

<b><u>Numéro AMM UE</u></b>	<b><u>Nom (de fantaisie)</u></b>	<b><u>Dosage</u></b>	<b><u>Forme pharmaceutique</u></b>	<b><u>Voie d'administration</u></b>	<b><u>Conditionnement primaire</u></b>	<b><u>Contenu (Concentration)</u></b>	<b><u>Présentation</u></b>
EU/1/23/1765/001	Ebglyss	250 mg	Solution injectable	Utilisation sous-cutanée	seringue préremplie (verre)	2 ml (125 mg/ml)	1 seringue préremplie
EU/1/23/1765/002	Ebglyss	250 mg	Solution injectable	Utilisation sous-cutanée	seringue préremplie (verre)	2 ml (125 mg/ml)	2 seringues préremplies
EU/1/23/1765/003	Ebglyss	250 mg	Solution injectable	Utilisation sous-cutanée	seringue préremplie (verre)	2 ml (125 mg/ml)	3 seringues préremplies
EU/1/23/1765/004	Ebglyss	250 mg	Solution injectable	Utilisation sous-cutanée	seringue préremplie (verre)	2 ml (125 mg/ml)	4 (2 x 2) seringues préremplies (conditionnement multiple)
EU/1/23/1765/005	Ebglyss	250 mg	Solution injectable	Utilisation sous-cutanée	seringue préremplie (verre)	2 ml (125 mg/ml)	5 (5 x 1) seringues préremplies (conditionnement multiple)
EU/1/23/1765/006	Ebglyss	250 mg	Solution injectable	Utilisation sous-cutanée	seringue préremplie (verre)	2 ml (125 mg/ml)	6 (3 x 2) seringues préremplies (conditionnement multiple)
EU/1/23/1765/007	Ebglyss	250 mg	Solution injectable	Utilisation sous-cutanée	stylo prérempli (verre)	2 ml (125 mg/ml)	1 stylo prérempli
EU/1/23/1765/008	Ebglyss	250 mg	Solution injectable	Utilisation sous-cutanée	stylo prérempli (verre)	2 ml (125 mg/ml)	2 stylos préremplis
EU/1/23/1765/009	Ebglyss	250 mg	Solution injectable	Utilisation sous-cutanée	stylo prérempli (verre)	2 ml (125 mg/ml)	3 stylos préremplis
EU/1/23/1765/010	Ebglyss	250 mg	Solution injectable	Utilisation sous-cutanée	stylo prérempli (verre)	2 ml (125 mg/ml)	4 (2 x 2) stylos préremplis (conditionnement multiple)
EU/1/23/1765/011	Ebglyss	250 mg	Solution injectable	Utilisation sous-cutanée	stylo prérempli (verre)	2 ml (125 mg/ml)	5 (5 x 1) stylos préremplis (conditionnement multiple)
EU/1/23/1765/012	Ebglyss	250 mg	Solution injectable	Utilisation sous-cutanée	stylo prérempli (verre)	2 ml (125 mg/ml)	6 (3 x 2) stylos préremplis (conditionnement multiple)