

<u>Numéro (AMM) UE</u>	<u>Nom de fantaisie</u>	<u>Dosage</u>	<u>Forme pharmaceutique</u>	<u>Espèces cibles</u>	<u>Voie d'administration</u>	<u>Conditionnement</u>	<u>Contenu</u>	<u>Taille de l'emballage</u>	<u>Temps d'attente</u>
EMA/V/C/002283	Emdocam	20 mg/ml	Solution injectable	Bovins, porcins et chevaux	Bovins : voie sous-cutanée ou intraveineuse Porcins : voie intramusculaire Chevaux : voie intraveineuse	Flacon (verre)	50 ml	1 flacon	Bovins Viande et abats : 15 jours Lait : 5 jours Porcins et chevaux Viande et abats : 5 jours
EMA/V/C/002283	Emdocam	20 mg/ml	Solution injectable	Bovins, porcins et chevaux	Bovins : voie sous-cutanée ou intraveineuse Porcins : voie intramusculaire Chevaux : voie intraveineuse	Flacon (verre)	100 ml	1 flacon	Bovins Viande et abats : 15 jours Lait : 5 jours Porcins et chevaux Viande et abats : 5 jours
EMA/V/C/002283	Emdocam	20 mg/ml	Solution injectable	Bovins, porcins et chevaux	Bovins : voie sous-cutanée ou intraveineuse Porcins : voie intramusculaire Chevaux : voie intraveineuse	Flacon (verre)	250 ml	1 flacon	Bovins Viande et abats : 15 jours Lait : 5 jours Porcins et chevaux Viande et abats : 5 jours
EMA/V/C/002283/X/013	Emdocam	15 mg/ml	Suspension buvable	Chevaux	Voie orale	Flacon (polyéthylène)	125 ml	1 flacon	Viande et abats : 3 jours
EMA/V/C/002283/X/013	Emdocam	15 mg/ml	Suspension buvable	Chevaux	Voie orale	Flacon (polyéthylène)	336 ml	1 flacon	Viande et abats : 3 jours

EMA/V/C/002283/X/012	Emdocam	5 mg/ml	Solution injectable	Chiens, chats	Chien : voie sous-cutanée ou intraveineuse Chat : voie sous-cutanée	Flacon (verre)	20 ml	1 flacon	Sans objet
EMA/V/C/002283/X/012	Emdocam	5 mg/ml	Solution injectable	Chiens, chats	Chien : voie sous-cutanée ou intraveineuse Chat : voie sous-cutanée	Flacon (verre)	50 ml	1 flacon	Sans objet
EMA/V/C/002283/X/012	Emdocam	5 mg/ml	Solution injectable	Bovins et porcins	Bovins : voie sous-cutanée ou intraveineuse Porcins : voie intramusculaire	Flacon (verre)	50 ml	1 flacon	Bovins Viande et abats : 15 jours Porcins Viande et abats : 5 jours
EMA/V/C/002283/X/012	Emdocam	5 mg/ml	Solution injectable	Bovins et porcins	Bovins : voie sous-cutanée ou intraveineuse Porcins : voie intramusculaire	Flacon (verre)	100 ml	1 flacon	Bovins Viande et abats : 15 jours Porcins Viande et abats : 5 jours
EMA/V/C/002283/X/012	Emdocam	5 mg/ml	Solution injectable	Bovins et porcins	Bovins : voie sous-cutanée ou intraveineuse Porcins : voie intramusculaire	Flacon (verre)	250 ml	1 flacon	Bovins Viande et abats : 15 jours Porcins Viande et abats : 5 jours