

| <u>Numéro AMM UE</u> | <u>Nom (de fantaisie)</u> | <u>Dosage</u> | <u>Forme pharmaceutique</u> | <u>Voie d'administration</u> | <u>Conditionnement primaire</u> | <u>Contenu (concentration)</u> | <u>Présentation</u> |
|----------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|---|--------------------------------|--|
| EU/1/19/1356/001 | IDACIO | 40 mg/0,8 ml | Solution injectable | Voie sous-cutanée | flacon (verre) | 0,8 ml (40 mg/0,8ml) | 1 flacon + 1 seringue + 1 aiguille + 1 adaptateur + 2 tampons d'alcool |
| EU/1/19/1356/002 | IDACIO | 40 mg | Solution injectable | Voie sous-cutanée | seringue préremplie (verre) | 0,8 ml (40 mg/0,8ml) | 2 seringues préremplies + 2 tampons d'alcool |
| EU/1/19/1356/003 | IDACIO | 40 mg | Solution injectable | Voie sous-cutanée | seringue préremplie (verre) dans un stylo | 0,8 ml (40 mg/0,8ml) | 2 stylos préremplis + 2 tampons d'alcool |
| EU/1/19/1356/004 | IDACIO | 40 mg | Solution injectable | Voie sous-cutanée | seringue préremplie (verre) | 0,8 ml (40 mg/0,8ml) | 6 seringues préremplies + 6 tampons d'alcool |
| EU/1/19/1356/005 | IDACIO | 40 mg | Solution injectable | Voie sous-cutanée | seringue préremplie (verre) dans un stylo | 0,8 ml (40 mg/0,8ml) | 6 stylos préremplis + 6 tampons d'alcool |