Numéro AMM (UE)	Nom (de fantaisie)	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration	Conditionnement primaire	Contenu (Concentration)	Présentation
EU/1/21/1612/001	Prevenar 20	-- [1]	Suspension injectable	Voie intramusculaire	Seringue préremplie (verre)	0,5 ml	1 seringue préremplie
EU/1/21/1612/002	Prevenar 20	-- [1]	Suspension injectable	Voie intramusculaire	Seringue préremplie (verre)	0,5 ml	1 seringue préremplie + 1 aiguille
EU/1/21/1612/003	Prevenar 20	-- [1]	Suspension injectable	Voie intramusculaire	Seringue préremplie (verre)	0,5 ml	10 seringues préremplies
EU/1/21/1612/004	Prevenar 20	-- [1]	Suspension injectable	Voie intramusculaire	Seringue préremplie (verre)	0,5 ml	10 seringues préremplies + 10 aiguilles
EU/1/21/1612/005	Prevenar 20	-- [1]	Suspension injectable	Voie intramusculaire	Seringue préremplie (verre)	0,5 ml	50 seringues préremplies
EU/1/21/1612/006	Prevenar 20	-- [1]	Suspension injectable	Voie intramusculaire	Seringue préremplie (verre)	0,5 ml	50 seringues préremplies + 50 aiguilles

--[1] --[1]

1 dose (0,5 ml) contient :

Polyoside pneumococcique sérotype 1[1] [2]	2,2 µg
Polyoside pneumococcique sérotype 3[1] [2]	2,2 µg
Polyoside pneumococcique sérotype 4[1] [2]	2,2 µg
Polyoside pneumococcique sérotype 5[1] [2]	2,2 µg
Polyoside pneumococcique sérotype 6A[1] [2]	2,2 µg
Polyoside pneumococcique sérotype 6B[1] [2]	4,4 µg
Polyoside pneumococcique sérotype 7F[1] [2]	2,2 µg
Polyoside pneumococcique sérotype 8[1] [2]	2,2 µg
Polyoside pneumococcique sérotype 9V[1] [2]	2,2 µg
Polyoside pneumococcique sérotype 10A[1] [2]	2,2 µg
Polyoside pneumococcique sérotype 11A[1] [2]	2,2 µg
Polyoside pneumococcique sérotype 12F[1] [2]	2,2 µg
Polyoside pneumococcique sérotype 14[1] [2]	2,2 µg
Polyoside pneumococcique sérotype 15B[1] [2]	2,2 µg
Polyoside pneumococcique sérotype 18C[1] [2]	2,2 µg

Numéro AMM (UE)	Nom (de fantaisie)	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration	Conditionnement primaire	Contenu (Concentration)	Présentation
Polyoside pneumococcique sérotype 19A[1] [2]			2,2 µg				
Polyoside pneumococcique sérotype 19F[1] [2]			2,2 µg				
Polyoside pneumococcique sérotype 22F[1] [2]			2,2 µg				
Polyoside pneumococcique sérotype 23F[1] [2]			2,2 µg				
Polyoside pneumococcique sérotype 33F[1] [2]			2,2 µg				

[1] Conjugué à la protéine vectrice CRM_{197} (environ 51 µg par dose)
[2] Adsorbé sur phosphate d'aluminium (0,125 mg d'aluminium par dose)