

<u>Numéro AMM UE</u>	<u>Nom (de fantaisie)</u>	<u>Dosage</u>	<u>Forme pharmaceutique</u>	<u>Voie d'administration</u>	<u>Conditionnement primaire</u>	<u>Contenu (concentration)</u>	<u>Présentation</u>
EU/1/18/1340/001	TAKHZYRO	300 mg	Solution injectable	Voie sous-cutanée	Flacon (verre)	2 ml (150 mg/ml)	1 flacon + 1 seringue + 2 aiguilles
EU/1/18/1340/002	TAKHZYRO	300 mg	Solution injectable	Voie sous-cutanée	Flacon (verre)	2 ml (150 mg/ml)	2 (2 × 1) flacons + 2 (2 × 1) seringues + 4 (2 × 2) aiguilles (conditionnement multiple)
EU/1/18/1340/003	TAKHZYRO	300 mg	Solution injectable	Voie sous-cutanée	Flacon (verre)	2 ml (150 mg/ml)	6 (6 × 1) flacons + 6 (6 × 1) seringues + 12 (6 × 2) aiguilles (conditionnement multiple)
EU/1/18/1340/004	TAKHZYRO	300 mg	Solution injectable	Voie sous-cutanée	Seringue préremplie (verre)	2 ml (150 mg/ml)	1 seringue préremplie
EU/1/18/1340/005	TAKHZYRO	300 mg	Solution injectable	Voie sous-cutanée	Seringue préremplie (verre)	2 ml (150 mg/ml)	2 seringues préremplies
EU/1/18/1340/006	TAKHZYRO	300 mg	Solution injectable	Voie sous-cutanée	Seringue préremplie (verre)	2 ml (150 mg/ml)	6 (3 × 2) seringues préremplies (conditionnement multiple)
EU/1/18/1340/007	TAKHZYRO	150 mg	Solution injectable	Voie sous-cutanée	Seringue préremplie (verre)	1 ml (150 mg/ml)	1 seringue préremplie
EU/1/18/1340/008	TAKHZYRO	150 mg	Solution injectable	Voie sous-cutanée	Seringue préremplie (verre)	1 ml (150 mg/ml)	2 seringues préremplies
EU/1/18/1340/009	TAKHZYRO	150 mg	Solution injectable	Voie sous-cutanée	Seringue préremplie (verre)	1 ml (150 mg/ml)	6 (3 × 2) seringues préremplies (conditionnement multiple)
EU/1/18/1340/010	TAKHZYRO	300 mg	Solution injectable	Voie sous-cutanée	Seringue préremplie (verre) dans un stylo prérempli	2 ml (150 mg/ml)	1 stylo prérempli
EU/1/18/1340/011	TAKHZYRO	300 mg	Solution injectable	Voie sous-cutanée	Seringue préremplie (verre) dans un stylo prérempli	2 ml (150 mg/ml)	2 stylos préremplis
EU/1/18/1340/012	TAKHZYRO	300 mg	Solution injectable	Voie sous-cutanée	Seringue préremplie (verre) dans un stylo prérempli	2 ml (150 mg/ml)	6 (3 × 2) stylos préremplis (conditionnement multiple)