

## Annexe A

| Numéro (AMM)<br>UE | Nom de<br>fantaisie | Dosage        | Forme<br>pharmaceutique | Espèces<br>cibles               | Voie<br>d'administration | Condition-<br>nement | Contenu | Taille de<br>l'emballage | Temps d'attente                                                         |
|--------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| EU/2/15/192/001    | Velactis            | 1,12<br>mg/ml | Solution injectable     | Bovins<br>(vaches<br>laitières) | Voie<br>intramusculaire  | Flacon<br>(verre)    | 5 ml    | 1 flacon                 | Viande et abats :<br>23 jours.<br>Lait :<br>4 jours après le<br>vêlage* |
| EU/2/15/192/002    | Velactis            | 1,12<br>mg/ml | Solution injectable     | Bovins<br>(vaches<br>laitières) | Voie<br>intramusculaire  | Flacon<br>(verre)    | 25 ml   | 1 flacon                 | Viande et abats :<br>23 jours.<br>Lait :<br>4 jours après le<br>vêlage* |
| EU/2/15/192/003    | Velactis            | 1,12<br>mg/ml | Solution injectable     | Bovins<br>(vaches<br>laitières) | Voie<br>intramusculaire  | Flacon<br>(verre)    | 50 ml   | 1 flacon                 | Viande et abats :<br>23 jours.<br>Lait :<br>4 jours après le<br>vêlage* |
| EU/2/15/192/004    | Velactis            | 1,12<br>mg/ml | Solution injectable     | Bovins<br>(vaches<br>laitières) | Voie<br>intramusculaire  | Flacon<br>(verre)    | 5 ml    | 5 flacons                | Viande et abats :<br>23 jours.<br>Lait :<br>4 jours après le<br>vêlage* |

\*Temps d'attente (lait) :

- Zéro heures après le vêlage lorsque la durée de la période sèche est de 32 jours ou plus.
- 4 jours (8 traites) après le vêlage lorsque la durée de la période sèche est inférieure à 32 jours.