

## **ANNEXE I**

### **RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

## 1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT

Kalydeco 75 mg comprimés pelliculés  
Kalydeco 150 mg comprimés pelliculés

## 2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

### Kalydeco 75 mg comprimés pelliculés

Chaque comprimé pelliculé contient 75 mg d'ivacaftor.

*Excipient à effet notoire*

Chaque comprimé pelliculé contient 83,6 mg de lactose monohydraté.

### Kalydeco 150 mg comprimés pelliculés

Chaque comprimé pelliculé contient 150 mg d'ivacaftor.

*Excipient à effet notoire*

Chaque comprimé pelliculé contient 167,2 mg de lactose monohydraté.

Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1.

## 3. FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé pelliculé (comprimé).

### Kalydeco 75 mg comprimés pelliculés

Comprimés pelliculés oblongs, bleu clair, portant la mention « V 75 » imprimée à l'encre noire sur une face et unis sur l'autre face (12,7 mm × 6,8 mm, de forme oblongue).

### Kalydeco 150 mg comprimés pelliculés

Comprimés pelliculés oblongs, bleu clair, portant la mention « V 150 » imprimée à l'encre noire sur une face et unis sur l'autre face (16,5 mm × 8,4 mm, de forme oblongue).

## 4. INFORMATIONS CLINIQUES

### 4.1 Indications thérapeutiques

Kalydeco comprimés est indiqué :

- En monothérapie dans le traitement des adultes, des adolescents et des enfants âgés de 6 ans et plus, et pesant 25 kg et plus atteints de mucoviscidose porteurs d'une mutation *R117H* du gène *CFTR* ou de l'une des mutations de défaut de régulation (classe III) du gène *CFTR* (*cystic fibrosis transmembrane conductance regulator*) suivantes : *G551D*, *G1244E*, *G1349D*, *G178R*, *G551S*, *S1251N*, *S1255P*, *S549N* ou *S549R* (voir rubriques 4.4 et 5.1).
- En association avec tezacaftor/ivacaftor comprimés, dans le traitement des adultes, des adolescents et des enfants âgés de 6 ans et plus atteints de mucoviscidose, homozygotes pour la mutation *F508del* ou hétérozygotes pour la mutation *F508del* et porteurs de l'une des mutations

suivantes du gène *CFTR* : *P67L*, *R117C*, *L206W*, *R352Q*, *A455E*, *D579G*, *711+3A→G*, *S945L*, *S977F*, *R1070W*, *D1152H*, *2789+5G→A*, *3272-26A→G* et *3849+10kbC→T*.

- En association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor comprimés dans le traitement des adultes, des adolescents et des enfants âgés de 6 ans et plus atteints de mucoviscidose porteurs d'au moins une mutation autre que de classe I du gène *CFTR* (voir rubriques 4.2 et 5.1).

## 4.2 Posologie et mode d'administration

La prescription de Kalydeco est réservée aux médecins expérimentés dans le traitement de la mucoviscidose. Si le génotype du patient n'est pas connu, un génotypage par une méthode fiable et validée devra être réalisé avant l'initiation du traitement, afin de confirmer la présence d'une mutation du gène *CFTR* entrant dans l'indication (voir rubrique 4.1). Le variant polythymidique [poly-T] identifié avec la mutation *R117H* doit être déterminé conformément aux recommandations locales.

### *Kalydeco en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor*

Le nombre de patients porteurs de mutations non répertoriées dans le tableau 6 susceptibles de répondre au traitement par l'ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor (IVA/TEZ/ELX) est limité. Chez ces patients, le traitement par l'ivacaftor (IVA) en association avec IVA/TEZ/ELX peut être envisagé sous surveillance médicale étroite si le médecin considère que les bénéfices attendus prédominent sur les risques potentiels. Cela exclut les patients porteurs de deux mutations de classe I (non-sens-mutations connues pour ne pas produire de protéine CFTR), qui, de ce fait, ne devraient pas répondre au traitement modulateur (voir rubriques 4.1, 4.4 et 5.1).

### Posologie

La posologie chez les adultes, les adolescents et les enfants âgés de 6 ans et plus doit être déterminée conformément au tableau 1.

**Tableau 1 : Recommandations posologiques**

| Âge/poids                                                             | Dose du matin                                                         | Dose du soir                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Ivacaftor en monothérapie</b>                                      |                                                                       |                                |
| 6 ans et plus, ≥ 25 kg                                                | Un comprimé d'ivacaftor 150 mg                                        | Un comprimé d'ivacaftor 150 mg |
| <b>Ivacaftor en association avec tezacaftor/ivacaftor</b>             |                                                                       |                                |
| 6 ans à < 12 ans, < 30 kg                                             | Un comprimé de tezacaftor/ivacaftor 50 mg/75 mg                       | Un comprimé d'ivacaftor 75 mg  |
| 6 ans à < 12 ans, ≥ 30 kg                                             | Un comprimé de tezacaftor/ivacaftor 100 mg/150 mg                     | Un comprimé d'ivacaftor 150 mg |
| 12 ans et plus                                                        | Un comprimé de tezacaftor/ivacaftor 100 mg/150 mg                     | Un comprimé d'ivacaftor 150 mg |
| <b>Ivacaftor en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor</b> |                                                                       |                                |
| 6 ans à < 12 ans, < 30 kg                                             | Deux comprimés d'ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor 37,5 mg/25 mg/50 mg | Un comprimé d'ivacaftor 75 mg  |
| 6 ans à < 12 ans, ≥ 30 kg                                             | Deux comprimés d'ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor 75 mg/50 mg/100 mg  | Un comprimé d'ivacaftor 150 mg |
| 12 ans et plus                                                        | Deux comprimés d'ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor 75 mg/50 mg/100 mg  | Un comprimé d'ivacaftor 150 mg |

Les doses du matin et du soir doivent être prises à environ 12 heures régulièrement avec un repas riche en graisses (voir rubrique Mode d'administration).

### *Oubli d'une prise*

S'il s'est écoulé 6 heures ou moins depuis l'heure de prise de la dose du matin ou du soir oubliée, le patient doit prendre la dose le plus tôt possible et prendre ensuite la prochaine dose au moment habituel. Si un délai de plus de 6 heures s'est écoulé, le patient doit attendre et prendre la dose suivante à l'heure habituelle.

Les patients traités par Kalydeco en association doivent être informés qu'ils ne doivent pas prendre plus d'une dose de chaque médicament en même temps.

### *Administration concomitante avec les inhibiteurs du CYP3A*

En cas d'utilisation concomitante d'inhibiteurs modérés ou puissants du CYP3A, la dose d'ivacaftor doit être ajustée comme indiqué dans le tableau 2. L'intervalle entre chaque prise doit être modifié en fonction de la réponse clinique et de la tolérance (voir rubriques 4.4 et 4.5).

**Tableau 2 : Recommandations posologiques en cas d'administration concomitante avec des inhibiteurs modérés ou puissants du CYP3A**

| Âge/poids                                            | Inhibiteurs modérés du CYP3A                                                                                                                                                                                                                                        | Inhibiteurs puissants du CYP3A                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ivacaftor en monothérapie</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |
| 6 ans et plus,<br>≥ 25 kg                            | Un comprimé d'ivacaftor 150 mg une fois par jour le matin.<br><br>Pas de prise d'ivacaftor le soir.                                                                                                                                                                 | Un comprimé d'ivacaftor 150 mg le matin deux fois par semaine à 3 ou 4 jours d'intervalle.<br><br>Pas de prise d'ivacaftor le soir.                    |
| <b>Ivacaftor en association tezacaftor/ivacaftor</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |
| 6 ans à < 12 ans,<br>< 30 kg                         | En alternance un jour sur deux : <ul style="list-style-type: none"><li>- un comprimé de tezacaftor/ivacaftor 50 mg/75 mg le matin le premier jour,</li><li>- un comprimé d'ivacaftor 75 mg le matin le lendemain.</li></ul><br>Pas de prise d'ivacaftor le soir.    | Un comprimé de tezacaftor/ivacaftor 50 mg/75 mg le matin deux fois par semaine à 3 ou 4 jours d'intervalle.<br><br>Pas de prise d'ivacaftor le soir.   |
| 6 ans à < 12 ans,<br>≥ 30 kg                         | En alternance un jour sur deux : <ul style="list-style-type: none"><li>- un comprimé de tezacaftor/ivacaftor 100 mg/150 mg le matin le premier jour,</li><li>- un comprimé d'ivacaftor 150 mg le matin le lendemain.</li></ul><br>Pas de prise d'ivacaftor le soir. | Un comprimé de tezacaftor/ivacaftor 100 mg/150 mg le matin deux fois par semaine à 3 ou 4 jours d'intervalle.<br><br>Pas de prise d'ivacaftor le soir. |
| 12 ans et plus                                       | En alternance un jour sur deux : <ul style="list-style-type: none"><li>- un comprimé de tezacaftor/ivacaftor 100 mg/150 mg le matin le premier jour,</li><li>- un comprimé d'ivacaftor 150 mg le matin le lendemain.</li></ul><br>Pas de prise d'ivacaftor le soir. | Un comprimé de tezacaftor/ivacaftor 100 mg/150 mg le matin deux fois par semaine à 3 ou 4 jours d'intervalle.<br><br>Pas de prise d'ivacaftor le soir. |

| Âge/poids                                                             | Inhibiteurs modérés du CYP3A                                                                                                                                                                                                              | Inhibiteurs puissants du CYP3A                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ivacaftor en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor</b> |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |
| 6 ans à < 12 ans,<br>< 30 kg                                          | En alternance un jour sur deux :<br>- deux comprimés d'ivacaftor/tezacaftor/ elexacaftor 37,5 mg/25 mg/50 mg le matin le premier jour,<br>- un comprimé d'ivacaftor 75 mg le matin le lendemain.<br><br>Pas de prise d'ivacaftor le soir. | Deux comprimés d'ivacaftor/tezacaftor/ elexacaftor 37,5 mg/25 mg/50 mg le matin deux fois par semaine à 3 ou 4 jours d'intervalle.<br><br>Pas de prise d'ivacaftor le soir. |
| 6 ans à < 12 ans,<br>≥ 30 kg                                          | En alternance un jour sur deux :<br>- deux comprimés d'ivacaftor/tezacaftor/ elexacaftor 75 mg/50 mg/100 mg le matin le premier jour,<br>- un comprimé d'ivacaftor 150 mg le matin le lendemain.<br><br>Pas de prise d'ivacaftor le soir. | Deux comprimés d'ivacaftor/tezacaftor/ elexacaftor 75 mg/50 mg/100 mg le matin deux fois par semaine à 3 ou 4 jours d'intervalle.<br><br>Pas de prise d'ivacaftor le soir.  |
| 12 ans et plus                                                        | En alternance un jour sur deux :<br>- deux comprimés d'ivacaftor/tezacaftor/ elexacaftor 75 mg/50 mg/100 mg le matin le premier jour,<br>- un comprimé d'ivacaftor 150 mg le matin le lendemain.<br><br>Pas de prise d'ivacaftor le soir. | Deux comprimés d'ivacaftor/tezacaftor/ elexacaftor 75 mg/50 mg/100 mg le matin deux fois par semaine à 3 ou 4 jours d'intervalle.<br><br>Pas de prise d'ivacaftor le soir.  |

### Populations particulières

#### *Personnes âgées*

Les données concernant les personnes âgées traitées par l'ivacaftor (administré en monothérapie ou en association) sont très limitées. Aucune adaptation de la posologie spécifique à cette population de patients n'est nécessaire (voir rubrique 5.2).

#### *Insuffisance rénale*

Aucune adaptation de la posologie n'est nécessaire chez les patients présentant une insuffisance rénale légère à modérée. La prudence est recommandée chez les patients présentant une insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine inférieure ou égale à 30 mL/min) ou en phase terminale (voir rubriques 4.4 et 5.2.).

#### *Insuffisance hépatique*

Aucune adaptation de la posologie n'est nécessaire chez les patients présentant une insuffisance hépatique légère (Child-Pugh de classe A).

Chez les patients présentant une insuffisance hépatique modérée (Child-Pugh de classe B) ou sévère (Child-Pugh de classe C), la dose d'ivacaftor doit être ajustée comme indiqué dans le tableau 3 (voir rubriques 4.4, 4.8 et 5.2).

**Tableau 3 : Recommandations posologiques chez les patients présentant une insuffisance hépatique modérée ou sévère**

| Âge/poids                                                 | Modérée (Child-Pugh de classe B)                                                                                                    | Sévère (Child-Pugh de classe C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ivacaftor en monothérapie</b>                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6 ans et plus,<br>≥ 25 kg                                 | Un comprimé d'ivacaftor 150 mg une fois par jour le matin.<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Pas de prise d'ivacaftor le soir. | <b>L'utilisation n'est pas recommandée</b> , sauf si les bénéfices escomptés prédominent sur les risques.<br><br>En cas d'utilisation, un comprimé d'ivacaftor 150 mg le matin un jour sur deux ou moins fréquemment en fonction de la réponse clinique et de la tolérance.<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Pas de prise d'ivacaftor le soir.                     |
| <b>Ivacaftor en association avec tezacaftor/ivacaftor</b> |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6 ans à<br>< 12 ans,<br>< 30 kg                           | Un comprimé de tezacaftor/ivacaftor 50 mg/75 mg une fois par jour le matin.<br><br>Pas de prise d'ivacaftor le soir.                | <b>L'utilisation n'est pas recommandée</b> , sauf si les bénéfices escomptés prédominent sur les risques.<br><br>En cas d'utilisation, un comprimé de tezacaftor/ivacaftor 50 mg/75 mg le matin une fois par jour ou moins fréquemment en fonction de la réponse clinique et de la tolérance.<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Pas de prise d'ivacaftor le soir.   |
| 6 ans à<br>< 12 ans,<br>≥ 30 kg                           | Un comprimé de tezacaftor/ivacaftor 100 mg/150 mg une fois par jour le matin.<br><br>Pas de prise d'ivacaftor le soir.              | <b>L'utilisation n'est pas recommandée</b> , sauf si les bénéfices escomptés prédominent sur les risques.<br><br>En cas d'utilisation, un comprimé de tezacaftor/ivacaftor 100 mg/150 mg le matin une fois par jour ou moins fréquemment en fonction de la réponse clinique et de la tolérance.<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Pas de prise d'ivacaftor le soir. |
| 12 ans et plus                                            | Un comprimé de tezacaftor/ivacaftor 100 mg/150 mg une fois par jour le matin.<br><br>Pas de prise d'ivacaftor le soir.              | <b>L'utilisation n'est pas recommandée</b> , sauf si les bénéfices escomptés prédominent sur les risques.<br><br>En cas d'utilisation, un comprimé de tezacaftor/ivacaftor 100 mg/150 mg le matin une fois par jour ou moins fréquemment en fonction de la réponse clinique et de la tolérance.<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Pas de prise d'ivacaftor le soir. |

| Âge/poids                                                             | Modérée (Child-Pugh de classe B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sévère (Child-Pugh de classe C) |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Ivacaftor en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| 6 ans à<br>< 12 ans,<br>< 30 kg                                       | <p><b>L'utilisation n'est pas recommandée</b>, sauf si les bénéfices escomptés prédominent sur les risques.</p> <p>En cas d'utilisation, la dose doit être ajustée comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jour 1 : deux comprimés d'ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor 37,5 mg/25 mg/50 mg le matin</li> <li>• Jour 2 : un comprimé d'ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor 37,5 mg/25 mg/50 mg le matin</li> </ul> <p>Poursuivre ensuite en alternant les posologies du jour 1 et du jour 2.</p> <p>Pas de prise d'ivacaftor le soir.</p> | Ne doit pas être utilisé.       |
| 6 ans à<br>< 12 ans,<br>≥ 30 kg                                       | <p><b>L'utilisation n'est pas recommandée</b>, sauf si les bénéfices escomptés prédominent sur les risques.</p> <p>En cas d'utilisation, la dose doit être ajustée comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jour 1 : deux comprimés d'ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor 75 mg/50 mg/100 mg le matin</li> <li>• Jour 2 : un comprimé d'ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor 75 mg/50 mg/100 mg le matin</li> </ul> <p>Poursuivre ensuite en alternant les posologies du jour 1 et du jour 2.</p> <p>Pas de prise d'ivacaftor le soir.</p>   | Ne doit pas être utilisé.       |
| 12 ans et plus                                                        | <p><b>L'utilisation n'est pas recommandée</b>, sauf si les bénéfices escomptés prédominent sur les risques.</p> <p>En cas d'utilisation, la dose doit être ajustée comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jour 1 : deux comprimés d'ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor 75 mg/50 mg/100 mg le matin</li> <li>• Jour 2 : un comprimé d'ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor 75 mg/50 mg/100 mg le matin</li> </ul> <p>Poursuivre ensuite en alternant les posologies du jour 1 et du jour 2.</p> <p>Pas de prise d'ivacaftor le soir.</p>   | Ne doit pas être utilisé.       |

## Population pédiatrique

La sécurité et l'efficacité de l'ivacaftor en monothérapie n'ont pas été établies chez les enfants âgés de moins d'1 mois ou chez les enfants âgés de moins de 6 mois nés prématurés (nés à moins de 37 semaines d'âge gestationnel). Elles n'ont pas non plus été établies pour l'ivacaftor en association avec tezacaftor/ivacaftor chez les enfants âgés de moins de 6 ans et pour l'ivacaftor en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor chez les enfants âgés de moins de 2 ans. Aucune donnée n'est disponible.

Les données chez les patients de moins de 6 ans porteurs d'une mutation *R117H* du gène *CFTR* sont limitées. Les données disponibles chez les patients âgés de 6 ans et plus sont décrites aux rubriques 4.8, 5.1 et 5.2.

## Mode d'administration

Voie orale.

Il convient de préciser aux patients que les comprimés doivent être avalés en entier. Les comprimés ne doivent pas être croqués, écrasés ou fractionnés dans la mesure où il n'existe pas actuellement de données cliniques documentant ces modalités d'emploi.

Les comprimés d'ivacaftor doivent être administrés avec un repas riche en graisses.

La consommation d'aliments ou de boissons contenant du pamplemousse doit être évitée durant le traitement (voir rubrique 4.5).

### **4.3 Contre-indications**

Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1.

### **4.4 Mises en garde spéciales et précautions d'emploi**

Seuls les patients atteints de mucoviscidose qui présentaient une mutation de défaut de régulation (classe III) *G551D*, *G1244E*, *G1349D*, *G178R*, *G551S*, *S1251N*, *S1255P*, *S549N*, *S549R* ou une mutation *G970R* ou *R117H* sur au moins un allèle du gène *CFTR* ont été inclus dans les études 770-102, 770-103, 770-111 et 770-110 (voir rubrique 5.1).

Quatre patients porteurs de la mutation *G970R* ont été inclus dans l'étude 770-111. Chez trois des quatre patients, la variation du taux de chlorures dans la sueur a été inférieure à 5 mmol/L et ce groupe ne présentait pas d'amélioration cliniquement significative du VEMS après 8 semaines de traitement. L'efficacité clinique chez les patients porteurs de la mutation *G970R* du gène *CFTR* n'a pas pu être établie (voir rubrique 5.1).

Les résultats d'efficacité d'une étude de phase II réalisée chez des patients atteints de mucoviscidose, homozygotes pour la mutation *CFTR-F508del*, n'ont pas mis en évidence de différence statistiquement significative du VEMS après 16 semaines de traitement par l'ivacaftor comparé au placebo (voir rubrique 5.1). Par conséquent, l'utilisation de l'ivacaftor en monothérapie n'est pas recommandée chez ces patients.

Dans l'étude 770-110, l'effet positif de l'ivacaftor observé a été moins évident chez les patients porteurs d'une mutation *R117H-7T* associée à une maladie moins sévère (voir rubrique 5.1).

L'ivacaftor en association avec tezacaftor/ivacaftor ne doit pas être prescrit chez les patients atteints de mucoviscidose, hétérozygotes pour la mutation *F508del* et porteurs d'une seconde mutation du gène *CFTR* non mentionnée dans la liste figurant à la rubrique 4.1.

### Augmentations des transaminases et atteinte hépatique

Chez un patient présentant une cirrhose et une hypertension portale, une insuffisance hépatique nécessitant une transplantation a été rapportée lors du traitement par l'ivacaftor en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor. Ce médicament doit être utilisé avec précaution chez les patients présentant une atteinte hépatique avancée préexistante (par exemple cirrhose, hypertension portale), et uniquement si les bénéfices escomptés prédominent sur les risques. S'il est utilisé, ces patients doivent être étroitement surveillés après l'instauration du traitement (voir rubriques 4.2, 4.8 et 5.2).

Des augmentations modérées des transaminases (alanine aminotransférase [ALAT] ou aspartate aminotransférase [ASAT]) sont fréquentes chez les patients atteints de mucoviscidose. Des augmentations des transaminases ont été observées chez certains patients traités par l'ivacaftor en monothérapie et en association avec tezacaftor/ivacaftor ou ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor. Chez les patients recevant l'ivacaftor en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor, ces augmentations ont parfois été accompagnées d'élévations de la bilirubine totale. Par conséquent, un dosage des transaminases (ALAT et ASAT) et de la bilirubine totale est recommandé chez tous les patients avant l'instauration du traitement par l'ivacaftor, tous les 3 mois durant la première année de traitement, puis au moins une fois par an. Une surveillance plus fréquente de la fonction hépatique doit être envisagée chez les patients ayant des antécédents d'atteinte hépatique ou d'augmentations des transaminases. En cas d'augmentations significatives des transaminases (par exemple ALAT ou ASAT > 5 fois la limite supérieure de la normale [LSN] ou ALAT ou ASAT > 3 × LSN avec bilirubine > 2 × LSN), le traitement doit être interrompu et le bilan hépatique doit être étroitement surveillé jusqu'à sa normalisation. La décision d'une éventuelle reprise du traitement après normalisation du bilan hépatique doit tenir compte des risques encourus par rapport au bénéfice attendu (voir rubriques 4.2, 4.8 et 5.2).

### Insuffisance hépatique

L'utilisation de l'ivacaftor en monothérapie ou en association avec tezacaftor/ivacaftor n'est pas recommandée chez les patients âgés de 6 ans et plus présentant une insuffisance hépatique sévère sauf si les bénéfices escomptés prédominent sur les risques. Ces patients ne doivent pas être traités par l'ivacaftor en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor (voir tableau 3 à la rubrique 4.2 et rubriques 4.8 et 5.2).

L'utilisation de l'ivacaftor en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor chez les patients âgés de 6 ans et plus présentant une insuffisance hépatique modérée n'est pas recommandée. Le traitement ne doit être envisagé qu'en cas de nécessité médicale absolue et uniquement si les bénéfices escomptés prédominent sur les risques. Dans ce cas, il doit être utilisé avec précaution à une dose réduite (voir tableau 3 à la rubrique 4.2 et rubriques 4.8 et 5.2).

### Dépression

Des cas de dépression (incluant idées suicidaires et tentatives de suicide), apparaissant généralement au cours des trois mois suivant l'instauration du traitement, ont été rapportés chez des patients traités par l'ivacaftor, notamment en association avec tezacaftor/ivacaftor ou avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor, et ayant des antécédents de troubles psychiatriques. Une amélioration des symptômes a été observée dans certains cas après une réduction de la dose ou l'arrêt du traitement. Les patients (et aidants) doivent être avertis de la nécessité d'être attentifs à l'apparition d'une humeur dépressive, de pensées suicidaires ou de modifications inhabituelles du comportement et de prendre immédiatement avis auprès du médecin en cas de survenue de ces symptômes.

### Insuffisance rénale

La prudence est recommandée lors de l'utilisation de l'ivacaftor chez des patients présentant une insuffisance rénale sévère ou en phase terminale (voir rubriques 4.2 et 5.2).

### Mutations peu susceptibles de répondre au traitement modulateur

Les patients dont le génotype comprend deux mutations du gène *CFTR* connues pour ne pas produire de protéine CFTR (c'est-à-dire deux mutations de classe I) ne devraient pas répondre au traitement modulateur de la protéine CFTR.

### Études cliniques comparant l'ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor au tezacaftor/ivacaftor ou à l'ivacaftor

Il n'a pas été mené d'étude clinique comparant directement l'ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor au tezacaftor/ivacaftor ou à l'ivacaftor chez les patients qui ne sont pas porteurs de mutations *F508del*.

### Patients greffés

L'ivacaftor n'a pas été étudié chez les patients atteints de mucoviscidose ayant reçu une greffe d'organe. Par conséquent, l'utilisation chez les patients greffés n'est pas recommandée. Voir la rubrique 4.5 pour les interactions avec la ciclosporine ou le tacrolimus.

### Rashs cutanés

L'incidence des rashs observés avec l'ivacaftor en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor était plus élevée chez les patientes que chez les patients de sexe masculin, en particulier chez les patientes prenant des contraceptifs hormonaux. Le rôle des contraceptifs hormonaux dans la survenue d'un rash ne peut être exclu. L'interruption du traitement par l'ivacaftor en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor et des contraceptifs hormonaux doit être envisagée chez les patientes sous contraceptifs hormonaux qui développent un rash. Après disparition du rash, il convient d'évaluer si la reprise du traitement par l'ivacaftor en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor sans contraceptifs hormonaux est appropriée. Si le rash ne récidive pas, la reprise des contraceptifs hormonaux peut être envisagée (voir rubrique 4.8).

### Interactions avec d'autres médicaments

#### *Inducteurs du CYP3A*

L'utilisation concomitante d'inducteurs du CYP3A diminue significativement l'exposition systémique de l'ivacaftor, ce qui peut entraîner une diminution de son efficacité. Par conséquent, l'administration concomitante d'ivacaftor avec des inducteurs puissants du CYP3A n'est pas recommandée (voir rubrique 4.5).

#### *Inhibiteurs du CYP3A*

L'utilisation concomitante d'inhibiteurs puissants ou modérés du CYP3A augmente les expositions systémiques de l'ivacaftor, du tezacaftor et de l'elexacaftor. En cas d'utilisation concomitante d'inhibiteurs modérés ou puissants du CYP3A, la dose d'ivacaftor doit être ajustée (voir tableau 2 à la rubrique 4.2 et rubrique 4.5).

### Population pédiatrique

Des cas d'opacités du cristallin/de cataractes non congénitales sans répercussions sur la vision ont été rapportés chez des enfants et adolescents traités par l'ivacaftor en monothérapie ou en association. Bien que d'autres facteurs de risque aient été présents dans certains cas (par exemple : corticothérapie et exposition à des rayonnements), un risque possible imputable au traitement par l'ivacaftor ne peut être exclu. Des examens ophtalmologiques avant et pendant le traitement sont recommandés en cas d'instauration du traitement par l'ivacaftor chez des patients pédiatriques (voir rubrique 5.3).

## Excipients à effet notoire

### *Lactose*

Ce médicament contient du lactose. Les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit total en lactase ou un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (maladies héréditaires rares) ne doivent pas prendre ce médicament.

### *Sodium*

Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par comprimé, c'est-à-dire qu'il est essentiellement « sans sodium ».

## **4.5 Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions**

L'ivacaftor est un substrat du CYP3A4 et du CYP3A5. C'est un inhibiteur faible du CYP3A et de la glycoprotéine P (P-gp) et un inhibiteur potentiel du CYP2C9. Les études *in vitro* ont montré que l'ivacaftor n'est pas un substrat de la P-gp.

### Médicaments modifiant la pharmacocinétique de l'ivacaftor

#### *Inducteurs du CYP3A*

L'administration concomitante d'ivacaftor et de rifampicine, un inducteur puissant du CYP3A, a diminué l'exposition systémique de l'ivacaftor (ASC) de 89 % et a diminué l'exposition systémique de l'hydroxyméthyl-ivacaftor (métabolite M1) dans une moindre mesure comparativement à l'ivacaftor. L'administration concomitante d'ivacaftor et d'inducteurs puissants du CYP3A, tels que la rifampicine, la rifabutine, le phénobarbital, la carbamazépine, la phénytoïne et le millepertuis (*Hypericum perforatum*), n'est pas recommandée (voir rubrique 4.4).

Aucune adaptation de la posologie n'est préconisée en cas d'utilisation de l'ivacaftor avec des inducteurs faibles ou modérés du CYP3A.

#### *Inhibiteurs du CYP3A*

L'ivacaftor est un substrat de forte affinité du CYP3A. L'administration concomitante de kétoconazole, un inhibiteur puissant du CYP3A, a augmenté l'exposition systémique de l'ivacaftor (mesurée par l'aire sous la courbe des concentrations plasmatiques [ASC]) de 8,5 fois et a augmenté l'exposition systémique du métabolite M1 dans une moindre mesure comparativement à celle de l'ivacaftor. Une réduction de la posologie de l'ivacaftor est recommandée lors de l'administration concomitante d'inhibiteurs puissants du CYP3A, tels que le kétoconazole, l'itraconazole, le posaconazole, le voriconazole, la télithromycine et la clarithromycine (voir tableau 2 à la rubrique 4.2 et rubrique 4.4).

L'administration concomitante de fluconazole, un inhibiteur modéré du CYP3A, a augmenté l'exposition systémique de l'ivacaftor de 3 fois et a augmenté l'exposition systémique du métabolite M1 dans une moindre mesure comparativement à celle de l'ivacaftor. Une réduction de la posologie de l'ivacaftor est recommandée chez les patients recevant un traitement concomitant par des inhibiteurs modérés du CYP3A, tels que le fluconazole, l'érythromycine et le vérapamil (voir tableau 2 à la rubrique 4.2 et rubrique 4.4).

L'administration concomitante d'ivacaftor et de jus de pamplemousse, qui contient un ou plusieurs composants inhibant modérément le CYP3A, peut augmenter l'exposition systémique de l'ivacaftor. La consommation d'aliments ou de boissons contenant du pamplemousse doit être évitée pendant le traitement par l'ivacaftor (voir rubrique 4.2).

### *Interactions potentielles entre l'ivacaftor et les transporteurs*

Les études *in vitro* ont montré que l'ivacaftor n'est pas un substrat d'OATP1B1 et d'OATP1B3. *In vitro*, l'ivacaftor et ses métabolites sont des substrats de la BCRP. Du fait de la perméabilité intrinsèque élevée de l'ivacaftor et de sa faible élimination sous forme inchangée, l'administration concomitante d'inhibiteurs de la BCRP ne devrait pas modifier les expositions systémiques de l'ivacaftor et du M1-IVA. Les éventuelles modifications de l'exposition systémique du M6-IVA ne devraient pas être cliniquement significatives.

### *Ciprofloxacin*

L'administration concomitante de ciprofloxacin et d'ivacaftor n'a pas eu d'effet sur l'exposition systémique de l'ivacaftor. Il n'y a pas lieu d'envisager une adaptation de la posologie en cas de traitement concomitant par l'ivacaftor et la ciprofloxacin.

### Médicaments dont la pharmacocinétique est modifiée par l'ivacaftor

L'administration d'ivacaftor peut augmenter l'exposition systémique des médicaments qui sont des substrats ayant une forte affinité pour le CYP2C9 et/ou la P-gp et/ou le CYP3A, ce qui peut augmenter ou prolonger leur effet thérapeutique et leurs effets indésirables.

### *Substrats du CYP2C9*

L'ivacaftor peut inhiber le CYP2C9. Par conséquent, la surveillance de l'INR (International Normalized Ratio - rapport normalisé international) est recommandée en cas d'administration concomitante de warfarine avec l'ivacaftor. Les autres médicaments dont l'exposition systémique peut être augmentée sont notamment le glimépiride et le glipizide. Ces médicaments doivent être utilisés avec précaution.

### *Digoxine et autres substrats de la P-gp*

L'administration concomitante de digoxine, un substrat ayant une forte affinité pour la P-gp, a entraîné une augmentation de l'exposition systémique de la digoxine d'un facteur 1,3, ce qui correspond à une inhibition faible de la P-gp par l'ivacaftor. L'administration d'ivacaftor peut augmenter l'exposition systémique des médicaments substrats de forte affinité de la P-gp, ce qui peut augmenter ou prolonger leur effet thérapeutique ainsi que leurs effets indésirables. La prudence et une surveillance adaptée sont préconisées en cas d'administration concomitante avec la digoxine ou avec d'autres substrats de la P-gp ayant une marge thérapeutique étroite tels que la ciclosporine, l'évérolimus, le sirolimus et le tacrolimus.

### *Substrats du CYP3A*

L'administration concomitante de midazolam (par voie orale), un substrat de forte affinité du CYP3A, a augmenté l'exposition systémique du midazolam d'un facteur 1,5, ce qui correspond à une inhibition faible du CYP3A par l'ivacaftor. Il n'y a pas lieu de prévoir une adaptation de la posologie des substrats du CYP3A tels que le midazolam, l'alprazolam, le diazépam ou le triazolam en cas d'administration concomitante avec l'ivacaftor.

### *Contraceptifs hormonaux*

Il n'a pas été mis en évidence d'effet significatif de l'ivacaftor sur les expositions systémiques d'un contraceptif œstro-progestatif administré par voie orale. Aucune adaptation de la posologie des contraceptifs oraux n'apparaît nécessaire.

### Population pédiatrique

Les études d'interaction n'ont été réalisées que chez l'adulte.

## **4.6 Fertilité, grossesse et allaitement**

### Grossesse

Il n'existe pas de données ou il existe des données limitées (moins de 300 grossesses) sur l'utilisation de l'ivacaftor chez la femme enceinte. Les études effectuées chez l'animal n'ont pas mis en évidence d'effets délétères directs ou indirects sur la reproduction (voir rubrique 5.3). Par mesure de précaution, il est préférable d'éviter l'utilisation de l'ivacaftor pendant la grossesse.

### Allaitement

Des données limitées montrent une excrétion de l'ivacaftor dans le lait maternel. Un risque pour les nouveau-nés/nourrissons allaités ne peut être exclu. Une décision doit être prise soit d'interrompre l'allaitement soit d'interrompre/de s'abstenir du traitement avec l'ivacaftor en prenant en compte le bénéfice de l'allaitement pour l'enfant au regard du bénéfice du traitement pour la femme.

### Fertilité

Il n'existe pas de données sur l'effet de l'ivacaftor sur la fertilité humaine. L'ivacaftor a eu un effet sur la fertilité chez le rat (voir rubrique 5.3).

## **4.7 Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines**

L'ivacaftor a une influence mineure sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. L'ivacaftor peut provoquer des sensations vertigineuses (voir rubrique 4.8). Il doit donc être recommandé aux patients de ne pas conduire de véhicules ni utiliser de machines s'ils ressentent des sensations vertigineuses et ceci jusqu'à la disparition des symptômes.

## **4.8 Effets indésirables**

### Résumé du profil de sécurité

Les effets indésirables les plus fréquemment observés chez les patients âgés de 6 ans et plus ayant reçu l'ivacaftor sont : céphalées (23,9 %), douleur oropharyngée (22,0 %), infections des voies respiratoires supérieures (22,0 %), congestion nasale (20,2 %), douleur abdominale (15,6 %), rhinopharyngite (14,7 %), diarrhée (12,8 %), sensations vertigineuses (9,2 %), rash cutané (12,8 %) et contamination bactérienne de l'expectoration (12,8 %). Des augmentations des transaminases ont été observées chez 12,8 % des patients traités par l'ivacaftor contre 11,5 % des patients recevant le placebo.

Chez les patients âgés de 2 ans à moins de 6 ans, les effets indésirables les plus fréquents étaient : congestion nasale (26,5 %), infections des voies respiratoires supérieures (23,5 %), augmentations des transaminases (14,7 %), rash cutané (11,8 %) et contamination bactérienne de l'expectoration (11,8 %).

Les effets indésirables graves étaient notamment des douleurs abdominales (0,9 %) et des augmentations des transaminases (1,8 %) chez les patients qui recevaient l'ivacaftor, tandis que des effets indésirables graves à type de rash ont été rapportés chez 1,5 % des patients âgés de 12 ans et plus recevant l'ivacaftor en association avec ivacaftor/tezacaftor/elixacaftor (voir rubrique 4.4).

### Tableau des effets indésirables

Le tableau 4 ci-dessous présente les effets indésirables observés avec l'ivacaftor en monothérapie dans les études cliniques (études contrôlées contre placebo et non contrôlées) au cours desquelles la durée d'exposition de l'ivacaftor allait de 16 semaines à 144 semaines. Les effets indésirables supplémentaires observés avec l'ivacaftor en association avec tezacaftor/ivacaftor et/ou en association avec ivacaftor/tezacaftor/elixacaftor sont également présentés dans le tableau 4 ci-dessous. La

fréquence de survenue des effets indésirables est définie comme suit : très fréquent ( $\geq 1/10$ ) ; fréquent ( $\geq 1/100, < 1/10$ ) ; peu fréquent ( $\geq 1/1\ 000, < 1/100$ ) ; rare ( $\geq 1/10\ 000, < 1/1\ 000$ ) ; très rare ( $< 1/10\ 000$ ) ; fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Au sein de chaque groupe de fréquence, les effets indésirables sont présentés suivant un ordre décroissant de gravité.

**Tableau 4 : Effets indésirables**

| Classe de systèmes d'organes                           | Effets indésirables                                       | Fréquence de survenue  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Infections et infestations                             | Infection des voies respiratoires supérieures             | très fréquent          |
|                                                        | Rhinopharyngite                                           | très fréquent          |
|                                                        | Syndrome grippal <sup>†</sup>                             | fréquent               |
|                                                        | Rhinite                                                   | fréquent               |
| Troubles du métabolisme et de la nutrition             | Hypoglycémie <sup>†</sup>                                 | fréquent               |
| Affections psychiatriques                              | Dépression                                                | fréquence indéterminée |
| Affections du système nerveux                          | Céphalées                                                 | très fréquent          |
|                                                        | Sensations vertigineuses                                  | très fréquent          |
| Affections de l'oreille et du labyrinthe               | Otalgie                                                   | fréquent               |
|                                                        | Sensation anormale au niveau de l'oreille                 | fréquent               |
|                                                        | Acouphènes                                                | fréquent               |
|                                                        | Hyperhémie du tympan                                      | fréquent               |
|                                                        | Trouble vestibulaire                                      | fréquent               |
|                                                        | Congestion de l'oreille                                   | peu fréquent           |
| Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales | Douleur oropharyngée                                      | très fréquent          |
|                                                        | Congestion nasale                                         | très fréquent          |
|                                                        | Respiration anormale <sup>†</sup>                         | fréquent               |
|                                                        | Rhinorrhée <sup>†</sup>                                   | fréquent               |
|                                                        | Congestion des sinus                                      | fréquent               |
|                                                        | Érythème pharyngé                                         | fréquent               |
|                                                        | Sibilances <sup>†</sup>                                   | peu fréquent           |
| Affections gastro-intestinales                         | Douleur abdominale                                        | très fréquent          |
|                                                        | Diarrhée                                                  | très fréquent          |
|                                                        | Douleur abdominale haute <sup>†</sup>                     | fréquent               |
|                                                        | Flatulences <sup>†</sup>                                  | fréquent               |
|                                                        | Nausées *                                                 | fréquent               |
|                                                        | Nausées*                                                  | fréquent               |
| Affections hépatobiliaires                             | Augmentations des transaminases                           | très fréquent          |
|                                                        | Augmentation de l'alanine aminotransférase <sup>†</sup>   | très fréquent          |
|                                                        | Augmentation de l'aspartate aminotransférase <sup>†</sup> | fréquent               |
|                                                        | Atteinte hépatique <sup>^</sup>                           | fréquence indéterminée |
|                                                        | Augmentation de la bilirubine totale <sup>^</sup>         | fréquence indéterminée |
| Affections de la peau et du tissu sous-cutané          | Rash cutané                                               | très fréquent          |
|                                                        | Acné <sup>†</sup>                                         | fréquent               |
|                                                        | Prurit <sup>†</sup>                                       | fréquent               |
| Affections des organes de reproduction et du sein      | Masse dans le sein                                        | fréquent               |
|                                                        | Inflammation du sein                                      | peu fréquent           |
|                                                        | Gynécomastie                                              | peu fréquent           |

| Classe de systèmes d'organes | Effets indésirables                                      | Fréquence de survenue |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Investigations               | Affection du mamelon                                     | peu fréquent          |
|                              | Douleur au niveau du mamelon                             | peu fréquent          |
|                              | Contamination bactérienne de l'expectoration             | très fréquent         |
|                              | Augmentation de la créatine kinase sanguine <sup>†</sup> | fréquent              |
|                              | Augmentation de la pression artérielle <sup>†</sup>      | peu fréquent          |

\* Effet indésirable et fréquence rapportés dans les études cliniques conduites avec l'ivacaftor en association avec tezacaftor/ivacaftor.

<sup>†</sup> Effet indésirable et fréquence rapportés dans les études cliniques conduites avec l'ivacaftor en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor.

<sup>^</sup> Atteinte hépatique (augmentations de l'ALAT, de l'ASAT et de la bilirubine totale) rapportée dans le cadre des données de pharmacovigilance depuis la commercialisation de l'ivacaftor en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor. Cela incluait également un cas d'insuffisance hépatique nécessitant une transplantation chez un patient présentant une cirrhose et une hypertension portale préexistantes. La fréquence ne peut pas être estimée sur la base des données disponibles.

### Description de certains effets indésirables

#### Élévation du taux de transaminases

Au cours des études cliniques 770-102 et 770-103 contrôlées contre placebo de 48 semaines de l'ivacaftor en monothérapie menées chez des patients âgés de 6 ans et plus, l'incidence de l'augmentation maximale des taux de transaminases (ALAT ou ASAT)  $> 8$ ,  $> 5$  ou  $> 3 \times \text{LSN}$  était respectivement de 3,7 %, 3,7 % et 8,3 % chez les patients traités par l'ivacaftor et de 1,0 %, 1,9 % et 8,7 % chez les patients recevant le placebo. Deux patients, l'un recevant le placebo et l'autre recevant l'ivacaftor, ont arrêté définitivement le traitement en raison de transaminases élevées,  $> 8 \times \text{LSN}$ . Aucun des patients traités par l'ivacaftor n'a présenté d'augmentation des transaminases  $> 3 \times \text{LSN}$  associée à une augmentation de la bilirubine totale  $> 1,5 \times \text{LSN}$ . Chez les patients traités par l'ivacaftor, les augmentations des transaminases allant jusqu'à  $5 \times \text{LSN}$  ont régressé sans interruption du traitement dans la majorité des cas. L'administration d'ivacaftor a été interrompue chez la plupart des patients présentant des élévations des transaminases  $> 5 \times \text{LSN}$ . Le traitement par l'ivacaftor a pu être repris avec succès dans tous les cas où il avait été interrompu temporairement en raison d'une élévation des transaminases (voir rubrique 4.4).

Au cours des études de phase III contrôlées contre placebo (d'une durée allant jusqu'à 24 semaines) du tezacaftor/ivacaftor, l'incidence de l'augmentation maximale des taux de transaminases (ALAT ou ASAT)  $> 8$ ,  $> 5$  ou  $> 3 \times \text{LSN}$  était respectivement de 0,2 %, 1,0 % et 3,4 % chez les patients traités par tezacaftor/ivacaftor et de 3,4 % chez les patients recevant le placebo. Un patient (0,2 %) recevant le traitement actif et deux patients (0,4 %) recevant le placebo ont arrêté définitivement le traitement en raison de transaminases élevées. Aucun patient traité par tezacaftor/ivacaftor n'a présenté d'augmentation des transaminases  $> 3 \times \text{LSN}$  accompagnée d'une augmentation de la bilirubine totale  $> 2 \times \text{LSN}$ .

Au cours de l'étude de phase III contrôlée contre placebo de 24 semaines de l'ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor, ces chiffres étaient de 1,5 %, 2,5 % et 7,9 % chez les patients traités par ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor et de 1,0 %, 1,5 % et 5,5 % chez les patients recevant le placebo. L'incidence des effets indésirables d'augmentations des transaminases était de 10,9 % chez les patients traités par l'ivacaftor en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor et de 4,0 % chez les patients recevant le placebo.

Des cas d'arrêt du traitement en raison d'augmentations des transaminases ont été rapportés depuis la commercialisation (voir rubrique 4.4).

### *Rashs cutanés*

Dans l'étude 445-102, l'incidence des rashs cutanés (tels que ; rash, rash prurigineux) était de 10,9 % chez les patients traités par ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor et de 6,5 % chez les patients recevant le placebo. Les rashs étaient généralement d'intensité légère à modérée. L'incidence en fonction du sexe était de 5,8 % chez les patients de sexe masculin et de 16,3 % chez les patientes dans le groupe traité par ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor et de 4,8 % chez les patients de sexe masculin et 8,3 % chez les patientes recevant le placebo. Chez les patientes traitées par ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor, l'incidence des rashs était de 20,5 % chez celles qui prenaient un contraceptif hormonal et de 13,6 % chez celles qui n'en prenaient pas (voir rubrique 4.4).

### *Augmentation de la créatine kinase*

Dans l'étude 445-102, l'incidence de l'augmentation maximale du taux de créatine kinase  $> 5 \times$  LSN était de 10,4 % chez les patients traités par ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor et de 5,0 % chez les patients recevant le placebo. Les augmentations de la créatine kinase observées étaient généralement transitoires et asymptomatiques et sont survenues à la suite d'une activité physique dans de nombreux cas. Aucun des patients traités par ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor n'a arrêté le traitement en raison d'une augmentation de la créatine kinase.

### *Augmentation de la pression artérielle*

Dans l'étude 445-102, l'augmentation maximale de la pression artérielle systolique (PAS) et diastolique (PAD) moyenne par rapport aux valeurs initiales était respectivement de 3,5 mmHg et 1,9 mmHg chez les patients traités par ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor (valeurs initiales : PAS 113 mmHg et PAD 69 mmHg) et respectivement de 0,9 mmHg et 0,5 mmHg chez les patients recevant le placebo (valeurs initiales : PAS 114 mmHg et PAD 70 mmHg).

Les pourcentages de patients ayant eu une pression artérielle systolique  $> 140$  mmHg ou une pression artérielle diastolique  $> 90$  mmHg à au moins deux reprises étaient respectivement de 5,0 % et 3,0 % chez les patients traités par ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor contre 3,5 % et 3,5 % chez les patients recevant le placebo.

### Population pédiatrique

#### *Ivacaftor en monothérapie*

La sécurité de l'ivacaftor administré en monothérapie pendant 24 semaines a été évaluée chez 43 patients âgés d'1 mois à moins de 24 mois (dont 7 étaient âgés de moins de 4 mois), 34 patients âgés de 2 à moins de 6 ans, 61 patients âgés de 6 à moins de 12 ans et 94 patients âgés de 12 à moins de 18 ans.

En général, le profil de sécurité de l'ivacaftor (en monothérapie ou en association) est uniforme chez les enfants et les adolescents et est également similaire à celui observé chez les patients adultes.

L'incidence des augmentations des transaminases (ALAT ou ASAT) observées dans les études 770-103, 770-111 et 770-110 (patients âgés de 6 à moins de 12 ans), dans l'étude 770-108 (patients âgés de 2 à moins de 6 ans) et dans l'étude 770-124 (patients âgés d'1 mois à moins de 24 mois) est présentée dans le tableau 5. Dans les études contrôlées contre placebo, l'incidence des augmentations des transaminases était similaire chez les patients traités par l'ivacaftor (15,0 %) et chez les patients recevant le placebo (14,6 %). Les augmentations des transaminases étaient généralement plus importantes chez les enfants que chez les patients plus âgés. Dans toutes les populations, les taux de transaminases sont revenus aux valeurs initiales après l'interruption du traitement, et le traitement par l'ivacaftor a pu être repris avec succès dans presque tous les cas où il avait été interrompu temporairement en raison d'une élévation des transaminases (voir rubrique 4.4). Des cas évocateurs d'un rechallenge positif ont été observés.

Dans l'étude 770-108, le traitement par l'ivacaftor a été arrêté définitivement chez un patient. Dans la cohorte de patients âgés d'1 mois à moins de 4 mois inclus dans l'étude 770-108, un patient (14,3 %) âgé d'1 mois avait un taux d'ALAT  $> 8 \times \text{LSN}$  et un taux d'ASAT  $> 3$  et  $\leq 5 \times \text{LSN}$ , entraînant l'arrêt du traitement par l'ivacaftor (voir la rubrique 4.4 pour la prise en charge des augmentations des transaminases).

**Tableau 5 : Augmentations des transaminases chez les patients âgés d'1 mois à moins de 12 ans traités par l'ivacaftor en monothérapie**

| Tranche d'âge  | n  | % de patients avec taux $> 3 \times \text{LSN}$ | % de patients avec taux $> 5 \times \text{LSN}$ | % de patients avec taux $> 8 \times \text{LSN}$ |
|----------------|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 6 à < 12 ans   | 40 | 15,0 % (6)                                      | 2,5 % (1)                                       | 2,5 % (1)                                       |
| 2 à < 6 ans    | 34 | 14,7 % (5)                                      | 14,7 % (5)                                      | 14,7 % (5)                                      |
| 12 à < 24 mois | 18 | 27,8 % (5)                                      | 11,1 % (2)                                      | 11,1 % (2)                                      |
| 1 à < 12 mois  | 24 | 8,3 % (2)                                       | 4,2 % (1)                                       | 4,2 % (1)                                       |

#### *Ivacaftor en association avec tezacaftor/ivacaftor*

La sécurité du tezacaftor/ivacaftor en association avec l'ivacaftor a été évaluée chez 124 patients âgés de 6 ans à moins de 12 ans. Les doses de 100 mg de tezacaftor/150 mg d'ivacaftor et de 150 mg d'ivacaftor n'ont pas été évaluées dans les études cliniques menées chez les enfants âgés de 6 ans à moins de 12 ans et pesant de 30 kg à moins de 40 kg.

En général, le profil de sécurité est uniforme chez les enfants et les adolescents et est également similaire à celui observé chez les patients adultes.

Au cours de l'étude de phase III en ouvert d'une durée de 24 semaines menée chez des patients âgés de 6 ans à moins de 12 ans (étude 661-113 partie B, n = 70), l'incidence de l'augmentation maximale des transaminases (ALAT ou ASAT)  $> 8$ ,  $> 5$  et  $> 3 \times \text{LSN}$  était respectivement de 1,4 %, 4,3 % et 10,0 %. Aucun des patients traités par tezacaftor/ivacaftor n'a présenté d'augmentation des transaminases  $> 3 \times \text{LSN}$  associée à une augmentation de la bilirubine totale  $> 2 \times \text{LSN}$  et aucun patient n'a arrêté le traitement en raison d'une augmentation des transaminases. Le traitement par tezacaftor/ivacaftor a été interrompu chez un patient en raison de transaminases élevées et a ensuite été repris avec succès (voir la rubrique 4.4 pour la conduite à tenir en cas d'augmentations des transaminases).

#### *Ivacaftor en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor*

La sécurité de l'ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor en association avec l'ivacaftor a été évaluée chez 272 patients âgés de 2 ans à moins de 18 ans dans les études 445-102, 445-103, 445-104, 445-106, 445-111 et 445-124. En général, le profil de sécurité est similaire chez les enfants et adolescents et chez les adultes.

Au cours de l'étude 445-106 menée chez des patients âgés de 6 ans à moins de 12 ans, l'incidence de l'augmentation maximale des transaminases (ALAT ou ASAT)  $> 8$ ,  $> 5$  et  $> 3 \times \text{LSN}$  était respectivement de 0,0 %, 1,5 % et 10,6 %. Aucun des patients traités par ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor n'a présenté d'augmentation des transaminases  $> 3 \times \text{LSN}$  associée à une augmentation de la bilirubine totale  $> 2 \times \text{LSN}$  et aucun patient n'a arrêté le traitement en raison d'une augmentation des transaminases (voir rubrique 4.4).

Au cours de l'étude 445-111 menée chez des patients âgés de 2 ans à moins de 6 ans, l'incidence de l'augmentation maximale des transaminases (ALAT ou ASAT)  $> 8$ ,  $> 5$  et  $> 3 \times \text{LSN}$  était respectivement de 1,3 %, 2,7 % et 8,0 %. Aucun des patients traités par ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor n'a présenté d'augmentation des transaminases  $> 3 \times \text{LSN}$  associée à

une augmentation de la bilirubine totale  $> 2 \times \text{LSN}$  et aucun patient n'a arrêté le traitement en raison d'une augmentation des transaminases (voir rubrique 4.4).

#### *Rashs cutanés*

Au cours de l'étude 445-111 menée chez des patients âgés de 2 ans à moins de 6 ans, 15 patients (20,0 %) ont présenté au moins un événement de type rash cutané : 4 patientes (9,8 %) et 11 patients de sexe masculin (32,4 %).

#### *Opacité du cristallin*

Un patient a présenté un événement indésirable de type opacité du cristallin.

#### Déclaration des effets indésirables suspectés

La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration – voir [Annexe V](#).

### **4.9 Surdosage**

Il n'existe aucun antidote spécifique en cas de surdosage avec l'ivacaftor. La conduite à tenir en cas de surdosage consiste en des mesures générales d'appoint, telles que la surveillance des fonctions vitales, de la fonction hépatique et de l'état clinique du patient.

## **5. PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES**

### **5.1 Propriétés pharmacodynamiques**

Classe pharmacothérapeutique : autres produits pour le système respiratoire, Code ATC : R07AX02

#### Mécanisme d'action

##### *Ivacaftor en monothérapie*

L'ivacaftor potentialise l'activité de la protéine CFTR. *In vitro*, il augmente l'ouverture du canal CFTR pour améliorer le transport des ions chlorures dans les mutations de défaut de régulation spécifiques (dont la liste figure à la rubrique 4.1) impliquées dans la diminution de la probabilité d'ouverture du canal par rapport au canal CFTR normal. L'ivacaftor a également potentialisé la probabilité d'ouverture du canal R117H-CFTR, qui présente à la fois une faible probabilité d'ouverture (régulation) et une amplitude du courant ionique (conductance) réduite. La mutation *G970R* provoque une anomalie d'épissage ayant pour conséquence une quantité faible ou l'absence de protéines CFTR à la surface cellulaire, ce qui peut expliquer les résultats observés dans l'étude 770-111 chez les patients porteurs de cette mutation (voir Effets pharmacodynamiques et Efficacité et sécurité cliniques).

Les réponses observées *in vitro* dans les expériences de patch-clamp en canal unitaire sur des fragments de membranes cellulaires sur des fragments de membranes cellulaires de rongeurs exprimant des formes mutées du canal CFTR ne correspondent pas systématiquement à la réponse pharmacodynamique *in vivo* (par exemple taux de chlorures dans la sueur) ou au bénéfice clinique. Le mécanisme exact par lequel l'ivacaftor potentialise l'activité de régulation du canal CFTR normal ou de certaines formes mutées de ce système n'est pas totalement élucidé.

##### *Ivacaftor en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor*

L'elexacaftor et le tezacaftor sont des correcteurs de la protéine CFTR qui se lient à des sites différents

sur la protéine CFTR. Comparativement à chaque molécule seule, ils ont un effet additif pour faciliter la maturation et le trafic intracellulaires de la protéine CFTR afin d'augmenter la quantité de protéines CFTR amenées à la surface cellulaire. Lorsque l'ivacaftor est administré en association avec ivacaftor/tezacaftor/elixacaftor, l'effet combiné est une augmentation de la quantité de protéines CFTR et de leur fonction à la surface cellulaire, entraînant une augmentation de l'activité du canal CFTR, mesurée par le transport des ions chlorures par le canal.

Mesure du transport des ions chlorures par le canal CFTR sur cellules thyroïdiennes de rat Fisher (FRT) exprimant la protéine CFTR mutée

La réponse de la protéine CFTR mutée à l'ivacaftor/tezacaftor/elixacaftor en termes de transport des ions chlorures a été déterminée dans des études d'électrophysiologie en chambre d'Ussing menées sur un panel de lignées cellulaires FRT transfectées avec des gènes *CFTR* porteurs de mutations uniques/distinctes. L'ivacaftor/tezacaftor/elixacaftor a augmenté le transport des ions chlorures dans les cellules FRT exprimant des mutations sélectionnées de *CFTR*.

Le seuil de réponse de la protéine CFTR pour le transport des ions chlorures *in vitro* était défini comme l'augmentation nette d'au moins 10 % de l'activité normale de la protéine par rapport à la valeur initiale, en considérant que cette valeur est prédictive ou qu'il peut être raisonnablement attendu qu'elle soit prédictive d'une réponse clinique. Pour chaque mutation, l'amplitude de la variation nette du transport des ions chlorures par la protéine CFTR par rapport à la valeur initiale telle qu'observée *in vitro* n'est pas corrélée à l'amplitude de la réponse clinique.

Dans la mucoviscidose, la présence d'une mutation du gène *CFTR* répondant à l'ivacaftor/tezacaftor/elixacaftor selon les données *in vitro* sur cellules FRT permettra probablement l'obtention d'une réponse clinique.

Le tableau 6 présente la liste des mutations du gène *CFTR* répondant à l'ivacaftor/tezacaftor/elixacaftor. La détection chez un sujet des mutations du gène *CFTR* répertoriées dans ce tableau ne doit pas remplacer le diagnostic de mucoviscidose ni être utilisée comme seul déterminant à des fins de prescription.

**Tableau 6. Mutations du gène *CFTR* ayant été identifiées comme répondant à l'ivacaftor/tezacaftor/elixacaftor d'après les données cliniques et/ou les données *in vitro***

|                |                 |               |                    |         |
|----------------|-----------------|---------------|--------------------|---------|
| 293A→G         | E217G           | H620Q         | N900K              | S50P    |
| 314del9        | E264V           | H939R         | N1088D             | S108F   |
| 546insCTA      | E282D           | H939R;H949L‡  | N1195T             | S158N   |
| 548insTAC      | E292K           | H954P         | N1303I             | S182R   |
| 711+3A→G*      | E384K           | H1054D        | N1303K*            | S308P   |
| 1140-1151dup   | E403D           | H1079P        | P5L†               | S341P   |
| 1336K          | E474K           | H1085P        | P67L*              | S364P   |
| 1461insGAT     | E527G           | H1085R        | P111L              | S434P   |
| 1507_1515del9  | E588V           | H1375N        | P140S              | S492F   |
| 2055del9       | E822K           | H1375P        | P205S              | S519G   |
| 2183A→G        | E831X           | I86M          | P439S              | S531P   |
| 2789+5G→A*     | E1104K          | I105N         | P499A              | S549I   |
| 2851A/G        | E1104V          | I125T         | P574H              | S549N   |
| 3007del6       | E1126K          | I148L         | P750L              | S549R*  |
| 3132T→G        | E1221V          | I148N         | P798S              | S557F   |
| 3141del9       | E1228K          | I175V         | P988R              | S589I   |
| 3143del9       | E1409K          | I331N         | P1013H             | S589N   |
| 3272-26A→G*†   | E1433K          | I336L         | P1013L             | S624R   |
| 3331del6       | F87L            | I444S         | P1021L             | S686Y   |
| 3410T→C        | F191V           | I497S         | P1021T             | S737F   |
| 3523A→G        | F200I           | I502T         | P1372T             | S821G   |
| 3601A→C        | F311del         | I506L         | Q30P               | S898R   |
| 3761T→G        | F311L           | I506V         | Q98P               | S912L   |
| 3791C/T        | F312del         | I506V;D1168G‡ | Q98R               | S912L;G |
| 3849+10kbC→T*† | F433L           | I521S         | Q151K              | 1244V‡  |
| 3850G→A        | F508C;S1251 N‡  | I530N         | Q179K              | S912T   |
| 3978G→C        | F508del*        | I556V         | Q237E              | S945L*† |
| A46D           | F508del;R1438W‡ | I586V         | Q237H              | S955P   |
| A62P           | F575Y           | I601F         | Q237P              | S977F   |
| A107G          | F587I           | I618N         | Q359K;T360K‡       | S977F;R |
| A120T          | F587L           | I618T         | Q359R              | 1438W‡  |
| A141D          | F693L(TTG)      | I980K         | Q372H              | S1045Y  |
| A155P          | F932S           | I1023R        | Q493L              | S1118F  |
| A234D          | F1016S          | I1139V        | Q493R              | S1159F  |
| A234V          | F1052V          | I1203V        | Q552P              | S1159P  |
| A238V          | F1074L          | I1234L        | Q1012P             | S1188L  |
| A309D          | F1078S          | I1234V        | Q1209P             | S1251N  |
| A349V          | F1099L          | I1269N        | Q1291H             | S1255P  |
| A357T          | F1107L          | I1366N        | Q1291R             | T338I   |
| A455E*†        | G27E            | I1366T        | Q1313K             | T351I   |
| A455V          | G27R            | K162E         | Q1352H             | T351S   |
| A457T          | G126D           | K464E         | R31L               | T351S;R |
| A462P          | G178E           | K464N         | R74Q               | 851L‡   |
| A534E          | G178R           | K522E         | R74Q;R297Q‡        | T388M   |
| A554E          | G194R           | K522Q         | R74Q;V201M;D1270N‡ | T465I   |
| A566D          | G194V           | K951E         | R74W               | T501A   |
| A872E          | G213E           | K1060T        | R74W;D1270N‡       | T582S   |
| A1006E         | G213E;R668C‡    | L15P          | R74W;R1070W;D1270  | T908N   |
| A1025D         | G213V           | L15P;L1253F‡  | N‡                 | T990I   |
| A1067P         | G226R           | L32P          | R74W;S945L‡        | T1036N* |
| A1067T         | G239R           | L88S          | R74W;V201M‡        | T1057R  |
| A1067V         | G253R           | L102R;F1016S‡ | R74W;V201M;D1270N‡ | T1086A  |
| A1081V         | G314E           | L137P         | R74W;V201M;L997F‡  | T1086I  |
| A1087P         | G314R           | L159S         | R75L               | T1246I  |
| A1319E         | G424S           | L165S         | R75Q;L1065P‡       | T1299I  |
| A1374D         | G437D           | L167R         | R75Q;N1088D‡       | T1299K  |
| A1466S         | G461R           | L206W*†       | R75Q;S549N‡        | V11I    |
| C225R          | G461V           | L210P         | R117C†             | V93D    |
| C491R          | G463V           | L293P         | R117C;G576A;R668C‡ | V201M   |
| C590Y          | G480C           | L327P         | R117G              | V232A   |
| C866Y          | G480D           | L333F         | R117H*             | V232D   |
|                | G480S           | L333H         | R117L              | V317A   |
|                | G500D           | L346P         | R117L;L997F‡       | V322M   |

|                    |                    |               |          |         |
|--------------------|--------------------|---------------|----------|---------|
| c.1367_1369dupTTG  | G545R              | L441P         | R117P    | V392G   |
| D58H               | G551A              | L453S         | R248K    | V456A   |
| D58V               | G551D*             | L467F         | R258G    | V456F   |
| D110E              | G551R              | L558F         | R297Q    | V520I   |
| D110H              | G551S              | L619S         | R334L    | V562I;A |
| D110N              | G576A;R668C‡       | L633P         | R334Q    | 1006E‡  |
| D192G              | G576A;S1359Y‡      | L636P         | R334W    | V562L   |
| D192N              | G622D              | L927P         | R347H*   | V591A   |
| D373N              | G622V              | L967F;L1096R‡ | R347L    | V603F   |
| D426N              | G628A              | L973F         | R347P    | V920L   |
| D443Y              | G628R              | L1011S        | R352Q    | V920M   |
| D443Y;G576A;R668C‡ | G85E*†             | L1065R        | R352W    | V1008D  |
| D529G              | G930E              | L1077P*†      | R516S    | V1010D  |
| D565G              | G970D              | L1227S        | R553Q    | V1153E  |
| D567N              | G970S              | L1324P        | R555G    | V1240G  |
| D579G              | G970V              | L1335P        | R600S    | V1293G  |
| D614G              | G1047D             | L1388P        | R709Q    | V1293I  |
| D651H              | G1047R             | L1480P        | R751L    | V1415F  |
| D651N              | G1061R             | M150K         | R792G    | W202C   |
| D806G              | G1069R             | M150R         | R792Q    | W361R   |
| D924N              | G1123R             | M152L         | R810G    | W496R   |
| D979A              | G1173S             | M152V         | R851L    | W1098C  |
| D979V              | G1237V             | M265R         | R933G    | W1282G  |
| D985H              | G1244E             | M348K         | R1048G   | W1282R  |
| D985Y              | G1244R             | M394L         | R1066C   | Y89C    |
| D993A              | G1247R             | M469V         | R1066G   | Y109H   |
| D993G              | G1249E             | M498I         | R1066H*† | Y109N   |
| D993Y              | G1249R             | M952I         | R1070P   | Y122C   |
| D1152A             | G1265V             | M952T         | R1070Q   | Y161C   |
| D1152H*†           | G1298V             | M961L         | R1070W   | Y161D   |
| D1270N*            | G1349D             | M1101K*†      | R1162Q   | Y161S   |
| D1270Y             | G149R;G576A;R668C‡ | M1137R        | R1239S   | Y301C   |
| D1312G             | H139L              | M1137V        | R1283G   | Y563N   |
| D1377H             | H139R              | M1210K        | R1283M   | Y913S   |
| D1445N             | H146R              | N186K         | R1283S   | Y919C   |
| E56K               | H199Q              | N187K         | R1438W   | Y1014C  |
| E60K               | H199Y              | N396Y         | S13F     | Y1032C  |
| E92K               | H609L              | N418S         | S13P     | Y1032N  |
| E116K              | H620P              |               | S18I     | Y1073C  |
| E116Q              |                    |               | S18N     | Y1092H  |
| E193K              |                    |               |          | Y1381H  |

Certains patients sont porteurs de deux mutations du gène *CFTR* autres que *F508del* rares non répertoriées dans le tableau 6. Sous réserve qu'ils ne soient pas porteurs de deux mutations de classe I (non-sens : mutations connues pour ne pas produire de protéine CFTR ; voir rubrique 4.1), il est possible qu'ils répondent au traitement. Chez ces patients, le traitement par Kafrio peut être envisagé sous surveillance médicale étroite si le médecin considère que les bénéfices attendus prédominent sur les risques potentiels.

Chez chaque patient, le diagnostic de mucoviscidose doit être établie en accord avec les recommandations diagnostiques et suivant l'appréciation clinique car il existe une très grande variabilité du phénotype chez les patients de même génotype.

\* Mutations pour lesquelles la réponse est étayée par les données cliniques.

† Mutations pour lesquelles la réponse est étayée par les données en vie réelle chez  $\geq 5$  patients.

‡ Mutations complexes ou composites où un seul allèle du gène *CFTR* porte plusieurs mutations ; celles-ci sont observées indépendamment de la présence de mutations sur l'autre allèle.

Les mutations non annotées sont incluses compte tenu des résultats observés *in vitro* sur cellules FRT, montrant une réponse positive évocatrice d'une possible réponse clinique.

## Effets pharmacodynamiques

### *Ivacaftor en monothérapie*

Dans les études 770-102 et 770-103 conduites chez des patients porteurs de la mutation *G551D* sur un allèle du gène *CFTR*, l'ivacaftor a entraîné des diminutions du taux de chlorures dans la sueur qui étaient rapides (15 jours), importantes (la variation moyenne du taux de chlorures dans la sueur entre la valeur à 24 semaines et la valeur initiale était respectivement de -48 mmol/L [IC à 95 % : -51 ; -45] et de -54 mmol/L [IC à 95 % : -62 ; -47]) et prolongées (jusqu'à 48 semaines).

Dans l'étude 770-111, partie 1, menée chez des patients porteurs d'une mutation de défaut de régulation du gène *CFTR* autre que *G551D*, le traitement par l'ivacaftor a entraîné une variation moyenne rapide (15 jours) et importante du taux de chlorures dans la sueur par rapport à la valeur initiale (IC à 95 % : -57 ; -41) jusqu'à la semaine 8 de traitement. Cependant, chez les patients porteurs de la mutation *CFTR-G970R*, la variation absolue moyenne du taux de chlorures dans la sueur à la semaine 8 était de -6,25 mmol/L (écart-type :  $\pm 6,55$ ). Des résultats comparables à ceux de la partie 1 ont été observés dans la partie 2 de l'étude. Lors de la visite de suivi de la semaine 4 (4 semaines après la fin du traitement par l'ivacaftor), les valeurs moyennes du taux de chlorures dans la sueur de chaque groupe tendaient à revenir aux valeurs initiales avant traitement.

Dans l'étude 770-110 menée chez des patients atteints de mucoviscidose âgés de 6 ans et plus porteurs de la mutation *R117H* du gène *CFTR*, la différence entre les variations moyennes du taux de chlorures dans la sueur jusqu'à la semaine 24 de traitement par rapport à la valeur initiale dans chacun des groupes de traitement était de -24 mmol/L (IC à 95 % : -28 ; -20). Dans les analyses en sous-groupes en fonction de l'âge, la différence entre les traitements était de -21,87 mmol/L (IC à 95 % : -26,46 ; -17,28) chez les patients âgés de 18 ans et plus et de -27,63 mmol/L (IC à 95 % : -37,16 ; -18,10) chez les patients âgés de 6 à 11 ans. Deux patients âgés de 12 à 17 ans ont été inclus dans cette étude.

### *Ivacaftor en association avec tezacaftor/ivacaftor*

Dans l'étude 661-106 (menée chez des patients homozygotes pour la mutation *F508del*), la différence entre les groupes traités par ivacaftor en association avec tezacaftor/ivacaftor et le placebo, observée jusqu'à la semaine 24 concernant la variation absolue moyenne du taux de chlorures dans la sueur par rapport à la valeur initiale était de -10,1 mmol/L (IC à 95 % : -11,4 ; -8,8).

Dans l'étude 661-108 (menée chez des patients hétérozygotes pour la mutation *F508del* et porteurs d'une seconde mutation associée à une activité résiduelle de la protéine CFTR), la différence entre les traitements observée jusqu'à la semaine 8 concernant la variation absolue moyenne du taux de chlorures dans la sueur par rapport à la valeur initiale était de -9,5 mmol/L (IC à 95 % : -11,7 ; -7,3) entre l'ivacaftor en association avec tezacaftor/ivacaftor et le placebo et de -4,5 mmol/L (IC à 95 % : -6,7 ; -2,3) entre l'ivacaftor et le placebo.

Dans l'étude 661-115 (menée chez des patients âgés de 6 ans à moins de 12 ans homozygotes pour la mutation *F508del* ou hétérozygotes pour la mutation *F508del* et porteurs d'une seconde mutation associée à une activité résiduelle de la protéine CFTR), la variation absolue moyenne du taux de chlorures dans la sueur à la semaine 8 par rapport à la valeur initiale était de -12,3 mmol/L (IC à 95 % : -15,3 ; -9,3) dans le groupe traité par tezacaftor/ivacaftor.

### *Ivacaftor en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor*

Dans l'étude 445-102 (menée chez des patients porteurs d'une mutation *F508del* sur un allèle et d'une mutation sur le second allèle prédictive de l'absence de synthèse de la protéine CFTR ou de la synthèse d'une protéine CFTR non fonctionnelle pour le transport des ions chlorures (mutation à fonction minimale) et ne répondant pas à l'ivacaftor et au tezacaftor/ivacaftor *in vitro*), la différence de la variation absolue moyenne du taux de chlorures de l'inclusion jusqu'à la semaine 24 entre ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor et placebo était de -41,8 mmol/L (IC à 95 % : -44,4 ; -39,3).

Dans l'étude 445-103 (menée chez des patients homozygotes pour la mutation *F508del*), la différence de la variation absolue moyenne du taux de chlorures à la semaine 4 par rapport à la valeur initiale entre ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor et tezacaftor/ivacaftor était de -45,1 mmol/L (IC à 95 % : -50,1 ; -40,1).

Dans l'étude 445-104 (menée chez des patients hétérozygotes pour la mutation *F508del* du gène *CFTR* et porteurs sur le second allèle d'une mutation de défaut de régulation ou d'une mutation associée à une activité résiduelle de la protéine CFTR), la différence de la variation absolue moyenne du taux de chlorures de l'inclusion à la semaine 8 entre le groupe ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor et le groupe contrôle (groupe ivacaftor en monothérapie ou groupe ivacaftor en association avec tezacaftor/ivacaftor) était de -23,1 mmol/L (IC à 95 % : -26,1 ; -20,1).

Dans l'étude 445-106 (menée chez des patients âgés de 6 ans à moins de 12 ans homozygotes pour la mutation *F508del* ou hétérozygotes pour la mutation *F508del* et porteurs d'une mutation à fonction minimale), la variation absolue moyenne du taux de chlorures jusqu'à la semaine 24 (n = 60) par rapport à la valeur initiale (n = 62) était de -60,9 mmol/L (IC à 95 % : -63,7 ; -58,2)\*. La variation absolue moyenne du taux de chlorures jusqu'à la semaine 12 (n = 59) par rapport à la valeur initiale était de -58,6 mmol/L (IC à 95 % : -61,1 ; -56,1).

\* Les données de toutes les visites de suivi n'étaient pas disponibles pour certains patients inclus dans les analyses, en particulier à partir de la semaine 16. La capacité à collecter les données à la semaine 24 a été restreinte par la pandémie de COVID-19. La pandémie a eu moins d'impact sur les données de la semaine 12.

Dans l'étude 445-116 (menée chez des patients âgés de 6 ans à moins de 12 ans hétérozygotes pour la mutation *F508del* et porteurs d'une mutation à fonction minimale), la différence de la variation absolue moyenne du taux de chlorures dans la sueur jusqu'à la semaine 24 par rapport à la valeur initiale entre le groupe ivacaftor en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor et le groupe placebo était de -51,2 mmol/L (IC à 95 % : -55,3 ; -47,1).

Dans l'étude 445-124 (ayant inclus des patients âgés de 6 ans et plus porteurs d'une mutation du gène *CFTR* répondant à l'ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor autre que *F508del* éligible, la variation absolue moyenne du taux de chlorures jusqu'à la semaine 24 par rapport au groupe placebo était de -28,3 mmol/L (IC à 95 % : -32,1 ; -24,5 ;  $p < 0,0001$ ).

### Efficacité et sécurité cliniques

#### *Ivacaftor en monothérapie*

#### Études 770-102 et 770-103 : études chez des patients atteints de mucoviscidose porteurs de la mutation de défaut de régulation G551D

L'efficacité de l'ivacaftor a été évaluée dans deux études de phase III, multicentriques, randomisées, en double insu, contrôlées contre placebo chez des patients atteints de mucoviscidose et porteurs de la mutation *G551D* sur au moins un allèle du gène *CFTR*, ayant un VEMS  $\geq 40$  % de la valeur théorique et stables cliniquement.

Les patients des deux études ont été randomisés dans les proportions 1/1 afin de recevoir 150 mg d'ivacaftor ou le placebo toutes les 12 heures avec des repas riches en graisses pendant 48 semaines, en plus de leur traitement prescrit pour la mucoviscidose (par exemple, tobramycine, dornase alfa). L'utilisation d'une solution de chlorure de sodium hypertonique inhalée n'était pas autorisée.

L'étude 770-102 a évalué 161 patients âgés de 12 ans et plus ; 122 (75,8 %) patients étaient porteurs de la mutation *F508del* sur le deuxième allèle. La consommation de médicaments en début d'étude était plus fréquente dans le groupe placebo que dans le groupe traité par l'ivacaftor. Ces médicaments comprenaient la dornase alfa (73,1 % contre 65,1 %), le salbutamol (53,8 % contre 42,2 %), la tobramycine (44,9 % contre 33,7 %) et l'association salmétérol/fluticasone (41,0 % contre 27,7 %). Le

VEMS moyen initial était égal à 63,6 % (de 31,6 % à 98,2 %) de la valeur théorique et l'âge moyen était de 26 ans (de 12 à 53 ans).

L'étude 770-103 a évalué 52 patients âgés de 6 à 11 ans lors de la phase de sélection ; le poids corporel moyen (ET) était de 30,9 (8,63) kg ; 42 (80,8 %) patients étaient porteurs de la mutation *F508del* sur le deuxième allèle. Le VEMS moyen initial était de 84,2 % (de 44,0 % à 133,8 %) de la valeur théorique et l'âge moyen était de 9 ans (de 6 à 12 ans) ; 8 (30,8 %) patients du groupe placebo et 4 (15,4 %) patients du groupe ivacaftor présentaient un VEMS initial inférieur à 70 % de la valeur théorique.

Le critère d'évaluation principal de l'efficacité dans les deux études était la variation absolue moyenne du VEMS exprimé en pourcentage de la valeur théorique après 24 semaines de traitement par rapport à sa valeur initiale.

La différence entre ivacaftor et placebo de la variation absolue moyenne (IC à 95 %) du VEMS exprimé en pourcentage de la valeur théorique entre la semaine 24 et la valeur initiale était de 10,6 % (8,6 ; 12,6) dans l'étude 770-102 et de 12,5 % (6,6 ; 18,3) dans l'étude 770-103. La différence entre ivacaftor et placebo de la variation relative moyenne (IC à 95 %) du VEMS exprimé en pourcentage de la valeur théorique entre la semaine 24 et la valeur initiale était de 17,1 % (13,9 ; 20,2) dans l'étude 770-102 et de 15,8 % (8,4 ; 23,2) dans l'étude 770-103. La variation moyenne du VEMS (L) entre la semaine 24 et la valeur initiale était de 0,37 litre pour le groupe ivacaftor et de 0,01 litre pour le groupe placebo dans l'étude 770-102 ; elle était de 0,30 litre pour le groupe ivacaftor et de 0,07 litre pour le groupe placebo dans l'étude 770-103. Dans les deux études, l'amélioration du VEMS était obtenue rapidement (jour 15) et persistait tout au long des 48 semaines.

La différence entre ivacaftor et placebo de la variation absolue moyenne (IC à 95 %) du VEMS en pourcentage de la valeur théorique entre la semaine 24 et la valeur initiale chez les patients âgés de 12 à 17 ans dans l'étude 770-102 était de 11,9 % (5,9 ; 17,9). La différence entre ivacaftor et placebo de la variation absolue moyenne (IC à 95 %) du VEMS en pourcentage de la valeur théorique entre la semaine 24 et la valeur initiale chez les patients dont le VEMS initial était supérieur à 90 % de la valeur théorique dans l'étude 770-103 était de 6,9 % (-3,8 ; 17,6).

Le tableau 7 ci-dessous présente les résultats concernant les critères d'évaluation secondaires pertinents d'un point de vue clinique.

**Tableau 7 : Effet de l'ivacaftor sur les autres critères d'évaluation de l'efficacité dans les études 770-102 et 770-103**

| Critère d'évaluation                                                                                                                      | Étude 770-102                                                |                    | Étude 770-103                                                |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                           | Différence entre les traitements <sup>a</sup><br>(IC à 95 %) | Valeur de <i>p</i> | Différence entre les traitements <sup>a</sup><br>(IC à 95 %) | Valeur de <i>p</i> |
| <b>Variation absolue moyenne du score du domaine respiratoire CFQ-R<sup>b</sup> (points) par rapport à sa valeur initiale<sup>c</sup></b> |                                                              |                    |                                                              |                    |
| Jusqu'à la semaine 24                                                                                                                     | 8,1<br>(4,7 ; 11,4)                                          | < 0,0001           | 6,1<br>(-1,4 ; 13,5)                                         | 0,1092             |
| Jusqu'à la semaine 48                                                                                                                     | 8,6<br>(5,3 ; 11,9)                                          | < 0,0001           | 5,1<br>(-1,6 ; 11,8)                                         | 0,1354             |
| <b>Risque relatif d'exacerbation pulmonaire</b>                                                                                           |                                                              |                    |                                                              |                    |
| Jusqu'à la semaine 24                                                                                                                     | 0,40 <sup>d</sup>                                            | 0,0016             | NA                                                           | NA                 |
| Jusqu'à la semaine 48                                                                                                                     | 0,46 <sup>d</sup>                                            | 0,0012             | NA                                                           | NA                 |
| <b>Variation absolue moyenne du poids corporel (kg) par rapport à sa valeur initiale</b>                                                  |                                                              |                    |                                                              |                    |
| À la semaine 24                                                                                                                           | 2,8<br>(1,8 ; 3,7)                                           | < 0,0001           | 1,9<br>(0,9 ; 2,9)                                           | 0,0004             |
| À la semaine 48                                                                                                                           | 2,7<br>(1,3 ; 4,1)                                           | 0,0001             | 2,8<br>(1,3 ; 4,2)                                           | 0,0002             |
| <b>Variation absolue moyenne de l'IMC (kg/m<sup>2</sup>) par rapport à sa valeur initiale</b>                                             |                                                              |                    |                                                              |                    |
| À la semaine 24                                                                                                                           | 0,94<br>(0,62 ; 1,26)                                        | < 0,0001           | 0,81<br>(0,34 ; 1,28)                                        | 0,0008             |
| À la semaine 48                                                                                                                           | 0,93<br>(0,48 ; 1,38)                                        | < 0,0001           | 1,09<br>(0,51 ; 1,67)                                        | 0,0003             |
| <b>Variation moyenne des scores z par rapport à leur valeur initiale</b>                                                                  |                                                              |                    |                                                              |                    |
| Score z du poids pour l'âge à la semaine 48                                                                                               | 0,33<br>(0,04 ; 0,62)                                        | 0,0260             | 0,39<br>(0,24 ; 0,53)                                        | < 0,0001           |
| Score z de l'IMC pour l'âge à la semaine 48 <sup>e</sup>                                                                                  | 0,33<br>(0,002 ; 0,65)                                       | 0,0490             | 0,45<br>(0,26 ; 0,65)                                        | < 0,0001           |

IC : intervalle de confiance ; NA : non analysé en raison de la faible incidence des événements.

<sup>a</sup> Différence entre les traitements = effet de l'ivacaftor - effet du placebo.

<sup>b</sup> CFQ-R : questionnaire révisé spécifique de la mucoviscidose, mesure de la qualité de vie relative à la santé pour la mucoviscidose.

<sup>c</sup> Les données des versions du CFQ-R pour adultes/adolescents et du CFQ-R pour enfants de 12-13 ans dans l'étude 770-102 ont été regroupées ; les données de l'étude 770-103 ont été obtenues à partir du CFQ-R pour enfants de 6 à 11 ans.

<sup>d</sup> Rapport des risques instantanés (*hazard ratio*) pour le délai d'apparition de la première exacerbation pulmonaire.

<sup>e</sup> Chez les patients de moins de 20 ans (courbes de croissance des CDC américains).

#### Étude 770-111 : étude chez des patients atteints de mucoviscidose porteurs de mutations de défaut de régulation autres que G551D

L'étude 770-111 était une étude de phase III croisée en deux parties, randomisée en double aveugle, contrôlée contre placebo (partie 1), suivie d'une phase d'extension en ouvert de 16 semaines (partie 2), visant à évaluer l'efficacité et la sécurité de l'ivacaftor chez des patients atteints de mucoviscidose âgés de 6 ans et plus porteurs d'une mutation *G970R* ou d'une mutation de défaut de régulation du gène *CFTR* autre que *G551D* (*G178R*, *S549N*, *S549R*, *G551S*, *G1244E*, *S1251N*, *S1255P* ou *G1349D*).

Dans la partie 1, les patients ont été randomisés (1:1) pour recevoir toutes les 12 heures pendant 8 semaines 150 mg d'ivacaftor ou le placebo avec un repas riche en graisses, en plus de leurs

traitements prescrits pour la mucoviscidose, puis ont permuté après une période d'arrêt de traitement de 4 à 8 semaines pour recevoir l'autre traitement pendant une deuxième période de 8 semaines. Les nébulisations de solution saline hypertonique n'étaient pas autorisées. Dans la partie 2, l'ivacaftor était administré aux patients selon les mêmes modalités que dans la partie 1 pendant 16 semaines supplémentaires. La durée du traitement continu par l'ivacaftor était de 24 semaines chez les patients randomisés à la séquence de traitement placebo/ivacaftor dans la partie 1 et de 16 semaines chez les patients randomisés à la séquence de traitement ivacaftor/placebo dans la partie 1.

Trente-neuf patients (âge moyen 23 ans) ayant un VEMS  $\geq 40$  % de la valeur théorique lors de l'inclusion (VEMS moyen : 78 % de la valeur théorique [allant de 43 % à 119 %]) ont été inclus dans l'étude ; 62 % des patients (24/39) étaient porteurs de la mutation *CFTR-F508del* sur le second allèle. Au total, 36 patients ont poursuivi l'étude dans la partie 2 (18 par séquence de traitement).

Dans la partie 1 de l'étude 770-111, la valeur moyenne initiale du VEMS exprimé en pourcentage de la valeur théorique était de 79,3 % dans le groupe de patients recevant le placebo, tandis qu'elle était de 76,4 % dans le groupe de patients traités par l'ivacaftor. La valeur globale moyenne après le début du traitement était respectivement de 76,0 % et 83,7 %. La variation absolue moyenne du VEMS à la semaine 8 par rapport à la valeur initiale (critère d'évaluation principal) était de 7,5 % pendant la période de traitement par l'ivacaftor et de -3,2 % pendant la période de traitement par le placebo. La différence entre traitements observée entre l'ivacaftor et le placebo était de 10,7 % (IC 95 % : 7,3 ; 14,1) ( $p < 0,0001$ ).

L'effet de l'ivacaftor dans la population totale de l'étude 770-111 (incluant les critères secondaires de variation absolue de l'IMC à la semaine 8 de traitement et la variation absolue du score du domaine respiratoire du questionnaire CFQ-R jusqu'à la semaine 8 de traitement) et en fonction de chaque mutation (variation absolue du taux de chlorures dans la sueur et du VEMS en pourcentage de la valeur théorique à la semaine 8) est présenté dans le tableau 8. Au vu des réponses cliniques (VEMS exprimé en pourcentage de la valeur théorique) et pharmacodynamiques (taux de chlorures dans la sueur), l'efficacité à l'ivacaftor n'a pas pu être établie chez les patients porteurs de la mutation *G970R*.

**Tableau 8 : Effet de l'ivacaftor sur les variables d'efficacité dans la population totale et dans les sous-groupes de mutations spécifiques du gène *CFTR***

| Variation absolue du VEMS exprimé en pourcentage de la valeur théorique                                                                                                                                                                       | IMC (kg/m <sup>2</sup> )                                      | Score du domaine respiratoire du questionnaire CFQ-R (points)       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Jusqu'à la semaine 8                                                                                                                                                                                                                          | À la semaine 8                                                | Jusqu'à la semaine 8                                                |
| Tous les patients (N = 39)<br>Résultats présentés sous forme de variation moyenne (IC à 95 %) par rapport à la valeur initiale chez les patients traités par l'ivacaftor comparativement au placebo :                                         |                                                               |                                                                     |
| 10,7 (7,3 ; 14,1)                                                                                                                                                                                                                             | 0,66 (0,34 ; 0,99)                                            | 9,6 (4,5 ; 14,7)                                                    |
| <b>Groupes de patients en fonction du type de mutation (n)</b><br>Résultats présentés sous forme de moyenne (minimum, maximum) pour la variation à la semaine 8 par rapport à la valeur initiale chez les patients traités par l'ivacaftor* : |                                                               |                                                                     |
| Mutation (n)                                                                                                                                                                                                                                  | Variation absolue du taux de chlorures dans la sueur (mmol/L) | Variation absolue du VEMS en pourcentage de la valeur théorique (%) |
|                                                                                                                                                                                                                                               | À la semaine 8                                                | À la semaine 8                                                      |
| <i>G1244E</i> (5)                                                                                                                                                                                                                             | -55 (-75 ; -34)                                               | 8 (-1 ; 18)                                                         |
| <i>G1349D</i> (2)                                                                                                                                                                                                                             | -80 (-82 ; -79)                                               | 20 (3 ; 36)                                                         |
| <i>G178R</i> (5)                                                                                                                                                                                                                              | -53 (-65 ; -35)                                               | 8 (-1 ; 18)                                                         |
| <i>G551S</i> (2)                                                                                                                                                                                                                              | -68†                                                          | 3†                                                                  |
| <i>G970R</i> <sup>#</sup> (4)                                                                                                                                                                                                                 | -6 (-16 ; -2)                                                 | 3 (-1 ; 5)                                                          |
| <i>S1251N</i> (8)                                                                                                                                                                                                                             | -54 (-84 ; -7)                                                | 9 (-20 ; 21)                                                        |
| <i>S1255P</i> (2)                                                                                                                                                                                                                             | -78 (-82 ; -74)                                               | 3 (-1 ; 8)                                                          |
| <i>S549N</i> (6)                                                                                                                                                                                                                              | -74 (-93 ; -53)                                               | 11 (-2 ; 20)                                                        |
| <i>S549R</i> (4)                                                                                                                                                                                                                              | -61†† (-71 ; -54)                                             | 5 (-3 ; 13)                                                         |

\* Il n'a pas été effectué de tests statistiques en raison du faible effectif pour chaque mutation.

† Résultats chez le patient porteur de la mutation *G551S* ayant des données au temps d'évaluation de la semaine 8.

†† n = 3 pour l'analyse de la variation absolue du taux de chlorures dans la sueur.

# Provoque une anomalie d'épissage ayant pour conséquence une quantité faible ou l'absence de protéines CFTR à la surface cellulaire.

Dans la partie 2 de l'étude 770-111, la variation absolue moyenne du VEMS exprimé en pourcentage de la valeur théorique après 16 semaines de traitement continu par l'ivacaftor (patients randomisés à la séquence de traitement ivacaftor/placebo dans la partie 1) était de 10,4 % (écart-type : ± 13,2 %). Lors de la visite de suivi de la partie 2, 4 semaines après la fin du traitement par l'ivacaftor, la variation absolue moyenne par rapport à la semaine 16 du VEMS exprimé en pourcentage de la valeur théorique était de -5,9 % (écart-type : ± 9,4 %). Chez les patients randomisés à la séquence de traitement placebo/ivacaftor dans la partie 1, une variation moyenne du VEMS (exprimé en pourcentage de la valeur théorique) de 3,3 % (écart-type : ± 9,3 %) était observée après les 16 semaines supplémentaires de traitement par l'ivacaftor. Lors de la visite de suivi de la partie 2, 4 semaines après la fin du traitement par l'ivacaftor, la variation moyenne par rapport à la semaine 16 du VEMS (exprimé en pourcentage de la valeur théorique) était de -7,4 % (écart-type : ± 5,5 %).

#### Étude 770-104 : étude chez des patients atteints de mucoviscidose et porteurs de la mutation *CFTR-F508del*

L'étude 770-104 (partie A) était une étude de phase II de 16 semaines, randomisée dans les proportions de 4:1, conduite en double aveugle, contrôlée contre placebo, en groupes parallèles, de l'ivacaftor (150 mg toutes les 12 heures) chez 140 patients atteints de mucoviscidose, âgés de 12 ans et plus, homozygotes pour la mutation *F508del* du gène *CFTR* et ayant un VEMS ≥ 40 % de la valeur théorique.

La variation absolue moyenne du VEMS exprimé en pourcentage de la valeur théorique entre la semaine 16 et la valeur initiale (critère d'évaluation principal de l'efficacité) était de 1,5 % dans le groupe ivacaftor et de -0,2 % dans le groupe placebo. La différence estimée entre le traitement par l'ivacaftor et le placebo était de 1,7 %t (IC à 95 % : -0,6 ; 4,1) ; cette différence n'était pas statistiquement significative ( $p = 0,15$ ).

#### Étude 770-105 : étude d'extension en ouvert

Dans l'étude 770-105, les patients qui avaient terminé le traitement par le placebo dans les études 770-102 et 770-103 ont permuté pour recevoir l'ivacaftor, tandis que les patients qui avaient été traités par l'ivacaftor ont continué à recevoir l'ivacaftor pendant au moins 96 semaines ; la durée de traitement par l'ivacaftor était donc d'au moins 96 semaines chez les patients du groupe placebo/ivacaftor et d'au moins 144 semaines chez les patients du groupe ivacaftor/ivacaftor.

Cent quarante-quatre (144) patients de l'étude 770-102 ont été inclus dans l'étude 770-105 : 67 patients dans le groupe placebo/ivacaftor et 77 dans le groupe ivacaftor/ivacaftor. Quarante-huit (48) patients de l'étude 770-103 sont entrés dans l'étude 770-105 : 22 patients dans le groupe placebo/ivacaftor et 26 dans le groupe ivacaftor/ivacaftor.

Le tableau 9 ci-dessous présente les résultats en termes de variation absolue moyenne (ET) du VEMS exprimé en pourcentage de la valeur théorique dans les deux groupes de patients. Pour les patients du groupe placebo/ivacaftor, la valeur initiale du VEMS exprimé en pourcentage de la valeur théorique est celle de l'étude 770-105, tandis que pour les patients du groupe ivacaftor/ivacaftor, la valeur initiale est celle des études 770-102 et 770-103.

**Tableau 9 : Effet de l'ivacaftor sur le VEMS exprimé en pourcentage de la valeur théorique dans l'étude 770-105**

| Étude initiale et groupe de traitement | Durée du traitement par l'ivacaftor (semaines) | Variation absolue du VEMS exprimé en pourcentage de la valeur théorique par rapport à la valeur initiale (%) |                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                        |                                                | N                                                                                                            | Moyenne (ET)             |
| Étude 770-102                          |                                                |                                                                                                              |                          |
| Ivacaftor                              | 48*                                            | 77                                                                                                           | 9,4 (8,3)                |
|                                        | 144                                            | 72                                                                                                           | 9,4 (10,8)               |
| Placebo                                | 0*                                             | 67                                                                                                           | -1,2 (7,8) <sup>†</sup>  |
|                                        | 96                                             | 55                                                                                                           | 9,5 (11,2)               |
| Étude 770-103                          |                                                |                                                                                                              |                          |
| Ivacaftor                              | 48*                                            | 26                                                                                                           | 10,2 (15,7)              |
|                                        | 144                                            | 25                                                                                                           | 10,3 (12,4)              |
| Placebo                                | 0*                                             | 22                                                                                                           | -0,6 (10,1) <sup>†</sup> |
|                                        | 96                                             | 21                                                                                                           | 10,5 (11,5)              |

\* Traitement pendant l'étude de phase III de 48 semaines randomisée en *insu*.

<sup>†</sup> Variation par rapport à la valeur initiale de l'étude antérieure après 48 semaines de traitement par le placebo.

Lorsque la variation absolue moyenne du VEMS exprimé en pourcentage de la valeur théorique est comparée à la valeur initiale de l'étude 770-105 pour les patients du groupe ivacaftor/ivacaftor ( $n = 72$ ) qui avaient participé à l'étude 770-102, cette variation était de 0,0 % (écart-type :  $\pm 9,05$ ), tandis que pour les patients du groupe ivacaftor/ivacaftor ( $n = 25$ ) qui avaient participé à l'étude 770-103, elle était de 0,6 % (écart-type :  $\pm 9,1$ ). Ces résultats montrent que chez les patients du groupe ivacaftor/ivacaftor, l'amélioration du VEMS en pourcentage de la valeur théorique observée à la semaine 48 de l'étude initiale (jour 0 à jour 48) a été maintenue jusqu'à la semaine 144. Il n'a pas été constaté d'améliorations supplémentaires dans l'étude 770-105 (semaine 48 à semaine 144).

Chez les patients du groupe placebo/ivacaftor de l'étude 770-102, le taux annualisé d'exacerbations pulmonaires a été plus élevé dans l'étude initiale lorsque les patients recevaient le placebo (1,34 événement/an) que pendant l'étude 770-105 qui l'a suivie quand les patients ont permuté pour recevoir l'ivacaftor (0,48 événement/an du jour 1 à la semaine 48 et 0,67 événement/an de la semaine 48 à la semaine 96). Chez les patients du groupe ivacaftor /ivacaftor de l'étude 770-102, le taux annualisé d'exacerbations pulmonaires était de 0,57 événement/an du jour 1 à la semaine 48 lorsqu'ils recevaient l'ivacaftor. Après la transition dans l'étude 770-105, le taux annualisé d'exacerbations pulmonaires a été de 0,91 événement/an du jour 1 à la semaine 48 et de 0,77 événement/an de la semaine 48 à la semaine 96.

Chez les patients qui avaient participé à l'étude 770-103, le nombre d'événements a été globalement faible.

#### *Étude 770-110 : étude conduite chez des patients atteints de mucoviscidose porteurs d'une mutation R117H du gène CFTR*

L'étude 770-110 a évalué 69 patients âgés de 6 ans et plus parmi lesquels 53 (76,8 %) étaient porteurs de la mutation *F508del* sur le second allèle. Le variant poly-T de *R117H* confirmé était *5T* chez 38 patients et *7T* chez 16 patients. À l'inclusion, le VEMS moyen était de 73 % de la valeur théorique (de 32,5 % à 105,5 %) et l'âge moyen était de 31 ans (de 6 ans à 68 ans). La variation absolue moyenne du VEMS exprimé en pourcentage de la valeur théorique mesuré sur la période allant jusqu'à la semaine 24 comparativement à la valeur initiale (critère d'évaluation principal de l'efficacité) était de 2,57 % dans le groupe ivacaftor et de 0,46 % dans le groupe placebo. La différence estimée entre le groupe traité par l'ivacaftor et le groupe placebo était de 2,1 % [IC à 95 % : -1,1 ; 5,4].

Une analyse en sous-groupe prédéfinie a été réalisée chez les patients âgés de 18 ans et plus (26 patients recevant le placebo et 24 patients traités par l'ivacaftor). La variation absolue moyenne du VEMS exprimé en pourcentage de la valeur théorique jusqu'à la semaine 24 était de 4,5 % dans le groupe ivacaftor contre -0,46 % dans le groupe placebo. La différence estimée entre le groupe traité par l'ivacaftor et le groupe placebo était de 5,0 % [IC à 95 % : 1,1 ; 8,8].

Dans une analyse en sous-groupe de patients porteurs d'un variant génétique *R117H-5T* confirmé, la différence de la variation absolue moyenne du VEMS exprimé en pourcentage de la valeur théorique jusqu'à la semaine 24 par rapport à la valeur initiale entre le groupe traité par l'ivacaftor et le groupe recevant le placebo était de 5,3 % [IC à 95 % : 1,3 ; 9,3]. Chez les patients porteurs d'un variant génétique *R117H-7T* confirmé, la différence observée entre le groupe ivacaftor et le groupe placebo était de 0,2 % [IC à 95 % : -8,1 ; 8,5].

Pour les critères d'efficacité secondaires, il n'a pas été observé de différences entre le traitement par l'ivacaftor et le placebo pour la variation absolue de l'indice de masse corporel (IMC) à la semaine 24 de traitement par rapport à la valeur initiale ou pour le délai jusqu'à la première exacerbation pulmonaire. Des différences ont été observées pour la variation absolue du score du domaine respiratoire du questionnaire CFQ-R jusqu'à la semaine 24 (la différence entre l'ivacaftor et le placebo était de 8,4 % [IC à 95 % : 2,2 ; 14,6]) et pour la variation moyenne du taux de chlorures dans la sueur par rapport à la valeur initiale (voir Effets pharmacodynamiques).

#### *Ivacaftor en association avec tezacaftor/ivacaftor ou avec ivacaftor/tezacaftor/elixacaftor*

L'efficacité et la sécurité de l'ivacaftor en association avec tezacaftor/ivacaftor chez les patients atteints de mucoviscidose âgés de 12 ans et plus ont été évaluées dans deux études cliniques : une étude randomisée en double aveugle, contrôlée contre placebo d'une durée de 24 semaines menée chez 504 patients âgés de 12 ans et plus homozygotes pour la mutation *F508del* (étude 661-106), et une étude croisée randomisée en double aveugle, contrôlée contre placebo plus ivacaftor, comportant deux périodes, trois traitements, d'une durée de 8 semaines menée chez 244 patients âgés de 12 ans et plus hétérozygotes pour la mutation *F508del* du gène *CFTR* et porteurs d'une seconde mutation associée à une activité résiduelle de la protéine CFTR (étude 661-108). La sécurité et l'efficacité à long terme du

traitement en association ont également été évaluées dans les deux populations de patients dans une étude d'extension en ouvert à long terme de 96 semaines (étude 661-110). Se reporter au Résumé des Caractéristiques du Produit du tezacaftor/ivacaftor pour des données complémentaires.

L'efficacité et la sécurité de l'ivacaftor en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor comprimés chez les patients âgés de 12 ans et plus ont été démontrées dans trois études de phase III randomisées en double aveugle, contrôlées contre placebo (patients hétérozygotes pour la mutation *F508del* et porteurs d'une mutation à fonction minimale sur le second allèle, n = 403) et contre comparateur actif (patients homozygotes pour la mutation *F508del*, n = 107 ou hétérozygotes pour la mutation *F508del* et porteurs sur le second allèle d'une mutation de défaut de régulation ou d'une mutation associée à une activité résiduelle de la protéine CFTR, n = 258) d'une durée de 24 semaines (étude 445-102), 4 semaines (étude 445-103) et 8 semaines (étude 445-104) respectivement. Les patients de toutes les études étaient éligibles pour entrer dans des études d'extension à long terme en ouvert (étude 445-105 ou étude 445-110).

L'efficacité et la sécurité de l'ivacaftor en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor comprimés chez les patients âgés de 6 ans et plus porteurs de mutations du gène *CFTR* répondant à l'ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor autres que *F508del* ont été démontrées dans une étude de phase III randomisée en double aveugle, contrôlée contre placebo (n = 307) et dans une étude observationnelle rétrospective des résultats cliniques en vie réelle (étude CFD-016 ; n = 422).

Se reporter au Résumé des Caractéristiques du Produit de l'ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor pour des données complémentaires.

### Population pédiatrique

#### *Ivacaftor en association avec tezacaftor/ivacaftor*

L'efficacité et la sécurité chez des patients âgés de 6 ans à moins de 12 ans (âge moyen, 8,6 ans) ont été évaluées dans une étude de phase III en double aveugle d'une durée de 8 semaines (étude 661-115) menée chez 67 patients ayant été randomisés selon un rapport 4:1 dans le groupe recevant l'ivacaftor en association avec tezacaftor/ivacaftor ou dans un groupe recevant un traitement comparateur en aveugle. Quarante-deux patients étaient homozygotes pour la mutation *F508del* (F/F) et 12 étaient hétérozygotes pour la mutation *F508del* et porteurs d'une seconde mutation associée à une activité résiduelle de la protéine CFTR (F/RF). Les patients étaient éligibles pour entrer dans une étude d'extension en ouvert de 96 semaines (étude 661-116 partie A). Se reporter au Résumé des Caractéristiques du Produit du tezacaftor/ivacaftor pour des données complémentaires.

#### *Ivacaftor en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor*

La pharmacocinétique et la sécurité chez les patients âgés de 6 ans à moins de 12 ans (n = 66) et chez les patients âgés de 2 ans à moins de 6 ans (n = 75) porteurs d'au moins une mutation *F508del* ont été évaluées dans deux études en ouvert de 24 semaines (étude 445-106 et étude 445-116). Se reporter au Résumé des Caractéristiques du Produit de l'ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor pour des données supplémentaires.

L'Agence européenne des médicaments a différé l'obligation de soumettre les résultats d'études réalisées avec Kalydeco dans un ou plusieurs sous-groupes de la population pédiatrique dans l'indication de mucoviscidose (voir rubrique 4.2 pour les informations concernant l'usage pédiatrique).

## **5.2 Propriétés pharmacocinétiques**

Les paramètres pharmacocinétiques de l'ivacaftor sont similaires entre les volontaires sains adultes et les patients atteints de mucoviscidose.

Après administration orale d'une dose unique de 150 mg à des volontaires sains avec un repas, les ASC et  $C_{\max}$  moyennes ( $\pm$  écart-type [ET]) étaient de 10,60 (5,26)  $\mu\text{g}\cdot\text{h/mL}$  et de 0,768 (0,233)  $\mu\text{g/mL}$ , respectivement. Après administration toutes les 12 heures, les concentrations plasmatiques à l'équilibre de l'ivacaftor étaient atteintes aux jours 3 à 5, avec un taux d'accumulation compris entre 2,2 et 2,9.

### Absorption

Après administrations orales répétées d'ivacaftor, l'exposition de l'ivacaftor augmentait généralement avec la posologie, comprise entre 25 mg toutes les 12 heures et 450 mg toutes les 12 heures. Après administration avec un repas riche en graisses, l'exposition systémique de l'ivacaftor était de 2,5 à 4 fois supérieure environ. Après administration concomitante avec le tezacaftor et l'elexacaftor, l'augmentation de l'aire sous la courbe (ASC) était similaire (augmentation d'environ 3 fois et 2,5 à 4 fois respectivement). Par conséquent, l'ivacaftor, en monothérapie ou en association avec tezacaftor/ivacaftor ou avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor, doit être administré avec un repas riche en graisses. Le  $t_{\max}$  médian (valeurs extrêmes) est de 4,0 (3,0 ; 6,0) heures environ après administration avec un repas.

La biodisponibilité des granulés d'ivacaftor (2 sachets de 75 mg) est comparable à celle du comprimé de 150 mg lorsqu'ils sont administrés avec un repas riche en graisses chez des volontaires sains adultes. Le rapport de la moyenne géométrique des moindres carrés pour les granulés par rapport aux comprimés était de 0,951 [IC à 90 % : 0,839 ; 1,08] pour l' $ASC_{0-\infty}$  et de 0,918 [IC à 90 % : 0,750 ; 1,12] pour la  $C_{\max}$ . L'effet des aliments sur l'absorption de l'ivacaftor est comparable pour les deux formulations comprimés et granulés.

### Distribution

L'ivacaftor est lié aux protéines plasmatiques à 99 % environ, essentiellement à l'alpha-1 glycoprotéine acide et à l'albumine. L'ivacaftor ne se fixe pas sur les hématies humaines. Après administration orale d'ivacaftor 150 mg toutes les 12 heures pendant 7 jours à des volontaires sains avec un repas, le volume apparent de distribution moyen ( $\pm$  ET) était de 353 (122) litres.

### Biotransformation

L'ivacaftor est fortement métabolisé chez l'homme. Les données *in vitro* et *in vivo* indiquent que l'ivacaftor est essentiellement métabolisé par le CYP3A. M1 et M6 sont les deux principaux métabolites de l'ivacaftor chez l'homme. L'activité de M1 correspond à un sixième environ de celle de l'ivacaftor et M1 est considéré comme pharmacologiquement actif. L'activité de M6 correspond à moins d'un cinquantième de celle de l'ivacaftor et M6 n'est pas considéré comme pharmacologiquement actif.

L'effet du génotype hétérozygote CYP3A4\*22 sur l'exposition de l'ivacaftor, du tezacaftor et de l'elexacaftor correspond à l'effet observé lors de l'administration concomitante d'un inhibiteur faible du CYP3A4, celui-ci n'étant pas cliniquement significatif. Aucun ajustement de la dose d'ivacaftor, de tezacaftor ou d'elexacaftor n'est jugé nécessaire. Chez les patients homozygotes pour le génotype CYP3A4\*22, un effet plus important est attendu. Cependant, il n'existe pas de données chez ce type de patients.

### Élimination

Après administration orale chez des volontaires sains, la majorité de l'ivacaftor (87,8 %) a été éliminée dans les fèces sous forme métabolisée. Les principaux métabolites M1 et M6 représentaient 65 % environ de la dose totale éliminée, 22 % sous forme de M1 et 43 % sous forme de M6. L'excrétion urinaire de l'ivacaftor sous forme inchangée était négligeable. La demi-vie terminale apparente était de 12 heures environ après une dose unique prise avec un repas. La clairance apparente (Cl/F) de l'ivacaftor était comparable entre les volontaires sains et les patients atteints de

mucoviscidose. Le Cl/F moyen ( $\pm$  ET) était de 17,3 (8,4) L/h pour une dose unique de 150 mg administrée à des volontaires sains.

### Linéarité/non linéarité

La pharmacocinétique de l'ivacaftor est généralement linéaire en fonction du temps ou de la dose pour des doses comprises entre 25 et 250 mg.

### Populations particulières

#### *Insuffisance hépatique*

Après une dose unique de 150 mg d'ivacaftor, la  $C_{\max}$  de l'ivacaftor (moyenne : 0,735  $\mu\text{g/mL}$  [écart-type : 0,331]) était comparable chez les patients adultes dont la fonction hépatique était modérément altérée (Child-Pugh de classe B, score de 7 à 9), mais l' $ASC_{0-\infty}$  de l'ivacaftor (moyenne : 16,80  $\mu\text{g}\cdot\text{h/mL}$  [écart-type :  $\pm$  6,14]) était augmentée de deux fois environ par rapport aux volontaires sains appariés pour les données démographiques. Des simulations permettant de prédire l'exposition de l'ivacaftor à l'état d'équilibre ont montré qu'en réduisant la dose de 150 mg toutes les 12 heures à 150 mg une fois par jour, les patients adultes présentant une insuffisance hépatique modérée auraient des valeurs de  $C_{\min}$  à l'équilibre comparables à celles obtenues avec une posologie de 150 mg toutes les 12 heures chez les adultes ayant une fonction hépatique normale.

Chez les patients présentant une insuffisance hépatique modérée (Child-Pugh de classe B, score de 7 à 9), l'ASC de l'ivacaftor était augmentée d'environ 50 % après administrations répétées pendant 10 jours de tezacaftor et d'ivacaftor ou d'ivacaftor, de tezacaftor et d'elexacaftor.

Le retentissement de l'insuffisance hépatique sévère (Child-Pugh de classe C, score de 10 à 15) sur la pharmacocinétique de l'ivacaftor n'a pas été étudié. Le niveau d'augmentation de l'exposition systémique chez ces patients n'est pas connu, mais une exposition systémique plus importante que celle observée chez les patients ayant une insuffisance hépatique modérée est attendue.

Pour les recommandations sur l'utilisation appropriée et les modifications posologiques, voir le tableau 3 à la rubrique 4.2.

#### *Insuffisance rénale*

Aucune étude pharmacocinétique n'a été réalisée avec l'ivacaftor chez des patients insuffisants rénaux. Dans une étude pharmacocinétique menée chez l'homme avec l'ivacaftor en monothérapie, l'élimination urinaire de l'ivacaftor et de ses métabolites était minime (seulement 6,6 % de la radioactivité totale ont été retrouvés dans l'urine). L'excrétion urinaire de l'ivacaftor sous forme inchangée était négligeable (moins de 0,01 % après une dose orale unique de 500 mg).

Aucune adaptation de la posologie n'est préconisée en cas d'insuffisance rénale légère ou modérée. La prudence est recommandée lors de l'administration d'ivacaftor à des patients présentant une insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine inférieure ou égale à 30 mL/min) ou en phase terminale (voir rubriques 4.2 et 4.4).

#### *Origine ethnique*

Selon une analyse de pharmacocinétique de population, l'origine ethnique n'avait pas d'effet cliniquement significatif sur les paramètres pharmacocinétiques de l'ivacaftor observés chez les patients caucasiens ( $n = 379$ ) et chez les patients d'autres origines ethniques ( $n = 29$ ).

#### *Influence du sexe*

Les paramètres pharmacocinétiques de l'ivacaftor sont similaires chez les hommes et les femmes.

## Sujets âgés

Le nombre de patients âgés de 65 ans et plus inclus dans les études cliniques de l'ivacaftor n'était pas suffisant pour déterminer si les paramètres pharmacocinétiques sont comparables ou non à ceux observés chez les adultes plus jeunes.

Les paramètres pharmacocinétiques de l'ivacaftor en association avec le tezacaftor sont comparables chez les patients âgés (65 à 72 ans) et chez les adultes plus jeunes.

## Population pédiatrique

L'exposition systémique attendue de l'ivacaftor, déterminée suivant une analyse compartimentale à partir des concentrations observées dans les études de phases II et III, est présentée par tranche d'âge dans le tableau 10.

**Tableau 10 : Exposition moyenne (écart-type) de l'ivacaftor, par tranche d'âge**

| Tranche d'âge                                               | Dose                         | C <sub>min, ss</sub><br>µg/mL | ASC <sub>0-12h, ss</sub><br>µg·h/mL |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1 mois à moins de 2 mois<br>(≥ 3 kg)*                       | 13,4 mg toutes les 24 heures | 0,300<br>(0,221) <sup>†</sup> | 5,84 (2,98) <sup>†</sup>            |
| 2 mois à moins de 4 mois<br>(≥ 3 kg)*                       | 13,4 mg toutes les 12 heures | 0,406<br>(0,266) <sup>†</sup> | 6,45 (3,43) <sup>†</sup>            |
| 4 mois à moins de 6 mois<br>(≥ 5 kg)*                       | 25 mg toutes les 12 heures   | 0,371 (0,183)                 | 6,48 (2,52)                         |
| 6 mois à moins de 12 mois<br>(≥ 5 kg à < 7 kg) <sup>‡</sup> | 25 mg toutes les 12 heures   | 0,336                         | 5,41                                |
| 6 mois à moins de 12 mois<br>(7 kg à < 14 kg)               | 50 mg toutes les 12 heures   | 0,508 (0,252)                 | 9,14 (4,20)                         |
| 12 mois à moins de 24 mois<br>(7 kg à < 14 kg)              | 50 mg toutes les 12 heures   | 0,440 (0,212)                 | 9,05 (3,05)                         |
| 12 mois à moins de 24 mois<br>(≥ 14 kg à < 25 kg)           | 75 mg toutes les 12 heures   | 0,451 (0,125)                 | 9,60 (1,80)                         |
| 2 à 5 ans<br>(< 14 kg)                                      | 50 mg toutes les 12 heures   | 0,577 (0,317)                 | 10,50 (4,26)                        |
| 2 à 5 ans<br>(≥ 14 kg à < 25 kg)                            | 75 mg toutes les 12 heures   | 0,629 (0,296)                 | 11,30 (3,82)                        |
| 6 à 11 ans <sup>§</sup><br>(≥ 14 kg à < 25 kg)              | 75 mg toutes les 12 heures   | 0,641 (0,329)                 | 10,76 (4,47)                        |
| 6 à 11 ans <sup>§</sup><br>(≥ 25 kg)                        | 150 mg toutes les 12 heures  | 0,958 (0,546)                 | 15,30 (7,34)                        |
| 12 à 17 ans                                                 | 150 mg toutes les 12 heures  | 0,564 (0,242)                 | 9,24 (3,42)                         |
| Adultes (≥ 18 ans)                                          | 150 mg toutes les 12 heures  | 0,701 (0,317)                 | 10,70 (4,10)                        |

\* Les patients âgés d'1 mois à moins de 6 mois étaient nés à un âge gestationnel ≥ 37 semaines.

<sup>†</sup> Les expositions chez les patients âgés d'1 mois à moins de 4 mois sont estimées à partir de simulations issues du modèle pharmacocinétique physiologique intégrant les données recueillies dans cette tranche d'âge.

<sup>‡</sup> Valeurs basées sur les données d'un seul patient ; écart-type non rapporté.

<sup>§</sup> Les expositions chez les patients âgés de 6 à 11 ans sont estimées à partir de simulations issues du modèle de pharmacocinétique de population utilisant les données recueillies dans cette tranche d'âge.

## 5.3 Données de sécurité préclinique

Les données non cliniques issues des études conventionnelles de pharmacologie de sécurité, toxicologie en administration répétée, génotoxicité et cancérogenèse n'ont pas révélé de risque particulier pour l'homme.

## Gestation et fertilité

L'ivacaftor a été associé à de légères diminutions du poids des vésicules séminales, à une diminution de l'indice global de fertilité et du nombre de gestations chez les femelles accouplées avec des mâles traités et à des réductions significatives du nombre de corps jaunes et des sites d'implantation avec les diminutions en résultant de la taille moyenne des portées et du nombre moyen d'embryons viables par portée chez les femelles traitées. La dose sans effet nocif observé (NOAEL) pour la fertilité entraîne un niveau d'exposition correspondant à environ 4 fois l'exposition systémique de l'ivacaftor et de ses métabolites lorsque l'ivacaftor est administré en monothérapie chez l'humain adulte à la dose maximale préconisée chez l'homme. Un passage transplacentaire de l'ivacaftor a été observé chez des rates et des lapines gravides.

## Développement péri- et postnatal

L'ivacaftor a entraîné une diminution de la survie et des indices de lactation et une réduction du poids des petits. La NOAEL pour la viabilité et la croissance des petits correspond à un niveau d'exposition environ 3 fois supérieur à l'exposition systémique de l'ivacaftor et de ses métabolites lorsque l'ivacaftor est administré en monothérapie chez l'humain adulte à la dose maximale préconisée.

## Études chez les animaux juvéniles

Des cataractes ont été observées chez les jeunes rats traités, du jour 7 au jour 35 de la période postnatale, à des niveaux d'exposition de l'ivacaftor correspondant à 0,22 fois ceux observés avec la dose maximale préconisée chez l'homme lorsque l'ivacaftor est administré en monothérapie. Ces anomalies n'ont pas été constatées chez les fœtus de rates traitées par l'ivacaftor du 7<sup>e</sup> au 17<sup>e</sup> jour de la gestation, ni chez les petits exposés à l'ivacaftor par l'intermédiaire du lait ingéré jusqu'au jour 20 de la période postnatale, ni chez des rats âgés de 7 semaines et des chiens âgés de 3,5 à 5 mois traités par l'ivacaftor. La signification éventuelle de ces observations pour l'homme n'est pas connue.

## **6. DONNÉES PHARMACEUTIQUES**

### **6.1 Liste des excipients**

#### Noyau du comprimé

Cellulose microcristalline  
Lactose monohydraté  
Succinate d'acétate d'hypromellose  
Croscarmellose sodique  
Laurilsulfate de sodium (E487)  
Silice colloïdale anhydre  
Stéarate de magnésium

#### Pelliculage

Alcool polyvinylique  
Dioxyde de titane (E171)  
Macrogol (PEG 3350)  
Talc  
Laque aluminique d'indigotine (E132)  
Cire de carnauba

#### Encre d'impression

Résine de shellac  
Oxyde de fer noir (E172)

Propylène glycol (E1520)  
Solution concentrée d'ammoniaque

## **6.2 Incompatibilités**

Sans objet.

## **6.3 Durée de conservation**

4 ans.

## **6.4 Précautions particulières de conservation**

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.

## **6.5 Nature et contenu de l'emballage extérieur**

Plaquette (polychlorotrifluoroéthylène [PCTFE]/aluminium) ou flacon en polyéthylène haute densité (PEHD) avec fermeture de sécurité enfant en polypropylène, film en aluminium scellé par induction et dessicant de type tamis moléculaire.

### Kalydeco 75 mg comprimés pelliculés

La présentation suivante est disponible :

- plaquette contenant 28 comprimés pelliculés dans une pochette en carton.

### Kalydeco 150 mg comprimés pelliculés

Les présentations suivantes sont disponibles :

- plaquette contenant 28 comprimés pelliculés dans une pochette en carton ;
- plaquette contenant 56 comprimés pelliculés ;
- flacon contenant 56 comprimés pelliculés.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

## **6.6 Précautions particulières d'élimination et manipulation**

Tout médicament non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

## **7. TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited  
Unit 49, Block 5, Northwood Court, Northwood Crescent,  
Dublin 9, D09 T665,  
Irlande

## **8. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

EU/1/12/782/001  
EU/1/12/782/002  
EU/1/12/782/005  
EU/1/12/782/007

**9. DATE DE PREMIÈRE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION**

Date de première autorisation : 23 juillet 2012

Date du dernier renouvellement : 29 avril 2022

**10. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l'Agence européenne des médicaments <https://www.ema.europa.eu>.

## 1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT

Kalydeco 13,4 mg granulés en sachet

Kalydeco 25 mg granulés en sachet

Kalydeco 50 mg granulés en sachet

Kalydeco 59,5 mg granulés en sachet

Kalydeco 75 mg granulés en sachet

## 2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

### Kalydeco 13,4 mg granulés en sachet

Chaque sachet contient 13,4 mg d'ivacaftor.

*Excipient à effet notoire*

Chaque sachet contient 19,7 mg de lactose monohydraté.

### Kalydeco 25 mg granulés en sachet

Chaque sachet contient 25 mg d'ivacaftor.

*Excipient à effet notoire*

Chaque sachet contient 36,6 mg de lactose monohydraté.

### Kalydeco 50 mg granulés en sachet

Chaque sachet contient 50 mg d'ivacaftor.

*Excipient à effet notoire*

Chaque sachet contient 73,2 mg de lactose monohydraté.

### Kalydeco 59,5 mg granulés en sachet

Chaque sachet contient 59,5 mg d'ivacaftor.

*Excipient à effet notoire*

Chaque sachet contient 87,3 mg de lactose monohydraté.

### Kalydeco 75 mg granulés en sachet

Chaque sachet contient 75 mg d'ivacaftor.

*Excipient à effet notoire*

Chaque sachet contient 109,8 mg de lactose monohydraté.

Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1.

### 3. FORME PHARMACEUTIQUE

Granulés en sachet (granulés).

Granulés de couleur blanche à blanc cassé mesurant environ 2 mm de diamètre.

### 4. INFORMATIONS CLINIQUES

#### 4.1 Indications thérapeutiques

Kalydeco granulés est indiqué :

- En monothérapie dans le traitement des nourrissons âgés d'au moins 1 mois, des jeunes enfants et des enfants pesant de 3 kg à moins de 25 kg atteints de mucoviscidose porteurs d'une mutation *R117H* du gène *CFTR* ou de l'une des mutations de défaut de régulation (classe III) du gène *CFTR* (*cystic fibrosis transmembrane conductance regulator*) suivantes : *G551D*, *G1244E*, *G1349D*, *G178R*, *G551S*, *S1251N*, *S1255P*, *S549N* ou *S549R* (voir rubriques 4.4 et 5.1).
- En association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor dans le traitement des enfants âgés de 2 ans à moins de 6 ans atteints de mucoviscidose porteurs d'au moins une mutation autre que de classe I du gène *CFTR* (voir rubriques 4.2 et 5.1).

#### 4.2 Posologie et mode d'administration

La prescription de Kalydeco est réservée aux médecins expérimentés dans le traitement de la mucoviscidose. Si le génotype du patient n'est pas connu, un génotypage par une méthode fiable et validée devra être réalisé avant l'initiation du traitement, afin de confirmer la présence d'une mutation entrant dans l'indication sur au moins un allèle du gène *CFTR* (voir rubrique 4.1). Le variant polythymidique [poly-T] identifié avec la mutation *R117H* doit être déterminé conformément aux recommandations locales.

*Kalydeco en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor*

Le nombre de patients porteurs de mutations non répertoriées dans le tableau 6 susceptibles de répondre au traitement par l'ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor (IVA/TEZ/ELX) est limité. Chez ces patients, le traitement par l'ivacaftor (IVA) en association avec IVA/TEZ/ELX peut être envisagé sous surveillance médicale étroite si le médecin considère que les bénéfices attendus prédominent sur les risques potentiels. Cela exclut les patients porteurs de deux mutations de classe I (non-sens-mutations connues pour ne pas produire de protéine CFTR), qui, de ce fait, ne devraient pas répondre au traitement modulateur (voir rubriques 4.1, 4.4 et 5.1).

## Posologie

Les posologies recommandées sont présentées dans le tableau 1.

**Tableau 1 : Posologies recommandées**

| Âge                                                            | Poids corporel    | Dose du matin                                                                                               | Dose du soir                           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Ivacaftor en monothérapie                                      |                   |                                                                                                             |                                        |
| 1 mois à moins de 2 mois                                       | ≥ 3 kg            | Un sachet d'ivacaftor 13,4 mg granulés                                                                      | Pas de prise le soir                   |
| 2 mois à moins de 4 mois                                       | ≥ 3 kg            | Un sachet d'ivacaftor 13,4 mg granulés                                                                      | Un sachet d'ivacaftor 13,4 mg granulés |
| 4 mois à moins de 6 mois                                       | ≥ 5 kg            | Un sachet d'ivacaftor 25 mg granulés                                                                        | Un sachet d'ivacaftor 25 mg granulés   |
| 6 mois et plus                                                 | ≥ 5 kg à < 7 kg   | Un sachet d'ivacaftor 25 mg granulés                                                                        | Un sachet d'ivacaftor 25 mg granulés   |
|                                                                | ≥ 7 kg à < 14 kg  | Un sachet d'ivacaftor 50 mg granulés                                                                        | Un sachet d'ivacaftor 50 mg granulés   |
|                                                                | ≥ 14 kg à < 25 kg | Un sachet d'ivacaftor 75 mg granulés                                                                        | Un sachet d'ivacaftor 75 mg granulés   |
|                                                                | ≥ 25 kg           | Se reporter au résumé des caractéristiques du produit (RCP) de Kalydeco comprimés pour plus d'informations. |                                        |
| Ivacaftor en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor |                   |                                                                                                             |                                        |
| 2 ans à moins de 6 ans                                         | ≥ 10 kg à < 14 kg | Un sachet d'ivacaftor 60 mg/tezacaftor 40 mg/elexacaftor 80 mg granulés                                     | Un sachet d'ivacaftor 59,5 mg granulés |
|                                                                | ≥ 14 kg           | Un sachet d'ivacaftor 75 mg/tezacaftor 50 mg/elexacaftor 100 mg granulés                                    | Un sachet d'ivacaftor 75 mg granulés   |

Les doses du matin et du soir doivent être prises régulièrement à environ 12 heures d'intervalle avec un repas riche en graisses (voir rubrique Mode d'administration).

### *Oubli d'une prise*

S'il s'est écoulé 6 heures ou moins depuis l'heure de prise de la dose du matin ou du soir oubliée, le patient doit prendre la dose le plus tôt possible et prendre ensuite la prochaine dose au moment habituel. Si un délai de plus de 6 heures s'est écoulé, le patient doit attendre et prendre la dose suivante à l'heure habituelle.

Les patients traités par Kalydeco en association ne doivent pas prendre plus d'une dose de chaque médicament en même temps.

### *Administration concomitante avec les inhibiteurs du CYP3A*

En cas d'utilisation concomitante d'inhibiteurs modérés ou puissants du CYP3A, la dose d'ivacaftor doit être ajustée comme indiqué dans le tableau 2 (voir rubriques 4.4 et 4.5).

**Tableau 2 : Recommandations posologiques en cas d'administration concomitante avec des inhibiteurs modérés ou puissants du CYP3A**

| Âge/poids                                                             | Inhibiteurs modérés du CYP3A                                                                                                                                                                                                                                                                  | Inhibiteurs puissants du CYP3A                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ivacaftor en monothérapie</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |
| 1 mois à moins de 6 mois                                              | <b>L'utilisation n'est pas recommandée.</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>L'utilisation n'est pas recommandée.</b>                                                                                                                                                                  |
| 6 mois et plus, $\geq 5$ kg à $< 7$ kg                                | Un sachet d'ivacaftor 25 mg granulés une fois par jour le matin.<br><br>Pas de prise d'ivacaftor le soir.                                                                                                                                                                                     | Un sachet d'ivacaftor 25 mg granulés le matin deux fois par semaine.<br><br>Pas de prise d'ivacaftor le soir.                                                                                                |
| 6 mois et plus, $\geq 7$ kg à $< 14$ kg                               | Un sachet d'ivacaftor 50 mg granulés une fois par jour le matin.<br><br>Pas de prise d'ivacaftor le soir.                                                                                                                                                                                     | Un sachet d'ivacaftor 50 mg granulés le matin deux fois par semaine.<br><br>Pas de prise d'ivacaftor le soir.                                                                                                |
| 6 mois et plus, $\geq 14$ kg à $< 25$ kg                              | Un sachet d'ivacaftor 75 mg granulés une fois par jour le matin.<br><br>Pas de prise d'ivacaftor le soir.                                                                                                                                                                                     | Un sachet d'ivacaftor 75 mg granulés le matin deux fois par semaine.<br><br>Pas de prise d'ivacaftor le soir.                                                                                                |
| <b>Ivacaftor en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |
| 2 ans à moins de 6 ans, $\geq 10$ kg à $< 14$ kg                      | En alternance un jour sur deux : <ul style="list-style-type: none"> <li>Un sachet d'ivacaftor 60 mg/tezacaftor 40 mg/elexacaftor 80 mg granulés le matin le premier jour.</li> <li>Un sachet d'ivacaftor 59,5 mg granulés le matin le lendemain.</li> </ul> Pas de prise d'ivacaftor le soir. | Un sachet d'ivacaftor 60 mg/tezacaftor 40 mg/elexacaftor 80 mg granulés le matin deux fois par semaine deux fois par semaine, à environ 3 ou 4 jours d'intervalle.<br><br>Pas de prise d'ivacaftor le soir.  |
| 2 ans à moins de 6 ans, $\geq 14$ kg                                  | En alternance un jour sur deux : <ul style="list-style-type: none"> <li>Un sachet d'ivacaftor 75 mg/tezacaftor 50 mg/elexacaftor 100 mg granulés le matin le premier jour.</li> <li>Un sachet d'ivacaftor 75 mg granulés le matin le lendemain.</li> </ul> Pas de prise d'ivacaftor le soir.  | Un sachet d'ivacaftor 75 mg/tezacaftor 50 mg/elexacaftor 100 mg granulés le matin deux fois par semaine deux fois par semaine, à environ 3 ou 4 jours d'intervalle.<br><br>Pas de prise d'ivacaftor le soir. |

### Populations particulières

#### *Insuffisance rénale*

Aucune adaptation de la posologie n'est nécessaire chez les patients présentant une insuffisance rénale légère à modérée. La prudence est recommandée chez des patients présentant une insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine inférieure ou égale à 30 mL/min) ou en phase terminale (voir rubriques 4.4 et 5.2).

#### *Insuffisance hépatique*

Aucune adaptation de la posologie n'est nécessaire chez les patients âgés de 6 mois et plus présentant une insuffisance hépatique légère (Child-Pugh de classe A). Le traitement par l'ivacaftor n'est pas recommandé chez les patients âgés d'1 mois à moins de 6 mois quel que soit le degré de sévérité de l'insuffisance hépatique.

Chez les patients présentant une insuffisance hépatique modérée (Child-Pugh de classe B) ou sévère (Child-Pugh de classe C), la dose d'ivacaftor doit être ajustée comme indiqué dans le tableau 3 (voir rubriques 4.4, 4.8 et 5.2).

**Tableau 3 : Recommandations posologiques chez les patients présentant une insuffisance hépatique modérée ou sévère**

| Âge/poids                            | Modérée (Child-Pugh de classe B)                                                                                                          | Sévère (Child-Pugh de classe C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ivacaftor en monothérapie</b>     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 mois à moins de 6 mois             | <b>L'utilisation n'est pas recommandée.</b>                                                                                               | <b>L'utilisation n'est pas recommandée.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6 mois et plus,<br>≥ 5 kg à < 7 kg   | Un sachet d'ivacaftor 25 mg granulés une fois par jour le matin.<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Pas de prise d'ivacaftor le soir. | <b>L'utilisation n'est pas recommandée,</b> sauf si les bénéfices escomptés prédominent sur les risques.<br><br>En cas d'utilisation, un sachet d'ivacaftor 25 mg granulés le matin un jour sur deux en fonction de la réponse clinique et de la tolérance.<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Pas de prise d'ivacaftor le soir. |
| 6 mois et plus,<br>≥ 7 kg à < 14 kg  | Un sachet d'ivacaftor 50 mg granulés une fois par jour le matin.<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Pas de prise d'ivacaftor le soir. | <b>L'utilisation n'est pas recommandée,</b> sauf si les bénéfices escomptés prédominent sur les risques.<br><br>En cas d'utilisation, un sachet d'ivacaftor 50 mg granulés un jour sur deux en fonction de la réponse clinique et de la tolérance.<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Pas de prise d'ivacaftor le soir.          |
| 6 mois et plus,<br>≥ 14 kg à < 25 kg | Un sachet d'ivacaftor 75 mg granulés une fois par jour le matin.<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Pas de prise d'ivacaftor le soir. | <b>L'utilisation n'est pas recommandée,</b> sauf si les bénéfices escomptés prédominent sur les risques.<br><br>En cas d'utilisation, un sachet d'ivacaftor 75 mg granulés le matin un jour sur deux en fonction de la réponse clinique et de la tolérance.<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Pas de prise d'ivacaftor le soir. |

| Âge/poids                                                             | Modérée (Child-Pugh de classe B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sévère (Child-Pugh de classe C) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Ivacaftor en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
| 2 ans à moins de 6 ans,<br>≥ 10 kg à < 14 kg                          | <p><b>L'utilisation n'est pas recommandée,</b> sauf si les bénéfices escomptés prédominent sur les risques.</p> <p>En cas d'utilisation, la dose doit être ajustée comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jours 1 à 3 : un sachet d'ivacaftor 60 mg/tezacaftor 40 mg/elexacaftor 80 mg granulés le matin chaque jour.</li> <li>• Jour 4 : pas de prise.</li> <li>• Jours 5 et 6 : un sachet d'ivacaftor 60 mg/tezacaftor 40 mg/elexacaftor 80 mg granulés le matin chaque jour.</li> <li>• Jour 7 : pas de prise.</li> </ul> <p>Le schéma posologique ci-dessus doit être répété chaque semaine.</p> <p>Pas de prise d'ivacaftor le soir .</p>             | Ne doit pas être utilisé.       |
| 2 ans à moins de 6 ans,<br>≥ 14 kg                                    | <p><b>L'utilisation n'est pas recommandée,</b> sauf seulement si les bénéfices escomptés prédominent sur les risques.</p> <p>En cas d'utilisation, la dose doit être ajustée comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jours 1 à 3 : un sachet d'ivacaftor 75 mg/tezacaftor 50 mg/elexacaftor 100 mg granulés le matin chaque jour.</li> <li>• Jour 4 : pas de prise.</li> <li>• Jours 5 et 6 : un sachet d'ivacaftor 75 mg/tezacaftor 50 mg/elexacaftor 100 mg granulés le matin chaque jour.</li> <li>• Jour 7 : pas de prise.</li> </ul> <p>Le schéma posologique ci-dessus doit être répété chaque semaine.</p> <p>Pas de prise d'ivacaftor le soir .</p> | Ne doit pas être utilisé.       |

### Population pédiatrique

La sécurité et l'efficacité de l'ivacaftor en monothérapie n'ont pas été établies chez les enfants âgés de moins d'1 mois ou chez les enfants âgés de moins de 6 mois prématurés (nés à moins de 37 semaines d'âge gestationnel). Elles n'ont pas non plus été établies pour l'ivacaftor en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor chez les enfants âgés de moins de 2 ans. Aucune donnée n'est disponible.

Les données chez les patients de moins de 6 ans porteurs d'une mutation *R117H* du gène *CFTR* sont limitées. Les données disponibles chez les patients âgés de 6 ans et plus sont décrites aux rubriques 4.8, 5.1 et 5.2.

## Mode d'administration

Voie orale.

Chaque sachet est à usage unique.

Le contenu de chaque sachet de granulés doit être mélangé avec 5 mL d'aliment semi-liquide ou de liquide adapté à l'âge et ingéré immédiatement et en totalité. L'aliment ou le liquide servant à la préparation du mélange doit être à température ambiante ou inférieure. Si le mélange n'est pas consommé immédiatement, il reste stable pendant une heure et doit donc être ingéré dans ce délai. Le médicament doit être administré immédiatement avant ou après un repas ou une collation riche en graisses.

La consommation d'aliments ou de boissons contenant du pamplemousse doit être évitée durant le traitement (voir rubrique 4.5).

### **4.3 Contre-indications**

Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1.

### **4.4 Mises en garde spéciales et précautions d'emploi**

Seuls les patients atteints de mucoviscidose qui présentaient une mutation de défaut de régulation (classe III) *G551D*, *G1244E*, *G1349D*, *G178R*, *G551S*, *S1251N*, *S1255P*, *S549N* ou *S549R* ou une mutation *G970R* sur au moins un allèle du gène *CFTR* ont été inclus dans les études 770-102, 770-103, 770-111 et 770-108 (voir rubrique 5.1).

Dans l'étude 770-110, l'effet positif de l'ivacaftor observé a été moins évident chez les patients porteurs d'une mutation *R117H-7T* associée à une maladie moins sévère (voir rubrique 5.1).

Quatre patients porteurs de la mutation *G970R* ont été inclus dans l'étude 770-111. Chez trois des quatre patients, la variation du taux de chlorures dans la sueur a été inférieure à 5 mmol/L et ce groupe ne présentait pas d'amélioration cliniquement significative du VEMS après 8 semaines de traitement. L'efficacité clinique chez les patients porteurs de la mutation *G970R* du gène *CFTR* n'a pas pu être établie (voir rubrique 5.1).

Les résultats d'efficacité d'une étude de phase II réalisée chez des patients atteints de mucoviscidose, homozygotes pour la mutation *CFTR-F508del*, n'ont pas mis en évidence de différence statistiquement significative du VEMS après 16 semaines de traitement par l'ivacaftor comparé au placebo (voir rubrique 5.1). Par conséquent, l'utilisation de l'ivacaftor en monothérapie n'est pas recommandée chez ces patients.

## Augmentations des transaminases et atteinte hépatique

Chez un patient présentant une cirrhose et une hypertension portale, une insuffisance hépatique nécessitant une transplantation a été rapportée lors du traitement par l'ivacaftor en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor. Ce médicament doit être utilisé avec précaution chez les patients présentant une atteinte hépatique avancée préexistante (par exemple cirrhose, hypertension portale), et uniquement si les bénéfices escomptés prédominent sur les risques. S'il est utilisé, ces patients doivent être étroitement surveillés après l'instauration du traitement (voir rubriques 4.2, 4.8 et 5.2).

Des augmentations modérées des transaminases (alanine aminotransférase [ALAT] ou aspartate aminotransférase [ASAT]) sont fréquentes chez les patients atteints de mucoviscidose. Des augmentations des transaminases ont été observées chez certains patients traités par l'ivacaftor en monothérapie et en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor. Chez les patients recevant l'ivacaftor en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor, ces augmentations ont parfois été accompagnées d'élévations de la bilirubine totale. Par conséquent, un dosage des transaminases

(ALAT et ASAT) et de la bilirubine totale est recommandé chez tous les patients avant l'instauration du traitement par l'ivacaftor, tous les 3 mois durant la première année de traitement, puis au moins une fois par an. Une surveillance plus fréquente de la fonction hépatique doit être envisagée chez les patients ayant des antécédents d'atteinte hépatique ou d'augmentations des transaminases. En cas d'augmentations significatives des transaminases (par exemple ALAT ou ASAT > 5 fois la limite supérieure de la normale [LSN] ou ALAT ou ASAT > 3 × LSN avec bilirubine > 2 × LSN), le traitement doit être interrompu et le bilan hépatique doit être étroitement surveillé jusqu'à sa normalisation. La décision d'une éventuelle reprise du traitement après normalisation du bilan hépatique doit tenir compte des risques encourus par rapport au bénéfice attendu (voir rubriques 4.2, 4.8 et 5.2).

### Insuffisance hépatique

L'utilisation de l'ivacaftor en monothérapie n'est pas recommandée chez les patients âgés d'1 mois à moins de 6 mois présentant une insuffisance hépatique quel que soit le degré de sévérité. L'utilisation de l'ivacaftor en monothérapie n'est pas recommandée chez les patients âgés de 6 mois et plus pesant moins de 25 kg qui présentent une insuffisance hépatique sévère, sauf si les bénéfices escomptés prédominent sur les risques. Les patients présentant une insuffisance hépatique sévère ne doivent pas être traités par l'ivacaftor en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor (voir tableau 3 à la rubrique 4.2 et rubriques 4.8 et 5.2).

L'utilisation de l'ivacaftor en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor chez les patients présentant une insuffisance hépatique modérée n'est pas recommandée. Le traitement ne doit être envisagé qu'en cas de nécessité médicale absolue et uniquement si les bénéfices escomptés prédominent sur les risques. Dans ce cas, il doit être utilisé avec précaution à une dose réduite (voir tableau 3 à la rubrique 4.2 et rubriques 4.8 et 5.2).

### Dépression

Des cas de dépression (incluant idées suicidaires et tentatives de suicide), apparaissant généralement au cours des trois mois suivant l'instauration du traitement, ont été rapportés chez des patients traités par l'ivacaftor, notamment en association avec tezacaftor/ivacaftor ou avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor, et ayant des antécédents de troubles psychiatriques. Une amélioration des symptômes a été observée dans certains cas après une réduction de la dose ou l'arrêt du traitement. Les patients (et aidants) doivent être avertis de la nécessité d'être attentifs à l'apparition d'une humeur dépressive, de pensées suicidaires ou de modifications inhabituelles du comportement et de prendre immédiatement avis auprès du médecin en cas de survenue de ces symptômes.

### Insuffisance rénale

La prudence est recommandée lors de l'utilisation de l'ivacaftor chez des patients présentant une insuffisance rénale sévère ou en phase terminale (voir rubriques 4.2 et 5.2).

### Mutations peu susceptibles de répondre au traitement modulateur

Les patients dont le génotype comprend deux mutations du gène *CFTR* connues pour ne pas produire de protéine CFTR (c'est-à-dire deux mutations de classe I) ne devraient pas répondre au traitement modulateur de la protéine CFTR.

### Études cliniques comparant l'ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor au tezacaftor/ivacaftor ou à l'ivacaftor

Il n'a pas été mené d'étude clinique comparant directement l'ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor au tezacaftor/ivacaftor ou à l'ivacaftor chez les patients qui ne sont pas porteurs de mutations *F508del*.

### Patients greffés

L'ivacaftor n'a pas été étudié chez les patients atteints de mucoviscidose ayant reçu une greffe d'organe. Par conséquent, l'utilisation chez les patients greffés n'est pas recommandée. Voir la rubrique 4.5 pour les interactions avec la ciclosporine ou le tacrolimus.

### Rashs cutanés

L'incidence des rashs observés avec l'ivacaftor en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor était plus élevée chez les patientes que chez les patients de sexe masculin, en particulier chez les patientes prenant des contraceptifs hormonaux. Le rôle des contraceptifs hormonaux dans la survenue d'un rash ne peut être exclu. L'interruption du traitement par l'ivacaftor en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor et des contraceptifs hormonaux doit être envisagée chez les patientes sous contraceptifs hormonaux qui développent un rash. Après disparition du rash, il convient d'évaluer si la reprise du traitement par l'ivacaftor en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor sans contraceptifs hormonaux est appropriée. Si le rash ne récidive pas, la reprise des contraceptifs hormonaux peut être envisagée (voir rubrique 4.8).

### Interactions avec d'autres médicaments

#### *Inducteurs du CYP3A*

L'utilisation concomitante d'inducteurs du CYP3A diminue significativement l'exposition systémique de l'ivacaftor, ce qui peut entraîner une diminution de son efficacité. Par conséquent, l'administration concomitante de Kalydeco avec des inducteurs puissants du CYP3A n'est pas recommandée (voir rubrique 4.5).

#### *Inhibiteurs du CYP3A*

L'utilisation concomitante d'inhibiteurs puissants ou modérés du CYP3A augmente l'exposition systémique de l'ivacaftor. En cas d'utilisation concomitante d'inhibiteurs modérés ou puissants du CYP3A, la dose d'ivacaftor doit être ajustée (voir tableau 2 à la rubrique 4.2 et la rubrique 4.5). Le traitement par l'ivacaftor en monothérapie n'est pas recommandé chez les patients âgés d'1 mois à moins de 6 mois recevant des inhibiteurs puissants ou modérés du CYP3A.

### Population pédiatrique

Des cas d'opacités du cristallin/de cataractes non congénitales sans répercussions sur la vision ont été rapportés chez des enfants et adolescents traités par l'ivacaftor en monothérapie ou en association. Bien que d'autres facteurs de risque aient été présents dans certains cas (par exemple : corticothérapie et exposition à des rayonnements), un risque possible imputable au traitement par l'ivacaftor ne peut être exclu. Des examens ophtalmologiques avant et pendant le traitement sont recommandés en cas d'instauration du traitement par l'ivacaftor chez des patients pédiatriques (voir rubrique 5.3).

### Excipients à effet notoire

#### *Lactose*

Ce médicament contient du lactose. Ce médicament ne doit pas être administré chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit complet en lactase ou un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (maladies héréditaires rares).

#### *Sodium*

Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par sachet, c'est-à-dire qu'il est essentiellement « sans sodium ».

## 4.5 Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions

L'ivacaftor est un substrat du CYP3A4 et du CYP3A5. C'est un inhibiteur faible du CYP3A et de la glycoprotéine P (P-gp) et un inhibiteur potentiel du CYP2C9. Les études *in vitro* ont montré que l'ivacaftor n'est pas un substrat de la P-gp.

### Médicaments modifiant la pharmacocinétique de l'ivacaftor

#### *Inducteurs du CYP3A*

L'administration concomitante d'ivacaftor et de rifampicine, un inducteur puissant du CYP3A, a diminué l'exposition systémique de l'ivacaftor (ASC) de 89 % et a diminué l'exposition systémique de l'hydroxyméthyl-ivacaftor (métabolite M1) dans une moindre mesure comparativement à l'ivacaftor. L'administration concomitante d'ivacaftor et d'inducteurs puissants du CYP3A, tels que la rifampicine, la rifabutine, le phénobarbital, la carbamazépine, la phénytoïne et le millepertuis (*Hypericum perforatum*), n'est pas recommandée (voir rubrique 4.4).

Aucune adaptation de la posologie n'est préconisée en cas d'utilisation de l'ivacaftor avec des inducteurs faibles ou modérés du CYP3A.

#### *Inhibiteurs du CYP3A*

L'ivacaftor est un substrat de forte affinité du CYP3A. L'administration concomitante de kétoconazole, un inhibiteur puissant du CYP3A, a augmenté l'exposition systémique de l'ivacaftor (mesurée par l'aire sous la courbe des concentrations plasmatiques [ASC]) de 8,5 fois et a augmenté l'exposition systémique du métabolite M1 dans une moindre mesure comparativement à celle de l'ivacaftor. L'administration concomitante de fluconazole, un inhibiteur modéré du CYP3A, a augmenté l'exposition systémique de l'ivacaftor de 3 fois et a augmenté l'exposition systémique du métabolite M1 dans une moindre mesure comparativement à celle de l'ivacaftor. Une réduction de la posologie de l'ivacaftor est recommandée lors de l'administration concomitante d'inhibiteurs puissants du CYP3A, tels que le kétoconazole, l'itraconazole, le posaconazole, le voriconazole, la télithromycine et la clarithromycine, ainsi que lors de l'administration concomitante d'inhibiteurs modérés du CYP3A, tels que le fluconazole, l'érythromycine et le vérapamil. Le traitement par l'ivacaftor en monothérapie n'est pas recommandé chez les patients âgés d'1 mois à moins de 6 mois en cas d'administration d'inhibiteurs puissants ou modérés du CYP3A (voir tableau 2 à la rubrique 4.2 et rubrique 4.4).

L'administration concomitante d'ivacaftor et de jus de pamplemousse, qui contient un ou plusieurs composants inhibant modérément le CYP3A, peut augmenter l'exposition de l'ivacaftor. La consommation d'aliments ou de boissons contenant du pamplemousse doit être évitée pendant le traitement par l'ivacaftor (voir rubrique 4.2).

#### *Interactions potentielles entre l'ivacaftor et les transporteurs*

Les études *in vitro* ont montré que l'ivacaftor n'est pas un substrat d'OATP1B1 et d'OATP1B3. *In vitro*, l'ivacaftor et ses métabolites sont des substrats de la BCRP. Du fait de la perméabilité intrinsèque élevée de l'ivacaftor et de sa faible élimination sous forme inchangée, l'administration concomitante d'inhibiteurs de la BCRP ne devrait pas modifier les expositions systémiques de l'ivacaftor et du M1-IVA. Les éventuelles modifications de l'exposition systémique du M6-IVA ne devraient pas être cliniquement significatives.

#### *Ciprofloxacine*

L'administration concomitante de ciprofloxacine et d'ivacaftor n'a pas eu d'effet sur l'exposition systémique de l'ivacaftor. Il n'y a pas lieu d'envisager une adaptation de la posologie en cas de traitement concomitant par l'ivacaftor et la ciprofloxacine.

### Médicaments dont la pharmacocinétique est modifiée par l'ivacaftor

L'administration d'ivacaftor peut augmenter l'exposition systémique des médicaments qui sont des substrats ayant une forte affinité pour le CYP2C9 et/ou la P-gp et/ou le CYP3A, ce qui peut augmenter ou prolonger leur effet thérapeutique et leurs effets indésirables.

#### *Substrats du CYP2C9*

L'ivacaftor peut inhiber le CYP2C9. Par conséquent, la surveillance de l'INR (International Normalized Ratio - rapport normalisé international) est recommandée en cas d'administration concomitante de warfarine avec l'ivacaftor. Les autres médicaments dont l'exposition systémique peut être augmentée sont notamment le glimépiride et le glipizide. Ces médicaments doivent être utilisés avec précaution.

#### *Digoxine et autres substrats de la P-gp*

L'administration concomitante de digoxine, un substrat ayant une forte affinité pour la P-gp, a entraîné une augmentation de l'exposition systémique de la digoxine d'un facteur 1,3, ce qui correspond à une inhibition faible de la P-gp par l'ivacaftor. L'administration d'ivacaftor peut augmenter l'exposition systémique des médicaments substrats de forte affinité de la P-gp, ce qui peut augmenter ou prolonger leur effet thérapeutique ainsi que leurs effets indésirables. La prudence et une surveillance adaptée sont préconisées en cas d'administration concomitante avec la digoxine ou avec d'autres substrats de la P-gp ayant une marge thérapeutique étroite tels que la ciclosporine, l'évérolimus, le sirolimus et le tacrolimus.

#### *Substrats du CYP3A*

L'administration concomitante de midazolam (par voie orale), un substrat de forte affinité du CYP3A, a augmenté l'exposition systémique du midazolam d'un facteur 1,5, ce qui correspond à une inhibition faible du CYP3A par l'ivacaftor. Il n'y a pas lieu de prévoir une adaptation de la posologie des substrats du CYP3A tels que le midazolam, l'alprazolam, le diazépam ou le triazolam en cas d'administration concomitante avec l'ivacaftor.

#### *Contraceptifs hormonaux*

Il n'a pas été mis en évidence d'effet significatif de l'ivacaftor sur les expositions systémiques d'un contraceptif œstro-progestatif administré par voie orale. Aucune adaptation de la posologie des contraceptifs oraux n'apparaît nécessaire.

### Population pédiatrique

Les études d'interaction n'ont été réalisées que chez l'adulte.

## **4.6 Fertilité, grossesse et allaitement**

### Grossesse

Il n'existe pas de données ou il existe des données limitées (moins de 300 grossesses) sur l'utilisation de l'ivacaftor chez la femme enceinte. Les études effectuées chez l'animal n'ont pas mis en évidence d'effets délétères directs ou indirects sur la reproduction (voir rubrique 5.3). Par mesure de précaution, il est préférable d'éviter l'utilisation de l'ivacaftor pendant la grossesse.

### Allaitement

Des données limitées montrent une excrétion de l'ivacaftor dans le lait maternel. Un risque pour les nouveau-nés/nourrissons allaités ne peut être exclu. Une décision doit être prise soit d'interrompre

l'allaitement soit d'interrompre/de s'abstenir du traitement avec l'ivacaftor en prenant en compte le bénéfice de l'allaitement pour l'enfant au regard du bénéfice du traitement pour la femme.

## Fertilité

Il n'existe pas de données sur l'effet de l'ivacaftor sur la fertilité humaine. L'ivacaftor a eu un effet sur la fertilité chez le rat (voir rubrique 5.3).

## **4.7 Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines**

L'ivacaftor a une influence mineure sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. L'ivacaftor peut provoquer des sensations vertigineuses (voir rubrique 4.8). Il doit donc être recommandé aux patients de ne pas conduire de véhicules ni utiliser de machines s'ils ressentent des sensations vertigineuses et ceci jusqu'à la disparition des symptômes.

## **4.8 Effets indésirables**

### Résumé du profil de sécurité

Les effets indésirables les plus fréquemment observés chez les patients âgés de 6 ans et plus sont : céphalées (23,9 %), douleur oropharyngée (22,0 %), infections des voies respiratoires supérieures (22,0 %), congestion nasale (20,2 %), douleur abdominale (15,6 %), rhinopharyngite (14,7 %), diarrhée (12,8 %), sensations vertigineuses (9,2 %), rash cutané (12,8 %) et contamination bactérienne de l'expectoration (12,8 %). Des augmentations des transaminases ont été observées chez 12,8 % des patients traités par l'ivacaftor contre 11,5 % des patients recevant le placebo.

Chez les patients âgés de 2 ans à moins de 6 ans, les effets indésirables les plus fréquents étaient : congestion nasale (26,5 %), infections des voies respiratoires supérieures (23,5 %), augmentations des transaminases (14,7 %), rash cutané (11,8 %) et contamination bactérienne de l'expectoration (11,8 %).

Les effets indésirables graves étaient notamment des douleurs abdominales (0,9 %) et des augmentations des transaminases (1,8 %) chez les patients qui recevaient l'ivacaftor, tandis que des effets indésirables graves à type de rash ont été rapportés chez 1,5 % des patients âgés de 12 ans et plus recevant l'ivacaftor en association avec ivacaftor/tezacaftor/elextacaftor (voir rubrique 4.4).

### Tableau des effets indésirables

Le tableau 4 ci-dessous présente les effets indésirables observés avec l'ivacaftor dans les études cliniques (études contrôlées contre placebo et non contrôlées) au cours desquelles la durée d'exposition de l'ivacaftor allait de 16 semaines à 144 semaines. La fréquence de survenue des effets indésirables est définie comme suit : très fréquent ( $\geq 1/10$ ) ; fréquent ( $\geq 1/100$ ,  $< 1/10$ ) ; peu fréquent ( $\geq 1/1\,000$ ,  $< 1/100$ ) ; rare ( $\geq 1/10\,000$ ,  $< 1/1\,000$ ) ; très rare ( $< 1/10\,000$ ) ; fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Au sein de chaque groupe de fréquence, les effets indésirables sont présentés suivant un ordre décroissant de gravité.

**Tableau 4 : Effets indésirables**

| Classe de systèmes d'organes | Effets indésirables                           | Fréquence de survenue |
|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Infections et infestations   | Infection des voies respiratoires supérieures | très fréquent         |
|                              | Rhinopharyngite                               | très fréquent         |
|                              | Syndrome grippal*                             | fréquent              |
|                              | Rhinite                                       | fréquent              |

| Classe de systèmes d'organes                           | Effets indésirables                           | Fréquence de survenue  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| Troubles du métabolisme et de la nutrition             | Hypoglycémie*                                 | fréquent               |
| Affections psychiatriques                              | Dépression                                    | fréquence indéterminée |
| Affections du système nerveux                          | Céphalées                                     | très fréquent          |
|                                                        | Sensations vertigineuses                      | très fréquent          |
| Affections de l'oreille et du labyrinthe               | Otalgie                                       | fréquent               |
|                                                        | Sensation anormale au niveau de l'oreille     | fréquent               |
|                                                        | Acouphènes                                    | fréquent               |
|                                                        | Hyperhémie du tympan                          | fréquent               |
|                                                        | Trouble vestibulaire                          | fréquent               |
|                                                        | Congestion de l'oreille                       | peu fréquent           |
|                                                        |                                               |                        |
| Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales | Douleur oropharyngée                          | très fréquent          |
|                                                        | Congestion nasale                             | très fréquent          |
|                                                        | Respiration anormale*                         | fréquent               |
|                                                        | Rhinorrhée*                                   | fréquent               |
|                                                        | Congestion des sinus                          | fréquent               |
|                                                        | Érythème pharyngé                             | fréquent               |
|                                                        | Sibilances*                                   | peu fréquent           |
| Affections gastro-intestinales                         | Douleur abdominale                            | très fréquent          |
|                                                        | Diarrhée                                      | très fréquent          |
|                                                        | Douleur abdominale haute*                     | fréquent               |
|                                                        | Flatulences*                                  | fréquent               |
| Affections hépatobiliaires                             | Augmentations des transaminases               | très fréquent          |
|                                                        | Augmentation de l'alanine aminotransférase*   | très fréquent          |
|                                                        | Augmentation de l'aspartate aminotransférase* | fréquent               |
|                                                        | Atteinte hépatique†                           | fréquence indéterminée |
|                                                        | Augmentation de la bilirubine totale†         | fréquence indéterminée |
| Affections de la peau et du tissu sous-cutané          | Rash cutané                                   | très fréquent          |
|                                                        | Acné*                                         | fréquent               |
|                                                        | Prurit*                                       | fréquent               |
| Affections des organes de reproduction et du sein      | Masse dans le sein                            | fréquent               |
|                                                        | Inflammation du sein                          | peu fréquent           |
|                                                        | Gynécomastie                                  | peu fréquent           |
|                                                        | Affection du mamelon                          | peu fréquent           |
|                                                        | Douleur au niveau du mamelon                  | peu fréquent           |
| Investigations                                         | Contamination bactérienne de l'expectoration  | très fréquent          |
|                                                        | Augmentation de la créatine kinase sanguine*  | fréquent               |
|                                                        | Augmentation de la pression artérielle*       | peu fréquent           |

\* Effet indésirable et fréquence rapportés dans les études cliniques conduites avec l'ivacaftor en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor.

† Atteinte hépatique (augmentations de l'ALAT, de l'ASAT et de la bilirubine totale) rapportée dans le cadre des données de pharmacovigilance depuis la commercialisation de l'ivacaftor en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor. Cela incluait également un cas d'insuffisance hépatique nécessitant une

transplantation chez un patient présentant une cirrhose et une hypertension portale préexistantes. La fréquence ne peut pas être estimée sur la base des données disponibles.

### Description de certains effets indésirables

#### *Élévation du taux de transaminases*

Au cours des études cliniques 770-102 et 770-103 contrôlées contre placebo d'une durée de 48 semaines menées chez des patients âgés de 6 ans et plus, l'incidence de l'augmentation maximale des taux de transaminases (ALAT ou ASAT)  $> 8$ ,  $> 5$  ou  $> 3 \times \text{LSN}$  était respectivement de 3,7 %, 3,7 % et 8,3 % chez les patients traités par l'ivacaftor et de 1,0 %, 1,9 % et 8,7 % chez les patients recevant le placebo. Deux patients, l'un recevant le placebo et l'autre recevant l'ivacaftor, ont arrêté définitivement le traitement en raison de transaminases élevées,  $> 8 \times \text{LSN}$ . Aucun des patients traités par l'ivacaftor n'a présenté d'augmentation des transaminases  $> 3 \times \text{LSN}$  associée à une augmentation de la bilirubine totale  $> 1,5 \times \text{LSN}$ . Chez les patients traités par l'ivacaftor, les augmentations des transaminases allant jusqu'à  $5 \times \text{LSN}$  ont régressé sans interruption du traitement dans la majorité des cas. L'administration d'ivacaftor a été interrompue chez la plupart des patients présentant des élévations des transaminases  $> 5 \times \text{LSN}$ . Le traitement par l'ivacaftor a pu être repris avec succès dans tous les cas où il avait été interrompu temporairement en raison d'une élévation des transaminases (voir rubrique 4.4).

Au cours des études de phase III contrôlées contre placebo (d'une durée allant jusqu'à 24 semaines) du tezacaftor/ivacaftor, l'incidence de l'augmentation maximale des taux de transaminases (ALAT ou ASAT)  $> 8$ ,  $> 5$  ou  $> 3 \times \text{LSN}$  était respectivement de 0,2 %, 1,0 % et 3,4 % chez les patients traités par tezacaftor/ivacaftor et de 3,4 % chez les patients recevant le placebo. Un patient (0,2 %) recevant le traitement actif et deux patients (0,4 %) recevant le placebo ont arrêté définitivement le traitement en raison de transaminases élevées. Aucun patient traité par tezacaftor/ivacaftor n'a présenté d'augmentation des transaminases  $> 3 \times \text{LSN}$  accompagnée d'une augmentation de la bilirubine totale  $> 2 \times \text{LSN}$ .

Au cours de l'étude de phase III contrôlée contre placebo de 24 semaines de l'ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor, ces chiffres étaient de 1,5 %, 2,5 % et 7,9 % chez les patients traités par ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor et de 1,0 %, 1,5 % et 5,5 % chez les patients recevant le placebo. L'incidence des effets indésirables d'augmentations des transaminases était de 10,9 % chez les patients traités par l'ivacaftor en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor et de 4,0 % chez les patients recevant le placebo.

Des cas d'arrêt du traitement en raison d'augmentations des transaminases ont été rapportés depuis la commercialisation chez des patients recevant l'association ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor (voir rubrique 4.4).

#### *Rashes cutanés*

Dans l'étude 445-102, l'incidence des rashes cutanés (tels que : rash, rash prurigineux) était de 10,9 % chez les patients traités par ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor et de 6,5 % chez les patients recevant le placebo. Les rashes étaient généralement d'intensité légère à modérée. L'incidence en fonction du sexe était de 5,8 % chez les patients de sexe masculin et de 16,3 % chez les patientes dans le groupe traité par ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor et de 4,8 % chez les patients de sexe masculin et 8,3 % chez les patientes recevant le placebo. Chez les patientes traitées par ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor, l'incidence des rashes était de 20,5 % chez celles qui prenaient un contraceptif hormonal et de 13,6 % chez celles qui n'en prenaient pas (voir rubrique 4.4)

#### *Augmentation de la créatine kinase*

Dans l'étude 445-102, l'incidence de l'augmentation maximale du taux de créatine kinase  $> 5 \times \text{LSN}$  était de 10,4 % chez les patients traités par ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor et de 5,0 % chez les patients recevant le placebo. Les augmentations de la créatine kinase observées étaient généralement

transitoires et asymptomatiques et sont survenues à la suite d'une activité physique dans de nombreux cas. Aucun des patients traités par ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor n'a arrêté le traitement en raison d'une augmentation de la créatine kinase.

#### *Augmentation de la pression artérielle*

Dans l'étude 445-102, l'augmentation maximale de la pression artérielle systolique (PAS) et diastolique (PAD) moyenne par rapport aux valeurs initiales était respectivement de 3,5 mmHg et 1,9 mmHg chez les patients traités par ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor (valeurs initiales : PAS 113 mmHg et PAD 69 mmHg) et respectivement de 0,9 mmHg et 0,5 mmHg chez les patients recevant le placebo (valeurs initiales : PAS 114 mmHg et PAD 70 mmHg).

Les pourcentages de patients ayant eu une pression artérielle systolique > 140 mmHg ou une pression artérielle diastolique > 90 mmHg à deux reprises au moins étaient respectivement de 5,0 % et 3,0 % chez les patients traités par ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor contre 3,5 % et 3,5 % chez les patients recevant le placebo.

#### Population pédiatrique

##### *Ivacaftor en monothérapie*

La sécurité de l'ivacaftor administré en monothérapie pendant 24 semaines a été évaluée chez 43 patients âgés d'1 mois à moins de 24 mois (dont 7 étaient âgés de moins de 4 mois), 34 patients âgés de 2 à moins de 6 ans, 61 patients âgés de 6 à moins de 12 ans et 94 patients âgés de 12 à moins de 18 ans.

En général, le profil de sécurité est uniforme chez les enfants âgés d'1 mois et plus et est également similaire à celui observé chez les patients adultes.

L'incidence des augmentations des transaminases (ALAT ou ASAT) observées dans les études 770-103, 770-111 et 770-110 (patients âgés de 6 à moins de 12 ans), dans l'étude 770-108 (patients âgés de 2 à moins de 6 ans) et dans l'étude 770-124 (patients âgés d'1 mois à moins de 24 mois) est présentée dans le tableau 5. Dans les études contrôlées contre placebo, l'incidence des augmentations des transaminases était similaire chez les patients traités par l'ivacaftor (15,0 %) et chez les patients recevant le placebo (14,6 %). Les augmentations des transaminases étaient généralement plus importantes chez les enfants que chez les patients plus âgés. Dans toutes les populations, les taux de transaminases sont revenus aux valeurs initiales après l'interruption du traitement, et le traitement par l'ivacaftor a pu être repris avec succès dans presque tous les cas où il avait été interrompu temporairement en raison d'une élévation des transaminases (voir rubrique 4.4). Des cas évocateurs d'un rechallenge positif ont été observés.

Dans l'étude 770-108, le traitement par l'ivacaftor a été arrêté définitivement chez un patient. Dans l'étude 770-124, dans la cohorte de patients âgés d'1 mois à moins de 4 mois, un patient (14,3 %) âgé d'1 mois avait un taux d'ALAT > 8 × LSN et un taux d'ASAT > 3 et ≤ 5 × LSN, entraînant l'arrêt du traitement par l'ivacaftor (voir la rubrique 4.4 pour la prise en charge des augmentations des transaminases).

**Tableau 5 : Augmentations des transaminases chez les patients âgés d'1 mois à moins de 12 ans traités par l'ivacaftor en monothérapie**

|                | n  | % de patients avec taux > 3 × LSN | % de patients avec taux > 5 × LSN | % de patients avec taux > 8 × LSN |
|----------------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 6 à < 12 ans   | 40 | 15,0 % (6)                        | 2,5 % (1)                         | 2,5 % (1)                         |
| 2 à < 6 ans    | 34 | 14,7 % (5)                        | 14,7 % (5)                        | 14,7 % (5)                        |
| 12 à < 24 mois | 18 | 27,8 % (5)                        | 11,1 % (2)                        | 11,1 % (2)                        |
| 1 à < 12 mois  | 24 | 8,3 % (2)                         | 4,2 % (1)                         | 4,2 % (1)                         |

#### *Ivacaftor en association avec tezacaftor/ivacaftor*

La sécurité du tezacaftor/ivacaftor en association avec l'ivacaftor a été évaluée chez 124 patients âgés de 6 ans à moins de 12 ans. Les doses de 100 mg de tezacaftor/150 mg d'ivacaftor et de 150 mg d'ivacaftor n'ont pas été évaluées dans les études cliniques menées chez les enfants âgés de 6 ans à moins de 12 ans et pesant de 30 kg à moins de 40 kg.

En général, le profil de sécurité est uniforme chez les enfants et les adolescents et est également similaire à celui observé chez les patients adultes.

Au cours de l'étude de phase III en ouvert d'une durée de 24 semaines menée chez des patients âgés de 6 ans à moins de 12 ans (étude 661-113 partie B, n = 70), l'incidence de l'augmentation maximale des transaminases (ALAT ou ASAT) > 8, > 5 et > 3 × LSN était respectivement de 1,4 %, 4,3 % et 10,0 %. Aucun des patients traités par tezacaftor/ivacaftor n'a présenté d'augmentation des transaminases > 3 × LSN associée à une augmentation de la bilirubine totale > 2 × LSN et aucun patient n'a arrêté le traitement en raison d'une augmentation des transaminases. Le traitement par tezacaftor/ivacaftor a été interrompu chez un patient en raison de transaminases élevées et a ensuite été repris avec succès (voir la rubrique 4.4 pour la prise en charge des augmentations des transaminases).

#### *Ivacaftor en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor*

La sécurité de l'ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor en association avec l'ivacaftor a été évaluée chez 272 patients âgés de 2 ans à moins de 18 ans dans les études 445-102, 445-103, 445-104, 445-106, 445-111 et 445-124. En général, le profil de sécurité est similaire chez les enfants et adolescents et chez les adultes.

Au cours de l'étude 445-106 menée chez des patients âgés de 6 ans à moins de 12 ans, l'incidence de l'augmentation maximale des transaminases (ALAT ou ASAT) > 8, > 5 et > 3 × LSN était respectivement de 0,0 %, 1,5 % et 10,6 %. Aucun des patients traités par ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor n'a présenté d'augmentation des transaminases > 3 × LSN associée à une augmentation de la bilirubine totale > 2 × LSN et aucun patient n'a arrêté le traitement en raison d'une augmentation des transaminases (voir rubrique 4.4).

Au cours de l'étude 445-111 menée chez des patients âgés de 2 ans à moins de 6 ans, l'incidence de l'augmentation maximale des transaminases (ALAT ou ASAT) > 8, > 5 et > 3 × LSN était respectivement de 1,3 %, 2,7 % et 8,0 %. Aucun des patients traités par ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor n'a présenté d'augmentation des transaminases > 3 × LSN associée à une augmentation de la bilirubine totale > 2 × LSN et aucun patient n'a arrêté le traitement en raison d'une augmentation des transaminases (voir rubrique 4.4).

#### *Rashes cutanés*

Au cours de l'étude 445-111 menée chez des patients âgés de 2 ans à moins de 6 ans, 15 patients (20,0 %) ont présenté au moins un événement de type rash cutané : 4 patientes (9,8 %) et 11 patients de sexe masculin (32,4 %).

## *Opacité du cristallin*

Un patient a présenté un événement indésirable de type opacité du cristallin.

### Déclaration des effets indésirables suspectés

La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration – voir [Annexe V](#).

## **4.9 Surdosage**

Il n'existe aucun antidote spécifique en cas de surdosage avec l'ivacaftor. La conduite à tenir en cas de surdosage consiste en des mesures générales d'appoint, telles que la surveillance des fonctions vitales, de la fonction hépatique et de l'état clinique du patient.

## **5. PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES**

### **5.1 Propriétés pharmacodynamiques**

Classe pharmacothérapeutique : autres produits pour le système respiratoire, Code ATC : R07AX02

#### Mécanisme d'action

##### *Ivacaftor en monothérapie*

L'ivacaftor potentialise l'activité de la protéine CFTR. *In vitro*, il augmente l'ouverture du canal CFTR pour améliorer le transport des ions chlorures dans les mutations de défaut de régulation spécifiques (dont la liste figure à la rubrique 4.1) impliquées dans la diminution de la probabilité d'ouverture du canal par rapport au canal CFTR normal. L'ivacaftor a également potentialisé la probabilité d'ouverture du canal R117H-CFTR, qui présente à la fois une faible probabilité d'ouverture (régulation) et une amplitude du courant ionique (conductance) réduite. La mutation G970R provoque une anomalie d'épissage ayant pour conséquence une quantité faible ou l'absence de protéines CFTR à la surface cellulaire, ce qui peut expliquer les résultats observés dans l'étude 770-111 chez les patients porteurs de cette mutation (voir Effets pharmacodynamiques et Efficacité et sécurité cliniques).

Les réponses observées *in vitro* dans les expériences de patch-clamp en canal unitaire sur des fragments de membranes cellulaires de rongeurs exprimant des formes mutées du canal CFTR ne correspondent pas systématiquement à la réponse pharmacodynamique *in vivo* (par exemple taux de chlorures dans la sueur) ou au bénéfice clinique. Le mécanisme exact par lequel l'ivacaftor potentialise l'activité de régulation du canal CFTR normal ou de certaines formes mutées de ce système n'est pas totalement élucidé.

##### *Ivacaftor en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor*

L'elexacaftor et le tezacaftor sont des correcteurs de la protéine CFTR qui se lient à des sites différents sur la protéine CFTR. Comparativement à chaque molécule seule, ils ont un effet additif pour faciliter la maturation et le trafic intracellulaires de la protéine CFTR afin d'augmenter la quantité de protéines CFTR amenées à la surface cellulaire. Lorsque l'ivacaftor est administré en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor, l'effet combiné est une augmentation de la quantité de protéines CFTR et de leur fonction à la surface cellulaire, entraînant une augmentation de l'activité du canal CFTR, mesurée par le transport des ions chlorures par le canal.

### Mesure du transport des ions chlorures par le canal CFTR sur cellules thyroïdiennes de rat Fisher (FRT) exprimant la protéine CFTR mutée

La réponse de la protéine CFTR mutée à l'ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor en termes de transport des ions chlorures a été déterminée dans des études d'électrophysiologie en chambre d'Ussing menées sur un panel de lignées cellulaires FRT transfectées avec des gènes *CFTR* porteurs de mutations uniques/distinctes. L'ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor a augmenté le transport des ions chlorures dans les cellules FRT exprimant des mutations sélectionnées de *CFTR*.

Le seuil de réponse de la protéine CFTR pour le transport des ions chlorures *in vitro* était défini comme l'augmentation nette d'au moins 10 % de l'activité normale de la protéine par rapport à la valeur initiale, en considérant que cette valeur est prédictive ou qu'il peut être raisonnablement attendu qu'elle soit prédictive d'une réponse clinique. Pour chaque mutation, l'amplitude de la variation nette du transport des ions chlorures par la protéine CFTR par rapport à la valeur initiale telle qu'observée *in vitro* n'est pas corrélée à l'amplitude de la réponse clinique.

Dans la mucoviscidose, la présence d'une mutation du gène *CFTR* répondant à l'ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor selon les données *in vitro* sur cellules FRT permettra probablement l'obtention d'une réponse clinique.

Le tableau 6 présente la liste des mutations du gène *CFTR* évoquées dans l'indication du traitement en combinaison avec l'ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor. La détection chez un sujet des mutations du gène *CFTR* répertoriées dans ce tableau ne doit pas remplacer le diagnostic de mucoviscidose ni être utilisée comme seul déterminant à des fins de prescription.

**Tableau 6. Mutations du gène *CFTR* ayant été identifiées comme répondant à l'ivacaftor/tezacaftor/elixacaftor d'après les données cliniques et/ou les données *in vitro***

|                |                 |               |                    |         |
|----------------|-----------------|---------------|--------------------|---------|
| 293A→G         | E217G           | H620Q         | N900K              | S50P    |
| 314del9        | E264V           | H939R         | N1088D             | S108F   |
| 546insCTA      | E282D           | H939R;H949L‡  | N1195T             | S158N   |
| 548insTAC      | E292K           | H954P         | N1303I             | S182R   |
| 711+3A→G*      | E384K           | H1054D        | N1303K*            | S308P   |
| 1140-1151dup   | E403D           | H1079P        | P5L†               | S341P   |
| 1336K          | E474K           | H1085P        | P67L*              | S364P   |
| 1461insGAT     | E527G           | H1085R        | P111L              | S434P   |
| 1507_1515del9  | E588V           | H1375N        | P140S              | S492F   |
| 2055del9       | E822K           | H1375P        | P205S              | S519G   |
| 2183A→G        | E831X           | I86M          | P439S              | S531P   |
| 2789+5G→A*     | E1104K          | I105N         | P499A              | S549I   |
| 2851A/G        | E1104V          | I125T         | P574H              | S549N   |
| 3007del6       | E1126K          | I148L         | P750L              | S549R*  |
| 3132T→G        | E1221V          | I148N         | P798S              | S557F   |
| 3141del9       | E1228K          | I175V         | P988R              | S589I   |
| 3143del9       | E1409K          | I331N         | P1013H             | S589N   |
| 3272-26A→G*†   | E1433K          | I336L         | P1013L             | S624R   |
| 3331del6       | F87L            | I444S         | P1021L             | S686Y   |
| 3410T→C        | F191V           | I497S         | P1021T             | S737F   |
| 3523A→G        | F200I           | I502T         | P1372T             | S821G   |
| 3601A→C        | F311del         | I506L         | Q30P               | S898R   |
| 3761T→G        | F311L           | I506V         | Q98P               | S912L   |
| 3791C/T        | F312del         | I506V;D1168G‡ | Q98R               | S912L;G |
| 3849+10kbC→T*† | F433L           | I521S         | Q151K              | 1244V‡  |
| 3850G→A        | F508C;S1251 N‡  | I530N         | Q179K              | S912T   |
| 3978G→C        | F508del*        | I556V         | Q237E              | S945L*† |
| A46D           | F508del;R1438W‡ | I586V         | Q237H              | S955P   |
| A62P           | F575Y           | I601F         | Q237P              | S977F   |
| A107G          | F587I           | I618N         | Q359K;T360K‡       | S977F;R |
| A120T          | F587L           | I618T         | Q359R              | 1438W‡  |
| A141D          | F693L(TTG)      | I980K         | Q372H              | S1045Y  |
| A155P          | F932S           | I1023R        | Q493L              | S1118F  |
| A234D          | F1016S          | I1139V        | Q493R              | S1159F  |
| A234V          | F1052V          | I1203V        | Q552P              | S1159P  |
| A238V          | F1074L          | I1234L        | Q1012P             | S1188L  |
| A309D          | F1078S          | I1234V        | Q1209P             | S1251N  |
| A349V          | F1099L          | I1269N        | Q1291H             | S1255P  |
| A357T          | F1107L          | I1366N        | Q1291R             | T338I   |
| A455E*†        | G27E            | I1366T        | Q1313K             | T351I   |
| A455V          | G27R            | K162E         | Q1352H             | T351S   |
| A457T          | G126D           | K464E         | R31L               | T351S;R |
| A462P          | G178E           | K464N         | R74Q               | 851L‡   |
| A534E          | G178R           | K522E         | R74Q;R297Q‡        | T388M   |
| A554E          | G194R           | K522Q         | R74Q;V201M;D1270N‡ | T465I   |
| A566D          | G194V           | K951E         | R74W               | T501A   |
| A872E          | G213E           | K1060T        | R74W;D1270N‡       | T582S   |
| A1006E         | G213E;R668C‡    | L15P          | R74W;R1070W;D1270  | T908N   |
| A1025D         | G213V           | L15P;L1253F‡  | N‡                 | T990I   |
| A1067P         | G226R           | L32P          | R74W;S945L‡        | T1036N* |
| A1067T         | G239R           | L88S          | R74W;V201M‡        | T1057R  |
| A1067V         | G253R           | L102R;F1016S‡ | R74W;V201M;D1270N‡ | T1086A  |
| A1081V         | G314E           | L137P         | R74W;V201M;L997F‡  | T1086I  |
| A1087P         | G314R           | L159S         | R75L               | T1246I  |
| A1319E         | G424S           | L165S         | R75Q;L1065P‡       | T1299I  |
| A1374D         | G437D           | L167R         | R75Q;N1088D‡       | T1299K  |
| A1466S         | G461R           | L206W*†       | R75Q;S549N‡        | V11I    |
| C225R          | G461V           | L210P         | R117C†             | V93D    |
| C491R          | G463V           | L293P         | R117C;G576A;R668C‡ | V201M   |
| C590Y          | G480C           | L327P         | R117G              | V232A   |
| C866Y          | G480D           | L333F         | R117H*             | V232D   |
|                | G480S           | L333H         | R117L              | V317A   |
|                | G500D           | L346P         | R117L;L997F‡       | V322M   |

|                    |                    |               |          |         |
|--------------------|--------------------|---------------|----------|---------|
| c.1367_1369dupTTG  | G545R              | L441P         | R117P    | V392G   |
| D58H               | G551A              | L453S         | R248K    | V456A   |
| D58V               | G551D*             | L467F         | R258G    | V456F   |
| D110E              | G551R              | L558F         | R297Q    | V520I   |
| D110H              | G551S              | L619S         | R334L    | V562I;A |
| D110N              | G576A;R668C‡       | L633P         | R334Q    | 1006E‡  |
| D192G              | G576A;S1359Y‡      | L636P         | R334W    | V562L   |
| D192N              | G622D              | L927P         | R347H*   | V591A   |
| D373N              | G622V              | L967F;L1096R‡ | R347L    | V603F   |
| D426N              | G628A              | L973F         | R347P    | V920L   |
| D443Y              | G628R              | L1011S        | R352Q    | V920M   |
| D443Y;G576A;R668C‡ | G85E*†             | L1065R        | R352W    | V1008D  |
| D529G              | G930E              | L1077P*†      | R516S    | V1010D  |
| D565G              | G970D              | L1227S        | R553Q    | V1153E  |
| D567N              | G970S              | L1324P        | R555G    | V1240G  |
| D579G              | G970V              | L1335P        | R600S    | V1293G  |
| D614G              | G1047D             | L1388P        | R709Q    | V1293I  |
| D651H              | G1047R             | L1480P        | R751L    | V1415F  |
| D651N              | G1061R             | M150K         | R792G    | W202C   |
| D806G              | G1069R             | M150R         | R792Q    | W361R   |
| D924N              | G1123R             | M152L         | R810G    | W496R   |
| D979A              | G1173S             | M152V         | R851L    | W1098C  |
| D979V              | G1237V             | M265R         | R933G    | W1282G  |
| D985H              | G1244E             | M348K         | R1048G   | W1282R  |
| D985Y              | G1244R             | M394L         | R1066C   | Y89C    |
| D993A              | G1247R             | M469V         | R1066G   | Y109H   |
| D993G              | G1249E             | M498I         | R1066H*† | Y109N   |
| D993Y              | G1249R             | M952I         | R1070P   | Y122C   |
| D1152A             | G1265V             | M952T         | R1070Q   | Y161C   |
| D1152H*†           | G1298V             | M961L         | R1070W   | Y161D   |
| D1270N*            | G1349D             | M1101K*†      | R1162Q   | Y161S   |
| D1270Y             | G149R;G576A;R668C‡ | M1137R        | R1239S   | Y301C   |
| D1312G             | H139L              | M1137V        | R1283G   | Y563N   |
| D1377H             | H139R              | M1210K        | R1283M   | Y913S   |
| D1445N             | H146R              | N186K         | R1283S   | Y919C   |
| E56K               | H199Q              | N187K         | R1438W   | Y1014C  |
| E60K               | H199Y              | N396Y         | S13F     | Y1032C  |
| E92K               | H609L              | N418S         | S13P     | Y1032N  |
| E116K              | H620P              |               | S18I     | Y1073C  |
| E116Q              |                    |               | S18N     | Y1092H  |
| E193K              |                    |               |          | Y1381H  |

Certains patients sont porteurs de deux mutations autres que *F508del* rares non répertoriées dans le tableau 6. Sous réserve qu'ils ne soient pas porteurs de deux mutations de classe I (non-sens : mutations connues pour ne pas produire de protéine CFTR ; voir rubrique 4.1), il est possible qu'ils répondent au traitement. Chez ces patients, le traitement par l'IVA en association avec IVA/TEZ/ELX peut être envisagé sous surveillance médicale étroite si le médecin considère que les bénéfices attendus prédominent sur les risques potentiels.

Chez chaque patient, le diagnostic de mucoviscidose doit être établi en accord avec les recommandations diagnostiques et suivant l'appréciation clinique car il existe une très grande variabilité du phénotype chez les patients de même génotype.

\* Mutations pour lesquelles la réponse est étayée par les données cliniques.

† Mutations pour lesquelles la réponse est étayée par les données en vie réelle chez  $\geq 5$  patients.

‡ Mutations complexes ou composites où un seul allèle du gène *CFTR* porte plusieurs mutations ; celles-ci sont observées indépendamment de la présence de mutations sur l'autre allèle.

Les mutations non annotées sont incluses compte tenu des résultats observés *in vitro* sur cellules FRT, montrant une réponse positive évocatrice d'une possible réponse clinique.

## Effets pharmacodynamiques

### *Ivacaftor en monothérapie*

Dans les études 770-102 et 770-103 conduites chez des patients porteurs de la mutation *G551D* sur un allèle du gène *CFTR*, l'ivacaftor a entraîné des diminutions du taux de chlorures dans la sueur qui étaient rapides (15 jours), importantes (la variation moyenne du taux de chlorures dans la sueur entre la valeur à 24 semaines et la valeur initiale était respectivement de -48 mmol/L [IC à 95 % : -51 ; -45] et de -54 mmol/L [IC à 95 % : -62 ; -47]) et prolongées (jusqu'à 48 semaines).

Dans l'étude 770-111, partie 1 menée chez des patients porteurs d'une mutation de défaut de régulation du gène *CFTR* autre que *G551D*, le traitement par l'ivacaftor a entraîné une variation moyenne rapide (15 jours) et importante du taux de chlorures dans la sueur par rapport à la valeur initiale (IC à 95 % : -57, -41) jusqu'à la semaine 8 de traitement. Cependant, chez les patients porteurs de la mutation *CFTR-G970R*, la variation absolue moyenne du taux de chlorures dans la sueur à la semaine 8 était de -6,25 mmol/L (écart-type :  $\pm 6,55$ ). Des résultats comparables à ceux de la partie 1 ont été observés dans la partie 2 de l'étude. Lors de la visite de suivi de la semaine 4 (4 semaines après la fin du traitement par l'ivacaftor), les valeurs moyennes du taux de chlorures dans la sueur de chaque groupe tendaient à revenir aux valeurs initiales avant traitement.

Dans l'étude 770-110 menée chez des patients atteints de mucoviscidose âgés de 6 ans et plus porteurs de la mutation *R117H* du gène *CFTR*, la différence entre les variations moyennes du taux de chlorures dans la sueur jusqu'à la semaine 24 de traitement par rapport à la valeur initiale dans chacun des groupes de traitement était de -24 mmol/L (IC à 95 % : -28 ; -20). Dans les analyses en sous-groupes en fonction de l'âge, la différence entre les traitements était de -21,87 mmol/L (IC à 95 % : -26,46 ; -17,28) chez les patients âgés de 18 ans et plus et de -27,63 mmol/L (IC à 95 % : -37,16 ; -18,10) chez les patients âgés de 6 à 11 ans. Deux patients âgés de 12 à 17 ans ont été inclus dans cette étude.

Dans l'étude 770-108 menée chez des patients âgés de 2 ans à moins de 6 ans porteurs d'une mutation de défaut de régulation sur au moins un allèle du gène *CFTR* recevant 50 mg ou 75 mg d'ivacaftor deux fois par jour, la variation absolue moyenne du taux de chlorures dans la sueur à la semaine 24 par rapport à la valeur initiale était de -47 mmol/L (IC à 95 % : -58 ; -36).

Dans l'étude 770-124 menée chez des patients atteints de mucoviscidose âgés d'1 mois à moins de 24 mois, la variation absolue moyenne du taux de chlorures dans la sueur à la semaine 24 par rapport à la valeur initiale était de -62,0 mmol/L (IC à 95 % : -71,6 ; -52,4). Les résultats étaient concordants dans les cohortes de patients âgés de 12 mois à moins de 24 mois, de 6 mois à moins de 12 mois et de 4 mois à moins de 6 mois.

### *Ivacaftor en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor*

Dans l'étude 445-111 menée chez des patients âgés de 2 ans à moins de 6 ans homozygotes pour la mutation *F508del* ou hétérozygotes pour la mutation *F508del* et porteurs d'une mutation à fonction minimale, la variation absolue moyenne du taux de chlorures de l'inclusion jusqu'à la semaine 24 était de -57,9 mmol/L (IC à 95 % : -61,3 ; -54,6).

Dans l'étude 445-124 (ayant inclus des patients âgés de 6 ans et plus porteurs d'une mutation du gène *CFTR* répondant à l'ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor autre que *F508del* éligible, la variation absolue moyenne du taux de chlorures jusqu'à la semaine 24 par rapport au groupe placebo était de -28,3 mmol/L (IC à 95 % : -32,1 ; -24,5 ;  $p < 0,0001$ ).

## Efficacité et sécurité cliniques

### *Ivacaftor en monothérapie*

#### Études 770-102 et 770-103 : études chez des patients atteints de mucoviscidose porteurs de la mutation de défaut de régulation G551D

L'efficacité de l'ivacaftor a été évaluée dans deux études de phase III, multicentriques, randomisées, en double insu, contrôlées contre placebo chez des patients atteints de mucoviscidose et porteurs de la mutation *G551D* sur au moins un allèle du gène *CFTR*, ayant un VEMS  $\geq 40$  % de la valeur théorique et stables cliniquement.

Les patients des deux études ont été randomisés dans les proportions 1/1 afin de recevoir 150 mg d'ivacaftor ou le placebo toutes les 12 heures avec des repas riches en graisses pendant 48 semaines, en plus de leur traitement prescrit pour la mucoviscidose (par exemple, tobramycine, dornase alfa). L'utilisation d'une solution de chlorure de sodium hypertonique inhalée n'était pas autorisée.

L'étude 770-102 a évalué 161 patients âgés de 12 ans et plus ; 122 (75,8 %) patients étaient porteurs de la mutation *F508del* sur le deuxième allèle. La consommation de médicaments en début d'étude était plus fréquente dans le groupe placebo que dans le groupe traité par l'ivacaftor. Ces médicaments comprenaient la dornase alfa (73,1 % contre 65,1 %), le salbutamol (53,8 % contre 42,2 %), la tobramycine (44,9 % contre 33,7 %) et l'association salmétérol/fluticasone (41,0 % contre 27,7 %). Le VEMS moyen initial était égal à 63,6 % (de 31,6 % à 98,2 %) de la valeur théorique et l'âge moyen était de 26 ans (de 12 à 53 ans).

L'étude 770-103 a évalué 52 patients âgés de 6 à 11 ans lors de la phase de sélection ; le poids corporel moyen (ET) était de 30,9 (8,63) kg ; 42 (80,8 %) patients étaient porteurs de la mutation *F508del* sur le deuxième allèle. Le VEMS moyen initial était de 84,2 % (de 44,0 % à 133,8 %) de la valeur théorique et l'âge moyen était de 9 ans (de 6 à 12 ans) ; 8 (30,8 %) patients du groupe placebo et 4 (15,4 %) patients du groupe ivacaftor présentaient un VEMS initial inférieur à 70 % de la valeur théorique.

Le critère d'évaluation principal de l'efficacité dans les deux études était la variation absolue moyenne du VEMS exprimé en pourcentage de la valeur théorique après 24 semaines de traitement par rapport à sa valeur initiale.

La différence entre ivacaftor et placebo de variation absolue moyenne (IC à 95 %) du VEMS exprimé en pourcentage de la valeur théorique entre la semaine 24 et la valeur initiale était de 10,6 % (8,6 ; 12,6) dans l'étude 770-102 et de 12,5 % (6,6 ; 18,3) dans l'étude 770-103. La différence entre ivacaftor et placebo de variation relative moyenne (IC à 95 %) du VEMS exprimé en pourcentage de la valeur théorique entre la semaine 24 et la valeur initiale était de 17,1 % (13,9 ; 20,2) dans l'étude 770-102 et de 15,8 % (8,4 ; 23,2) dans l'étude 770-103. La variation moyenne du VEMS (L) entre la semaine 24 et la valeur initiale était de 0,37 litre pour le groupe ivacaftor et de 0,01 litre pour le groupe placebo dans l'étude 770-102 ; elle était de 0,30 litre pour le groupe ivacaftor et de 0,07 litre pour le groupe placebo dans l'étude 770-103. Dans les deux études, l'amélioration du VEMS était obtenue rapidement (jour 15) et persistait tout au long des 48 semaines.

La différence entre ivacaftor et placebo de la variation absolue moyenne (IC à 95 %) du VEMS en pourcentage de la valeur théorique entre la semaine 24 et la valeur initiale chez les patients âgés de 12 à 17 ans dans l'étude 770-102 était de 11,9 % (5,9 ; 17,9). La différence entre ivacaftor et placebo de la variation absolue moyenne (IC à 95 %) du VEMS en pourcentage de la valeur théorique entre la semaine 24 et la valeur initiale chez les patients dont le VEMS initial était supérieur à 90 % de la valeur théorique dans l'étude 770-103 était de 6,9 % (-3,8 ; 17,6).

Le tableau 7 présente les résultats concernant les critères d'évaluation secondaires pertinents d'un point de vue clinique.

**Tableau 7 : Effet de l'ivacaftor sur les autres critères d'évaluation de l'efficacité dans les études 770-102 et 770-103**

| Critère d'évaluation                                                                                                                      | Étude 770-102                                                |                    | Étude 770-103                                                |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                           | Différence entre les traitements <sup>a</sup><br>(IC à 95 %) | valeur de <i>p</i> | Différence entre les traitements <sup>a</sup><br>(IC à 95 %) | valeur de <i>p</i> |
| <b>Variation absolue moyenne du score du domaine respiratoire CFQ-R<sup>b</sup> (points) par rapport à sa valeur initiale<sup>c</sup></b> |                                                              |                    |                                                              |                    |
| Jusqu'à la semaine 24                                                                                                                     | 8,1<br>(4,7 ; 11,4)                                          | < 0,0001           | 6,1<br>(-1,4 ; 13,5)                                         | 0,1092             |
| Jusqu'à la semaine 48                                                                                                                     | 8,6<br>(5,3 ; 11,9)                                          | < 0,0001           | 5,1<br>(-1,6 ; 11,8)                                         | 0,1354             |
| <b>Risque relatif d'exacerbation pulmonaire</b>                                                                                           |                                                              |                    |                                                              |                    |
| Jusqu'à la semaine 24                                                                                                                     | 0,40 <sup>d</sup>                                            | 0,0016             | NA                                                           | NA                 |
| Jusqu'à la semaine 48                                                                                                                     | 0,46 <sup>d</sup>                                            | 0,0012             | NA                                                           | NA                 |
| <b>Variation absolue moyenne du poids corporel (kg) par rapport à sa valeur initiale</b>                                                  |                                                              |                    |                                                              |                    |
| À la semaine 24                                                                                                                           | 2,8<br>(1,8 ; 3,7)                                           | < 0,0001           | 1,9<br>(0,9 ; 2,9)                                           | 0,0004             |
| À la semaine 48                                                                                                                           | 2,7<br>(1,3 ; 4,1)                                           | 0,0001             | 2,8<br>(1,3 ; 4,2)                                           | 0,0002             |
| <b>Variation absolue moyenne de l'IMC (kg/m<sup>2</sup>) par rapport à sa valeur initiale</b>                                             |                                                              |                    |                                                              |                    |
| À la semaine 24                                                                                                                           | 0,94<br>(0,62 ; 1,26)                                        | < 0,0001           | 0,81<br>(0,34 ; 1,28)                                        | 0,0008             |
| À la semaine 48                                                                                                                           | 0,93<br>(0,48 ; 1,38)                                        | < 0,0001           | 1,09<br>(0,51 ; 1,67)                                        | 0,0003             |
| <b>Variation moyenne des scores z par rapport à leur valeur initiale</b>                                                                  |                                                              |                    |                                                              |                    |
| Score z du poids pour l'âge à la semaine 48                                                                                               | 0,33<br>(0,04 ; 0,62)                                        | 0,0260             | 0,39<br>(0,24 ; 0,53)                                        | < 0,0001           |
| Score z de l'IMC pour l'âge à la semaine 48 <sup>e</sup>                                                                                  | 0,33<br>(0,002 ; 0,65)                                       | 0,0490             | 0,45<br>(0,26 ; 0,65)                                        | < 0,0001           |

IC : intervalle de confiance ; NA : non analysé en raison de la faible incidence des événements.

<sup>a</sup> Différence entre les traitements = effet de l'ivacaftor - effet du placebo.

<sup>b</sup> CFQ-R : questionnaire révisé spécifique de la mucoviscidose, mesure de la qualité de vie relative à la santé pour la mucoviscidose.

<sup>c</sup> Les données des versions du CFQ-R pour adultes/adolescents et du CFQ-R pour enfants de 12-13 ans dans l'étude 770-102 ont été regroupées ; les données de l'étude 770-103 ont été obtenues à partir du CFQ-R pour enfants de 6 à 11 ans.

<sup>d</sup> Rapport des risques instantanés (*hazard ratio*) pour le délai d'apparition de la première exacerbation pulmonaire.

<sup>e</sup> Chez les patients de moins de 20 ans (courbes de croissance des CDC américains).

#### Étude 770-111 : étude chez des patients atteints de mucoviscidose porteurs de mutations de défaut de régulation autres que G551D

L'étude 770-111 était une étude de phase III croisée en deux parties, randomisée en double aveugle, contrôlée contre placebo (partie 1), suivie d'une phase d'extension en ouvert de 16 semaines (partie 2), visant à évaluer l'efficacité et la sécurité de l'ivacaftor chez des patients atteints de mucoviscidose âgés de 6 ans et plus porteurs d'une mutation G970R ou d'une mutation de défaut de régulation du gène *CFTR* autre que G551D (G178R, S549N, S549R, G551S, G1244E, S1251N, S1255P ou G1349D).

Dans la partie 1, les patients ont été randomisés (1:1) pour recevoir toutes les 12 heures pendant 8 semaines 150 mg d'ivacaftor ou le placebo avec un repas riche en graisses, en plus de leurs traitements prescrits pour la mucoviscidose puis ont permuté après une période d'arrêt de traitement de 4 à 8 semaines pour recevoir l'autre traitement pendant une deuxième période de 8 semaines. Les nébulisations de solution saline hypertonique n'étaient pas autorisées. Dans la partie 2, l'ivacaftor était

administré aux patients selon les mêmes modalités que dans la partie 1 pendant 16 semaines supplémentaires. La durée du traitement continu par l'ivacaftor était de 24 semaines chez les patients randomisés à la séquence de traitement placebo/ivacaftor dans la partie 1 et de 16 semaines chez les patients randomisés à la séquence de traitement ivacaftor/placebo dans la partie 1.

Trente-neuf patients (âge moyen 23 ans) ayant un VEMS  $\geq 40$  % de la valeur théorique lors de l'inclusion (VEMS moyen : 78 % de la valeur théorique [allant de 43 % à 119 %]) ont été inclus dans l'étude ; 62 % des patients (24/39) étaient porteurs de la mutation *CFTR-F508del* sur le second allèle. Au total, 36 patients ont poursuivi l'étude dans la partie 2 (18 par séquence de traitement).

Dans la partie 1 de l'étude 770-111, la valeur moyenne initiale du VEMS exprimé en pourcentage de la valeur théorique était de 79,3 % dans le groupe de patients recevant le placebo, tandis qu'elle était de 76,4 % dans le groupe de patients traités par l'ivacaftor. La valeur globale moyenne après le début du traitement était respectivement de 76,0 % et 83,7 %. La variation absolue moyenne du VEMS à la semaine 8 par rapport à la valeur initiale (critère d'évaluation principal) était de 7,5 % pendant la période de traitement par l'ivacaftor et de -3,2 % pendant la période de traitement par le placebo. La différence entre traitements observée entre l'ivacaftor et le placebo était de 10,7 % (IC 95 % : 7,3 ; 14,1) ( $p < 0,0001$ ).

L'effet de l'ivacaftor dans la population totale de l'étude 770-111 (incluant les critères secondaires de variation absolue de l'IMC à la semaine 8 de traitement et la variation absolue du score du domaine respiratoire du questionnaire CFQ-R jusqu'à la semaine 8 de traitement) et en fonction de chaque mutation (variation absolue du taux de chlorures dans la sueur et du VEMS en pourcentage de la valeur théorique à la semaine 8) est présenté dans le tableau 8. Au vu des réponses cliniques (VEMS exprimé en pourcentage de la valeur théorique) et pharmacodynamiques (taux de chlorures dans la sueur), l'efficacité à l'ivacaftor n'a pas pu être établie chez les patients porteurs de la mutation *G970R*.

**Tableau 8 : Effet de l'ivacaftor sur les variables d'efficacité dans la population totale et dans les sous-groupes de mutations spécifiques du gène *CFTR***

| Variation absolue du VEMS exprimé en pourcentage de la valeur théorique                                                                                                                                                                       | IMC (kg/m <sup>2</sup> )                                      | Score du domaine respiratoire du questionnaire CFQ-R (points)       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Jusqu'à la semaine 8                                                                                                                                                                                                                          | À la semaine 8                                                | Jusqu'à la semaine 8                                                |
| Tous les patients (N = 39)<br>Résultats présentés sous forme de variation moyenne (IC à 95 %) par rapport à la valeur initiale chez les patients traités par l'ivacaftor <i>versus</i> placebo :                                              |                                                               |                                                                     |
| 10,7 (7,3 ; 14,1)                                                                                                                                                                                                                             | 0,66 (0,34 ; 0,99)                                            | 9,6 (4,5 ; 14,7)                                                    |
| <b>Groupes de patients en fonction du type de mutation (n)</b><br>Résultats présentés sous forme de moyenne (minimum, maximum) pour la variation à la semaine 8 par rapport à la valeur initiale chez les patients traités par l'ivacaftor* : |                                                               |                                                                     |
| Mutation (n)                                                                                                                                                                                                                                  | Variation absolue du taux de chlorures dans la sueur (mmol/L) | Variation absolue du VEMS en pourcentage de la valeur théorique (%) |
|                                                                                                                                                                                                                                               | À la semaine 8                                                | À la semaine 8                                                      |
| <i>G1244E</i> (5)                                                                                                                                                                                                                             | -55 (-75 ; -34)                                               | 8 (-1 ; 18)                                                         |
| <i>G1349D</i> (2)                                                                                                                                                                                                                             | -80 (-82 ; -79)                                               | 20 (3 ; 36)                                                         |
| <i>G178R</i> (5)                                                                                                                                                                                                                              | -53 (-65 ; -35)                                               | 8 (-1 ; 18)                                                         |
| <i>G551S</i> (2)                                                                                                                                                                                                                              | -68†                                                          | 3†                                                                  |
| <i>G970R</i> <sup>#</sup> (4)                                                                                                                                                                                                                 | -6 (-16 ; -2)                                                 | 3 (-1 ; 5)                                                          |
| <i>S1251N</i> (8)                                                                                                                                                                                                                             | -54 (-84 ; -7)                                                | 9 (-20 ; 21)                                                        |
| <i>S1255P</i> (2)                                                                                                                                                                                                                             | -78 (-82 ; -74)                                               | 3 (-1 ; 8)                                                          |
| <i>S549N</i> (6)                                                                                                                                                                                                                              | -74 (-93 ; -53)                                               | 11 (-2 ; 20)                                                        |
| <i>S549R</i> (4)                                                                                                                                                                                                                              | -61†† (-71 ; -54)                                             | 5 (-3 ; 13)                                                         |

\* Il n'a pas été effectué de tests statistiques en raison du faible effectif pour chaque mutation.

† Résultats chez le patient porteur de la mutation *G551S* ayant des données au temps d'évaluation de la semaine 8.

†† n = 3 pour l'analyse de la variation absolue du taux de chlorures dans la sueur.

# Provoque une anomalie d'épissage ayant pour conséquence une quantité faible ou l'absence de protéines CFTR à la surface cellulaire.

Dans la partie 2 de l'étude 770-111, la variation absolue moyenne du VEMS exprimé en pourcentage de la valeur théorique après 16 semaines de traitement continu par l'ivacaftor (patients randomisés à la séquence de traitement ivacaftor/placebo dans la partie 1) était de 10,4 % (écart-type :  $\pm 13,2$  %). Lors de la visite de suivi de la partie 2, 4 semaines après la fin du traitement par l'ivacaftor, la variation absolue moyenne par rapport à la semaine 16 du VEMS exprimé en pourcentage de la valeur théorique était de -5,9 % (écart-type :  $\pm 9,4$  %). Chez les patients randomisés à la séquence de traitement placebo/ivacaftor dans la partie 1, une variation moyenne du VEMS (exprimé en pourcentage de la valeur théorique) de 3,3 % (écart-type :  $\pm 9,3$  %) était observée après les 16 semaines supplémentaires de traitement par l'ivacaftor. Lors de la visite de suivi de la partie 2, 4 semaines après la fin du traitement par l'ivacaftor, la variation moyenne par rapport à la semaine 16 du VEMS (exprimé en pourcentage de la valeur théorique) était de -7,4 % (écart-type :  $\pm 5,5$  %).

#### Étude 770-104 : étude chez des patients atteints de mucoviscidose et porteurs de la mutation CFTR-F508del

L'étude 770-104 (partie A) était une étude de phase II de 16 semaines, randomisée dans les proportions de 4:1, conduite en double aveugle, contrôlée contre placebo, en groupes parallèles, de l'ivacaftor (150 mg toutes les 12 heures) chez 140 patients atteints de mucoviscidose, âgés de 12 ans et plus, homozygotes pour la mutation F508del du gène CFTR et ayant un VEMS  $\geq 40$  % de la valeur théorique.

La variation absolue moyenne du VEMS exprimé en pourcentage de la valeur théorique entre la semaine 16 et la valeur initiale (critère d'évaluation principal de l'efficacité) était de 1,5 % dans le groupe ivacaftor et de -0,2 % dans le groupe placebo. La différence estimée entre le traitement par l'ivacaftor et le placebo était de 1,7 % (IC à 95 % : -0,6 ; 4,1) ; cette différence n'était pas statistiquement significative ( $p = 0,15$ ).

#### Étude 770-105 : étude d'extension en ouvert

Dans l'étude 770-105, les patients qui avaient terminé le traitement par le placebo dans les études 770-102 et 770-103 ont permuté pour recevoir l'ivacaftor, tandis que les patients qui avaient été traités par l'ivacaftor ont continué à recevoir l'ivacaftor pendant au moins 96 semaines ; la durée de traitement par l'ivacaftor était donc d'au moins 96 semaines chez les patients du groupe placebo/ivacaftor et d'au moins 144 semaines chez les patients du groupe ivacaftor/ivacaftor.

Cent quarante-quatre (144) patients de l'étude 770-102 ont été inclus dans l'étude 770-105 : 67 patients dans le groupe placebo/ivacaftor et 77 dans le groupe ivacaftor/ivacaftor. Quarante-huit (48) patients de l'étude 770-103 sont entrés dans l'étude 770-105 : 22 patients dans le groupe placebo/ivacaftor et 26 dans le groupe ivacaftor/ivacaftor.

Le tableau 9 présente les résultats en termes de variation absolue moyenne (ET) du VEMS exprimé en pourcentage de la valeur théorique dans les deux groupes de patients. Pour les patients du groupe placebo/ivacaftor, la valeur initiale du VEMS exprimé en pourcentage de la valeur théorique est celle de l'étude 770-105, tandis que pour les patients du groupe ivacaftor/ivacaftor, la valeur initiale est celle des études 770-102 et 770-103.

**Tableau 9 : Effet de l'ivacaftor sur le VEMS exprimé en pourcentage de la valeur théorique dans l'étude 770-105**

| Étude initiale et groupe de traitement | Durée du traitement par l'ivacaftor (semaines) | Variation absolue du VEMS exprimé en pourcentage de la valeur théorique par rapport à la valeur initiale (%) |                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                        |                                                | N                                                                                                            | Moyenne (ET)             |
| Étude 770-102                          |                                                |                                                                                                              |                          |
| Ivacaftor                              | 48*                                            | 77                                                                                                           | 9,4 (8,3)                |
|                                        | 144                                            | 72                                                                                                           | 9,4 (10,8)               |
| Placebo                                | 0*                                             | 67                                                                                                           | -1,2 (7,8) <sup>†</sup>  |
|                                        | 96                                             | 55                                                                                                           | 9,5 (11,2)               |
| Étude 770-103                          |                                                |                                                                                                              |                          |
| Ivacaftor                              | 48*                                            | 26                                                                                                           | 10,2 (15,7)              |
|                                        | 144                                            | 25                                                                                                           | 10,3 (12,4)              |
| Placebo                                | 0*                                             | 22                                                                                                           | -0,6 (10,1) <sup>†</sup> |
|                                        | 96                                             | 21                                                                                                           | 10,5 (11,5)              |

\* Traitement pendant l'étude de phase III de 48 semaines randomisée en *insu*.

<sup>†</sup> Variation par rapport à la valeur initiale de l'étude antérieure après 48 semaines de traitement par le placebo.

Lorsque la variation absolue moyenne du VEMS exprimé en pourcentage de la valeur théorique est comparée à la valeur initiale de l'étude 770-105 pour les patients du groupe ivacaftor/ivacaftor (n = 72) qui avaient participé à l'étude 770-102, cette variation était de 0,0 % (écart-type : 9,05), tandis que pour les patients du groupe ivacaftor/placebo (n = 25) qui avaient participé à l'étude 770-103, elle était de 0,6 % (écart-type : 9,1). Ces résultats montrent que chez les patients du groupe ivacaftor/ivacaftor, l'amélioration du VEMS en pourcentage de la valeur théorique observée à la semaine 48 de l'étude initiale (jour 0 à jour 48) a été maintenue jusqu'à la semaine 144. Il n'a pas été constaté d'améliorations supplémentaires dans l'étude 770-105 (semaine 48 à semaine 144).

Chez les patients du groupe placebo/ivacaftor de l'étude 770-102, le taux annualisé d'exacerbations pulmonaires a été plus élevé dans l'étude initiale lorsque les patients recevaient le placebo (1,34 événement/an) que pendant l'étude 770-105 qui l'a suivie quand les patients ont permuté pour recevoir l'ivacaftor (0,48 événement/an du jour 1 à la semaine 48 et 0,67 événement/an de la semaine 48 à la semaine 96). Chez les patients du groupe ivacaftor /ivacaftor de l'étude 770-102, le taux annualisé d'exacerbations pulmonaires était de 0,57 événement/an du jour 1 à la semaine 48 lorsqu'ils recevaient l'ivacaftor. Après la transition dans l'étude 770-105, le taux annualisé d'exacerbations pulmonaires a été de 0,91 événement/an du jour 1 à la semaine 48 et de 0,77 événement/an de la semaine 48 à la semaine 96.

Chez les patients qui avaient participé à l'étude 770-103, le nombre d'événements a été globalement faible.

#### Étude 770-110 : étude conduite chez des patients atteints de mucoviscidose porteurs d'une mutation R117H du gène CFTR

L'étude 770-110 a évalué 69 patients âgés de 6 ans et plus parmi lesquels 53 (76,8 %) étaient porteurs de la mutation *F508del* sur le second allèle. Le variant poly-T de *R117H* confirmé était *5T* chez 38 patients et *7T* chez 16 patients. À l'inclusion, le VEMS moyen était de 73 % de la valeur théorique (de 32,5 % à 105,5 %) et l'âge moyen était de 31 ans (de 6 ans à 68 ans). La variation absolue moyenne du VEMS exprimé en pourcentage de la valeur théorique mesuré sur la période allant jusqu'à la semaine 24 comparativement à la valeur initiale (critère d'évaluation principal de l'efficacité) était de 2,57 % dans le groupe ivacaftor et de 0,46 % dans le groupe placebo. La différence estimée entre le groupe traité par l'ivacaftor et le groupe placebo était de 2,1 % [IC à 95 % : -1,1 ; 5,4].

Une analyse en sous-groupe prédéfinie a été réalisée chez les patients âgés de 18 ans et plus (26 patients recevant le placebo et 24 patients traités par l'ivacaftor). La variation absolue moyenne du

VEMS exprimé en pourcentage de la valeur théorique jusqu'à la semaine 24 était de 4,5 % dans le groupe ivacaftor contre -0,46 % dans le groupe placebo. La différence estimée entre le groupe traité par l'ivacaftor et le groupe placebo était de 5,0 % [IC à 95 % : 1,1 ; 8,8].

Dans une analyse en sous-groupe de patients porteurs d'un variant génétique *R117H-5T* confirmé, la différence de la variation absolue moyenne du VEMS exprimé en pourcentage de la valeur théorique jusqu'à la semaine 24 par rapport à la valeur initiale entre le groupe traité par l'ivacaftor et le groupe recevant le placebo était de 5,3 % [IC à 95 % : 1,3 ; 9,3]. Chez les patients porteurs d'un variant génétique *R117H-7T* confirmé, la différence observée entre le groupe ivacaftor et le groupe placebo était de 0,2 % [IC à 95 % : -8,1 ; 8,5].

Pour les critères d'efficacité secondaires, il n'a pas été observé de différences entre le traitement par l'ivacaftor et le placebo pour la variation absolue de l'indice de masse corporel (IMC) à la semaine 24 de traitement par rapport à la valeur initiale ou pour le délai jusqu'à la première exacerbation pulmonaire. Des différences ont été observées pour la variation absolue du score du domaine respiratoire du questionnaire CFQ-R jusqu'à la semaine 24 (la différence entre l'ivacaftor et le placebo était de 8,4 % [IC à 95 % : 2,2 ; 14,6]) et pour la variation moyenne du taux de chlorures dans la sueur par rapport à la valeur initiale (voir Effets pharmacodynamiques).

Étude 770-108 : étude chez des enfants atteints de mucoviscidose âgés de 2 ans à moins de 6 ans porteurs de la mutation G551D ou d'une autre mutation de défaut de régulation

Le profil pharmacocinétique, la sécurité et l'efficacité de l'ivacaftor ont été évalués dans une étude non contrôlée de l'ivacaftor d'une durée de 24 semaines chez 34 patients âgés de 2 ans à moins de 6 ans atteints de mucoviscidose et porteurs de la mutation *G551D*, *G1244E*, *G1349D*, *G178R*, *G551S*, *S1251N*, *S1255P*, *S549N* ou *S549R* du gène *CFTR*. Les patients pesant moins de 14 kg recevaient 50 mg d'ivacaftor et les patients pesant 14 kg et plus recevaient 75 mg d'ivacaftor. L'ivacaftor était administré par voie orale toutes les 12 heures avec un repas riche en graisses, en plus des traitements prescrits pour la mucoviscidose.

Les patients de l'étude 770-108 étaient âgés de 2 ans à moins de 6 ans (âge moyen : 3 ans). Sur les 34 patients inclus, 26 (76,5 %) présentaient le génotype *G551D-F508del* de *CFTR*, deux patients seulement étant porteurs d'une mutation autre que *G551D* (*S549N*). Le taux moyen de chlorures dans la sueur lors de l'inclusion (n = 25) était de 97,88 mmol/L (écart-type : ± 14,00). Le taux moyen d'élastase-1 fécale lors de l'inclusion (n = 27) était de 28 µg/g (écart-type : ± 95).

Le critère principal de cette étude était l'évaluation de la sécurité jusqu'à la semaine 24 (voir rubrique 4.8). Les critères d'efficacité secondaires et exploratoires étaient la variation absolue du taux de chlorures dans la sueur par rapport à la valeur initiale jusqu'à la semaine 24 de traitement, la variation absolue du poids par rapport aux valeurs initiales, de l'indice de masse corporelle (IMC) et de la taille (confirmée par les scores z de poids, d'IMC et de taille) à la semaine 24 de traitement et des mesures de la fonction pancréatique telles que le taux d'élastase-1 fécale. Des données concernant le VEMS en pourcentage de la valeur théorique (critère exploratoire) étaient disponibles pour 3 patients du groupe ivacaftor 50 mg et pour 17 patients du groupe ivacaftor 75 mg.

La moyenne globale de la variation absolue (analyse groupée des deux groupes de patients traités par l'ivacaftor) de l'IMC à la semaine 24 par rapport à la valeur initiale était de 0,32 kg/m<sup>2</sup> (écart-type : ± 0,54) et la moyenne globale de la variation du score z de l'IMC pour l'âge de 0,37 (écart-type : ± 0,42). La moyenne globale de la variation du score z de la taille pour l'âge était de -0,01 (écart-type : ± 0,33). La moyenne globale de la variation du taux d'élastase-1 fécale par rapport à la valeur initiale (n = 27) était de 99,8 µg/g (écart-type : ± 138,4). Six patients qui avaient un taux initial inférieur à 200 µg/g ont obtenu un taux ≥ 200 µg/g à la semaine 24. La moyenne globale de la variation du VEMS exprimé en pourcentage de la valeur théorique à la semaine 24 par rapport à la valeur initiale (critère exploratoire) était de 1,8 (écart-type : 17,81).

### Étude 770-124 : étude chez des enfants atteints de mucoviscidose âgés de moins de 24 mois

Le profil pharmacocinétique et la sécurité de l'ivacaftor chez les patients atteints de mucoviscidose âgés d'1 mois à moins de 24 mois ont été évalués dans une étude en ouvert à un seul bras de 24 semaines (partie B uniquement), dans laquelle 19 patients âgés de 12 mois à moins de 24 mois (âge moyen de 15,2 mois lors de l'inclusion), 11 patients âgés de 6 mois à moins de 12 mois, 6 patients âgés de 4 mois à moins de 6 mois et 7 patients (partie A/B) âgés d'1 mois à moins de 4 mois ont été traités par l'ivacaftor à une posologie déterminée en fonction de leur âge et de leur poids. L'âge moyen à l'inclusion dans les cohortes était respectivement de 15,2 mois, 9,0 mois, 4,5 mois et 1,9 mois.

Le critère d'évaluation principal dans la partie B et la partie A/B était la sécurité jusqu'à la semaine 24 (voir rubrique 4.8). La pharmacocinétique et la variation absolue du taux de chlorures dans la sueur par rapport à la valeur initiale jusqu'à la semaine 24 (voir Effets pharmacodynamiques) étaient des critères secondaires. Les critères tertiaires incluaient des mesures d'efficacité telles que le taux d'élastase-1 fécale et les paramètres de croissance.

Le tableau 10 présente les scores z moyens (écart-type) du poids pour l'âge, de la taille pour l'âge et du poids pour la taille chez les patients âgés d'1 mois à moins de 24 mois pour lesquels des valeurs à l'inclusion et à la semaine 24 étaient disponibles.

**Tableau 10 : Effet de l'ivacaftor sur les paramètres de croissance chez les patients âgés d'1 mois à moins de 24 mois pour lesquels des valeurs à l'inclusion et à la semaine 24 étaient disponibles**

| Paramètre                       | Nombre de patients | Inclusion       |                        | Variation absolue à la semaine 24 |                       |
|---------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|                                 |                    | Moyenne (ET)    | Médiane (min, max)     | Moyenne (ET)                      | Médiane (min, max)    |
| Score z du poids pour l'âge     | 41                 | 0,00<br>(0,94)  | 0,07<br>[-1,93, 1,79]  | 0,45<br>(0,64)                    | 0,30<br>[-0,54, 2,66] |
| Score z de la taille pour l'âge | 40                 | -0,03<br>(1,11) | -0,03<br>[-1,99, 2,79] | 0,44<br>(0,92)                    | 0,52<br>[-1,81, 3,38] |
| Score z du poids pour la taille | 40                 | 0,07<br>(1,02)  | 0,14<br>[-1,72, 2,16]  | 0,32<br>(0,99)                    | 0,32<br>[-2,04, 2,22] |

Chez les patients âgés d'1 mois à moins de 24 mois, 14 patients parmi les 24 qui présentaient une insuffisance pancréatique lors de l'inclusion (définie comme un taux d'élastase-1 fécale < 200 µg/g), avaient un taux d'élastase-1 fécale supérieur à 200 µg/g à la semaine 24. Dans la population totale de la partie B et de la partie A/B, le taux médian (min, max) d'élastase-1 fécale était de 55,5 µg/g (7,5, 500,0) à l'inclusion. La variation absolue médiane (min, max) entre l'inclusion (n = 40) et la semaine 24 (n = 33) était de 126,0 µg/g (-23,0, 423,5).

#### *Ivacaftor en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor*

L'efficacité et la sécurité de l'ivacaftor en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor comprimés chez les patients âgés de 12 ans et plus ont été démontrées dans trois études de phase III randomisées en double aveugle, contrôlées contre placebo (patients hétérozygotes pour la mutation *F508del* et porteurs d'une mutation à fonction minimale sur le second allèle, n = 403) et contre comparateur actif (patients homozygotes pour la mutation *F508del*, n = 107 ou hétérozygotes pour la mutation *F508del* et porteurs sur le second allèle d'une mutation de défaut de régulation ou d'une mutation associée à une activité résiduelle de la protéine CFTR, n = 258) d'une durée de 24 semaines (étude 445-102), 4 semaines (étude 445-103) et 8 semaines (étude 445-104) respectivement. Les patients de toutes les études étaient éligibles pour entrer dans des études d'extension en ouvert (étude 445-105 ou étude 445-110).

L'efficacité et la sécurité de l'ivacaftor en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor comprimés chez les patients âgés de 6 ans et plus porteurs de mutations du gène *CFTR* répondant à l'ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor autres que *F508del* ont été démontrées dans une étude de phase III

randomisée en double aveugle, contrôlée contre placebo (n = 307) et dans une étude observationnelle rétrospective des résultats cliniques en vie réelle (étude CFD-016 ; n = 422).

Se reporter au Résumé des Caractéristiques du Produit de l'ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor pour des données complémentaires.

### Population pédiatrique

#### *Ivacaftor en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor*

La pharmacocinétique et la sécurité chez les patients âgés de 6 ans à moins de 12 ans (n = 66) et chez les patients âgés de 2 ans à moins de 6 ans (n = 75) porteurs d'au moins une mutation *F508del* ont été évaluées dans deux études en ouvert de 24 semaines (étude 445-106 et étude 445-111). Se reporter au Résumé des Caractéristiques du Produit de l'ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor pour des données supplémentaires.

L'Agence européenne des médicaments a différé l'obligation de soumettre les résultats d'études réalisées avec Kalydeco dans un ou plusieurs sous-groupes de la population pédiatrique dans l'indication de mucoviscidose (voir rubrique 4.2 pour les informations concernant l'usage pédiatrique).

## **5.2 Propriétés pharmacocinétiques**

Les paramètres pharmacocinétiques de l'ivacaftor sont similaires entre les volontaires sains adultes et les patients atteints de mucoviscidose.

Après administration orale d'une dose unique de 150 mg à des volontaires sains avec un repas, les ASC et  $C_{max}$  moyennes ( $\pm$  écart-type [ET]) étaient de 10,60 (5,26)  $\mu\text{g}\cdot\text{h/mL}$  et de 0,768 (0,233)  $\mu\text{g/mL}$ , respectivement. Après administration toutes les 12 heures, les concentrations plasmatiques à l'équilibre de l'ivacaftor étaient atteintes aux jours 3 à 5, avec un taux d'accumulation compris entre 2,2 et 2,9.

### Absorption

Après administrations orales répétées d'ivacaftor, l'exposition de l'ivacaftor augmentait généralement avec la posologie, comprise entre 25 mg toutes les 12 heures et 450 mg toutes les 12 heures. Après administration avec un repas riche en graisses, l'exposition systémique de l'ivacaftor était de 2,5 à 4 fois supérieure environ. Après administration concomitante avec le tezacaftor et l'elexacaftor, l'augmentation de l'aire sous la courbe (ASC) était similaire (augmentation d'environ 3 fois et 2,5 à 4 fois respectivement). Par conséquent, l'ivacaftor, en monothérapie ou en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor, doit être administré avec un repas riche en graisses. Le  $t_{max}$  médian (valeurs extrêmes) est de 4,0 (3,0 ; 6,0) heures environ après administration avec un repas.

La biodisponibilité des granulés d'ivacaftor (2 sachets de 75 mg) est comparable à celle du comprimé de 150 mg lorsqu'ils sont administrés avec un repas riche en graisses chez des volontaires sains adultes. Le rapport de la moyenne géométrique des moindres carrés pour les granulés par rapport aux comprimés était de 0,951 [IC à 90 % : 0,839 ; 1,08] pour l' $ASC_{0-\infty}$  et de 0,918 [IC 90% : 0,750 ; 1,12] pour la  $C_{max}$ . L'effet des aliments sur l'absorption de l'ivacaftor est comparable pour les deux formulations comprimés et granulés.

### Distribution

L'ivacaftor est lié aux protéines plasmatiques à 99 % environ, essentiellement à l'alpha-1 glycoprotéine acide et à l'albumine. L'ivacaftor ne se fixe pas sur les hématies humaines. Après administration orale d'ivacaftor 150 mg toutes les 12 heures pendant 7 jours à des volontaires sains avec un repas, le volume apparent de distribution moyen ( $\pm$ ET) était de 353 (122) litres.

## Biotransformation

L'ivacaftor est fortement métabolisé chez l'homme. Les données *in vitro* et *in vivo* indiquent que l'ivacaftor est essentiellement métabolisé par le CYP3A. M1 et M6 sont les deux principaux métabolites de l'ivacaftor chez l'homme. L'activité de M1 correspond à un sixième environ de celle de l'ivacaftor et M1 est considéré comme pharmacologiquement actif. L'activité de M6 correspond à moins d'un cinquantième de celle de l'ivacaftor et M6 n'est pas considéré comme pharmacologiquement actif.

L'effet du génotype hétérozygote CYP3A4\*22 sur l'exposition de l'ivacaftor, du tezacaftor et de l'alexacaftor correspond à l'effet observé lors de l'administration concomitante d'un inhibiteur faible du CYP3A4, celui-ci n'étant pas cliniquement significatif. Aucun ajustement de la dose d'ivacaftor, de tezacaftor ou d'alexacaftor n'est jugé nécessaire. Chez les patients homozygotes pour le génotype CYP3A4\*22, un effet plus important est attendu. Cependant, il n'existe pas de données chez ce type de patients.

## Élimination

Après administration orale chez des volontaires sains, la majorité de l'ivacaftor (87,8 %) a été éliminée dans les fèces sous forme métabolisée. Les principaux métabolites M1 et M6 représentaient 65 % environ de la dose totale éliminée, 22 % sous forme de M1 et 43 % sous forme de M6. L'excrétion urinaire de l'ivacaftor sous forme inchangée était négligeable. La demi-vie terminale apparente était de 12 heures environ après une dose unique prise avec un repas. La clairance apparente (Cl/F) de l'ivacaftor était comparable entre les volontaires sains et les patients atteints de mucoviscidose. Le Cl/F moyen ( $\pm$ ET) était de 17,3 (8,4) L/h pour une dose unique de 150 mg administrée à des volontaires sains.

## Linéarité/non linéarité

La pharmacocinétique de l'ivacaftor est généralement linéaire en fonction du temps ou de la dose pour des doses comprises entre 25 et 250 mg.

## Populations particulières

### *Insuffisance hépatique*

Après une dose unique de 150 mg d'ivacaftor, la  $C_{\max}$  de l'ivacaftor (moyenne : 0,735  $\mu$ g/mL [écart-type : 0,331]) était comparable chez les patients adultes dont la fonction hépatique était modérément altérée (Child-Pugh de classe B, score de 7 à 9), mais l' $ASC_{0-\infty}$  de l'ivacaftor (moyenne de 16,80  $\mu$ g·h/mL [écart-type :  $\pm$  6,14]) était augmentée de deux fois environ par rapport aux volontaires sains appariés pour les données démographiques. Des simulations permettant de prédire l'exposition de l'ivacaftor à l'état d'équilibre ont montré qu'en réduisant la dose de 150 mg toutes les 12 heures à 150 mg une fois par jour, les patients adultes présentant une insuffisance hépatique modérée auraient des valeurs de  $C_{\min}$  à l'équilibre comparables à celles obtenues avec une posologie de 150 mg toutes les 12 heures chez les adultes ayant une fonction hépatique normale.

Chez les patients présentant une insuffisance hépatique modérée (Child-Pugh de classe B, score de 7 à 9), l'ASC de l'ivacaftor était augmentée d'environ 50 % après administrations répétées pendant 10 jours d'ivacaftor, de tezacaftor et d'alexacaftor.

Le retentissement de l'insuffisance hépatique sévère (Child-Pugh de classe C, score de 10 à 15) sur la pharmacocinétique de l'ivacaftor en monothérapie ou en association avec ivacaftor/tezacaftor/alexacaftor n'a pas été étudié. Le niveau d'augmentation de l'exposition systémique chez ces patients n'est pas connu mais une exposition systémique plus importante que celle observée chez les patients ayant une insuffisance hépatique modérée est attendue.

Pour les recommandations sur l'utilisation appropriée et les modifications posologiques, voir le tableau 3 à la rubrique 4.2.

### *Insuffisance rénale*

Aucune étude pharmacocinétique n'a été réalisée avec l'ivacaftor chez des patients insuffisants rénaux. Dans une étude pharmacocinétique chez l'homme, l'élimination urinaire de l'ivacaftor et de ses métabolites était minime (seulement 6,6 % de la radioactivité totale ont été retrouvés dans l'urine). L'excrétion urinaire de l'ivacaftor sous forme inchangée était négligeable (moins de 0,01 % après une dose orale unique de 500 mg).

Aucune adaptation de la posologie n'est recommandée en cas d'insuffisance rénale légère ou modérée. Cependant, la prudence est recommandée lors de l'administration d'ivacaftor à des patients présentant une insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine inférieure ou égale à 30 mL/min) ou en phase terminale (voir rubriques 4.2 et 4.4).

### *Origine ethnique*

Selon une analyse de pharmacocinétique de population, l'origine ethnique n'avait pas d'effet cliniquement significatif sur les paramètres pharmacocinétiques de l'ivacaftor observés chez les patients caucasiens (n = 379) et chez les patients d'autres origines ethniques (n = 29).

### *Influence du sexe*

Les paramètres pharmacocinétiques de l'ivacaftor sont similaires chez les hommes et les femmes.

### *Sujets âgés*

Le nombre de patients âgés de 65 ans et plus inclus dans les études cliniques de l'ivacaftor en monothérapie n'était pas suffisant pour déterminer si les paramètres pharmacocinétiques sont comparables ou non à ceux observés chez les adultes plus jeunes.

### *Population pédiatrique*

L'exposition systémique attendue de l'ivacaftor, déterminée suivant une analyse compartimentale à partir des concentrations observées dans les études de phases II et III, est présentée par tranche d'âge dans le tableau 11.

**Tableau 11 : Exposition moyenne (écart-type) de l'ivacaftor, par tranche d'âge**

| Tranche d'âge                                     | Dose                         | C <sub>min, ss</sub><br>µg/mL | ASC <sub>0-12 h</sub><br>µg·h/mL |
|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 mois à moins de 2 mois<br>(≥ 3 kg)*             | 13,4 mg toutes les 24 heures | 0,300 (0,221) <sup>†</sup>    | 5,84 (2,98) <sup>†</sup>         |
| 2 mois à moins de 4 mois<br>(≥ 3 kg)*             | 13,4 mg toutes les 12 heures | 0,406 (0,266) <sup>†</sup>    | 6,45 (3,43) <sup>†</sup>         |
| 4 mois à moins de 6 mois<br>(≥ 5 kg)              | 25 mg toutes les 12 heures   | 0,371 (0,183)                 | 6,48 (2,52)                      |
| 6 mois à moins de 12 mois<br>(≥ 5 kg à < 7 kg)*   | 25 mg toutes les 12 heures   | 0,336                         | 5,41                             |
| 6 mois à moins de 12 mois<br>(7 kg à < 14 kg)     | 50 mg toutes les 12 heures   | 0,508 (0,252)                 | 9,14 (4,20)                      |
| 12 mois à moins de 24 mois<br>(7 kg à < 14 kg)    | 50 mg toutes les 12 heures   | 0,440 (0,212)                 | 9,05 (3,05)                      |
| 12 mois à moins de 24 mois<br>(≥ 14 kg à < 25 kg) | 75 mg toutes les 12 heures   | 0,451 (0,125)                 | 9,60 (1,80)                      |
| 2 à 5 ans<br>(< 14 kg)                            | 50 mg toutes les 12 heures   | 0,577 (0,317)                 | 10,50 (4,26)                     |

| Tranche d'âge                                  | Dose                        | C <sub>min, ss</sub><br>µg/mL | ASC <sub>0-12 h</sub><br>µg·h/mL |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 2 à 5 ans<br>(≥ 14 kg à < 25 kg)               | 75 mg toutes les 12 heures  | 0,629 (0,296)                 | 11,30 (3,82)                     |
| 6 à 11 ans <sup>†</sup><br>(≥ 14 kg à < 25 kg) | 75 mg toutes les 12 heures  | 0,641 (0,329)                 | 10,76 (4,47)                     |
| 6 à 11 ans <sup>†</sup><br>(≥ 25 kg)           | 150 mg toutes les 12 heures | 0,958 (0,546)                 | 15,30 (7,34)                     |
| 12 à 17 ans                                    | 150 mg toutes les 12 heures | 0,564 (0,242)                 | 9,24 (3,42)                      |
| Adultes (≥ 18 ans)                             | 150 mg toutes les 12 heures | 0,701 (0,317)                 | 10,70 (4,10)                     |

\* Les patients âgés d'1 mois à moins de 6 mois étaient nés à un âge gestationnel ≥ 37 semaines.

† Les expositions chez les patients âgés d'1 mois à moins de 4 mois sont estimées à partir de simulations issues du modèle pharmacocinétique physiologique intégrant les données recueillies dans cette tranche d'âge.

‡ Valeurs basées sur les données d'un seul patient ; écart-type non rapporté.

§ Les expositions chez les patients âgés de 6 à 11 ans sont estimées à partir de simulations issues du modèle de pharmacocinétique de population utilisant les données recueillies dans cette tranche d'âge.

### 5.3 Données de sécurité préclinique

Les données non cliniques issues des études conventionnelles de pharmacologie de sécurité, toxicologie en administration répétée, génotoxicité et cancérogenèse n'ont pas révélé de risque particulier pour l'homme.

#### Gestation et fertilité

L'ivacaftor a été associé à de légères diminutions du poids des vésicules séminales, à une diminution de l'indice global de fertilité et du nombre de gestations chez les femelles accouplées avec des mâles traités et à des réductions significatives du nombre de corps jaunes et des sites d'implantation avec les diminutions en résultant de la taille moyenne des portées et du nombre moyen d'embryons viables par portée chez les femelles traitées. La dose sans effet nocif observé (NOAEL) pour la fertilité entraîne un niveau d'exposition correspondant à environ 4 fois l'exposition systémique de l'ivacaftor et de ses métabolites lorsque l'ivacaftor est administré en monothérapie chez l'humain adulte à la dose maximale préconisée chez l'homme. Un passage transplacentaire de l'ivacaftor a été observé chez des rates et des lapines gravides.

#### Développement péri- et postnatal

L'ivacaftor a entraîné une diminution de la survie et des indices de lactation et une réduction du poids des petits. La NOAEL pour la viabilité et la croissance des petits correspond à un niveau d'exposition environ 3 fois supérieur à l'exposition systémique de l'ivacaftor et de ses métabolites lorsque l'ivacaftor est administré en monothérapie chez l'humain adulte à la dose maximale préconisée.

#### Études chez les animaux juvéniles

Des cataractes ont été observées chez les jeunes rats traités, du jour 7 au jour 35 de la période postnatale, à des niveaux d'exposition de l'ivacaftor correspondant à 0,22 fois ceux observés avec la dose maximale préconisée chez l'homme lorsque l'ivacaftor est administré en monothérapie. Ces anomalies n'ont pas été constatées chez les fœtus de rates traitées par l'ivacaftor du 7<sup>e</sup> au 17<sup>e</sup> jour de la gestation, ni chez les petits exposés à l'ivacaftor par l'intermédiaire du lait ingéré jusqu'au jour 20 de la période postnatale, ni chez des rats âgés de 7 semaines et des chiens âgés de 3,5 à 5 mois traités par l'ivacaftor. La signification éventuelle de ces observations pour l'homme n'est pas connue.

## **6. DONNÉES PHARMACEUTIQUES**

### **6.1 Liste des excipients**

Silice colloïdale anhydre  
Croscarmellose sodique  
Succinate d'acétate d'hypromellose  
Lactose monohydraté  
Stéarate de magnésium  
Mannitol  
Sucralose  
Laurilsulfate de sodium (E487)

### **6.2 Incompatibilités**

Sans objet.

### **6.3 Durée de conservation**

4 ans.

Le médicament mélangé est stable pendant une heure.

### **6.4 Précautions particulières de conservation**

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.

### **6.5 Nature et contenu de l'emballage extérieur**

Sachet en polyéthylène téréphtalate à orientation biaxiale/polyéthylène/aluminium/polyéthylène (BoPET/PE/aluminium/PE).

Kalydeco 13,4 mg granulés en sachets, Kalydeco 25 mg granulés en sachets, Kalydeco 50 mg granulés en sachets et Kalydeco 75 mg granulés en sachets

Boîtes de 56 sachets (contenant 4 pochettes individuelles contenant chacune 14 sachets).

Kalydeco 13,4 mg granulés en sachets, Kalydeco 59,5 mg granulés en sachets et Kalydeco 75 mg granulés en sachets

Boîtes de 28 sachets (contenant 4 pochettes individuelles contenant chacune 7 sachets).

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

### **6.6 Précautions particulières d'élimination et manipulation**

Tout médicament non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

## **7. TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited  
Unit 49, Block 5, Northwood Court, Northwood Crescent,  
Dublin 9, D09 T665,  
Irlande

**8. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

EU/1/12/782/003  
EU/1/12/782/004  
EU/1/12/782/006  
EU/1/12/782/008  
EU/1/12/782/009  
EU/1/12/782/010  
EU/1/12/782/011

**9. DATE DE PREMIÈRE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION**

Date de première autorisation : 23 juillet 2012  
Date du dernier renouvellement : 29 avril 2022

**10. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l'Agence européenne des médicaments <https://www.ema.europa.eu>.

## **ANNEXE II**

- A. FABRICANT(S) RESPONSABLE(S) DE LA LIBÉRATION DES LOTS**
- B. CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DÉLIVRANCE ET D'UTILISATION**
- C. AUTRES CONDITIONS ET OBLIGATIONS DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**
- D. CONDITIONS OU RESTRICTIONS EN VUE D'UNE UTILISATION SÛRE ET EFFICACE DU MÉDICAMENT**

## **A. FABRICANT(S) RESPONSABLE(S) DE LA LIBÉRATION DES LOTS**

Nom et adresse du (des) fabricant(s) responsable(s) de la libération des lots

Almac Pharma Services (Ireland) Limited  
Finnabair Industrial Estate  
Dundalk  
Co. Louth  
A91 P9KD  
Irlande

Almac Pharma Services Limited  
Seagoe Industrial Estate  
Craigavon  
Northern Ireland  
BT63 5UA  
Royaume-Uni

Millmount Healthcare Limited  
Block-7, City North Business Campus  
Stamullen  
Co. Meath  
K32 YD60  
Irlande

Le nom et l'adresse du fabricant responsable de la libération du lot concerné doivent figurer sur la notice du médicament.

## **B. CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DÉLIVRANCE ET D'UTILISATION**

Médicament soumis à prescription médicale restreinte (voir annexe I : Résumé des Caractéristiques du Produit, rubrique 4.2).

## **C. AUTRES CONDITIONS ET OBLIGATIONS DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

- **Rapports périodiques actualisés de sécurité (PSURs)**

Les exigences relatives à la soumission des PSURs pour ce médicament sont définies dans la liste des dates de référence pour l'Union (liste EURD) prévue à l'article 107 quater, paragraphe 7, de la directive 2001/83/CE et ses actualisations publiées sur le portail web européen des médicaments.

## **D. CONDITIONS OU RESTRICTIONS EN VUE D'UNE UTILISATION SÛRE ET EFFICACE DU MÉDICAMENT**

- **Plan de gestion des risques (PGR)**

Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché réalise les activités de pharmacovigilance et interventions requises décrites dans le PGR adopté et présenté dans le Module 1.8.2 de l'autorisation de mise sur le marché, ainsi que toutes actualisations ultérieures adoptées du PGR.

De plus, un PGR actualisé doit être soumis :

- à la demande de l'Agence européenne des médicaments ;
- dès lors que le système de gestion des risques est modifié, notamment en cas de réception de nouvelles informations pouvant entraîner un changement significatif du profil bénéfice/risque, ou lorsqu'une étape importante (pharmacovigilance ou réduction du risque) est franchie.

**ANNEXE III**  
**ÉTIQUETAGE ET NOTICE**

## **A. ÉTIQUETAGE**

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****BOÎTE EXTERNE POUR PLAQUETTE – BOÎTE DE 56 COMPRIMÉS****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT**

Kalydeco 150 mg comprimés pelliculés  
ivacaftor

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)**

Chaque comprimé contient 150 mg d'ivacaftor.

**3. LISTE DES EXCIPIENTS**

Contient du lactose.

Voir la notice pour plus d'informations.

**4. FORME PHARMACEUTIQUE ET CONTENU**

56 comprimés

**5. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

Lire la notice avant utilisation.

Voie orale

Mode d'emploi

À prendre avec un repas riche en graisses.

Ne pas croquer, casser ou dissoudre les comprimés.

**6. MISE EN GARDE SPÉCIALE INDIQUANT QUE LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE CONSERVÉ HORS DE VUE ET DE PORTÉE DES ENFANTS**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**7. AUTRE(S) MISE(S) EN GARDE SPÉCIALE(S), SI NÉCESSAIRE****8. DATE DE PÉREMPTION**

EXP

**9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION****10. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS PROVENANT DE CES MÉDICAMENTS S'IL Y A LIEU****11. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited  
Unit 49, Block 5, Northwood Court, Northwood Crescent,  
Dublin 9, D09 T665,  
Irlande

**12. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

EU/1/12/782/002

**13. NUMÉRO DU LOT**

Lot

**14. CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DÉLIVRANCE****15. INDICATIONS D'UTILISATION****16. INFORMATIONS EN BRAILLE**

Kalydeco 150 mg comprimés

**17. IDENTIFIANT UNIQUE - CODE-BARRES 2D**

code-barres 2D portant l'identifiant unique inclus.

**18. IDENTIFIANT UNIQUE - DONNÉES LISIBLES PAR LES HUMAINS**

PC  
SN  
NN

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES PLAQUETTES OU LES FILMS  
THERMOUSOUDÉS**

**PLAQUETTES – BOÎTE DE 56 COMPRIMÉS**

**1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT**

Kalydeco 150 mg comprimés  
ivacaftor

**2. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Vertex Pharmaceuticals

**3. DATE DE PÉREMPTION**

EXP

**4. NUMÉRO DU LOT**

Lot

**5. AUTRE**

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**

**BOÎTE EXTERNE POUR LES PLAQUETTES DANS UNE POCHETTE EN CARTON –  
BOÎTE DE 28 COMPRIMÉS**

**1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT**

Kalydeco 150 mg comprimés pelliculés  
ivacaftor

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)**

Chaque comprimé contient 150 mg d'ivacaftor.

**3. LISTE DES EXCIPIENTS**

Contient du lactose.

Voir la notice pour plus d'informations.

**4. FORME PHARMACEUTIQUE ET CONTENU**

28 comprimés

**5. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

Lire la notice avant utilisation.

Voie orale

Mode d'emploi

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin.

À prendre avec un repas riche en graisses.

Ne pas croquer, casser ou dissoudre les comprimés.

Insérer la languette ci-dessous pour refermer

Ouvrir

**6. MISE EN GARDE SPÉCIALE INDIQUANT QUE LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE  
CONSERVÉ HORS DE VUE ET DE PORTÉE DES ENFANTS**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**7. AUTRE(S) MISE(S) EN GARDE SPÉCIALE(S), SI NÉCESSAIRE**

**8. DATE DE PÉREPTION**

EXP

**9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

**10. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS PROVENANT DE CES MÉDICAMENTS S'IL Y A LIEU**

**11. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited  
Unit 49, Block 5, Northwood Court, Northwood Crescent,  
Dublin 9, D09 T665,  
Irlande

**12. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

EU/1/12/782/005

**13. NUMÉRO DU LOT**

Lot

**14. CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DÉLIVRANCE**

**15. INDICATIONS D'UTILISATION**

**16. INFORMATIONS EN BRAILLE**

Kalydeco 150 mg comprimés

**17. IDENTIFIANT UNIQUE - CODE-BARRES 2D**

code-barres 2D portant l'identifiant unique inclus.

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| <b>18. IDENTIFIANT UNIQUE - DONNÉES LISIBLES PAR LES HUMAINS</b> |
|------------------------------------------------------------------|

PC  
SN  
NN

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE**  
**PLAQUETTES DANS UNE POCHETTE EN CARTON – BOÎTE DE 28 COMPRIMÉS**

**1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT**

Kalydeco 150 mg comprimés pelliculés  
ivacaftor

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)**

Chaque comprimé contient 150 mg d'ivacaftor.

**3. LISTE DES EXCIPIENTS**

Contient du lactose.

Voir la notice pour plus d'informations.

**4. FORME PHARMACEUTIQUE ET CONTENU**

7 comprimés

**5. MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION**

Lire la notice avant utilisation.

Voie orale.

Mode d'emploi

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin.

À prendre avec un repas riche en graisses.

Ne pas croquer, casser ou dissoudre les comprimés.

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

**6. MISE EN GARDE SPÉCIALE INDIQUANT QUE LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE CONSERVÉ HORS DE VUE ET DE PORTÉE DES ENFANTS**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**7. AUTRE(S) MISE(S) EN GARDE SPÉCIALE(S), SI NÉCESSAIRE**

**8. DATE DE PÉREMPTION**

EXP

**9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION****10. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS PROVENANT DE CES MÉDICAMENTS S'IL Y A LIEU****11. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited  
Unit 49, Block 5, Northwood Court, Northwood Crescent,  
Dublin 9, D09 T665,  
Irlande

**12. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

EU/1/12/782/005

**13. NUMÉRO DU LOT**

Lot

**14. CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DÉLIVRANCE****15. INDICATIONS D'UTILISATION****16. INFORMATIONS EN BRAILLE****17. IDENTIFIANT UNIQUE - CODE-BARRES 2D****18. IDENTIFIANT UNIQUE - DONNÉES LISIBLES PAR LES HUMAINS**

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES PLAQUETTES OU LES FILMS  
THERMOSOUDES**

**PLAQUETTES – BOÎTE DE 28 COMPRIMÉS**

**1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT**

Kalydeco 150 mg comprimés  
ivacaftor

**2. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Vertex

**3. DATE DE PÉREMPTION**

EXP

**4. NUMÉRO DU LOT**

Lot

**5. AUTRE**

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**

**BOÎTE EXTERNE POUR LES PLAQUETTES DANS UNE POCHETTE EN CARTON –  
BOÎTE DE 28 COMPRIMÉS**

**1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT**

Kalydeco 75 mg comprimés pelliculés  
ivacaftor

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)**

Chaque comprimé contient 75 mg d'ivacaftor.

**3. LISTE DES EXCIPIENTS**

Contient du lactose.

Voir la notice pour plus d'informations.

**4. FORME PHARMACEUTIQUE ET CONTENU**

28 comprimés

**5. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

Lire la notice avant utilisation.

Voie orale

Mode d'emploi

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin.

À prendre avec un repas riche en graisses.

Ne pas croquer, casser ou dissoudre les comprimés.

Insérer la languette ci-dessous pour refermer

Ouvrir

**6. MISE EN GARDE SPÉCIALE INDIQUANT QUE LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE  
CONSERVÉ HORS DE VUE ET DE PORTÉE DES ENFANTS**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**7. AUTRE(S) MISE(S) EN GARDE SPÉCIALE(S), SI NÉCESSAIRE**

**8. DATE DE PÉREPTION**

EXP

**9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

**10. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS PROVENANT DE CES MÉDICAMENTS S'IL Y A LIEU**

**11. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited  
Unit 49, Block 5, Northwood Court, Northwood Crescent,  
Dublin 9, D09 T665,  
Irlande

**12. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

EU/1/12/782/007

**13. NUMÉRO DU LOT**

Lot

**14. CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DÉLIVRANCE**

**15. INDICATIONS D'UTILISATION**

**16. INFORMATIONS EN BRAILLE**

Kalydeco 75 mg comprimés

**17. IDENTIFIANT UNIQUE - CODE-BARRES 2D**

code-barres 2D portant l'identifiant unique inclus.

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| <b>18. IDENTIFIANT UNIQUE - DONNÉES LISIBLES PAR LES HUMAINS</b> |
|------------------------------------------------------------------|

PC  
SN  
NN

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE**  
**PLAQUETTES DANS UNE POCHETTE EN CARTON – BOÎTE DE 28 COMPRIMÉS**

**1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT**

Kalydeco 75 mg comprimés pelliculés  
ivacaftor

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)**

Chaque comprimé contient 75 mg d'ivacaftor.

**3. LISTE DES EXCIPIENTS**

Contient du lactose.

Voir la notice pour plus d'informations.

**4. FORME PHARMACEUTIQUE ET CONTENU**

7 comprimés

**5. MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION**

Lire la notice avant utilisation.

Voie orale.

Mode d'emploi

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin.

À prendre avec un repas riche en graisses.

Ne pas croquer, casser ou dissoudre les comprimés.

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

**6. MISE EN GARDE SPÉCIALE INDIQUANT QUE LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE CONSERVÉ HORS DE VUE ET DE PORTÉE DES ENFANTS**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**7. AUTRE(S) MISE(S) EN GARDE SPÉCIALE(S), SI NÉCESSAIRE**

**8. DATE DE PÉREMPTION**

EXP

**9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION****10. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS PROVENANT DE CES MÉDICAMENTS S'IL Y A LIEU****11. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited  
Unit 49, Block 5, Northwood Court, Northwood Crescent,  
Dublin 9, D09 T665,  
Irlande

**12. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

EU/1/12/782/007

**13. NUMÉRO DU LOT**

Lot

**14. CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DÉLIVRANCE****15. INDICATIONS D'UTILISATION****16. INFORMATIONS EN BRAILLE****17. IDENTIFIANT UNIQUE - CODE-BARRES 2D****18. IDENTIFIANT UNIQUE - DONNÉES LISIBLES PAR LES HUMAINS**

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES PLAQUETTES OU LES FILMS  
THERMOSOUDES**

**PLAQUETTES – BOÎTE DE 28 COMPRIMÉS**

**1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT**

Kalydeco 75 mg comprimés  
ivacaftor

**2. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Vertex

**3. DATE DE PÉREMPTION**

EXP

**4. NUMÉRO DU LOT**

Lot

**5. AUTRE**

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****BOÎTE EXTERNE POUR FLACON****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT**

Kalydeco 150 mg comprimés pelliculés  
ivacaftor

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)**

Chaque comprimé contient 150 mg d'ivacaftor.

**3. LISTE DES EXCIPIENTS**

Contient du lactose.

Voir la notice pour plus d'informations.

**4. FORME PHARMACEUTIQUE ET CONTENU**

56 comprimés

**5. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

Lire la notice avant utilisation.

Voie orale

Mode d'emploi

À prendre avec un repas riche en graisses.

Ne pas croquer, casser ou dissoudre les comprimés.

**6. MISE EN GARDE SPÉCIALE INDIQUANT QUE LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE CONSERVÉ HORS DE VUE ET DE PORTÉE DES ENFANTS**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**7. AUTRE(S) MISE(S) EN GARDE SPÉCIALE(S), SI NÉCESSAIRE****8. DATE DE PÉREMPTION**

EXP

**9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION****10. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS PROVENANT DE CES MÉDICAMENTS S'IL Y A LIEU****11. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited  
Unit 49, Block 5, Northwood Court, Northwood Crescent,  
Dublin 9, D09 T665,  
Irlande

**12. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

EU/1/12/782/001

**13. NUMÉRO DU LOT**

Lot

**14. CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DÉLIVRANCE****15. INDICATIONS D'UTILISATION****16. INFORMATIONS EN BRAILLE**

Kalydeco 150 mg comprimés

**17. IDENTIFIANT UNIQUE - CODE-BARRES 2D**

code-barres 2D portant l'identifiant unique inclus.

**18. IDENTIFIANT UNIQUE - DONNÉES LISIBLES PAR LES HUMAINS**

PC  
SN  
NN

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE****ÉTIQUETTE DU FLACON****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT**

Kalydeco 150 mg comprimés pelliculés  
ivacaftor

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)**

Chaque comprimé contient 150 mg d'ivacaftor.

**3. LISTE DES EXCIPIENTS**

Contient du lactose.

Voir la notice pour plus d'informations.

**4. FORME PHARMACEUTIQUE ET CONTENU**

56 comprimés

**5. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

Lire la notice avant utilisation.

Voie orale

**6. MISE EN GARDE SPÉCIALE INDIQUANT QUE LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE CONSERVÉ HORS DE PORTÉE ET DE VUE DES ENFANTS**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**7. AUTRE(S) MISE(S) EN GARDE SPÉCIALE(S), SI NÉCESSAIRE****8. DATE DE PÉREMPTION**

EXP

**9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

**10. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS PROVENANT DE CES MÉDICAMENTS S'IL Y A LIEU**

**11. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited  
Unit 49, Block 5, Northwood Court, Northwood Crescent,  
Dublin 9, D09 T665,  
Irlande

**12. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

EU/1/12/782/001

**13. NUMÉRO DU LOT**

Lot

**14. CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DÉLIVRANCE**

**15. INDICATIONS D'UTILISATION**

**16. INFORMATIONS EN BRAILLE**

**17. IDENTIFIANT UNIQUE - CODE-BARRES 2D**

**18. IDENTIFIANT UNIQUE - DONNÉES LISIBLES PAR LES HUMAINS**

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****BOÎTE EXTERNE POUR LES SACHETS****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT**

Kalydeco 13,4 mg granulés en sachet  
ivacaftor  
Patients âgés d'1 mois à moins de 2 mois

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)**

Chaque sachet de granulés contient 13,4 mg d'ivacaftor.

**3. LISTE DES EXCIPIENTS**

Contient du lactose.

Voir la notice pour plus d'informations.

**4. FORME PHARMACEUTIQUE ET CONTENU**

Granulés en sachet

28 sachets

4 pochettes individuelles contenant chacune 7 sachets

**5. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

Lire la notice avant utilisation.

Voie orale

Mode d'emploi

Le contenu entier d'un sachet doit être mélangé avec 5 mL d'aliment semi-liquide ou de liquide, adapté au mieux en fonction de l'âge de l'enfant, à température ambiante ou inférieure.

Le mélange sera ingéré en totalité dans l'heure qui suit sa réalisation, immédiatement avant ou après un repas ou une collation riche en graisses.

Soulever ici pour ouvrir

**6. MISE EN GARDE SPÉCIALE INDIQUANT QUE LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE CONSERVÉ HORS DE VUE ET DE PORTÉE DES ENFANTS**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**7. AUTRE(S) MISE(S) EN GARDE SPÉCIALE(S), SI NÉCESSAIRE**

**8. DATE DE PÉREPTION**

EXP

**9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

**10. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS PROVENANT DE CES MÉDICAMENTS S'IL Y A LIEU**

**11. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited  
Unit 49, Block 5, Northwood Court, Northwood Crescent,  
Dublin 9, D09 T665,  
Irlande

**12. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

EU/1/12/782/010

**13. NUMÉRO DU LOT**

Lot

**14. CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DÉLIVRANCE**

**15. INDICATIONS D'UTILISATION**

**16. INFORMATIONS EN BRAILLE**

Kalydeco 13,4 mg granulés

**17. IDENTIFIANT UNIQUE - CODE-BARRES 2D**

code-barres 2D portant l'identifiant unique inclus.

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| <b>18. IDENTIFIANT UNIQUE - DONNÉES LISIBLES PAR LES HUMAINS</b> |
|------------------------------------------------------------------|

PC  
SN  
NN

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT INTERMÉDIAIRE****POCHETTE POUR LES SACHETS****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT**

Kalydeco 13,4 mg granulés en sachet  
ivacaftor

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)**

Chaque sachet de granulés contient 13,4 mg d'ivacaftor.

**3. LISTE DES EXCIPIENTS**

Contient du lactose.

Voir la notice pour plus d'informations.

**4. FORME PHARMACEUTIQUE ET CONTENU**

Granulés en sachet

7 sachets

**5. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

Lire la notice avant utilisation.

Voie orale

Mode d'emploi

Le contenu entier d'un sachet doit être mélangé avec 5 mL d'aliment semi-liquide ou de liquide, adapté au mieux en fonction de l'âge de l'enfant, à température ambiante ou inférieure.

Le mélange sera ingéré en totalité dans l'heure qui suit sa réalisation, immédiatement avant ou après un repas ou une collation riche en graisses.

Les doses des 7 jours doivent être utilisées avant d'entamer une nouvelle pochette.

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

**6. MISE EN GARDE SPÉCIALE INDIQUANT QUE LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE CONSERVÉ HORS DE VUE ET DE PORTÉE DES ENFANTS**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**7. AUTRE(S) MISE(S) EN GARDE SPÉCIALE(S), SI NÉCESSAIRE**

**8. DATE DE PÉREPTION**

**9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

**10. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS PROVENANT DE CES MÉDICAMENTS S'IL Y A LIEU**

**11. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited  
Unit 49, Block 5, Northwood Court, Northwood Crescent,  
Dublin 9, D09 T665,  
Irlande

**12. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

EU/1/12/782/010

**13. NUMÉRO DU LOT**

**14. CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DÉLIVRANCE**

**15. INDICATIONS D'UTILISATION**

**16. INFORMATIONS EN BRAILLE**

**17. IDENTIFIANT UNIQUE - CODE-BARRES 2D**

**18. IDENTIFIANT UNIQUE - DONNÉES LISIBLES PAR LES HUMAINS**

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES PETITS CONDITIONNEMENTS  
PRIMAIRES**

**SACHETS**

**1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

Kalydeco 13,4 mg granulés  
ivacaftor  
Voie orale

**2. MODE D'ADMINISTRATION**

**3. DATE DE PÉREMPTION**

EXP

**4. NUMÉRO DU LOT**

Lot

**5. CONTENU EN POIDS, VOLUME OU UNITÉ**

**6. AUTRE**

Vertex Pharmaceuticals

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****BOÎTE EXTERNE POUR LES SACHETS****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT**

Kalydeco 13,4 mg granulés en sachet  
ivacaftor  
Patients âgés de 2 mois à moins de 4 mois

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)**

Chaque sachet de granulés contient 13,4 mg d'ivacaftor.

**3. LISTE DES EXCIPIENTS**

Contient du lactose.

Voir la notice pour plus d'informations.

**4. FORME PHARMACEUTIQUE ET CONTENU**

Granulés en sachet

56 sachets

4 pochettes individuelles contenant chacune 14 sachets

**5. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

Lire la notice avant utilisation.

Voie orale

Mode d'emploi

Le contenu entier d'un sachet doit être mélangé avec 5 mL d'aliment semi-liquide ou de liquide, adapté au mieux en fonction de l'âge de l'enfant, à température ambiante ou inférieure.

Le mélange sera ingéré en totalité dans l'heure qui suit sa réalisation, immédiatement avant ou après un repas ou une collation riche en graisses.

Soulever ici pour ouvrir

**6. MISE EN GARDE SPÉCIALE INDIQUANT QUE LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE CONSERVÉ HORS DE VUE ET DE PORTÉE DES ENFANTS**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**7. AUTRE(S) MISE(S) EN GARDE SPÉCIALE(S), SI NÉCESSAIRE**

**8. DATE DE PÉREMPTION**

EXP

**9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

**10. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS PROVENANT DE CES MÉDICAMENTS S'IL Y A LIEU**

**11. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited  
Unit 49, Block 5, Northwood Court, Northwood Crescent,  
Dublin 9, D09 T665,  
Irlande

**12. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

EU/1/12/782/011

**13. NUMÉRO DU LOT**

Lot

**14. CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DÉLIVRANCE**

**15. INDICATIONS D'UTILISATION**

**16. INFORMATIONS EN BRAILLE**

Kalydeco 13,4 mg granulés

**17. IDENTIFIANT UNIQUE - CODE-BARRES 2D**

code-barres 2D portant l'identifiant unique inclus.

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| <b>18. IDENTIFIANT UNIQUE - DONNÉES LISIBLES PAR LES HUMAINS</b> |
|------------------------------------------------------------------|

PC  
SN  
NN

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT INTERMÉDIAIRE**

**POCHETTE POUR LES SACHETS**

**1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT**

Kalydeco 13,4 mg granulés en sachet  
ivacaftor

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)**

Chaque sachet de granulés contient 13,4 mg d'ivacaftor.

**3. LISTE DES EXCIPIENTS**

Contient du lactose.

Voir la notice pour plus d'informations.

**4. FORME PHARMACEUTIQUE ET CONTENU**

Granulés en sachet

14 sachets

**5. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

Lire la notice avant utilisation.

Voie orale

Mode d'emploi

Le contenu entier d'un sachet doit être mélangé avec 5 mL d'aliment semi-liquide ou de liquide, adapté au mieux en fonction de l'âge de l'enfant, à température ambiante ou inférieure.

Le mélange sera ingéré en totalité dans l'heure qui suit sa réalisation, immédiatement avant ou après un repas ou une collation riche en graisses.

Les doses des 7 jours doivent être utilisées avant d'entamer une nouvelle pochette.

Matin

Soir

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

|                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6. MISE EN GARDE SPÉCIALE INDIQUANT QUE LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE CONSERVÉ HORS DE VUE ET DE PORTÉE DES ENFANTS</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| <b>7. AUTRE(S) MISE(S) EN GARDE SPÉCIALE(S), SI NÉCESSAIRE</b> |
|----------------------------------------------------------------|

|                              |
|------------------------------|
| <b>8. DATE DE PÉREMPTION</b> |
|------------------------------|

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| <b>9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION</b> |
|-----------------------------------------------------|

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS PROVENANT DE CES MÉDICAMENTS S'IL Y A LIEU</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>11. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited  
Unit 49, Block 5, Northwood Court, Northwood Crescent,  
Dublin 9, D09 T665,  
Irlande

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>12. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ</b> |
|-----------------------------------------------------------|

EU/1/12/782/011

|                          |
|--------------------------|
| <b>13. NUMÉRO DU LOT</b> |
|--------------------------|

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| <b>14. CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DÉLIVRANCE</b> |
|--------------------------------------------------------|

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>15. INDICATIONS D'UTILISATION</b> |
|--------------------------------------|

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>16. INFORMATIONS EN BRAILLE</b> |
|------------------------------------|

|                                                |
|------------------------------------------------|
| <b>17. IDENTIFIANT UNIQUE - CODE-BARRES 2D</b> |
|------------------------------------------------|

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| <b>18. IDENTIFIANT UNIQUE - DONNÉES LISIBLES PAR LES HUMAINS</b> |
|------------------------------------------------------------------|

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES PETITS CONDITIONNEMENTS  
PRIMAIRES**

**SACHETS**

**1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

Kalydeco 13,4 mg granulés  
ivacaftor  
Voie orale

**2. MODE D'ADMINISTRATION**

**3. DATE DE PÉREMPTION**

EXP

**4. NUMÉRO DU LOT**

Lot

**5. CONTENU EN POIDS, VOLUME OU UNITÉ**

**6. AUTRE**

Vertex Pharmaceuticals

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****BOÎTE EXTERNE POUR LES SACHETS****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT**

Kalydeco 25 mg granulés en sachet  
ivacaftor

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)**

Chaque sachet de granulés contient 25 mg d'ivacaftor.

**3. LISTE DES EXCIPIENTS**

Contient du lactose.

Voir la notice pour plus d'informations.

**4. FORME PHARMACEUTIQUE ET CONTENU**

Granulés en sachet

56 sachets

4 pochettes individuelles contenant chacune 14 sachets

**5. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

Lire la notice avant utilisation.

Voie orale

Mode d'emploi

Le contenu entier d'un sachet doit être mélangé avec 5 mL d'aliment semi-liquide ou de liquide, adapté au mieux en fonction de l'âge de l'enfant, à température ambiante ou inférieure.

Le mélange sera ingéré en totalité dans l'heure qui suit sa réalisation, immédiatement avant ou après un repas ou une collation riche en graisses.

Soulever ici pour ouvrir

**6. MISE EN GARDE SPÉCIALE INDIQUANT QUE LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE CONSERVÉ HORS DE VUE ET DE PORTÉE DES ENFANTS**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**7. AUTRE(S) MISE(S) EN GARDE SPÉCIALE(S), SI NÉCESSAIRE**

**8. DATE DE PÉREPTION**

EXP

**9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

**10. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS PROVENANT DE CES MÉDICAMENTS S'IL Y A LIEU**

**11. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited  
Unit 49, Block 5, Northwood Court, Northwood Crescent,  
Dublin 9, D09 T665,  
Irlande

**12. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

EU/1/12/782/006

**13. NUMÉRO DU LOT**

Lot

**14. CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DÉLIVRANCE**

**15. INDICATIONS D'UTILISATION**

**16. INFORMATIONS EN BRAILLE**

Kalydeco 25 mg granulés

**17. IDENTIFIANT UNIQUE - CODE-BARRES 2D**

code-barres 2D portant l'identifiant unique inclus.

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| <b>18. IDENTIFIANT UNIQUE - DONNÉES LISIBLES PAR LES HUMAINS</b> |
|------------------------------------------------------------------|

PC  
SN  
NN

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT INTERMÉDIAIRE**

**POCHETTE POUR LES SACHETS**

**1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT**

Kalydeco 25 mg granulés en sachet  
ivacaftor

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)**

Chaque sachet de granulés contient 25 mg d'ivacaftor.

**3. LISTE DES EXCIPIENTS**

Contient du lactose.

Voir la notice pour plus d'informations.

**4. FORME PHARMACEUTIQUE ET CONTENU**

Granulés en sachet

14 sachets

**5. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

Lire la notice avant utilisation.

Voie orale

Mode d'emploi

Le contenu entier d'un sachet doit être mélangé avec 5 mL d'aliment semi-liquide ou de liquide, adapté au mieux en fonction de l'âge de l'enfant, à température ambiante ou inférieure.

Le mélange sera ingéré en totalité dans l'heure qui suit sa réalisation, immédiatement avant ou après un repas ou une collation riche en graisses.

Les doses des 7 jours doivent être utilisées avant d'entamer une nouvelle pochette.

Matin

Soir

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

|                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6. MISE EN GARDE SPÉCIALE INDIQUANT QUE LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE CONSERVÉ HORS DE VUE ET DE PORTÉE DES ENFANTS</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| <b>7. AUTRE(S) MISE(S) EN GARDE SPÉCIALE(S), SI NÉCESSAIRE</b> |
|----------------------------------------------------------------|

|                              |
|------------------------------|
| <b>8. DATE DE PÉREMPTION</b> |
|------------------------------|

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| <b>9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION</b> |
|-----------------------------------------------------|

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS PROVENANT DE CES MÉDICAMENTS S'IL Y A LIEU</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>11. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited  
Unit 49, Block 5, Northwood Court, Northwood Crescent,  
Dublin 9, D09 T665,  
Irlande

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>12. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ</b> |
|-----------------------------------------------------------|

EU/1/12/782/006

|                          |
|--------------------------|
| <b>13. NUMÉRO DU LOT</b> |
|--------------------------|

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| <b>14. CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DÉLIVRANCE</b> |
|--------------------------------------------------------|

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>15. INDICATIONS D'UTILISATION</b> |
|--------------------------------------|

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>16. INFORMATIONS EN BRAILLE</b> |
|------------------------------------|

|                                                |
|------------------------------------------------|
| <b>17. IDENTIFIANT UNIQUE - CODE-BARRES 2D</b> |
|------------------------------------------------|

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| <b>18. IDENTIFIANT UNIQUE - DONNÉES LISIBLES PAR LES HUMAINS</b> |
|------------------------------------------------------------------|

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES PETITS CONDITIONNEMENTS  
PRIMAIRES**

**SACHETS**

**1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

Kalydeco 25 mg granulés  
ivacaftor  
Voie orale

**2. MODE D'ADMINISTRATION**

**3. DATE DE PÉREMPTION**

EXP

**4. NUMÉRO DU LOT**

Lot

**5. CONTENU EN POIDS, VOLUME OU UNITÉ**

**6. AUTRE**

Vertex Pharmaceuticals

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****BOÎTE EXTERNE POUR LES SACHETS****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT**

Kalydeco 50 mg granulés en sachet  
ivacaftor

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)**

Chaque sachet de granulés contient 50 mg d'ivacaftor.

**3. LISTE DES EXCIPIENTS**

Contient du lactose.

Voir la notice pour plus d'informations.

**4. FORME PHARMACEUTIQUE ET CONTENU**

Granulés en sachet

56 sachets

4 pochettes individuelles contenant chacune 14 sachets

**5. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

Lire la notice avant utilisation.

Voie orale

Mode d'emploi

Le contenu entier d'un sachet doit être mélangé avec 5 mL d'aliment semi-liquide ou de liquide, adapté au mieux en fonction de l'âge de l'enfant, à température ambiante ou inférieure.

Le mélange sera ingéré en totalité dans l'heure qui suit sa réalisation, immédiatement avant ou après un repas ou une collation riche en graisses.

Soulever ici pour ouvrir

**6. MISE EN GARDE SPÉCIALE INDIQUANT QUE LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE CONSERVÉ HORS DE VUE ET DE PORTÉE DES ENFANTS**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**7. AUTRE(S) MISE(S) EN GARDE SPÉCIALE(S), SI NÉCESSAIRE**

**8. DATE DE PÉREPTION**

EXP

**9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

**10. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS PROVENANT DE CES MÉDICAMENTS S'IL Y A LIEU**

**11. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited  
Unit 49, Block 5, Northwood Court, Northwood Crescent,  
Dublin 9, D09 T665,  
Irlande

**12. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

EU/1/12/782/003

**13. NUMÉRO DU LOT**

Lot

**14. CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DÉLIVRANCE**

**15. INDICATIONS D'UTILISATION**

**16. INFORMATIONS EN BRAILLE**

Kalydeco 50 mg granulés

**17. IDENTIFIANT UNIQUE - CODE-BARRES 2D**

code-barres 2D portant l'identifiant unique inclus.

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| <b>18. IDENTIFIANT UNIQUE - DONNÉES LISIBLES PAR LES HUMAINS</b> |
|------------------------------------------------------------------|

PC  
SN  
NN

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT INTERMÉDIAIRE</b><br><b>POCHETTE POUR LES SACHETS</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT</b> |
|--------------------------------------|

Kalydeco 50 mg granulés en sachet  
ivacaftor

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>2. COMPOSITION EN SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)</b> |
|-------------------------------------------------|

Chaque sachet de granulés contient 50 mg d'ivacaftor.

|                                |
|--------------------------------|
| <b>3. LISTE DES EXCIPIENTS</b> |
|--------------------------------|

Contient du lactose.

Voir la notice pour plus d'informations.

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <b>4. FORME PHARMACEUTIQUE ET CONTENU</b> |
|-------------------------------------------|

Granulés en sachet

14 sachets

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>5. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION</b> |
|--------------------------------------------|

Lire la notice avant utilisation.

Voie orale

Mode d'emploi

Le contenu entier d'un sachet doit être mélangé avec 5 mL d'aliment semi-liquide ou de liquide, adapté au mieux en fonction de l'âge de l'enfant, à température ambiante ou inférieure.

Le mélange sera ingéré en totalité dans l'heure qui suit sa réalisation, immédiatement avant ou après un repas ou une collation riche en graisses.

Les doses des 7 jours doivent être utilisées avant d'entamer une nouvelle pochette.

Matin

Soir

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

|                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6. MISE EN GARDE SPÉCIALE INDIQUANT QUE LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE CONSERVÉ HORS DE VUE ET DE PORTÉE DES ENFANTS</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| <b>7. AUTRE(S) MISE(S) EN GARDE SPÉCIALE(S), SI NÉCESSAIRE</b> |
|----------------------------------------------------------------|

|                              |
|------------------------------|
| <b>8. DATE DE PÉREMPTION</b> |
|------------------------------|

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| <b>9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION</b> |
|-----------------------------------------------------|

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS PROVENANT DE CES MÉDICAMENTS S'IL Y A LIEU</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>11. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited  
Unit 49, Block 5, Northwood Court, Northwood Crescent,  
Dublin 9, D09 T665,  
Irlande

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>12. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ</b> |
|-----------------------------------------------------------|

EU/1/12/782/003

|                          |
|--------------------------|
| <b>13. NUMÉRO DU LOT</b> |
|--------------------------|

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| <b>14. CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DÉLIVRANCE</b> |
|--------------------------------------------------------|

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>15. INDICATIONS D'UTILISATION</b> |
|--------------------------------------|

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>16. INFORMATIONS EN BRAILLE</b> |
|------------------------------------|

|                                                |
|------------------------------------------------|
| <b>17. IDENTIFIANT UNIQUE - CODE-BARRES 2D</b> |
|------------------------------------------------|

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| <b>18. IDENTIFIANT UNIQUE - DONNÉES LISIBLES PAR LES HUMAINS</b> |
|------------------------------------------------------------------|

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES PETITS CONDITIONNEMENTS  
PRIMAIRES**

**SACHETS**

**1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

Kalydeco 50 mg granulés  
ivacaftor  
Voie orale

**2. MODE D'ADMINISTRATION**

**3. DATE DE PÉREMPTION**

EXP

**4. NUMÉRO DU LOT**

Lot

**5. CONTENU EN POIDS, VOLUME OU UNITÉ**

**6. AUTRE**

Vertex Pharmaceuticals

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****BOÎTE EXTERNE POUR LES SACHETS****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT**

Kalydeco 59,5 mg granulés en sachet  
ivacaftor

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)**

Chaque sachet de granulés contient 59,5 mg d'ivacaftor.

**3. LISTE DES EXCIPIENTS**

Contient du lactose.

Voir la notice pour plus d'informations.

**4. FORME PHARMACEUTIQUE ET CONTENU**

Granulés en sachet

28 sachets

4 pochettes individuelles contenant chacune 7 sachets

**5. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

Lire la notice avant utilisation.

Voie orale

Mode d'emploi

Le contenu entier d'un sachet doit être mélangé avec 5 mL d'aliment semi-liquide ou de liquide, adapté au mieux en fonction de l'âge de l'enfant, à température ambiante ou inférieure.

Le mélange sera ingéré en totalité dans l'heure qui suit sa réalisation, immédiatement avant ou après un repas ou une collation riche en graisses.

Soulever ici pour ouvrir

**6. MISE EN GARDE SPÉCIALE INDIQUANT QUE LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE CONSERVÉ HORS DE VUE ET DE PORTÉE DES ENFANTS**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**7. AUTRE(S) MISE(S) EN GARDE SPÉCIALE(S), SI NÉCESSAIRE**

**8. DATE DE PÉREPTION**

EXP

**9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

**10. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS PROVENANT DE CES MÉDICAMENTS S'IL Y A LIEU**

**11. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited  
Unit 49, Block 5, Northwood Court, Northwood Crescent,  
Dublin 9, D09 T665,  
Irlande

**12. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

EU/1/12/782/008

**13. NUMÉRO DU LOT**

Lot

**14. CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DÉLIVRANCE**

**15. INDICATIONS D'UTILISATION**

**16. INFORMATIONS EN BRAILLE**

Kalydeco 59,5 mg granulés

**17. IDENTIFIANT UNIQUE - CODE-BARRES 2D**

code-barres 2D portant l'identifiant unique inclus.

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| <b>18. IDENTIFIANT UNIQUE - DONNÉES LISIBLES PAR LES HUMAINS</b> |
|------------------------------------------------------------------|

PC  
SN  
NN

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT INTERMÉDIAIRE****POCHETTE POUR LES SACHETS****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT**

Kalydeco 59,5 mg granulés en sachet  
ivacaftor

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)**

Chaque sachet de granulés contient 59,5 mg d'ivacaftor.

**3. LISTE DES EXCIPIENTS**

Contient du lactose.

Voir la notice pour plus d'informations.

**4. FORME PHARMACEUTIQUE ET CONTENU**

Granulés en sachet

7 sachets

**5. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

Lire la notice avant utilisation.

Voie orale

Mode d'emploi

Le contenu entier d'un sachet doit être mélangé avec 5 mL d'aliment semi-liquide ou de liquide, adapté au mieux en fonction de l'âge de l'enfant, à température ambiante ou inférieure.

Le mélange sera ingéré en totalité dans l'heure qui suit sa réalisation, immédiatement avant ou après un repas ou une collation riche en graisses.

Les doses des 7 jours doivent être utilisées avant d'entamer une nouvelle pochette.

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

**6. MISE EN GARDE SPÉCIALE INDIQUANT QUE LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE CONSERVÉ HORS DE VUE ET DE PORTÉE DES ENFANTS**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**7. AUTRE(S) MISE(S) EN GARDE SPÉCIALE(S), SI NÉCESSAIRE**

**8. DATE DE PÉREPTION**

**9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

**10. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS PROVENANT DE CES MÉDICAMENTS S'IL Y A LIEU**

**11. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited  
Unit 49, Block 5, Northwood Court, Northwood Crescent,  
Dublin 9, D09 T665,  
Irlande

**12. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

EU/1/12/782/008

**13. NUMÉRO DU LOT**

**14. CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DÉLIVRANCE**

**15. INDICATIONS D'UTILISATION**

**16. INFORMATIONS EN BRAILLE**

**17. IDENTIFIANT UNIQUE - CODE-BARRES 2D**

**18. IDENTIFIANT UNIQUE - DONNÉES LISIBLES PAR LES HUMAINS**

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES PETITS CONDITIONNEMENTS  
PRIMAIRES**

**SACHETS**

**1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

Kalydeco 59,5 mg granulés  
ivacaftor  
Voie orale

**2. MODE D'ADMINISTRATION**

**3. DATE DE PÉREMPTION**

EXP

**4. NUMÉRO DU LOT**

Lot

**5. CONTENU EN POIDS, VOLUME OU UNITÉ**

**6. AUTRE**

Vertex Pharmaceuticals

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****BOÎTE EXTERNE POUR LES SACHETS****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT**

Kalydeco 75 mg granulés en sachet  
ivacaftor

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)**

Chaque sachet de granulés contient 75 mg d'ivacaftor.

**3. LISTE DES EXCIPIENTS**

Contient du lactose.

Voir la notice pour plus d'informations.

**4. FORME PHARMACEUTIQUE ET CONTENU**

Granulés en sachet

56 sachets

4 pochettes individuelles contenant chacune 14 sachets

**5. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

Lire la notice avant utilisation.

Voie orale

Mode d'emploi

Le contenu entier d'un sachet doit être mélangé avec 5 mL d'aliment semi-liquide ou de liquide, adapté au mieux en fonction de l'âge de l'enfant, à température ambiante ou inférieure.

Le mélange sera ingéré en totalité dans l'heure qui suit sa réalisation, immédiatement avant ou après un repas ou une collation riche en graisses.

Soulever ici pour ouvrir

**6. MISE EN GARDE SPÉCIALE INDIQUANT QUE LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE CONSERVÉ HORS DE VUE ET DE PORTÉE DES ENFANTS**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**7. AUTRE(S) MISE(S) EN GARDE SPÉCIALE(S), SI NÉCESSAIRE**

**8. DATE DE PÉREPTION**

EXP

**9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

**10. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS PROVENANT DE CES MÉDICAMENTS S'IL Y A LIEU**

**11. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited  
Unit 49, Block 5, Northwood Court, Northwood Crescent,  
Dublin 9, D09 T665,  
Irlande

**12. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

EU/1/12/782/004

**13. NUMÉRO DU LOT**

Lot

**14. CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DÉLIVRANCE**

**15. INDICATIONS D'UTILISATION**

**16. INFORMATIONS EN BRAILLE**

Kalydeco 75 mg granulés

**17. IDENTIFIANT UNIQUE - CODE-BARRES 2D**

code-barres 2D portant l'identifiant unique inclus.

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| <b>18. IDENTIFIANT UNIQUE - DONNÉES LISIBLES PAR LES HUMAINS</b> |
|------------------------------------------------------------------|

PC  
SN  
NN

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT INTERMÉDIAIRE</b><br><b>POCHETTE POUR LES SACHETS</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT</b> |
|--------------------------------------|

Kalydeco 75 mg granulés en sachet  
ivacaftor

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>2. COMPOSITION EN SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)</b> |
|-------------------------------------------------|

Chaque sachet de granulés contient 75 mg d'ivacaftor.

|                                |
|--------------------------------|
| <b>3. LISTE DES EXCIPIENTS</b> |
|--------------------------------|

Contient du lactose.

Voir la notice pour plus d'informations.

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <b>4. FORME PHARMACEUTIQUE ET CONTENU</b> |
|-------------------------------------------|

Granulés en sachet

14 sachets

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>5. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION</b> |
|--------------------------------------------|

Lire la notice avant utilisation.

Voie orale

Mode d'emploi

Le contenu entier d'un sachet doit être mélangé avec 5 mL d'aliment semi-liquide ou de liquide, adapté au mieux en fonction de l'âge de l'enfant, à température ambiante ou inférieure.

Le mélange sera ingéré en totalité dans l'heure qui suit sa réalisation, immédiatement avant ou après un repas ou une collation riche en graisses.

Les doses des 7 jours doivent être utilisées avant d'entamer une nouvelle pochette.

Matin

Soir

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

|                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6. MISE EN GARDE SPÉCIALE INDIQUANT QUE LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE CONSERVÉ HORS DE VUE ET DE PORTÉE DES ENFANTS</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| <b>7. AUTRE(S) MISE(S) EN GARDE SPÉCIALE(S), SI NÉCESSAIRE</b> |
|----------------------------------------------------------------|

|                              |
|------------------------------|
| <b>8. DATE DE PÉREMPTION</b> |
|------------------------------|

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| <b>9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION</b> |
|-----------------------------------------------------|

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS PROVENANT DE CES MÉDICAMENTS S'IL Y A LIEU</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>11. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited  
Unit 49, Block 5, Northwood Court, Northwood Crescent,  
Dublin 9, D09 T665,  
Irlande

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>12. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ</b> |
|-----------------------------------------------------------|

EU/1/12/782/004

|                          |
|--------------------------|
| <b>13. NUMÉRO DU LOT</b> |
|--------------------------|

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| <b>14. CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DÉLIVRANCE</b> |
|--------------------------------------------------------|

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>15. INDICATIONS D'UTILISATION</b> |
|--------------------------------------|

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>16. INFORMATIONS EN BRAILLE</b> |
|------------------------------------|

|                                                |
|------------------------------------------------|
| <b>17. IDENTIFIANT UNIQUE - CODE-BARRES 2D</b> |
|------------------------------------------------|

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| <b>18. IDENTIFIANT UNIQUE - DONNÉES LISIBLES PAR LES HUMAINS</b> |
|------------------------------------------------------------------|

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES PETITS CONDITIONNEMENTS  
PRIMAIRES**

**SACHETS**

**1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

Kalydeco 75 mg granulés  
ivacaftor  
Voie orale

**2. MODE D'ADMINISTRATION**

**3. DATE DE PÉREMPTION**

EXP

**4. NUMÉRO DU LOT**

Lot

**5. CONTENU EN POIDS, VOLUME OU UNITÉ**

**6. AUTRE**

Vertex Pharmaceuticals

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****BOÎTE EXTERNE POUR LES SACHETS – BOÎTE DE 28 SACHETS****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT**

Kalydeco 75 mg granulés en sachet  
ivacaftor

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)**

Chaque sachet de granulés contient 75 mg d'ivacaftor.

**3. LISTE DES EXCIPIENTS**

Contient du lactose.

Voir la notice pour plus d'informations.

**4. FORME PHARMACEUTIQUE ET CONTENU**

Granulés en sachet

28 sachets

4 pochettes individuelles contenant chacune 7 sachets

**5. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

Lire la notice avant utilisation.

Voie orale

Mode d'emploi

Le contenu entier d'un sachet doit être mélangé avec 5 mL d'aliment semi-liquide ou de liquide, adapté au mieux en fonction de l'âge de l'enfant, à température ambiante ou inférieure.

Le mélange sera ingéré en totalité dans l'heure qui suit sa réalisation, immédiatement avant ou après un repas ou une collation riche en graisses.

Soulever ici pour ouvrir

**6. MISE EN GARDE SPÉCIALE INDIQUANT QUE LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE CONSERVÉ HORS DE VUE ET DE PORTÉE DES ENFANTS**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**7. AUTRE(S) MISE(S) EN GARDE SPÉCIALE(S), SI NÉCESSAIRE**

**8. DATE DE PÉREPTION**

EXP

**9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

**10. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS PROVENANT DE CES MÉDICAMENTS S'IL Y A LIEU**

**11. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited  
Unit 49, Block 5, Northwood Court, Northwood Crescent,  
Dublin 9, D09 T665,  
Irlande

**12. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

EU/1/12/782/009

**13. NUMÉRO DU LOT**

Lot

**14. CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DÉLIVRANCE**

**15. INDICATIONS D'UTILISATION**

**16. INFORMATIONS EN BRAILLE**

Kalydeco 75 mg granulés

**17. IDENTIFIANT UNIQUE - CODE-BARRES 2D**

code-barres 2D portant l'identifiant unique inclus.

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| <b>18. IDENTIFIANT UNIQUE - DONNÉES LISIBLES PAR LES HUMAINS</b> |
|------------------------------------------------------------------|

PC  
SN  
NN

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT INTERMÉDIAIRE**

**POCHETTE POUR LES SACHETS – POCHETTE CONTENANT 7 SACHETS**

**1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT**

Kalydeco 75 mg granulés en sachet  
ivacaftor

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)**

Chaque sachet de granulés contient 75 mg d'ivacaftor.

**3. LISTE DES EXCIPIENTS**

Contient du lactose.

Voir la notice pour plus d'informations.

**4. FORME PHARMACEUTIQUE ET CONTENU**

Granulés en sachet

7 sachets

**5. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

Lire la notice avant utilisation.

Voie orale

Mode d'emploi

Le contenu entier d'un sachet doit être mélangé avec 5 mL d'aliment semi-liquide ou de liquide, adapté au mieux en fonction de l'âge de l'enfant, à température ambiante ou inférieure.

Le mélange sera ingéré en totalité dans l'heure qui suit sa réalisation, immédiatement avant ou après un repas ou une collation riche en graisses.

Les doses des 7 jours doivent être utilisées avant d'entamer une nouvelle pochette.

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

**6. MISE EN GARDE SPÉCIALE INDIQUANT QUE LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE CONSERVÉ HORS DE VUE ET DE PORTÉE DES ENFANTS**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**7. AUTRE(S) MISE(S) EN GARDE SPÉCIALE(S), SI NÉCESSAIRE**

**8. DATE DE PÉREPTION**

**9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

**10. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS PROVENANT DE CES MÉDICAMENTS S'IL Y A LIEU**

**11. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited  
Unit 49, Block 5, Northwood Court, Northwood Crescent,  
Dublin 9, D09 T665,  
Irlande

**12. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

EU/1/12/782/009

**13. NUMÉRO DU LOT**

**14. CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DÉLIVRANCE**

**15. INDICATIONS D'UTILISATION**

**16. INFORMATIONS EN BRAILLE**

**17. IDENTIFIANT UNIQUE - CODE-BARRES 2D**

**18. IDENTIFIANT UNIQUE - DONNÉES LISIBLES PAR LES HUMAINS**

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES PETITS CONDITIONNEMENTS  
PRIMAIRES**

**SACHETS – BOÎTE DE 28 SACHETS**

**1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

Kalydeco 75 mg granulés  
ivacaftor  
Voie orale

**2. MODE D'ADMINISTRATION**

**3. DATE DE PÉREMPTION**

EXP

**4. NUMÉRO DU LOT**

Lot

**5. CONTENU EN POIDS, VOLUME OU UNITÉ**

**6. AUTRE**

Vertex Pharmaceuticals

## **B. NOTICE**

## Notice : information du patient

### Kalydeco 75 mg comprimés pelliculés Kalydeco 150 mg comprimés pelliculés ivacaftor

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament, car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

#### **Que contient cette notice ?**

1. Qu'est-ce que Kalydeco et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Kalydeco
3. Comment prendre Kalydeco
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Kalydeco
6. Contenu de l'emballage et autres informations

#### **1. Qu'est-ce que Kalydeco et dans quels cas est-il utilisé**

Kalydeco contient comme substance active l'ivacaftor. L'ivacaftor agit au niveau de la protéine CFTR (*Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator*), une protéine qui forme un canal à la surface cellulaire et qui permet le transport de particules telles que les ions chlorures à l'intérieur de la cellule et en dehors de la cellule. Des mutations du gène *CFTR* (voir ci-dessous) entraînent une diminution du transport des ions chlorures chez les personnes atteintes de mucoviscidose. L'ivacaftor aide certaines protéines CFTR anormales à s'ouvrir plus souvent afin que les ions chlorures puissent entrer et sortir plus facilement.

Kalydeco comprimés est indiqué :

- En monothérapie chez les patients âgés de 6 ans et plus et pesant 25 kg et plus atteints de mucoviscidose porteurs d'une mutation *R117H* du gène *CFTR* ou de l'une des mutations de défaut de régulation du gène *CFTR* suivantes : *G551D*, *G1244E*, *G1349D*, *G178R*, *G551S*, *S1251N*, *S1255P*, *S549N* ou *S549R*.
- En association avec les comprimés de tezacaftor/ivacaftor chez les patients âgés de 6 ans et plus atteints de mucoviscidose porteurs de deux mutations *F508del* du gène *CFTR* (homozygotes pour la mutation *F508del*) ou porteurs d'une mutation *F508del* et de certaines autres secondes mutations qui entraînent une diminution de la quantité de protéines CFTR et/ou de leur fonction (hétérozygotes pour la mutation *F508del* avec une mutation associée à une activité résiduelle de la protéine CFTR [RF]). Si Kalydeco vous a été prescrit en association avec un traitement par les comprimés de tezacaftor/ivacaftor, veuillez lire la notice de ce médicament. Elle contient des informations importantes sur la façon de prendre ces deux médicaments.
- En association avec les comprimés d'ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor chez les patients âgés de 6 ans et plus atteints de mucoviscidose porteurs d'au moins une mutation du gène *CFTR* répondant au traitement par Kalydeco en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor. Si

Kalydeco vous a été prescrit en association avec un traitement par les comprimés associant ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor, veuillez lire la notice de ce médicament. Elle contient des informations importantes sur la façon de prendre ces deux médicaments.

## **2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Kalydeco**

### **Ne prenez jamais Kalydeco**

- si vous êtes allergique à l'ivacaftor ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

### **Avertissements et précautions**

Vous devez consulter votre médecin ou pharmacien avant de prendre Kalydeco.

- Adressez-vous à votre médecin si vous avez une maladie du foie ou si vous en avez eu une dans le passé. Il pourra être nécessaire d'adapter la dose de votre traitement.
- Des augmentations des taux sanguins d'enzymes hépatiques ont été observées chez certaines personnes recevant Kalydeco (seul ou en association avec les comprimés de tezacaftor/ivacaftor ou d'ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor). Si vous présentez l'un des symptômes suivants, parlez-en immédiatement à votre médecin, car ils peuvent être le signe d'un problème au niveau du foie :
  - douleur ou gêne dans la partie haute et droite de l'estomac (abdomen),
  - jaunissement de la peau ou du blanc des yeux,
  - perte de l'appétit,
  - nausées ou vomissements,
  - urines foncées.
- Avant et pendant le traitement, notamment la première année et en particulier si vos analyses de sang avaient montré des taux élevés des enzymes hépatiques dans le passé, votre médecin fera pratiquer certaines analyses de sang pour vérifier le bon fonctionnement de votre foie.
- Des cas de dépression (incluant des idées et comportements suicidaires), apparaissant généralement au cours des trois premiers mois de traitement, ont été rapportés chez des patients traités par Kalydeco, notamment en association avec tezacaftor/ivacaftor ou ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor. Consultez immédiatement votre médecin si vous (ou la personne qui prend ce médicament) présentez l'un des symptômes suivants : humeur triste ou modification de l'humeur, anxiété, sentiment de mal-être émotionnel ou pensées d'automutilation ou de suicide, qui peuvent être des signes de dépression.
- Si vous avez une maladie des reins ou si vous en avez eu une dans le passé, informez votre médecin.
- Si vous êtes porteur/porteuse de deux mutations de classe I (mutations connues pour ne pas produire de protéine CFTR), vous ne devez pas prendre Kalydeco car vous ne devriez pas répondre positivement à ce médicament.
- Kalydeco n'est pas recommandé chez les patients ayant reçu une greffe d'organe.
- Adressez-vous à votre médecin si vous utilisez une contraception hormonale, par exemple la pilule contraceptive. Cela peut entraîner un plus grand risque de présenter une éruption cutanée pendant le traitement par Kalydeco en association avec les comprimés d'ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor.
- Des cas de cataractes (une anomalie du cristallin de l'œil), sans effet sur la vision, ont été rapportés chez certains enfants et adolescents traités par Kalydeco (seul ou en association avec

un traitement par tezacaftor/ivacaftor ou par ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor). Votre médecin pourra effectuer des examens ophtalmologiques avant et pendant le traitement par l'ivacaftor.

- Kalydeco n'est destiné qu'aux patients porteurs d'au moins une des mutations du gène *CFTR* indiquées à la rubrique 1 (Qu'est-ce que Kalydeco et dans quels cas est-il utilisé).

### Enfants et adolescents

Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les enfants âgés de moins d'1 mois car on ne sait pas si l'ivacaftor est sûr et efficace chez ces enfants.

Ce médicament ne doit pas être utilisé en association avec les comprimés de tezacaftor/ivacaftor chez les enfants âgés de moins de 6 ans ou en association avec les comprimés d'ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor chez les enfants âgés de moins de 2 ans car on ne sait pas s'ils sont sûrs et efficaces chez eux.

### Autres médicaments et Kalydeco

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament. Certains médicaments peuvent modifier la façon dont Kalydeco agit ou peuvent augmenter la probabilité de survenue d'effets indésirables. En particulier, informez votre médecin si vous prenez l'un des médicaments mentionnés ci-dessous. Il pourra décider d'ajuster la dose de votre traitement et il déterminera si des contrôles supplémentaires sont nécessaires.

- **Médicaments antifongiques** (utilisés dans le traitement des infections fongiques, ou mycoses) tels que le fluconazole, l'itraconazole, le kétoconazole, le posaconazole et le voriconazole.
- **Antibiotiques** (utilisés dans le traitement des infections bactériennes) tels que la clarithromycine, l'érythromycine, la rifabutine, la rifampicine et la télithromycine.
- **Anticonvulsivants** (utilisés dans le traitement des crises d'épilepsie ou crises convulsives) tels que la carbamazépine, le phénobarbital et la phénytoïne.
- **Médicaments à base de plantes** : le millepertuis (*Hypericum perforatum*).
- **Immunosuppresseurs** (utilisés après une greffe d'organe) tels que la ciclosporine, l'évérolimus, le sirolimus et le tacrolimus.
- **Glucosides cardiotoniques** (utilisés dans le traitement de certaines affections cardiaques) tels que la digoxine.
- **Anticoagulants** (utilisés pour prévenir la formation de caillots de sang) tels que la warfarine.
- **Antidiabétiques** tels que le glimépiride et le glipizide.
- **Médicaments utilisés pour diminuer la pression artérielle** tels que le vérapamil.

### Kalydeco avec des aliments et boissons

Évitez les aliments ou boissons contenant du pamplemousse pendant le traitement, car ceux-ci peuvent augmenter les effets indésirables de Kalydeco en augmentant la quantité d'ivacaftor dans votre organisme.

### Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin avant de prendre ce médicament. Si cela est possible, il peut être préférable d'éviter d'utiliser Kalydeco pendant la grossesse et votre médecin vous aidera à prendre la meilleure décision pour vous et votre enfant.

L'ivacaftor passe dans le lait maternel. Si vous envisagez d'allaiter, demandez conseil à votre médecin avant de prendre Kalydeco. Votre médecin déterminera s'il convient de ne pas allaiter ou si vous devez arrêter le traitement par l'ivacaftor. Sa décision prendra en compte le bénéfice de l'allaitement pour l'enfant et le bénéfice du traitement pour vous.

## Conduite de véhicules et utilisation de machines

Kalydeco peut provoquer des sensations vertigineuses. Vous ne devez pas conduire de véhicules, faire de la bicyclette ni utiliser de machines si vous ressentez des sensations vertigineuses.

## Kalydeco contient du lactose et du sodium

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Kalydeco contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par dose, c'est-à-dire qu'il est essentiellement « sans sodium ».

## 3. Comment prendre Kalydeco

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin en cas de doute.

Votre médecin déterminera le médicament et la dose qui vous conviennent.

Les recommandations relatives à la posologie de Kalydeco sont présentées dans le tableau 1 ci-dessous.

**Tableau 1 : Recommandations posologiques**

| Âge/poids                                                            | Dose du matin                                                         | Dose du soir                   |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Kalydeco en monothérapie</b>                                      |                                                                       |                                |
| 6 ans et plus, $\geq 25$ kg                                          | Un comprimé de Kalydeco 150 mg                                        | Un comprimé de Kalydeco 150 mg |
| <b>Kalydeco en association avec tezacaftor/ivacaftor</b>             |                                                                       |                                |
| 6 ans à moins de 12 ans, $< 30$ kg                                   | Un comprimé de tezacaftor/ivacaftor 50 mg/75 mg                       | Un comprimé de Kalydeco 75 mg  |
| 6 ans à moins de 12 ans, $\geq 30$ kg                                | Un comprimé de tezacaftor/ivacaftor 100 mg/150 mg                     | Un comprimé de Kalydeco 150 mg |
| 12 ans et plus                                                       | Un comprimé de tezacaftor/ivacaftor 100 mg/150 mg                     | Un comprimé de Kalydeco 150 mg |
| <b>Kalydeco en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor</b> |                                                                       |                                |
| 6 ans à moins de 12 ans, $< 30$ kg                                   | Deux comprimés d'ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor 37,5 mg/25 mg/50 mg | Un comprimé de Kalydeco 75 mg  |
| 6 ans à moins de 12 ans, $\geq 30$ kg                                | Deux comprimés d'ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor 75 mg/50 mg/100 mg  | Un comprimé de Kalydeco 150 mg |
| 12 ans et plus                                                       | Deux comprimés d'ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor 75 mg/50 mg/100 mg  | Un comprimé de Kalydeco 150 mg |

Prenez les doses du matin et du soir régulièrement à environ 12 heures d'intervalle avec un repas riche en graisses.

Vous devez continuer à utiliser tous vos autres médicaments, sauf si votre médecin vous dit d'arrêter l'un d'entre eux.

Si vous avez des problèmes hépatiques, modérés ou sévères, il pourra être nécessaire que votre médecin réduise la dose de vos comprimés, car votre foie n'éliminera pas le médicament aussi rapidement que chez les personnes ayant une fonction hépatique normale.

Ce médicament est pris par voie orale.

Les comprimés doivent être avalés entiers. Ne pas croquer, casser ou dissoudre les comprimés. Kalydeco comprimés doit être pris avec un repas riche en graisses.

Les repas ou collations riches en graisses sont notamment ceux qui sont préparés avec du beurre ou des huiles ou ceux contenant des œufs. Les autres aliments contenant des graisses sont :

- Fromage, lait entier, laitages entiers, yaourt, chocolat.
- Viandes, poissons gras.
- Avocat, houmous, produits à base de soja (tofu).
- Fruits à coque, barres ou boissons nutritives contenant des graisses.

### **Si vous avez pris plus de Kalydeco que vous n'auriez dû**

Vous pouvez ressentir des effets indésirables, notamment ceux mentionnés dans la rubrique 4 ci-après. Si c'est le cas, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien. Si possible, ayez votre médicament et cette notice avec vous.

### **Si vous oubliez de prendre Kalydeco**

Prenez la dose oubliée s'il s'est écoulé moins de 6 heures depuis l'heure de la prise oubliée. Sinon, attendez la dose suivante prévue à l'heure habituelle. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

### **Si vous arrêtez de prendre Kalydeco**

Vous devez prendre Kalydeco aussi longtemps que votre médecin le recommande. N'arrêtez pas de le prendre sans l'avis de votre médecin. Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

## **4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

### **Effets indésirables graves**

Douleurs abdominales (mal au ventre) et augmentations des taux sanguins d'enzymes hépatiques.

### **Signes possibles de problèmes hépatiques**

Des augmentations des taux sanguins d'enzymes hépatiques sont fréquentes chez les patients atteints de mucoviscidose et ont également été observées chez des patients prenant Kalydeco seul ou en association avec tezacaftor/ivacaftor ou avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor.

**Chez les patients prenant Kalydeco en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor, une atteinte hépatique et une détérioration de la fonction hépatique** ont été rapportées chez des patients présentant une maladie hépatique sévère. La détérioration de la fonction hépatique peut être grave et nécessiter une transplantation.

Les symptômes suivants peuvent être des signes de problèmes hépatiques :

- douleur ou gêne dans la partie supérieure droite de l'abdomen,
- jaunissement de la peau ou du blanc des yeux,

- perte d'appétit,
- nausées ou vomissements,
- urines foncées.

### **Dépression**

Les signes comprennent : humeur triste ou modification de l'humeur, anxiété, sentiment de mal-être émotionnel.

**Informez immédiatement votre médecin** si vous présentez l'un de ces symptômes.

### **Effets indésirables très fréquents** (pouvant toucher plus d'une personne sur 10)

- infection des voies respiratoires supérieures (rhume), y compris mal de gorge et congestion nasale,
- maux de tête,
- sensations vertigineuses,
- diarrhée,
- douleurs gastriques ou abdominales,
- modifications de la flore bactérienne présente dans les expectorations,
- augmentation des taux d'enzymes hépatiques (signes d'atteinte du foie),
- rash (éruption cutanée).

### **Effets indésirables fréquents** (pouvant toucher jusqu'à une personne sur 10)

- nez qui coule,
- mal aux oreilles, sensation anormale au niveau de l'oreille,
- tintements d'oreilles,
- rougeur dans l'oreille,
- troubles au niveau de la partie interne de l'oreille (sensations de vertige ou de tournoiement),
- problèmes de sinus (congestion des sinus),
- rougeur dans la gorge,
- masse dans le sein,
- envie de vomir (nausées),
- grippe,
- taux faible de sucre dans le sang (hypoglycémie),
- respiration anormale (essoufflement ou difficultés pour respirer),
- gaz intestinaux (flatulences),
- boutons et points noirs (acné),
- démangeaisons,
- augmentation du taux de créatine kinase (signe de destruction du tissu musculaire) montrée par les analyses de sang.

### **Effets indésirables peu fréquents** (pouvant toucher jusqu'à une personne sur 100)

- congestion de l'oreille,
- inflammation au niveau des seins,
- gonflement des seins chez les patients de sexe masculin,
- modifications des mamelons ou mamelons douloureux,
- respiration sifflante,
- augmentation de la pression artérielle.

### **Fréquence indéterminée** (la fréquence ne peut pas être estimée sur la base des données disponibles)

- atteinte du foie (atteinte hépatique),
- augmentation du taux de bilirubine (montrée par les analyses de sang effectuées pour un bilan hépatique).

## Effets indésirables supplémentaires chez les enfants et les adolescents

Les effets indésirables rapportés chez les enfants et les adolescents sont comparables à ceux observés chez les adultes. Cependant, des augmentations des taux sanguins d'enzymes hépatiques sont observées plus fréquemment chez les jeunes enfants.

## Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via [le système national de déclaration décrit en Annexe V](#). En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## 5. Comment conserver Kalydeco

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte, la plaquette et l'étiquette du flacon après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

## 6. Contenu de l'emballage et autres informations

### Ce que contient Kalydeco

La substance active est l'ivacaftor.

#### Kalydeco 75 mg comprimés pelliculés

Chaque comprimé pelliculé contient 75 mg d'ivacaftor.

#### Kalydeco 150 mg comprimés pelliculés

Chaque comprimé pelliculé contient 150 mg d'ivacaftor.

Les autres composants sont :

- Noyau du comprimé : cellulose microcristalline, lactose monohydraté, succinate d'acétate d'hypromellose, croscarmellose sodique, laurilsulfate de sodium (E487), silice colloïdale anhydre et stéarate de magnésium.
- Pelliculage : alcool polyvinylique, dioxyde de titane (E171), macrogol (PEG 3350), talc, laque aluminique d'indigotine (E132) et cire de carnauba.
- Encre d'impression : résine de shellac, oxyde de fer noir (E172), propylène glycol (E1520) et solution concentrée d'ammoniaque.

Voir la fin de la rubrique 2 - Kalydeco contient du lactose et du sodium.

## **Comment se présente Kalydeco et contenu de l’emballage extérieur**

Kalydeco 75 mg comprimés pelliculés se présente sous la forme de comprimés bleu clair, oblongs, de 12,7 mm × 6,8 mm, portant la mention « V 75 » imprimée à l’encre noire sur une face et unis sur l’autre face.

La présentation suivante est disponible :

- plaquette contenant 28 comprimés pelliculés dans une pochette en carton.

Kalydeco 150 mg comprimés pelliculés se présente sous la forme de comprimés bleu clair, oblongs, de 16,5 mm × 8,4 mm, portant la mention « V 150 » imprimée à l’encre noire sur une face et unis sur l’autre face.

Les présentations suivantes sont disponibles :

- plaquette contenant 28 comprimés pelliculés dans une pochette en carton ;
- plaquette contenant 56 comprimés pelliculés ;
- flacon contenant 56 comprimés pelliculés.

## **Titulaire de l’Autorisation de mise sur le marché et fabricant**

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited  
Unit 49, Block 5, Northwood Court, Northwood Crescent,  
Dublin 9, D09 T665,  
Irlande  
Tél. : +353 (0)1 761 7299

### **Fabricant**

Almac Pharma Services (Ireland) Limited  
Finnabair Industrial Estate  
Dundalk  
Co. Louth  
A91 P9KD  
Irlande

Almac Pharma Services Limited  
Seagoe Industrial Estate  
Craigavon  
Northern Ireland  
BT63 5UA  
Royaume-Uni

Millmount Healthcare Limited  
Block-7, City North Business Campus  
Stamullen  
Co. Meath  
K32 YD60  
Irlande

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché :

**België/Belgique/Belgien, България, Česká republika, Danmark, Deutschland, Eesti, France, Hrvatska, Ireland, Ísland, Κύπρος, Latvija, Lietuva, Luxembourg/Luxemburg, Magyarország, Malta, Nederland, Norge, Österreich, Polska, Portugal, România, Slovenija, Slovenská republika, Suomi/Finland, Sverige**

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited

Tél/Tel/Тел/Τηλ/Σίμι/Τηλ/Ρυη:

+353 (0) 1 761 7299

**España**

Vertex Pharmaceuticals Spain, S.L.

Tel: + 34 91 7892800

**Ελλάδα**

Vertex Φαρμακευτική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία

Τηλ: +30 (211) 2120535

**Italia**

Vertex Pharmaceuticals

(Italy) S.r.l.

Tel: +39 0697794000

**La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est**

#### **Autres sources d'information**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l'Agence européenne des médicaments <https://www.ema.europa.eu>. Il existe aussi des liens vers d'autres sites concernant les maladies rares et leur traitement.

## Notice : information de l'utilisateur

**Kalydeco 13,4 mg granulés en sachet**  
**Kalydeco 25 mg granulés en sachet**  
**Kalydeco 50 mg granulés en sachet**  
**Kalydeco 59,5 mg granulés en sachet**  
**Kalydeco 75 mg granulés en sachet**  
ivacaftor

**Veuillez lire attentivement cette notice avant que votre enfant prenne ce médicament, car elle contient des informations importantes pour lui.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez le médecin de votre enfant ou votre pharmacien.
- Ce médicament a été personnellement prescrit à votre enfant. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques à ceux de votre enfant.
- Si votre enfant ressent un quelconque effet indésirable, parlez-en à son médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

### Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Kalydeco et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant que votre enfant prenne Kalydeco
3. Comment utiliser Kalydeco
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Kalydeco
6. Contenu de l'emballage et autres informations

#### 1. Qu'est-ce que Kalydeco et dans quels cas est-il utilisé

Kalydeco contient comme substance active l'ivacaftor. L'ivacaftor agit au niveau de la protéine CFTR (*Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator*), une protéine qui forme un canal à la surface cellulaire et qui permet le transport de particules telles que les ions chlorures à l'intérieur de la cellule et en dehors de la cellule. Des mutations du gène *CFTR* (voir ci-dessous) entraînent une diminution du transport des ions chlorures chez les personnes atteintes de mucoviscidose. L'ivacaftor aide certaines protéines CFTR anormales à s'ouvrir plus souvent afin que les ions chlorures puissent entrer et sortir plus facilement.

Kalydeco granulés est indiqué :

- En monothérapie dans le traitement des nourrissons et des enfants âgés d'1 mois et plus et pesant de 3 kg à moins de 25 kg atteints de mucoviscidose porteurs d'une mutation *R117H* du gène *CFTR* ou de l'une des mutations de défaut de régulation du gène *CFTR* suivantes : *G551D*, *G1244E*, *G1349D*, *G178R*, *G551S*, *S1251N*, *S1255P*, *S549N* ou *S549R*.
- En association avec les granulés d'ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor chez les patients âgés de 2 ans à moins de 6 ans atteints de mucoviscidose porteurs d'au moins une mutation du gène *CFTR* répondant au traitement par Kalydeco en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor. Si Kalydeco a été prescrit à votre enfant en association avec les granulés d'ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor, veuillez lire la notice de ce médicament. Elle contient des informations importantes sur la façon de prendre ces deux médicaments

## 2. Quelles sont les informations à connaître avant que votre enfant prenne Kalydeco

### Votre enfant ne doit jamais prendre Kalydeco :

- s'il est allergique à l'ivacaftor ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

### Avertissements et précautions

Vous devez consulter le médecin de votre enfant avant que votre enfant prenne Kalydeco.

- Adressez-vous au médecin de votre enfant si votre enfant a une maladie du foie ou s'il en a eu une dans le passé. Il pourra être nécessaire d'adapter la dose du traitement.
- Des augmentations des taux sanguins d'enzymes hépatiques ont été observées chez certaines personnes recevant Kalydeco (seul ou en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor). Si votre enfant présente l'un des symptômes suivants, parlez-en immédiatement à son médecin, car ils peuvent être le signe d'un problème au niveau du foie :
  - douleur ou gêne dans la partie haute et droite de l'estomac (abdomen),
  - jaunissement de la peau ou du blanc des yeux,
  - perte de l'appétit,
  - nausées ou vomissements,
  - urines foncées.
- Avant et pendant le traitement, notamment la première année et en particulier si les analyses de sang de votre enfant avaient montré des taux élevés des enzymes hépatiques dans le passé, son médecin fera pratiquer certaines analyses de sang pour vérifier le bon fonctionnement de son foie.
- Des cas de dépression (incluant des idées et comportements suicidaires), apparaissant généralement au cours des trois premiers mois de traitement, ont été rapportés chez des patients traités par Kalydeco, notamment en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor. Consultez immédiatement le médecin de votre enfant si votre enfant présente l'un des symptômes suivants : humeur triste ou modification de l'humeur, anxiété, sentiment de mal-être émotionnel ou pensées d'automutilation ou de suicide, qui peuvent être des signes de dépression.
- Si votre enfant a une maladie des reins ou s'il en a eu une dans le passé, informez son médecin.
- Si votre enfant est porteur/porteuse de deux mutations de classe I (mutations connues pour ne pas produire de protéine CFTR), il/elle ne doit pas prendre Kalydeco car il/elle ne devrait pas répondre positivement à ce médicament.
- Kalydeco n'est pas recommandé chez les patients ayant reçu une greffe d'organe.
- Des cas de cataractes (une anomalie du cristallin de l'œil), sans effet sur la vision, ont été rapportés chez certains enfants et adolescents traités par Kalydeco (seul ou en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor). Le médecin de votre enfant pourra effectuer des examens ophtalmologiques avant et pendant le traitement.
- Kalydeco n'est destiné qu'aux patients porteurs d'au moins une des mutations du gène *CFTR* indiquées à la rubrique 1 (Qu'est-ce que Kalydeco et dans quels cas est-il utilisé).

### Enfants

Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les enfants âgés de moins d'1 mois car on ne sait pas si l'ivacaftor est sûr et efficace chez ces enfants.

Ce médicament ne doit pas être utilisé en association avec les granulés d'ivacaftor/tezacaftor/elixacaftor chez les enfants âgés de moins de 2 ans car on ne sait pas s'ils sont sûrs et efficaces chez eux.

### Autres médicaments et Kalydeco

Informez le médecin de votre enfant ou votre pharmacien si votre enfant utilise, a récemment utilisé ou pourrait utiliser tout autre médicament. Certains médicaments peuvent modifier la façon dont Kalydeco agit ou peuvent augmenter la probabilité de survenue d'effets indésirables. En particulier, informez le médecin de votre enfant si votre enfant prend l'un des médicaments mentionnés ci-dessous. Le médecin de votre enfant pourra décider d'ajuster la dose du traitement et il déterminera si des contrôles supplémentaires sont nécessaires.

- **Médicaments antifongiques** (utilisés dans le traitement des infections fongiques, ou mycoses) tels que le fluconazole, l'itraconazole, le kétoconazole, le posaconazole et le voriconazole.
- **Antibiotiques** (utilisés dans le traitement des infections bactériennes) tels que la clarithromycine, l'érythromycine, la rifabutine, la rifampicine et la télicycline.
- **Anticonvulsivants** (utilisés dans le traitement des crises d'épilepsie) tels que la carbamazépine, le phénobarbital et la phénytoïne.
- **Médicaments à base de plantes** : le millepertuis (*Hypericum perforatum*).
- **Immunosuppresseurs** (utilisés après une greffe d'organe) tels que la ciclosporine, l'évérolimus, le sirolimus et le tacrolimus.
- **Glucosides cardiotoniques** (utilisés dans le traitement de certaines affections cardiaques) tels que la digoxine.
- **Anticoagulants** (utilisés pour prévenir la formation de caillots de sang) tels que la warfarine.
- **Antidiabétiques** tels que le glimépiride et le glipizide.
- **Médicaments utilisés pour diminuer la pression artérielle** tels que le vérapamil.

### Kalydeco avec des aliments et boissons

Évitez de donner à votre enfant des aliments ou boissons contenant du pamplemousse pendant le traitement, car ceux-ci peuvent augmenter les effets indésirables de Kalydeco en augmentant la quantité d'ivacaftor dans l'organisme de votre enfant.

### Conduite de véhicules et utilisation de machines

Kalydeco peut provoquer des sensations vertigineuses. Votre enfant ne doit pas faire de la bicyclette ni effectuer d'autres activités nécessitant toute son attention s'il ressent des sensations vertigineuses.

### Kalydeco contient du lactose et du sodium

Si le médecin de votre enfant vous a informé(e) que votre enfant présente une intolérance à certains sucres, contactez-le avant que votre enfant prenne ce médicament.

Kalydeco contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par dose, c'est-à-dire qu'il est essentiellement « sans sodium ».

## 3. Comment utiliser Kalydeco

Veillez à toujours donner ce médicament à votre enfant en suivant exactement les indications de son médecin. Vérifiez auprès de son médecin en cas de doute.

Le médecin de votre enfant déterminera la dose appropriée pour votre enfant. Votre enfant doit continuer à utiliser tous ses autres médicaments, sauf si son médecin recommande d'arrêter l'un d'entre eux.

Les doses recommandées de Kalydeco sont présentées dans le tableau 1 ci-dessous.

**Tableau 1 : Recommandations posologiques**

| Âge/poids                                                            | Dose du matin                                                            | Dose du soir                           |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Kalydeco en monothérapie</b>                                      |                                                                          |                                        |
| 1 mois à moins de 2 mois, ≥ 3 kg                                     | Un sachet de Kalydeco 13,4 mg granulés                                   | Pas de prise le soir                   |
| 2 mois à moins de 4 mois, ≥ 3 kg                                     | Un sachet de Kalydeco 13,4 mg granulés                                   | Un sachet de Kalydeco 13,4 mg granulés |
| 4 mois à moins de 6 mois, ≥ 5 kg                                     | Un sachet de Kalydeco 25 mg granulés                                     | Un sachet de Kalydeco 25 mg granulés   |
| 6 mois et plus, ≥ 5 kg à < 7 kg                                      | Un sachet de Kalydeco 25 mg granulés                                     | Un sachet de Kalydeco 25 mg granulés   |
| 6 mois et plus, ≥ 7 kg à < 14 kg                                     | Un sachet de Kalydeco 50 mg granulés                                     | Un sachet de Kalydeco 50 mg granulés   |
| 6 mois et plus, ≥ 14 kg à < 25 kg                                    | Un sachet de Kalydeco 75 mg granulés                                     | Un sachet de Kalydeco 75 mg granulés   |
| 6 mois et plus, ≥ 25 kg                                              | Se reporter à la notice de Kalydeco comprimés.                           |                                        |
| <b>Kalydeco en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor</b> |                                                                          |                                        |
| 2 ans à moins de 6 ans, ≥ 10 kg à < 14 kg                            | Un sachet d'ivacaftor 60 mg/tezacaftor 40 mg/elexacaftor 80 mg granulés  | Un sachet de Kalydeco 59,5 mg granulés |
| 2 ans à moins de 6 ans, ≥ 14 kg                                      | Un sachet d'ivacaftor 75 mg/tezacaftor 50 mg/elexacaftor 100 mg granulés | Un sachet de Kalydeco 75 mg granulés   |

Votre enfant doit prendre les doses du matin et du soir régulièrement à environ 12 heures d'intervalle.

**Si votre enfant a des problèmes hépatiques**, son médecin pourra réduire la dose de Kalydeco, car dans ce cas le foie de votre enfant n'élimine pas le médicament aussi rapidement que chez les enfants ayant une fonction hépatique normale.

- **Problèmes hépatiques modérés chez les enfants âgés de 6 mois et plus** : la dose peut être réduite à la moitié de la dose indiquée dans le tableau ci-dessus, soit un sachet une fois par jour.
- **Problèmes hépatiques sévères chez les enfants âgés de 6 mois et plus** : l'utilisation n'est pas recommandée, mais le médecin de votre enfant déterminera s'il est approprié pour votre enfant de prendre ce médicament, auquel cas la dose (indiquée dans le tableau ci-dessus) doit être réduite à un sachet un jour sur deux.
- **Problèmes hépatiques chez les enfants âgés d'1 mois à 6 mois** : l'utilisation n'est pas recommandée.

Kalydeco est pris par voie orale.

Chaque sachet est à usage unique.

Mode d'emploi :

- Tenir le sachet de granulés avec le trait de coupe vers le haut.
- Agiter doucement le sachet pour que le contenu se dépose.
- Ouvrir le sachet en le déchirant ou en le découpant le long du trait de coupe.
- Mélanger tout le contenu d'un sachet avec 5 mL d'aliment semi-liquide ou de liquide adapté à l'âge. L'aliment ou le liquide servant à la préparation du mélange doit être à température ambiante ou inférieure. Les aliments semi-liquides ou les liquides adaptés à l'âge sont par exemple : compotes de fruits ou purées de légumes, yaourt, eau, lait, lait maternel, préparation infantile ou jus de fruit.

- Une fois le médicament mélangé, il doit être immédiatement administré à votre enfant. Si cela n'est pas possible, il devra être administré au plus tard dans l'heure suivant la réalisation du mélange. Il convient de bien s'assurer que le mélange est ingéré immédiatement et en totalité.
- Un repas ou une collation riche en graisses doivent être pris immédiatement avant ou après le médicament (des exemples de repas ou collations riches en graisses sont présentés ci-dessous).

Les repas ou collations riches en graisses sont notamment ceux qui sont préparés avec du beurre ou des huiles ou ceux contenant des œufs. Les autres aliments contenant des graisses sont :

- Fromage, lait entier, laitages entiers, yaourt, lait maternel, préparation infantile, chocolat.
- Viandes, poissons gras.
- Avocat, houmous, produits à base de soja (tofu).
- Fruits à coque, barres ou boissons nutritives contenant des graisses.

### **Si votre enfant a pris plus de Kalydeco qu'il n'aurait dû**

Votre enfant pourrait ressentir des effets indésirables, notamment ceux mentionnés dans la rubrique 4 ci-après. Si c'est le cas, demandez conseil au médecin de votre enfant ou à votre pharmacien. Si possible, ayez le médicament de votre enfant et cette notice avec vous.

### **Si vous oubliez de donner Kalydeco à votre enfant**

Donnez la dose oubliée s'il s'est écoulé moins de 6 heures depuis l'heure de la prise oubliée. Sinon, attendez la dose suivante prévue à l'heure habituelle. Ne donnez pas de dose double à votre enfant pour compenser la dose que vous avez oublié de donner.

### **Si vous arrêtez de donner Kalydeco à votre enfant**

Vous devez donner Kalydeco à votre enfant aussi longtemps que son médecin le recommande. N'arrêtez pas sans l'avis de son médecin. Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations au médecin de votre enfant ou à votre pharmacien.

## **4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

### **Effets indésirables graves**

Douleurs abdominales (mal au ventre) et augmentations des taux sanguins d'enzymes hépatiques.

### **Signes possibles de problèmes hépatiques**

Les augmentations des taux sanguins d'enzymes hépatiques sont fréquentes chez les patients atteints de mucoviscidose et ont également été observées chez des patients prenant Kalydeco seul ou en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor.

**Chez les patients prenant Kalydeco en association avec ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor, une atteinte hépatique et une détérioration de la fonction hépatique** ont été rapportées chez des patients présentant une maladie hépatique sévère. La détérioration de la fonction hépatique peut être grave et nécessiter une transplantation.

Les symptômes suivants peuvent être des signes de problèmes hépatiques :

- douleur ou gêne dans la partie supérieure droite de l'abdomen,
- jaunissement de la peau ou du blanc des yeux,
- perte d'appétit,
- nausées ou vomissements,

- urines foncées.

### **Dépression**

Les signes comprennent : humeur triste ou modification de l'humeur, anxiété, sentiment de mal-être émotionnel.

Si votre enfant présente l'un de ces symptômes, informez immédiatement son médecin.

### **Effets indésirables très fréquents** (pouvant toucher plus d'une personne sur 10)

- infection des voies respiratoires supérieures (rhume), y compris mal de gorge et congestion nasale,
- maux de tête,
- sensations vertigineuses,
- diarrhée,
- douleurs gastriques ou abdominales,
- modifications de la flore bactérienne présente dans les expectorations,
- augmentation des taux d'enzymes hépatiques (signes d'atteinte du foie),
- rash (éruption cutanée).

### **Effets indésirables fréquents** (pouvant toucher jusqu'à une personne sur 10)

- nez qui coule,
- mal aux oreilles, sensation anormale au niveau de l'oreille,
- tintements d'oreilles,
- rougeur dans l'oreille,
- troubles au niveau de la partie interne de l'oreille (sensations de vertige ou de tournoiement),
- problèmes de sinus (congestion des sinus),
- rougeur dans la gorge,
- masse dans le sein,
- envie de vomir (nausées),
- grippe,
- taux faible de sucre dans le sang (hypoglycémie),
- respiration anormale (essoufflement ou difficultés pour respirer),
- gaz intestinaux (flatulences),
- boutons et points noirs (acné),
- démangeaisons,
- augmentation du taux de créatine kinase (signe de destruction du tissu musculaire) montrée par les analyses de sang.

### **Effets indésirables peu fréquents** (pouvant toucher jusqu'à une personne sur 100)

- congestion de l'oreille,
- inflammation au niveau des seins,
- gonflement des seins chez les garçons,
- modifications des mamelons ou mamelons douloureux,
- respiration sifflante,
- augmentation de la pression artérielle.

### **Fréquence indéterminée** (la fréquence ne peut pas être estimée sur la base des données disponibles)

- atteinte du foie (atteinte hépatique),
- augmentation du taux de bilirubine (montrée par les analyses de sang effectuées pour un bilan hépatique).

### **Effets indésirables supplémentaires chez les enfants et adolescents**

Les effets indésirables rapportés chez les enfants et les adolescents sont comparables à ceux observés chez les adultes. Cependant, des augmentations des taux sanguins d'enzymes hépatiques sont observées plus fréquemment chez les jeunes enfants.

## **Déclaration des effets secondaires**

Si votre enfant ressent un quelconque effet indésirable, parlez-en à son médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration décrit en [Annexe V](#). En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## **5. Comment conserver Kalydeco**

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte, la pochette et le sachet après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.

Le médicament mélangé est stable pendant une heure.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

## **6. Contenu de l'emballage et autres informations**

### **Ce que contient Kalydeco**

La substance active est l'ivacaftor.

Kalydeco 13,4 mg granulés en sachet :

Chaque sachet contient 13,4 mg d'ivacaftor.

Kalydeco 25 mg granulés en sachet :

Chaque sachet contient 25 mg d'ivacaftor.

Kalydeco 50 mg granulés en sachet :

Chaque sachet contient 50 mg d'ivacaftor.

Kalydeco 59,5 mg granulés en sachet :

Chaque sachet contient 59,5 mg d'ivacaftor.

Kalydeco 75 mg granulés en sachet :

Chaque sachet contient 75 mg d'ivacaftor.

Les autres composants sont : silice colloïdale anhydre, croscarmellose sodique, succinate d'acétate d'hypromellose, lactose monohydraté, stéarate de magnésium, mannitol, sucralose et laurilsulfate de sodium (E487).

Voir la fin de la rubrique 2 - Kalydeco contient du lactose et du sodium.

## **Comment se présente Kalydeco et contenu de l'emballage extérieur**

Kalydeco 13,4 mg granulés en sachet se présente sous forme de granulés de couleur blanche à blanc cassé.

Kalydeco 25 mg granulés en sachet se présente sous forme de granulés de couleur blanche à blanc cassé.

Kalydeco 50 mg granulés en sachet se présente sous forme de granulés de couleur blanche à blanc cassé.

Kalydeco 59,5 mg granulés en sachet se présente sous forme de granulés de couleur blanche à blanc cassé.

Kalydeco 75 mg granulés en sachet se présente sous forme de granulés de couleur blanche à blanc cassé.

Les granulés sont conditionnés en sachets.

Kalydeco 13,4 mg granulés en sachet, Kalydeco 25 mg granulés en sachet, Kalydeco 50 mg granulés en sachet et Kalydeco 75 mg granulés en sachet :

Boîte de 56 sachets (contenant 4 pochettes individuelles contenant chacune 14 sachets).

Kalydeco 13,4 mg granulés en sachet, Kalydeco 59,5 mg granulés en sachet et Kalydeco 75 mg granulés en sachet :

Boîte de 28 sachets (contenant 4 pochettes individuelles contenant chacune 7 sachets).

## **Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant**

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited  
Unit 49, Block 5, Northwood Court, Northwood Crescent,  
Dublin 9, D09 T665,  
Irlande  
Tél. : +353 (0)1 761 7299

## **Fabricant**

Almac Pharma Services (Ireland) Limited  
Finnabair Industrial Estate  
Dundalk  
Co. Louth  
A91 P9KD  
Irlande

Almac Pharma Services Limited  
Seagoe Industrial Estate  
Craigavon  
Northern Ireland  
BT63 5UA  
Royaume-Uni

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché :

**België/Belgique/Belgien, България, Česká republika, Danmark, Deutschland, Eesti, France, Hrvatska, Ireland, Ísland, Κύπρος, Latvija, Lietuva, Luxembourg/Luxemburg, Magyarország, Malta, Nederland, Norge, Österreich, Polska, Portugal, România, Slovenija, Slovenská republika, Suomi/Finland, Sverige**

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited  
Tél/Tel/Тел/Tlf/Sími/Τηλ/Puh:  
+353 (0) 1 761 7299

**España**

Vertex Pharmaceuticals Spain, S.L.  
Tel: + 34 91 7892800

**Ελλάδα**

Vertex Φαρμακευτική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία  
Τηλ: +30 (211) 2120535

**Italia**

Vertex Pharmaceuticals  
(Italy) S.r.l.  
Tel: +39 0697794000

**La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est**

**Autres sources d'information**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l'Agence européenne des médicaments <https://www.ema.europa.eu>. Il existe aussi des liens vers d'autres sites concernant les maladies rares et leur traitement.