

## **ANNEXE I**

### **RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté. Voir rubrique 4.8 pour les modalités de déclaration des effets indésirables.

## **1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT**

Oyavas 25 mg/mL solution à diluer pour perfusion.

## **2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE**

Chaque mL de solution à diluer contient 25 mg de bevacizumab\*.

Chaque flacon de 4 mL contient 100 mg de bevacizumab.

Chaque flacon de 16 mL contient 400 mg de bevacizumab.

Pour la dilution et autres recommandations de manipulation, voir rubrique 6.6.

\*Bevacizumab est un anticorps monoclonal humanisé recombinant produit par la technologie de l'ADN recombinant dans des cellules ovariennes de Hamster Chinois.

Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1.

## **3. FORME PHARMACEUTIQUE**

Solution à diluer pour perfusion (solution stérile).

Liquide incolore à jaune pâle ou brun pâle, légèrement opalescent.

## **4. INFORMATIONS CLINIQUES**

### **4.1 Indications thérapeutiques**

Oyavas, en association à une chimiothérapie à base de fluoropyrimidine, est indiqué chez les patients adultes atteints de cancer colorectal métastatique.

Oyavas, en association au paclitaxel, est indiqué en traitement de première ligne chez les patients adultes atteints de cancer du sein métastatique. Pour une information complémentaire concernant le statut du récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2), référez-vous à la rubrique 5.1.

Oyavas en association à la capécitabine, est indiqué en traitement de première ligne, chez les patients adultes atteints de cancer du sein métastatique, pour lesquels un traitement avec d'autres options de chimiothérapie incluant des taxanes ou des anthracyclines, n'est pas considéré comme approprié. Les patients ayant reçu un traitement à base de taxanes et d'anthracyclines en situation adjuvante au cours des 12 derniers mois doivent être exclus d'un traitement par Oyavas en association à la capécitabine. Pour une information complémentaire concernant le statut HER2, référez-vous à la rubrique 5.1.

Oyavas, en association à une chimiothérapie à base de sels de platine, est indiqué en traitement de première ligne chez les patients adultes atteints de cancer bronchique non à petites cellules, avancé et non opérable, métastatique ou en rechute, dès lors que l'histologie n'est pas à prédominance épidermoïde.

Oyavas, en association à l'erlotinib, est indiqué en traitement de première ligne chez les patients adultes atteints de cancer bronchique non à petites cellules non épidermoïde, avancé et non opérable,

métastatique ou en rechute, et présentant des mutations activatrices de l'EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) (voir rubrique 5.1).

Oyavas, en association à l'interféron alfa-2a, est indiqué en traitement de première ligne, chez les patients adultes atteints de cancer du rein avancé et/ou métastatique.

Oyavas, en association au carboplatine et au paclitaxel, est indiqué en traitement de première ligne des stades avancés (stades FIGO [Fédération Internationale de Gynécologie Obstétrique] III B, III C et IV) du cancer épithélial de l'ovaire, des trompes de Fallope ou péritonéal primitif chez des patientes adultes (Voir rubrique 5.1).

Oyavas, en association au carboplatine et à la gemcitabine ou en association au carboplatine et au paclitaxel, est indiqué chez les patientes adultes atteintes d'un cancer épithélial de l'ovaire, des trompes de Fallope ou péritonéal primitif, en première récurrence, sensible aux sels de platine et qui n'ont pas été préalablement traitées par du bevacizumab ou d'autres inhibiteurs du VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) ou d'autres agents ciblant le récepteur du VEGF.

Oyavas, en association au paclitaxel, topotécan ou à la doxorubicine liposomale pégylée, est indiqué chez les patientes adultes atteintes d'un cancer épithélial de l'ovaire, des trompes de Fallope ou péritonéal primitif, en rechute, résistant aux sels de platine, qui n'ont pas reçu plus de deux protocoles antérieurs de chimiothérapie et qui n'ont pas été préalablement traitées par du bevacizumab ou d'autres inhibiteurs du VEGF ou d'autres agents ciblant le récepteur du VEGF (voir rubrique 5.1).

Oyavas, en association au paclitaxel et au cisplatine, ou bien en association au paclitaxel et au topotécan chez les patientes ne pouvant pas recevoir de traitement à base de sels de platine, est indiqué chez les patientes adultes atteintes d'un carcinome du col de l'utérus persistant, en rechute ou métastatique (voir rubrique 5.1).

## **4.2 Posologie et mode d'administration**

Ne pas agiter le flacon.

Oyavas doit être administré sous le contrôle d'un médecin expérimenté dans l'utilisation des agents antinéoplasiques.

### Posologie

#### Cancer colorectal métastatique (CCRM)

Oyavas est recommandé soit à la posologie de 5 mg/kg ou 10 mg/kg de poids corporel administré une fois toutes les 2 semaines, soit à la posologie de 7,5 mg/kg ou 15 mg/kg de poids corporel administré une fois toutes les 3 semaines, en perfusion intraveineuse.

Il est recommandé de poursuivre le traitement jusqu'à progression de la maladie sous-jacente ou toxicité inacceptable.

#### Cancer du sein métastatique (CSm)

Oyavas est recommandé à la posologie de 10 mg/kg de poids corporel administré une fois toutes les 2 semaines ou à la posologie de 15 mg/kg de poids corporel, administré une fois toutes les 3 semaines, en perfusion intraveineuse.

Il est recommandé de poursuivre le traitement jusqu'à progression de la maladie sous-jacente ou toxicité inacceptable.

### Cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC)

#### *Traitement de première ligne du CBNPC non épidermoïde en association à une chimiothérapie à base de sels de platine*

Oyavas est administré en association à une chimiothérapie à base de sels de platine jusqu'à 6 cycles de traitement, suivis d'Oyavas en monothérapie jusqu'à progression de la maladie.

Oyavas est recommandé à la posologie de 7,5 mg/kg ou 15 mg/kg de poids corporel administré une fois toutes les 3 semaines, en perfusion intraveineuse.

Le bénéfice clinique chez les patients atteints de CBNPC a été démontré aux posologies de 7,5 mg/kg et 15 mg/kg (voir rubrique 5.1).

Il est recommandé de poursuivre le traitement jusqu'à progression de la maladie sous-jacente ou toxicité inacceptable.

#### *Traitement de première ligne du CBNPC non épidermoïde présentant des mutations activatrices de l'EGFR en association à l'erlotinib*

La recherche de la mutation de l'EGFR doit être réalisée avant l'initiation du traitement par l'association Oyavas et erlotinib. Il est important de choisir une méthode robuste et bien validée pour éviter les faux négatifs ou faux positifs.

Oyavas est recommandé, en association à l'erlotinib, à la posologie de 15 mg/kg de poids corporel administré une fois toutes les 3 semaines, en perfusion intraveineuse.

Il est recommandé de poursuivre le traitement par Oyavas en association à l'erlotinib jusqu'à progression de la maladie.

Pour la posologie et le mode d'administration de l'erlotinib, veuillez-vous référer au Résumé des Caractéristiques du Produit de l'erlotinib.

### Cancer du rein avancé et/ou métastatique (CRm)

Oyavas est recommandé à la posologie de 10 mg/kg de poids corporel administré une fois toutes les 2 semaines, en perfusion intraveineuse.

Il est recommandé de poursuivre le traitement jusqu'à progression de la maladie sous-jacente ou toxicité inacceptable.

### Cancer épithélial de l'ovaire, des trompes de Fallope ou péritonéal primitif

#### *Traitement de première ligne :*

Oyavas est administré en association au carboplatine et au paclitaxel jusqu'à 6 cycles de traitement, suivis d'Oyavas en monothérapie en continu jusqu'à progression de la maladie ou jusqu'à 15 mois maximum ou jusqu'à toxicité inacceptable, selon ce qui survient en premier.

Oyavas est recommandé à la posologie de 15 mg/kg de poids corporel administré une fois toutes les 3 semaines en perfusion intraveineuse.

#### *Traitement de la maladie récidivante sensible aux sels de platine :*

Oyavas est administré en association soit au carboplatine et à la gemcitabine pendant 6 cycles, et jusqu'à 10 cycles ou soit en association au carboplatine et paclitaxel pendant 6 cycles, et jusqu'à 8 cycles, suivis d'Oyavas en monothérapie en continu jusqu'à progression de la maladie. Oyavas est

recommandé à la posologie de 15 mg/kg de poids corporel administré une fois toutes les 3 semaines en perfusion intraveineuse.

#### *Traitement de la maladie récidivante résistante aux sels de platine :*

Oyavas est administré en association avec l'un des agents suivants - paclitaxel, topotécan (administré chaque semaine) ou doxorubicine liposomale pégylée. Oyavas est recommandé à la posologie de 10 mg/kg de poids corporel administré une fois toutes les 2 semaines, en perfusion intraveineuse. Lorsque Oyavas est administré en association avec le topotécan (administré aux jours 1-5, toutes les 3 semaines), Oyavas est recommandé à la posologie de 15 mg/kg de poids corporel administré une fois toutes les 3 semaines en perfusion intraveineuse. Il est recommandé de poursuivre le traitement jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable (voir rubrique 5.1, étude MO22224).

#### *Cancer du col de l'utérus*

Oyavas est administré en association avec l'un des protocoles de chimiothérapie suivants : paclitaxel et cisplatine ou paclitaxel et topotécan.

Oyavas est recommandé à la posologie de 15 mg/kg de poids corporel administré une fois toutes les 3 semaines en perfusion intraveineuse.

Il est recommandé de poursuivre le traitement jusqu'à progression de la maladie sous-jacente ou toxicité inacceptable (voir rubrique 5.1).

#### *Populations particulières*

##### *Personnes âgées*

Aucune adaptation de la dose n'est nécessaire chez les patients âgés de 65 ans et plus.

##### *Insuffisants rénaux*

La tolérance et l'efficacité n'ont pas été étudiées chez les patients insuffisants rénaux (voir rubrique 5.2).

##### *Insuffisants hépatiques*

La tolérance et l'efficacité n'ont pas été étudiées chez les patients insuffisants hépatiques (voir rubrique 5.2).

#### *Population pédiatrique*

La sécurité et l'efficacité du bevacizumab chez les enfants âgés de moins de 18 ans n'ont pas été établies. Les données actuellement disponibles sont décrites en rubriques 4.8, 5.1 et 5.2 mais aucune recommandation sur la posologie ne peut être donnée.

Il n'existe aucune utilisation pertinente du bevacizumab au sein de la population pédiatrique dans les indications de traitement des cancers du côlon, du rectum, du sein, du poumon, de l'ovaire, des trompes de Fallope, du péritoine, du col de l'utérus et du rein.

#### *Mode d'administration*

Oyavas doit être injecté par voie intraveineuse. La dose initiale doit être administrée par une perfusion intraveineuse de 90 minutes. Si la première perfusion est bien tolérée, la deuxième perfusion peut être administrée en 60 minutes. Si la perfusion administrée en 60 minutes est bien tolérée, toutes les perfusions ultérieures pourront être administrées en 30 minutes.

Ne pas administrer par voie I.V. rapide ou en bolus.

Une réduction de dose n'est pas recommandée en cas de survenue d'effets indésirables. Si nécessaire, le traitement doit être soit arrêté de façon définitive, soit suspendu de façon temporaire, comme décrit en rubrique 4.4.

#### Précautions à prendre avant la manipulation ou l'administration du médicament

Pour les instructions concernant la dilution du médicament avant administration, voir la rubrique 6.6. Les perfusions d'Oyavas ne doivent pas être administrées, ou mélangées, avec des solutions de glucose. Ce médicament ne doit pas être mélangé avec d'autres médicaments à l'exception de ceux mentionnés dans la rubrique 6.6.

### **4.3 Contre-indications**

- Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1.
- Hypersensibilité aux produits des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO) ou à d'autres anticorps recombinants humains ou humanisés.
- Grossesse (voir rubrique 4.6).

### **4.4 Mises en garde spéciales et précautions d'emploi**

#### Traçabilité

Afin d'améliorer la traçabilité des médicaments biologiques, le nom et le numéro de lot du produit administré doivent être clairement enregistrés.

#### Perforations gastro-intestinales (GI) et fistules (voir rubrique 4.8)

Les patients traités par Oyavas peuvent être exposés à un risque accru de perforation gastro-intestinale et de perforation de la vésicule biliaire. Chez les patients ayant un cancer colorectal métastatique, une réaction inflammatoire intra abdominale peut être un facteur de risque de perforation gastro-intestinale, de ce fait, des précautions seront prises lors du traitement de ces patients. Une radiothérapie préalable est un facteur de risque de perforation GI chez les patientes traitées par bevacizumab pour un cancer du col de l'utérus persistant, en rechute ou métastatique et tous les patients présentant des perforations GI avaient des antécédents de radiothérapies préalables. La survenue d'une perforation gastro-intestinale impose l'arrêt définitif du traitement.

#### Fistule GI-vaginales dans l'étude GOG-0240

Les patientes traitées par bevacizumab pour un cancer du col de l'utérus persistant, en rechute ou métastatique ont un risque plus élevé de développer des fistules entre le vagin et toute partie du tractus GI (fistules GI-vaginales). Une radiothérapie préalable est un facteur de risque majeur de développement de fistules GI-vaginales et toutes les patientes présentant des fistules GI-vaginales avaient des antécédents de radiothérapie préalable. Une récurrence du cancer dans la zone pré-irradiée (radiothérapie préalable) est un facteur de risque supplémentaire important de développement de fistules GI-vaginales.

#### Fistules non GI (voir rubrique 4.8)

Les patients traités par bevacizumab peuvent être exposés à un risque accru de survenue de fistule. Oyavas doit être définitivement arrêté chez les patients atteints de fistule trachéo-œsophagienne (TO) ou toute autre fistule de Grade 4 (US National Cancer Institute – Common Terminology Criteria for Adverse Events [NCI-CTCAE v.3]). Les données disponibles sont limitées quant à la poursuite du bevacizumab chez les patients présentant d'autres types de fistule.

En cas de fistule interne autre que celles du tractus gastro-intestinal, l'arrêt du traitement par Oyavas doit être envisagé.

#### Complications de la cicatrisation des plaies (voir rubrique 4.8)

Le bevacizumab serait susceptible d'altérer le processus de cicatrisation des plaies. Des complications graves de la cicatrisation des plaies, incluant des complications anastomotiques, d'issue fatale, ont été rapportées. Le traitement ne doit pas être initié pendant au moins 28 jours après une intervention chirurgicale lourde, ou tant que la plaie chirurgicale n'est pas totalement cicatrisée. En cas de complications de la cicatrisation d'une plaie pendant le traitement, celui-ci doit être interrompu jusqu'à la cicatrisation totale. Le traitement doit être suspendu lorsqu'une intervention chirurgicale est planifiée.

Des cas de fasciite nécrosante, dont certains d'issue fatale, ont été rapportés rarement chez des patients traités par bevacizumab. Cette condition est généralement secondaire à des complications de la cicatrisation des plaies, à une perforation gastro-intestinale ou à une formation de fistules. Le traitement par Oyavas doit être arrêté chez les patients développant une fasciite nécrosante ; un traitement approprié doit être rapidement initié.

#### Hypertension artérielle (voir rubrique 4.8)

Une majoration de l'incidence de l'hypertension artérielle a été observée chez les patients traités par bevacizumab. Les données de tolérance clinique suggèrent que l'incidence de l'hypertension artérielle est vraisemblablement dose-dépendante. Toute hypertension artérielle préexistante doit être efficacement contrôlée avant l'instauration du traitement par Oyavas. Aucune information n'est disponible quant à l'effet du bevacizumab chez les patients présentant une hypertension artérielle non contrôlée à l'instauration du traitement.

La surveillance de la pression artérielle est recommandée au cours du traitement.

Dans la majorité des cas, l'hypertension artérielle a été efficacement contrôlée par un traitement antihypertenseur standard, adapté à la situation individuelle du patient. L'utilisation de diurétiques n'est pas recommandée pour contrôler l'hypertension artérielle des patients traités par une chimiothérapie à base de cisplatine. Oyavas doit être définitivement arrêté si l'hypertension artérielle médicalement significative ne peut pas être contrôlée efficacement par un traitement antihypertenseur ou en cas de survenue de crise hypertensive ou d'encéphalopathie hypertensive.

#### Syndrome d'encéphalopathie postérieure réversible (SEPR) (voir rubrique 4.8)

Il a été rarement rapporté que des patients traités par bevacizumab développaient des signes et symptômes compatibles avec un Syndrome d'Encéphalopathie Postérieure Réversible (SEPR), un trouble neurologique rare, pouvant se manifester, entre autres, par les signes et symptômes suivants : attaques, céphalées, état mental altéré, troubles de la vision, cécité corticale, avec ou sans hypertension associée. Le diagnostic de SEPR requiert une confirmation par imagerie cérébrale, de préférence une imagerie par résonance magnétique (IRM). Chez les patients qui développent un SEPR, le traitement spécifique des symptômes, incluant le contrôle de l'hypertension est recommandé ainsi que l'arrêt d'Oyavas. Les conséquences en termes de tolérance d'une reprise du traitement par bevacizumab chez les patients ayant préalablement développé un SEPR ne sont pas connues.

#### Protéinurie (voir rubrique 4.8)

Les patients ayant des antécédents d'hypertension artérielle peuvent être exposés à un risque accru de protéinurie lorsqu'ils sont traités par bevacizumab. Certaines données suggèrent que l'apparition d'une protéinurie de tout grade (NCI-CTCAE v.3) peut être liée à la dose. La surveillance de la protéinurie par analyse d'urine à la bandelette est recommandée avant le début du traitement et au cours de celui-ci. Des cas de protéinurie de grade 4 (syndrome néphrotique) ont été observés chez jusqu'à 1,4 % des

patients traités par bevacizumab. Le traitement doit être arrêté définitivement en cas de syndrome néphrotique (NCI- CTCAE v.3).

#### Thromboembolies artérielles (voir rubrique 4.8)

Dans les études cliniques, l'incidence des effets thromboemboliques artériels, incluant des accidents vasculaires cérébraux (AVC), des accidents ischémiques transitoires (AIT) et des infarctus du myocarde (IM), a été plus élevée chez les patients recevant le bevacizumab en association à une chimiothérapie que chez les patients recevant une chimiothérapie seule.

Les patients recevant bevacizumab plus une chimiothérapie ayant des antécédents thromboemboliques artériels ou de diabète ou âgés de plus de 65 ans, ont un risque majoré d'effet thromboembolique artériel pendant le traitement. La prudence est nécessaire lors du traitement de ces patients par Oyavas.

La survenue d'un accident thromboembolique impose l'arrêt définitif du traitement.

#### Thromboembolies veineuses (voir rubrique 4.8)

Les patients recevant bevacizumab sont susceptibles de présenter des réactions thromboemboliques veineuses, y compris une embolie pulmonaire.

Les patientes traitées par bevacizumab pour un cancer du col de l'utérus persistant, en rechute ou métastatique en association au paclitaxel et au cisplatine peuvent avoir un risque plus élevé de présenter des événements thromboemboliques veineux.

Oyavas doit être arrêté chez les patients présentant des effets thromboemboliques mettant en jeu le pronostic vital (grade 4), notamment une embolie pulmonaire (NCI-CTCAE v.3). Les patients présentant des effets thromboemboliques de grade  $\leq 3$  doivent être étroitement surveillés (NCI-CTCAE v.3).

#### Hémorragies

Les patients traités par bevacizumab ont un risque hémorragique majoré, notamment d'hémorragie liée à la tumeur. La survenue d'une hémorragie de grade 3 ou 4 au cours du traitement impose l'arrêt définitif du traitement par bevacizumab (NCI-CTCAE v.3) (voir rubrique 4.8).

Sur la base de résultats d'imagerie ou la présence de signes ou symptômes cliniques, les patients présentant des métastases du système nerveux central (SNC) non traitées étaient systématiquement exclus des études cliniques avec bevacizumab. De ce fait, chez ces patients, le risque d'hémorragie du SNC n'a pas été évalué de manière prospective au cours d'études cliniques randomisées (voir rubrique 4.8). Les patients doivent être surveillés pour des signes et symptômes d'hémorragie du SNC. Le traitement par Oyavas doit être arrêté en cas d'hémorragie cérébrale.

Aucune information n'est disponible quant au profil de tolérance du bevacizumab chez les patients présentant une prédisposition congénitale aux hémorragies, une coagulopathie acquise ou recevant un anticoagulant à pleine dose pour le traitement d'un événement thromboembolique avant l'instauration du traitement par bevacizumab. En effet, ces patients étaient exclus des études cliniques. Le traitement sera donc instauré avec prudence chez de tels patients. Néanmoins, les patients qui ont développé une thrombose veineuse au cours du traitement et qui ont été traités simultanément par la warfarine à pleine dose et par bevacizumab n'ont pas présenté une fréquence accrue d'hémorragies de grade 3 ou plus (NCI-CTCAE v.3).

#### Hémorragies pulmonaires/hémoptysies

Les patients atteints d'un cancer bronchique non à petites cellules traités par bevacizumab peuvent être exposés à un risque d'hémorragie pulmonaire/hémoptyisie grave et dans certains cas, fatal. Les patients

ayant récemment présenté une hémorragie pulmonaire/hémoptysie (> 2,5 mL de sang rouge) ne doivent pas être traités par Oyavas.

#### Anévrisme et dissections artérielles

L'utilisation d'inhibiteurs des voies du VEGF chez les patients souffrant ou non d'hypertension peut favoriser la formation d'anévrismes et/ou de dissections artérielles. Avant l'instauration d'Oyavas, ce risque doit être soigneusement pris en considération chez les patients présentant des facteurs de risque tels que l'hypertension ou des antécédents d'anévrisme.

#### Insuffisance cardiaque congestive (ICC) (voir rubrique 4.8)

Des effets compatibles avec une ICC ont été rapportés dans les études cliniques. Les résultats observés sont allés d'une diminution asymptomatique de la fraction d'éjection ventriculaire gauche à une ICC symptomatique, nécessitant un traitement ou une hospitalisation. Une attention particulière est recommandée en cas de traitement avec Oyavas chez des patients atteints d'une affection cardiovasculaire cliniquement significative telle qu'une pathologie coronarienne pré-existante, ou une insuffisance cardiaque congestive.

La plupart des cas d'ICC sont survenus chez des patients atteints d'un cancer du sein métastatique précédemment traités par anthracyclines ou radiothérapie de la paroi thoracique gauche, ou chez qui d'autres facteurs de risque de survenue d'ICC étaient présents.

Dans l'étude AVF3694g, chez les patients traités par anthracyclines et qui n'avaient pas reçu d'anthracyclines précédemment, aucune augmentation de l'incidence des ICC, quel que soit le grade, n'a été observée dans le groupe bevacizumab + anthracycline, comparé au groupe traité par anthracyclines seules. Les ICC de grade 3 ou plus étaient toutefois plus fréquentes parmi les patients traités par bevacizumab en association à une chimiothérapie que parmi les patients traités par chimiothérapie uniquement. Ceci est en accord avec les résultats obtenus dans les autres études conduites dans le cancer du sein métastatique chez des patients qui n'avaient pas été préalablement traités par des anthracyclines (NCI-CTCAE v.3) (voir rubrique 4.8)

#### Neutropénies et infections (voir rubrique 4.8)

Une augmentation de l'incidence des neutropénies sévères, des neutropénies fébriles ou des infections avec ou sans neutropénie sévère (dont certaines fatales) a été observée chez des patients recevant une chimiothérapie myélotoxique associée à bevacizumab, comparé à ceux recevant une chimiothérapie seule. Cela a principalement été observé en association aux dérivés du platine ou aux chimiothérapies à base de taxane dans le CBNPC, le cancer du sein métastatique, et en association avec le paclitaxel et le topotécan dans le cancer du col de l'utérus persistant, en rechute ou métastatique.

#### Réactions d'hypersensibilité (dont le choc anaphylactique) / réactions liées à la perfusion (voir rubrique 4.8)

Les patients peuvent être exposés à un risque de réactions liées à la perfusion/ d'hypersensibilité (*dont le choc anaphylactique*). Comme avec toute perfusion d'un anticorps monoclonal humanisé, les patients doivent être étroitement surveillés pendant et après l'administration du bevacizumab. En cas de réaction, la perfusion doit être arrêtée et un traitement approprié doit être instauré. Une prémédication systématique n'est pas justifiée.

#### Ostéonécroses de la mâchoire (voir rubrique 4.8)

Des cas d'ostéonécrose de la mâchoire ont été rapportés chez des patients atteints de cancer et traités avec bevacizumab, la majorité d'entre eux avait reçu un traitement antérieur ou concomitant par des bisphosphonates administrés par voie intraveineuse, lesquels présentent un risque connu d'ostéonécroses de la mâchoire. Une attention particulière est recommandée en cas d'administration antérieure ou concomitante d'Oyavas avec des bisphosphonates administrés par voie intraveineuse.

Les interventions dentaires invasives sont connues comme étant un facteur de risque. Un examen dentaire ainsi que des soins dentaires préventifs appropriés doivent être envisagés avant l'instauration du traitement par Oyavas. Pour les patients ayant auparavant reçu ou recevant un traitement par bisphosphonates administrés par voie intraveineuse, les interventions dentaires invasives doivent si possible être évitées.

#### Utilisation intravitréenne

Oyavas n'est pas formulé pour une administration intravitréenne.

#### Affections oculaires

Des cas isolés et des séries d'effets indésirables oculaires graves ont été rapportés à la suite d'une administration intravitréenne non autorisée du bevacizumab, préparé à partir de flacons autorisés pour une administration intraveineuse chez des patients atteints de cancer. Ces effets incluent : endophthalmie infectieuse ; inflammation intraoculaire telle qu'une endophthalmie stérile, une uvéite et une hyalite ; décollement de la rétine ; déchirure de l'épithélium pigmentaire de la rétine ; augmentation de la pression intraoculaire ; hémorragie intraoculaire telle qu'une hémorragie du vitré ou de la rétine ; hémorragie conjonctivale. Certains de ces effets ont entraîné une diminution de l'acuité visuelle à des degrés différents, dont la cécité permanente.

#### Effets systémiques suite à une utilisation de la voie intravitréenne

Une réduction de la concentration en VEGF circulant a été démontrée suite à un traitement par anti-VEGF en intra-vitréen. Des effets systémiques dont des hémorragies non-oculaires et des effets thromboemboliques artériels ont été rapportés suite à une injection intra-vitréenne d'un inhibiteur du VEGF.

#### Insuffisance ovarienne / Fertilité

Le bevacizumab peut altérer la fertilité chez la femme (voir rubriques 4.6 et 4.8). En conséquence, des stratégies de préservation de la fertilité doivent être discutées avec les femmes en âge de procréer, avant de démarrer un traitement par le bevacizumab.

#### Excipients

Ce médicament contient moins de 1 mmol de sodium (23 mg) par flacon, c'est-à-dire qu'il est essentiellement « sans sodium ».

### **4.5 Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions**

#### Effet des agents antinéoplasiques sur la pharmacocinétique du bevacizumab

Les résultats des analyses de pharmacocinétique de population n'ont montré aucune interaction cliniquement significative lors de la co-administration de chimiothérapies avec le bevacizumab. Il n'y avait de différence ni statistiquement significative ni cliniquement pertinente de la clairance du bevacizumab chez les patients recevant le bevacizumab en monothérapie comparé à ceux recevant le bevacizumab en association à l'interféron alfa-2a, l'erlotinib ou à d'autres chimiothérapies (IFL, 5-FU/LV, carboplatine-paclitaxel, capécitabine, doxorubicine ou cisplatine/gemcitabine).

#### Effet du bevacizumab sur la pharmacocinétique des autres agents antinéoplasiques

Aucune interaction cliniquement pertinente du bevacizumab n'a été observée sur la pharmacocinétique de l'interféron alfa-2a, de l'erlotinib (et son métabolite actif OSI-420) ou d'autres chimiothérapies : irinotécan (et son métabolite actif SN38), capécitabine, oxaliplatine (déterminée d'après la mesure du

platine libre et total) ou cisplatine, lors de leur co-administration. Les conclusions sur l'impact du bevacizumab sur la pharmacocinétique de la gemcitabine ne peuvent être tirées.

#### Association bevacizumab et malate de sunitinib

Au cours de deux études cliniques dans le carcinome du rein métastatique, une anémie hémolytique microangiopathique (AHMA) a été rapportée chez 7 des 19 patients traités par l'association bevacizumab (10 mg/kg toutes les deux semaines) et malate de sunitinib (50 mg par jour).

La AHMA est une affection hémolytique qui peut se traduire par une fragmentation des globules rouges, une anémie et une thrombopénie. De plus, une hypertension (incluant des poussées hypertensives), une créatininémie élevée et des symptômes neurologiques ont été observés chez certains de ces patients. Tous ces troubles ont été réversibles à l'arrêt du bevacizumab et du malate de sunitinib (voir *Hypertension*, *Protéinurie*, *SEPR* rubrique 4.4).

#### Association avec des traitements à base de sels de platine ou de taxanes (voir rubriques 4.4 et 4.8)

Une augmentation de l'incidence des neutropénies sévères, des neutropénies fébriles et des infections avec ou sans neutropénie sévère (dont certaines fatales) a été principalement observée chez des patients recevant un traitement à base de sels de platine ou de taxanes dans le cadre d'un CBNPC ou d'un cancer du sein métastatique.

#### Radiothérapie

La tolérance et l'efficacité de l'administration concomitante du bevacizumab et d'une radiothérapie n'ont pas été établies.

#### Anticorps monoclonaux anti-EGFR en association à des traitements de chimiothérapie contenant du bevacizumab

Aucune étude d'interaction n'a été conduite. Les anticorps monoclonaux anti-EGFR ne doivent pas être administrés en association à un traitement de chimiothérapie contenant du bevacizumab dans le cadre d'un cancer colorectal métastatique. Les résultats des études randomisées de phase III, PACCE et CAIRO-2, menées chez des patients atteints d'un cancer colorectal métastatique, suggèrent que l'utilisation des anticorps monoclonaux anti-EGFR panitumumab et cetuximab, respectivement, en association au bevacizumab plus chimiothérapie, est associée à une diminution de la survie sans progression et/ou de la survie globale et à une augmentation de la toxicité par rapport à la chimiothérapie plus bevacizumab seul.

### **4.6 Fertilité, grossesse et allaitement**

#### Femmes en âge d'avoir des enfants/Contraception

Les femmes en âge de procréer doivent utiliser des mesures de contraception efficaces au cours du traitement et pendant les 6 mois qui suivent son arrêt.

#### Grossesse

Il n'existe pas de données issues d'essais cliniques concernant l'utilisation d'Oyavas chez les femmes enceintes. Des études chez l'animal ont mis en évidence une toxicité sur la reproduction incluant des malformations (voir rubrique 5.3). Il est connu que les IgG franchissent la barrière placentaire et le bevacizumab est susceptible d'inhiber l'angiogenèse fœtale, ce qui pourrait causer de graves anomalies congénitales lors d'une administration pendant la grossesse. Après commercialisation, des cas d'anomalies fœtales ont été observés chez des femmes traitées par bevacizumab seul ou en association à des chimiothérapies connues pour être embryotoxiques (voir rubrique 4.8). Oyavas est contre-indiqué chez la femme enceinte (voir rubrique 4.3).

## Allaitement

On ne sait pas si le bevacizumab est excrété dans le lait humain. Puisque les IgG maternelles passent dans le lait et que le bevacizumab pourrait compromettre la croissance et le développement du nourrisson (voir rubrique 5.3), les femmes doivent interrompre l'allaitement pendant le traitement et ne doivent pas allaiter pendant au moins 6 mois après l'administration de la dernière dose de bevacizumab.

## Fertilité

Des études de toxicité par administration répétée chez l'animal ont révélé que le bevacizumab pourrait avoir un effet indésirable sur la fertilité des femmes (voir rubrique 5.3). Dans un essai de phase III chez des patients atteints d'un cancer colorectal en traitement adjuvant, une sous-étude a montré, chez des femmes non ménopausées, une augmentation de l'incidence de nouveaux cas d'insuffisance ovarienne dans le groupe bevacizumab comparé au groupe contrôle. Après arrêt du traitement par le bevacizumab, la fonction ovarienne s'est rétablie pour la majorité des patientes concernées. Les effets à long terme d'un traitement par bevacizumab sur la fertilité ne sont à ce jour pas connus.

### **4.7 Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines**

Bevacizumab n'a aucun effet ou qu'un effet négligeable sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Toutefois, des cas de somnolence et de syncope ont été rapportés sous bevacizumab (voir tableau 1 rubrique 4.8). Si les patients présentent des symptômes altérant leur vision, leur concentration ou leur aptitude à réagir, il est déconseillé de conduire et d'utiliser des machines jusqu'à régression des symptômes.

### **4.8 Effets indésirables**

#### Résumé du profil de tolérance

Le profil de tolérance du bevacizumab est basé sur des données recueillies, au cours d'études cliniques, menées chez plus de 5 700 patients atteints de différents types de tumeurs malignes qui ont été traités, pour la plupart, par bevacizumab associé à une chimiothérapie.

Les effets indésirables les plus graves étaient :

- Des perforations gastro-intestinales (voir rubrique 4.4).
- Des hémorragies, dont des hémorragies pulmonaires/hémoptysies, plus fréquentes chez les patients atteints d'un cancer bronchique non à petites cellules (voir rubrique 4.4).
- Des thromboembolies artérielles (voir rubrique 4.4).

Dans l'ensemble des études cliniques, les effets indésirables les plus fréquemment observés chez les patients recevant Oyavas étaient : hypertension artérielle, fatigue ou asthénie, diarrhée et douleur abdominale.

Les analyses des données cliniques de tolérance suggèrent que la survenue d'une hypertension artérielle et d'une protéinurie lors du traitement par Oyavas sont probablement dose dépendantes.

#### Liste des effets indésirables sous forme de tableau

Les effets indésirables mentionnés dans cette rubrique font partie des groupes de fréquence suivants : très fréquent ( $\geq 1/10$ ), fréquent ( $\geq 1/100$  à  $< 1/10$ ), peu fréquent : ( $\geq 1/1\ 000$  à  $< 1/100$ ), rare ( $\geq 1/10\ 000$  à  $< 1/1000$ ), très rare ( $< 1/10\ 000$ ), fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles).

Les tableaux 1 et 2 présentent les effets indésirables associés à l'utilisation d'Oyavas en association à différents protocoles de chimiothérapie dans diverses indications, selon la classification MedDRA par Système Organe Classe.

Le tableau 1 présente, selon leur fréquence, tous les effets indésirables définis comme ayant une relation causale avec la prise d'Oyavas au travers :

- de la comparaison des incidences constatées entre les bras de traitement des essais cliniques (avec une différence d'au moins 10 % par rapport au groupe témoin pour les effets de grade 1-5 NCI-CTCAE ou une différence supérieure d'au moins 2 % par rapport au groupe témoin pour les effets de grade 3-5 NCI-CTCAE),
- des études de sécurité post-autorisation,
- des déclarations spontanées,
- des études épidémiologiques non interventionnelles ou observationnelles,
- ou au travers de l'évaluation de rapports de cas individuels.

Le tableau 2 présente la fréquence des effets indésirable graves. Les effets indésirables graves sont considérés en tant que tel, lorsque qu'une différence d'au moins 2 % est observée par rapport au groupe témoin pour les effets de grade 3-5 NCI-CTCAE dans les études cliniques. Le tableau 2 inclut également les effets indésirables considérés comme cliniquement significatifs ou graves par le titulaire de l'AMM.

Les effets indésirables post-commercialisation sont inclus dans les tableaux 1 et 2, si applicable. Des informations détaillées sur les effets indésirables rapportés depuis la commercialisation sont présentées dans le tableau 3.

Les effets indésirables sont classés dans le groupe de fréquence appropriée dans les tableaux ci-dessous, en fonction de l'incidence la plus élevée observée quelle que soit l'indication.

Au sein de chaque catégorie de fréquence, les effets indésirables sont présentés suivant un ordre décroissant de gravité.

Certains des effets indésirables sont des effets fréquemment observés avec une chimiothérapie ; toutefois bevacizumab, en association à des agents de chimiothérapie, peut exacerber ces effets indésirables. Par exemple, un syndrome d'érythrodysesthésie palmo-plantaire avec la doxorubicine liposomale pégylée ou la capécitabine, une neuropathie sensitive périphérique avec le paclitaxel ou l'oxaliplatine, des troubles unguéaux ou une alopecie avec le paclitaxel et une paronychie avec l'erlotinib.

**Tableau 1. Effets indésirables selon leur fréquence**

| Système organe-classe                                      | Très fréquent                                                                            | Fréquent                                                                           | Peu fréquent | Rare                                | Très rare | Fréquence indéterminée |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------|------------------------|
| <b>Infections et infestations</b>                          |                                                                                          | Sepsis, Abscess <sup>b,d</sup> ,<br>Cellulite,<br>Infection,<br>Infection urinaire |              | Fasciite<br>nécrosante <sup>a</sup> |           |                        |
| <b>Affections hématologiques et du système lymphatique</b> | Neutropénie<br>fébrile,<br>Leucopénie,<br>Neutropénie <sup>b</sup> ,<br>Thrombocytopénie | Anémie,<br>Lymphopénie                                                             |              |                                     |           |                        |
| <b>Affections du système immunitaire</b>                   |                                                                                          | Hypersensibilité,<br>réactions liées à la<br>perfusion <sup>a,b,d</sup>            |              | Choc<br>anaphylactique              |           |                        |
| <b>Troubles du métabolisme et de la nutrition</b>          | Anorexie,<br>Hypomagnésémie,<br>Hyponatrémie                                             | Déshydratation                                                                     |              |                                     |           |                        |

| Système organe-classe                                         | Très fréquent                                                                                                                 | Fréquent                                                                                                                                                                                 | Peu fréquent | Rare                                                               | Très rare                                 | Fréquence indéterminée                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Affections du système nerveux</b>                          | Neuropathie sensorielle périphérique <sup>b</sup> , Dysarthrie, Céphalées, Dysgueusie                                         | Accident vasculaire cérébral, Syncope, Somnolence                                                                                                                                        |              | Syndrome d'encéphalopathie postérieure réversible <sup>a,b,d</sup> | Encéphalopathie hypertensive <sup>a</sup> |                                                                                             |
| <b>Affections oculaires</b>                                   | Affection oculaire, Augmentation du larmoiement                                                                               |                                                                                                                                                                                          |              |                                                                    |                                           |                                                                                             |
| <b>Affections cardiaques</b>                                  |                                                                                                                               | Insuffisance cardiaque congestive <sup>b,d</sup> , Tachycardie supraventriculaire                                                                                                        |              |                                                                    |                                           |                                                                                             |
| <b>Affections vasculaires</b>                                 | Hypertension <sup>b,d</sup> , Thromboembolie (veineuse) <sup>b,d</sup>                                                        | Thromboembolie (artérielle) <sup>b,d</sup> , Hémorragie <sup>b,d</sup> , Thrombose veineuse profonde                                                                                     |              |                                                                    |                                           | Microangiopathie thrombotique rénale <sup>a,b</sup> , Anévrismes et dissections artérielles |
| <b>Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales</b> | Dyspnée, Rhinite, Épistaxis, Toux                                                                                             | Hémorragie pulmonaire/ Hémoptysie <sup>b,d</sup> , Embolie pulmonaire, Hypoxie, Dysphonie <sup>a</sup>                                                                                   |              |                                                                    |                                           | Hypertension pulmonaire <sup>a</sup> , Perforation de la cloison nasale <sup>a</sup>        |
| <b>Affections gastro-intestinales</b>                         | Rectorragie, Stomatite, Constipation, Diarrhée, Nausées, Vomissements, Douleur abdominale                                     | Perforation gastro-intestinale <sup>b,d</sup> , Perforation intestinale, Iléus, Occlusion intestinale, Fistules recto-vaginales <sup>d,e</sup> , Troubles gastro-intestinaux, Proctalgie |              |                                                                    |                                           | Ulcère gastro-intestinal <sup>a</sup>                                                       |
| <b>Affections hépatobiliaires</b>                             |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |              |                                                                    |                                           | Perforation de la vésicule biliaire <sup>a,b</sup>                                          |
| <b>Affections de la peau et du tissu sous-cutané</b>          | Complications de la cicatrisation des plaies <sup>b,d</sup> , Dermate exfoliante, Sécheresse cutanée, Décoloration de la peau | Syndrome d'érythrodysesthésie palmo-plantaire                                                                                                                                            |              |                                                                    |                                           |                                                                                             |
| <b>Affections musculosquelettiques et systémiques</b>         | Arthralgie, Myalgie                                                                                                           | Fistule <sup>b,d</sup> , Faiblesse musculaire, Dorsalgie                                                                                                                                 |              |                                                                    |                                           | Ostéonécrose de la mâchoire <sup>a,b</sup> , Ostéonécrose non-mandibulaire <sup>a,f</sup>   |
| <b>Affections du rein et des voies urinaires</b>              | Protéinurie <sup>b,d</sup>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |              |                                                                    |                                           |                                                                                             |
| <b>Affections des organes de reproduction et du sein</b>      | Insuffisance ovarienne <sup>b,c,d</sup>                                                                                       | Douleur pelvienne                                                                                                                                                                        |              |                                                                    |                                           |                                                                                             |

| Système organe-classe                                          | Très fréquent                                                  | Fréquent  | Peu fréquent | Rare | Très rare | Fréquence indéterminée           |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------|-----------|----------------------------------|
| <b>Affections congénitales, familiales et génétiques</b>       |                                                                |           |              |      |           | Anomalies fœtales <sup>a,b</sup> |
| <b>Troubles généraux et anomalies au site d'administration</b> | Asthénie, Fatigue, Fièvre, Douleur, Inflammation des muqueuses | Léthargie |              |      |           |                                  |
| <b>Investigations</b>                                          | Perte de poids                                                 |           |              |      |           |                                  |

Lorsque les événements ont été notifiés à la fois en tant qu'effets indésirables de tout grade et de grade 3-5 dans les essais cliniques, la fréquence la plus élevée observée chez les patients a été rapportée. Les données ne sont pas ajustées pour les différentes durées de traitement.

<sup>a</sup>Pour plus d'informations merci de vous référer au tableau 3 « Effets indésirables rapportés depuis la commercialisation ».

<sup>b</sup>Les termes représentent des groupes d'événements indésirables décrivant un concept médical plutôt qu'une condition particulière ou terme privilégié MedDRA (Medical Dictionary for Regulatory Activities). Ce groupe de termes médicaux peut impliquer la même physiopathologie sous-jacente (ex. : les effets thromboemboliques artériels incluent les accidents vasculaires cérébraux, les infarctus du myocarde, les accidents ischémiques transitoires et les autres effets thromboemboliques artériels).

<sup>c</sup>Basé sur une sous-étude de l'essai NSABP C-08 avec 295 patients.

<sup>d</sup>Pour des informations supplémentaires se reporter ci-dessous à la section « Description de certains des effets indésirables graves ».

<sup>e</sup>Les fistules recto-vaginales sont les plus fréquentes dans la catégorie des fistules GI-vaginales.

<sup>f</sup>Observé uniquement dans la population pédiatrique.

**Tableau 2. Effets indésirables graves selon leur fréquence**

| Système organe-classe                                  | Très fréquent                                                                | Fréquent                                                                                                                                            | Peu fréquent | Rare                | Très rare | Fréquence indéterminée                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Infections et infestations                             |                                                                              | Sepsis, Cellulite, Abscess <sup>a,b</sup> , Infection, Infection urinaire                                                                           |              |                     |           | Fasciite nécrosante <sup>c</sup>                                                                               |
| Affections hématologiques et du système lymphatique    | Neutropénie fébrile, Leucopénie, Neutropénie <sup>a</sup> , Thrombocytopénie | Anémie, Lymphopénie                                                                                                                                 |              |                     |           |                                                                                                                |
| Affections du système immunitaire                      |                                                                              | Hypersensibilité, réactions liées à la perfusion <sup>a,b,c</sup>                                                                                   |              | Choc anaphylactique |           |                                                                                                                |
| Troubles du métabolisme et de la nutrition             |                                                                              | Déshydratation, Hyponatrémie                                                                                                                        |              |                     |           |                                                                                                                |
| Affections du système nerveux                          | Neuropathie sensorielle périphérique <sup>a</sup>                            | Accident vasculaire cérébral, Syncope, Somnolence, Céphalées                                                                                        |              |                     |           | Syndrome d'encéphalopathie postérieure réversible <sup>a,b,c</sup> , Encéphalopathie hypertensive <sup>c</sup> |
| Affections cardiaques                                  |                                                                              | Insuffisance cardiaque congestive <sup>a,b</sup> , Tachycardie supraventriculaire                                                                   |              |                     |           |                                                                                                                |
| Affections vasculaires                                 | Hypertension <sup>a,b</sup>                                                  | Thromboembolie (artérielle) <sup>a,b</sup> , Hémorragie <sup>a,b</sup> , Thromboembolie (veineuse) <sup>a,b</sup> , Thrombose veineuse profonde     |              |                     |           | Microangiopathie thrombotique rénale <sup>b,c</sup> , Anévrismes et dissections artérielles                    |
| Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales |                                                                              | Hémorragie pulmonaire/ Hémoptysie <sup>a,b</sup> , Embolie pulmonaire, Epistaxis, Dyspnée, Hypoxie                                                  |              |                     |           | Hypertension pulmonaire <sup>c</sup> , Perforation de la cloison nasale <sup>c</sup>                           |
| Affections gastro-intestinales                         | Diarrhée, Nausées, Vomissements, Douleur abdominale                          | Perforation intestinale, Iléus, Occlusion intestinale, Fistules recto-vaginales <sup>c,d</sup> , Troubles gastro-intestinaux, Stomatite, Proctalgie |              |                     |           | Perforation gastro-intestinale <sup>a,b</sup> , Ulcère gastro-intestinal <sup>c</sup> , Hémorragie rectale     |
| Affections hépatobiliaires                             |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |                     |           | Perforation de la vésicule biliaire <sup>b,c</sup>                                                             |
| Affections de la peau et du tissu sous-cutané          |                                                                              | Complications de la cicatrisation des plaies <sup>a,b</sup> , Syndrome d'érythrodysesthésie palmo-plantaire                                         |              |                     |           |                                                                                                                |
| Affections musculosquelettiques et systémiques         |                                                                              | Fistule <sup>a,b</sup> , Myalgie, Arthralgie, Faiblesse musculaire, Dorsalgie                                                                       |              |                     |           | Ostéonécrose de la mâchoire <sup>b,c</sup>                                                                     |
| Affections du rein et des voies urinaires              |                                                                              | Protéinurie <sup>a,b</sup>                                                                                                                          |              |                     |           |                                                                                                                |
| Affections des organes de reproduction et du sein      |                                                                              | Douleur pelvienne                                                                                                                                   |              |                     |           | Insuffisance ovarienne <sup>a,b</sup>                                                                          |

| Système organe-classe                                          | Très fréquent     | Fréquent                                  | Peu fréquent | Rare | Très rare | Fréquence indéterminée           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|------|-----------|----------------------------------|
| <b>Affections congénitales, familiales et génétiques</b>       |                   |                                           |              |      |           | Anomalies fœtales <sup>a,c</sup> |
| <b>Troubles généraux et anomalies au site d'administration</b> | Asthénie, Fatigue | Douleur, Léthargie, Inflammation muqueuse |              |      |           |                                  |

Le tableau 2 présente la fréquence des effets indésirables graves. Les effets indésirables graves sont considérés en tant que tel, lorsque qu'une différence d'au moins 2 % est observée par rapport au groupe témoin pour les effets de grade 3-5 NCI-CTCAE dans les études cliniques.

Le tableau 2 inclut également les effets indésirables considérés comme cliniquement significatifs ou graves par le titulaire de l'AMM. Ces effets indésirables, cliniquement significatifs, ont été rapportés dans les essais cliniques mais les effets de grade 3-5 n'ont pas atteint le seuil d'une différence d'au moins 2 % par rapport au groupe témoin. Le tableau 2 inclut également les effets indésirables cliniquement significatifs, observés depuis la commercialisation uniquement. Par conséquent, la fréquence et le grade NCI-CTCAE n'est pas connu. Ces effets cliniquement significatifs ont ainsi été inclus dans la colonne « Fréquence indéterminée » du tableau 2.

<sup>a</sup>Les termes représentent des groupes d'événements indésirables décrivant un concept médical plutôt qu'une condition particulière ou terme privilégié MedDRA (Medical Dictionary for Regulatory Activities). Ce groupe de termes médicaux peut impliquer la même physiopathologie sous-jacente (ex. : les effets thromboemboliques artériels incluent les accidents vasculaires cérébraux, les infarctus du myocarde, les accidents ischémiques transitoires et les autres effets thromboemboliques artériels).

<sup>b</sup>Pour des informations supplémentaires, se reporter ci-dessous à la section « Descriptions de certains des effets indésirables graves ».

<sup>c</sup>Pour des informations complémentaires, se reporter au tableau 3 « Effets indésirables rapportés depuis la commercialisation ».

<sup>d</sup>Les fistules recto-vaginales sont les plus fréquentes dans la catégorie des fistules GI-vaginales.

### Description de certains des effets indésirables graves

#### Perforations gastro-intestinales (GI) et fistules (voir rubrique 4.4)

Bevacizumab a été associé à des cas graves de perforations gastro-intestinales.

Des perforations gastro-intestinales ont été rapportées dans les études cliniques avec une incidence inférieure à 1 % dans le cancer bronchique non à petites cellules non épidermoïde, jusqu'à 1,3 % dans le cancer du sein métastatique, jusqu'à 2,0 % dans le cancer du rein métastatique ou dans le cancer de l'ovaire et jusqu'à 2,7% (comprenant des fistules gastro-intestinales et des abcès) dans le cancer colorectal métastatique. Au cours d'un essai clinique avec des patientes atteintes d'un cancer du col de l'utérus persistant, en rechute ou métastatique (étude GOG-0240), des perforations GI (tous grades confondus) ont été rapportées chez 3,2 % des patientes, qui avaient toutes un antécédent de radiothérapie pelvienne.

La survenue de ces événements variait en nature et en sévérité, allant de la présence d'air libre observée à la radiographie abdominale sans préparation (ASP), avec résolution spontanée sans traitement, à la perforation intestinale avec abcès abdominal et issue fatale. Dans certains cas, une inflammation intra abdominale sous-jacente était présente, en raison d'un ulcère gastrique, d'une nécrose tumorale, d'une diverticulite ou d'une colite associée à une chimiothérapie.

Dans environ un tiers des cas de perforations gastro-intestinales graves, l'évolution a été fatale, ce qui représente entre 0,2 et 1 % de l'ensemble des patients traités par bevacizumab.

Au cours des essais cliniques de bevacizumab, des fistules gastro-intestinales (tous grades confondus) ont été rapportées chez jusqu'à 2 % des patients traités pour cancer colorectal métastatique et pour cancer de l'ovaire. Cette fréquence était moindre chez les patients traités pour d'autres types de cancer.

### Fistule GI-vaginales dans l'étude GOG-0240

Dans un essai incluant des patientes atteintes d'un cancer du col de l'utérus persistant, en rechute ou métastatique, la survenue de fistules GI-vaginales a été de 8,3 % chez les patientes traitées par bevacizumab et de 0,9 % chez les patientes témoins ; toutes ayant un antécédent de radiothérapie pelvienne. La fréquence d'apparition des fistules GI-vaginales dans le groupe traité par bevacizumab + chimiothérapie a été plus élevée chez les patientes présentant une récurrence du cancer dans la zone pré-irradiée (16,7 %) en comparaison aux patientes n'ayant pas reçu de radiothérapie préalable et/ou ne présentant pas de récurrence du cancer de la zone pré-irradiée (3,6 %). Les fréquences correspondantes dans le groupe témoin recevant une chimiothérapie seule ont été respectivement de 1,1 % vs 0,8 %. Les patientes qui ont développé des fistules GI-vaginales présentaient également des occlusions intestinales qui nécessitaient une intervention chirurgicale telle que des stomies de dérivation.

### Fistule non GI (voir rubrique 4.4)

L'utilisation du bevacizumab a été associée à la survenue de cas graves de fistule dont certains ont conduit au décès.

Au cours d'un essai clinique avec des patientes atteintes d'un cancer du col de l'utérus persistant, en rechute ou métastatique (étude GOG-0240), il a été rapporté qu'1,8 % des patientes traitées par Bevacizumab et 1,4 % des patientes témoins ont présenté des fistules non gastro-intestinales, vaginales, vésicales ou des voies génitales féminines.

Des fistules, touchant d'autres parties du corps que le tractus gastro-intestinal (ex. : fistule broncho pleurale ou biliaire) ont été peu fréquemment ( $\geq 0,1$  % à  $< 1$  %) rapportées, dans diverses indications. Des fistules ont été également rapportées après la commercialisation du Bevacizumab.

Ces effets ont été rapportés à des périodes diverses du traitement allant d'une semaine à plus de 1 an après l'initiation du traitement par le bevacizumab, la majorité des effets apparaissant dans les 6 premiers mois de traitement.

### Cicatrisation des plaies (voir rubrique 4.4)

Bevacizumab pouvant altérer la cicatrisation des plaies, les patients qui avaient subi une intervention chirurgicale majeure dans les 28 derniers jours étaient exclus de la participation aux études cliniques de phase III.

Au cours des essais cliniques dans le cancer colorectal métastatique, il n'a pas été observé d'augmentation du risque hémorragique post-opératoire ou de complications de la cicatrisation des plaies, chez les patients ayant subi une intervention chirurgicale majeure 28 à 60 jours avant l'initiation du traitement par bevacizumab. Une augmentation de l'incidence des saignements post-opératoires ou des complications de la cicatrisation des plaies a été observée dans les 60 jours suivant une intervention chirurgicale majeure chez les patients traités par le bevacizumab au moment de l'intervention chirurgicale. L'incidence variait de 10 % (4/40) à 20 % (3/15).

Des complications graves de la cicatrisation des plaies, incluant des complications anastomotiques, ont été rapportées, dont certaines d'issue fatale.

Au cours des essais cliniques dans le cancer du sein métastatique ou en rechute locale, des complications de la cicatrisation des plaies de grade 3-5 ont été observées avec une incidence allant jusqu'à 1,1 % des patients traités par bevacizumab comparé à un maximum de 0,9 % des patients dans les groupes témoins (NCI-CTCAE v.3).

Au cours des essais cliniques dans le cancer de l'ovaire, des complications de la cicatrisation des plaies de grade 3-5 ont été observées avec une incidence allant jusqu'à 1,8 % des patientes dans le bras bevacizumab par rapport à 0,1 % des patientes dans le groupe témoin (NCI-CTCAE v.3).

#### Hypertension artérielle (voir rubrique 4.4)

Dans les études cliniques, à l'exception de l'étude JO25567, l'incidence globale de l'hypertension artérielle (tous grades) allait jusqu'à 42,1 % dans les bras contenant le bevacizumab comparé à une incidence globale allant jusqu'à 14 % dans les bras contrôle. L'incidence globale d'hypertension artérielle de grade 3 et 4 (NCI-CTC) a varié de 0,4 % à 17,9 % chez les patients recevant le bevacizumab. Une hypertension artérielle de grade 4 (crise hypertensive) est survenue chez jusqu'à 1,0 % des patients traités par bevacizumab + chimiothérapie comparé à une incidence jusqu'à 0,2 % des patients traités par la même chimiothérapie seule.

Dans l'étude JO25567, une hypertension tous grades confondus a été observée chez 77,3 % des patients ayant reçu bevacizumab en association à l'erlotinib, en traitement de première ligne pour un CBNPC non épidermoïde présentant des mutations activatrices de l'EGFR, comparé à 14,3 % chez les patients traités par l'erlotinib seul. Une hypertension de grade 3 a été observée chez 60,0 % des patients traités par bevacizumab en association à l'erlotinib, comparé à 11,7 % chez les patients traités par l'erlotinib seul. Aucun événement d'hypertension de grade 4 ou 5 n'a été observé.

L'hypertension artérielle a généralement été bien contrôlée avec des anti-hypertenseurs oraux comme des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, des diurétiques et des inhibiteurs calciques. Elle a rarement conduit à un arrêt du traitement par le bevacizumab ou à une hospitalisation.

De très rares cas d'encéphalopathie hypertensive ont été rapportés, dont certains ont été fatals.

Il n'y a pas eu de corrélation entre le risque d'hypertension artérielle lié à l'utilisation de bevacizumab et les caractéristiques des patients à l'inclusion, une maladie sous-jacente ou un traitement concomitant.

#### Syndrome d'encéphalopathie postérieure réversible (SEPR) (voir rubrique 4.4)

Il a été rarement rapporté que des patients traités par bevacizumab développaient des signes et symptômes compatibles avec un SEPR, un trouble neurologique rare. Sa survenue peut inclure des attaques, céphalées, état mental altéré, troubles de la vision, cécité corticale, avec ou sans hypertension associée. Le tableau clinique d'un SEPR est souvent non spécifique et par conséquent le diagnostic de SEPR requiert une confirmation par imagerie cérébrale, de préférence une IRM.

Chez les patients qui développent un SEPR, outre l'arrêt du bevacizumab, une reconnaissance précoce des symptômes avec un traitement rapide des symptômes spécifiques, incluant le contrôle de l'hypertension (si associé à une hypertension artérielle sévère non contrôlée), est recommandée. Les symptômes, habituellement, se dissipent ou s'améliorent dans les jours suivant l'arrêt du traitement, bien que certains patients ont développé quelques séquelles neurologiques. Les conséquences en termes de tolérance d'une reprise du traitement par bevacizumab chez les patients ayant préalablement développé un SEPR ne sont pas connues.

Au cours des essais cliniques, 8 cas de SEPR ont été rapportés. Deux des huit cas n'avaient pas eu de confirmation radiologique par IRM.

#### Protéinurie (voir rubrique 4.4)

Dans les essais cliniques, une protéinurie a été rapportée chez 0,7 à 54,7 % des patients traités par bevacizumab.

La protéinurie a varié en termes de sévérité, de cliniquement asymptomatique, transitoire, à l'état de traces jusqu'à un syndrome néphrotique, cette protéinurie étant de grade 1 dans la majorité des cas (NCI-CTCAE v.3). Une protéinurie de grade 3 a été rapportée chez jusqu'à 10,9 % des patients traités. Une protéinurie de grade 4 (syndrome néphrotique) a été observée chez jusqu'à 1,4 % des patients traités. Une recherche de protéinurie est donc recommandée avant l'instauration du traitement par

Oyavas. Dans la plupart des études cliniques, une protéinurie  $\geq 2$  g/24 h a conduit à suspendre le traitement par bevacizumab jusqu'au retour à des valeurs  $< 2$  g/24 h.

#### Hémorragies (voir rubrique 4.4)

Dans les essais cliniques, toutes indications confondues, l'incidence globale des effets hémorragiques de grade 3-5 selon les critères NCI-CTCAE v.3 a été de 0,4 à 6,9 % des patients traités par bevacizumab comparé à un maximum de 4,5 % dans le groupe témoin sous chimiothérapie.

Au cours d'un essai clinique avec des patientes atteintes d'un cancer du col de l'utérus persistant, en rechute ou métastatique (étude GOG-0240), des effets hémorragiques de grade 3-5 ont été rapportés chez jusqu'à 8,3 % des patientes traitées par bevacizumab en association au paclitaxel et au topotécan en comparaison chez jusqu'à 4,6 % des patientes traitées avec le paclitaxel et le topotécan.

Les effets hémorragiques qui ont été observés au cours des essais cliniques étaient essentiellement des hémorragies associées à la tumeur (voir ci-dessous) et des saignements cutanéomuqueux mineurs (ex : épistaxis).

#### Hémorragie associée à la tumeur (voir rubrique 4.4)

Des hémorragies pulmonaires/hémoptysies majeures ou massives ont été observées principalement dans les études menées chez des patients atteints d'un cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC). Les facteurs de risque possibles incluent les histologies de type épidermoïde, un traitement par produit antirhumatismal/anti-inflammatoire, un traitement anticoagulant, une radiothérapie préalable, un traitement par bevacizumab, des antécédents d'athérosclérose, une localisation centrale de la tumeur et une cavitation de la tumeur avant ou au cours du traitement. Les seules variables ayant été corrélées de façon statistiquement significative à ces hémorragies ont été le traitement par bevacizumab et l'histologie de type épidermoïde. Les patients atteints d'un CBNPC d'histologie épidermoïde connue ou mixte à prédominance épidermoïde, ont été exclus des études de phase III ultérieures, alors que les patients atteints d'une tumeur de type histologique inconnu étaient inclus.

Chez les patients atteints de CBNPC, à l'exclusion de ceux ayant une histologie épidermoïde prédominante, les effets indésirables de tous grades ont été observés avec une fréquence allant jusqu'à 9,3 % chez les patients traités par bevacizumab plus chimiothérapie, comparé à jusqu'à 5 % chez les patients traités par chimiothérapie seule. Les effets de grade 3-5 ont été observés chez jusqu'à 2,3 % des patients traités par bevacizumab plus chimiothérapie, comparés à  $< 1$  % chez ceux traités par chimiothérapie seule (NCI-CTCAE v.3). Des hémorragies pulmonaires/hémoptysies majeures ou massives peuvent survenir de manière soudaine : jusqu'à deux tiers des hémorragies pulmonaires graves ont été fatales.

Des cas d'hémorragie gastro-intestinale, notamment rectorragies et méléna, ont été rapportés chez des patients atteints d'un cancer colorectal et ont été considérés comme des hémorragies associées à la tumeur.

Une hémorragie associée à la tumeur (y compris des cas d'hémorragies du système nerveux central (SNC) chez des patients atteints de métastases du SNC) a également été observée dans de rares cas, dans d'autres types de tumeurs et dans d'autres localisations (voir rubrique 4.4).

L'incidence des hémorragies du SNC chez les patients traités par bevacizumab et présentant des métastases non traitées du SNC n'a pas été évaluée de manière prospective au cours d'études cliniques randomisées. Dans une analyse exploratoire rétrospective, portant sur les résultats finaux de 13 études cliniques randomisées menées dans différents types de tumeurs, 3 patients sur 91 (3,3 %), traités par bevacizumab et atteints de métastases cérébrales ont présenté une hémorragie du SNC (toutes de Grade 4), comparé à 1 patient (grade 5) sur 96 (1 %), non traité par bevacizumab. Dans deux études ultérieures menées chez des patients présentant des métastases cérébrales traitées (incluant environ 800 patients), au moment de l'analyse intermédiaire de tolérance, 1 patient sur 83 (1,2 %), traité par bevacizumab, a présenté une hémorragie du SNC de grade 2 (NCI-CTCAE v.3).

Dans tous les essais cliniques, une hémorragie cutanéomuqueuse a été observée chez jusqu'à 50 % des patients traités par bevacizumab. Il s'agissait la plupart du temps d'épistaxis de grade 1 selon les critères du NCI-CTCAE v.3 d'une durée de moins de 5 minutes, disparaissant sans traitement et qui ne justifiaient pas de modifications du traitement par bevacizumab. Les données cliniques de pharmacovigilance suggèrent que l'incidence des hémorragies cutanéomuqueuses (ex : épistaxis) serait dose dépendante.

Des effets moins fréquents à type de saignements mineurs cutanéomuqueux ont également été rapportés dans d'autres localisations telles que des saignements gingivaux ou vaginaux.

#### Thromboembolies (voir rubrique 4.4)

##### *Thromboembolies artérielles :*

Une augmentation de l'incidence des effets thromboemboliques artériels a été observée chez les patients traités par bevacizumab, toutes indications confondues, incluant les accidents vasculaires cérébraux, les infarctus du myocarde, les accidents ischémiques transitoires et les autres effets thromboemboliques artériels.

Dans des essais cliniques, l'incidence globale des effets thromboemboliques artériels allait jusqu'à 3,8 % dans les groupes contenant bevacizumab comparé à 2,1 % maximum dans les groupes témoins avec chimiothérapie. L'issue de ces événements a été fatale chez 0,8 % des patients recevant le bevacizumab comparé à 0,5 % de ceux recevant une chimiothérapie seule. Les accidents vasculaires cérébraux (dont les accidents ischémiques transitoires) ont été rapportés jusqu'à 2,7 % des patients traités par bevacizumab associé à une chimiothérapie, comparé à jusqu'à 0,5 % des patients traités par une chimiothérapie seule. Des infarctus du myocarde ont été rapportés chez jusqu'à 1,4 % des patients traités par bevacizumab associé à une chimiothérapie comparé à jusqu'à 0,7 % des patients traités par une chimiothérapie seule.

Les patients atteints d'un cancer colorectal chez lesquels un traitement par irinotécan n'était pas indiqué ont été inclus dans l'essai clinique AVF2192g, évaluant bevacizumab en association au 5-fluorouracil en bolus/acide folinique. Dans cette étude, des effets thromboemboliques artériels ont été observés chez 11 % (11/100) des patients du groupe bevacizumab comparé à 5,8 % (6/104) des patients du groupe chimiothérapie seule.

##### *Thromboembolies veineuses :*

L'incidence des effets thromboemboliques veineux lors des essais cliniques a été comparable entre les patients recevant bevacizumab en association à une chimiothérapie et ceux du groupe témoin recevant la même chimiothérapie seule. Ces effets ont inclus des cas de thrombose veineuse profonde, d'embolie pulmonaire et de thrombophlébite.

Au cours des essais cliniques toutes indications confondues, l'incidence globale des effets thromboemboliques veineux était de 2,8 % à 17,3 % des patients traités par bevacizumab comparé à 3,2 % à 15,6 % des patients des groupes témoins.

Des effets thromboemboliques veineux de grade 3-5 (NCI-CTCAE v.3) ont été rapportés chez jusqu'à 7,8 % des patients traités par chimiothérapie plus bevacizumab, contre jusqu'à 4,9 % des patients traités par chimiothérapie seule (dans toutes les indications, excepté pour le cancer du col de l'utérus persistant, en rechute ou métastatique).

Au cours d'un essai clinique avec des patientes atteintes d'un cancer du col de l'utérus persistant, en rechute ou métastatique (étude GOG-0240), des événements thromboemboliques veineux de grade 3-5 ont été rapportés chez jusqu'à 15,6 % des patientes traitées par bevacizumab en association au paclitaxel et au cisplatine, en comparaison chez jusqu'à 7,0 % des patientes traitées avec le paclitaxel et le cisplatine.

Les patients ayant des antécédents d'effets thromboemboliques veineux peuvent être exposés à un risque plus élevé de récurrence s'ils reçoivent bevacizumab en association à une chimiothérapie comparé à la chimiothérapie seule.

#### Insuffisance cardiaque congestive (ICC)

Dans les essais cliniques conduits avec bevacizumab, une insuffisance cardiaque congestive (ICC) a été observée, dans toutes les indications étudiées à ce jour, mais principalement chez des patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique. Dans quatre études de phase III (AVF2119g, E2100, BO17708 et AVF3694g) dans le cancer du sein métastatique, une ICC de grade 3 (NCI-CTCAE v.3) ou plus a été rapportée chez un maximum de 3,5 % des patients traités par bevacizumab en association à une chimiothérapie comparé à un maximum de 0,9 % dans les groupes témoins. Dans l'étude AVF3694g, chez les patients traités en concomitant par des anthracyclines en association au bevacizumab, les incidences d'ICC de grade 3 ou plus, dans les groupes avec bevacizumab et dans les groupes témoin, étaient similaires à celles observées dans les autres études conduites dans le cancer du sein métastatique : 2,9 % dans le bras anthracyclines + bevacizumab et 0 % dans le bras anthracyclines + placebo. De plus, dans l'étude AVF3694g, les incidences d'ICC de tout grade étaient similaires entre le bras anthracyclines + bevacizumab (6,2 %) et le bras anthracyclines + placebo (6,0 %).

La plupart des patientes ayant développé une ICC au cours des études cliniques conduites dans le cancer du sein métastatique ont bénéficié d'une amélioration de leurs symptômes et/ou de la fonction ventriculaire gauche suite à un traitement médical approprié.

Dans la plupart des études avec le bevacizumab, les patients ayant une ICC pré-existante (grades II à IV de la classification du New York Heart Association (NYHA)) étaient exclus. De ce fait, aucune information n'est disponible quant au risque de manifestations d'ICC dans cette population.

Des antécédents de traitement par anthracycline et/ou de radiothérapie de la paroi thoracique gauche peuvent être des facteurs de risque de survenue d'une ICC.

Une augmentation de l'incidence d'ICC a été observée dans un essai clinique chez des patients atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B recevant du bevacizumab en association à une dose cumulative de doxorubicine supérieure à 300 mg/m<sup>2</sup>. Cette étude clinique de phase III comparait l'association rituximab/cyclophosphamide/doxorubicine/vincristine/prednisone (R-CHOP) avec bevacizumab à R-CHOP sans bevacizumab. Alors que l'incidence d'ICC était, dans les deux bras, au-dessus de celle observée précédemment pour le traitement par doxorubicine, le taux était supérieur dans le bras R-CHOP plus bevacizumab. Ces résultats suggèrent qu'un suivi clinique rapproché comprenant des évaluations cardiaques appropriées doit être considéré chez des patients exposés à des doses cumulées de doxorubicine supérieures à 300 mg/m<sup>2</sup>, lorsqu'elles sont associées au bevacizumab.

#### Réactions d'hypersensibilité (dont le choc anaphylactique) / réactions liées à la perfusion (voir rubrique 4.4 et ci-dessous expérience depuis la commercialisation)

Lors de certains essais cliniques, des réactions anaphylactiques et de type anaphylactoïdes ont été plus fréquemment rapportées chez les patients recevant bevacizumab en association à une chimiothérapie que chez ceux traités uniquement par chimiothérapie. L'incidence de ces réactions a été fréquente (jusqu'à 5 % de patients traités par bevacizumab) au cours de certains essais cliniques menés avec bevacizumab.

#### Infections

Au cours d'un essai clinique avec des patientes atteintes d'un cancer du col de l'utérus persistant, en rechute ou métastatique (étude GOG-0240), des infections de grade 3-5 ont été rapportées chez jusqu'à 24 % des patientes traitées par bevacizumab en association au paclitaxel et au topotécan comparé à jusqu'à 13 % des patientes traitées avec le paclitaxel et le topotécan.

### Insuffisance ovarienne / Fertilité (voir rubriques 4.4 et 4.6)

Dans l'étude NSABP C-08, un essai de phase III avec bevacizumab utilisé en traitement adjuvant chez des patients atteints d'un cancer du côlon, l'incidence des nouveaux cas d'insuffisance ovarienne, définie par une aménorrhée de 3 mois ou plus, un taux de FSH  $\geq 30$  mUI/mL et un test de grossesse  $\beta$ -HCG négatif, a été évalué chez 295 femmes non ménopausées. Des nouveaux cas d'insuffisance ovarienne ont été rapportés chez 2,6 % des patientes dans le groupe mFOLFOX-6 comparé à 39 % dans le groupe mFOLFOX-6 + bevacizumab. Après arrêt du traitement par le bevacizumab, la fonction ovarienne s'est rétablie chez 86,2 % des femmes évaluables. Les effets à long terme d'un traitement par bevacizumab sur la fertilité ne sont à ce jour pas connus.

### Anomalies des paramètres biologiques

Une diminution du nombre de neutrophiles, une diminution du nombre de globules blancs et la présence d'une protéinurie peuvent être associées à un traitement par le bevacizumab.

Dans les études cliniques, les anomalies des paramètres biologiques de grades 3 et 4 (NCI-CTCAE v.3) suivantes sont survenues chez les patients traités par bevacizumab avec au minimum 2 % de différence comparé à ceux des groupes témoins : hyperglycémie, diminution de l'hémoglobine, hypokaliémie, hyponatrémie, diminution du nombre de globules blancs, augmentation de l'INR.

Des essais cliniques ont montré que des augmentations transitoires de taux de créatinine sérique (allant de 1,5 à 1,9 fois le taux de référence), que ce soit avec ou sans protéinurie, sont associées à l'utilisation de bevacizumab. L'augmentation observée de taux de créatinine sérique n'était pas associée à une incidence plus élevée de manifestations cliniques d'insuffisance rénale chez des patients traités par bevacizumab.

### Autres populations particulières

#### Patients âgés

Dans les essais cliniques randomisés, un âge de  $> 65$  ans était associé à un risque accru de développement d'effets thromboemboliques artériels incluant les accidents vasculaires cérébraux (AVC), les accidents ischémiques transitoires (AIT) et les infarctus du myocarde. Les autres effets indésirables observés avec une fréquence accrue, au cours d'un traitement par bevacizumab, chez les patients de  $> 65$  ans par rapport à un âge de  $\leq 65$  ans étaient des leucopénies et des thrombopénies de grades 3-4 (NCI-CTCAE v.3), des neutropénies de tous grades, des diarrhées, des nausées, des céphalées et une fatigue (voir rubriques 4.4 et 4.8 dans *Thromboembolies*). Dans un essai clinique, l'incidence de l'hypertension artérielle de grade  $\geq 3$  a été deux fois plus élevée chez les patients de  $> 65$  ans que chez des groupes d'âge plus jeune ( $< 65$  ans). Dans une étude chez des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire en récurrence, résistant aux sels de platine, une alopécie, une inflammation des muqueuses, une neuropathie sensitive périphérique, une protéinurie et une hypertension ont également été rapportées et sont survenues à une fréquence d'au moins 5 % supérieure dans le bras CT + BV pour les patientes de  $\geq 65$  ans, traitées par bevacizumab, comparée aux patientes de  $< 65$  ans, traitées par bevacizumab.

Aucune augmentation de l'incidence des autres effets, dont les perforations gastro-intestinales, les complications de la cicatrisation des plaies, l'insuffisance cardiaque congestive et les hémorragies, n'a été observée chez les patients âgés ( $> 65$  ans) par rapport à ceux de  $\leq 65$  ans traités par bevacizumab.

#### Population pédiatrique

La sécurité et l'efficacité du bevacizumab chez les enfants âgés de moins de 18 ans n'ont pas été établies.

Dans l'étude BO25041 étudiant l'adjonction de bevacizumab à la radiothérapie postopératoire en association concomitante au témozolomide en adjuvant, chez des patients pédiatriques atteints d'un

gliome de haut grade sus-tentorial, sous-tentorial cérébelleux ou pédonculaire nouvellement diagnostiqué, le profil de tolérance était comparable à celui observé chez les adultes traités par bevacizumab dans d'autres types tumoraux.

Dans l'étude BO20924 du bevacizumab associé au traitement de référence dans le rhabdomyosarcome et le sarcome des tissus mous non-rhabdomyosarcome métastatiques, le profil de tolérance du bevacizumab chez les enfants traités était comparable à celui observé chez les adultes traités par bevacizumab.

Oyavas n'est pas autorisé chez les patients de moins de 18 ans. Dans les rapports publiés dans la littérature, des cas d'ostéonécrose non-mandibulaire ont été observés chez les patients de moins de 18 ans, traités par bevacizumab.

Expérience depuis la commercialisation :

**Tableau 3. Effets indésirables rapportés depuis la commercialisation**

| Système organe-classe (SOC)                                   | Effets (fréquence*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Infections et infestations</b>                             | Fasciite nécrosante, généralement secondaire à des complications de la cicatrisation des plaies, à une perforation gastro-intestinale ou à une formation de fistules (rare) (voir également rubrique 4.4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Affections du système immunitaire</b>                      | Réactions d'hypersensibilité et réactions liées à la perfusion (fréquentes), éventuellement associées aux manifestations suivantes : dyspnée/difficultés respiratoires, bouffées vasomotrices/érythème/éruption, hypotension ou hypertension, désaturation de l'oxygène, douleurs thoraciques, frissons et nausées/ vomissements (voir également rubriques 4.4 et ci-dessus <i>réactions d'hypersensibilité / réactions liées à la perfusion</i> ).<br><br>Choc anaphylactique (rare) (voir également rubrique 4.4). |
| <b>Affections du système nerveux</b>                          | Encéphalopathie hypertensive (très rare) (voir également rubrique 4.4 et <i>Hypertension</i> rubrique 4.8)<br>Syndrome d'encéphalopathie postérieure réversible (SEPR) (rare) (voir rubrique 4.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Affections vasculaires</b>                                 | Microangiopathie thrombotique rénale, qui pourrait se manifester cliniquement par une protéinurie (non connue) avec ou sans l'utilisation concomitante du sunitinib. Pour plus d'informations sur la protéinurie, voir rubrique 4.4 et <i>Protéinurie</i> rubrique 4.8.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales</b> | Perforation de la cloison nasale (non connue)<br>Hypertension pulmonaire (non connue)<br>Dysphonie (fréquent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Affections gastro-intestinales</b>                         | Ulcère gastro-intestinal (non connue)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Affections hépatobiliaires</b>                             | Perforation de la vésicule biliaire (non connue)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Affections musculosquelettiques et systémiques</b>         | Des cas d'ostéonécrose de la mâchoire ont été rapportés chez des patients traités avec bevacizumab, présentant pour la plupart des facteurs de risque connus d'ostéonécrose de la mâchoire, en particulier une exposition aux bisphosphonates administrés par voie intraveineuse et/ou un antécédent d'affection dentaire nécessitant une intervention dentaire invasive (voir également rubrique 4.4).                                                                                                              |
|                                                               | Des cas d'ostéonécrose non-mandibulaire ont été observés chez des patients pédiatriques traités par bevacizumab (voir rubrique 4.8, Population pédiatrique)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Affections congénitales, familiales et génétiques</b>      | Des cas d'anomalies fœtales chez des femmes traitées par bevacizumab seul ou en association à des chimiothérapies connues pour être embryotoxiques ont été observées (voir rubrique 4.6).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

\*La fréquence, si spécifiée, est issue des données des études cliniques.

#### Déclaration des effets indésirables suspectés

La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration – voir [Annexe V](#)

## 4.9 Surdosage

L'administration de la plus forte dose étudiée chez l'homme (20 mg/kg de poids corporel, voie intraveineuse, toutes les 2 semaines) s'est accompagnée d'une migraine sévère chez plusieurs patients.

## 5. PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

### 5.1 Propriétés pharmacodynamiques

Classe pharmacothérapeutique : antinéoplasiques et immunomodulateurs ; agents antinéoplasiques, anticorps monoclonaux et conjugués anticorps-médicament, code ATC : L01FG01.

Oyavas est un médicament biosimilaire. Des informations détaillées sont disponibles sur le site internet de l'Agence européenne du médicament <https://www.ema.europa.eu>.

#### Mécanisme d'action

Le bevacizumab se lie au VEGF (*Vascular Endothelial Growth Factor*), facteur clé de la vasculogénèse et de l'angiogénèse, et inhibe de ce fait la liaison du VEGF à ses récepteurs, Flt-1 (VEGFR-1) et KDR (VEGFR-2), à la surface des cellules endothéliales. La neutralisation de l'activité biologique du VEGF fait régresser les vaisseaux tumoraux, normalise les vaisseaux tumoraux restants, et inhibe la formation de nouveaux vaisseaux tumoraux, inhibant ainsi la croissance tumorale.

#### Effets pharmacodynamiques

L'administration de bevacizumab ou de son anticorps murin parent dans des modèles de cancers réalisés chez des souris nues porteuses de xénogreffes a résulté en une importante activité antitumorale sur des cancers humains, dont les cancers du côlon, du sein, du pancréas et de la prostate. La progression de la maladie métastatique a été inhibée et la perméabilité microvasculaire réduite.

#### Efficacité clinique

##### Cancer colorectal métastatique (CCRM)

La tolérance et l'efficacité à la posologie recommandée (5 mg/kg de poids corporel toutes les deux semaines) dans le cancer colorectal métastatique ont été évaluées dans trois études cliniques randomisées, contrôlées, associant le bevacizumab à une chimiothérapie de première ligne à base de fluoropyrimidine. Bevacizumab était associé à deux protocoles de chimiothérapie :

- AVF2107g : Administration hebdomadaire d'irinotécan/5-fluorouracile en bolus/acide folinique (IFL) pendant 4 semaines consécutives par cycle, chaque cycle ayant une durée de 6 semaines (protocole Saltz).
- AVF0780g : Administration hebdomadaire de 5-fluorouracile en bolus/acide folinique (5-FU/AF) pendant 6 semaines consécutives par cycle, chaque cycle ayant une durée de 8 semaines (protocole Roswell Park).
- AVF2192g : Administration hebdomadaire de 5-FU/AF pendant 6 semaines consécutives par cycle, chaque cycle ayant une durée de 8 semaines (protocole Roswell Park) chez des patients pour lesquels un traitement de première ligne par irinotécan n'était pas indiqué de façon optimale.

Trois études supplémentaires ont été conduites avec du bevacizumab chez des patients atteints d'un cancer colorectal métastatique : en traitement de première ligne (NO16966), de seconde ligne chez des patients n'ayant pas été traité au préalable avec du bevacizumab (E3200) et de seconde ligne chez des patients ayant été traités au préalable avec du bevacizumab en première ligne et chez lesquels la maladie a progressé (ML18147). Dans ces études, le bevacizumab a été administré en association au FOLFOX-4 (5FU/LV/oxaliplatine), au XELOX (capécitabine/oxaliplatine) et à une association de

chimiothérapie à base de fluoropyrimidine/irinotécan ou de fluoropyrimidine/oxaliplatine aux posologies suivantes :

- NO16966 : Bevacizumab à la dose de 7,5 mg/kg de poids corporel toutes les trois semaines en association à la capécitabine par voie orale et à l'oxaliplatine (XELOX) par voie intraveineuse ou bevacizumab à la dose de 5 mg/kg toutes les deux semaines en association à la leucovorine + 5-fluorouracile en bolus, suivi de 5-fluorouracile en perfusion, associé à l'oxaliplatine par voie intraveineuse (FOLFOX-4).
- E3200 : Bevacizumab à la dose de 10 mg/kg de poids corporel toutes les deux semaines en association à la leucovorine et au 5-fluorouracile en bolus, suivi du 5-fluorouracile en perfusion, associé à l'oxaliplatine par voie intraveineuse (FOLFOX-4) chez des patients naïfs de traitement par bevacizumab.
- ML18147 : Bevacizumab à la dose de 5 mg/kg de poids corporel toutes les deux semaines ou à la dose de 7,5 mg/kg de poids corporel toutes les 3 semaines en association à une chimiothérapie à base de fluoropyrimidine/irinotécan ou de fluoropyrimidine/oxaliplatine chez des patients dont la maladie a progressé après une première ligne de traitement avec du bevacizumab. L'utilisation d'une chimiothérapie à base d'irinotécan ou d'oxaliplatine dépendait du traitement reçu en 1<sup>ère</sup> ligne, respectivement soit une chimiothérapie à base d'oxaliplatine soit à base d'irinotécan.

#### *AVF2107g*

Il s'agissait d'une étude de phase III, randomisée, en double aveugle, contrôlée, évaluant bevacizumab en association à une chimiothérapie IFL en traitement de première ligne du cancer colorectal métastatique. Huit cent treize patients ont été randomisés pour recevoir soit IFL + placebo (bras 1), soit IFL + bevacizumab (5 mg/kg toutes les 2 semaines, groupe 2). Un troisième groupe de 110 patients a reçu une chimiothérapie 5-FU en bolus/AF + bevacizumab (bras 3). L'inclusion dans le bras 3 a été interrompue, comme le prévoyait le protocole, lorsque la tolérance du bevacizumab associé au schéma IFL a été établie et jugée acceptable. Tous les traitements ont été poursuivis jusqu'à progression de la maladie. L'âge moyen des patients était de 59,4 ans et l'indice de performance ECOG était de 0 chez 56,6 %, de 1 chez 43 % et de 2 chez 0,4 % des patients. 15,5 % des patients avaient reçu précédemment une radiothérapie et 28,4 % une chimiothérapie.

Le critère principal d'efficacité de l'étude était la survie globale. L'association du bevacizumab + IFL a conduit à une augmentation statistiquement significative de la survie globale, de la survie sans progression et du taux de réponse globale (voir tableau 4). Le bénéfice clinique, évalué par la survie globale, a été constaté dans toutes les sous populations de patients prédéfinies en fonction de l'âge, du sexe, de l'indice de performance, de la localisation de la tumeur primitive, du nombre d'organes atteints et de la durée de la maladie métastatique.

Les résultats d'efficacité du bevacizumab en association à la chimiothérapie IFL sont présentés dans le tableau 4.

**Tableau 4. Résultats d'efficacité de l'étude AVF2107g**

|                             | AVF2107g               |                                         |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
|                             | Groupe 1 IFL + placebo | Groupe 2 IFL + bevacizumab <sup>a</sup> |
| Nombre de patients          | 411                    | 402                                     |
| Survie globale              |                        |                                         |
| Temps médian (mois)         | 15,6                   | 20,3                                    |
| IC 95 %                     | 14,29 - 16,99          | 18,46 - 24,18                           |
| Risque relatif <sup>b</sup> | 0,660<br>(p = 0,00004) |                                         |
| Survie sans progression     |                        |                                         |
| Temps médian (mois)         | 6,2                    | 10,6                                    |
| Risque relatif              | 0,54<br>(p < 0,0001)   |                                         |
| Taux de réponse globale     |                        |                                         |
| Taux (%)                    | 34,8                   | 44,8                                    |
|                             | (p = 0,0036)           |                                         |

<sup>a</sup>5 mg/kg toutes les 2 semaines.

<sup>b</sup>Par rapport au groupe témoin.

Chez les 110 patients randomisés dans le groupe 3 (5-FU/AF + bevacizumab) avant l'arrêt de ce bras, la médiane de survie globale a été de 18,3 mois et la médiane de survie sans progression de 8,8 mois.

#### *AVF2192g*

Cette étude clinique de phase II randomisée, contrôlée et en double aveugle évaluant l'efficacité et la tolérance du bevacizumab en association à la chimiothérapie 5-FU/AF en traitement de première ligne du cancer colorectal métastatique chez des patients pour lesquels un traitement de première ligne par l'irinotécan n'était pas indiqué de façon optimale. Cent cinq patients ont été randomisés dans le groupe 5-FU/AF + placebo et 104 dans le groupe 5-FU/AF + bevacizumab (5 mg/kg toutes les 2 semaines). Tous les traitements ont été poursuivis jusqu'à progression de la maladie. L'association du bevacizumab (5 mg/kg toutes les 2 semaines) à la chimiothérapie 5-FU/AF a conduit à des taux de réponse objective plus élevés, à une prolongation significative de la survie sans progression et à une tendance à une survie plus longue comparé à la chimiothérapie 5-FU/AF seule.

#### *AVF0780g*

Il s'agissait d'une étude clinique de phase II, randomisée, contrôlée, ouverte, évaluant bevacizumab en association à une chimiothérapie 5-FU/AF comme traitement de première ligne du cancer colorectal métastatique. L'âge médian était de 64 ans. 19 % des patients avaient reçu précédemment une chimiothérapie et 14 % une radiothérapie. Soixante et onze patients ont été randomisés pour recevoir 5-FU en bolus/AF ou 5-FU en bolus/AF + bevacizumab (5 mg/kg toutes les 2 semaines). Un troisième groupe de 33 patients a reçu 5-FU en bolus/AF + bevacizumab (10 mg/kg toutes les 2 semaines). Les patients ont été traités jusqu'à progression de la maladie. Les critères principaux de l'étude étaient le taux de réponse objective et la survie sans progression de la maladie. L'association de bevacizumab (5 mg/kg toutes les deux semaines) à la chimiothérapie 5-FU/AF a conduit, par comparaison à la chimiothérapie 5-FU/AF seule, à l'augmentation du taux de réponse objective, à l'allongement de la survie sans progression, ainsi qu'à une tendance à la prolongation de la survie (voir tableau 5). Ces résultats d'efficacité sont en adéquation avec ceux de l'étude AVF2107g.

Les données d'efficacité des études AVF0780g et AVF2192g évaluant bevacizumab en association à la chimiothérapie 5-FU/AF sont résumées dans le tableau 5.

**Tableau 5. Résultats d'efficacité des études AVF0780g et AVF2192g**

|                                | <b>AVF0780g</b> |                                          |                                          | <b>AVF2192g</b>          |                              |
|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|                                | <b>5-FU/AF</b>  | <b>5-FU/AF + bevacizumab<sup>a</sup></b> | <b>5-FU/AF + bevacizumab<sup>b</sup></b> | <b>5-FU/AF + placebo</b> | <b>5-FU/AF + bevacizumab</b> |
| Nombre de patients             | 36              | 35                                       | 33                                       | 105                      | 104                          |
| <b>Survie globale</b>          |                 |                                          |                                          |                          |                              |
| Temps médian (mois)            | 13,6            | 17,7                                     | 15,2                                     | 12,9                     | 16,6                         |
| IC 95 %                        |                 |                                          |                                          | 10,35 - 16,95            | 13,63 - 19,32                |
| Risque relatif <sup>c</sup>    | -               | 0,52                                     | 1,01                                     |                          | 0,79                         |
| p                              |                 | 0,073                                    | 0,978                                    |                          | 0,16                         |
| <b>Survie sans progression</b> |                 |                                          |                                          |                          |                              |
| Temps médian (mois)            | 5,2             | 9,0                                      | 7,2                                      | 5,5                      | 9,2                          |
| Risque relatif                 |                 | 0,44                                     | 0,69                                     |                          | 0,5                          |
| p                              | -               | 0,0049                                   | 0,217                                    |                          | 0,0002                       |
| <b>Réponse globale</b>         |                 |                                          |                                          |                          |                              |
| Taux (%)                       | 16,7            | 40,0                                     | 24,2                                     | 15,2                     | 26                           |
| IC 95 %                        | 7,0 - 33,5      | 24,4 - 57,8                              | 11,7 - 42,6                              | 9,2 - 23,9               | 18,1 - 35,6                  |
| p                              |                 | 0,029                                    | 0,43                                     |                          | 0,055                        |
| <b>Durée de réponse</b>        |                 |                                          |                                          |                          |                              |
| Temps médian (mois)            | NA              | 9,3                                      | 5,0                                      | 6,8                      | 9,2                          |
| 25e - 75e percentile (mois)    | 5,5 - NA        | 6,1 - NA                                 | 3,8 - 7,8                                | 5,59 - 9,17              | 5,88 - 13,01                 |

<sup>a</sup>5 mg/kg toutes les 2 semaines.<sup>b</sup>10 mg/kg toutes les 2 semaines.<sup>c</sup>Par rapport au groupe témoin

NA = non atteint.

*NO16966*

Il s'agissait d'une étude de phase III randomisée, en double aveugle (pour le bevacizumab), évaluant le bevacizumab à la dose de 7,5 mg/kg en association à la capécitabine orale et à l'oxaliplatine I.V. (XELOX), administré sur un schéma toutes les trois semaines ou le bevacizumab à la dose de 5 mg/kg en association à la leucovorine et au 5-fluorouracile en bolus, suivi du 5-fluorouracile en perfusion, associé à l'oxaliplatine I.V. (FOLFOX-4), administré sur un schéma toutes les deux semaines. L'étude comportait deux parties : une partie initiale (Partie I) au cours de laquelle les patients ont été randomisés, en ouvert, en deux bras de traitements différents (XELOX et FOLFOX-4) et une autre partie (Partie II) au cours de laquelle les patients ont été randomisés selon un plan factoriel 2 x 2 avec 4 bras de traitements (XELOX + placebo, FOLFOX-4 + placebo, XELOX + bevacizumab, FOLFOX-4 + bevacizumab). Dans la partie II, le bevacizumab a été administré en double aveugle.

Dans la partie II de l'étude, environ 350 patients ont été randomisés dans chacun des quatre groupes.

**Tableau 6. Schéma thérapeutique de l'étude NO16966 (CCRM)**

|                                                                            | Traitement                                     | Dose initiale                                                                                                                   | Calendrier                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FOLFOX-4<br>ou<br>FOLFOX-4<br>+<br>bevacizumab                             | Oxaliplatine<br>Leucovorine<br>5-fluorouracile | 85 mg/m <sup>2</sup> IV 2 h<br>200 mg/m <sup>2</sup> IV 2 h<br>400 mg/m <sup>2</sup> IV bolus,<br>600 mg/m <sup>2</sup> IV 22 h | Oxaliplatine au jour 1<br>Leucovorine au jour 1 et au jour 2<br>5-fluorouracile IV en bolus/perfusion,<br>chacun au jour 1 et au jour 2     |
|                                                                            | Placebo ou<br>bevacizumab                      | 5 mg/kg IV 30-90 min                                                                                                            | Jour 1, avant FOLFOX-4, toutes les<br>2 semaines                                                                                            |
| XELOX ou<br>XELOX +<br>bevacizumab                                         | Oxaliplatine<br>Capécitabine                   | 130 mg/m <sup>2</sup> IV 2 h<br>1 000 mg/m <sup>2</sup> voie orale<br>2 fois par jour                                           | Oxaliplatine au jour 1<br>Capécitabine par voie orale (en 2 prises<br>par jour) pendant 2 semaines (suivi<br>d'une semaine sans traitement) |
|                                                                            | Placebo ou<br>bevacizumab                      | 7,5 mg/kg IV 30-90 min                                                                                                          | Jour 1, avant XELOX, pendant<br>3 semaines                                                                                                  |
| 5-Fluorouracile : injection IV en bolus immédiatement après la leucovorine |                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |

Le critère principal d'efficacité de l'étude a été la durée de survie sans progression. Dans cette étude, il y avait deux objectifs principaux : démontrer la non-infériorité de XELOX par rapport à FOLFOX-4 et démontrer la supériorité du bevacizumab associé à la chimiothérapie (FOLFOX-4 ou XELOX) comparé à la chimiothérapie seule. Ces deux objectifs principaux ont été atteints :

- La non-infériorité des bras contenant XELOX comparés aux bras contenant FOLFOX-4 a été démontrée en termes de survie sans progression et de survie globale dans la population éligible per-protocole.
- La supériorité des bras contenant bevacizumab versus les bras traités par chimiothérapie seule a été démontrée en termes de survie sans progression dans la population ITT (Tableau 7).

Les analyses secondaires de PFS, basées sur l'évaluation d'un Comité de Revue Indépendant (CRI) et sur les évaluations de la réponse « sous-traitement », ont confirmé la supériorité significative du bénéfice clinique pour les patients traités avec bevacizumab (voir analyses de sous-groupe du Tableau 7), comme observé lors de l'analyse poolée.

**Tableau 7. Résultats d'efficacité pour l'analyse de la supériorité (Population ITT, étude NO16966)**

| Critères (mois)                                         | FOLFOX-4 ou<br>XELOX + placebo<br>(n = 701) | FOLFOX-4 ou XELOX<br>+ bevacizumab<br>(n = 699) | p        |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| Critère principal                                       |                                             |                                                 |          |
| Survie sans progression<br>médiane**                    | 8,0                                         | 9,4                                             | 0,0023   |
| Risque relatif (IC<br>97,5 %)ª                          | 0,83 (0,72 - 0,95)                          |                                                 |          |
| Critères secondaires                                    |                                             |                                                 |          |
| Survie sans progression<br>médiane (sous traitement)**  | 7,9                                         | 10,4                                            | < 0,0001 |
| Risque relatif (IC<br>97,5 %)                           | 0,63 (0,52 - 0,75)                          |                                                 |          |
| Taux de réponse globale<br>(revue des investigateurs)** | 49,2 %                                      | 46,5 %                                          |          |
| Survie globale médiane*                                 | 19,9                                        | 21,2                                            | 0,0769   |
| Risque relatif (IC<br>97,5 %)                           | 0,89 (0,76 - 1,03)                          |                                                 |          |

\*Analyse de la survie globale avec un cut-off au 31 janvier 2007

\*\*Analyse primaire avec un cut-off au 31 janvier 2006

<sup>a</sup>Par rapport au groupe témoin.

Dans le groupe traité par FOLFOX, la PFS médiane était de 8,6 mois pour le groupe placebo et de 9,4 mois pour le groupe bevacizumab (risque relatif = 0,89, IC 97,5 % = [0,73 ; 1,08], p = 0,1871), les résultats correspondant dans le groupe traité par XELOX étant de 7,4 vs 9,3 mois (risque relatif = 0,77, IC 97,5 % = [0,63 ; 0,94], p = 0,0026).

Dans le groupe FOLFOX, la médiane de survie globale était de 20,3 mois pour le groupe placebo et de 21,2 mois chez les patients traités par bevacizumab (risque relatif = 0,94, IC 97,5 % = [0,75 ; 1,16], p = 0,4937), les résultats correspondants dans le groupe traité par XELOX étant de 19,2 vs 21,4 mois (risque relatif = 0,84, IC 97,5 % = [0,68 ; 1,04], p = 0,0698).

### ECOG E3200

Il s'agissait d'une étude de phase III, randomisée, contrôlée en ouvert, évaluant le bevacizumab 10 mg/kg en association à la leucovorine et au 5-fluorouracile en bolus puis 5FU en perfusion, avec l'oxaliplatine en intraveineuse (FOLFOX-4), administrés selon un schéma toutes les 2 semaines chez les patients ayant déjà été traités précédemment (en seconde ligne) pour un cancer colorectal avancé. Dans les bras sous chimiothérapie, le bras avec FOLFOX-4 a reçu les mêmes doses, selon le même schéma décrit précédemment dans le Tableau 6 de l'étude NO16966.

Le critère principal d'efficacité de l'étude a été la survie globale, définie entre le temps de la randomisation et celui du décès quelle que soit sa cause. 829 patients ont été randomisés (292 sous FOLFOX-4, 293 sous bevacizumab + FOLFOX-4 et 244 sous bevacizumab en monothérapie). L'ajout de bevacizumab à FOLFOX-4 a prolongé la survie de manière significative. Une augmentation significative de la survie sans progression et du taux de réponse objective ont également été observés (voir Tableau 8).

**Tableau 8. Résultats d'efficacité de l'étude E3200**

|                             | E3200                 |                                     |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
|                             | FOLFOX-4              | FOLFOX-4 + bevacizumab <sup>a</sup> |
| Nombre de patients          | 292                   | 293                                 |
| Survie globale              |                       |                                     |
| Médiane (mois)              | 10,8                  | 13,0                                |
| IC 95 %                     | 10,12 - 11,86         | 12,09 - 14,03                       |
| Risque relatif <sup>b</sup> | 0,751<br>(p = 0,0012) |                                     |
| Survie sans progression     |                       |                                     |
| Médiane (mois)              | 4,5                   | 7,5                                 |
| Risque relatif              | 0,518<br>(p < 0,0001) |                                     |
| Taux de réponse objective   |                       |                                     |
| Taux                        | 8,6 %                 | 22,2 %                              |
|                             | (p < 0,0001)          |                                     |

<sup>a</sup>10 mg/kg toutes les 2 semaines.

<sup>b</sup>Par rapport au groupe témoin.

Aucune différence significative n'a été observée en termes de durée de survie globale entre les patients ayant reçu bevacizumab en monothérapie comparés à ceux traités avec FOLFOX-4. La survie sans progression et le taux de réponse objective ont été inférieurs dans le bras avec bevacizumab en monothérapie comparé à celui avec FOLFOX-4.

Il s'agissait d'une étude de phase III, randomisée, contrôlée, en ouvert évaluant bevacizumab 5 mg/kg toutes les 2 semaines ou 7,5 mg/kg toutes les 3 semaines en association à une chimiothérapie à base de fluoropyrimidine versus chimiothérapie à base de fluoropyrimidine seule, chez des patients atteints d'un cancer colorectal métastatique ayant progressé après un traitement de 1ère ligne contenant du bevacizumab.

Les patients atteints d'un cancer colorectal métastatique, histologiquement confirmé et dont la maladie avait progressé, étaient randomisés en proportion égale (1:1) dans les 3 mois après l'arrêt du bevacizumab utilisé en 1ère ligne de traitement, pour recevoir une chimiothérapie à base de fluoropyrimidine/oxaliplatine ou fluoropyrimidine/irinotécan (la chimiothérapie avait été modifiée en fonction de celle utilisée en première ligne de traitement) avec ou sans bevacizumab. Le traitement était administré jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable. Le critère principal était la survie globale définie comme le délai entre la randomisation et le décès quel qu'en soit la cause.

Un total de 820 patients a été randomisé. L'ajout du bevacizumab à la chimiothérapie à base de fluoropyrimidine a montré un allongement statistiquement significatif de la survie chez des patients atteints d'un cancer colorectal métastatique ayant progressé après une première ligne de traitement contenant du bevacizumab (ITT = 819) (voir tableau 9).

**Tableau 9. Résultats d'efficacité de l'étude ML18147 (population ITT)**

|                                          | <b>ML18147</b>                                                                               |                                                                                                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | <b>Chimiothérapie à base de fluoropyrimidine/irinotécan ou fluoropyrimidine/oxaliplatine</b> | <b>Chimiothérapie à base de fluoropyrimidine/irinotécan ou fluoropyrimidine/oxaliplatine + bevacizumab<sup>a</sup></b> |
| Nombre de patients                       | 410                                                                                          | 409                                                                                                                    |
| Survie globale                           |                                                                                              |                                                                                                                        |
| Médiane (mois)                           | 9,8                                                                                          | 11,2                                                                                                                   |
| Risque relatif (IC 95%)                  | 0,81 (0,69 ; 0,94)<br>(p = 0,0062)                                                           |                                                                                                                        |
| Survie sans progression                  |                                                                                              |                                                                                                                        |
| Médiane (mois)                           | 4,1                                                                                          | 5,7                                                                                                                    |
| Risque relatif (IC 95%)                  | 0,68 (0,59 ; 0,78)<br>(p < 0,0001)                                                           |                                                                                                                        |
| Taux de réponse objective (ORR)          |                                                                                              |                                                                                                                        |
| Nombre de patients inclus dans l'analyse | 406                                                                                          | 404                                                                                                                    |
| Taux                                     | 3,9 %                                                                                        | 5,4 %                                                                                                                  |
|                                          | (p = 0,3113)                                                                                 |                                                                                                                        |

<sup>a</sup>5 mg/kg toutes les 2 semaines ou 7,5 mg/kg toutes les 3 semaines.

Des améliorations statistiquement significatives de la survie sans progression ont été observées. Le taux de réponse objective était faible dans les deux bras de traitement et la différence n'était pas significative.

L'étude E3200 a utilisé une dose de bevacizumab équivalente à 5 mg/kg par semaine chez les patients naïfs de bevacizumab, alors que l'étude ML18147 a utilisé une dose de bevacizumab équivalente à 2,5 mg/kg par semaine chez des patients pré-traités par bevacizumab. Une comparaison croisée des études sur les données d'efficacité et de tolérance est limitée en raison de différences entre ces études, plus particulièrement sur les populations de patients, l'exposition préalable au bevacizumab et les traitements de chimiothérapie. Les posologies de bevacizumab de 5 mg/kg par semaine et de 2,5 mg/kg par semaine ont chacune apporté un bénéfice statistiquement significatif en ce qui concerne

la survie globale (RR = 0,751 dans l'étude E3200 ; RR = 0,81 dans l'étude ML18147) et la survie sans progression (RR = 0,518 dans l'étude E3200 ; RR = 0,68 dans l'étude ML18147). En termes de tolérance, l'incidence globale des effets indésirables de grades 3-5 a été plus élevée dans l'étude E3200 que dans l'étude ML18147.

### Cancer du sein métastatique (CSm)

Deux larges études de phase III avaient pour objectif d'évaluer l'effet du bevacizumab en association à deux chimiothérapies distinctes, avec comme critère principal : la Survie Sans Progression (PFS). Une amélioration cliniquement pertinente et statistiquement significative de la PFS a été observée dans chacune des deux études.

Les résultats de PFS pour chaque chimiothérapie de l'indication sont résumés ci-dessous :

- Étude E2100 (paclitaxel)
  - Augmentation de la médiane de PFS de 5,6 mois, risque relatif 0,421 ( $p < 0,0001$ , IC 95 % : [0,343 ; 0,516])
- Étude AVF3694g (capécitabine)
  - Augmentation de la médiane de PFS 2,9 mois, risque relatif 0,69 ( $p = 0,0002$ , IC 95 % : [0,56 ; 0,84])

Des informations complémentaires sur chaque étude sont présentées ci-dessous.

### *ECOG E2100*

L'étude E2100 était une étude ouverte, randomisée, contrôlée, multicentrique, évaluant le bevacizumab en association au paclitaxel en première ligne de traitement des patients atteints de cancers du sein métastatique ou en rechute locale et n'ayant pas reçu de chimiothérapie antérieure pour leur maladie métastatique ou en rechute locale. Les patients étaient randomisés pour recevoir soit du paclitaxel seul (90 mg/m<sup>2</sup> en perfusion I.V. d'1 heure une fois par semaine 3 semaines sur 4) soit du paclitaxel en association au bevacizumab (10 mg/kg en perfusion I.V. toutes les 2 semaines). Un traitement antérieur de la maladie métastatique par hormonothérapie était autorisé. Un traitement adjuvant antérieur par taxane était autorisé, uniquement s'il avait été terminé au moins 12 mois avant l'entrée dans l'étude. Parmi les 722 patients de l'étude, la majorité (90 %) avait un statut HER2-négatif. Un petit nombre de patients avait un statut inconnu (8 %) ou un statut HER2-positif confirmé (2 %) et avait été précédemment traité par trastuzumab ou considéré comme non éligible au trastuzumab. Par ailleurs, 65 % des patients avaient reçu une chimiothérapie adjuvante comportant des taxanes (19 %) et des anthracyclines (49 %). Les patients avec des métastases du système nerveux central, y compris celles antérieurement traitées ou opérées étaient exclus.

Dans l'étude E2100, les patients étaient traités jusqu'à progression de la maladie. Dans les cas où un arrêt prématuré de la chimiothérapie était nécessaire, le traitement par bevacizumab en monothérapie était poursuivi jusqu'à progression de la maladie. Les caractéristiques des patients étaient similaires dans les deux bras de traitement. L'objectif principal de l'étude était la survie sans progression (PFS), selon une évaluation de la progression de la maladie faite par les investigateurs de l'étude. De plus, une revue indépendante du critère principal a également été réalisée. Les résultats de cette étude sont présentés dans le tableau 10.

**Tableau 10. Résultats d'efficacité de l'étude E2100**

| Survie sans progression                                         |                                |                                     |                                     |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                 | Évaluation des investigateurs* |                                     | Évaluation de la revue indépendante |                                     |
|                                                                 | Paclitaxel<br>(n = 354)        | Paclitaxel/bevacizumab<br>(n = 368) | Paclitaxel<br>(n = 354)             | Paclitaxel/bevacizumab<br>(n = 368) |
| Médiane de la survie sans progression (mois)                    | 5,8                            | 11,4                                | 5,8                                 | 11,3                                |
| Risque relatif (IC 95%)                                         | 0,421<br>(0,343 ; 0,516)       |                                     | 0,483<br>(0,385 ; 0,607)            |                                     |
| p                                                               | < 0,0001                       |                                     | < 0,0001                            |                                     |
| Taux de réponse (chez les patients ayant une maladie mesurable) |                                |                                     |                                     |                                     |
|                                                                 | Évaluation des investigateurs  |                                     | Évaluation de la revue indépendante |                                     |
|                                                                 | Paclitaxel<br>(n = 273)        | Paclitaxel/bevacizumab<br>(n = 252) | Paclitaxel<br>(n = 243)             | Paclitaxel/bevacizumab<br>(n = 229) |
| % de patients avec une réponse objective                        | 23,4                           | 48,0                                | 22,2                                | 49,8                                |
| p                                                               | < 0.0001                       |                                     | < 0.0001                            |                                     |

\* Analyse primaire

| Survie globale                      |                          |                                     |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|                                     | Paclitaxel<br>(n = 354)  | Paclitaxel/bevacizumab<br>(n = 368) |
| Médiane de la survie globale (mois) | 24,8                     | 26,5                                |
| Risque relatif (IC 95%)             | 0,869<br>(0,722 ; 1,046) |                                     |
| p                                   | 0,1374                   |                                     |

Le bénéfice clinique du bevacizumab évalué par la PFS a été retrouvé dans tous les sous-groupes testés prévus au protocole (y compris l'intervalle libre sans récurrence, le nombre de sites métastatiques, un traitement antérieur par chimiothérapie adjuvante et le statut des récepteurs aux œstrogènes).

#### AVF3694g

L'étude AVF3694g était une étude de phase III, multicentrique, randomisée, contrôlée versus placebo ayant pour objectif d'évaluer l'efficacité et la tolérance du bevacizumab en association à une chimiothérapie comparé à une chimiothérapie seule, en traitement de 1<sup>ère</sup> ligne, chez des patients présentant un cancer du sein métastatique HER-2 négatif ou localement récidivant.

La chimiothérapie était choisie à la discrétion de l'investigateur avant la randomisation selon un ratio 2:1, pour recevoir soit une chimiothérapie plus bevacizumab, soit une chimiothérapie plus placebo. Les choix de chimiothérapies comprenaient la capecitabine, un taxane (particules de protéines liées au paclitaxel, docétaxel), des traitements à base d'anthracyclines (doxorubicine/cyclophosphamide, épirubicine/cyclophosphamide, 5-fluorouracil/doxorubicine/cyclophosphamide, 5-fluorouracile/épirubicine/cyclophosphamide) administrés toutes les 3 semaines. Bevacizumab ou le placebo était administré à la posologie de 15 mg/kg toutes les 3 semaines.

Cette étude comprenait une phase de traitement en aveugle, une phase optionnelle en ouvert après progression et une phase de suivi de la survie. Durant la phase de traitement en aveugle, les patients ont reçu une chimiothérapie en association au médicament (bevacizumab ou placebo) toutes les 3 semaines jusqu'à progression de la maladie, toxicité limitant le traitement, ou décès. Après progression documentée de la maladie, les patients qui entraient dans la phase optionnelle en ouvert

pouvaient recevoir du bevacizumab en ouvert en association à un large choix de traitement de deuxième ligne.

Les analyses statistiques ont été réalisées indépendamment pour : 1) les patients traités par capécitabine en association au bevacizumab ou au placebo ; 2) les patients traités par une chimiothérapie à base de taxanes ou d'anthracyclines en association au bevacizumab ou au placebo. Le critère principal était la Survie Sans Progression (PFS) basé sur l'évaluation de l'investigateur. Par ailleurs, le critère principal était également évalué par un comité de revue indépendant.

Les résultats de cette étude, pour les analyses de survie sans progression et de taux de réponses définies dans le protocole final, pour la cohorte capécitabine de l'étude AVF3694g, indépendante et de puissance nécessaire pour pouvoir conclure, sont présentés dans le tableau 11. Les résultats d'une étude exploratoire de la survie globale avec 7 mois supplémentaires de suivi (environ 46 % des patients étaient décédés) sont également présentés. Le pourcentage de patients ayant reçu bevacizumab pendant la phase en ouvert était de 62,1 % dans le bras capécitabine + placebo et de 49,9 % dans le bras capécitabine + bevacizumab.

**Tableau 11. Résultats d'efficacité de l'étude AVF3694g : Capécitabine<sup>a</sup> et bevacizumab/placebo (Cap + bevacizumab/PI)**

| Survie sans progression <sup>b</sup>                                        |                               |                                   |                                           |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                             | Évaluation des investigateurs |                                   | Évaluation du comité de revue indépendant |                                   |
|                                                                             | Cap + PI<br>(n = 206)         | Cap<br>+ bevacizumab<br>(n = 409) | Cap + PI<br>(n = 206)                     | Cap<br>+ bevacizumab<br>(n = 409) |
| Médiane de la survie sans progression (mois)                                | 5,7                           | 8,6                               | 6,2                                       | 9,8                               |
| Risque relatif vs bras placebo (IC 95 %)                                    | 0,69 (0,56 ; 0,84)            |                                   | 0,68 (0,54 ; 0,86)                        |                                   |
| p                                                                           | 0,0002                        |                                   | 0,0011                                    |                                   |
| Taux de réponse (pour les patients avec une maladie mesurable) <sup>b</sup> |                               |                                   |                                           |                                   |
|                                                                             | Cap + PI<br>(n = 161)         |                                   | Cap + bevacizumab<br>(n = 325)            |                                   |
| % de patients avec une réponse objective                                    | 23,6                          |                                   | 35,4                                      |                                   |
| p                                                                           | 0,0097                        |                                   |                                           |                                   |
| Survie globale <sup>b</sup>                                                 |                               |                                   |                                           |                                   |
| Risque relatif (IC 95%)                                                     | 0,88 (0,69 ; 1,13)            |                                   |                                           |                                   |
| Valeur exploratoire du p                                                    | 0,33                          |                                   |                                           |                                   |

<sup>a</sup>1 000 mg/m<sup>2</sup> administré par voie orale deux fois par jour pendant 14 jours toutes les 3 semaines

<sup>b</sup>Cette analyse stratifiée incluait tous les événements de progression ou de décès exceptés ceux liés à des traitements hors protocole initiés avant que la progression ne soit documentée; les données de ces patients étaient censurées au moment de la dernière évaluation tumorale avant le début du traitement hors protocole.

Une analyse non stratifiée de la PFS (évaluée par les investigateurs) a été réalisée sans censurer les traitements hors protocole avant progression de la maladie. Les résultats de ces analyses étaient très similaires à ceux de la survie sans progression du critère principal.

### Cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC)

*Traitement de première ligne du CBNPC non épidermoïde en association à une chimiothérapie à base de sels de platine.*

La tolérance et l'efficacité du bevacizumab associé à une chimiothérapie à base de sels de platine, en traitement de première ligne chez les patients atteints d'un cancer bronchique non à petites cellules

(CBNPC) non épidermoïde, ont été étudiées dans les études E4599 et BO17704. Un bénéfice sur la survie globale a été démontré dans l'étude E4599 avec bevacizumab à la posologie de 15 mg/kg toutes les 3 semaines. L'étude BO17704 a démontré que les posologies de 7,5 mg/kg et 15 mg/kg toutes les 3 semaines augmentent la survie sans progression et le taux de réponse.

#### E4599

L'étude E4599 était une étude ouverte, randomisée, contrôlée, multicentrique, évaluant le bevacizumab en traitement de première ligne du CBNPC localement avancé (stade IIIb avec épanchement pleural malin), métastatique ou en rechute, dès lors que l'histologie n'était pas à prédominance épidermoïde.

Les patients ont été randomisés pour recevoir une chimiothérapie à base de sels de platine (perfusion IV de paclitaxel 200 mg/m<sup>2</sup> et de carboplatine ASC = 6,0) (PC) le premier jour de chaque cycle de 3 semaines pendant 6 cycles maximum de PC, en association avec le bevacizumab à la dose de 15 mg/kg en perfusion IV le premier jour de chaque cycle de 3 semaines. À l'issue de 6 cycles complets de chimiothérapie carboplatine / paclitaxel ou en cas d'arrêt prématuré de la chimiothérapie, les patients du bras bevacizumab + carboplatine / paclitaxel ont continué à recevoir bevacizumab en monothérapie toutes les 3 semaines jusqu'à progression de la maladie. 878 patients ont été randomisés dans les deux bras.

Pendant l'essai, parmi les patients ayant reçu le traitement à l'étude, 32,2 % (136/422) ont reçu entre 7 et 12 administrations de bevacizumab et 21,1 % (89/422) des patients ont reçu 13 administrations ou plus de bevacizumab.

Le critère principal de l'étude était la durée de survie. Les résultats sont présentés dans le tableau 12.

**Tableau 12. Résultats d'efficacité de l'étude E4599**

|                         | Bras 1<br>Carboplatine/Paclitaxel          | Bras 2<br>Carboplatine/Paclitaxel + bevacizumab<br>15 mg/kg toutes les 3 semaines |
|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de patients      | 444                                        | 434                                                                               |
| Survie globale          |                                            |                                                                                   |
| Médiane (mois)          | 10,3                                       | 12,3                                                                              |
| Risque relatif          | 0,80 (p = 0,003)<br>IC 95 % (0,69 ; 0,93)  |                                                                                   |
| Survie sans progression |                                            |                                                                                   |
| Médiane (mois)          | 4,8                                        | 6,4                                                                               |
| Risque relatif          | 0,65 (p < 0,0001)<br>IC 95 % (0,56 ; 0,76) |                                                                                   |
| Taux de réponse globale |                                            |                                                                                   |
| Taux (%)                | 12,9                                       | 29,0 (p < 0,0001)                                                                 |

Dans une analyse exploratoire, l'amplitude du bénéfice en survie globale était moins prononcée dans le sous-groupe des patients dont l'histologie était autre qu'un adénocarcinome.

#### BO17704

L'étude BO17704 était une étude de phase III, randomisée, en double aveugle, évaluant le bevacizumab en association au cisplatine et à la gemcitabine versus placebo en association au cisplatine et à la gemcitabine, en première ligne de traitement du CBNPC non épidermoïde localement avancé (stade IIIb avec métastases ganglionnaires supraclaviculaires ou épanchement pleural ou péricardique malin), métastatique ou en rechute. L'objectif principal de l'étude était la survie sans progression, les objectifs secondaires comprenaient la durée de la survie globale.

Les patients ont été randomisés pour recevoir soit la chimiothérapie à base de sels de platine (CG) : 80 mg/m<sup>2</sup> de cisplatine en perfusion intraveineuse à J 1 et 1 250 mg/m<sup>2</sup> de gemcitabine par perfusion intraveineuse à J 1 et J 8 de chaque cycle de 3 semaines jusqu'à 6 cycles associé au placebo, soit CG en association au bevacizumab à la dose de 7,5 mg/kg ou de 15 mg/kg en perfusion IV à J 1 de chaque cycle de 3 semaines. Dans le bras bevacizumab, les patients pouvaient recevoir le bevacizumab en monothérapie une fois toutes les 3 semaines jusqu'à progression de la maladie ou apparition d'une toxicité non acceptable. Les résultats de l'étude montrent que 94 % (277/296) des patients éligibles ont reçu du bevacizumab en monothérapie au cycle 7. Une proportion élevée de patients (environ 62 %) a reçu différents types de traitements anticancéreux non spécifiés par le protocole, ce qui a pu impacter l'analyse de la survie globale.

Les résultats d'efficacité sont présentés dans le tableau 13.

**Tableau 13. Résultats d'efficacité de l'étude BO17704**

|                                                  | Cisplatine/Gemcitabine<br>+ placebo | Cisplatine/Gemcitabine<br>+ bevacizumab<br>7,5 mg/kg toutes les<br>3 semaines | Cisplatine/Gemcitabine<br>+ bevacizumab<br>15 mg/kg toutes les<br>3 semaines |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de patients                               | 347                                 | 345                                                                           | 351                                                                          |
| Survie sans<br>progression                       |                                     |                                                                               |                                                                              |
| Médiane (mois)                                   | 6,1                                 | 6,7<br>(p = 0,0026)                                                           | 6,5<br>(p = 0,0301)                                                          |
| Risque<br>relatif                                |                                     | 0,75<br>[0,62 ; 0,91]                                                         | 0,82<br>[0,68 ; 0,98]                                                        |
| Meilleur taux de<br>réponse globale <sup>a</sup> | 20,1 %                              | 34,1 %<br>(p < 0,0001)                                                        | 30,4 %<br>(p = 0,0023)                                                       |

<sup>a</sup>patients dont la maladie était mesurable lors de l'entrée dans l'étude

| Survie globale |      |                       |                       |
|----------------|------|-----------------------|-----------------------|
| Médiane (mois) | 13,1 | 13,6<br>(p = 0,4203)  | 13,4<br>(p = 0,7613)  |
| Risque relatif |      | 0,93<br>[0,78 ; 1,11] | 1,03<br>[0,86 ; 1,23] |

*Traitement de première ligne du CBNPC non épidermoïde présentant des mutations activatrices de l'EGFR en association à l'erlotinib*

*JO25567*

L'étude JO25567 était une étude de phase II, randomisée, en ouvert, multicentrique, conduite au Japon pour évaluer l'efficacité et la tolérance du bevacizumab utilisé en association à l'erlotinib, chez des patients atteints d'un CBNPC non épidermoïde, présentant des mutations activatrices de l'EGFR (délétion de l'exon 19 ou mutation L858R de l'exon 21), qui n'avaient pas reçu précédemment de traitement systémique à un stade IIIB/IV ou d'une maladie récidivante.

Le critère primaire était la survie sans progression (PFS) basée sur une évaluation indépendante. Les critères secondaires comprenaient la survie globale, le taux de réponse, le taux de contrôle de la maladie, la durée de la réponse et la tolérance.

Le statut de mutation de l'EGFR était déterminé pour chaque patient avant sa sélection et 154 patients ont été randomisés pour recevoir soit erlotinib + bevacizumab (erlotinib 150 mg par voie orale une fois par jour + bevacizumab [15 mg/kg en perfusion IV toutes les 3 semaines]) soit erlotinib en monothérapie (150 mg par voie orale une fois par jour) jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable. En l'absence de progression de la maladie, l'interruption d'un composant du traitement à

l'étude dans le bras erlotinib + bevacizumab n'a pas conduit à l'interruption de l'autre composant du traitement à l'étude, tel que spécifié dans le protocole de l'étude.

Les résultats d'efficacité de l'étude sont présentés dans le tableau 14.

**Tableau 14. Résultats d'efficacité de l'étude JO25567**

|                                             | <b>Erlotinib<br/>N = 77<sup>#</sup></b> | <b>Erlotinib + bevacizumab<br/>N = 75<sup>#</sup></b> |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Survie sans progression <sup>^</sup> (mois) |                                         |                                                       |
| Médiane                                     | 9,7                                     | 16,0                                                  |
| Risque relatif (HR) (IC 95%)                | 0,54 (0,36 ; 0,79)                      |                                                       |
| p                                           | 0,0015                                  |                                                       |
| Taux de réponse globale                     |                                         |                                                       |
| Taux (n)                                    | 63,6 % (49)                             | 69,3 % (52)                                           |
| p                                           | 0,4951                                  |                                                       |
| Survie globale* (mois)                      |                                         |                                                       |
| Médiane                                     | 47,4                                    | 47,0                                                  |
| Risque relatif (HR) (IC 95%)                | 0,81 (0,53 ; 1,23)                      |                                                       |
| p                                           | 0,3267                                  |                                                       |

<sup>#</sup>Un total de 154 patients (Indice de performance ECOG 0 ou 1) était randomisé. Cependant, deux des patients randomisés ont interrompu l'étude avant de recevoir le traitement à l'étude.

<sup>^</sup>Revue à l'aveugle indépendante (analyse principale telle que définie par le protocole)

\*Analyse exploratoire : analyse finale de la Survie Globale à la date de recueil des données du 31 octobre 2017, environ 59 % des patients étaient décédés

IC, intervalle de confiance ; HR, risque relatif à partir de l'analyse de régression Cox non stratifiée

#### Cancer du rein avancé et/ou métastatique (CRm)

##### *Bevacizumab en association à l'interféron alfa-2a en traitement de première ligne du cancer du rein avancé et/ou métastatique (BO17705)*

Il s'agissait d'une étude de phase III, randomisée, en double aveugle, qui évaluait l'efficacité et la tolérance du bevacizumab en association à l'interféron (IFN) alfa-2a comparativement à l'IFN alfa-2a seul, en traitement de première ligne du CRm. Les 649 patients randomisés (641 traités) avaient un score de performance KPS (Karnofsky Performance Status)  $\geq 70$  %, et ne présentaient aucune métastase du SNC, ni dysfonctionnement organique. Les patients ont subi une néphrectomie pour un carcinome rénal primitif. Bevacizumab à la posologie de 10 mg/kg toutes les 2 semaines était administré jusqu'à progression de la maladie. L'IFN alfa-2a était administré pendant 52 semaines ou jusqu'à progression de la maladie à une posologie initiale recommandée de 9 MUI trois fois par semaine, avec une réduction de la dose à 3 MUI trois fois par semaine autorisée en deux paliers. Les patients ont été stratifiés en fonction du pays et du score de Motzer et les bras de traitement étaient bien équilibrés en ce qui concerne les facteurs pronostiques.

L'objectif principal de l'étude était la survie globale et les objectifs secondaires incluaient la survie sans progression. L'addition du bevacizumab à l'IFN alpha-2a a significativement augmenté la survie sans progression et le taux de réponse tumorale objective. Ces résultats ont été confirmés par une revue radiologique indépendante. Toutefois, l'augmentation de 2 mois du critère principal, la survie globale, n'a pas été cliniquement significative (HR = 0,91). Une proportion importante de patients (approximativement 63 % IFN/placebo ; 55 % bevacizumab /IFN) ont reçu après l'étude des traitements anticancéreux non spécifiés initialement dans le protocole, dont des agents antinéoplasiques, ce qui peut avoir eu un impact sur l'analyse de la survie globale.

Les résultats d'efficacité sont présentés dans le tableau 15.

**Tableau 15. Résultats d'efficacité de l'étude BO17705**

|                                                                            | <b>BO17705</b>                      |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                            | <b>Placebo+ IFN<sup>a</sup></b>     | <b>BV<sup>b</sup>+ IFN<sup>a</sup></b> |
| Nombre de patients                                                         | 322                                 | 327                                    |
| Survie sans progression                                                    |                                     |                                        |
| Médiane (mois)                                                             | 5,4                                 | 10,2                                   |
| Risque relatif (IC 95 %)                                                   | 0,63<br>0,52 ; 0,75<br>(p < 0,0001) |                                        |
| Taux de réponse objective (%) chez les patients ayant une lésion mesurable |                                     |                                        |
| N                                                                          | 289                                 | 306                                    |
| Taux de réponse                                                            | 12,8 %                              | 31,4 %                                 |
|                                                                            | (p < 0,0001)                        |                                        |

<sup>a</sup>Interféron alfa-2a 9 MUI 3 x/semaine.

<sup>b</sup>Bevacizumab 10 mg/kg toutes les 2 semaines.

|                          |                                     |      |
|--------------------------|-------------------------------------|------|
| Survie globale           |                                     |      |
| Médiane (mois)           | 21,3                                | 23,3 |
| Risque relatif (IC 95 %) | 0,91<br>0,76 ; 1,10<br>(p = 0,3360) |      |

Un modèle exploratoire de régression multivariée de Cox utilisant une méthode de sélection pas à pas (backward) a identifié des facteurs pronostiques à l'inclusion qui étaient fortement associés à la survie indépendamment du traitement : sexe, nombre de leucocytes, plaquettes, perte de poids dans les 6 mois précédant l'entrée dans l'étude, nombre de site métastatiques, somme des plus grands diamètres des lésions cibles, score de Motzer. L'ajustement de ces facteurs à l'inclusion a conduit à un risque relatif pour le traitement de 0,78 (IC 95 % [0,63 ; 0,96], p = 0,0219), indiquant une réduction du risque de décès de 22 % dans le bras bevacizumab + IFN alpha-2a comparé au bras IFN alpha-2a.

Comme pré-spécifié dans le protocole, la dose d'IFN alpha-2a a été réduite de 9 MUI à 6 MUI, ou 3 MUI trois fois par semaine chez 97 patients du bras IFN alpha-2a et 131 patients du bras bevacizumab. D'après le taux de survie sans progression de la maladie au cours du temps, cette réduction de la dose d'IFN alpha-2a ne semble pas avoir eu d'effet sur l'efficacité de l'association bevacizumab et IFN alpha-2a, comme démontré par l'analyse en sous-groupe. Les 131 patients du bras bevacizumab + IFN alpha-2a ayant reçu une dose d'IFN alpha-2a réduite et maintenue à 6 ou 3 MUI, ont présenté un taux de survie sans progression de la maladie à 6, 12 et 18 mois de respectivement 73, 52 et 21 %, comparés à 61, 43 et 17 % dans la population totale des patients ayant été traités par bevacizumab + IFN alpha-2a.

#### AVF2938

Il s'agissait d'une étude clinique de phase II, randomisée, en double aveugle, comparant l'administration du bevacizumab à la posologie de 10 mg/kg toutes les 2 semaines et la même posologie du bevacizumab en association à 150 mg par jour d'erlotinib, chez les patients souffrant de cancer du rein métastatique à cellules claires. Un total de 104 patients a été randomisé pour recevoir le traitement : 53 patients ont reçu 10 mg/kg de bevacizumab toutes les 2 semaines plus placebo et 51 patients ont reçu 10 mg/kg de bevacizumab toutes les 2 semaines plus 150 mg par jour d'erlotinib. L'analyse du critère principal de l'étude n'a montré aucune différence entre le bras bevacizumab + placebo et le bras bevacizumab + erlotinib (survie sans progression médiane de 8,5 mois contre 9,9 mois). Sept patients de chaque bras ont présenté une réponse objective. L'association de l'erlotinib au bevacizumab n'a pas entraîné d'augmentation de la survie globale (risque relatif, 1,764 ; p = 0,1789), de la durée de réponse objective (6,7 vs 9,1 mois) ou du temps de progression des symptômes (risque relatif, 1,172 ; p = 0,5076).

Il s'agissait d'une étude clinique de phase II, randomisée, comparant l'efficacité et la tolérance du bevacizumab versus placebo. Un total de 116 patients a été randomisé pour recevoir 3 mg/kg de bevacizumab toutes les 2 semaines (n = 39), 10 mg/kg de bevacizumab toutes les 2 semaines (n = 37) ou un placebo (n = 40). Une analyse intermédiaire a montré qu'il y avait une prolongation significative du temps jusqu'à progression de la maladie dans le groupe traité par 10 mg/kg de bevacizumab comparé au groupe placebo (risque relatif, 2,55 ; p < 0,001). Il y avait une petite différence, à la limite de la significativité, dans le temps jusqu'à progression de la maladie entre le groupe traité par 3 mg/kg de bevacizumab et le groupe placebo (risque relatif, 1,26 ; p = 0,053). Cinq patients ont présenté une réponse objective (partielle), et chacun d'entre eux avait reçu la dose de 10 mg/kg de bevacizumab ; le taux de réponse objective pour la dose de 10 mg/kg était de 10 %.

### Cancer épithélial de l'ovaire, des trompes de Fallope et péritonéal primitif

#### *Traitement de première ligne du cancer de l'ovaire*

La tolérance et l'efficacité du bevacizumab, en traitement de première ligne chez des patientes atteintes d'un cancer épithélial de l'ovaire, des trompes de Fallope ou péritonéal primitif, ont été étudiées dans deux essais de phase III (GOG-0218 et BO17707) qui évaluaient l'effet de l'ajout du bevacizumab au carboplatine et au paclitaxel comparé à un traitement de chimiothérapie seul.

#### *GOG-0218*

L'étude GOG-0218 était une étude de phase III multicentrique, randomisée, en double aveugle, contrôlée versus placebo, à trois bras, évaluant l'effet de l'ajout du bevacizumab à un traitement de chimiothérapie approuvé (carboplatine et paclitaxel) chez des patientes atteintes d'un cancer épithélial de l'ovaire, des trompes de Fallope ou péritonéal primitif, à des stades avancés (stades III B, III C et IV selon la version datée de 1988 de la classification FIGO).

Les patientes ayant préalablement reçu pour un cancer de l'ovaire un traitement avec du bevacizumab, ou un traitement systémique anticancéreux (par exemple : chimiothérapie, traitement avec un anticorps monoclonal, traitement avec un inhibiteur de la tyrosine kinase ou un traitement hormonal) ou une radiothérapie abdominale ou pelvienne, étaient exclues de l'étude.

Un total de 1 873 patientes a été randomisé, en proportion égale, dans les trois bras suivants :

- Bras CPP : cinq cycles de placebo (à partir du cycle 2) en association au carboplatine (ASC 6) et au paclitaxel (175 mg/m<sup>2</sup>) pendant 6 cycles, suivi du placebo seul pour une durée totale de traitement allant jusqu'à 15 mois.
- Bras CPB15 : cinq cycles de bevacizumab (15 mg/kg toutes les 3 semaines à partir du cycle 2) en association au carboplatine (ASC 6) et au paclitaxel (175 mg/m<sup>2</sup>) pendant 6 cycles, suivis du placebo seul pour une durée totale de traitement allant jusqu'à 15 mois.
- Bras CPB15+ : cinq cycles de bevacizumab (15 mg/kg toutes les 3 semaines à partir du cycle 2) en association au carboplatine (ASC 6) et au paclitaxel (175 mg/m<sup>2</sup>) pendant 6 cycles, suivis du bevacizumab en monothérapie (15 mg/kg toutes les 3 semaines) pour une durée totale de traitement allant jusqu'à 15 mois.

La majorité des patientes incluses dans l'étude était de type caucasien (87 % dans les 3 bras) ; l'âge médian était de 60 ans dans les bras CPP et CPB15 et de 59 ans dans le bras CPB15+ ; 29 % des patientes des bras CPP et CPB15 et 26 % des patientes du bras CPB15+ avaient plus de 65 ans. Dans l'ensemble, environ 50 % des patientes avaient un indice de performance GOG de 0 à l'inclusion, 43 % un indice de performance GOG de 1, et 7 % un indice de performance GOG de 2. La plupart des patientes étaient atteintes d'un cancer épithélial de l'ovaire (82 % dans les bras CPP et CPB15, 85 % dans le bras CPB15+) ; viennent ensuite celles atteintes d'un cancer péritonéal primitif (16 % dans le bras CPP, 15 % dans le bras CPB15, 13 % dans le bras CPB15+), puis enfin celles atteintes d'un cancer des trompes de Fallope (1 % dans le bras CPP, 3 % dans le bras CPB15, 2 % dans le bras

CPB15+). La majorité des patientes présentait un adénocarcinome de type histologique séreux (85 % dans les bras CPP et CPB15, 86 % dans le bras CPB15+). Globalement, environ 34 % des patientes avaient une maladie résiduelle macroscopique de stade FIGO III après exérèse optimale, 40 % des patientes avaient une maladie résiduelle macroscopique de stade FIGO III après exérèse suboptimale et 26 % étaient de stade IV.

Le critère principal était la survie sans progression (PFS) basée sur l'évaluation de la progression de la maladie par les investigateurs, à partir de scanners, du taux du marqueur CA 125 ou d'une détérioration symptomatique durant le protocole. Par ailleurs, une analyse pré-définie des données censurant les événements de progression définis sur la base de l'augmentation du CA 125 a été conduite, ainsi qu'une revue indépendante de la PFS déterminée par les scanners.

L'objectif principal d'amélioration de la survie sans progression (PFS) a été atteint. Les patientes ayant reçu du bevacizumab à la dose de 15 mg/kg toutes les 3 semaines en association à la chimiothérapie et ayant continué à recevoir du bevacizumab seul (CPB15+), ont eu une amélioration cliniquement pertinente et statistiquement significative de la PFS, comparée aux patientes traitées par chimiothérapie seule (carboplatine et paclitaxel) en première ligne.

Aucun bénéfice cliniquement pertinent en PFS n'a été observé chez les patientes ayant reçu du bevacizumab en association à la chimiothérapie et n'ayant pas continué à recevoir du bevacizumab seul (CPB15).

Les résultats de cette étude sont résumés dans le tableau 16.

**Tableau 16. Résultats d'efficacité de l'étude GOG-0218**

| Survie sans progression (PFS) <sup>1</sup>   |                  |                       |                       |
|----------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                              | CPP<br>(n = 625) | CPB15<br>(n = 625)    | CPB15+<br>(n = 623)   |
| Médiane de la survie sans progression (mois) | 10,6             | 11,6                  | 14,7                  |
| Risque relatif (IC 95 %) <sup>2</sup>        |                  | 0,89<br>(0,78 ; 1,02) | 0,70<br>(0,61 ; 0,81) |
| p <sup>3,4</sup>                             |                  | 0,0437                | < 0,0001              |
| Taux de réponse objective <sup>5</sup>       |                  |                       |                       |
|                                              | CPP<br>(n = 396) | CPB15<br>(n = 393)    | CPB15+<br>(n = 403)   |
| % de patientes avec une réponse objective    | 63,4             | 66,2                  | 66,0                  |
| p                                            |                  | 0,2341                | 0,2041                |
| Survie globale <sup>6</sup>                  |                  |                       |                       |
|                                              | CPP<br>(n = 625) | CPB15<br>(n = 625)    | CPB15+<br>(n = 623)   |
| Médiane de la survie globale (mois)          | 40,6             | 38,8                  | 43,8                  |
| Risque relatif (IC 95 %) <sup>2</sup>        |                  | 1,07 (0,91 ; 1,25)    | 0,88 (0,75 ; 1,04)    |
| p <sup>3</sup>                               |                  | 0,2197                | 0,0641                |

<sup>1</sup> Les investigateurs ont évalué l'analyse de la PFS spécifiée au protocole GOG (données de progression CA 125 et traitements hors protocole avant progression de la maladie non censurés) à la date du 25 février 2010 (cut-off).

<sup>2</sup> Par rapport au groupe témoin ; risque relatif stratifié.

<sup>3</sup> Valeur P du test du log-rank unilatéral.

<sup>4</sup> Soumis à une valeur seuil de p de 0,0116.

<sup>5</sup> Patientes ayant une maladie mesurable à l'inclusion.

<sup>6</sup> Analyse de la survie globale finale évaluée au moment où 46,9 % des patientes étaient décédées.

Des analyses pré-définies de la PFS ont été conduites, toutes avec un cut-off au 29 septembre 2009. Les résultats de ces analyses pré-définies sont comme suit :

- L'analyse prévue au protocole de la PFS évaluée par les investigateurs (données de progression CA 125 et traitements hors protocole non censurés) a montré un risque relatif stratifié de 0,71 (IC à 95 % : 0,61 à 0,83, valeur de p du test du log-rank unilatéral < 0,0001) quand le bras CPB15+ est comparé au bras CPP, avec une médiane de PFS de 10,4 mois dans le bras CPP et de 14,1 mois dans le bras CPB15+.
- L'analyse primaire de la PFS évaluée par les investigateurs (données de progression CA 125 et traitements hors protocole censurés) a montré un risque relatif stratifié de 0,62 (IC 95 % : 0,52 - 0,75, valeur de p du test du log-rank unilatéral < 0,0001) quand le bras CPB15+ est comparé au bras CPP, avec une médiane de PFS de 12,0 mois dans le bras CPP et de 18,2 mois dans le bras CPB15+.
- L'analyse de la PFS déterminée par le comité de revue indépendant (traitements hors protocole censurés) a montré un risque relatif stratifié de 0,62 (IC 95 % : 0,50 - 0,77, valeur de p du test du log-rank unilatéral < 0,0001) quand le bras CPB15+ est comparé au bras CPP, avec une médiane de PFS de 13,1 mois dans le bras CPP et de 19,1 mois dans le bras CPB15+.

Des analyses de la PFS en sous-groupe, par stade de la maladie et statut de l'exérèse, sont résumées dans le Tableau 17. Ces résultats démontrent une robustesse de l'analyse de la PFS telle que présentée dans le Tableau 16.

**Tableau 17. Résultats de la PFS<sup>1</sup> par stade de la maladie et statut de l'exérèse de l'étude GOG-0218**

| Patientes randomisées ayant une maladie de stade III après exérèse optimale <sup>2,3</sup>  |                  |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                             | CPP<br>(n = 219) | CPB15<br>(n = 204)    | CPB15+<br>(n = 216)   |
| Médiane de la survie sans progression (mois)                                                | 12,4             | 14,3                  | 17,5                  |
| Risque relatif (IC 95 %) <sup>4</sup>                                                       |                  | 0,81<br>(0,62 ; 1,05) | 0,66<br>(0,50 ; 0,86) |
| Patientes randomisées ayant une maladie de stade III après exérèse suboptimale <sup>3</sup> |                  |                       |                       |
|                                                                                             | CPP<br>(n = 253) | CPB15<br>(n = 256)    | CPB15+<br>(n = 242)   |
| Médiane de la survie sans progression (mois)                                                | 10,1             | 10,9                  | 13,9                  |
| Risque relatif (IC 95 %) <sup>4</sup>                                                       |                  | 0,93<br>(0,77 ; 1,14) | 0,78<br>(0,63 ; 0,96) |
| Patientes randomisées ayant une maladie de stade IV                                         |                  |                       |                       |
|                                                                                             | CPP<br>(n = 153) | CPB15<br>(n = 165)    | CPB15+<br>(n = 165)   |
| Médiane de la survie sans progression (mois)                                                | 9,5              | 10,4                  | 12,8                  |
| Risque relatif (IC 95 %) <sup>4</sup>                                                       |                  | 0,90<br>(0,70 ; 1,16) | 0,64<br>(0,49 ; 0,82) |

<sup>1</sup>Les investigateurs ont évalué l'analyse de la PFS spécifiée au protocole GOG (données de progression CA 125 et traitements hors protocole avant progression de la maladie non censurés) à la date du 25 février 2010 (cut-off).

<sup>2</sup>Avec une maladie résiduelle macroscopique.

<sup>3</sup>3,7 % de la population globale de patientes randomisées avaient une maladie de stade IIIB.

<sup>4</sup>Par rapport au groupe témoin.

#### BO17707 (ICON7)

L'étude BO17707 était une étude de phase III, à deux bras, multicentrique, randomisée, contrôlée, en ouvert comparant l'effet de l'ajout du bevacizumab à l'association carboplatine plus paclitaxel chez des patientes, atteintes d'un cancer épithélial de l'ovaire, des trompes de Fallope ou péritonéal primitif de stade FIGO I ou IIA (grade 3 ou histologie à cellules claires uniquement ; n = 142), ou de stade de

FIGO IIB – IV (tous les grades et tous les types histologiques ; n = 1 386), après chirurgie (NCI-CTCAE v.3). La version datée de 1988 de la classification FIGO était utilisée dans cette étude.

Les patientes ayant préalablement reçu pour un cancer de l’ovaire un traitement avec du bevacizumab, ou un traitement systémique anticancéreux (par exemple : chimiothérapie, traitement avec un anticorps monoclonal, traitement avec un inhibiteur de la tyrosine kinase ou un traitement hormonal) ou une radiothérapie abdominale ou pelvienne, étaient exclues de l’étude.

Un total de 1 528 patientes a été randomisé, en proportion égale, dans les deux bras suivants :

- Bras CP : carboplatine (ASC 6) et paclitaxel (175 mg/m<sup>2</sup>) pendant 6 cycles d’une durée de 3 semaines.
- Bras CPB7.5+ : carboplatine (ASC 6) et paclitaxel (175 mg/m<sup>2</sup>) pendant 6 cycles d’une durée de 3 semaines plus bevacizumab (7,5 mg/kg toutes les 3 semaines) pendant 12 mois maximum (bevacizumab démarrait au cycle 2 de la chimiothérapie si le traitement avait été initié dans les 4 semaines suivant la chirurgie ou au cycle 1 si le traitement avait été initié plus de 4 semaines après la chirurgie).

La majorité des patientes incluses dans l’étude était de type caucasien (96 %) ; l’âge médian était de 57 ans dans les deux bras de traitement, 25 % des patientes de chaque bras avaient 65 ans ou plus et environ 50 % des patientes avaient un indice de performance ECOG de 1 ; 7 % des patientes de chaque bras avaient un indice de performance ECOG de 2. La majorité des patientes étaient atteintes d’un cancer épithélial de l’ovaire (87,7 %) ; venaient ensuite celles atteintes d’un cancer péritonéal primitif (6,9 %), puis enfin celles atteintes d’un cancer des trompes de Fallope (3,7 %) ou celles ayant un mélange des trois origines (1,7 %). La plupart des patientes étaient de stade FIGO III (68 % dans les deux groupes), venaient ensuite celles de stade FIGO IV (13% et 14%), de stade FIGO II (10% et 11%) et enfin de stade FIGO I (9 % et 7 %). La majorité des patientes dans chaque bras de traitement (74 % et 71 %) présentaient des tumeurs primaires peu différenciées (de grade 3) lors de la randomisation. L’incidence de chaque sous-type histologique du cancer épithélial de l’ovaire était similaire entre les deux bras de traitement ; 69 % des patientes dans chaque bras de traitement avaient un adénocarcinome de type histologique séreux.

Le critère principal était la survie sans progression (PFS), évaluée par les investigateurs selon RECIST.

L’objectif principal d’amélioration de la survie sans progression (PFS) a été atteint. Les patientes ayant reçu du bevacizumab à la dose de 7,5 mg/kg toutes les 3 semaines en association à la chimiothérapie et ayant continué à recevoir du bevacizumab seul pendant 18 cycles au maximum, ont eu une amélioration de la PFS statistiquement significative comparée aux patientes traitées par chimiothérapie seule (carboplatine et paclitaxel) en première ligne.

Les résultats de cette étude sont résumés dans le tableau 18.

**Tableau 18. Résultats d'efficacité de l'étude BO17707 (ICON7)**

| Survie sans progression                                       |                                    |                      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|                                                               | CP<br>(n = 764)                    | CPB7,5+<br>(n = 764) |
| Médiane de la survie sans progression PFS (mois) <sup>2</sup> | 16,9                               | 19,3                 |
| Risque relatif (IC 95 %) <sup>2</sup>                         | 0,86 [0,75 ; 0,98]<br>(p = 0,0185) |                      |
| Taux de réponse objective <sup>1</sup>                        |                                    |                      |
|                                                               | CP<br>(n = 277)                    | CPB7,5+<br>(n = 272) |
| Taux de réponse                                               | 54,9 %                             | 64,7 %               |
|                                                               | (p = 0,0188)                       |                      |
| Survie globale <sup>3</sup>                                   |                                    |                      |
|                                                               | CP<br>(n = 764)                    | CPB7,5+<br>(n = 764) |
| Médiane (mois)                                                | 58,0                               | 57,4                 |
| Risque relatif (IC 95 %)                                      | 0,99 (0,85 ; 1,15)<br>(p = 0,8910) |                      |

<sup>1</sup>Chez les patientes ayant une maladie mesurable au moment de la randomisation.

<sup>2</sup>Les investigateurs ont évalué l'analyse de la PFS à la date du 30 novembre 2010 (cut-off).

<sup>3</sup>Analyse de la survie globale finale réalisée au moment où 46,7 % des patients étaient décédés à la date du 31 mars 2013 (cut-off).

L'analyse primaire de la PFS évaluée par les investigateurs à la date du 28 février 2010 (cut-off) montre un risque relatif non stratifié de 0,79 (IC 95 % : 0,68 ; 0,91, valeur du p du test du log-rank bilatéral : 0,0010) avec une médiane de PFS de 16,0 mois dans le bras CP et de 18,3 mois dans le bras CPB 7,5+.

Les analyses de la PFS en sous-groupe, par stade de la maladie et statut de l'exérèse, sont résumées dans le Tableau 19. Ces résultats démontrent une robustesse de l'analyse primaire de la PFS telle que présentée dans le Tableau 18.

**Tableau 19. Résultats de la PFS<sup>1</sup> par stade de la maladie et statut de l'exérèse de l'étude BOI7707 (ICON7)**

| Patientes randomisées ayant une maladie de stade III après exérèse optimale <sup>2,3</sup>  |                 |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
|                                                                                             | CP<br>(n = 368) | CPB7,5+<br>(n = 383)  |
| Médiane de la survie sans progression (mois)                                                | 17,7            | 19,3                  |
| Risque relatif (IC 95 %) <sup>4</sup>                                                       |                 | 0,89<br>(0,74 ; 1,07) |
| Patientes randomisées ayant une maladie de stade III après exérèse suboptimale <sup>3</sup> |                 |                       |
|                                                                                             | CP<br>(n = 154) | CPB7,5+<br>(n = 140)  |
| Médiane de la survie sans progression (mois)                                                | 10,1            | 16,9                  |
| Risque relatif (IC 95 %) <sup>4</sup>                                                       |                 | 0,67<br>(0,52 ; 0,87) |
| Patientes randomisées ayant une maladie de stade IV                                         |                 |                       |
|                                                                                             | CP<br>(n = 97)  | CPB7,5+<br>(n = 104)  |
| Médiane de la survie sans progression (mois)                                                | 10,1            | 13,5                  |
| Risque relatif (IC 95 %) <sup>4</sup>                                                       |                 | 0,74<br>(0,55 ; 1,01) |

<sup>1</sup> Les investigateurs ont évalué l'analyse de la PFS à la date du 30 novembre 2010 (cut-off).

<sup>2</sup> Avec ou sans maladie résiduelle macroscopique.

<sup>3</sup> 5,8 % de la population globale de patientes randomisées avaient une maladie de stade IIIB.

<sup>4</sup> Par rapport au groupe témoin.

### *Cancer de l'ovaire en rechute*

La tolérance et l'efficacité du bevacizumab dans le traitement du cancer épithélial de l'ovaire, des trompes de Fallope ou péritonéal primitif, en rechute, ont été étudiées dans trois essais de phase III (AVF4095g, MO22224 et GOG-0213) chez différentes populations de patientes et avec différents protocoles de chimiothérapie.

- L'étude AVF4095g a évalué l'efficacité et la tolérance du bevacizumab en association au carboplatine et à la gemcitabine, suivis du bevacizumab en monothérapie chez des patientes atteintes d'un cancer épithélial de l'ovaire, des trompes de Fallope ou péritonéal primitif, en rechute sensible aux sels de platine.
- L'étude GOG-0213 a évalué l'efficacité et la tolérance du bevacizumab en association au carboplatine et au paclitaxel, suivis du bevacizumab en monothérapie chez des patientes atteintes d'un cancer épithélial de l'ovaire, des trompes de Fallope ou péritonéal primitif, en rechute sensible aux sels de platine.
- L'étude MO22224 a évalué l'efficacité et la tolérance du bevacizumab en association au paclitaxel, au topotécan ou à la doxorubicine liposomale pégylée chez des patientes atteintes d'un cancer épithélial de l'ovaire, des trompes de Fallope ou péritonéal primitif, en rechute résistant aux sels de platine.

### *AVF4095g*

La tolérance et l'efficacité du bevacizumab chez des patientes atteintes d'un cancer épithélial de l'ovaire, des trompes de Fallope ou péritonéal primitif, récidivant sensible aux sels de platine, qui n'avaient pas reçu précédemment de chimiothérapie dans le cadre de leur récidive ou de traitement antérieur par bevacizumab, ont été étudiées dans un essai de phase III randomisé, en double-aveugle, contrôlé versus placebo (AVF4095g). L'étude comparait l'effet de l'ajout du bevacizumab à la

chimiothérapie carboplatine et gemcitabine, suivi de bevacizumab en monothérapie jusqu'à progression, à un traitement de chimiothérapie carboplatine et gemcitabine seul.

Seules ont été incluses dans cette étude, les patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire, péritonéal primitif ou des trompes de Fallope, histologiquement documenté et ayant récidivé plus de 6 mois après le traitement de chimiothérapie à base de sels de platine, qui n'avaient pas reçu préalablement de chimiothérapie dans le cadre de leur récurrence et qui n'ont pas été traitées préalablement par du bevacizumab ou d'autres inhibiteurs du VEGF ou d'autres agents ciblant le récepteur du VEGF.

Un total de 484 patientes atteintes d'une maladie mesurable a été randomisé, en proportion égale (1:1), dans les deux bras suivants :

- Carboplatine (ASC 4, jour 1) et gemcitabine (1 000 mg/m<sup>2</sup>, jours 1 et 8) suivis du placebo toutes les 3 semaines pendant 6 cycles, et jusqu'à 10 cycles, suivis du placebo (toutes les 3 semaines) seul jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable.
- Carboplatine (ASC 4, jour 1) et gemcitabine (1 000 mg/m<sup>2</sup>, jours 1 et 8) suivis du bevacizumab (15 mg/kg, jour 1) toutes les 3 semaines pendant 6 cycles, et jusqu'à 10 cycles, suivis du bevacizumab (15 mg/kg toutes les 3 semaines) seul jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable.

Le critère principal était la survie sans progression (PFS), évaluée par les investigateurs selon les critères RECIST 1.0 mis à jour. Les critères supplémentaires comprenaient la réponse objective, la durée de la réponse, la survie globale et la tolérance. Une revue indépendante de critère principal a également été conduite.

Les résultats de cette étude sont résumés dans le tableau 20.

**Tableau 20. Résultats d'efficacité de l'étude AVF4095g**

| Survie sans progression                      |                               |                                |                                           |                                |
|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|                                              | Évaluation des investigateurs |                                | Évaluation du comité de revue indépendant |                                |
|                                              | Placebo + C/G<br>(n = 242)    | Bevacizumab + C/G<br>(n = 242) | Placebo + C/G<br>(n = 242)                | Bevacizumab + C/G<br>(n = 242) |
| Traitements hors protocole non censurés      |                               |                                |                                           |                                |
| Médiane de la survie sans progression (mois) | 8,4                           | 12,4                           | 8,6                                       | 12,3                           |
| Risque relatif (IC 95 %)                     | 0,524 [0,425 ; 0,645]         |                                | 0,480 [0,377 ; 0,613]                     |                                |
| p                                            | < 0,0001                      |                                | < 0,0001                                  |                                |
| Traitements hors protocole censurés          |                               |                                |                                           |                                |
| Médiane de la survie sans progression (mois) | 8,4                           | 12,4                           | 8,6                                       | 12,3                           |
| Risque relatif (IC 95 %)                     | 0,484 [0,388 ; 0,605]         |                                | 0,451 [0,351 ; 0,580]                     |                                |
| p                                            | < 0,0001                      |                                | < 0,0001                                  |                                |
| Taux de réponse objective                    |                               |                                |                                           |                                |
|                                              | Évaluation des investigateurs |                                | Évaluation du comité de revue indépendant |                                |
|                                              | Placebo + C/G<br>(n = 242)    | Bevacizumab + C/G<br>(n = 242) | Placebo + C/G<br>(n = 242)                | Bevacizumab + C/G<br>(n = 242) |
| % de patientes avec une réponse objective    | 57,4 %                        | 78,5 %                         | 53,7 %                                    | 74,8 %                         |
| p                                            | < 0,0001                      |                                | < 0,0001                                  |                                |
| Survie globale                               |                               |                                |                                           |                                |
|                                              | Placebo + C/G<br>(n = 242)    |                                | Bevacizumab + C/G<br>(n = 242)            |                                |
| Médiane de la survie globale (mois)          | 32,9                          |                                | 33,6                                      |                                |
| Risque relatif (IC 95 %)                     | 0,952 [0,771 ; 1,176]         |                                |                                           |                                |
| p                                            | 0,6479                        |                                |                                           |                                |

Les analyses de la survie sans progression en sous-groupe dépendant du moment de la rechute après le dernier traitement à base de sels de platine, sont résumées dans le tableau 21.

**Tableau 21. Survie sans progression entre le dernier traitement à base de sels de platine et la rechute**

| Temps depuis le dernier traitement à base de sels de platine et la rechute | Évaluation des investigateurs |                                |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|                                                                            | Placebo + C/G<br>(n = 242)    | Bevacizumab + C/G<br>(n = 242) |
| 6 à 12 mois (n = 202)                                                      |                               |                                |
| Médiane                                                                    | 8,0                           | 11,9                           |
| Risque relatif (IC 95 %)                                                   | 0,41 (0,29 - 0,58)            |                                |
| > 12 mois (n=282)                                                          |                               |                                |
| Médiane                                                                    | 9,7                           | 12,4                           |
| Risque relatif (IC 95 %)                                                   | 0,55 (0,41 - 0,73)            |                                |

#### GOG-0213

L'étude GOG-0213, un essai de phase III randomisé, contrôlé et ouvert, a évalué la tolérance et l'efficacité du bevacizumab chez des patientes atteintes d'un cancer épithélial de l'ovaire, des trompes de Fallope ou péritonéal primitif, récidivant sensible aux sels de platine, qui n'avaient pas reçu précédemment de chimiothérapie dans le cadre de leur récurrence. Il n'y avait pas de critère d'exclusion pour un traitement antérieur par anti-angiogénique. L'étude a évalué l'effet de l'ajout du bevacizumab au carboplatine et au paclitaxel suivis de bevacizumab en monothérapie jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable comparé à un traitement par carboplatine et paclitaxel seul.

Un total de 673 patientes a été randomisé, en proportion égale, dans les deux bras suivants :

- Bras CP : carboplatine (ASC 5) et paclitaxel (175 mg/m<sup>2</sup> IV) toutes les 3 semaines pendant 6 cycles, et jusqu'à 8 cycles.
- Bras CPB : carboplatine (ASC 5) et paclitaxel (175 mg/m<sup>2</sup> IV) et le bevacizumab (15 mg/kg) toutes les 3 semaines pendant 6 cycles, et jusqu'à 8 cycles, suivis du bevacizumab (15 mg/kg toutes les 3 semaines) en monothérapie jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable.

La majorité des patientes du bras CP (80,4 %) et du bras CPB (78,9 %) était de type caucasien. L'âge médian était de 60,0 ans dans le bras CP et de 59,0 ans dans le bras CPB. La majorité des patientes (CP : 64,6 %, CPB : 68,8 %) était âgée de moins de 65 ans. A l'inclusion, la majorité des patientes dans chaque bras de traitement avait un indice de performance GOG de 0 (CP : 82,4 %, CPB : 80,7 %) ou de 1 (CP : 16,7 %, CPB : 18,1 %). Un indice de performance GOG de 2 à l'inclusion a été rapporté chez 0,9 % des patientes dans le bras CP et chez 1,2 % des patientes dans le bras CPB.

Le critère principal d'efficacité était la survie globale. Le critère secondaire principal d'efficacité était la survie sans progression (PFS). Les résultats sont présentés dans le tableau 22.

**Tableau 22. Résultats d'efficacité<sup>1,2</sup> de l'étude GOG-0213**

| Critère principal                                                |                            |                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| Survie globale (OS)                                              | CP<br>(n = 336)            | CPB<br>(n = 337) |
| Médiane de la survie globale (mois)                              | 37,3                       | 42,6             |
| Risque relatif (IC 95%) (eCRF) <sup>a</sup>                      | 0,823 [IC : 0,680 ; 0,996] |                  |
| p                                                                | 0,0447                     |                  |
| Risque relatif (IC 95 %) (formulaire d'inscription) <sup>b</sup> | 0,838 [IC : 0,693 ; 1,014] |                  |
| p                                                                | 0,0683                     |                  |
| Critère secondaire                                               |                            |                  |
| Survie sans progression (PFS)                                    | CP<br>(n = 336)            | CPB<br>(n = 337) |
| Médiane de la survie sans progression (mois)                     | 10,2                       | 13,8             |
| Risque relatif (IC 95 %)                                         | 0,613 [IC : 0,521 ; 0,721] |                  |
| p                                                                | < 0,0001                   |                  |

<sup>1</sup>Analyse finale

<sup>2</sup>L'analyse des tumeurs et les évaluations des réponses étaient déterminées par les investigateurs selon les critères GOG RECIST (directive RECIST révisée [version 1.1]. Eur J Cancer. 2009;45:228Y247).

<sup>a</sup>Le risque relatif était estimé selon les modèles de risques proportionnels de Cox stratifiés par la durée de l'intervalle sans sel de platine avant son inclusion dans cette étude par eCRF (formulaire de rapport électronique) et le statut de la réduction tumorale chirurgicale secondaire Oui/Non (Oui = randomisé pour subir une cytoréduction ou randomisé pour ne pas subir une cytoréduction ; Non = n'est pas candidat ou ne consent pas à la cytoréduction).

<sup>b</sup>Stratifiés par la durée de l'intervalle sans traitement avant son inclusion dans cette étude par le formulaire d'inscription et le statut de la réduction tumorale chirurgicale secondaire Oui/Non.

L'essai a atteint son objectif principal d'amélioration de la survie globale. Les données issues des eCRF montrent que le traitement par bevacizumab à 15 mg/kg toutes les 3 semaines en association à une chimiothérapie (carboplatine et paclitaxel) pendant 6 cycles, et jusqu'à 8 cycles, suivis de bevacizumab jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable, a entraîné une amélioration cliniquement pertinente et statistiquement significative de la survie globale (OS) comparé au traitement par carboplatine et paclitaxel seul.

#### MO22224

L'étude MO22224 a évalué l'efficacité et la tolérance du bevacizumab en association à une chimiothérapie dans le traitement du cancer épithélial de l'ovaire, des trompes de Fallope ou péritonéal primitif, en rechute, résistant aux sels de platine. Il s'agit d'une étude de phase III, en ouvert, randomisée, à deux bras, évaluant le bevacizumab plus la chimiothérapie (CT+BV) contre la chimiothérapie seule (CT).

Un total de 361 patientes a été inclus dans cette étude. Il leur a été administré soit une chimiothérapie seule (paclitaxel, topotécan ou doxorubicine liposomale pégylée [PLD]) soit une chimiothérapie en association au bevacizumab. :

Bras CT (chimiothérapie seule) :

- Paclitaxel 80 mg/m<sup>2</sup> en perfusion IV d'1 heure aux jours 1, 8, 15 et 22 toutes les 4 semaines.
- Topotécan 4mg/m<sup>2</sup> en perfusion IV de 30 minutes aux jours 1, 8 et 15 toutes les 4 semaines. En alternative, une dose de 1,25 mg/m<sup>2</sup> pouvait être administrée sur 30 minutes aux jours 1-5 toutes les 3 semaines.
- Doxorubicine liposomale pégylée (PLD) 40 mg/m<sup>2</sup> en perfusion IV de 1 mg/min au jour 1 uniquement toutes les 4 semaines. Après le cycle 1, le produit pouvait être administré en perfusion d'1 heure.

Bras CT+BV (chimiothérapie plus bevacizumab) :

- La chimiothérapie choisie était associée au bevacizumab 10 mg/kg en perfusion IV toutes les 2 semaines (ou bevacizumab 15 mg/kg toutes les 3 semaines s'il était utilisé en association au topotécan 1,25 mg/m<sup>2</sup> aux jours 1-5 toutes les 3 semaines).

Les patientes éligibles étaient atteintes d'un cancer épithélial de l'ovaire, des trompes de Fallope ou péritonéal primitif ayant progressé dans les 6 mois après un précédent traitement à base de sels de platine composé d'un minimum de 4 cycles de traitement à base de sels de platine. Les patientes devaient avoir une espérance de vie de 12 semaines au moins et ne pas avoir reçu précédemment de radiothérapie pelvienne ou abdominale. La plupart des patientes était de stade FIGO IIIC ou IV. La majorité des patientes, dans les deux bras, avait un indice de performance ECOG de 0 (bras CT : 56,4 % vs bras CT + BV : 61,2 %). Le pourcentage des patientes avec un indice de performance ECOG de 1 ou  $\geq 2$  était de 38,7 % et de 5,0 % dans le bras CT et de 29,8 % et 9,0 % dans le bras CT + BV. L'origine ethnique était connue dans 29,3 % des cas et la majorité des patientes était de type caucasien. L'âge médian des patientes était de 61,0 ans (amplitude : 25 à 84 ans). Un total de 16 patientes (4,4 %) était âgé de plus de 75 ans. Les taux globaux d'interruption en raison de survenue d'effets indésirables étaient de 8,8 % dans le bras CT et de 43,6 % dans le bras CT + BV (majoritairement en raison d'effets indésirables de grades 2-3) et le temps médian jusqu'à interruption était de 5,2 mois dans le bras CT + BV comparé à 2,4 mois dans le bras CT. Le taux d'interruption en raison de survenue d'effets indésirables chez les patientes âgées de plus de 65 ans était de 8,8 % dans le bras CT comparé à 50,0 % dans le bras CT + BV. Le risque relatif pour la survie sans progression dans les sous-groupes < 65 ans et  $\geq 65$  ans était respectivement de 0,47 (IC à 95 % : 0,35 ; 0,62) et de 0,45 (IC à 95 % : 0,31 ; 0,67).

Le critère principal était la survie sans progression et les critères secondaires incluaient le taux de réponse objective et la survie globale. Les résultats sont présentés dans le tableau 23.

**Tableau 23. Résultats d'efficacité de l'étude MO22224**

| Critère principal                            |                       |                      |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Survie sans progression*                     |                       |                      |
|                                              | CT<br>(n = 182)       | CT + BV<br>(n = 179) |
| Médiane (mois)                               | 3,4                   | 6,7                  |
| Risque relatif<br>(IC 95 %)                  | 0,379 [0,296 ; 0,485] |                      |
| p                                            | < 0,0001              |                      |
| Critères secondaires                         |                       |                      |
| Taux de réponse objective**                  |                       |                      |
|                                              | CT<br>(n = 144)       | CT + BV<br>(n = 142) |
| % de patientes avec une<br>réponse objective | 18 (12,5 %)           | 40 (28,2 %)          |
| p                                            | 0,0007                |                      |
| Survie Globale (analyse finale)***           |                       |                      |
|                                              | CT<br>(n = 182)       | CT + BV<br>(n = 179) |
| Médiane de la survie globale<br>(mois)       | 13,3                  | 16,6                 |
| Risque relatif<br>(IC 95 %)                  | 0,870 [0,678 ; 1,116] |                      |
| p                                            | 0,2711                |                      |

Toutes les analyses présentées dans ce tableau sont des analyses stratifiées.

\*L'analyse primaire a été réalisée avec une date limite fixée au 14 novembre 2011 (cut-off).

\*\*Patients randomisés dont la maladie était mesurable lors de l'inclusion.

\*\*\*L'analyse finale de la survie globale a été réalisée après que la survenue de 266 décès, représentant 73,7 % des patientes incluses, a été observée.

L'essai a atteint son objectif principal d'amélioration de la survie sans progression. Comparé aux patientes traitées par chimiothérapie seule (paclitaxel, topotécan ou PLD), en situation de rechute résistante aux sels de platine, les patientes traitées par le bevacizumab à la dose de 10 mg/kg toutes les 2 semaines (ou 15 mg/kg toutes les 3 semaines s'il était utilisé en association avec 1,25 mg/m<sup>2</sup> de topotécan aux jours 1-5 toutes les 3 semaines) en association à la chimiothérapie et qui ont continué à recevoir le bevacizumab jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable, avaient une amélioration statistiquement significative de la survie sans progression. Les analyses exploratoires de la survie sans progression et de la survie globale par cohorte de chimiothérapie (paclitaxel, topotécan et PLD) sont résumées dans le tableau 24.

**Tableau 24. Analyse exploratoire de la survie sans progression et de la survie globale par cohorte de chimiothérapie**

|                                              | CT                 | CT + BV |
|----------------------------------------------|--------------------|---------|
| <b>Paclitaxel</b>                            | n = 115            |         |
| Médiane de la survie sans progression (mois) | 3,9                | 9,2     |
| Risque relatif (IC 95 %)                     | 0,47 [0,31 ; 0,72] |         |
| Médiane de la survie globale (mois)          | 13,2               | 22,4    |
| Risque relatif (IC 95 %)                     | 0,64 [0,41 ; 0,99] |         |
| <b>Topotécan</b>                             | n = 120            |         |
| Médiane de la survie sans progression (mois) | 2,1                | 6,2     |
| Risque relatif (IC 95 %)                     | 0,28 [0,18 ; 0,44] |         |
| Médiane de la survie globale (mois)          | 13,3               | 13,8    |
| Risque relatif (IC 95 %)                     | 1,07 [0,70 ; 1,63] |         |
| <b>Doxorubicine liposomale pégylée (PLD)</b> | n = 126            |         |
| Médiane de la survie sans progression (mois) | 3,5                | 5,1     |
| Risque relatif (IC 95 %)                     | 0,53 [0,36 ; 0,77] |         |
| Médiane de la survie globale (mois)          | 14,1               | 13,7    |
| Risque relatif (IC 95 %)                     | 0,91 [0,61 ; 1,35] |         |

### Cancer du col de l'utérus

#### *GOG-0240*

L'efficacité et la sécurité du bevacizumab en association à une chimiothérapie (paclitaxel et cisplatine ou paclitaxel et topotécan) dans le traitement des patientes atteintes d'un carcinome du col de l'utérus persistant, en rechute ou métastatique, ont été évaluées dans le cadre de l'étude GOG-0240, un essai de phase III, randomisé, à quatre bras, en ouvert, multicentrique.

Un total de 452 patientes a été randomisé afin de recevoir soit :

- Paclitaxel 135 mg/m<sup>2</sup> en perfusion IV de 24 heures au jour 1 et cisplatine 50 mg/m<sup>2</sup> en perfusion IV au jour 2, toutes les trois semaines ou,  
Paclitaxel 175 mg/m<sup>2</sup> en perfusion IV de 3 heures au jour 1 et cisplatine 50 mg/m<sup>2</sup> en perfusion IV au jour 2, toutes les trois semaines ou,  
Paclitaxel 175 mg/m<sup>2</sup> en perfusion IV de 3 heures au jour 1 et cisplatine 50 mg/m<sup>2</sup> en perfusion IV au jour 1, toutes les trois semaines.
- Paclitaxel 135 mg/m<sup>2</sup> en perfusion IV de 24 heures au jour 1 et cisplatine 50 mg/m<sup>2</sup> en perfusion IV au jour 2, plus bevacizumab 15 mg/kg en perfusion IV au jour 2, toutes les trois semaines ou,  
Paclitaxel 175 mg/m<sup>2</sup> en perfusion IV de 3 heures au jour 1 et cisplatine 50 mg/m<sup>2</sup> en perfusion IV au jour 2, plus bevacizumab 15 mg/kg en perfusion IV au jour 2, toutes les trois semaines ou,  
Paclitaxel 175 mg/m<sup>2</sup> en perfusion IV de 3 heures au jour 1 et cisplatine 50 mg/m<sup>2</sup> en perfusion IV au jour 1, plus bevacizumab 15 mg/kg en perfusion IV au jour 1, toutes les trois semaines.

- Paclitaxel 175 mg/m<sup>2</sup> en perfusion IV de 3 heures au jour 1 et topotécan 0,75 mg/m<sup>2</sup> en perfusion IV de 30 minutes aux jours 1 à 3, toutes les trois semaines.
- Paclitaxel 175 mg/m<sup>2</sup> en perfusion IV de 3 heures au jour 1 et topotécan 0,75 mg/m<sup>2</sup> en perfusion IV de 30 minutes aux jours 1-3, plus bevacizumab 15mg/kg en perfusion IV au jour 1, toutes les trois semaines.

Les patientes de l'essai étaient atteintes d'un carcinome épidermoïde, d'un carcinome adénoquameux, ou d'un adénocarcinome du col de l'utérus, persistant, en rechute ou métastatique, non éligibles au traitement curatif par chirurgie et/ou par radiothérapie, et n'ayant pas reçu un traitement préalable par bevacizumab ou d'autres inhibiteurs du VEGF ou d'autres agents ciblant le récepteur du VEGF.

L'âge médian était de 46,0 ans (amplitude : 20 à 83 ans) dans le groupe traité par chimiothérapie seule et de 48,0 ans (amplitude : 22 à 85 ans) dans le groupe traité par chimiothérapie + bevacizumab ; 9,3 % des patientes dans le groupe traité par chimiothérapie seule et 7,5 % des patientes dans le groupe traité par chimiothérapie + bevacizumab, avaient plus de 65 ans.

Parmi les 452 patientes randomisées initialement, la majorité des patientes était de type caucasien (80,0 % dans le groupe traité par chimiothérapie seule et 75,3 % dans le groupe traité par chimiothérapie + bevacizumab), présentait un carcinome épidermoïde (67,1 % dans le groupe traité par chimiothérapie seule et 69,6 % dans le groupe traité par chimiothérapie + bevacizumab), présentait une affection persistante / en rechute (83,6 % dans le groupe traité par chimiothérapie seule et 82,8 % dans le groupe traité par chimiothérapie + bevacizumab), présentait 1 à 2 foyers métastatiques (72,0 % dans le groupe traité par chimiothérapie seule et 76,2 % dans le groupe traité par chimiothérapie + bevacizumab), présentait une atteinte ganglionnaire (50,2 % dans le groupe traité par chimiothérapie seule et 56,4 % dans le groupe traité par chimiothérapie + bevacizumab), et n'avait pas reçu de sels de platine depuis plus de 6 mois (72,5 % dans le groupe traité par chimiothérapie seule et 64,4 % dans le groupe traité par chimiothérapie + bevacizumab).

Le critère principal d'efficacité était la survie globale. Les critères secondaires d'efficacité incluaient la survie sans progression et le taux de réponse objective. Les résultats de l'analyse primaire et de l'analyse de suivi sont présentés respectivement en fonction de l'ajout du bevacizumab au traitement et en fonction du schéma de traitement dans les tableaux 25 et 26.

**Tableau 25. Résultats d'efficacité de l'étude GOG-0240 en fonction de l'ajout de bevacizumab au traitement**

|                                                                    | Chimiothérapie<br>(n = 225)                       | Chimiothérapie + bevacizumab<br>(n = 227) |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Critère principal                                                  |                                                   |                                           |
| Survie globale - Analyse primaire <sup>6</sup>                     |                                                   |                                           |
| Médiane (mois) <sup>1</sup>                                        | 12,9                                              | 16,8                                      |
| Risque relatif (IC 95 %)                                           | 0,74 [0,58 ; 0,94]<br>(p <sup>5</sup> = 0,0132)   |                                           |
| Survie globale - Analyse de suivi <sup>7</sup>                     |                                                   |                                           |
| Médiane (mois) <sup>1</sup>                                        | 13,3                                              | 16,8                                      |
| Risque relatif (IC 95 %)                                           | 0,76 [0,62 ; 0,94]<br>(p <sup>5,8</sup> = 0,0126) |                                           |
| Critères secondaires                                               |                                                   |                                           |
| Survie sans progression - Analyse primaire <sup>6</sup>            |                                                   |                                           |
| Médiane de la survie sans progression (mois) <sup>1</sup>          | 6,0                                               | 8,3                                       |
| Risque relatif (IC 95 %)                                           | 0,66 [0,54 ; 0,81]<br>(p <sup>5</sup> < 0,0001)   |                                           |
| Meilleure réponse globale - Analyse primaire <sup>6</sup>          |                                                   |                                           |
| Patientes répondant au traitement (taux de réponse <sup>2</sup> )  | 76 (33,8 %)                                       | 103 (45,4 %)                              |
| IC 95 % pour les taux de réponse <sup>3</sup>                      | [27,6 % ; 40,4 %]                                 | [38,8 % ; 52,1 %]                         |
| Différence entre les taux de réponse                               | 11,60 %                                           |                                           |
| IC 95% pour les différences entre les taux de réponse <sup>4</sup> | [2,4 % ; 20,8 %]                                  |                                           |
| p (test du Chi-2)                                                  | 0.0117                                            |                                           |

<sup>1</sup>Estimations de Kaplan-Meier.

<sup>2</sup>Patientes et pourcentage de patientes avec une réponse complète ou une réponse partielle confirmées comme meilleure réponse globale ; pourcentage calculé chez les patientes avec maladie mesurable à l'inclusion.

<sup>3</sup>IC 95 % pour un échantillon binomial utilisant la méthode de Pearson-Clopper.

<sup>4</sup>IC 95 % approximatif pour la différence entre les deux taux utilisant la méthode d'Hauck-Anderson.

<sup>5</sup>Test du log-rank (stratifié).

<sup>6</sup>L'analyse primaire a été réalisée avec une date limite de recueil des données fixée au 12 décembre 2012 et est considérée comme l'analyse finale.

<sup>7</sup>L'analyse de suivi été réalisée avec une date limite de recueil des données fixée au 7 mars 2014 (cut-off).

<sup>8</sup>La valeur du p a été donnée uniquement dans un but descriptif.

**Tableau 26. Résultats de la survie globale de l'étude GOG-0240 en fonction du schéma de traitement**

| Comparaison des traitements                       | Autres facteurs         | Survie globale - Analyse primaire <sup>1</sup><br>Risque relatif (IC 95 %) | Survie globale - Analyse de suivi <sup>2</sup><br>Risque relatif (IC 95 %) |
|---------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bevacizumab vs Sans bevacizumab                   | Cisplatine + Paclitaxel | 0,72 (0,51 ; 1,02)<br>(17,5 vs 14,3 mois ; p = 0,0609)                     | 0,75 (0,55 ; 1,01)<br>(17,5 vs 15,0 mois ; p = 0,0584)                     |
|                                                   | Topotécan + Paclitaxel  | 0,76 (0,55 ; 1,06)<br>(14,9 vs 11,9 mois ; p = 0,1061)                     | 0,79 (0,59 ; 1,07)<br>(16,2 vs 12,0 mois ; p = 0,1342)                     |
| Topotécan + Paclitaxel vs Cisplatine + Paclitaxel | Bevacizumab             | 1,15 (0,82 ; 1,61)<br>(14,9 vs 17,5 mois ; p = 0,4146)                     | 1,15 (0,85 ; 1,56)<br>(16,2 vs 17,5 mois ; p = 0,3769)                     |
|                                                   | Sans bevacizumab        | 1,13 (0,81 ; 1,57)<br>(11,9 vs 14,3 mois ; p = 0,4825)                     | 1,08 (0,80 ; 1,45)<br>(12,0 vs 15,0 mois ; p = 0,6267)                     |

<sup>1</sup>L'analyse primaire a été réalisée avec une date limite de recueil des données fixée au 12 décembre 2012 et est considérée comme l'analyse finale.

<sup>2</sup>L'analyse de suivi des données a été réalisée avec une date limite de recueil des données fixée au 7 mars 2014 ; toutes les valeurs du p ont été données dans un but descriptif uniquement.

### Population pédiatrique

L'Agence Européenne du Médicament a accordé une dérogation à l'obligation de soumettre les résultats d'études réalisées avec le bevacizumab dans tous les sous-groupes de la population pédiatrique, dans le carcinome mammaire, l'adénocarcinome du côlon et du rectum, le carcinome bronchique (carcinomes à petites cellules et non à petites cellules), le carcinome du rein et le carcinome urothélial (à l'exclusion du néphroblastome, de la néphroblastomatose, du sarcome à cellules claires, du néphrome mésoblastique, du carcinome médullaire du rein, du carcinome et de la tumeur rhabdoïde du rein), le carcinome ovarien (à l'exclusion du rhabdomyosarcome et des tumeurs à cellules germinales), le carcinome des trompes de Fallope (à l'exclusion du rhabdomyosarcome et des tumeurs à cellules germinales), le carcinome péritonéal (à l'exclusion des blastomes et des sarcomes) et le carcinome du col et du corps utérin.

### *Gliome de haut grade*

Aucune activité anti-tumorale n'a été observée dans le cadre de deux précédentes études réalisées sur un total de 30 enfants âgés de plus de 3 ans, atteints d'un gliome de haut grade en récurrence ou en progression, traités par du bevacizumab et de l'irinotecan (CPT-11). Il n'existe pas assez d'informations permettant de déterminer la tolérance et l'efficacité du bevacizumab chez des enfants atteints d'un gliome de haut grade nouvellement diagnostiqué.

- Dans une étude à un seul bras (PBTC-022), 18 enfants atteints d'un gliome de haut grade en récurrence ou en progression autre que pontique (dont 8 patients atteints d'un glioblastome [de grade IV selon la classification de l'OMS], 9 d'un astrocytome anaplasique [grade III] et 1 d'un oligodendrogliome anaplasique [grade III]) ont été traités par du bevacizumab (10 mg/kg) à deux semaines d'intervalle puis par du bevacizumab en association au CPT-11 (125 - 350 mg/m<sup>2</sup>) une fois toutes les deux semaines jusqu'à progression. Aucune réponse radiologique objective (partielle ou complète) (selon les critères de MacDonald) n'a été observée. La toxicité et les effets indésirables comprenaient l'hypertension artérielle, la fatigue ainsi que des ischémies du SNC avec déficit neurologique aigu.
- Dans une série rétrospective monocentrique, 12 enfants atteints d'un gliome de haut grade en rechute ou en progression (3 de grade IV selon la classification de l'OMS, 9 de grade III), ont

été traités de manière consécutive (de 2005 à 2008) par du bevacizumab (10 mg/kg) et de l'irinotecan (125 mg/m<sup>2</sup>) toutes les deux semaines. Il n'y a eu aucune réponse complète et deux réponses partielles (selon les critères de MacDonald).

Dans une étude randomisée de phase II (BO25041), 121 patients âgés de  $\geq 3$  ans à  $< 18$  ans, atteints d'un gliome de haut grade sus-tentorial, sous-tentorial cérébelleux ou pédonculaire nouvellement diagnostiqué, ont été traités par radiothérapie post-opératoire associée au temozolomide en adjuvant avec ou sans bevacizumab : 10 mg/kg toutes les 2 semaines en IV.

L'étude n'a pas atteint son critère de jugement principal consistant à démontrer une amélioration significative de la survie sans événement (SSE) (évaluée par le Comité central d'examen de radiologie [CRRC]) lorsque bevacizumab était associé au bras radiothérapie + temozolomide comparé au bras radiothérapie + temozolomide seul (HR = 1,44, IC 95 % : 0,90 ; 2,30). Ces résultats étaient cohérents avec ceux issus de nombreuses analyses de sensibilité et dans des sous-groupes cliniquement pertinents. Les résultats pour tous les critères secondaires (la survie sans événement évaluée par l'investigateur, le taux de réponse global et la survie globale) étaient cohérents en ne montrant aucune amélioration associée à l'adjonction du bevacizumab au bras radiothérapie + temozolomide comparé au bras radiothérapie + temozolomide seul.

L'association du bevacizumab à la radiothérapie + temozolomide n'a pas démontré de bénéfice clinique dans l'étude BO25041 portant sur 60 patients pédiatriques évaluable, atteints d'un gliome de haut grade sus-tentorial, sous-tentorial cérébelleux ou pédonculaire nouvellement diagnostiqué (voir information sur l'utilisation pédiatrique à la rubrique 4.2).

#### *Sarcome des tissus mous*

Dans une étude randomisée de phase II (BO20924) un total de 154 patients âgés de  $\geq 6$  mois à  $< 18$  ans, nouvellement diagnostiqués atteints de rhabdomyosarcome et de sarcome des tissus mous non-rhabdomyosarcome métastatiques, a été traité par le traitement de référence (induction IVADO/IVA +/- thérapie locale suivi de Vinorelbine en maintenance et de cyclophosphamide) avec ou sans bevacizumab (2,5 mg/kg/semaine) pour une durée de traitement d'environ 18 mois. Au moment de l'analyse primaire finale, le critère principal de survie sans événements basée sur une revue centrale indépendante n'a pas montré une différence statistiquement significative entre les deux bras de traitement, avec un HR de 0,93 (IC 95 % : 0,61 ; 1,41 ; p = 0,72). La différence de taux de réponse objective par revue centrale indépendante était de 18 % (IC : 0,6 % ; 35,3 %) entre les deux bras de traitement chez les quelques patients ayant une tumeur évaluable à l'inclusion et une réponse confirmée avant de recevoir une thérapie locale : 27/75 patients (36,0 %, IC 95 % : 25,2 % ; 47,9 %) dans le bras chimiothérapie et 34/63 patients (54,0 %, IC 95 % : 40,9 % ; 66,6 %) dans le bras BV + chimiothérapie. Les analyses finales de survie globale (OS) n'ont montré aucun bénéfice clinique significatif de l'ajout du bevacizumab à la chimiothérapie dans cette population de patients.

L'association du bevacizumab au traitement de référence n'a pas démontré de bénéfice clinique dans l'essai clinique BO20924, chez 71 patients pédiatriques évaluable (âgés de 6 mois à moins de 18 ans) atteints de rhabdomyosarcome et de sarcome des tissus mous non-rhabdomyosarcome métastatiques (voir rubrique 4.2 pour des informations sur l'utilisation pédiatrique).

L'incidence des effets indésirables, dont des effets indésirables de grade  $\geq 3$  et des effets indésirables graves, était similaire entre les deux bras de traitement. Aucun effet indésirable d'évolution fatale n'a eu lieu dans l'un ou l'autre des bras de traitement, tous les décès étant liés à la progression de la maladie. Le bevacizumab en association avec le traitement multimodal standard semble avoir été toléré dans cette population pédiatrique.

## **5.2 Propriétés pharmacocinétiques**

Les données pharmacocinétiques disponibles pour le bevacizumab proviennent de dix études cliniques réalisées chez des patients atteints de tumeurs solides. Dans toutes les études cliniques, le bevacizumab était administré par perfusion IV. La vitesse de perfusion était ajustée en fonction de la

tolérance, la durée de la perfusion initiale étant de 90 minutes. La pharmacocinétique du bevacizumab était linéaire aux doses allant de 1 à 10 mg/kg.

### Distribution

La valeur caractéristique du volume du compartiment central ( $V_c$ ) des patients était de 2,73 L pour les femmes et de 3,28 L pour les hommes, ce qui est dans l'intervalle des valeurs rapportées pour les IgGs et les autres anticorps monoclonaux. La valeur caractéristique du volume du compartiment périphérique ( $V_p$ ) était de 1,69 L pour les femmes et de 2,35 L pour les hommes lorsque le bevacizumab est administré avec des agents antinéoplasiques. Après correction selon le poids corporel, le  $V_c$  était plus important (+ 20 %) chez les hommes que chez les femmes.

### Biotransformation

L'évaluation du métabolisme du bevacizumab chez le lapin après administration I.V. unique de 125I-bevacizumab indiquait que le profil métabolique était similaire à celui attendu pour une molécule d'IgG native ne se liant pas au VEGF. Le métabolisme et l'élimination du bevacizumab sont similaires à ceux de l'IgG endogène, principalement via un catabolisme protéolytique dans l'ensemble du corps, y compris les cellules endothéliales, et ne sont pas intrinsèquement liés à une élimination rénale et hépatique. La liaison de l'IgG au récepteur FcRn conduit à la protection vis-à-vis du métabolisme cellulaire et à la longue demi-vie terminale.

### Élimination

La valeur de la clairance des patients est en moyenne égale à 0,188 L/jour chez la femme et à 0,220 L/jour chez l'homme. Après correction selon le poids corporel, la clairance du bevacizumab était plus importante (+ 17 %) chez les hommes que chez les femmes. Selon un modèle à deux compartiments, la demi-vie d'élimination de référence est de 18 jours pour une femme et de 20 jours pour un homme.

Une albuminémie basse et une charge tumorale élevée sont généralement indicateurs d'une sévérité de la maladie. La clairance du bevacizumab était accélérée d'environ 30 % chez les patients avec un taux bas d'albumine et de 7 % chez les patients avec charge tumorale élevée comparés à des patients typiques avec des valeurs médianes d'albuminémie et de charge tumorale.

### Pharmacocinétique dans des populations particulières

La pharmacocinétique de population a été analysée chez des patients adultes et pédiatriques afin d'évaluer les effets de caractéristiques démographiques. Chez les adultes, les résultats obtenus n'ont révélé aucune différence significative des paramètres pharmacocinétiques du bevacizumab en fonction de l'âge.

#### *Insuffisants rénaux*

La pharmacocinétique du bevacizumab n'a pas été étudiée chez l'insuffisant rénal, puisque le rein n'est pas un organe majeur du métabolisme ou de l'excrétion du bevacizumab.

#### *Insuffisants hépatiques*

La pharmacocinétique du bevacizumab n'a pas été étudiée chez l'insuffisant hépatique, puisque le foie n'est pas un organe majeur de l'élimination ou de l'excrétion du bevacizumab.

#### *Population pédiatrique*

La pharmacocinétique du bevacizumab a été évaluée chez 152 enfants, adolescents et jeunes adultes (de 7 mois à 21 ans, pesant entre 5,9 et 125 kg) au cours de 4 études cliniques utilisant un modèle de population pharmacocinétique. Les résultats pharmacocinétiques montrent que la clairance et le

volume de distribution du bevacizumab étaient comparables entre les patients pédiatriques et les jeunes adultes lorsqu'ils étaient normalisés au poids corporel, avec une exposition à la baisse lorsque le poids corporel diminuait. L'âge n'était pas associé avec la pharmacocinétique du bevacizumab lorsque le poids corporel était pris en compte.

La pharmacocinétique du bevacizumab a bien été caractérisée par le modèle pharmacocinétique de la population pédiatrique chez 70 patients dans l'étude BO20924 (de 1,4 à 17,6 ans ; avec un poids compris entre 11,6 et 77,5 kg) et chez 59 patients dans l'étude BO25041 (de 1 à 17 ans ; avec un poids compris entre 11,2 et 82,3 kg). Dans l'étude BO20924, l'exposition au bevacizumab était généralement moindre, comparativement à un patient adulte typique à la même dose. Dans l'étude BO25041, l'exposition au bevacizumab était généralement similaire, comparativement à un patient adulte typique à la même dose. Dans les deux études, l'exposition au bevacizumab avait une tendance à la baisse lorsque le poids corporel diminuait.

### **5.3 Données de sécurité préclinique**

Lors d'études d'une durée atteignant 26 semaines chez le singe cynomolgus, à des concentrations sériques moyennes en bevacizumab inférieures aux concentrations thérapeutiques moyennes attendues en clinique, une dysplasie physique a été observée chez les jeunes animaux dont les cartilages de conjugaison n'étaient pas soudés. Chez les lapins, le bevacizumab a inhibé la cicatrisation de plaies à des doses inférieures à celles proposées en clinique. Ces effets sur la cicatrisation des plaies se sont avérés totalement réversibles.

Aucune étude n'a été réalisée afin d'évaluer le potentiel mutagène et carcinogène du bevacizumab.

Aucune étude spécifique n'a été réalisée chez l'animal afin d'évaluer l'effet sur la fertilité. Un effet indésirable sur la fécondité féminine est cependant prévisible, car des études de la toxicité par administration répétée chez l'animal ont révélé une inhibition de la maturation des follicules ovariens, une raréfaction ou absence des corps jaunes et une diminution associée du poids des ovaires et de l'utérus ainsi qu'une réduction du nombre de cycles menstruels.

Le bevacizumab s'est révélé embryotoxique et tératogène après administration chez le lapin. Les effets observés incluaient des diminutions du poids corporel maternel et fœtal, un nombre accru de résorptions fœtales et une majoration de l'incidence d'altérations fœtales squelettiques et macroscopiques spécifiques. Une issue fœtale défavorable a été observée à toutes les doses examinées, dont la plus basse a résulté en des concentrations sériques moyennes près de 3 fois plus élevées que chez des patients recevant 5 mg/kg toutes les 2 semaines. Des informations relatives aux malformations fœtales observées après commercialisation figurent aux rubriques 4.6 Fertilité, grossesse et allaitement et 4.8 Effets indésirables.

## **6. DONNÉES PHARMACEUTIQUES**

### **6.1 Liste des excipients**

Dihydrate de tréhalose  
Phosphate de sodium monobasique et monohydrate  
Phosphate disodique  
Polysorbate 20  
Eau pour préparations injectables

### **6.2 Incompatibilités**

Ce médicament ne doit pas être mélangé avec d'autres médicaments à l'exception de ceux mentionnés dans la rubrique 6.6.

Un profil de dégradation concentration dépendant a été observé pour bevacizumab après dilution dans des solutions de glucose (5 %).

### **6.3 Durée de conservation**

#### Flacon non ouvert

36 mois

#### Médicament dilué

La stabilité chimique et physique en cours d'utilisation a été démontrée pendant 30 jours entre 2 °C et 8 °C, puis pendant 48 heures supplémentaires à une température n'excédant pas 30 °C dans une solution injectable de chlorure de sodium à 9 mg/mL (0,9 %). D'un point de vue microbiologique, une utilisation immédiate est recommandée. Si le produit n'est pas utilisé immédiatement après reconstitution, les délais et conditions de conservation relèvent de la responsabilité de l'utilisateur et ne devraient normalement pas excéder 24 heures entre 2 °C et 8 °C, sauf si la dilution a été effectuée dans des conditions d'asepsie contrôlées.

### **6.4 Précautions particulières de conservation**

À conserver au réfrigérateur (entre 2 °C et 8 °C)

Ne pas congeler

Conserver le flacon dans l'emballage extérieur à l'abri de la lumière.

Pour les conditions de conservation du médicament après dilution, voir rubrique 6.3.

### **6.5 Nature et contenu de l'emballage extérieur**

4 mL de solution en flacon (verre de type I) muni d'un bouchon (caoutchouc butylé), contenant 100 mg de bevacizumab.

16 mL de solution en flacon (verre de type I) muni d'un bouchon (caoutchouc butylé), contenant 400 mg de bevacizumab.

Boîte de 1 flacon.

### **6.6 Précautions particulières d'élimination et manipulation**

Ne pas agiter le flacon.

Oyavas doit être préparé par un professionnel de santé en respectant les règles d'asepsie afin d'assurer la stérilité de la solution préparée. Une aiguille et une seringue stériles doivent être utilisées pour préparer Oyavas.

Le volume de bevacizumab nécessaire doit être prélevé et dilué dans le volume d'administration requis avec une solution injectable de chlorure de sodium à 9 mg/mL (0,9 %). La concentration de la solution finale de bevacizumab doit être maintenue entre 1,4 mg/mL et 16,5 mg/mL. Dans la majorité des cas, le volume d'Oyavas nécessaire peut être dilué avec une solution injectable de chlorure de sodium à 9 mg/mL (0,9 %) dans un volume total de 100 mL.

Aucune incompatibilité entre Oyavas et les poches ou les dispositifs de perfusion en chlorure de polyvinyle ou en polyoléfine n'a été observée.

Les médicaments parentéraux doivent être inspectés visuellement pour détecter des particules et des décolorations avant leur administration.

Oyavas est à usage unique compte tenu qu'il ne contient pas de conservateur. Tout médicament non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

**7. TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

STADA Arzneimittel AG  
Stadastrasse 2-18  
61118 Bad Vilbel  
Allemagne

**8. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

EU/1/20/1510/001 – 100 mg/4 mL  
EU/1/20/1510/002 – 400 mg/16 mL

**9. DATE DE PREMIÈRE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION**

Date de première autorisation : 26 mars 2021

**10. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l'Agence européenne du médicament (EMA) : <https://www.ema.europa.eu>.

## **ANNEXE II**

- A. FABRICANT DE LA SUBSTANCE ACTIVE D'ORIGINE BIOLOGIQUE ET FABRICANT RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS**
- B. CONDITIONS OU RESTRICTION DE DÉLIVRANCE ET D'UTILISATION**
- C. AUTRES CONDITIONS ET OBLIGATIONS DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**
- D. CONDITIONS OU RESTRICTIONS EN VUE D'UNE UTILISATION SÛRE ET EFFICACE DU MÉDICAMENT**

**A. FABRICANT DE LA SUBSTANCE ACTIVE D'ORIGINE BIOLOGIQUE ET  
FABRICANT RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS**

Nom et adresse du fabricant de la substance active d'origine biologique

GH GENHELIX S.A.  
Parque Tecnológico de León  
Edificio GENHELIX  
C/Julia Morros, s/n  
Armunia, 24009 León  
Espagne

mAbxience S.A.U.  
Calle Jose Zabala 1040  
Garin, B1619JNA  
Buenos Aires  
Argentine

Nom et adresse du fabricant responsable de la libération des lots

GH GENHELIX S.A.  
Parque Tecnológico de León  
Edificio GENHELIX  
C/Julia Morros, s/n  
Armunia, 24009 León  
Espagne

STADA Arzneimittel AG  
Stadastrasse 2–18  
61118 Bad Vilbel  
Allemagne

**B. CONDITIONS OU RESTRICTION DE DÉLIVRANCE ET D'UTILISATION**

Médicament soumis à prescription médicale restreinte (voir Annexe I : Résumé des Caractéristiques du Produit, rubrique 4.2).

**C. AUTRES CONDITIONS ET OBLIGATIONS DE L'AUTORISATION DE MISE SUR  
LE MARCHÉ**

• **Rapports périodiques actualisés de sécurité (PSUR)**

Les exigences relatives à la soumission des PSURs pour ce médicament sont définies dans la liste des dates de référence pour l'Union (liste EURD) prévue à l'article 107 quater, paragraphe 7, de la directive 2001/83/CE et ses actualisations publiées sur le portail web européen des médicaments.

## **D. CONDITIONS OU RESTRICTIONS EN VUE D'UNE UTILISATION SÛRE ET EFFICACE DU MÉDICAMENT**

- **Plan de gestion des risques (PGR)**

Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché réalise les activités de pharmacovigilance et interventions requises décrites dans le PGR adopté et présenté dans le Module 1.8.2 de l'autorisation de mise sur le marché, ainsi que toutes actualisations ultérieures adoptées du PGR.

De plus, un PGR actualisé doit être soumis :

- à la demande de l'Agence européenne des médicaments ;
- dès lors que le système de gestion des risques est modifié, notamment en cas de réception de nouvelles informations pouvant entraîner un changement significatif du profil bénéfice/risque, ou lorsqu'une étape importante (pharmacovigilance ou réduction du risque) est franchie.

**ANNEXE III**  
**ÉTIQUETAGE ET NOTICE**

## **A. ÉTIQUETAGE**

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****ÉTUI****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT**

Oyavas 25 mg/mL solution à diluer pour perfusion  
bevacizumab

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)**

Chaque flacon contient 100 mg de bevacizumab.

**3. LISTE DES EXCIPIENTS**

Dihydrate de tréhalose, phosphate de sodium monobasique et monohydrate, phosphate disodique, polysorbate 20, eau pour préparations injectables

**4. FORME PHARMACEUTIQUE ET CONTENU**

Solution à diluer pour perfusion  
1 flacon de 4 mL  
100 mg/4 mL

**5. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

Voie intraveineuse après dilution  
Lire la notice avant utilisation.

**6. MISE EN GARDE SPÉCIALE INDIQUANT QUE LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE CONSERVÉ HORS DE VUE ET DE PORTÉE DES ENFANTS**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**7. AUTRE(S) MISE(S) EN GARDE SPÉCIALE(S), SI NÉCESSAIRE****8. DATE DE PÉREMPTION**

EXP

**9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver au réfrigérateur.  
Ne pas congeler  
Conserver le flacon dans l'emballage extérieur à l'abri de la lumière.

**10. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS PROVENANT DE CES MÉDICAMENTS S'IL Y A LIEU**

**11. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

STADA Arzneimittel AG  
Stadastrasse 2-18  
61118 Bad Vilbel  
Allemagne

**12. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

EU/1/20/1510/001

**13. NUMÉRO DU LOT**

Lot

**14. CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DÉLIVRANCE**

**15. INDICATIONS D'UTILISATION**

**16. INFORMATIONS EN BRAILLE**

Justification de ne pas inclure l'information en Braille acceptée.

**17. IDENTIFIANT UNIQUE - CODE-BARRES 2D**

Code-barres 2D portant l'identifiant unique inclus.

**18. IDENTIFIANT UNIQUE - DONNÉES LISIBLES PAR LES HUMAINS**

PC  
SN  
NN

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES PETITS CONDITIONNEMENTS PRIMAIRES**

**FLACON**

**1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

Oyavas 25 mg/mL solution stérile  
bevacizumab  
IV après dilution

**2. MODE D'ADMINISTRATION**

**3. DATE DE PÉREPTION**

EXP

**4. NUMÉRO DU LOT**

Lot

**5. CONTENU EN POIDS, VOLUME OU UNITÉ**

100 mg/4 mL

**6. AUTRE**

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****ÉTUI****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT**

Oyavas 25 mg/mL solution à diluer pour perfusion  
bevacizumab

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)**

Chaque flacon contient 400 mg de bevacizumab.

**3. LISTE DES EXCIPIENTS**

Dihydrate de tréhalose, phosphate de sodium monobasique et monohydrate, phosphate disodique, polysorbate 20, eau pour préparations injectables

**4. FORME PHARMACEUTIQUE ET CONTENU**

Solution à diluer pour perfusion  
1 flacon de 16 mL  
400 mg/16 mL

**5. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

Voie intraveineuse après dilution  
Lire la notice avant utilisation.

**6. MISE EN GARDE SPÉCIALE INDIQUANT QUE LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE CONSERVÉ HORS DE VUE ET DE PORTÉE DES ENFANTS**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**7. AUTRE(S) MISE(S) EN GARDE SPÉCIALE(S), SI NÉCESSAIRE****8. DATE DE PÉREMPTION**

EXP

**9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver au réfrigérateur.  
Ne pas congeler  
Conserver le flacon dans l'emballage extérieur à l'abri de la lumière.

**10. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS PROVENANT DE CES MÉDICAMENTS S'IL Y A LIEU**

**11. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

STADA Arzneimittel AG  
Stadastrasse 2-18  
61118 Bad Vilbel  
Allemagne

**12. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

EU/1/20/1510/002

**13. NUMÉRO DU LOT**

Lot

**14. CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DÉLIVRANCE**

**15. INDICATIONS D'UTILISATION**

**16. INFORMATIONS EN BRAILLE**

Justification de ne pas inclure l'information en Braille acceptée.

**17. IDENTIFIANT UNIQUE - CODE-BARRES 2D**

Code-barres 2D portant l'identifiant unique inclus.

**18. IDENTIFIANT UNIQUE - DONNÉES LISIBLES PAR LES HUMAINS**

PC  
SN  
NN

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES PETITS CONDITIONNEMENTS  
PRIMAIRES**

**FLACON**

**1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

Oyavas 25 mg/mL solution stérile  
bevacizumab  
IV après dilution

**2. MODE D'ADMINISTRATION**

**3. DATE DE PÉREMPTION**

EXP

**4. NUMÉRO DU LOT**

Lot

**5. CONTENU EN POIDS, VOLUME OU UNITÉ**

400 mg/16 mL

**6. AUTRE**

## **B. NOTICE**

## Notice : Information de l'utilisateur

### Oyavas 25 mg/mL solution à diluer pour perfusion bevacizumab

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Vous pouvez y contribuer en signalant tout effet indésirable que vous observez. Voir en fin de rubrique 4 comment déclarer les événements indésirables.

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

#### Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce qu'Oyavas et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Oyavas
3. Comment utiliser Oyavas
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Oyavas
6. Contenu de l'emballage et autres informations

#### 1. Qu'est-ce qu'Oyavas et dans quel cas est-il utilisé

La substance active d'Oyavas est un anticorps monoclonal humanisé (qui est un type de protéine normalement fabriqué par le système immunitaire pour aider l'organisme à se défendre contre les infections et les cancers), le bevacizumab. Le bevacizumab se lie sélectivement à une protéine appelée facteur de croissance endothélial vasculaire humain (VEGF) qui est présente dans le revêtement intérieur des vaisseaux sanguins et lymphatiques. La protéine VEGF induit la croissance des vaisseaux sanguins dans les tumeurs. Ces vaisseaux apportent l'oxygène et les nutriments nécessaires aux tumeurs. Dès que le bevacizumab se lie au VEGF, la croissance des tumeurs est inhibée en bloquant la formation des nouveaux vaisseaux qui alimentent la tumeur en nutriments et en oxygène.

Oyavas est un médicament utilisé chez les patients adultes pour le traitement de cancers métastatiques du gros intestin, par exemple du côlon ou du rectum. Oyavas sera administré en association avec une chimiothérapie contenant une fluoropyrimidine.

Oyavas est également utilisé chez les patients adultes pour le traitement de cancers métastatiques du sein. Dans le cancer du sein, Oyavas sera administré avec une chimiothérapie de médicaments appelés paclitaxel ou capécitabine.

Oyavas est également utilisé chez des patients adultes pour le traitement du cancer bronchique non à petites cellules avancé. Oyavas sera administré avec une chimiothérapie contenant un sel de platine.

Oyavas est également utilisé chez les patients adultes pour le traitement du cancer bronchique non à petites cellules avancé lorsque les cellules cancéreuses présentent une mutation spécifique d'une protéine appelée (*Epidermal Growth Factor Receptor*) EGFR. Oyavas sera administré en association à l'erlotinib.

Oyavas est également utilisé chez les patients adultes pour le traitement du cancer du rein avancé. Dans le cancer du rein, il sera administré avec un autre médicament appelé interféron.

Oyavas est également utilisé chez les patients adultes pour le traitement des stades avancés du cancer épithélial de l'ovaire, des trompes de Fallope ou péritonéal primitif. En cas d'utilisation chez des patientes atteintes d'un cancer épithélial de l'ovaire, des trompes de Fallope ou péritonéal primitif, il sera administré en association avec du carboplatine et du paclitaxel.

Lorsqu'il est utilisé pour ces patientes adultes ayant un cancer épithélial de l'ovaire, des trompes de Fallope ou péritonéal primitif, à un stade avancé, dont la maladie est revenue après au moins 6 mois après qu'elles aient reçu leur dernier traitement de chimiothérapie contenant un sel de platine, Oyavas sera administré en association au carboplatine et à la gemcitabine ou au carboplatine et au paclitaxel.

Lorsqu'il est utilisé pour ces patientes adultes ayant un cancer épithélial de l'ovaire, des trompes de Fallope ou péritonéal primitif, à un stade avancé, dont la maladie est revenue dans les 6 mois après qu'elles aient reçu leur dernier traitement de chimiothérapie contenant un sel de platine, Oyavas sera administré en association au paclitaxel, topotécan, ou à la doxorubicine liposomale pégylée.

Oyavas est également utilisé pour le traitement des patientes adultes atteintes d'un cancer du col de l'utérus persistant, en rechute ou métastatique. Oyavas sera administré en association au paclitaxel et au cisplatine, ou au paclitaxel et au topotécan pour les patientes ne pouvant recevoir de chimiothérapie à base de sels de platine.

## **2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Oyavas**

### **N'utilisez jamais Oyavas :**

- Si vous êtes allergique au bevacizumab ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous êtes allergique à un produit obtenu à partir de cellules ovariennes de hamster chinois (CHO) ou à un autre anticorps recombinant humain ou humanisé.
- Si vous êtes enceinte.

### **Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant d'utiliser Oyavas :

- Il est possible qu'Oyavas puisse accroître le risque de perforation de l'intestin. Si vous avez des maladies pouvant être à l'origine d'une inflammation abdominale (par exemple diverticulite, ulcère de l'estomac, colite associée à une chimiothérapie), parlez-en à votre médecin.
- Oyavas pourrait augmenter le risque de développer une communication anormale ou un passage entre deux organes et entre des vaisseaux. Le risque de développer des communications entre le vagin et une partie de l'intestin peut augmenter, si vous avez un cancer du col de l'utérus persistant, en rechute ou métastatique.
- Oyavas peut augmenter le risque de saignement ou perturber la cicatrisation des plaies après une intervention chirurgicale. Si une opération est planifiée, si vous avez eu une intervention chirurgicale majeure au cours des derniers 28 jours ou si vous avez encore une plaie chirurgicale non cicatrisée, vous ne devez pas recevoir ce médicament.
- Oyavas pourrait augmenter le risque de développer des infections graves de la peau ou des couches plus profondes sous la peau, en particulier si vous avez eu une perforation de l'intestin ou des problèmes de cicatrisation des plaies.
- Oyavas peut accroître l'incidence de l'hypertension artérielle. Si vous avez une hypertension artérielle mal contrôlée par les médicaments anti-hypertenseurs, parlez-en à votre médecin car il

est important de s'assurer que votre tension artérielle est bien contrôlée avant de débiter un traitement par Oyavas.

- Si vous souffrez ou avez souffert d'un anévrisme (élargissement et affaiblissement de la paroi d'un vaisseau sanguin) ou d'une déchirure dans la paroi d'un vaisseau sanguin
- Ce médicament augmente le risque de présence de protéines dans vos urines, particulièrement si vous avez déjà une hypertension artérielle.
- Le risque de développer des caillots sanguins dans vos artères (un type de vaisseau sanguin) peut augmenter si vous avez plus de 65 ans, si vous êtes atteints de diabète ou si vous avez eu précédemment des caillots sanguins dans vos artères. Parlez-en à votre médecin, les caillots sanguins pouvant entraîner une insuffisance cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.
- Oyavas peut également augmenter le risque de développer des caillots sanguins dans vos veines (un type de vaisseau sanguin).
- Oyavas peut entraîner des saignements, particulièrement des saignements liés à la tumeur. Consultez votre médecin si vous ou votre famille avez tendance à souffrir de problèmes hémorragiques ou si vous prenez des médicaments fluidifiant le sang pour n'importe quelle raison.
- Il est possible qu'Oyavas puisse entraîner des saignements dans votre cerveau et autour de celui-ci. Parlez-en à votre médecin si vous avez un cancer métastatique affectant le cerveau.
- Il est possible qu'Oyavas augmente le risque d'un saignement dans vos poumons, comprenant une toux ou un crachat de sang. Parlez-en à votre médecin si vous avez déjà identifié cela.
- Oyavas peut augmenter le risque de développer une insuffisance cardiaque. Il est important que votre médecin sache si vous avez déjà reçu des anthracyclines (par exemple de la doxorubicine, un type spécifique de chimiothérapie utilisé pour traiter certains cancers) ou une radiothérapie du thorax, ou si vous avez une maladie cardiaque.
- Ce médicament pourrait entraîner des infections et une diminution du nombre de neutrophiles (un type de cellules sanguines importantes pour la protection contre les bactéries).
- Il est possible qu'Oyavas entraîne une hypersensibilité (dont le choc anaphylactique) et/ou réaction à la perfusion (réaction liée à l'injection de votre médicament). Parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère si vous avez déjà rencontré après les injections un problème, tel qu'un étourdissement/sensation d'évanouissement, un étouffement, un œdème ou une éruption cutanée.
- Un événement indésirable neurologique rare appelé Syndrome d'encéphalopathie postérieure réversible (SEPR) a été associé au traitement par Oyavas. Si vous avez mal à la tête, des troubles de la vision, une confusion ou une attaque avec ou sans hypertension artérielle, consultez votre médecin.
- Des cas de mort tissulaire osseuse (ostéonécrose) dans les os autres que la mâchoire ont été observés chez des patients âgés de moins de 18 ans traités par Oyavas. Des douleurs au niveau de la bouche, des dents et/ou de la mâchoire, des gonflements ou des plaies à l'intérieur de la bouche, des engourdissements ou une sensation de lourdeur dans la mâchoire, ou la perte d'une dent, peuvent être des signes et symptômes de lésions osseuses dans la mâchoire (ostéonécrose). Parlez-en immédiatement à votre médecin et à votre dentiste si vous ressentez l'un de ces symptômes.

Veillez consulter votre médecin si l'un des cas ci-dessus vous concerne uniquement, ou vous a concerné dans le passé.

Avant de recevoir Oyavas ou pendant le traitement par Oyavas :

- si vous avez ou avez eu des douleurs au niveau de la bouche, des dents et/ou de la mâchoire, des gonflements ou des plaies dans la bouche, des engourdissements ou une sensation de lourdeur dans la mâchoire, ou la perte d'une dent, parlez-en à votre médecin et à votre dentiste immédiatement.
- si vous devez subir un traitement dentaire invasif ou une chirurgie dentaire, prévenez votre dentiste que vous êtes traité par Oyavas, en particulier si vous recevez ou avez reçu une injection de bisphosphonates dans votre sang.

Il peut vous être demandé de faire un bilan dentaire avant de commencer le traitement par Oyavas.

Oyavas a été développé et fabriqué pour traiter le cancer par injection dans la circulation sanguine. Il n'a pas été développé ni fabriqué pour une injection dans l'œil. Il n'est par conséquent pas autorisé pour être utilisé selon cette voie d'administration. Lorsque Oyavas est injecté directement dans l'œil (utilisation non autorisée), les événements indésirables suivants peuvent apparaître :

- Infection ou inflammation du globe oculaire,
- Rougeur des yeux, présence de petites particules ou de tâches dans la vision (corps flottants), douleur oculaire,
- Vision de flashes de lumière avec corps flottants, évoluant vers une perte d'une partie de votre vision,
- Augmentation de la pression intraoculaire,
- Saignements dans les yeux.

### **Enfants et adolescents**

L'utilisation d'Oyavas n'est pas recommandée chez les enfants et adolescents âgés de moins de 18 ans car la tolérance et l'efficacité n'ont pas été établies chez ces populations de patients.

### **Autres médicaments et Oyavas**

Informez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Des associations d'Oyavas avec un autre médicament, appelé le malate de sunitinib (prescrit dans les cancers du rein et gastrointestinal) peuvent entraîner des effets indésirables sévères. Parlez-en à votre médecin pour vous assurer que vous ne prenez pas ces médicaments en association.

Informez votre médecin si vous utilisez des traitements à base de sels de platine ou à base de taxane pour un cancer du poumon ou du sein métastatique. Ces traitements en association à Oyavas peuvent augmenter le risque d'effets indésirables sévères.

Si vous avez récemment reçu ou recevez actuellement une radiothérapie, veuillez en informer votre médecin.

### **Grossesse, allaitement et fertilité**

N'utilisez jamais ce médicament si vous êtes enceinte. Oyavas peut être nocif pour l'enfant à naître parce qu'il arrête la formation des nouveaux vaisseaux sanguins. Votre médecin doit vous conseiller une méthode de contraception à suivre au cours du traitement par Oyavas et pendant au moins 6 mois après l'administration de la dernière dose de celui-ci.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Vous ne devez pas allaiter votre enfant au cours du traitement par Oyavas et pendant au moins 6 mois après l'administration de la dernière dose de celui-ci en raison de risques d'effets nocifs sur la croissance et le développement de votre nourrisson.

Oyavas peut entraîner une altération de la fertilité. Contactez votre médecin pour plus d'informations.

Une irrégularité voire absence des règles ainsi qu'une altération de la fertilité peuvent être observées chez les femmes non ménopausées (qui ont un cycle menstruel). Si vous envisagez d'avoir des enfants, vous devez en discuter avec votre médecin avant de démarrer le traitement.

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Il n'a pas été montré qu'Oyavas puisse diminuer votre aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des outils ou des machines. Toutefois, des cas de somnolence et d'évanouissement ont été rapportés sous Oyavas. Si vous présentez des symptômes altérant votre vision, votre concentration ou votre aptitude à réagir, ne conduisez pas et n'utilisez pas de machines, jusqu'à disparition des symptômes.

### **Oyavas contient du sodium.**

Ce médicament contient moins de 1 mmol de sodium (23 mg) par flacon, c'est-à-dire qu'il est essentiellement « sans sodium ».

## **3. Comment utiliser Oyavas**

### **Dose et fréquence d'administration**

La dose d'Oyavas dépend de votre poids et du type de cancer à traiter. La dose recommandée d'Oyavas est de 5 mg, 7,5 mg, 10 mg ou 15 mg par kg de poids corporel. Votre médecin vous prescrira la dose d'Oyavas adaptée à votre cas. Vous recevrez une perfusion d'Oyavas toutes les 2 ou 3 semaines. Le nombre total de perfusions que vous recevrez dépendra de votre réponse au traitement ; vous devez continuer à recevoir Oyavas jusqu'à ce qu'il ne puisse plus stopper la croissance de votre tumeur. Votre médecin s'entretiendra de ces points avec vous.

### **Mode et voie d'administration**

Ne pas agiter le flacon. Oyavas est une solution à diluer pour perfusion. En fonction de la dose qui vous est prescrite, la totalité ou une partie du contenu d'un flacon d'Oyavas sera diluée dans une solution de chlorure de sodium avant utilisation. Un médecin ou une infirmière vous administrera cette solution diluée d'Oyavas par perfusion intraveineuse (un goutte-à-goutte dans vos veines). La durée de la première perfusion sera de 90 minutes. Si la tolérance est bonne, celle de la seconde perfusion pourra être de 60 minutes. Les perfusions suivantes seront administrées en 30 minutes.

### **L'administration d'Oyavas doit être temporairement suspendue :**

- si vous développez une hypertension artérielle sévère, nécessitant un traitement par des médicaments anti-hypertenseurs,
- si vous avez des problèmes de cicatrisation post-opératoire,
- si vous subissez une opération chirurgicale.

### **L'administration d'Oyavas doit être définitivement arrêtée si vous développez :**

- une hypertension artérielle sévère non contrôlée par les médicaments anti-hypertenseurs ; ou une augmentation sévère et soudaine de la pression artérielle,
- la présence de protéines dans votre urine accompagnée d'œdème corporel,
- une perforation dans la paroi de votre intestin,
- une communication anormale entre la trachée et l'œsophage, entre des organes internes et la peau, entre le vagin et une partie de l'intestin ou entre d'autres tissus qui normalement ne sont pas reliés (fistule), et qui est jugée sévère par votre médecin,
- des infections graves de la peau ou des couches plus profondes sous la peau,
- un caillot sanguin dans vos artères,
- un caillot sanguin dans les vaisseaux sanguins de vos poumons,
- toute hémorragie sévère.

**Si vous avez utilisé plus d'Oyavas que vous n'auriez dû**

- Vous pouvez développer une migraine sévère. Dans ce cas, prévenez immédiatement votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.

**Si une perfusion d'Oyavas n'a pas pu être réalisée :**

- Votre médecin décidera de la date de la prochaine perfusion et s'en entretiendra avec vous.

**Si vous arrêtez d'utiliser Oyavas :**

L'arrêt du traitement par Oyavas peut interrompre l'effet sur la croissance de la tumeur. N'arrêtez pas le traitement par Oyavas sans vous en entretenir auparavant avec votre médecin.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère.

**4. Quels sont les événements indésirables éventuels**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets indésirables mentionnés ci-dessous ont été observés lors de traitements par Oyavas en association à une chimiothérapie. Ces événements n'ont donc pas été nécessairement causés uniquement par Oyavas.

**Réactions allergiques**

Si vous présentez une réaction allergique, informez-en immédiatement votre médecin ou un membre de l'équipe médicale. Les signes peuvent inclure : une difficulté à respirer ou une douleur thoracique. Vous pouvez également présenter des rougeurs de la peau ou des bouffées de chaleurs ou une éruption transitoire, des frissons et tremblements, des nausées ou des vomissements, , un gonflement (œdème), des étourdissements, un pouls accéléré et une perte de connaissance.

**Demandez immédiatement de l'aide si vous souffrez de l'un des événements indésirables mentionnés ci-dessous.**

Les événements indésirables d'intensité sévère pouvant être **très fréquents** (pouvant affecter plus d'1 personne sur 10) comprennent :

- hypertension artérielle,
- sensation d'engourdissement ou fourmillements dans les mains ou les pieds,
- diminution du nombre des cellules dans le sang, y compris des globules blancs qui aident à lutter contre les infections (cela peut être accompagné de fièvre) et des cellules qui aident le sang à coaguler,
- sensation de faiblesse et de manque d'énergie,
- fatigue,
- diarrhées, nausées, vomissements et douleur abdominale.

Les événements indésirables d'intensité sévère pouvant être **fréquents** (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10) comprennent :

- réactions allergiques (les signes peuvent inclure une difficulté à respirer, des rougeurs au visage, des éruptions, une hypotension ou une hypertension, un faible taux d'oxygène dans votre sang, une douleur thoracique, ou des nausées/vomissements).
- perforation intestinale,
- saignements, y compris les saignements dans les poumons chez les patients atteints de cancer bronchique non à petites cellules,
- obstruction d'une artère par un caillot sanguin,
- obstruction d'une veine par un caillot sanguin,
- obstruction de vaisseaux sanguins des poumons par un caillot sanguin,

- obstruction d'une veine des jambes par un caillot sanguin,
- insuffisance cardiaque,
- troubles de la cicatrisation des plaies après une intervention chirurgicale,
- rougeurs, desquamation, sensibilité, douleur ou cloques sur les doigts ou les pieds,
- diminution du nombre de globules rouges dans le sang,
- manque d'énergie,
- troubles des intestins et de l'estomac,
- douleur musculaire et articulaire, faiblesse musculaire,
- sécheresse de la bouche associée à une sensation de soif et/ou urines foncées ou en moins grande quantité,
- inflammation des muqueuses de la bouche et des intestins, des poumons, des voies respiratoires, des voies urinaires et de la reproduction,
- plaies dans la bouche et le tube partant de la bouche vers l'estomac (œsophage), pouvant être douloureuses et entraîner des difficultés à avaler,
- douleurs, incluant des maux de tête, des douleurs au dos et des douleurs au niveau du bassin et de la région anale,
- collection de pus localisé,
- infection, et en particulier infection sanguine ou urinaire,
- diminution de l'afflux de sang dans le cerveau ou attaque cérébrale,
- somnolence,
- saignement de nez,
- augmentation du rythme cardiaque (pouls),
- occlusion intestinale,
- bilan urinaire anormal (protéines dans l'urine),
- souffle court ou faible taux d'oxygène dans le sang,
- infections de la peau ou dans les couches plus profondes sous la peau,
- fistule : communication anormale entre des organes internes et la peau ou d'autres tissus qui ne sont normalement pas reliés, incluant des communications entre le vagin et l'intestin chez les patientes atteintes d'un cancer du col de l'utérus.

Les événements indésirables d'intensité sévère pouvant être **rare** (peut affecter jusqu'à une personne sur 1 000) comprennent :

- réaction allergique soudaine et sévère avec une difficulté à respirer, un gonflement (œdème), des étourdissements, un pouls accéléré, une transpiration et une perte de connaissance (choc anaphylactique).

Les événements indésirables d'intensité sévère et de fréquence **indéterminée** (fréquence ne pouvant être estimée sur la base des données disponibles) comprennent :

- infections graves de la peau ou des couches plus profondes sous la peau, particulièrement si vous avez eu une perforation de l'intestin ou des problèmes de cicatrisation des plaies,
- un effet négatif sur la capacité des femmes à avoir des enfants (voir paragraphe qui suit la liste des événements indésirables pour plus d'informations),
- un trouble cérébral avec des symptômes comprenant des convulsions (crises), un mal de tête, une confusion et des troubles de la vision (syndrome d'encéphalopathie postérieure réversible ou SEPR),
- symptômes qui suggèrent des changements dans le fonctionnement normal du cerveau (maux de tête, troubles de la vision, confusion, ou convulsions) et une hypertension artérielle,
- élargissement et affaiblissement de la paroi d'un vaisseau sanguin ou déchirure dans la paroi d'un vaisseau sanguin (anévrismes et dissections artérielles),
- obstruction de très petits vaisseaux sanguins dans les reins,
- pression sanguine anormalement élevée dans les vaisseaux sanguins des poumons ce qui fait travailler davantage la partie droite du cœur,
- perforation dans le cartilage qui sépare les deux narines du nez,
- perforation de l'estomac ou des intestins,

- une plaie ouverte ou une perforation des parois de l'estomac ou de l'intestin grêle (les signes peuvent inclure une douleur abdominale, une sensation de gonflement, des selles noires goudronneuses, du sang dans vos selles (fèces) ou du sang dans vos vomissements),
- saignement de la partie basse du gros intestin,
- lésions des gencives avec atteinte de l'os de la mâchoire, qui ne guérissent pas et qui peuvent être associées à une douleur ou une inflammation du tissu environnant (voir paragraphe qui suit la liste des événements indésirables pour plus d'informations),
- perforation de la vésicule biliaire (les signes et symptômes peuvent inclure une douleur abdominale, de la fièvre et des nausées/vomissements).

**Demandez de l'aide dès que possible si vous souffrez de l'un des événements indésirables mentionnés ci-dessous.**

**Les événements indésirables très fréquents** (pouvant affecter plus d'1 personne sur 10) non sévères comprennent :

- constipation,
- perte d'appétit,
- fièvre,
- problèmes oculaires (dont larmoiement),
- modification du langage,
- modification du goût,
- écoulement nasal,
- sécheresse cutanée, desquamation et inflammation de la peau, modification de la couleur de peau,
- perte de poids,
- saignement de nez.

**Les événements indésirables fréquents** (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10) non sévères comprennent :

- modifications de la voix et enrouement.

Les patients âgés de plus de 65 ans ont un risque accru de présenter les événements indésirables suivants :

- des caillots sanguins dans les artères, pouvant conduire à une attaque cérébrale ou à une attaque cardiaque,
- diminution du nombre de globules blancs dans le sang et de cellules qui aident le sang à coaguler,
- diarrhée,
- malaise,
- mal de tête,
- fatigue,
- hypertension artérielle.

Oyavas peut également modifier les résultats des analyses demandées par votre médecin. Cela inclut une diminution du nombre de globules blancs dans le sang, en particulier des neutrophiles (un type de globules blancs qui aident à se protéger des infections), la présence de protéines dans l'urine, une diminution du taux de potassium, du taux de sodium, du taux de phosphore (un minéral) dans le sang, une augmentation du taux de sucre dans le sang ou des phosphatases alcalines (une enzyme) dans le sang, une augmentation de taux de créatinine sérique (une protéine mesurée par test sanguin pour voir si vos reins fonctionnent normalement), une diminution du taux d'hémoglobine (qui transporte l'oxygène dans le sang) qui peuvent être sévères.

#### **Déclaration des événements secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout événement indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système

national de déclaration décrit en [Annexe V](#). En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## **5. Comment conserver Oyavas**

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage et l'étiquette du flacon après l'abréviation utilisée pour la date d'expiration EXP. La date d'expiration fait référence au dernier jour de ce mois.

À conserver au réfrigérateur (entre 2 °C et 8 °C). Ne pas congeler.  
Conserver le flacon dans l'emballage extérieur à l'abri de la lumière.

Les solutions pour perfusion doivent être utilisées immédiatement après dilution. Si elles ne sont pas utilisées immédiatement, les durées et conditions de conservation en cours d'utilisation relèvent de la responsabilité de l'utilisateur et ne devraient normalement pas excéder 24 heures entre 2 °C et 8 °C, sauf si les solutions pour perfusion ont été préparées dans un environnement stérile. Lorsque la dilution est réalisée dans un environnement stérile, Oyavas est stable jusqu'à 30 jours entre 2 °C et 8 °C après dilution et pendant une période pouvant aller jusqu'à 48 heures à des températures ne dépassant pas 30 °C.

Ne pas utiliser Oyavas, si vous remarquez un problème de particule quel qu'il soit, ou une décoloration avant l'administration.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

## **6. Contenu de l'emballage et autres informations**

### **Ce que contient Oyavas**

- La substance active est le bevacizumab. Chaque ml contient 25 mg de bevacizumab, ce qui correspond à 1,4 à 16,5 mg/mL après dilution telle que recommandée.
- Chaque flacon de 4 mL contient 100 mg de bevacizumab, ce qui correspond à 1,4 mg/mL après la dilution recommandée.
- Chaque flacon de 16 ml contient 400 mg de bevacizumab, ce qui correspond à 16,5 mg/mL après la dilution recommandée.
- Les autres composants sont : dihydrate de tréhalose, phosphate de sodium monobasique et monohydrate, phosphate disodique, polysorbate 20 et eau pour préparations injectables (voir rubrique 2 « Oyavas contient du sodium. »).

### **Comment se présente Oyavas et contenu de l'emballage extérieur**

Oyavas est une solution à diluer pour perfusion (solution stérile). La solution à diluer est incolore à jaune pâle ou brun pâle, légèrement opalescente, contenue dans un flacon en verre avec un bouchon en caoutchouc. Chaque flacon contient 100 mg de bevacizumab dans 4 mL de solution ou 400 mg de bevacizumab dans 16 mL de solution. Chaque boîte d'Oyavas contient un flacon.

### **Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché**

STADA Arzneimittel AG  
Stadastrasse 2-18  
61118 Bad Vilbel  
Allemagne

**Fabricant :**

GH GENHELIX S.A.  
Parque Tecnológico de León  
Edificio GENHELIX  
C/Julia Morros, s/n  
Armunia, 24009 León  
Espagne

STADA Arzneimittel AG  
Stadastrasse 2–18  
61118 Bad Vilbel  
Allemagne

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.

**België/Belgique/Belgien**

EG (Eurogenerics) NV  
Tél/Tel: +32 4797878

**Lietuva**

UAB „STADA Baltics“  
Tel: +370 52603926

**България**

STADA Bulgaria EOOD  
Тел.: +359 29624626

**Luxembourg/Luxemburg**

EG (Eurogenerics) NV  
Tél/Tel: +32 4797878

**Česká republika**

STADA PHARMA CZ s.r.o.  
Tel: +420 257888111

**Magyarország**

STADA Hungary Kft  
Tel.: +36 18009747

**Danmark**

STADA Nordic ApS  
Tlf.: +45 44859999

**Malta**

Pharma.MT Ltd.  
Tel: +356 21337008

**Deutschland**

STADAPHARM GmbH  
Tel: +49 61016030

**Nederland**

Centrafarm B.V.  
Tel.: +31 765081000

**Eesti**

UAB „STADA Baltics“  
Tel: +370 52603926

**Norge**

STADA Nordic ApS  
Tlf: +45 44859999

**Ελλάδα**

DEMO S.A. Pharmaceutical Industry  
Τηλ: +30 2108161802

**Österreich**

STADA Arzneimittel GmbH  
Tel: +43 136785850

**España**

Laboratorio STADA, S.L.  
Tel: +34 934738889

**Polska**

STADA Poland Sp. z.o.o.  
Tel: +48 227377920

**France**

EG Labo - Laboratoires EuroGenerics  
Tél: +33 146948686

**Portugal**

Stada, Lda.  
Tel: +351 211209870

**Hrvatska**

STADA d.o.o.  
Tel: +385 13764111

**România**

STADA M&D SRL  
Tel: +40 213160640

**Ireland**

Clonmel Healthcare Ltd.  
Tel: +353 526177777

**Ísland**

STADA Arzneimittel AG  
Sími: +49 61016030

**Italia**

EG SpA  
Tel: +39 028310371

**Κύπρος**

STADA Arzneimittel AG  
Τηλ: +49 61016030

**Latvija**

UAB „STADA Baltics“  
Tel: +370 52603926

**Slovenija**

Stada d.o.o.  
Tel: +386 15896710

**Slovenská republika**

STADA PHARMA Slovakia, s.r.o.  
Tel: +421 252621933

**Suomi/Finland**

STADA Nordic ApS, Suomen sivuliike  
Puh/Tel: +358 207416888

**Sverige**

STADA Nordic ApS  
Tel: +45 44859999

**La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est <{MM/AAAA}><{mois AAAA}>.**

**Autres sources d'informations**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l'Agence européenne du médicament : <https://www.ema.europa.eu>.