

EMA/585265/2018
EMEA/H/C/002751

Anoro Ellipta¹ (*umeklidinijev bromid / vilanterol*)

Pregled informacija o lijeku Anoro Ellipta i zašto je odobren u EU-u

Što je Anoro Ellipta i za što se primjenjuje?

Anoro Ellipta je lijek za ublažavanje simptoma kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB) u odraslih osoba. KOPB je dugotrajna bolest kod koje dolazi do postupnog oštećenja ili začepljenja dišnih putova i zračnih mjehurića u plućima, što dovodi do poteškoća pri disanju. Anoro Ellipta primjenjuje se kao (redovita) terapija održavanja.

Anoro Ellipta sadrži djelatne tvari umeklidinijev bromid i vilanterol.

Kako se Anoro Ellipta primjenjuje?

Anoro Ellipta izdaje se samo na liječnički recept. Dostupan je kao prašak za inhalaciju u prijenosnom inhalatoru. Jednom inhalacijom oslobađa se 55 mikrograma umeklidinija (kao umeklidinijev bromid) i 22 mikrograma vilanterola.

Preporučena doza je jedna inhalacija dnevno u isto vrijeme svakog dana. Detaljne informacije o pravilnoj upotrebi inhalatora pogledajte u uputi o lijeku ili se obratite liječniku ili ljekarniku.

Kako djeluje Anoro Ellipta?

Djelatne tvari koje sadrži Anoro Ellipta, umeklidinij i vilanterol, svojim različitim djelovanjem proširuju dišne putove i olakšavaju disanje u bolesnika s KOPB-om. Vilanterol je dugodjelujući beta-2 adrenergički agonist. Djeluje vezivanjem na beta-2 adrenergičke receptore koji se nalaze u stanicama mišića mnogih organa, uključujući dišne putove u plućima. Udisanjem lijeka vilanterol dospijeva do receptora u dišnim putovima i aktivira ih. Time dolazi do opuštanja mišića dišnih putova.

Umeklidinij je antagonist muskarinskih receptora. Djeluje blokiranjem drugih receptora zvanih muskarinski receptori koji kontroliraju stezanje mišića. Udisanjem umeklidinija također dolazi do opuštanja mišića dišnih puteva.

¹ Prethodno poznat kao Anoro.



Kombinirano djelovanje dviju djelatnih tvari pomaže držati dišne puteve otvorenima i bolesniku olakšava disanje. Antagonisti muskarinskih receptora i dugodjelujući beta-2 agonisti obično se kombiniraju pri liječenju KOPB-a.

Koje su koristi od lijeka Anoro Ellipta utvrđene u ispitivanjima?

U pet glavnih ispitivanja uspoređena je primjena lijeka Anoro Ellipta i kombinacije veće doze umeklidinija i vilanterola (113 mikrograma/22 mikrograma) s primjenom placebo (prividno liječenje), samo vilanterola, samo umeklidinija ili lijeka za liječenje KOPB-a pod nazivom tiotropij.

U svih pet ispitivanja, koja su uključivala 5 600 bolesnika, glavna mјera učinkovitosti lijeka temeljila se na promjenama forsiranog izdisajnog volumena bolesnika (FEV₁, maksimalnog volumena zraka koji osoba može izdahnuti u prvoj sekundi).

Rezultati su pokazali da je nakon 24 tjedna liječenja Anoro Ellipta poboljšao funkciju pluća i to povećanjem FEV₁ u prosjeku za 167 ml više nego placebo. Osim toga, uz lijek Anoro Ellipta povećanje FEV₁ bilo je u prosjeku do 95 ml veće nego uz primjenu samo vilanterola, a za 52 ml veće nego uz primjenu samo umeklidinijevog bromida. U tri ispitivanja u kojima se lijek Anoro Ellipta uspoređivao s tiotropijem, nakon 24 tjedna liječenja prosječno povećanje FEV₁ uz primjenu lijeka Anoro Ellipta iznosilo je 60, 90 i 112 ml više nego uz tiotropij.

Pokazalo se također da Anoro Ellipta u usporedbi s placebom olakšava nedostatak zraka.

Kombinacija veće doze umeklidinija i vilanterola nije dosljedno dovodila do poboljšanja većih od lijeka Anoro Ellipta, što bi opravdalo njezinu primjenu.

Koji su rizici povezani s lijekom Anoro Ellipta?

Najčešće nuspojave lijeka Anoro Ellipta (koje se mogu pojaviti u do 1 na 10 osoba) bile su infekcije gornjeg dišnog sustava (infekcije nosa i grla), infekcije mokraćnog sustava (infekcije struktura koje odvode mokraću), faringitis (upala grla), sinusitis (upala sinusa), nazofaringitis (upala nosa i grla), glavobolja, kašalj, orofaringealna bol (bol u ustima i grlu), zatvor i suha usta.

Potpuni popis nuspojava i ograničenja potražite u uputi o lijeku.

Zašto je lijek Anoro Ellipta odobren u EU-u?

Europska agencija za lijekove zaključila je da koristi od lijeka Anoro Ellipta nadmašuju s njim povezane rizike te da lijek može biti odobren za primjenu u Europskoj uniji. Agencija je zaključila da se lijek Anoro Ellipta pokazao učinkovitim u poboljšanju funkcije pluća i simptoma KOPB-a u usporedbi s placebom ili pojedinačnim komponentama kao i tiotropijem. Agencija je također zaključila da za lijek Anoro Ellipta nisu ustanovljeni ozbiljni razlozi u pogledu sigurnosti primjene te da se nuspojave mogu liječiti, iako su zasad podatci o dugoročnoj sigurnosti primjene ograničeni. Agencija je preporučila provedbu ispitivanja kako bi se to dalje istraživalo.

Koje se mjere poduzimaju da bi se osigurala sigurna i učinkovita primjena lijeka Anoro Ellipta?

Budući da lijekovi iste klase kao i Anoro Ellipta mogu imati učinak na srce i krvne žile u mozgu, tvrtka koja ovaj lijek stavlja u promet provest će dugoročno ispitivanje u bolesnika kako bi se prikupile daljnje informacije u usporedbi s tiotropijem.

Preporuke i mjere opreza kojih se zdravstveni radnici i bolesnici trebaju pridržavati u cilju sigurne i učinkovite primjene lijeka Anoro Ellipta nalaze se također u sažetku opisa svojstava lijeka i u uputi o lijeku.

Kao i za sve lijekove, podatci o primjeni lijeka Anoro Ellipta kontinuirano se prate. Nuspojave prijavljene za lijek Anoro Ellipta pažljivo se procjenjuju i poduzimaju se potrebne mjere za zaštitu bolesnika.

Ostale informacije o lijeku Anoro Ellipta

Lijek Anoro Ellipta dobio je odobrenje za stavljanje lijeka u promet koje vrijedi na prostoru EU-a od 8. svibnja 2014.

Više informacija o lijeku Anoro Ellipta možete naći na internetskim stranicama Agencije:
ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports.

Ovaj pregled informacija posljednji je put ažuriran u 09. 2018.