

<u>EU törzskönyvi szám</u>	<u>Kereskedelmi név</u>	<u>Hatáserősség</u>	<u>Gyógyszerforma</u>	<u>Az alkalmazás módja</u>	<u>Csomagolás</u>	<u>Tartalom (koncentráció)</u>	<u>Kiszerezés</u>
EU/1/08/463/001	Relistor	12 mg/0,6 ml	Oldatos injekció	Szubkután alkalmazás	Injekciós üveg (üveg)	0,6 ml (20 mg/ml)	1 db injekciós üveg
EU/1/08/463/002	Relistor	12 mg/0,6 ml	Oldatos injekció	Szubkután alkalmazás	Injekciós üveg (üveg)	0,6 ml (20 mg/ml)	2 db injekciós üveg + 2 db steril fecskendő + 4 db alkoholos törülőkendő
EU/1/08/463/003	Relistor	12 mg/0,6 ml	Oldatos injekció	Szubkután alkalmazás	Injekciós üveg (üveg)	0,6 ml (20 mg/ml)	7 db injekciós üveg + 7 db steril fecskendő + 14 db alkoholos törülőkendő
EU/1/08/463/004	Relistor	8 mg	Oldatos injekció	Szubkután alkalmazás	Előretöltött fecskendő (üveg)	0,4 ml (20 mg/ml)	4 db előretöltött fecskendő
EU/1/08/463/005	Relistor	8 mg	Oldatos injekció	Szubkután alkalmazás	Előretöltött fecskendő (üveg)	0,4 ml (20 mg/ml)	7 db előretöltött fecskendő
EU/1/08/463/006	Relistor	8 mg	Oldatos injekció	Szubkután alkalmazás	Előretöltött fecskendő (üveg)	0,4 ml (20 mg/ml)	8 db előretöltött fecskendő
EU/1/08/463/007	Relistor	8 mg	Oldatos injekció	Szubkután alkalmazás	Előretöltött fecskendő (üveg)	0,4 ml (20 mg/ml)	10 db előretöltött fecskendő
EU/1/08/463/008	Relistor	12 mg	Oldatos injekció	Szubkután alkalmazás	Előretöltött fecskendő (üveg)	0,6 ml (20 mg/ml)	4 db előretöltött fecskendő
EU/1/08/463/009	Relistor	12 mg	Oldatos injekció	Szubkután alkalmazás	Előretöltött fecskendő (üveg)	0,6 ml (20 mg/ml)	7 db előretöltött fecskendő
EU/1/08/463/010	Relistor	12 mg	Oldatos injekció	Szubkután alkalmazás	Előretöltött fecskendő (üveg)	0,6 ml (20 mg/ml)	8 db előretöltött fecskendő
EU/1/08/463/011	Relistor	12 mg	Oldatos injekció	Szubkután alkalmazás	Előretöltött fecskendő (üveg)	0,6 ml (20 mg/ml)	10 db előretöltött fecskendő
EU/1/08/463/012	Relistor	12 mg/0.6 ml	Oldatos injekció	Szubkután Alkalmazás	Injekciós üveg (üveg)	0,6 ml (20 mg/ml)	2 db injekciós üveg + 2 db steril fecskendő biztonsági injekciós túvel + 4 db alkoholos

EU/1/08/463/013	Relistor	12 mg/0.6 ml	Oldatos injekció	Szubkután alkalmazás	Injekciós üveg (üveg)	0,6 ml (20 mg/ml)	törőlkendő 7 db injekciós üveg + 7 db steril fecskendő biztonsági injekciós tűvel + 14 db alkoholos törőlkendő
-----------------	----------	--------------	------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------	---