

Lyfið er ekki lengur með markaðsleyfi

VIÐAUKI I
SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS

1. HEITI LYFS

Bortezomib Hospira 1 mg stungulyfsstofn, lausn.
Bortezomib Hospira 2,5 mg stungulyfsstofn, lausn.
Bortezomib Hospira 3 mg stungulyfsstofn, lausn.
Bortezomib Hospira 3,5 mg stungulyfsstofn, lausn.

2. INNIHALDSLÝSING

Bortezomib Hospira 1 mg stungulyfsstofn, lausn

Hvert hettuglas með stofni inniheldur 1 mg af bortezomibi (sem mannítólbórester).

Bortezomib Hospira 2,5 mg stungulyfsstofn, lausn

Hvert hettuglas með stofni inniheldur 2,5 mg af bortezomibi (sem mannítólbórester).

Bortezomib Hospira 3 mg stungulyfsstofn, lausn

Hvert hettuglas með stofni inniheldur 3 mg af bortezomibi (sem mannítólbórester).

Bortezomib Hospira 3,5 mg stungulyfsstofn, lausn

Hvert hettuglas með stofni inniheldur 3,5 mg af bortezomibi (sem mannítólbórester).

Eftir blöndun inniheldur 1 ml af lausn til inndælingar undir húð 2,5 mg af bortezomibi.

Eftir blöndun inniheldur 1 ml af lausn til inndælingar í bláæð 1 mg af bortezomibi.

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1.

3. LYFJAFORM

Stungulyfsstofn, lausn.

Hvít til beinhvít kaka eða duft.

4. KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR

4.1 Ábendingar

Bortezomib Hospira sem einlyfjameðferð eða í samsettri meðferð með pegýleruðu liposomal doxorubicíni eða dexametasoni er ætlað fullorðnum sjúklingum með versnandi mergæxli (multiple myeloma) sem hafa fengið a.m.k. eina fyrri meðferð og hafa þegar gengist undir ígræðslu blóðmyndandi stofnfrumna eða ef hún hentar ekki.

Bortezomib Hospira í samsettri meðferð með melfalani og prednisóni er ætlað til meðferðar hjá fullorðnum sjúklingum með áður ómeðhöndlað mergæxli, sem ekki hentar krabbameinslyfjameðferð í stórum skömmtum ásamt ígræðslu blóðmyndandi stofnfrumna.

Bortezomib Hospira í samsettri meðferð með dexametasoni eða ásamt dexametasoni og thalidomíði er ætlað sem innleiðslumeðferð hjá fullorðnum sjúklingum með áður ómeðhöndlað mergæxli, sem hentar krabbameinslyfjameðferð í stórum skömmtum ásamt ígræðslu blóðmyndandi stofnfrumna.

Bortezomib Hospira í samsettri meðferð með rituximabi, cyclophosphamíði, doxorubicini og prednisóni er ætlað til meðferðar hjá fullorðnum sjúklingum með áður ómeðhöndlað möttulfrumu eitlaæxli þar sem ígræðsla blóðmyndandi stofnfrumna hentar ekki.

4.2 Skammtar og lyfjagjöf

Meðferð með Bortezomib Hospira á að hefja undir eftirliti læknis með reynslu í meðferð krabbameinssjúklinga, hins vegar má heilbrigðisstarfsmaður með reynslu í notkun krabbameinslyfja gefa Bortezomib Hospira. Blöndun Bortezomib Hospira að vera í höndum heilbrigðisstarfsmanns (sjá kafla 6.6).

Skömmun við meðferð versnandi mergæxlis (sjúklingar sem hafa fengið a.m.k. eina meðferð áður)

Einlyfjameðferð

Bortezomib Hospira er gefið með inndælingu í bláæð eða undir húð í ráðlögðum skammti 1,3 mg/m² líkamsyfirborðs, tvisvar sinnum í viku í tvær vikur á 1., 4., 8. og 11. degi í 21 dags meðferðarlotu. Þetta 3 vikna tímabil er skilgreint sem meðferðarloti. Mælt er með því að sjúklingar fái 2 meðferðarlotur af Bortezomib Hospira eftir að staðfesting á fullnaðarsvörun liggur fyrir. Einnig er mælt með því að sjúklingar, sem svara meðferð en ná ekki fullum bata, fái samtals 8 meðferðarlotur af Bortezomib Hospira. Að minnsta kosti 72 klst. eiga að líða á milli Bortezomib Hospira skammta.

Skammtaaðlögun meðan á meðferð stendur og þegar einlyfjameðferð er hafin að nýju

Gera verður hlé á meðferð með Bortezomib Hospira ef fram kemur einhver 3. stigs eiturverkun sem ekki varðar blóðmynd eða 4. stigs eiturverkun á blóðmynd, að undanskildum taugakvilla eins og fram kemur hér á eftir (sjá einnig kafla 4.4). Þegar einkenni eiturverkana eru horfin má hefja meðferð með Bortezomib Hospira að nýju með 25% minni skammti (1,3 mg/m² minnkuð í 1,0 mg/m²; 1,0 mg/m² minnkuð í 0,7 mg/m²). Hverfi eiturverkanir ekki eða ef þær koma aftur fram við minnsta skammt, verður að íhuga að hætta notkun Bortezomib Hospira, nema ávinningur vegi augljóslega þyngra en áhættan.

Taugaverkir og/eða útlægur taugakvilli

Sjúklinga, sem fá taugaverk og/eða útlægan taugakvilla í tengslum við bortezomib, á að meðhöndla eins og fram kemur í töflu 1 (sjá kafla 4.4). Sjúklinga, sem fyrir eru með alvarlegan taugakvilla, má einungis meðhöndla með Bortezomib Hospira eftir ítarlegt mat á áhættu gegn ávinningi.

Tafla 1: Ráðlagðar* skammtabreytingar vegna taugakvilla í tengslum við bortezomib

Alvarleiki taugakvilla	Skammtabreyting
1. stig (án einkenna; missir djúpsinaviðbragða eða náladofti) án verks eða skerðingar á færni	Engin
1. stig með verk eða 2. stig (miðlungsmikil einkenni sem takmarka almennar athafnir daglegs lífs)**	Minnka Bortezomib Hospira í 1,0 mg/m ² eða Breyta áætlun um meðferð með Bortezomib Hospira í 1,3 mg/m ² einu sinni í viku
2. stig með verk eða 3. stig (veruleg einkenni; sem takmarka getu til athafna daglegs lífs sem lúta að sjálfsmönnum***)	Gera hlé á meðferð með Bortezomib Hospira þar til einkenni eiturverkana eru horfin. Þegar eiturverkanir eru horfnar skal hefja meðferð með Bortezomib Hospira að nýju og minnka skammt í 0,7 mg/m ² einu sinni í viku.
4. stig (lífshættulegar afleiðingar; brýn þörf á inn gripi) og/eða alvarlegur taugakvilli í ósjálfráða taugakerfinu	Hætta notkun Bortezomib Hospira

* Byggt á skammtabreytingum í II. og III. stigs rannsóknum á mergæxli og reynslu eftir markaðssetningu lyfsins. Stigun byggð á NCI Common Toxicity Criteria CTCAE útgáfu 4.0.

** *Almennar athafnir daglegs lífs:* Átt er við getu til að matbúa, kaupa inn matvöru eða föt, nota síma, fara með peninga o.s.frv.

*** *Athafnir daglegs lífs sem líta að sjálfsmönnum:* Átt er við getu til að baða, klæða og afklæða sig, matast, nota salerni, taka lyf og að viðkomandi sé ekki rúmfastur.

Samsett meðferð með pegýleruðu liposomal doxorubicini

Bortezomib Hospira er gefið í bláæð eða undir húð í ráðlögðum skammti 1,3 mg/m² líkamsyfirborðs tvisvar í viku í tvær vikur á 1., 4., 8. og 11. degi í 21 dags meðferðarlotu. Þetta 3 vikna tímabil er skilgreint sem meðferðarlota. Að minnsta kosti 72 klst. eiga að líða á milli Bortezomib Hospira skammta.

Pegýlerað liposomal doxorubicin er gefið sem 30 mg/m² á 4. degi í meðferðarlotu með Bortezomib Hospira með 1 klst. innrennsli í bláæð á eftir inndælingu með Bortezomib Hospira.

Gefa má allt að 8 lotur af þessari samsettu meðferð svo framarlega sem sjúkdómurinn hefur ekki versnað og sjúklingurinn þolir meðferðina. Sjúklingar sem ná fullkominni svörun geta haldið meðferð áfram í a.m.k. 2 lotur eftir fyrstu merki um fullkomna svörun, jafnvel þótt það krefjist meðferðar í meira en 8 lotur. Sjúklingar með parapróteingildi sem fara áfram lækjandi eftir 8 lotur geta einnig haldið áfram svo lengi sem þeir þola meðferðina og þeir halda áfram að svara henni.

Viðbótarupplýsingar um pegýlerað liposomal doxorubicin, sjá samantekt á eiginleikum viðkomandi lyfs.

Samsett meðferð með dexametasoni

Bortezomib Hospira er gefið í bláæð eða undir húð í ráðlögðum skammti 1,3 mg/m² líkamsyfirborðs tvisvar í viku í tvær vikur á 1., 4., 8. og 11. degi í 21 dags meðferðarlotu. Þetta 3 vikna tímabil er skilgreint sem meðferðarlota. Að minnsta kosti 72 klst. eiga að líða á milli Bortezomib Hospira skammta.

Dexametason 20 mg til inntöku er gefið á 1., 2., 4., 5., 8., 9., 11. og 12. degi í meðferðarlotu með Bortezomib Hospira.

Sjúklingar sem ná svörun eða stöðugleika sjúkdóms eftir 4 lotur af samsettu meðferðinni geta haldið áfram sömu samsettu meðferðinni í að hámarki 4 lotur til viðbótar.

Viðbótarupplýsingar um dexametason, sjá samantekt á eiginleikum viðkomandi lyfs.

Skammtaaðlögun fyrir samsetta meðferð fyrir sjúklinga með versnandi mergæxli

Varðandi skammtaaðlögun fyrir Bortezomib Hospira í samsettri meðferð skal fylgja leiðbeiningum um skammtaaðlögun fyrir einlyfjameðferð hér að ofan.

Skömmun hjá sjúklingum með áður ómeðhöndlað mergæxli, sem hentar ekki ígræðsla blóðmyndandi stofnfrumna

Samsett meðferð með melfaleni og prednisóni

Bortezomib Hospira er gefið með inndælingu í bláæð eða undir húð ásamt melfaleni til inntöku og prednisóni til inntöku eins og sýnt er í töflu 2. Sex vikna tímabil er talið ein meðferðarlota. Í lotum 1-4 er Bortezomib Hospira gefið tvisvar í viku á degi 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29 og 32. Í lotum 5-9 er Bortezomib Hospira gefið einu sinni í viku á degi 1, 8, 22 og 29. Að minnsta kosti 72 klst. eiga að líða á milli Bortezomib Hospira skammta.

Gefa skal bæði melfalan og prednisón til inntöku á degi 1, 2, 3 og 4 í fyrstu viku hvernar Bortezomib Hospira meðferðarlotu.

Gefnar eru níu meðferðarlotur af þessari samsettu meðferð.

Tafla 2: Ráðlagðir skammtar af Bortezomib Hospira í samsettri meðferð með melfalani og prednisóni

Bortezomib Hospira tvisvar í viku (lotur 1-4)												
Vika	1				2		3	4		5		6
B (1,3 mg/m ²)	Dagur 1	--	--	Dagur 4	Dagur 8	Dagur 11	Hvöld	Dagur 22	Dagur 25	Dagur 29	Dagur 32	Hvöld
M (9 mg/m ²) P (60 mg/m ²)	Dagur 1	Dagur 2	Dagur 3	Dagur 4	--	--	Hvöld	--	--	--	--	Hvöld

Bortezomib Hospira einu sinni í viku (lotur 5-9)									
Vika	1				2	3	4	5	6
B (1,3 mg/m ²)	Dagur 1	--	--	--	Dagur 8	Hvöld	Dagur 22	Dagur 29	Hvöld
M (9 mg/m ²) P (60 mg/m ²)	Dagur 1	Dagur 2	Dagur 3	Dagur 4	--	Hvöld	--	--	Hvöld

B = bortezomib, M = melfalan, P = prednisón

Skammtaaðlögun meðan á meðferð stendur og þegar samsett meðferð með melfalani og prednisóni er hafin að nýju

Áður en byrjað er á nýrri meðferðarlotu:

- Blóðflagnafjöldi skal vera $\geq 70 \times 10^9/l$ og heildarfjöldi daufkyrninga (absolute neutrophil count (ANC)) skal vera $\geq 1,0 \times 10^9/l$
- Eiturverkanir, sem ekki tengjast blóði, skulu hafa gengið til baka niður á 1. stig eða að grunnigildi

Tafla 3: Skammtabreytingar í eftirfylgjandi meðferðarlotum með Bortezomib Hospira í samsettri meðferð með melfalani og prednisóni

Eiturverkanir	Skammtabreyting eða seinkun skammts
<i>Eiturverkanir á blóðmynd í meðferðarlotu</i>	
Ef langvarandi 4. stigs daufkyrningafæð eða blóðflagnafæð eða blóðflagnafæð með blæðingum kemur fram í fyrri lotu	Íhugið að minnka skammtinn af melfalani um 25% í næstu meðferðarlotu
Ef blóðflagnafjöldi er $\leq 50 \times 10^9/l$ eða $ANC \leq 0,75 \times 10^9/l$ á degi sem Bortezomib Hospira er gefið (öðrum en degi 1)	Sleppa skal meðferð með Bortezomib Hospira
Ef nokkrum skömmtum af Bortezomib Hospira er sleppt í sömu meðferðarlotu (≥ 3 skammtar þegar gefa á tvo skammta á viku eða ≥ 2 skammtar þegar gefa á einn skammt á viku)	Minnta skal skammtinn af Bortezomib Hospira um eitt skammtabil (úr 1,3 mg/m ² í 1 mg/m ² eða úr 1 mg/m ² í 0,7 mg/m ²)

Eiturverkanir	Skammtabreyting eða seinkun skammts
≥ 3. stigs eiturverkanir sem ekki tengjast blóði	Fresta skal meðferð með Bortezomib Hospira þar til einkenni eiturverkana hafa gengið til baka niður á 1. stig eða að grunngildi. Þá má hefja meðferð með Bortezomib Hospira að nýju með eins skammtabils minnkun (úr 1,3 mg/m ² í 1 mg/m ² eða úr 1 mg/m ² í 0,7 mg/m ²). Varðandi taugaverki og/eða útlægan taugakvilla í tengslum við Bortezomib Hospira, skal stöðva og/eða breyta meðferð með Bortezomib Hospira eins og lýst er í töflu 1.

Frekari upplýsingar um melfalan og prednisón er að finna í samantekt á eiginleikum hvors lyfs fyrir sig (SmPC).

Skömmun hjá sjúklingum með áður ómeðhöndlað mergæxli, sem hentar ígræðsla blóðmyndandi stofnfrumna (innleiðslumeðferð)

Samsett meðferð með dexametasoni

Bortezomib Hospira er gefið með inndælingu í bláæð eða undir húð í ráðlögðum skammti 1,3 mg/m² líkamsyfirborðs, tvisvar sinnum í viku í tvær vikur á 1., 4., 8. og 11. degi í 21 dags meðferðarlötu. Þetta 3 vikna tímabil er skilgreint sem meðferðarlöta. Að minnsta kosti 72 klst. eiga að líða á milli Bortezomib Hospira skammta.

Dexametason er gefið til inntöku í 40 mg skammti á 1., 2., 3., 4., 8., 9., 10. og 11. degi í meðferðarlötu með Bortezomib Hospira.

Gefnar eru fjórar meðferðarlötur af þessari samsettu meðferð.

Samsett meðferð með dexametasoni og thalidomíði

Bortezomib Hospira er gefið með inndælingu í bláæð eða undir húð í ráðlögðum skammti 1,3 mg/m² líkamsyfirborðs, tvisvar sinnum í viku í tvær vikur á 1., 4., 8. og 11. degi í 28 daga meðferðarlötu. Þetta 4 vikna tímabil er skilgreint sem meðferðarlöta. Að minnsta kosti 72 klst. eiga að líða á milli Bortezomib Hospira skammta.

Dexametason er gefið til inntöku í 40 mg skammti á 1., 2., 3., 4., 8., 9., 10. og 11. degi í meðferðarlötu með Bortezomib Hospira.

Thalidomíð er gefið til inntöku í 50 mg skammti daglega á 1.-14. degi og ef sá skammtur þolist er skammturinn aukinn í 100 mg á 15.-28. degi og síðan má auka skammtinn í 200 mg daglega frá 2 lotu (sjá töflu 4).

Gefnar eru fjórar meðferðarlötur af þessari samsettu meðferð. Mælt er með því að sjúklingar sem svara að minnsta kosti að hluta til fái 2 lotur til viðbótar.

Tafla 4: Skömmtun Bortezomib Hospira í samsettri meðferð hjá sjúklingum með áður ómeðhöndlað mergæxli, sem hentar ígræðsla blóðmyndandi stofnfrumna

B + Dx	Lotur 1 til 4				
	Vika	1	2	3	
	B (1,3 mg/m ²)	Dagur 1, 4	Dagur 8, 11	Hvíldartímabil	
	Dx 40 mg	Dagur 1, 2, 3, 4	Dagur 8, 9, 10, 11	-	
B + Dx + T	Lota 1				
	Vika	1	2	3	4
	B (1,3 mg/m ²)	Dagur 1, 4	Dagur 8, 11	Hvíldartíma-bil	Hvíldartíma-bil
	T 50 mg	Daglega	Daglega	-	-
	T 100 mg ^a	-	-	Daglega	Daglega
	Dx 40 mg	Dagur 1, 2, 3, 4	Dagur 8, 9, 10, 11	-	-
	Lotur 2 til 4 ^b				
	B (1,3 mg/m ²)	Dagur 1, 4	Dagur 8, 11	Hvíldartíma-bil	Hvíldartíma-bil
	T 200 mg ^a	Daglega	Daglega	Daglega	Daglega
	Dx 40 mg	Dagur 1, 2, 3, 4	Dagur 8, 9, 10, 11	-	-

B = bortezomib; Dx = dexametason; T = thalidomíð

a Thalidomíð skammtur er einungis aukinn í 100 mg frá 3. viku, lotu 1 ef 50 mg þolast og í 200 mg frá lotu 2 ef 100 mg þolast.

b Sjúklingum sem svara að minnsta kosti að hluta til eftir 4 lotur má gefa allt að 6 lotur.

Skammtaaðlögun hjá sjúklingum sem hentar ígræðsla

Varðandi skammtaaðlögun Bortezomib Hospira skal fylgja leiðbeiningum um skammtaaðlögun fyrir einlyfjameðferð.

Þegar Bortezomib Hospira er gefið í samsettri meðferð með öðrum krabbameinslyfjum, skal auk þess íhuga viðeigandi skammtaminnkun þessara lyfja ef til eiturvefna kemur, í samræmi við ráðleggingar í samantekt á eiginleikum lyfjanna.

Skömmtun hjá sjúklingum með áður ómeðhöndlað möttulfrumu eitlaæxli (MCL)

Samsett meðferð með rituximabi, cyclophosphamíði, doxorubicini og prednisóni (BR-CAP)

Bortezomib Hospira er gefið með inndælingu í bláæð eða undir húð í ráðlögðum skammti 1,3 mg/m² líkamsyfirborðs, tvisvar sinnum í viku í tvær vikur á 1., 4., 8. og 11. degi og í kjölfarið er 10 daga hvíldartímabil á 12.-21. degi. Þetta 3 vikna tímabil er skilgreint sem meðferðarlota. Mælt er með sex Bortezomib Hospira meðferðarlotum, þó að gefa megi tvær viðbótar Bortezomib Hospira meðferðarlotur hjá sjúklingum sem svara fyrst meðferð í meðferðarlotu 6. Að minnsta kosti 72 klst. eiga að líða á milli Bortezomib Hospira skammta.

Eftirfarandi lyf eru gefin með innrennsli í bláæð á 1. degi hvernar 3 vikna Bortezomib Hospira meðferðarlotu: rituximab 375 mg/m², cyclophosphamíð 750 mg/m² og doxorubicin 50 mg/m².

Prednisón er gefið til inntöku í 100 mg/m² skammti á 1., 2., 3., 4. og 5. degi hvernar Bortezomib Hospira meðferðarlotu.

Skammtaaðlögun meðan á meðferð stendur hjá sjúklingum með áður ómeðhöndlað möttulfrumu eitlaæxli

Áður en byrjað er á nýrri meðferðarlotu:

- Blóðflagnafjöldi skal vera ≥ 100.000 frumur/ μ l og heildarfjöldi daufkyrninga (ANC) skal vera ≥ 1.500 frumur/ μ l
- Blóðflagnafjöldi skal vera ≥ 75.000 frumur/ μ l hjá sjúklingum með beinmergsíferð eða bindingu

- í milta (splenic sequestration)
- Blóðrauði ≥ 8 g/dl
- Eiturverkanir, sem ekki tengjast blóði, skulu hafa gengið til baka niður á 1. stig eða að grunnngildi.

Gera verður hlé á meðferð með Bortezomib Hospira ef fram kemur einhver ≥ 3 . stigs eiturverkun tengd Bortezomib Hospira sem ekki varðar blóðmynd (taugakvillar undanskildir) eða ≥ 3 . stigs eiturverkun á blóðmynd (sjá einnig kafla 4.4). Skammtaaðlögun sést í töflu 5 hér á eftir.

Gefa má hvítkornavaxtarþætti (granulocyte colony stimulating factors) við eiturverkun á blóðmynd í samræmi við gildandi venjur. Íhuga skal fyrirbyggjandi meðferð með hvítkornavaxtarþættum ef endurtekið þarf að fresta gjöf meðferðarlota. Íhuga skal gjöf blóðflagna sem meðferð við blóðflagnafæð þegar það er klínískt viðeigandi.

Tafla 5: Skammtaaðlögun meðan á meðferð stendur hjá sjúklingum með áður ómeðhöndlað möttulfrumu eitlaæxli

Eiturverkanir	Skammtabreyting eða seinkun skammts
<i>Eiturverkanir á blóðmynd</i>	
• ≥ 3. stigs daufkyrningafæð með hita, 4. stigs daufkyrningafæð sem varir lengur en 7 daga, blóðflagnafjöldi < 10.000 frumur/μl	Fresta skal Bortezomib Hospira meðferð í allt að 2 vikur þar til sjúklingurinn hefur ANC ≥ 750 frumur/μl og blóðflagnafjölda ≥ 25.000 frumur/μl. • Ef eiturverkanir hverfa ekki eftir að Bortezomib Hospira hefur verið frestað eins og lýst er að ofan, skal hætta Bortezomib Hospira meðferð. • Ef eiturverkanir ganga til baka, þ.e. sjúklingurinn hefur ANC ≥ 750 frumur/μl og blóðflagnafjölda ≥ 25.000 frumur/μl, má hefja meðferð með Bortezomib Hospira að nýju með skammti sem er minnkaður um eitt skammtabil (úr $1,3 \text{ mg/m}^2$ í 1 mg/m^2 eða úr 1 mg/m^2 í $0,7 \text{ mg/m}^2$).
• Ef blóðflagnafjöldi er < 25.000 frumur/μl eða ANC < 750 frumur/μl á degi sem Bortezomib Hospira skammtur er gefinn (fyrir utan 1. dag hverrar lotu)	Sleppa skal meðferð með Bortezomib Hospira
≥ 3 . stigs eiturverkanir sem ekki tengjast blóði og eru taldar tengjast Bortezomib Hospira	Fresta skal meðferð með Bortezomib Hospira þar til einkenni eiturverkana hafa gengið til baka niður á 2. stig eða neðar. Þá má hefja meðferð með Bortezomib Hospira að nýju með skammti sem er minnkaður um eitt skammtabil (úr $1,3 \text{ mg/m}^2$ í 1 mg/m^2 eða úr 1 mg/m^2 í $0,7 \text{ mg/m}^2$). Varðandi taugaverki og/eða útlægan taugakvilla í tengslum við Bortezomib Hospira, skal stöðva og/eða breyta meðferð með Bortezomib Hospira eins og lýst er í töflu 1.

Þegar Bortezomib Hospira er gefið í samsettri meðferð með öðrum krabbameinslyfjum, skal auk þess íhuga viðeigandi skammtaminnkun þessara lyfja ef til eiturverkana kemur, í samræmi við ráðleggingar í samantekt á eiginleikum lyfjanna.

Sérstakir sjúklingahópar

Aldraðir

Engar vísbendingar eru um að aðlaga þurfi skammta hjá sjúklingum eldri en 65 ára með mergæxli eða möttulfrumu eitlaæxli.

Engar rannsóknir hafa verið gerðar á notkun Bortezomib Hospira hjá öldruðum sjúklingum með áður ómeðhöndlað mergæxli, sem hentar krabbameinslyfjameðferð í stórum skömmtum ásamt ígræðslu blóðmyndandi stofnfrumna. Þess vegna er ekki hægt að veita neinar ráðleggingar um skammta hjá þessum sjúklingahópi.

Í rannsókn á sjúklingum með áður ómeðhöndlað möttulfrumu eitlaæxli sem fengu Bortezomib Hospira, voru 42,9% sjúklinga á aldrinum 65-74 ára og 10,4% sjúklinga voru ≥ 75 ára. Sjúklingar sem voru ≥ 75 ára þöldu verr báðar meðferðirnar, BR-CAP sem og R-CHOP (sjá kafla 4.8).

Skert lifrarstarfsemi

Ekki er þörf á skammtaaðlögun hjá sjúklingum með vægt skerta lifrarstarfsemi og skal meðhöndla sjúklingana með ráðlögðum skömmtum. Hefja skal meðferð hjá sjúklingum með í meðallagi mikið eða verulega skerta lifrarstarfsemi með minni skammti af Bortezomib Hospira, 0,7 mg/m² í hverri inndælingu í fyrstu meðferðarlotunni, og í kjölfarið má íhuga að auka skammtinn í 1,0 mg/m² eða minnka skammtinn í 0,5 mg/m² eftir því hversu vel sjúklingurinn þolir meðferðina (sjá töflu 6 og kafla 4.4 og 5.2).

Tafla 6: Ráðlagðar breytingar á upphafsskammti Bortezomib Hospira hjá sjúklingum með skerta lifrarstarfsemi

Alvarleiki skerðingar á lifrarstarfsemi*	Bilirúbín gildi	SGOT (AST) gildi	Breytingar á upphafsskammti
Væg	$\leq 1,0 \times \text{ULN}$	$> \text{ULN}$	Engin
	$> 1,0 \times -1,5 \times \text{ULN}$	Mælist	Engin
Í meðallagi mikil	$> 1,5 \times -3 \times \text{ULN}$	Mælist	Minnka Bortezomib Hospira í 0,7 mg/m ² í fyrstu meðferðarlotunni. Íhuga skal að auka skammtinn í 1,0 mg/m ² eða minnka skammtinn í 0,5 mg/m ² í síðari meðferðarlotum miðað við hvernig sjúklingur þolir lyfið
Veruleg	$> 3 \times \text{ULN}$	Mælist	

Skammstafanir: SGOT = glutamín oxaloacetic transamínasi í sermi;

AST = aspartat amínótransferasi; ULN = efri mörk eðlilegra gilda (upper limit of the normal range).

* Byggt á flokkun NCI Organ Dysfunction Working Group á skerðingu á lifrarstarfsemi (væg, í meðallagi mikil, veruleg).

Skert nýrnastarfsemi

Hjá sjúklingum með vægt til í meðallagi mikið skerta nýrnastarfsemi (kreatínínúthreinsun [CrCl] > 20 ml/mín./1,73 m²) koma ekki fram breytingar á lyfjahvörfum bortezomibs, og því er ekki þörf á skammtaaðlögun hjá þessum sjúklingum. Ekki er þekkt hvort lyfjahvörf bortezomibs breytast hjá sjúklingum með verulega skerta nýrnastarfsemi sem ekki eru í skilun (CrCl < 20 ml/mín./1,73 m²). Þar sem skilun getur lækkað þéttni bortezomibs skal gefa Bortezomib Hospira eftir að skilun hefur farið fram (sjá kafla 5.2).

Börn

Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi og verkun Bortezomib Hospira hjá börnum yngri en 18 ára (sjá kafla 5.1 og 5.2). Nýjustu upplýsingum sem liggja fyrir er lýst í kafla 5.1 en ekki er hægt að ráðleggja skammta á grundvelli þeirra.

Lyfjagjöf

Bortezomib Hospira er ætlað til notkunar í bláæð eða undir húð.

Bortezomib Hospira má ekki nota með öðrum íkomuleiðum. Gjöf í mænuvökva hefur valdið dauða.

Gjöf með inndælingu í bláæð

Bortezomib Hospira fullbúin lausn er gefin með einni inndælingu í bláæð á 3-5 sekúndum um útlægan eða miðlægan æðalegg og síðan er skolað með natríumklóríð 9 mg/ml (0,9%) stungulyfi, lausn. Að minnsta kosti 72 klst. eiga að líða á milli Bortezomib Hospira skammta.

Gjöf með inndælingu undir húð

Bortezomib Hospira fullbúin lausn er gefin undir húð í læri (hægra eða vinstra) eða kvið (hægra eða vinstra megin). Lausnina skal gefa með inndælingu undir húð við 45-90° horn.

Skipta skal um stungustaði til að inndælingarnar gangi vel fyrir sig.

Ef fram koma staðbundin viðbrögð á stungustað í kjölfar inndælingar Bortezomib Hospira undir húð er mælt með því annaðhvort að gefa vægari Bortezomib Hospira lausn (Bortezomib Hospira blandað þannig að styrkurinn verði 1 mg/ml í stað 2,5 mg/ml) undir húð eða skipta yfir í inndælingu í bláæð.

Þegar Bortezomib Hospira er gefið samhliða öðrum lyfjum skal fylgja leiðbeiningum um lyfjagjöf í samantekt á eiginleikum lyfjanna.

Sjá leiðbeiningar í kafla 6.6 um blöndun lyfsins fyrir gjöf.

4.3 Frábendingar

Ofnæmi fyrir virka efniinu, fyrir bóri eða einhyrju hjálparefnanna sem talin eru upp í kafla 6.1.

Bráð, dreifð lungnaíferð eða sjúkdómur í gollurshúsi.

Þegar Bortezomib Hospira er gefið samhliða öðrum lyfjum skal einnig skoða frábendingar í samantekt á eiginleikum lyfs (SmPC) fyrir hin lyfin.

4.4 Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun

Þegar Bortezomib Hospira er gefið samhliða öðrum lyfjum verður að taka mið af samantekt á eiginleikum lyfs (SmPC) fyrir hin lyfin áður en meðferð með Bortezomib Hospira er hafin. Þegar thalidomíð er notað þarf sérstaklega að huga að þungunarprófum og nauðsyn þess að koma í veg fyrir þungun (sjá kafla 4.6).

Gjöf í mænuvökva

Orðið hafa dauðsföll vegna þess að Bortezomib Hospira var gefið af vangá í mænuvökva. Bortezomib Hospira er ætlað til notkunar í bláæð eða undir húð. Bortezomib Hospira má ekki gefa í mænuvökva.

Eiturverkanir á meltingarfæri

Eiturverkanir á meltingarfæri, þ.m.t. ógleði, niðurgangur, uppköst og hægðatregða, eru mjög algengar við meðferð með Bortezomib Hospira. Í sjaldgæfum tilvikum hefur verið greint frá garnastíflu (sjá kafla 4.8), því skal fylgjast náið með sjúklingum sem fá hægðatregðu.

Eiturverkanir á blóðmynd

Meðferð með Bortezomib Hospira tengist mjög oft eiturverkunum á blóðmynd (blóðflagnafæð, daufkyrningafæð og blóðleysi). Ein algengasta eiturverkunin á blóðmynd í rannsóknum hjá sjúklingum með endurkomið mergæxli sem fengu meðferð með Bortezomib Hospira og hjá sjúklingum með áður ómeðhöndlað möttulfrumu eitlaæxli sem fengu meðferð með Bortezomib Hospira samhliða rituximabi, cyclophosphamíði, doxorubicini og prednisóni (BR-CAP) var skammvinn blóðflagnafæð. Blóðflagnafjöldi var í lágmarki á 11. degi hvernar meðferðarlotu með Bortezomib Hospira og var almennt kominn upp í grunnildi í næstu lotu. Engin merki voru um að blóðflagnafæðin færi versnandi. Minnsti fjöldi blóðflagna mældist að meðaltali um 40% af grunnildi í rannsóknunum á mergæxli með stöku lyfi og 50% í rannsókninni á möttulfrumu eitlaæxli (MCL). Hjá sjúklingum með langt gengið mergæxli tengdist alvarleiki blóðflagnafæðar fjölda blóðflagna fyrir meðferð: Hvað varðar blóðflagnafjölda sem í upphafi meðferðar var $< 75.000/\mu\text{l}$, voru 90% af 21 sjúklingi með fjölda $\leq 25.000/\mu\text{l}$ meðan á rannsókninni stóð, þar af 14% $< 10.000/\mu\text{l}$; af sjúklingum með blóðflagnafjölda sem í upphafi rannsóknar var $> 75.000/\mu\text{l}$, voru hins vegar aðeins 14% af 309 sjúklingum með fjölda $\leq 25.000/\mu\text{l}$ meðan á rannsókninni stóð.

Hjá sjúklingum með MCL (rannsókn LYM-3002) var tíðni ≥ 3 . stigs blóðflagnafæðar hærri (56,7% samanborið við 5,8%) hjá Bortezomib Hospira meðferðarhópnum (BR-CAP) samanborið við meðferðarhópinn sem fékk ekki Bortezomib Hospira (rituximab, cyclophosphamíð, doxorubicin, vincristin og prednisón [R-CHOP]). Heildartíðni blæðinga af öllum stigum var sambærileg hjá báðum meðferðarhópnum (6,3% hjá BR-CAP hópnum og 5,0% hjá R-CHOP hópnum) og einnig tíðni 3. stigs blæðinga og hærri (BR-CAP: 4 sjúklingar [1,7%]; R-CHOP: 3 sjúklingar [1,2%]). Í BR-CAP hópnum voru 22,5% sjúklinga gefnar blóðflögur samanborið við 2,9% sjúklinga í R-CHOP hópnum.

Greint hefur verið frá blæðingum í meltingarvegi og heila í tengslum við meðferð með Bortezomib Hospira. Því skal telja blóðflögur fyrir gjöf sérhvers skammts af Bortezomib Hospira. Bíða skal með meðferð með Bortezomib Hospira þegar fjöldi blóðflagna er $< 25.000/\mu\text{l}$ eða í tilfellum þar sem fjöldi blóðflagna er $\leq 30.000/\mu\text{l}$ ef lyfið er gefið samhliða melfalani og prednisóni (sjá kafla 4.2). Meta skal vandlega mögulegan ávinning meðferðar gegn ánættu, sérstaklega ef um er að ræða í meðallagi alvarlega til alvarlega blóðflagnafæð og ánættuþætti fyrir blæðingu.

Heildarblóðkornatalningu, ásamt deilitalningu og að meðtalinni talningu á blóðflögum, skal framkvæma oft meðan á meðferð með Bortezomib Hospira stendur. Íhuga skal gjöf blóðflagna þegar það er klínískt viðeigandi (sjá kafla 4.2).

Hjá sjúklingum með MCL kom fram skammvinn daufkyrningafæð sem gekk til baka milli lota, en engin merki voru um uppsafnaða daufkyrningafæð. Daufkyrningar voru fæstir á 11. degi hvernar meðferðarlotu með Bortezomib Hospira og voru almennt komnir upp í grunnildi við næstu lotu. Í rannsókn LYM-3002 fengu 78% sjúklinga í BR-CAP hópnum stuðning með vaxtarþáttum og 61% sjúklinga í R-CHOP hópnum. Þar sem sjúklingar með daufkyrningafæð eru í meiri hættu á að fá sýkingar skal fylgjast með þeim m.t.t. einkenna um sýkingu og meðhöndla tafarlaust. Gefa má hvítkornavaxtarþætti við eiturverkunum á blóðmynd í samræmi við gildandi venjur. Íhuga skal fyrirbyggjandi meðferð með hvítkornavaxtarþáttum ef endurtekið þarf að fresta gjöf meðferðarlota (sjá kafla 4.2).

Endurvirkjun herpes zoster veiru

Mælt er með fyrirbyggjandi meðferð með veirulyfjum hjá sjúklingum sem meðhöndlaðir eru með Bortezomib Hospira.

Í III. stigs rannsókninni hjá sjúklingum með áður ómeðhöndlað mergæxli var heildartíðni endurvirkjunar *herpes zoster* hærri hjá sjúklingum sem meðhöndlaðir voru með bortezomib+melfalan+prednisón samanborið við melfalan+prednisón (14% miðað við 4%, talið í sömu röð).

Hjá sjúklingum með MCL (rannsókn LYM-3002) var tíðni herpes zoster sýkinga 6,7% í BR-CAP hópnum og 1,2% í R-CHOP hópnum (sjá kafla 4.8).

Lifrabólgu B veirusýking og endurvirkjun veirunnar

Begar rituximab er notað í samsettri meðferð með Bortezomib Hospira verður alltaf að skima fyrir lifrabólgu B veiru hjá sjúklingum sem eru í hættu á lifrabólgu B veirusýkingu áður en meðferð hefst. Fylgjast verður náið með lifrabólgu B smitberum og sjúklingum með sögu um lifrabólgu B m.t.t. klínískra og mælanlegra einkenna virkrar lifrabólgu B veirusýkingar á meðan samsettri meðferð með rituximabi og Bortezomib Hospira stendur, og eftir að meðferð lýkur. Íhuga skal fyrirbyggjandi meðferð með veirulyfjum. Frekari upplýsingar má finna í samantekt á eiginleikum lyfs fyrir rituximab.

Ágeng fjölhreiðra innlyksuheilabólga (progressive multifocal leukoencephalopathy (PML))

Hjá sjúklingum á meðferð með Bortezomib Hospira hefur örsjaldan verið greint frá tilvikum John Cunningham veirusýkingar af óþekktum orsökum, sem leiddi til ágengrar fjölhreiðra innlyksuheilabólgu og dauða. Sjúklingarnir sem greindust með ágenga fjölhreiðra innlyksuheilabólgu höfðu verið eða voru á ónæmisbælandi meðferð. Flest tilvik ágengrar fjölhreiðra innlyksuheilabólgu greindust innan 12 mánaða frá fyrsta skammti Bortezomib Hospira. Fylgjast skal með sjúklingum með reglubundnu millibili með tilliti til nýrra eða vernsandi einkenna frá taugakerfi sem gætu bent til ágengrar fjölhreiðra innlyksuheilabólgu sem hluta af mismunagreiningu kvilla í miðtaugakerfi. Ef grunur er um ágenga fjölhreiðra innlyksuheilabólgu skal vísa sjúklingum til sérfræðings í meðferð ágengrar fjölhreiðra innlyksuheilabólgu og grípa til viðeigandi úrræða til greiningar ágengrar fjölhreiðra innlyksuheilabólgu. Hættið meðferð með Bortezomib Hospira ef ágeng fjölhreiðra innlyksuheilabólga greinist.

Útlægur taugakvilli

Mjög algengt er að meðferð með Bortezomib Hospira tengist útlægum taugakvilla sem er einkum í skyntaugum. Hins vegar hefur verið greint frá alvarlegum tilvikum hreyfitaugakvilla með eða án útlægs skyntaugakvilla. Tíðni útlægs taugakvilla eykst snemma í meðferðinni og hefur reynst ná hámarki í 5. meðferðarlotu.

Mælt er með að vandlega sé fylgst með sjúklingum varðandi einkenni um taugakvilla, t.d. sviðatilfinningu, aukið húðskyn, skert húðskyn, náladofa, óþægindum, taugaverk eða máttleysi.

Í III. stigs rannsókninni, þar sem meðferð með Bortezomib Hospira í bláæð var borin saman við meðferð undir húð var tíðni tilvika úttaugakvilla af ≥ 2 . stigi 24% í hópnum sem fékk lyfið með inndælingu undir húð og 41% hjá hópnum sem fékk það með inndælingu í bláæð ($p = 0,0124$). Taugakvilli af ≥ 3 . stigi kom fyrir hjá 6% sjúklinga í meðferðarhópnum sem fékk lyfið undir húð samanborið við 16% í meðferðarhópnum sem fékk lyfið í bláæð ($p = 0,0264$). Tíðni úttaugakvilla af öllum stigum, þar sem Bortezomib Hospira var gefið í bláæð, var lægri í sögulegu rannsóknunum á Bortezomib Hospira sem var gefið í bláæð samanborið við MMY-3021 rannsóknina.

Leggja skal taugafræðilegt mat á sjúklinga sem fá úttaugakvilla í fyrsta sinn eða versnandi úttaugakvilla og vera má að breyta þurfi skammti, meðferðaráætlun eða íkomuleið yfir í gjöf undir húð (sjá kafla 4.2). Taugakvilli hefur verið meðhöndlaður með stuðningsmeðferð og öðrum meðferðum.

Hafa skal í huga að fylgjast snemma og reglulega með einkennum meðferðartengds taugakvilla með taugafræðilegu mati hjá sjúklingum sem fá Bortezomib Hospira samhliða lyfjum sem vitað er að tengjast taugakvilla (t.d. thalidomíði) og íhuga skal viðeigandi skammtaminnkun eða stöðvun meðferðar.

Auk útlægs taugakvilla getur taugakvilli í ósjálfráða taugakerfinu valdið aukaverkunum, t.d. stöðubundnum lágþrýstingi og alvarlegri hægðatregðu með garnastíflu. Upplýsingar um taugakvilla í ósjálfráða taugakerfinu og hvaða áhrif hann hefur með tilliti til þessara aukaverkana eru takmarkaðar.

Flog

Í sjaldgæfum tilvikum hefur verið greint frá flogum hjá sjúklingum sem ekki hafa sögu um flog eða flogaveiki. Sérstakrar varúðar þarf að gæta þegar verið er að meðhöndla sjúklinga með einhverja áhættuþætti floga.

Lágþrýstingur

Algennt er að meðferð með Bortezomib Hospira tengist réttstöðu-/stöðubundnum lágþrýstingi. Flestar aukaverkanir eru vægar til í meðallagi alvarlegar og koma fram allan meðferðartímann. Sjúklingar, sem fengu réttstöðubundinn lágþrýsting meðan á meðferð með Bortezomib Hospira (gefið með inndælingu í bláæð) stóð, höfðu engin merki um réttstöðubundinn lágþrýsting fyrir meðferð með Bortezomib Hospira. Flestir sjúklingar þurftu meðferð við réttstöðubundna lágþrýstingnum. Lítill hluti sjúklinga með réttstöðubundinn lágþrýsting fann fyrir aðsvifum. Réttstöðu-/stöðubundinn lágþrýstingur kom ekki fram í beinu framhaldi af Bortezomib Hospira innrennsli. Ekki er þekkt hvað liggur að baki þessari aukaverkun þótt einn þátturinn geti verið vegna taugakvilla í ósjálfráða taugakerfinu. Kvilli í ósjálfráða taugakerfinu getur tengst bortezomibi eða að bortezomib getur gert undirliggjandi ástand verra, svo sem sykursýkis- eða mýlildistaugakvilla. Gæta skal varúðar við meðferð sjúklinga með sögu um yfirlið sem fá lyf sem vitað er að tengjast lágþrýstingi eða sem eru með vessaþurrð vegna endurtekens niðurgangs eða uppkasta. Meðhöndlun réttstöðu-/stöðubundins lágþrýstings getur falið í sér breytingar á skömmtum blóðþrýstingslyfja, vökvagjöf eða gjöf saltstera og/eða adrenergískra lyfja. Leiðbeina á sjúklingum um að leita læknis ef þeir finna fyrir einkennum á borð við sundl, vægan svima eða yfirlið.

Afturkræft aftara heilakvillaheilkenni (Posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES))

Greint hefur verið frá afturkræfu aftara heilakvillaheilkenni hjá sjúklingum sem fá Bortezomib Hospira. Afturkræft aftara heilakvillaheilkenni er ástand með einkennum frá taugakerfi sem er mjög sjaldgæft, oft afturkræft og þróast hratt. Því geta fylgt flog, háþrýstingur, höfuðverkur, svefnhöfði, rugl, blindi og fleiri truflanir á sjón og í taugakerfi. Myndgreining af heila, einkum segulómun (MRI), er notuð til að staðfesta greininguna. Stöðva skal notkun Bortezomib Hospira hjá sjúklingum sem fá afturkræft aftara heilakvillaheilkenni.

Hjartabilun

Greint hefur verið frá bráðri hjartabilun eða versnun hennar og/eða nýjum tilvikum minnkaðs útfallsbrots vinstri slegils hjá sjúklingum meðan á meðferð með bortezomibi stóð. Vökvassöfnun getur aukið líkur á einkennum hjartabilunar. Fylgjast skal náið með sjúklingum sem eru með hjartasjúkdóm eða áhættuþætti hjartasjúkdóma.

Rannsóknir á hjartalínuriti

Komið hafa fram einstaka tilvik lengingar QT-bils í klínískum rannsóknum en ekki hefur verið sýnt fram á orsakasamband.

Lungnakvillar

Greint hefur verið frá mjög sjaldgæfum tilvikum bráðrar, dreifðrar lungnaíferðar af óþekktum orsökum, t.d. lungnabólgu, millivefslungnabólgu, lungnaíferð og brátt andnaðarheilkenni (acute respiratory distress syndrome [ARDS]) hjá sjúklingum í meðferð með Bortezomib Hospira (sjá kafla 4.8). Sum þessara tilvika hafa reynst banvæn. Mælt er með að röntgenmynd af brjósti sé tekin fyrir meðferð til að nota sem grunnviðmið fyrir hugsanlegar breytingar sem verða á lungum eftir meðferð.

Komi fram ný einkennum eða versnun einkenna lungnasjúkdóms (t.d. hósti, mæði) skal tafarlaust fara fram sjúkdómsgreining og sjúklingarnir meðhöndlaðir í samræmi við hana. Meta skal ávinning og áhættu áður en meðferð með Bortezomib Hospira er haldið áfram.

Í klínískri rannsókn dóu tveir sjúklingar (af tveimur) úr bráðu andnaðarheilkenni snemma í meðferð þar sem þeir fengu háskammta cytarabin (2 g/m^2 á sólarhring), sem gefið var með samfelldu innrennsli á 24 klst. samhliða daunorubicini og Bortezomib Hospira, við endurkomnu bráðu kyrningahvítblæði, og rannsókninni var hætt. Því er ekki mælt með þessari tilteknu skömmtun samhliða háskammta cytarabini (2 g/m^2 á sólarhring) sem gefið er með samfelldu innrennsli á 24 klst.

Skert nýrnastarfsemi

Fylgikvillar í nýrum eru tíðir hjá sjúklingum með mergæxli. Fylgjast skal náið með sjúklingum með skerta nýrnastarfsemi (sjá kafla 4.2 og 5.2).

Skert lifrastarfsemi

Bortezomib er umbrotið af lifrarensímum. Útsetning fyrir bortezomibi eykst hjá sjúklingum með í meðallagi mikið eða verulega skerta lifrastarfsemi. Meðhöndla skal þessa sjúklinga með minni skömmtum af Bortezomib Hospira og fylgjast vel með eiturverkunum (sjá kafla 4.2 og 5.2).

Áhrif á lifur

Greint hefur verið frá mjög sjaldgæfum tilvikum lifrabilunar hjá sjúklingum sem fengu Bortezomib Hospira samhliða öðrum lyfjum og voru með undirliggjandi alvarlega sjúkdóma. Aðrar aukaverkanir á lifur, sem greint hefur verið frá, eru aukning á lifrarensímum, gallrauðadreyri og lifrabólga. Slíkar breytingar gætu gengið til baka þegar notkun bortezomibs er hætt (sjá kafla 4.8).

Æxlislýsuheilkenni

Vegna þess að bortezomib er frumuskemmandi lyf og getur dregið illkynja plasmafrumur og möttulfrumu eitlaæxlisfrumur hratt, geta fylgikvillar æxlislýsuheilkennis komið fram. Sjúklingar, sem eiga á hættu að fá æxlislýsuheilkenni, eru þeir sem eru með mikla æxlisbyrði fyrir meðferð. Fylgjast þarf vel með þessum sjúklingum og gera viðeigandi ráðstafanir.

Lyf sem notuð eru samhliða

Fylgjast skal vandlega með sjúklingum sem fá bortezomib ásamt öflugum CYP3A4-hemlum. Gæta skal varúðar þegar bortezomib er gefið ásamt hvarfefnum CYP3A4 eða CYP2C19 (sjá kafla 4.5).

Staðfesta skal eðlilega lifrastarfsemi og gæta skal varúðar hjá sjúklingum sem fá blóðsykurslækkandi lyf til inntöku (sjá kafla 4.5).

Möguleg viðbrögð fyrir tilstilli ónæmisfléttna

Greint hefur verið frá sjaldgæfum tilvikum viðbragða sem mögulega voru vegna ónæmisfléttna, t.d. viðbrögðum sem líkjast sermissótt, fjölíðagigt með útbrotum og gauklabólgu með frumufjölgun. Ef alvarleg viðbrögð koma fram skal hætta notkun bortezomibs.

4.5 Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir

In vitro rannsóknir benda til þess að bortezomib sé vægur hemill cytókróm P450 (CYP) ísóensímanna 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 og 3A4. Á grundvelli þess hve CYP2D6 hefur lítil áhrif (7%) á umbrot bortezomibs er ekki búist við að svipgerð CYP2D6 með lítil umbrot hafi áhrif á heildardreifingu og -brothvarf (disposition) bortezomibs.

Í rannsókn á lyfjamilliverkunum þar sem metin voru áhrif ketoconazols, öflugs CYP3A4-hemils, á lyfjahvörf bortezomibs (gefið með inndælingu í bláæð), var sýnt fram á 35% meðalaukningu á AUC fyrir bortezomib ($\text{CI}_{90\%}$ [1,032 til 1,772]), byggt á gögnum um 12 sjúklinga. Því skal fylgjast vandlega með sjúklingum sem fá bortezomib ásamt öflugum CYP3A4-hemlum (t.d. ketoconazol, ritonavir).

Í rannsókn á lyfjamilliverkunum þar sem metin voru áhrif omeprazols, öflugs CYP2C19-hemils, á lyfjahvörf bortezomibs (gefið með inndælingu í bláæð), var ekki sýnt fram á marktæk áhrif á lyfjahvörf bortezomibs, byggt á gögnum um 17 sjúklinga.

Í rannsókn á lyfjamilliverkunum þar sem metin voru áhrif rifampicins, öflugs CYP3A4-örva, á lyfjahvörf bortezomibs (gefið með inndælingu í bláæð), var sýnt fram á 45% meðallækkun á AUC fyrir bortezomib, byggt á gögnum um 6 sjúklinga. Því er ekki ráðlagt að nota bortezomib samhliða öflugum CYP3A4-örvum (t.d. rifampicin, carbamazepin, phenytoin, phenobarbital og jóhannesarjurt (*Hypericum perforatum*)) þar sem verkunin getur minnkað.

Í sömu rannsókn á lyfjamilliverkunum þar sem metin voru áhrif dexametasons, vægari CYP3A4-örva, á lyfjahvörf bortezomibs (gefið með inndælingu í bláæð), var ekki sýnt fram á marktæk áhrif á lyfjahvörf bortezomibs, byggt á gögnum um 7 sjúklinga.

Í rannsókn á lyfjamilliverkunum, sem er byggð á gögnum um 21 sjúkling, þar sem áhrif melfalansprednisóns á lyfjahvörf bortezomibs (gefið með inndælingu í bláæð) voru metin, var sýnt fram á 17% hækkun á meðaltali AUC fyrir bortezomib. Þessar upplýsingar eru ekki taldar skipta máli klínískt.

Meðan á klínískum rannsóknum stóð var tilkynnt um sjaldgæf tilvik blóðsykurslækkunar og algeng tilvik blóðsykurshækkunar hjá sykursýkisjúklingum sem fengu blóðsykurslækkandi lyf til inntöku. Sjúklingar á sykursýkislyfjum til inntöku, sem fá meðferð með Bortezomib Hospira, geta þurft náið eftirlit með blóðsykursgildum og skammtastillingu sykursýkislyfja.

4.6 Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf

Getnaðarvarnir fyrir karla og konur

Vegna mögulegra eiturverkana á erfðafni af völdum bortezomibs (sjá kafla 5.3) þurfa konur sem geta orðið þungaðar að nota örugga getnaðarvörn og forðast þungun meðan á meðferð með bortezomib stendur og í 8 mánuði eftir að henni lýkur. Karlkyns sjúklingar skulu nota örugga getnaðarvörn og þeim skal ráðlagt að geta ekki börn meðan á notkun bortezomib stendur og í 5 mánuði eftir að meðferð lýkur (sjá kafla 5.3).

Meðganga

Engar klínískar upplýsingar eru fyrirbyggjandi um bortezomib varðandi útsetningu á meðgöngu. Vansköpunaráhrif bortezomibs hafa ekki verið rannsökuð að fullu.

Í rannsóknum, sem ekki voru klínískar, hafði bortezomib engin áhrif á þroska fósturvísa/fóstra í rottum og kaninum við stærstu skammta sem móðirin þoldi. Dýrannsóknir til að ganga úr skugga um áhrif bortezomibs í fæðingu og á þroska eftir fæðingu voru ekki gerðar (sjá kafla 5.3). Ekki má nota Bortezomib Hospira á meðgöngu nema meðferð með Bortezomib Hospira sé nauðsynleg vegna sjúkdómsástands konunnar.

Ef Bortezomib Hospira er notað á meðgöngu eða ef kona verður þunguð meðan hún fær lyfið, skal gera henni kunnugt um hugsanlega áhættu fyrir fóstrið.

Thalidomíð er þekkt vansköpunarvaldandi virkt efni hjá mönnum sem veldur alvarlegum lífshættulegum fæðingargöllum. Ekki má nota thalidomíð á meðgöngu eða handa konum sem geta orðið þungaðar nema öll skilyrði áætlunarinnar um að koma í veg fyrir þungun („*thalidomide pregnancy prevention*“) séu uppfyllt. Sjúklingar sem fá Bortezomib Hospira samhliða thalidomíði eiga að fylgja áætluninni fyrir thalidomíð til að koma í veg fyrir þungun. Vísað er í frekari upplýsingar í samantekt á eiginleikum lyfs fyrir thalidomíð.

Brjóstagjöf

Ekki er þekkt hvort bortezomib skilst út í brjóstamjólk. Vegna möguleika á alvarlegum aukaverkunum af völdum Bortezomib Hospira hjá brjóstmylkingum skal hætta brjóstagjöf meðan á meðferð með Bortezomib Hospira stendur.

Frjósemi

Ekki hafa verið gerðar rannsóknir á frjósemi með Bortezomib Hospira (sjá kafla 5.3). Vegna mögulegra eiturvekana á erfðaeðni af völdum bortezomibs (sjá kafla 5.3) skulu karlkyns sjúklingar leita ráða varðandi varðveislu sæðis og konur sem geta orðið þungaðar skulu fá ráðgjöf varðandi frystingu eggfrumna áður en meðferð er hafin.

4.7 Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla

Bortezomib Hospira getur haft væg áhrif á hæfni til aksturs eða notkunar véla. Bortezomib Hospira getur tengst þreytu, mjög algengt; sundli, algengt; yfirliði, sjaldgæft; og réttstöðu-/stöðubundum lágrýstingi eða þokusýn, algengt. Því verða sjúklingar að sýna aðgæslu við akstur og stjórnun véla og skal ráðleggja þeim að aka ekki eða stjórna vélum ef þeir finna fyrir þessum einkennum (sjá kafla 4.8).

4.8 Aukaverkanir

Samantekt á öryggi

Alvarlegar sjaldgæfar aukaverkanir, sem greint hefur verið frá við notkun Bortezomib Hospira, eru m.a. hjartabilun, æxlislýsuheilkenni, lungnaháþrýstingur, áfturkræft aftara heilakvillaheilkenni, bráð dreifð lungnaferð og í mjög sjaldgæfum tilvikum taugakvilli í ósjálfráða taugakerfinu.

Algengustu aukaverkanirnar, sem greint hefur verið frá við notkun Bortezomib Hospira, eru ógleði, niðurgangur, hægðatregða, uppköst, þreyta, sótthiti, blóðflagnafæð, blóðleysi, dauðkyrningafæð, útlægur taugakvilli (þ.á m. skyntaugakvilli), höfuðverkur, náladoði, minni matarlyst, mæði, útbrot, ristill og vöðvaverkir.

Aukaverkanir í töflu

Mergæxli

Rannsakendur töldu eftirtaldir aukaverkanir í töflu 7 hafa a.m.k. hugsanleg eða líkleg orsakatengsl við Bortezomib Hospira. Þessar aukaverkanir eru byggðar á samantekt upplýsinga um 5.476 sjúklinga, en af þeim voru 3.996 sjúklingar meðhöndlaðir með Bortezomib Hospira 1,3 mg/m², og eru þær taldar upp í töflu 7. Í heildina var Bortezomib Hospira notað til meðferðar við mergæxli hjá 3.974 sjúklingum.

Aukaverkanir eru taldar upp hér að aftan og flokkaðar eftir líffærum og tíðni. Tíðniskilgreiningar: Mjög algengar ($\geq 1/10$); algengar ($\geq 1/100$ til $< 1/10$); sjaldgæfar ($\geq 1/1.000$ til $< 1/100$); mjög sjaldgæfar ($\geq 1/10.000$ til $< 1/1.000$); koma örsjaldan fyrir ($< 1/10.000$); tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum). Innan tíðniflokka eru alvarlegustu aukaverkanirnar taldar upp fyrst. Notuð var útgáfa 14.1 af MedDRA við gerð töflu 7.

Einnig eru meðtaldir aukaverkanir sem ekki komu fram í klínískum rannsóknum en greint hefur verið frá eftir markaðssetningu lyfsins.

Tafla 7: Aukaverkanir hjá sjúklingum með mergæxli sem meðhöndlaðir voru með bortezomibi í klínískum rannsóknum og allar aukaverkanir eftir markaðssetningu, óháð ábendingu[#].

Líffæraflokkur	Tíðni	Aukaverkun
Sýkingar af völdum sýkla og sníkjudýra	Algengar	Ristill (þ.m.t. útbreiddur og í augum), lungnabólga*, herpes simplex*, sveppasýking*
	Sjaldgæfar	Sýking*, bakteríusýkingar*, veirusýkingar*, sýklasótt (þ.m.t. sýklasóttarlost)*, berkjulungnabólga, herpes veirusýking*, heilahimnu- og heilabólga vegna herpes veirusýkingar [#] , bakteríur í blóði (þ.m.t. stafýlókokkar), vogrís (hordeolum), influensa, húðnetjubólga, sýking sem tengist búnaði, sýking í húð*, sýking í eyra*, stafýlókokkasýking, sýking í töm*
	Mjög sjaldgæfar	Heilahimnubólga (þ.m.t. vegna bakteríusýkingar), Epstein-Barr veirusýking, kynfæraáblástur, eitlubólga (tonsillitis), stikilbólga (mastoiditis), þreytuheilkenni eftir veirusýkingu
Æxli, góðkynja, illkynja og óskilgreind (einnig blöðrur og separ)	Mjög sjaldgæfar	Illkynja æxli, plasmafrumuhvítblæði (leukaemia plasmacytic), nýrnafrumukrabbamein, fyrirferð, húð-eitilvefjaæxli (mycosis fungoides), góðkynja æxli*
Blóð og eitlar	Mjög algengar	Blóðflagnafæð*, daufkýrningafæð*, blóðleysi*
	Algengar	Hvítfrumnafæð*, eitilfrumnafæð*
	Sjaldgæfar	Blóðfrumnafæð*, daufkýrningafæð með hita, blóðstorkukvilli*, hvítfrumnafjölgun*, eitlakvilli, rauðalosblóðleysi [#]
	Mjög sjaldgæfar	Dreifð blóðstorkun (disseminated intravascular coagulation), blóðflagnafjölgun*, heilkenni ofseigju (hyperviscosity syndrome), blóðflagnakvilli sem ekki er nánara skilgreindur, segasmáæðakvilli (þ.m.t. blóðflagnafæðarpurpur) [#] , röskun á blóðmynd sem ekki er nánara skilgreind, blæðingarhneigð, íferð eitilfrumna
Ónæmiskerfi	Sjaldgæfar	Ofnæmisþjágur [#] , ofnæmi*
	Mjög sjaldgæfar	Ofnæmislost, mýlildi, teg. III viðbrögð vegna ónæmisfléttna (type III immune complex mediated reaction)
Innkirtlar	Sjaldgæfar	Cushing's heilkenni*, ofvirkni skjaldkirtils*, óviðeigandi seyting þvagstemma
	Mjög sjaldgæfar	Vanvirkni skjaldkirtils
Efnaskipti og næring	Mjög algengar	Minnkuð matarlyst
	Algengar	Vökvaskortur, blóðkalíumlækkun*, blóðnatríumlækkun*, óeðlileg blóðsykursgildi*, blóðkalsíumlækkun*, ensím óeðlileg*
	Sjaldgæfar	Æxlislýsuheilkenni, vanþrif*, blóðmagnesiumlækkun*, blóðfosfatlækkun*, blóðkalíumhækkun*, blóðkalsíumhækkun*, blóðnatríumhækkun*, óeðlileg gildi þvagsýru*, sykursýki*, vökvasöfnun
	Mjög sjaldgæfar	Blóðmagnesiumhækkun*, blóðsýring, blóðsaltaójafnvægi*, vökvaóhóf, blóðklóríðlækkun*, blóðþurrð, blóðklóríðhækkun*, blóðfosfathækkun*, efnaskiptaröskun, allsherjar B vítamínskortur, B12 vítamínskortur, þvagsýrugigt, aukin matarlyst, óþol fyrir alkóhóli

Líffæraflokkur	Tíðni	Aukaverkun
Geðræn vandamál	Algengar	Lyndisraskanir og -truflanir*, kvíðaröskun*, svefnraskanir og -truflanir*
	Sjaldgæfar	Geðsjúkdómur*, ofskynjun*, geðrof*, ringlun*, eirðarleysi
	Mjög sjaldgæfar	Sjálfsvígshugleiðingar*, aðlögunarröskun, óráð, minnkuð kynhvöt
Taugakerfi	Mjög algengar	Taugakvillar*, útlægur skyntaugakvilli, tilfinningartruflun (dysaesthesia)*, taugaverkur*
	Algengar	Hreyfitaugakvilli*, meðvitundarmissir (þ.m.t. aðsvif), sundl*, bragðskynstruflun*, svefnhöfði, höfuðverkur*
	Sjaldgæfar	Skjálfti, útlægur skynhreyfitaugakvilli, hreyfingatregða*, truflun á samhæfingar- og jafnvægistjórn litla heila*, minnisleysi (ekki vitglöp)*, heilakvilli*, afturkræft aftara heilakvillaheilkenni [#] , eiturverkun á taugar, krampasjúkdómar*, verkur eftir ristil, taltruflun*, fótaóeirð, mígreni, settaugarbólga, truflun á athygli, óeðlileg viðbrögð*, truflun á lyktarskyni
	Mjög sjaldgæfar	Heilablæðing*, innankúpublæðing (þ.m.t. innanskúmsblæðing)*, heilabjúgur, skammvinn blóðþurrðarköst, dá, ójafnvægi í ósjálfráða taugakerfinu, taugakvilli í ósjálfráða taugakerfinu, heilalömun (Cranial palsy)*, lömun*, lömunarsnertur*, yfirliðstilfinning, heilastofnsheilkenni, truflanir á blóðflæði til heila, taugarótarskemmd, skynhreyfiofyrirbætur, þrýstingur á mænu (spinal cord compression), vitsmunaröskun sem ekki er skilgreind nánar, hreyfitruflun, kvilli í taugakerfi sem ekki er skilgreindur nánar, taugarótarbólga (radiculitis), slef, minnkuð vöðvaspenna, heilkenni bráðrar fjöltaugabólgu (Guillain-Barré heilkenni)*, afmylandi fjöltaugakvilli
Augu	Algengar	Augnbólga*, óeðlileg sjón*, tárubólga*
	Sjaldgæfar	Augnblæðing*, sýking í augnloki*, augnaþrymill [#] , hvarnabólga [#] , augnbólga*, tvísýni, augnþurrkur*, erting í auga*, augnverkur, aukin tármyndun, útferð úr auga
	Mjög sjaldgæfar	Sár á glæru*, útstæð augu (exophthalmos), sjónhimnubólga, sjónsviðseyða, augnkvilli (þ.m.t. í augnloki) sem er ekki nánara skilgreindur, áunnin tárakirtilsbólga, ljósfælni, sjúklingur sé ljósblossa (photopsia), sjóntaugarkvilli [#] , mismunandi stig sjónskerðingar (allt að blindu)*
Eyru og vöndurhús	Algengar	Svimi*
	Sjaldgæfar	Hljóðkvöl (þ.m.t. eyrnasuð)*, heyrnarskerðing (allt að og þ.m.t. heyrnarleysi), óþægindi í eyra*
Hjarta	Mjög sjaldgæfar	Eyrnablæðing, andartaugarbólga (vestibular neuronitis), eyrnakvilli sem er ekki nánara skilgreindur
	Sjaldgæfar	Gollurshússprenging [#] , hjarta- og öndunarstopp*, hjartatíf (þ.m.t. gáttatíf), hjartabilun (þ.m.t. vinstri og hægri slegilsbilun)*, hjartsláttaróregla*, hraðsláttur*, hjartsláttarónot, hjartaöng, gollurshússbólga (þ.m.t. gollurshússvökvi)*, hjartavöðvakvilli*, vanstarfsemi slegils*, hægsláttur
	Mjög sjaldgæfar	Gáttaflökt, hjartadrep*, gátta-slegla rof*, hjarta- og æðasjúkdómur (þ.m.t. hjartalost), Torsade de pointes, hvíkul hjartaöng, hjartalokukvillar*, kransæðabilun, sínusstöðvun (sinus arrest)

Líffæraflokkur	Tíðni	Aukaverkun
Æðar	Algengar	Lágþrýstingur*, stöðubundinn lágþrýstingur, háþrýstingur*
	Sjaldgæfar	Heilaslag [#] , djúþbláæðasegi*, blæðing*, segabláæðabólga (þ.m.t. yfirborðsbláæðabólga), blóðrásarbilun (þ.m.t. lost vegna minnkaðs blóðmagns), bláæðarbólga, andlitsroði*, margúll (þ.m.t. við nýra)*, lélegt blóðflæði í útlimum*, æðabólga, blóðsókn (þ.m.t. blóðsókn í auga (ocular hyperaemia))*
	Mjög sjaldgæfar	Útlægt segarek, sogæðabjúgur, fölvi, roði og verkir í útlimum (erythromelalgia), æðavíkkun, mislitun sem tengist bláæðum, skert blóðflæði í bláæðum
Öndunarfæri, brjósthol og miðmæti	Algengar	Mæði*, blóðnasir, sýking í efri/neðri öndunarvegi*, hósti*
	Sjaldgæfar	Lungnasegarek, fleiðruvökvi, lungnabjúgur (þ.m.t. bráður), blæðing í lungnablöðrum [#] , berkjukrampi, langvinn lungnateppa*, súrefnisskortur í blóði*, teppa í öndunarvegi*, súrefnisskortur, brjósthimnubólga*, hiksti, nefrennsli, raddtruflun, hvæsandi öndun
	Mjög sjaldgæfar	Öndunarbílun, heilkenni bráðrar andnauðar, öndunarstopp, loftbrjóst, samfall á lunga, lungnaháþrýstingur, blóðhósti, oföndun, leguandköf, lungnabólga, öndunarlýting (respiratory alkalosis), hröð öndun, bandvefsmýndun í lungum, berkjukvillar*, koltvísýringislækkun*, millivefslungnasjúkdómur, íferð í lunga, herpingur í koki, þurrkur í kverkum, aukin slímmyndun í efri öndunarvegi, erting í kverkum, hóstaheilkenni í efri öndunarvegi
Meltingarfæri	Mjög algengar	Ógleði og uppköst*, niðurgangur*, hægðatregða
	Algengar	Blæðing í meltingarvegi (þ.m.t. í slímhúð)*, meltingartuflanir, munnbólga*, þaninn kviður, verkur í munnkoki*, kviðverkur (þ.m.t. verkur í meltingarvegi og milta)*, kvilli í munni*, vindgangur
	Sjaldgæfar	Brisbólga (þ.m.t. langvinn)*, blóðuppköst, þroti á vörum*, teppa í meltingarvegi (þ.m.t. teppa í mjógirni, garnastifla)*, óþægindi í kvið, sáramyndun í munni*, garnabólga*, magabólga*, tannholdsblæðing, vélindabakflæðissjúkdómur*, ristilbólga (þ.m.t. vegna clostridium difficile)*, blóðþurrðaristilbólga [#] , bólga í meltingarvegi*, kyngingartregða, heilkenni ristilertingar, sjúkdómur í meltingarvegi sem ekki er nánar skilgreindur, skán á tungu, röskun á maga- og þarmahreyfingum*, munnvatnskirtilskvilli*
	Mjög sjaldgæfar	Bráð brisbólga, lífhimnubólga*, bjúgur á tungu*, kviðarholsvökvi, vélindabólga, varabólga, hægðaleki, spennuleysi í hringvöðva endaparms, hægðaköggull*, sáramyndun og rof í meltingarfærum*, ofholdgun tannholds, risaristill, útferð frá endaparmi, blöðrumyndun í munnkoki*, verkur í vör, tannholdsbólga, sprungur við endaparmsop, breyting á hægðavenjum, verkur í endaparmi, óeðlilegar hægðir
Lifur og gall	Algengar	Óeðlileg gildi lifrarensíma*
	Sjaldgæfar	Eiturverkun á lifur (þ.m.t. röskun á lifrarstarfsemi), lifrabólga*, gallteppa
	Mjög sjaldgæfar	Lifrabílun, lifrarstækkun, Budd-Chiari heilkenni, lifrabólga af völdum cytomegaloveiru, lifrablæðing, gallsteinar

Líffæraflokkur	Tíðni	Aukaverkun
Húð og undirhúð	Algengar	Útbrot*, kláði*, roði, húðþurrkur
	Sjaldgæfar	Regnbogaroðasótt, ofsakláði, bráður daufkyrningahúðsjúkdómur með hita (acute febrile neutrophilic dermatosis), eitrunarútþot, eitrunardrep í húðþekju [#] , Stevens-Johnson heilkenni [#] , húðbólga*, breyting á hári*, depilblæðingar, flekkblæðingar, sár á húð, purpuri, massi í húð*, psoriasis, ofsvitnun, nætursviti, legusár [#] , þrymlabólur*, blöðrur*, röskun á húðlit*
	Mjög sjaldgæfar	Húðviðbrögð, Jessner's eitiðfrumuiferð, handa- og fótahéilkenni (palmar-plantar erythrodysesthesia syndrome), blæðing undir húð, marmarahúð (livedo reticularis), hersli í húð, næbbar, ljósnæmisviðbrögð, flasa, kaldur sviti, húðkvilli sem er ekki nánar skilgreindur, blóðríkisroði, húðsár, naglakvilli
Stoðkerfi og bandvefur	Mjög algengar	Verkir í stoðkerfi og stoðvef*
	Algengar	Vöðvakrampar*, verkur í útlím, vöðvaslappleiki
	Sjaldgæfar	Vöðvakippir, liðbólga, liðagigt*, stíðleiki í liðum, vöðvakvillar*, þyngslatilfinning
	Mjög sjaldgæfar	Rákvöðvalýsa, heilkenni kjálkaiðsörskunar, fistill, vökvi í lið, verkur í kjálka, beinkvilli, sýkingar og bólgur í stoðkerfi og stoðvef*, hálahimnubelgur (synovial cyst)
Nýru og þvægfæri	Algengar	Skert nýrnastarfsemi*
	Sjaldgæfar	Bráð nýrnabilun, langvinn nýrnabilun*, þvægfærasýking*, einkenni frá þvægfærum*, blóð í þvagi*, þvægteppa, röskun á þvæglátum*, prótein í þvagi, blóðniturhækkun (azotaemia), þvægburrð*, óeðlilega tíð þvæglát
	Mjög sjaldgæfar	Erting í þvægbólðru
Æxlunarfæri og brjóst	Sjaldgæfar	Blæðing frá leggöngum, verkur í kynfærum*, rístruflun
	Mjög sjaldgæfar	Kvilli í eistum*, blöðruhálskirtilsbólga, brjóstakvilli hjá konum, viðkvæmni í eistalyppum, eistalyppbólga, verkur í grindarholi, sáramyndun á sköpum
Meðfætt og fjölskyldubundið/ arfgengt ástand	Mjög sjaldgæfar	Vanmyndun frumna, vansköpun á meltingarvegi, hreisturhúð
Almennar aukaverkanir og aukaverkanir á íkomustað	Mjög algengar	Hiti*, þreyta, þróttleysi
	Algengar	Bjúgur (þ.m.t. útlægur), hrollur, verkur*, lasleiki*
	Sjaldgæfar	Versnun almenns líkamlegs heilsufars*, bjúgur í andliti*, viðbrögð á stungustað*, slímhúðarkvilli*, brjóstverkur, truflun á göngulagi, kuldatilfinning, lyfið berst út fyrir æð*, fylgikvillar sem tengjast æðalegg*, breyting á þorsta*, óþægindi fyrir brjósti, tilfinning um breytingu á líkamshita*, verkur á stungustað*
	Mjög sjaldgæfar	Dauði (þ.m.t. skyndidauði), fjölliðfærabilun, blæðing á stungustað*, kviðslit (þ.m.t. þindarslit)*, truflun á gróanda*, bólga, bláæðabólga á stungustað*, viðkvæmni, sár, skapstygð, brjóstverkur sem ekki stafar frá hjarta, verkur við æðalegg, tilfinning um að aðskotahlutur sé til staðar

Líffæraflokkur	Tíðni	Aukaverkun
Rannsóknarniðurstöður	Algengar	Þyngdartap
	Sjaldgæfar	Bilirúbínhækkun í blóði*, óeðlilegar niðurstöður mælinga á próteini*, þyngdaraukning, óeðlilegar niðurstöður blóðrannsóknar*, hækkun á CRP (C-reactive protein)
	Mjög sjaldgæfar	Óeðlilegar niðurstöður mælinga á blóðgösum*, óeðlilegt hjartalínurit (þ.m.t. lenging QT-bils)*, INR gildi (international normalised ratio) óeðlilegt*, lækkað sýrustig í maga, aukin samloðun blóðflagna, troponin I hækkun, veirur og mótefni greinast*, óeðlilegar niðurstöður þvagrannsóknar*
Áverkar, eitranir og fylgikvillar aðgerðar	Sjaldgæfar	Fall, mar
	Mjög sjaldgæfar	Viðbrögð við blóðgjöf, beinbrot*, stífleiki*, áverkar í andliti, liðáverkar*, bruni [#] , svöðusár, verkur vegna aðgerðar, skaði vegna geislunar*
Skurðaðgerðir og aðrar aðgerðir	Mjög sjaldgæfar	Virkjun stóráttfrumna

* Á við um heiti þar sem fleiri en eitt heiti samkvæmt MedDRA flokkun er meðtalið

[#] Tilkyrningar eftir markaðssetningu, óháð ábendingu

Möttlufurmu eitlaæxli

Öryggi Bortezomib Hospira hjá 240 sjúklingum með möttlufurmu eitlaæxli (MCL) sem fengu Bortezomib Hospira 1,3 mg/m² í samsettri meðferð með rituximabi, cyclophosphamíði, doxorubicini og prednisóni (BR-CAP) samanborið við 242 sjúklinga sem fengu meðferð með rituximabi, cyclophosphamíði, doxorubicini, vincristini og prednisóni [R-CHOP] var tiltölulega sambærilegt við það sem sést hjá sjúklingum með mergæxli en helsta muninum er lýst hér á eftir. Viðbótar aukaverkanir sem komu fram og voru tengdar við notkun samsettrar meðferðar (BR-CAP) voru lifrabólgu B sýking (< 1%) og hjartavöðvablóðþurrð (1,3%). Svipuð tíðni þessara aukaverkana í báðum meðferðarhópum bendir til þess að aukaverkanirnar séu ekki eingöngu rekjanlegar til Bortezomib Hospira. Merkjannlegur munur hjá MCL sjúklingunum samanborið við sjúklinga í rannsóknunum á mergæxli var $\geq 5\%$ hærri tíðni aukaverkana á blóðmynd (daufkyrningafæð, blóðflagnafæð, hvítfrumnafæð, blóðleysi, eitilfrumnafæð), útlægs skyntaugakvilla, háþrýstings, hita, lungnabólgu, munnbólgu og breytinga á hári.

Aukaverkanir sem greindust með tíðni $\geq 1\%$, sambærilega eða hærri tíðni í BR-CAP hópnum og með að minnsta kosti hugsanleg eða líkleg orsaktengsl við lyfjasamsetningu BR-CAP hópsins eru taldar upp í töflu 8 hér á eftir. Einnig eru meðtaldar aukaverkanir sem komu fram í BR-CAP hópnum og rannsakendur töldu að hefðu að minnsta kosti hugsanleg eða líkleg orsaktengsl við Bortezomib Hospira út frá eldri gögnum í rannsóknunum á mergæxli.

Aukaverkanir eru taldar upp hér að aftan og flokkaðar eftir líffærum og tíðni. Tíðniskilgreiningar: Mjög algengar ($\geq 1/10$); algengar ($\geq 1/100$ til $< 1/10$); sjaldgæfar ($\geq 1/1.000$ til $< 1/100$); mjög sjaldgæfar ($\geq 1/10.000$ til $< 1/1.000$); koma örsjaldan fyrir ($< 1/10.000$); tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum). Innan tíðniflokka eru alvarlegustu aukaverkanirnar taldar upp fyrst. Notuð var útgáfa 16 af MedDRA við gerð töflu 8.

Tafla 8: Aukaverkanir hjá sjúklingum með möttulfrumu eitlaæxli sem fengu meðferð með BR-CAP í klínískri rannsókn.

Líffæraflokkur	Tíðni	Aukaverkun
Sýkingar af völdum sýkla og sníkjudýra	Mjög algengar	Lungnabólga*
	Algengar	Sýklasótt (þ.m.t. sýklasóttarlost) *, ristill (þ.m.t. útbreiddur og í augum), herpes veirusýking*, bakteríusýkingar*, sýking í efri/neðri öndunarvegi*, sveppasýking*, herpes simplex*
	Sjaldgæfar	Lifrabólgu B sýking*, berkjulungnabólga
Blóð og eitlar	Mjög algengar	Blóðflagnafæð*, daufkýrningafæð með hita, daufkýrningafæð*, hvítfrumnafæð*, blóðleysi*, eitilfrumnafæð*
	Sjaldgæfar	Blóðfrumnafæð*
Ónæmiskerfi	Algengar	Ofnæmi*
	Sjaldgæfar	Ofnæmisviðbrögð
Efnaskipti og næring	Mjög algengar	Minnkuð matarlyst
	Algengar	Blóðkalíumlækkun*, óeðlileg blóðsykursgildi*, blóðnatríumlækkun*, sykursýki*, vökvæðun
	Sjaldgæfar	Æxlislýsuheilkenni
Geðræn vandamál	Algengar	Svefnraskanir og truflanir*
Taugakerfi	Mjög algengar	Útlægur skyntaugakvilli, tilfinningatruflun (dysaesthesia)*, taugaverkur*
	Algengar	Taugakvillar*, hreyfitaugakvilli*, meðvitundarmissir (þ.m.t. aðsvif), heilakvilli*, útlægur skynhreyfitaugakvilli, sundl*, bragðskynstruflun*, taugakvilli í ósjálfráða taugakerfinu
	Sjaldgæfar	Ójafnvægi í ósjálfráða taugakerfinu
Augu	Algengar	Óeðlileg sjón*
Eyru og vöndurhús	Algengar	Hljóðkvöl (þ.m.t. eyrnasuð)*
	Sjaldgæfar	Svimi*, heyrnarskerðing (allt að og þ.m.t. heyrnarleysi)
Hjarta	Algengar	Hjartatíf (þ.m.t. gáttatíf), hjartsláttaróregla*, hjartabilun (þ.m.t. vinstri og hægri slegilsbilun)*, hjartavöðvablóðþurrð, vanstarfsemi slegils*
	Sjaldgæfar	Hjarta- og æðasjúkdómur (þ.m.t. hjartalost)
Æðar	Algengar	Háþrýstingur*, lágþrýstingur*, stöðubundinn lágþrýstingur
Öndunarfæri, brjósthol og miðmætti	Algengar	Mæði*, hósti*, hiksti
	Sjaldgæfar	Heilkenni bráðrar andnauðar, lungnasegarek, lungnabólga, lungnaháþrýstingur, lungnabjúgur (þ.m.t. bráður)
Meltingarfæri	Mjög algengar	Ógleði og uppköst*, niðurgangur*, munnbólga*, hægðatregða
	Algengar	Blæðing í meltingarvegi (þ.m.t. í slímhúð)*, þaninn kviður, meltingartruflanir, verkur í munnkoki*, magabólga*, sáramyndun í munni*, óþægindi í kvið, kyngingartregða, bólga í meltingarvegi*, kviðverkur (þ.m.t. verkur í meltingarvegi og milta)*, kvilli í munni*
	Sjaldgæfar	Ristilbólga (þ.m.t. vegna clostridium difficile)*
Lifur og gall	Algengar	Eiturverkun á lifur (þ.m.t. röskun á lifrarsarfsemi)
	Sjaldgæfar	Lifrabilun
Húð og undirhúð	Mjög algengar	Breyting á hári*
	Algengar	Kláði*, húðbólga*, útbrot*

Líffæraflokkur	Tíðni	Aukaverkun
Stoðkerfi og bandvefur	Algengar	Vöðvakrampar*, verkir í stoðkerfi og stoðvef*, verkur í útlím
Nýru og þvagfæri	Algengar	Þvagfærasýking*
Almennar aukaverkanir og aukaverkanir á íkomustað	Mjög algengar	Hiti*, þreyta, þróttleysi
	Algengar	Bjúgur (þ.m.t. útlægur), hrollur, viðbrögð á stungustað*, lasleiki*
Rannsóknarniðurstöður	Algengar	Bilirúbínhækkun í blóði*, óeðlilegar niðurstöður mælinga á próteini*, þyngdartap, þyngdaraukning

* Á við um heiti þar sem fleiri en eitt heiti samkvæmt MedDRA flokkun er meðtalið.

Lýsing á völdum aukaverkunar

Endurvirkjun herpes zoster-veiru

Mergæxli

Í B+M+P meðferðarhópnum fengu 26% sjúklinga fyrirbyggjandi meðferð með veirulyfjum. Tíðni *herpes zoster* hjá sjúklingum í B+M+P meðferðarhópnum var 17% hjá sjúklingum, sem fengu ekki fyrirbyggjandi meðferð með veirulyfjum, samanborið við 3% hjá sjúklingum sem fengu fyrirbyggjandi meðferð með veirulyfjum.

Möttulfrumu eitlaæxli

Fyrirbyggjandi meðferð með veirulyfjum var gefin 137 af 240 sjúklingum (57%) í BR-CAP hópnum. Tíðni ristils í BR-CAP hópnum var 10,7% hjá sjúklingum sem ekki fengu fyrirbyggjandi meðferð með veirulyfjum samanborið við 3,6% hjá sjúklingum sem fengu fyrirbyggjandi meðferð með veirulyfjum (sjá kafla 4.4).

Lifrabólgu B veirusýking og endurvirkjun veirunnar

Möttulfrumu eitlaæxli

Lifrabólgu B veirusýkingar sem leiddu til dauða komu fram hjá 0,8% (n=2) sjúklinga í meðferðarhópnum sem fékk ekki bortezomib (rituximab, cyclophosphamíð, doxorubicin, vincristin og prednisón; R-CHOP) og 0,4% (n=1) sjúklinga sem fengu Bortezomib Hospira í samsettri meðferð með rituximabi, cyclophosphamíði, doxorubicini og prednisóni (BR-CAP). Heildartíðni lifrabólgu B sýkinga var sambærileg hjá sjúklingum sem fengu meðferð með BR-CAP og sjúklingum sem fengu meðferð með R-CHOP (0,8% samanborið við 1,2%, talið í sömu röð).

Útlægur taugakvilla við samsetta meðferð

Mergæxli

Í rannsóknum þar sem bortezomib var gefið sem innleiðslumeðferð ásamt dexametasoni (rannsókn IFM-2005-01), og dexametasoni-thalidomíði (rannsókn MMY-3010), var tíðni útlægs taugakvilla við samsetta meðferð eins og fram kemur í töflunni hér fyrir neðan:

Tafla 9: Tíðni útlægs taugakvilla meðan á innleiðslumeðferð stóð, eftir stigi eiturvekana og stöðvun meðferðar vegna útlægs taugakvilla

	IFM-2005-01		MMY-3010	
	VDDx (N = 239)	BDx (N = 239)	TDx (N = 126)	BTdx (N = 130)
Tíðni PN (%)				
PN af öllum stigum	3	15	12	45
≥ stig 2 PN	1	10	2	31
≥ stig 3 PN	< 1	5	0	5
Stöðvun meðferðar vegna PN (%)	< 1	2	1	5

VDDx = vincristin, doxorubicin, dexametason; BDx = bortezomib, dexametason; TDx = thalidomíð, dexametason;

BTdx = bortezomib, thalidomíð, dexametason; PN = útlægur taugakvilli

Athugið: Útlægur taugakvilli fól í sér valin sjúkdómsheiti sem voru: útlægur taugakvilli, útlægur hreyfitaugakvilli, útlægur skyntaugakvilli og fjöltaugakvilli.

Möttlufurum eitlaæxli

Í rannsókn LYM-3002, þar sem bortezomib var gefið ásamt rituximabi, cyclophosphamíði, doxorubicini og prednisóni (R-CAP), kemur tíðni útlægs taugakvilla við samsetta meðferð fram í töflunni hér á eftir:

Tafla 10: Tíðni útlægs taugakvilla í rannsókn LYM-3002 eftir stigi eiturvekana og stöðvun meðferðar vegna útlægs taugakvilla

	BR-CAP (N = 240)	R-CHOP (N = 242)
Tíðni PN (%)		
PN af öllum stigum	30	29
≥ stig 2 PN	18	9
≥ stig 3 PN	8	4
Stöðvun meðferðar vegna PN (%)	2	< 1

BR-CAP = bortezomib, rituximab, cyclophosphamíð, doxorubicin og prednisón; R-CHOP = rituximab, cyclophosphamíð, doxorubicin, vincristin og prednisón; PN = útlægur taugakvilli

Útlægur taugakvilli fól í sér valin sjúkdómsheiti sem voru: útlægur skyntaugakvilli, útlægur taugakvilli, útlægur hreyfitaugakvilli og útlægur skynhreyfitaugakvilli.

Aldraðir sjúklingar með möttlufurum eitlaæxli

42,9% sjúklinga í BR-CAP hópnum var á aldrinum 65-74 ára og 10,4% var ≥ 75 ára. Þó að sjúklingar sem voru ≥ 75 ára höfðu verr bæði BR-CAP og R-CHOP, var tíðni alvarlegra aukaverkana í BR-CAP hópnum 68% samanborið við 42% í R-CHOP hópnum.

Eftirtektaverður munur á öryggi bortezomibs þegar það var gefið undir húð samanborið við í bláæð sem einlyfjameðferð

Hjá sjúklingum í III. stigs rannsókninni sem fengu bortezomib undir húð, samanborið við þá sem fengu lyfið í bláæð, var heildartíðni meðferðartengdra aukaverkana, sem voru af 3. stigi eða hærra stigi eiturvekana, 13% lægri og tíðni stöðvunar bortezomib meðferðar var 5% lægri. Heildartíðni niðurgangs, verkja í meltingarvegi og kvið, þröttleysisástands, sýkinga í efri öndunarvegi og úttaugakvilla var 12-15% lægri í hópnum sem fékk lyfið undir húð samanborið við hópinn sem fékk það í bláæð. Auk þess var tíðni 3. stigs eða hærra stigs úttaugakvilla 10% lægri og tíðni stöðvunar meðferðar vegna úttaugakvilla var 8% lægri í hópnum sem fékk lyfið undir húð samanborið við hópinn sem fékk það í bláæð.

Greint var frá staðbundnum aukaverkunum hjá 6% sjúklinga sem fengu lyfið undir húð, oftast roða. Að miðgildi 6 dagar liðu þangað til bati náðist, breyta þurfti skammti hjá tveimur sjúklingum. Tveir (1%) sjúklingar fengu slæm viðbrögð; 1 tilvik kláða og 1 tilvik roða.

Tíðni dauða á meðan meðferð stóð var 5% í meðferðarhópnum sem fékk lyfið undir húð og 7% í meðferðarhópnum sem fékk lyfið í bláæð. Tíðni dauða vegna „ágengi sjúkdóms“ var 18% í hópnum sem fékk lyfið undir húð og 9% í hópnum sem fékk lyfið í bláæð.

Endurmeðferð hjá sjúklingum við endurkomu mergæxlis

Í rannsókn þar sem 130 sjúklingum var gefin endurmeðferð með bortezomib við endurkomu mergæxlis, sem höfðu áður svarað að minnsta kosti að hluta til meðferð sem innihélt bortezomib, voru algengustu aukaverkanirnar af öllum alvarleikastigum sem komu fram hjá a.m.k. 25% sjúklinga blóðflagnafæð (55%), taugakvilli (40%), blóðleysi (37%), niðurgangur (35%) og hægðatregða (28%). Útlægur taugakvilli af öllum alvarleikastigum kom fram hjá 40% sjúklinga og útlægur taugakvilli $\geq$ stig 3 kom fram hjá 8,5% sjúklinga.

Tilkynning aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfinu

Eftir að lyf hefur fengið markaðsleyfi er mikilvægt að tilkynna aukaverkanir sem grunur er um að tengist því. Þannig er hægt að fylgjast stöðugt með sambandinu milli ávinnings og áhættu af notkun lyfsins. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist lyfinu samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá [Appendix V](#).

4.9 Ofskömmtnun

Hjá sjúklingum hefur ofskömmtnun, sem er meiri en tvöfaldur ráðlagður skammtur, verið tengd við bráð einkenni lágþrýstings og blóðflagnafæð sem leitt hefur til dauðsfalla. Upplýsingar um forklinískar lyfjafræðilegar rannsóknir á öryggi fyrir hjarta má finna í kafla 5.3.

Ekkert þekkt sértækt mótefni er til við ofskömmtnun bortezomibs. Komi til ofskömmtnunar skal fylgjast með lífsmörkum og veita viðeigandi stuðning til að viðhalda blóðþrýstingi (svo sem vökva, blóðþrýstingshækkandi lyf og/eða lyf sem breyta samdráttarkrafti hjartans) og líkamshita (sjá kafla 4.2 og 4.4).

5. LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

5.1 Lyfhrif

Flokkun eftir verkun: Æxlishefjandi lyf, önnur æxlishefjandi lyf, ATC flokkur: L01XG01.

Verkunarháttur

Bortezomib er próteasómhemill. Það er sérstaklega hannað til að hamla chymotrypsin-líkri virkni 26S-próteasómsins í frumum spendýra. 26S-próteasómið er stór próteinflétta sem brýtur niður ubiquitinmerkt prótein. Ubiquitin-próteasóm ferlið gegnir mikilvægu hlutverki í stjórnun endurnýjunar sértækra próteina og viðheldur þannig jafnvægi innan frumna. Hömlun á 26S-próteasóminu kemur í veg fyrir próteinsundrun sem stefnt var að og hefur áhrif á margþátta keðjuverkun boða innan frumunnar, sem að lokum veldur dauða krabbameinsfrumu.

Bortezomib er afar sértækt fyrir próteasómið. Við 10 míkromólm þéttu hamlar bortezomib ekki neinum af þeim fjölda viðtaka og próteasa, sem rannsakaðir voru við kembileit, og er meira en 1.500 sinnum sértækara fyrir próteasómið en fyrir næsta markensím. Lyfjahlvörf próteasómhömlunar voru metin *in vitro* og reyndist bortezomib klofna frá próteasóminu á helmingunartíma sem nam 20 mínútum, sem sýnir að próteasómhömlun fyrir tilstilli bortezomibs gengur til baka.

Próteasómhömlun fyrir tilstilli bortezomibs hefur margvísleg áhrif á krabbameinsfrumur, þar á meðal, en ekki eingöngu, með því að breyta stýripróteinum sem stjórna framvindu frumuférils og nuclear factor kappa B (NF- κ B) örvun. Hömlun próteasómsins veldur stöðvun á frumuférli og stýrðum frumudauða. NF- κ B er umritunarpáttur sem þarf að virkja til margra þátta æxlismyndunar, að meðtöldum frumuvexti og lifun, æðamyndun, frumumilliverkunum og meinvörpum. Í mergæxlum hefur bortezomib áhrif á hæfni mergæxlisfrumna til að milliverka við nánasta umhverfi beinmergs.

Í rannsóknum hefur verið sýnt fram á að bortezomib er frumudrepandi fyrir margs konar krabbameinsfrumugerðir og að krabbameinsfrumur eru viðkvæmari fyrir áhrifum stýrðs frumudauða próteasómhömlunar en eðlilegar frumur. Bortezomib dregur úr æxlisvexti *in vivo* í mörgum forklinískum æxlislíkönunum, þar á meðal mergæxli.

Gögn úr *in vitro* og *ex vivo* líkönum og dýralíkönunum með bortezomibi benda til þess að það auki sérhæfingu og virkni beinkímfrumna og hemji starfsemi beinætufrumna. Þessi áhrif hafa komið fram hjá sjúklingum með mergæxli sem einnig hafa langt genginn beineyðingarsjúkdóm og eru meðhöndlaðir með bortezomibi.

Klínísk verkun hjá sjúklingum með áður ómeðhöndlað mergæxli

Framsýn, alþjóðleg, slembiröðuð (1:1), opin, III. stigs klínísk rannsókn (MMY-3002 VISTA) á 682 sjúklingum var framkvæmd til að ákvarða hvort bortezomib ($1,3 \text{ mg/m}^2$ gefin með inndælingu í bláæð) ásamt melfalani (9 mg/m^2) og prednisóni (60 mg/m^2) leiddi til hægari framrásar sjúkdóms samanborið við melfalan (9 mg/m^2) og prednisón (60 mg/m^2) hjá sjúklingum með áður ómeðhöndlað mergæxli. Meðferð var gefin að hámarki í 9 meðferðarlotum (um það bil 54 vikur) og var hætt snemma ef um var að ræða versnun sjúkdóms eða óásættanlegar eiturverkanir. Miðgildi aldurs sjúklinganna í rannsókninni var 71 ár, 50% voru karlar, 88% af hvíta kynstofninum og miðgildi skors samkvæmt Karnofsky mælikvarða á færni var 80. Sjúklingar sem voru með IgG/IgA/léttkeðju mergæxli í 63%/25%/8% tilvika, miðgildi blóðrauða var 105 g/l og miðgildi blóðflagnafjölda $221,5 \times 10^9/l$. Svipað hlutfall sjúklinga var með kreatínínúthreinsun $\leq 30 \text{ ml/mín.}$ (3% í hvorum armi).

Þegar greining var gerð fyrir áður ákvarðað tímabil (pre-specified interim analysis) var fyrsta endapunktur, tíma að framrás sjúkdóms, náð og sjúklingum í B+M+P hópnum var boðin B+M+P meðferð. Miðgildi eftirfylgni var 16,3 mánuðir. Lokauppfærsla greiningar á lifun var gerð með 60,1 mánaðar miðgildi tímalengdar eftirfylgni. Sýnt var fram á að lifun var tölfræðilega marktækt hagstæðari hjá B+M+P meðferðarhópnum (áhættuhlutfall=0,695; $p=0,00043$) þrátt fyrir síðari meðferðir, þ.á.m. meðferðaráætlanir byggðar á bortezomibi. Miðgildi lifunar í B+M+P meðferðarhópnum var 56,4 mánuðir samanborið við 43,1 mánuðir í M+P meðferðarhópnum. Virkniniðurstöður er að finna í töflu 11:

Tafla 11: Virkniniðurstöður eftir lokauppfærslu með tilliti til lifunar í VISTA-rannsókninni

Endapunktur virkni	B+M+P n = 344	M+P n = 338
Tími að framrás sjúkdóms		
Tilfelli n (%)	101 (29)	152 (45)
Miðgildi ^a (95% CI)	20,7 mán. (17,6; 24,7)	15,0 mán. (14,1; 17,9)
Áhættuhlutfall ^b (95% CI)	0,54 (0,42; 0,70)	
p-gildi ^c	0,000002	
Lifun án framrásar sjúkdóms		
Tilfelli n (%)	135 (39)	190 (56)
Miðgildi ^a (95% CI)	18,3 mán. (16,6; 21,7)	14,0 mán. (11,1; 15,0)
Áhættuhlutfall ^b (95% CI)	0,61 (0,49; 0,76)	
p-gildi ^c	0,00001	

Endapunktur virkni	B+M+P n = 344	M+P n = 338
Heildarlifun*		
Tilfelli (dauði) n (%)	176 (51,2)	211 (62,4)
Miðgildi ^a (95% CI)	56,4 mán. (52,8; 60,9)	43,1 mán. (35,3; 48,3)
Áhættuhlutfall ^b (95% CI)	0,695 (0,567; 0,852)	
p- gildi ^c	0,00043	
Svarhlutfall		
Þýði ^e n = 668	n = 337	n = 331
CR ^f n (%)	102 (30)	12 (4)
PR ^f n (%)	136 (40)	103 (31)
nCR n (%)	5 (1)	0
CR+PR ^f n (%)	238 (71)	115 (35)
p-gildi ^d	<10 ⁻¹⁰	
Lækkun M-próteina í sermi		
Þýði ^g n = 667	n = 336	n = 331
≥ 90% n (%)	151 (45)	34 (10)
Tími að fyrstu svörun í CR + PR		
Miðgildi	1,4 mán.	4,2 mán.
Miðgildi svörunarlengdar		
CR ^f	24,0 mán.	12,8 mán.
CR+PR ^f	19,9 mán.	13,1 mán.
Tími að næstu meðferð		
Tilfelli n (%)	224 (65,1)	260 (76,9)
Miðgildi ^a (95% CI)	27,0 mán. (24,7; 31,1)	19,2 mán. (17,0; 21,0)
Áhættuhlutfall ^b (95% CI)	0,557 (0,462; 0,671)	
p-gildi ^c	<0,000001	

^a Kaplan-Meier mat

^b Mat á áhættuhlutfalli er byggt á Cox-hlutfallalíkani þar sem leiðrétt er fyrir lagskiptandi þáttum: β_2 -míkróglóbúlín, albúmín og svæði. Áhættuhlutfall minna en 1 gefur til kynna yfirburði VMP

^c Reiknað p-gildi byggt á lagskiptu log-rank prófi þar sem leiðrétt er fyrir lagskiptandi þáttum: β_2 -míkróglóbúlín, albúmín og svæði

^d p-gildi fyrir svarhlutfall (CR+PR) fengið með Cochran Mantel-Haenszel kí-kvaðrat prófi þar sem leiðrétt er fyrir lagskiptandi þáttum

^e Svörunarþýði nær yfir sjúklinga sem höfðu mælanlegan sjúkdóm í upphafi

^f CR = fullnaðarsvörun (complete response), PR = hlutasvörun (partial response). EBMT viðmið

^g Allir slembíraðaðir sjúklingar með seytingarsjúkdóm

* Uppfærð lifun byggð á miðgildi tímalengdar eftirfylgni sem var 60,1 mánuðir

mán.: mánuðir

CI = öryggisbil (confidence interval)

Sjúklingar sem hentar ígræðsla stofnfrumna

Tvær slembaðar, opnar, fjölsetra III. stigs rannsóknir (IFM-2005-01, MMY-3010) voru gerðar til að sýna fram á öryggi og verkun bortezomib í tveggja og þriggja lyfja samsetningum með öðrum krabbameinslyfjum, sem innleiðslumeðferð fyrir ígræðslu stofnfrumna hjá sjúklingum með áður ómeðhöndlað mergæxli.

Í rannsókn IFM-2005-01 var bortezomib í samsettri meðferð með dexametasoni [BDx, n = 240] borið saman við meðferð með vincristini- doxorubicini-dexametasoni [VDDx, n = 242]. Sjúklingarnir í BDx hópnun fengu fjórar 21 dags meðferðarlotur, sem hver fyrir sig samanstóð af bortezomib (1,3 mg/m² gefið í bláæð tvisvar í viku á 1., 4., 8. og 11. degi) og dexametasoni til inntöku (40 mg/dag á 1. til 4. dags og 9. til 12. dags, í 1. og 2. lotu, og á 1. til 4. dags í 3 og 4. lotu).

Samgena stofnfrumuígræðsla var gerð hjá 198 (82%) sjúklingum í VDDx hópnum og 208 (87%) sjúklingum í BDx hópnum. Meirihluti sjúklinganna gekkst undir eina staka ígræðslu. Lýðfræðilegar breytur og sjúkdómsbreytur við grunnlínu voru svipaðar í meðferðarhópnum. Miðgildi aldurs sjúklinganna í rannsókninni var 57 ár, 55% voru karlar og 48% sjúklinganna voru frumuerfðafræðilega séð í mikilli áhættu. Miðgildi meðferðartíma var 13 vikur í VDDx hópnum og 11 vikur í BDx hópnum. Miðgildi fjölda meðferðarlota í báðum hópnum var 4 lotur.

Aðalendapunktur verkunar var svarhlutfall eftir innleiðslu (CR+nCR). Tölfræðilega marktækur munur á CR+nCR kom fram sem var í hag hópnum sem fékk samsetta meðferð með bortezomib ásamt dexametasoni. Aukaendapunktur verkunar voru m.a. svarhlutföll eftir innleiðslu (CR+nCR, CR+nCR+VGPR+PR), lifun án versnunar sjúkdóms og heildarlifun. Helstu niðurstöður varðandi verkun er að finna í töflu 12.

Tafla 12: Niðurstöður varðandi verkun í rannsókn IFM-2005-01

Endapunktur	BDx N = 240 (ITT sjúklingahópur)	VDDx N = 242 (ITT sjúklingahópur)	OR; 95% CI; P-gildi ^a
IFM-2005-01			
<i>Svarhlutfall (eftir innleiðslu)</i>			
*CR+nCR	14,6 (10,4; 19,7)	6,2 (3,5; 10,0)	2,58 (1,37; 4,85); 0,003
CR+nCR+VGPR+PR % (95% CI)	77,1 (71,2; 82,2)	60,7 (54,3; 66,9)	2,18 (1,46; 3,24); < 0,001
<i>Svarhlutfall (eftir ígræðslu)^b</i>			
CR+nCR	37,5 (31,4; 44,0)	23,1 (18,0; 29,0)	1,98 (1,33; 2,95); 0,001
CR+nCR+VGPR+PR % (95% CI)	79,6 (73,9; 84,5)	74,4 (68,4; 79,8)	1,34 (0,87; 2,05); 0,179

CI = öryggisbil; CR = fullnaðarsvör; nCR = nálægt fullnaðarsvör; ITT = sem á að meðhöndla (intent to treat);

B = bortezomib; BDx = bortezomib, dexametason; VDDx = vincristin, doxorubicin, dexametason; VGPR = mjög góð hlutasvör; PR = hlutasvör; OR = líkindahlutfall

* Aðalendapunktur

^a OR fyrir svörnarhlutföll byggt á Mantel-Haenszel áætlun á almennu líkindahlutfalli fyrir lagskiptar töflur; p-gildi fengin með Cochran Mantel-Haenszel prófi.

^b Vísar til svarhlutfalls eftir aðra ígræðslu hjá sjúklingum sem fengu aðra ígræðslu (42/240 [18%] í BDx hópnum og 52/242 [21%] í VDDx hópnum).

Athugið: OR > 1 bendir til þess að innleiðslumeðferð með bortezomib sé hagstæðari.

Í rannsókn MMY-3010 var gerður samanburður á samsettri innleiðslumeðferð með bortezomibi ásamt thalidomíði og dexametasoni [BTDx, n=130] og meðferð með thalidomíði-dexametasoni [TDx, n=127]. Sjúklingarnir í BTDx hópnum fengu sex 4-vikna meðferðarlotur, sem hver fyrir sig samanstóð af bortezomibi (1,3 mg/m² gefið tvisvar í viku á 1., 4., 8. og 11. degi, með 17 daga hvíldartímabili frá 12. degi til 28. dags), dexametasoni (40 mg til inntöku á 1. til 4. degi og 8. til 11. degi) og thalidomíði (til inntöku 50 mg daglega á 1.-14. degi, skammtahækkun í 100 mg á 15.-28. degi og eftir það í 200 mg daglega).

Ein stök samgena stofnfrumuígræðsla var gerð hjá 105 (81%) sjúklingum í BTDx hópnum og 78 (61%) sjúklingum í TDx hópnum. Lýðfræðilegar breytur og sjúkdómsbreytur við grunnlínu voru svipaðar í meðferðarhópnum. Hjá BTDx og TDx hópnum, talið í sömu röð, var miðgildi aldurs 57 á móti 56 ár, 99% á móti 98% sjúklinga voru af hvíta kynstofninum og 58% á móti 54% voru karlar. Í BTDx hópnum voru 12% sjúklinga frumuerfðafræðilega séð skilgreindir í mikilli áhættu á móti 16% sjúklinga í TDx hópnum. Miðgildi meðferðartíma var 24,0 vikur og miðgildi fjölda meðferðarlota var 6,0 og var það eins í báðum meðferðarhópnum.

Aðalendapunktur verkunar voru svarhlutföll eftir innleiðslu og eftir ígræðslu (CR+nCR). Tölfræðilega marktækur munur á CR+nCR kom fram sem var í hag hópnum sem fékk samsetta meðferð með

bortezomib ásamt dexametasoni og thalidomíði. Aukaendapunktur verkunar voru m.a. lifun án versunar sjúkdóms og heildarlifun. Helstu niðurstöður varðandi verkun er að finna í töflu 13.

Tafla 13: Niðurstöður varðandi verkun í rannsókn MMY-3010

Endapunktur	BTDx	TDx	OR; 95% CI; P-gildi ^a
MMY-3010	N = 130 (ITT sjúklingahópur)	N = 127 (ITT sjúklingahópur)	
<i>*Svarhlutfall (eftir innleiðslu)</i>			
CR+nCR	49,2 (40,4; 58,1)	17,3 (11,2; 25,0)	4,63 (2,61; 8,22); < 0,001 ^a
CR+nCR +PR % (95% CI)	84,6 (77,2; 90,3)	61,4 (52,4; 69,9)	3,46 (1,90; 6,27); < 0,001 ^a
<i>*Svarhlutfall (eftir ígræðslu)</i>			
CR+nCR	55,4 (46,4; 64,1)	34,6 (26,4; 43,6)	2,34 (1,42; 3,87); 0,001 ^a 2,66
CR+nCR +PR % (95% CI)	77,7 (69,6; 84,5)	56,7 (47,6; 65,5)	(1,55; 4,57); < 0,001 ^a

CI = öryggisbil; CR = fullnaðarsvör; nCR = nálægt fullnaðarsvör; ITT = sem á að meðhöndla (intent to treat); B = bortezomib; BTDx = bortezomib, thalidomíð, dexametason; TDx = thalidomíð, dexametason; PR = hlutasvör; OR = líkindahlutfall

* Aðalendapunktur

^a OR fyrir svörunarhlutföll byggt á Mantel-Haenszel áætlun á almennum líkindahlutfalli fyrir lagskiptar töflur; p-gildi fengin með Cochran Mantel-Haenszel prófi.

Athugið: OR > 1 bendir til þess að innleiðslumeðferð með bortezomibi sé hagstæðari.

Klínísk verkun hjá sjúklingum með endurtekið eða illviðráðanlegt mergæxli

Öryggi og verkun bortezomib (gefið með inndælingu í bláæð) var metin í 2 rannsóknum við ráðlagðan skammt 1,3 mg/m² í III. stigs, slembaðri, samanburðarrannsókn (APEX) með dexametasoni (Dex) á 669 sjúklingum með endurtekið eða illviðráðanlegt mergæxli sem höfðu fengið 1-3 meðferðartegundir og II. stigs rannsókn á einum hópi 202 sjúklinga með endurtekið eða illviðráðanlegt mergæxli, sem höfðu fengið minnst 2 meðferðartegundir og versnaði við síðustu meðferð.

Í III. stigs rannsókninni leiddi meðferð með bortezomib til marktækt lengri tíma fram að versnun, marktækt lengri lifunar og marktækt hærri svörunarhlutfalls samanborið við meðferð með dexametasoni (sjá töflu 14), hjá öllum sjúklingum sem og sjúklingum sem áður höfðu fengið 1 meðferðartegund. Vegna fyrirfram áætlaðrar milligreiningar, var dexametason-hópurinn stöðvaður samkvæmt ráðleggingum umsjónarnefndarinnar og öllum sjúklingum, sem var slembiráðað á dexametason, var síðan boðið bortezomib, óháð sjúkdómsástandi. Vegna þessarar snemmbæru víxlunar er miðgildi tímalengdar, vegna eftirlits á lifun sjúklinga, 8,3 mánuðir. Bæði hjá sjúklingum, sem fengu sjúkdóminn aftur eftir síðustu meðferð, og þeim sem ekki fengu sjúkdóminn aftur eftir síðustu meðferð, var heildarlifun marktækt lengri og svörunarhlutfall marktækt hærri í bortezomib hópnun.

Af 669 sjúklingum, sem tóku þátt, voru 245 (37%) 65 ára eða eldri. Svörunarbreytur sem og tími fram að versnun (TTP) héldust marktækt betri fyrir bortezomibi óháð aldri. Óháð grunnigildi β_2 -míkróglóbúlíns voru allar virknibreytur (tími fram að versnun og heildarlifun, sem og svörunarhlutfall) marktækt betri í bortezomib hópnun.

Í hópnun með illviðráðanlegan sjúkdóm í II. stigs rannsókninni var svörun ákvörðuð af óháðri unsagnarnefnd og svörunarviðmið voru þau sömu og hjá European Bone Marrow Transplant Group. Miðgildi lifunar allra sjúklinga, sem þátt tóku, var 17 mánuðir (á bilinu < 1 til 36+ mánuðir). Þessi lifun var hærri en það sex til níu mánaða miðgildi lifunar sem klínískir rannsóknarráðgjafar gera ráð fyrir að gildi um svipaðan sjúklingahóp. Með fjölbreytugreiningu var svörunartíðnin óháð gerð mergæxlis, líkamlegu ástandi sjúklings, hvort um var að ræða brottfellingu á æxlislitningi 13 eða fjölda og gerð fyrri meðferða. Hjá sjúklingum, sem höfðu fengið 2 til 3 fyrri meðferðartegundir, var svörunartíðnin 32% (10/32) og hjá sjúklingum, sem fengu meira en 7 fyrri meðferðartegundir, var svörunartíðnin 31% (21/67).

Tafla 14: Samantekt á útkomu sjúkdóms úr III. stigs (APEX) og II. stigs rannsóknum

	III. stig		III. stig		III. stig		II. stig
	Allir sjúklingar		1 fyrri meðferð		> 1 fyrri meðferð		≥ 2 fyrri meðferðir
Tímatengdir atburðir	B n=333 ^a	Dex n=336 ^a	B n=132 ^a	Dex n=119 ^a	B n=200 ^a	Dex n=217 ^a	B n=202 ^a
TTP, dagar [95% CI]	189 ^b [148; 211]	106 ^b [86; 128]	212 ^d [188; 267]	169 ^d [105; 191]	148 ^b [129; 192]	87 ^b [84; 107]	210 [154; 281]
1 árs lifun, % [95% CI]	80 ^d [74;85]	66 ^d [59;72]	89 ^d [82;95]	72 ^d [62;83]	73 [64;82]	62 [53;71]	60
Besta svörun (%)	B n=315 ^c	Dex n=312 ^c	B n=128	Dex n=110	B n=187	Dex n=202	B n=193
CR	20 (6) ^b	2 (<1) ^b	8 (6)	2 (2)	12 (6)	0 (0)	(4)**
CR+nCR	41 (13) ^b	5 (2) ^b	16 (13)	4 (4)	25 (13)	1 (<1)	(10)**
CR+nCR+PR	121 (38) ^b	56 (18) ^b	57 (45) ^d	29 (26) ^d	64 (34) ^b	27 (13) ^b	(27)**
CR+nCR+PR+MR	146 (46)	108 (35)	66 (52)	45 (41)	80 (43)	63 (31)	(35)**
Miðgildi tímalengdar Dagar (mánuðir)	242 (8,0)	169 (5,6)	246 (8,1)	189 (6,2)	238 (7,8)	126 (4,1)	385*
Tími fram að svörun CR+PR (dagar)	43	43	44	46	41	27	38*

a Sjúklingahópur sem á að meðhöndla (ITT)

b p-gildi úr lagskiptu log-rank prófi; greining eftir meðferðartegund útilokar lagskiptingu m.t.t. meðferðarsögu; p<0,0001

c Í svarþýði eru sjúklingar sem voru með mælanlegan sjúkdóm við grunnlínu og fengu a.m.k. 1 skammt af rannsóknarlyfi

d p-gildi úr Cochran Mantel-Haenszel kí-kvaðrat prófi aðlagð með tilliti til lagskiptingarþátta; greining eftir meðferðartegund útilokar lagskiptingu m.t.t. meðferðarsögu.

* CR+PR+MR **CR = CR, (IF+); nCR = CR (IF+)

NA = á ekki við, NE = ekki metið

TTP = tími að framrás sjúkdóms (time to progression)

CI = öryggisbil (confidence interval)

B = bortezomib; Dex = dexametason

CR = fullnaðarsvörun; nCR = nánast fullnaðarsvörun (near complete response)

PR = hlutasvörun; MR = lágmarkssvörun (minimal response)

Sjúklingar, sem náðu ekki ákjósanlegri svörun við meðferð með bortezomibi einu sér í II. stigs rannsókninni, gátu fengið háskammta dexametason samhliða bortezomibi. Aðferðarlýsingin heimilaði sjúklingum að fá dexametason ef þeir sýndu ekki hagstæða svörun við bortezomib einu sér. Alls var 74 sjúklingum gefið dexametason samhliða bortezomib. Átján prósent sjúklinga sýndu árangur [MR (11%) eða PR (7%)] við samsetta meðferð.

Klinísk verkun bortezomibs sem gefið er undir húð hjá sjúklingum með endurtekið eða illviðráðanlegt mergæxli

Í opinni, slembaðri III. stigs jafngildisrannsókn var verkun og öryggi gjafar bortezomib undir húð borin saman við gjöf lyfsins með inndælingu í bláæð. Þátttakendur í rannsókninni voru 222 sjúklingar með endurtekið eða illviðráðanlegt mergæxli, sem var slembiraðað í hlutfallinu 2:1 til að fá 1,3 mg/m² af bortezomib, annaðhvort með gjöf undir húð eða í bláæð í 8 lotum. Sjúklingar sem ekki náðu

ákjósanlegri svörun (minna en fullnaðarsvörun [CR]) við meðferð með bortezomib eingöngu eftir 4 lotur máttu fá dexametason 20 mg á sólarhring daginn sem bortezomib var gefið og eftir það. Sjúklingar með ≥ 2 . stigs úttaugakvilla eða blóðflagnafjöldi $<50.000/\mu\text{l}$ við grunnlínu voru útilokaðir frá þátttöku í rannsókninni. Í heild var hægt að meta svörun hjá 218 sjúklingum.

Í rannsókninni náðist aðalmarkmiðið, jafngildi með tilliti til svörunarhlutfalls (fullnaðarsvörun + svörun að hluta til (CR+PR)) eftir 4 lotur með bortezomib eingöngu, bæði gefnu undir húð og í bláæð, 42% í báðum hópunum. Auk þess voru niðurstöður varðandi verkun með tilliti til aukavíðmiða svörunar og tíma fram að verkunartengdu tilviki í samræmi hvað varðar gjöf undir húð og gjöf í bláæð (tafla 15).

Tafla 15: Samantekt á greiningum á verkun þar sem borin er saman gjöf bortezomib undir húð og í bláæð

	Bortezomib hópur sem fékk lyfið í bláæð (i.v.)	Bortezomib hópur sem fékk lyfið undir húð (s.c.)
Metanlegt þýði m.t.t. svörunar	n=73	n=145
Svörunarhlutfall eftir 4 lotur n (%)	31 (42)	61 (42)
Hlutlægt svörunarhlutfall (CR+PR)		
p-gildi ^a	0,00201	
CR n (%)	6 (8)	9 (6)
PR n (%)	25 (34)	52 (36)
nCR n (%)	4 (5)	9 (6)
Svörunarhlutfall eftir 8 lotur n (%)	38 (52)	76 (52)
Hlutlægt svörunarhlutfall (CR+PR)		
p-gildi ^a	0,0001	
CR n (%)	9 (12)	15 (10)
PR n (%)	29 (40)	61 (42)
nCR n (%)	7 (10)	14 (10)
Þýðið sem ætlunin var að meðhöndla^b	n=74	n=148
Tími að framrás sjúkdóms, mánuðir	9,4	10,4
(95% CI)	(7,6; 10,6)	(8,5; 11,7)
Áhættuhlutfall (95% CI) ^c	0,839 (0,564; 1,249)	
p-gildi ^d	0,38657	
Lifun án versnunar sjúkdóms, mánuðir	8,0	10,2
(95% CI)	(6,7; 9,8)	(8,1; 10,8)
Áhættuhlutfall (95% CI) ^c	0,824 (0,574; 1,183)	
p-gildi ^d	0,295	
1. árs heildarlifun (%)^e	76,7	72,6
(95% CI)	(64,1; 85,4)	(63,1; 80,0)

^a p-gildi á við um jafngildistilgátuna að s.c. hópurinn nái að minnsta kosti 60% af svörunarhlutfalli í i.v. hópnum

^b 222 einstaklingar voru valdir til þátttöku í rannsókninni; 221 einstaklingur var meðhöndlaður með bortezomib

^c Áætlað áhættuhlutfall byggir á Cox módeli aðlöguðu að lagskiptingarþáttum: ISS-stigun (International Staging System) og fjöldi fyrri meðferða

^d Log-rank próf aðlagð að stigunarþáttum: ISS stigun og fjöldi fyrri meðferða

^e Miðgildi eftirfylgni er 11,8 mánuðir

Bortezomib í samsettri meðferð með pegýleruðu liposomal doxorubicini (rannsókn DOXIL MMY 3001)

Í III. stigs slembaðri, opinni, fjölsetra rannsókn með samhliða hópum með 646 sjúklingum var gerður samanburður á öryggi og verkun bortezomib ásamt pegýleruðu liposomal doxorubicini og bortezomib einlyfjameðferð hjá sjúklingum með mergæxli sem höfðu fengið a.m.k. eina meðferð áður og þar sem sjúkdómurinn hafði ekki versnað við meðferð sem byggist á anthracyclini. Aðalendapunktur verkunar

var tími fram að versnun (TTP) og aukaendapunktur verkunar var heildarlífur (OR) og hlutlægt svörunarhlutfall (CR+PR) samkvæmt EBMT (European Group for Blood and Marrow Transplantation) viðmiði.

Milligreining skilgreind samkvæmt rannsóknaráætluninni (byggð á 249 TTP tilvikum) varð til þess að hætta þurfti rannsókninni með tilliti til hluta verkunar. Þessi milligreining sýndi 45% áhættuminnkun varðandi TTP (95 % CI; 29-57 %, $p < 0,0001$) hjá sjúklingum sem fengu samsetta meðferð með bortezomib og pegýleruðu liposomal doxorubicini. Miðgildi tíma fram að versnun var 6,5 mánuðir hjá sjúklingum sem fengu bortezomib einlyfjameðferð samanborið við 9,3 mánuði hjá sjúklingum sem fengu bortezomib ásamt pegýleruðu liposomal doxorubicini. Þessar niðurstöður sýna, þótt þær séu ekki fullmótaðar, endanlega greiningu samkvæmt skilgreiningu rannsóknaráætlunarinnar.

Lokagreiningin á heildarlífur sem var gerð eftir eftirfylgni í 8,6 ár (miðgildi) sýndi ekki fram á marktækan mun á heildarlífur meðferðarhópanna tveggja. Miðgildi heildarlífunar var 30,8 mánuðir (95% CI: 25,2-36,5 mánuðir) fyrir sjúklingana sem fengu bortezomib einlyfjameðferð og 33,0 mánuðir (95% CI: 28,9-37,1 mánuður) fyrir sjúklingana sem fengu samsetta meðferð með bortezomib og pegýleruðu lipósóm doxorubicíni.

Bortezomib í samsettri meðferð með dexametasoni

Þar sem ekki er beinn samanburður fyrir hendi á bortezomibi og bortezomibi í samsettri meðferð með dexametasoni hjá sjúklingum með versnandi mergæxli var tölfræðileg pöruð greining gerð til að bera saman niðurstöður frá óslembuðum hóp sem fékk bortezomib í samsettri meðferð með dexametasoni (opin II. stigs rannsókn MMY-2045) við niðurstöður frá bortezomib hópnum sem fékk einlyfjameðferð í öðrum III. stigs slembuðum rannsóknum (M34101-039 [APEX] og DOXIL MMY-3001) við sömu ábendingu.

Paraða greiningin er tölfræðiaðferð þar sem sjúklingar í meðferðarhópnum (t.d. bortezomib í samsettri meðferð með dexametasoni) og sjúklingar í samanburðarhópnum (t.d. bortezomib) eru gerðir sambærilegir með tilliti til truflandi þátta með einstaklingsbundinni pörun. Þetta dregur úr áhrifum truflandi þátta sem komu fram þegar meta á áhrif meðferðarinnar með því að nota óslembaðar niðurstöður.

Eitt hundrað tuttugu og sjö sjúklingar voru skilgreind. Greiningin sýndi bætt hlutlægt svörunarhlutfall (CR+PR) (líkindahlutfall 3,769; 95% CI: 2,045-6,947; $p < 0,001$), lífur án versnunar (áhættuhlutfall 0,511; 95% CI: 0,309-0,845; $p=0,008$), tími fram að versnun (áhættuhlutfall 0,385; 95% CI: 0,212-0,698; $p=0,001$) fyrir bortezomib í samsettri meðferð með dexametasoni fram yfir bortezomib einlyfjameðferð.

Takmarkaðar upplýsingar eru til um endurmeðferð með bortezomib við endurkomu mergæxlis.

II. stigs rannsóknin MMY-2036 (RETRIEVE), einarma, opin rannsókn var gerð til að ákvarða verkun og öryggi endurmeðferðar með bortezomib. Hundrað og þrjátíu sjúklingum (≥ 18 ára) með mergæxli, sem höfðu áður svarað að minnsta kosti að hluta til meðferð sem innihélt bortezomib, voru meðhöndlaðir aftur þegar sjúkdómurinn versnaði. A.m.k. 6 mánuðum eftir fyrri meðferð, var meðferð með bortezomib hafin með skammtinum sem þoldist seinast, sem var $1,3 \text{ mg/m}^2$ ($n=93$) eða $\leq 1,0 \text{ mg/m}^2$ ($n=37$) og gefinn á 1., 4., 8. og 11. degi á 3 vikna fresti í hámark 8 lotur, annaðhvort sem einlyfjameðferð eða í samsettri meðferð með dexametasoni í samræmi við venjubundna umönnun (standard of care). Dexametason var gefið í samsettri meðferð með bortezomib hjá 83 sjúklingum í 1. lotu og 11 sjúklingar til viðbótar fengu dexametason á meðan endurmeðferðlotum með bortezomib stóð.

Aðalendapunkturinn var besta staðfesta svörun við endurmeðferð sem var metin með EBMT viðmiði. Besta heildarsvarhlutfallið (CR+PR) við endurmeðferð hjá 130 sjúklingum var 38,5% (95% CI: 30,1; 47,4).

Klínísk verkun hjá sjúklingum með áður ómeðhöndlað möttulfrumu eitlaæxli (MCL)

Rannsókn LYM-3002 var III. stigs, slembuð, opin rannsókn sem bar verkun og öryggi samsetningar með bortezomibi, rituximabi, cyclophosphamíði, doxorubicini og prednisóni (BR-CAP, n=243) saman við samsetningu með rituximabi, cyclophosphamíði, doxorubicini, vincristini og prednisóni (R-CHOP, n=244) hjá fullorðnum sjúklingum með áður ómeðhöndlað MCL (II., III. eða IV. stigs). Sjúklingar í BR-CAP hópnum fengu bortezomib (1,3 mg/m² á 1., 4., 8. og 11. degi, hvíldardagar á 12.-21. degi), rituximab 375 mg/m² í bláæð á 1. degi, cyclophosphamíð 750 mg/m² í bláæð á 1. degi, doxorubicin 50 mg/m² í bláæð á 1. degi og prednison 100 mg/m² til inntöku á 1. til 5. degi 21 dags bortezomib meðferðarlotunnar. Gefnar voru tvær viðbótar bortezomib meðferðarlotur hjá sjúklingum sem svara fyrst í meðferðarlotu 6.

Aðalendapunktur fyrir virkni var lifun án versnunar byggt á mati óháðrar umsagnarnefndar (IRC). Aukaendapunktur fólu í sér tíma að framrás sjúkdóms, tíma að næstu meðferð við eitilfrumukrabbameini, lengd tímabils án meðferðar, heildarsvörunarhlutfall og hlutfall fullnaðarsvörunar (CR/CRu), heildarlifun og svörunarlengd.

Almennt voru lýðfræðilegar breytur og sjúkdómsbreytur við grunnlínu í góðu jafnvægi á milli meðferðarhópanna tveggja: miðgildi aldurs sjúklinganna var 66 ár, 74% voru karlar, 66% voru af hvítum kynþætti og 32% af asískum kynþætti, 69% sjúklinga voru með jákvætt beinmergssýni og/eða jákvætt beinmergs vefjasýni fyrir MCL, 54% sjúklinga höfðu ≥ 3 á IPI (International Prognostic Index) skala og 76% voru með sjúkdóm á IV. stigi. Meðferðarlengd (miðgildi = 17 vikur) og lengd eftirfylgni (miðgildi=40 mánuðir) voru sambærileg í báðum meðferðarhópnum. Miðgildi fjölda meðferðarlota var 6 í báðum meðferðarhópnum, þar sem 14% sjúklinga í BR-CAP hópnum og 17% sjúklinga í R-CHOP hópnum fengu 2 viðbótar meðferðarlotur. Meirihluti sjúklinga í báðum hópnum lauk meðferðinni, eða 80% í BR-CAP hópnum og 82% í R-CHOP hópnum. Niðurstöður um virkni eru birtar í töflu 16:

Tafla 16: Niðurstöður um virkni úr rannsókn LYM-3002

Endapunktur virkni	BR-CAP	R-CHOP	
n: ITT sjúklingar	243	244	
Lifun án versnunar (IRC) ^a			
Tilfelli n (%)	133 (54,7%)	165 (67,6%)	HR ^b (95% CI)=0,63 (0,50; 0,79) p-gildi ^d < 0,001
Miðgildi ^c (95% CI) (mánuðir)	24,7 (19,8; 31,8)	14,4 (12; 16,9)	
Svörunarhlutfall			
n: sjúklingar þar sem hægt var að meta svörun	229	228	
Heildarfullnaðarsvörun (CR+CRu) ^f n(%)	122 (53,3%)	95(41,7%)	OR ^e (95% CI)=1,688 (1,148; 2,481) p-gildi ^g = 0,007
Heildarsvörun (CR+CRu+PR) ^h n(%)	211 (92,1%)	204 (89,5%)	OR ^e (95% CI)=1,428 (0,749; 2,722) p-gildi ^g = 0,275

a Byggt á mati óháðrar umsagnarnefndar (Independent Review Committee (IRC)) (einungis gögn um geislagreiningu).

b Mat á áhættuhlutfalli er byggt á Cox líkani sem er lagskipt eftir IPI áhættu og stigi sjúkdóms. Áhættuhlutfall < 1 gefur til kynna yfirburði BR-CAP.

c Byggt á Kaplan-Meier product limit mati.

d Byggt á Log rank prófi sem er lagskipt eftir IPI áhættu og stigi sjúkdóms.

e Mantel-Haenszel mat á almennu líkindahlutfalli (OR) fyrir lagskiptar tölur er notað, lagskipt er eftir IPI áhættu og stigi sjúkdóms. Líkindahlutfall > 1 gefur til kynna yfirburði BR-CAP.

f Meðtalin öll CR+CRu, út frá IRC, beinmerg og LDH.

g P-gildi úr Cochran Mantel-Haenszel kí-kvaðrat prófi, lagskipt er eftir IPI og stigi sjúkdóms.

h Meðtalin öll CR+CRu+PR við geislagreiningu, út frá IRC, óháð staðfestingu með beinmerg og LDH.

CR = fullnaðarsvörun; CRu = fullnaðarsvörun óstaðfest; PR = hlutasvörun; CI = öryggisbil, HR = áhættuhlutfall; OR = líkindahlutfall; ITT = sem á að meðhöndla (intent to treat)

Miðgildi lifunar án versnunar að mati rannsækenda var 30,7 mánuðir hjá BR-CAP hópnum og 16,1 mánuðir hjá R-CHOP hópnum (áhættuhlutfall [HR]=0,51; $p < 0,001$). Tölfræðilega marktækur ávinningur ($p < 0,001$) fyrir BR-CAP hópinn fram yfir R-CHOP hópinn kom fram fyrir tíma að framrás sjúkdóms (miðgildi 30,5 samanborið við 16,1 mánuð), tíma að næstu meðferð við eitilfrumukrabbameini (miðgildi 44,5 samanborið við 24,8 mánuðir) og lengd tímabils án meðferðar (miðgildi 40,6 samanborið við 20,5 mánuðir). Miðgildi lengdar fullnaðarsvörunar var 42,1 mánuður hjá BR-CAP hópnum samanborið við 18 mánuði í R-CHOP hópnum. Lengd heildarsvörunar var 21,4 mánuðum lengri hjá BR-CAP hópnum (miðgildi 36,5 mánuðir samanborið við 15,1 mánuður í R-CHOP hópnum). Lokagreining á heildarlifun var gerð eftir eftirfylgni í 82 mánuði (miðgildi). Miðgildi heildarlifunar var 90,7 mánuðir hjá BR-CAP hópnum samanborið við 55,7 mánuði hjá R-CHOP hópnum (áhættuhlutfall=0,66; $p=0,001$). Lokamunurinn á heildarlifun (miðgildi) sem kom fram milli meðferðarhópanna tveggja var 35 mánuðir.

Sjúklingar með áður meðhöndlað léttkeðju (AL) mýlildi (amyloidosis)

Opin I/II. stigs rannsókn, sem ekki var slembiröðuð, var framkvæmd til að akvarða öryggi og verkun bortezomib hjá sjúklingum með áður meðhöndlað léttkeðju (AL) mýlildi. Engin ný öryggisatriði komu fram í rannsókninni og sérstaklega olli bortezomib ekki versnun á skemmdum í marklíffærum (hjarta, nýru og lifur). Í rannsóknarvirknigreiningu (exploratory efficacy analysis) var greint frá 67,3% svarhlutfalli (með 28,6% CR hlutfalli) sem var mælt með blóðsvörun (M-prótein) hjá 49 sjúklingum, sem hægt var að meta, meðhöndlaðir með hámarksleyfilegum skammti sem var 1,6 mg/m² vikulega og 1,3 mg/m² tvisvar í viku. Hjá hópnum, sem fengu þessa skammta, var sameinað eins árs lifunarhlutfall 88,1%.

Börn

Lyfjastofnun Evrópu hefur fallið frá kröfu um að lagðar verði fram niðurstöður úr rannsóknum á bortezomibi hjá öllum undirhópum barna við mergæxli og við möttulfrumu eitlaæxli (sjá upplýsingar í kafla 4.2 um notkun handa börnum).

Samtökin Children's Oncology Group gerðu II. stigs rannsókn í einum hópi (single arm) á virkni, öryggi og lyfjahvörfum til að meta áhrif þess að gefa bortezomib sem viðbót við endurtekna fjöllyfja krabbameinslyfjameðferð hjá börnum og ungum fullorðnum sjúklingum með illkynja eitilfrumusjúkdóma (B-frumuförvera bráðaeitilfrumuhvítblæði [ALL], T-frumu ALL og T-frumu eitilfrumuhvítblæði [LL]). Virk endurtekin fjöllyfja krabbameinslyfjameðferð var gefin í 3 samsetningum (blocks). Bortezomib var einungis gefið í samsetningum 1 og 2 til að forðast hugsanlega skörun eiturverktunar við lyf gefin samhliða í samsetningu 3.

Við lok samsetningar 1 var fullnaðarsvörun (complete response) metin. Hjá B-ALL sjúklingum sem fengu bakslag innan 18 mánaða frá sjúkdómsgreiningu ($n=27$) var tíðni fullnaðarsvörunar 67% (95% CI: 46; 84); tíðni fjögurra mánaða lifunar án tilvika var 44% (95% CI: 26; 62). Hjá B-ALL sjúklingum sem fengu bakslag 18-36 mánuðum frá sjúkdómsgreiningu ($n=33$) var tíðni fullnaðarsvörunar 79% (95% CI: 61; 91) og tíðni fjögurra mánaða lifunar án tilvika var 73% (95% CI: 54; 85). Tíðni fullnaðarsvörunar hjá sjúklingum með fyrsta bakslag af T-frumu ALL ($n=22$) var 68% (95% CI: 45; 86) og tíðni fjögurra mánaða lifunar án tilvika var 67% (95% CI: 42; 83). Upplýsingarnar um virkni sem greint var frá eru taldar vera ófullnægjandi (sjá kafla 4.2).

Það voru 140 sjúklingar með ALL eða LL teknir með við mat á öryggi; miðgildi aldurs var 10 ár (aldursbil 1 til 26). Engin ný öryggisatriði komu fram þegar bortezomib var bætt við viðtekna grunnmeðferð með krabbameinslyfjum hjá börnum með B-frumuförvera ALL. Tíðni eftirfarandi aukaverkana (stig ≥ 3) var hærri í meðferðaráætluninni sem innihélt bortezomib samanborið við eldri samanburðarrannsókn þar sem eingöngu grunnmeðferðin var gefin: í samsetningu 1, útlægur skyntaugakvilli (3% samanborið við 0%); garnastífla (2,1% samanborið við 0%); súrefnisskortur (8% samanborið við 2%). Engar upplýsingar eru fyrirliggjandi í þessari rannsókn um mögulegar afleiðingar útlægs taugakvilla eða um tíðni þess að hann gangi til baka. Einnig kom fram hærri tíðni sýkinga með dauftyfningafæð af stigi ≥ 3 (24% samanborið við 19% í samsetningu 1 og 22% samanborið við 11%

í samsetningu 2), aukning á ALT (17% samanborið við 8% í samsetningu 2), blóðkalíumlækkun (18% samanborið við 6% í samsetningu 1 og 21% samanborið við 12% í samsetningu 2) og blóðnatríumlækkun (12% samanborið við 5% í samsetningu 1 og 4% samanborið við 0% í samsetningu 2).

5.2 Lyfjahvörf

Frásög

Eftir inndælingu í bláæð, þar sem 11 sjúklingum með mergæxli og kreatínínúthreinsun yfir 50 ml/mín. var gefinn 1,0 mg/m² eða 1,3 mg/m² skammtur, var hámarksþéttni bortezomibs í plasma eftir fyrsta skammt að meðaltali 57 og 112 ng/ml, tilgreint í sömu röð. Við síðari skammta voru meðaltalsgildi hámarksþéttni í plasma á bilinu 67 til 106 ng/ml þegar gefinn var 1,0 mg/m² skammtur og 89 til 120 ng/ml þegar gefinn var 1,3 mg/m² skammtur.

Eftir inndælingu 1,3 mg/m² skammts í bláæð eða undir húð hjá sjúklingum með mergæxli (n=14 í hópnum sem fékk lyfið í bláæð, n=17 í hópnum sem fékk lyfið undir húð) var altæk útsetning í heild eftir endurtekna skammta (AUC_{last}) jafngild fyrir gjöf undir húð og gjöf í bláæð. C_{max} eftir gjöf undir húð (20,4 ng/ml) var lægri en eftir gjöf í bláæð (223 ng/ml). Hlutfall faldmeðaltals (geometric mean ratio) AUC_{last} var 0,99 og 90% öryggisbila voru 80,18%-122,80%.

Dreifing

Meðaltalsgildi dreifingarrúmmáls (V_d) bortezomibs var á bilinu 1.659 l til 3.294 l eftir staka og endurtekna 1,0 mg/m² og 1,3 mg/m² skammta með gjöf í bláæð handa sjúklingum með mergæxli. Þetta bendir til þess að bortezomib dreifist mikið til útvefja. Við þéttni bortezomibs á bilinu 0,01 til 1,0 míkrogr/ml var próteinbinding *in vitro* að meðaltali 82,9% í plasma manna. Hlutfall bortezomibs, sem bundið var plasmapróteinum, var ekki háð þéttni.

Umbrot

In vitro rannsóknir á lifrarfrymisögnum manna og cDNA-tjáðum cytókróm P450 ísóensímum manna benda til þess að bortezomib umbroti einkum með oxun fyrir tilstilli cytókróm P450 ensímanna 3A4, 2C19 og 1A2. Helsta umbrotaleiðin er bórsvipting sem gefur af sér tvö bórsvipt umbrotsefni sem síðan umbrotna í ýmis umbrotsefni með hydroxýtengingu. Bórsvipt umbrotsefni bortezomibs eru óvirk hvað varðar hömlun á 26S-próteasómi.

Brotthvarf

Meðalhelmingunartími (t_{1/2}) brotthvarfs bortezomibs eftir endurtekna skammta var á bilinu 40- 193 klst. Brotthvarf bortezomibs er hraðara eftir fyrsta skammtinn en eftir síðari skammta. Heildarúthreinsun úr líkamanum eftir fyrsta skammtinn var að meðaltali 102 l/klst. eftir 1,0 mg/m² skammt og 112 l/klst. eftir 1,3 mg/m² skammt. Eftir síðari skammta var hún á bilinu 15 til 32 l/klst. eftir 1,0 mg/m² skammt og á bilinu 18 til 32 l/klst. eftir 1,3 mg/m² skammt.

Sérstakir sjúklingahópar

Skert lifrarstarfsemi

Áhrif skertrar lifrarstarfsemi á lyfjahvörf bortezomibs voru metin í I. stigs rannsókn í fyrstu meðferðarlotu hjá 61 sjúklingi, aðallega með föst æxli (solid tumours) og mismunandi mikið skerta lifrarstarfsemi, sem fengu bortezomib skammta á bilinu 0,5 til 1,3 mg/m².

Í samanburði við sjúklinga með eðlilega lifrarstarfsemi breytti væg skerðing á lifrarstarfsemi ekki AUC fyrir bortezomib, sem var leiðrétt fyrir skammta. Hins vegar stækkaði meðaltal AUC, sem var leiðrétt fyrir skammta, um u.þ.b. 60% hjá sjúklingum með í meðallagi mikið eða verulega skerta

lifrarstarfsemi. Mælt er með minni upphafsskammti hjá sjúklingum með í meðallagi mikið eða verulega skerta lifrarstarfsemi og fylgjast skal vel með þessum sjúklingum (sjá kafla 4.2, töflu 6).

Skert nýrnastarfsemi

Rannsókn á lyfjahvörfum var framkvæmd hjá sjúklingum með hin ýmsu stig skertrar nýrnastarfsemi, sem voru skilgreind í samræmi við gildi kreatínínúthreinsunar (CrCl) í eftirfarandi hópa: eðlileg nýrnastarfsemi (CrCl $\geq$ 60 ml/mín./1,73 m², n=12), væg skerðing (CrCl = 40-59 ml/mín./1,73 m², n=10), í meðallagi mikil skerðing (CrCl = 20-39 ml/mín./1,73 m², n=9) og veruleg skerðing (CrCl < 20 ml/mín./1,73 m², n=3). Hópur sjúklinga, sem var í skilun og fékk skammta eftir skilun, var einnig með í rannsókninni (n=8). Sjúklingum voru gefnir 0,7 til 1,3 mg/m² skammtar af bortezomibi í bláæð tvisvar á viku. Útsetning fyrir bortezomibi (AUC og C_{max}, leiðrétt fyrir skammta) var sambærileg milli allra hópanna (sjá kafla 4.2).

Aldur

Lyfjahvörf bortezomibs voru greind eftir gjöf staks 1,3 mg/m² skammts í bláæð tvisvar sinnum á viku hjá 104 sjúklingum (2-16 ára) með bráðaeitilfrumuhvítblæði (ALL) eða brátt kyrningahvítblæði (AML). Á grundvelli lyfjahvarfagreiningar þýðis jókst úthreinsun bortezomibs með stækkandi flatarmáli líkamsyfirborðs. Margfeldismeðaltal (%CV) úthreinsunar var 7,79 (25%) l/klst./m², dreifingarrúmmál við jafnvægi var 834 (39%) l/m² og helmingunartími brothvarfs var 100 (44%) klst. Eftir að leiðrétt hafði verið fyrir áhrifum flatarmáls líkamsyfirborðs höfðu aðrir lýðfræðilegir þættir svo sem aldur, líkamsþyngd og kyn ekki klínískt marktæk áhrif á úthreinsun bortezomibs. Úthreinsun bortezomibs, stöðluð fyrir áhrifum flatarmáls líkamsyfirborðs, hjá börnum var svipuð og hjá fullorðnum.

5.3 Forklínískar upplýsingar

Bortezomib hefur sýnt eiturverkun á erfðafni. Bortezomib sýndi litningasundrandi virkni (frávik á uppbyggingu litninga) í *in vitro* prófun á litningafrávikum þar sem frumur úr eggjastokkum kínverskra hamstra voru notaðar við þéttni miður í 3,125 mÍkróg/ml sem var lægsta þéttni sem metin var. Bortezomib sýndi ekki jákvæða svörun þegar það var prófað í *in vitro* stökkbreytingarprófi (Ames-prófi) og *in vivo* smákjarnaprófi á músum.

Í rannsóknum á eiturverkunum á þroska hjá rottum og kaninum hefur verið sýnt fram á fósturvísa- og fósturdauða við skammta sem voru eitradir fyrir móðurina, en enga beina eiturverkun á fósturvísa og fóstur í skömmum sem voru undir þeim skömmum sem voru eitradir fyrir móðurina.

Frjósemisrannsóknir voru ekki gerðar en æxlunarvefir voru metnir í almennum rannsóknum á eiturverkunum. Í 6 mánaða rannsókn á rottum komu bæði fram hrörnunaráhrif í eistum og eggjastokkum. Því er líklegt að bortezomib geti hugsanlega haft áhrif, hvort sem er, á frjósemi karla eða kvendýra. Ekki voru gerðar rannsóknir á burðarmáls- og eftirburðarþroska.

Í rannsóknum á almennum eiturverkunum, sem samanstóðu af mörgum lotum og gerðar voru á rottum og öpum, voru helstu markliffæri meltingarvegur, sem leiddi til uppkasta og/eða niðurgangs; blóðmyndandi vefir og eitilvefir, en það olli frumufæð í útæðablóði, rýrnun eitilvefs og frumufæð í blóðmyndandi beinmerg; útlægir taugakvillar (kom fram hjá öpum, músum og hundum) sem náði til skyntaugarþráða; og vægar nýrnabreytingar. Í öllum þessum markliffærum hefur orðið bati að einhverju eða öllu leyti eftir að meðferð var hætt.

Á grundvelli dýrarannsókna virðist flæði bortezomibs yfir blóðheilaþröskuld vera takmarkað ef eitthvað og mikilvægi þess hjá mönnum er óþekkt.

Lyfjafræðilegar rannsóknir á öryggi fyrir hjarta- og æðakerfi hjá öpum og hundum sýna að skammtar gefnir í bláæð, sem eru tvö- til þrefaldir ráðlagðir klínískir skammtar á grundvelli mg/m² tengjast aukningu á hjartsláttartíðni, minni samdráttarhæfni, lágþrýstingi og dauða. Hjá hundum svaraði minnkuð samdráttarhæfni hjartans og lágþrýstingur bráðum inngrípum með lyfjum sem auka

samdráttarkraft hjartans eða blóðþrýstingshækkandi lyfjum. Ennfremur sást í rannsóknum á hundum smávægileg aukning á leiðréttu QT-bili.

6. LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

6.1 Hjálparefni

Mannitól (E421)

6.2 Ósamrýmanleiki

Ekki má blanda þessu lyfi saman við önnur lyf en þau sem nefnd eru í kafla 6.6.

6.3 Geymslupól

Órofið hettuglas

3 ár.

Fullbúin lausn:

Nota skal blönduðu lausnina strax og hún er tilbúin. Ef hún er ekki notuð strax er geymslutími meðan á notkun stendur og geymsluskilyrðin fyrir notkun á ábyrgð notanda. Þó hefur verið sýnt fram á efna- og eðlisfræðilegan stöðugleika í 8 klukkustundir við 5°C og 25°C, ef lyfið er geymt í upprunalegu hettuglasi og/öðra sprautu. Heildargeymslutími fullbúinnar lausnar fyrir notkun má ekki vera lengri en 8 klukkustundir.

6.4 Sérstakar varúðarreglur við geymslu

Ekki þarf að geyma lyfið við sérstök hitaskilyrði.

Geymið hettuglasið í ytri öskju til varnar gegn ljósi.

Geymsluskilyrði eftir blöndun lyfsins, sjá kafla 6.3.

6.5 Gerð íláts og innihald

Silíkonhúðað 5 ml hettuglas úr gleri af gerð I með gúmmítappa og álinnsigli, sem inniheldur 1 mg af bortezomíbi.

10 ml hettuglas úr gleri af gerð I með gúmmítappa og álinnsigli, sem inniheldur 2,5 mg, 3 mg eða 3,5 mg af bortezomíbi.

Hver pakkning inniheldur 1 hettuglas.

6.6 Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun

Almennar varúðarráðstafanir

Bortezomib er frumudrepandi lyf. Því skal gæta varúðar við meðhöndlun og blöndun Bortezomib Hospira. Mælt er með notkun hanska og annars hlífðarfatnaðar til að koma í veg fyrir að lyfið snerti húð.

Fyllsta **smitgát** skal viðhöfð við alla meðhöndlun Bortezomib Hospira þar sem það inniheldur ekkert rotvarnarefni.

Orðið hafa dauðsföll vegna þess að Bortezomib Hospira var gefið af vangá í mænuvökva. Bortezomib Hospira er ætlað til notkunar í bláæð eða undir húð. Bortezomib Hospira má ekki gefa í mænuvökva.

Leiðbeiningar um blöndun

Blöndun Bortezomib Hospira á að vera í höndum heilbrigðisstarfsmanns.

Inndæling í bláæð

Bortezomib Hospira 1 mg stungulyfsstofn, lausn

Innihald hvers 5 ml hettuglass af Bortezomib Hospira 1 mg stungulyfsstofni, lausn á að leysa varlega upp með 1 ml af natríumklóríði 9 mg/ml (0,9%) lausn fyrir stungulyf, með því að nota viðeigandi stærð af sprautu, án þess að fjarlægja tappann úr hettuglasinu. Frostþurrkaða duftið leysist upp á innan við 2 mínútum.

Eftir blöndun inniheldur hver ml af lausn 1 mg af bortezomibi. Blönduð lausnin er tær og litlaus með lokasýrustig sem nemur 4 til 7. Fyrir notkun verður að skoða blönduðu lausnina m.t.t. agna og mislitunar. Verði vart við einhverja mislitun eða agnir, verður að farga blönduðu lausninni.

Bortezomib Hospira 2,5 mg stungulyfsstofn, lausn

Innihald hvers 10 ml hettuglass af Bortezomib Hospira 2,5 mg stungulyfsstofni, lausn á að leysa varlega upp með 2,5 ml af natríumklóríði 9 mg/ml (0,9%) lausn fyrir stungulyf, með því að nota viðeigandi stærð af sprautu, án þess að fjarlægja tappann úr hettuglasinu. Frostþurrkaða duftið leysist upp á innan við 2 mínútum.

Eftir blöndun inniheldur hver ml af lausn 1 mg af bortezomibi. Blönduð lausnin er tær og litlaus með lokasýrustig sem nemur 4 til 7. Fyrir notkun verður að skoða blönduðu lausnina m.t.t. agna og mislitunar. Verði vart við einhverja mislitun eða agnir, verður að farga blönduðu lausninni.

Bortezomib Hospira 3 mg stungulyfsstofn, lausn

Innihald hvers 10 ml hettuglass af Bortezomib Hospira 3 mg stungulyfsstofni, lausn á að leysa varlega upp með 3 ml af natríumklóríði 9 mg/ml (0,9%) lausn fyrir stungulyf, með því að nota viðeigandi stærð af sprautu, án þess að fjarlægja tappann úr hettuglasinu. Frostþurrkaða duftið leysist upp á innan við 2 mínútum.

Eftir blöndun inniheldur hver ml af lausn 1 mg af bortezomibi. Blönduð lausnin er tær og litlaus með lokasýrustig sem nemur 4 til 7. Fyrir notkun verður að skoða blönduðu lausnina m.t.t. agna og mislitunar. Verði vart við einhverja mislitun eða agnir, verður að farga blönduðu lausninni.

Bortezomib Hospira 3,5 mg stungulyfsstofn, lausn

Innihald hvers 10 ml hettuglass af Bortezomib Hospira 3,5 mg stungulyfsstofni, lausn á að leysa varlega upp með 3,5 ml af natríumklóríði 9 mg/ml (0,9%) lausn fyrir stungulyf, með því að nota viðeigandi stærð af sprautu, án þess að fjarlægja tappann úr hettuglasinu. Frostþurrkaða duftið leysist upp á innan við 2 mínútum.

Eftir blöndun inniheldur hver ml af lausn 1 mg af bortezomibi. Blönduð lausnin er tær og litlaus með lokasýrustig sem nemur 4 til 7. Fyrir notkun verður að skoða blönduðu lausnina m.t.t. agna og mislitunar. Verði vart við einhverja mislitun eða agnir, verður að farga blönduðu lausninni.

Inndæling undir húð

Bortezomib Hospira 1 mg stungulyfsstofn, lausn

Innihald hvers 5 ml hettuglass af Bortezomib Hospira 1 mg stungulyfsstofni, lausn á að leysa varlega upp með 0,4 ml af natríumklóríði 9 mg/ml (0,9%) lausn fyrir stungulyf, með því að nota viðeigandi stærð af sprautu, án þess að fjarlægja tappann úr hettuglasinu. Frostþurrkaða duftið leysist upp á innan við 2 mínútum.

Eftir blöndun inniheldur hver ml af lausn 2,5 mg af bortezomibi. Blönduð lausnin er tær og litlaus með lokasýrustig sem nemur 4 til 7. Fyrir notkun verður að skoða blönduðu lausnina m.t.t. agna og mislitunar. Verði vart við einhverja mislitun eða agnir, verður að farga blönduðu lausninni.

Bortezomib Hospira 2,5 mg stungulyfsstofn, lausn

Innihald hvers 10 ml hettuglass af Bortezomib Hospira 2,5 mg stungulyfsstofni, lausn á að leysa varlega upp með 1 ml af natríumklóríði 9 mg/ml (0,9%) lausn fyrir stungulyf, með því að nota viðeigandi stærð af sprautu, án þess að fjarlægja tappann úr hettuglasinu. Frostþurrkaða duftið leysist upp á innan við 2 mínútum.

Eftir blöndun inniheldur hver ml af lausn 2,5 mg af bortezomibi. Blönduð lausnin er tær og litlaus með lokasýrustig sem nemur 4 til 7. Fyrir notkun verður að skoða blönduðu lausnina m.t.t. agna og mislitunar. Verði vart við einhverja mislitun eða agnir, verður að farga blönduðu lausninni.

Bortezomib Hospira 3 mg stungulyfsstofn, lausn

Innihald hvers 10 ml hettuglass af Bortezomib Hospira 3 mg stungulyfsstofni, lausn á að leysa varlega upp með 1,2 ml af natríumklóríði 9 mg/ml (0,9%) lausn fyrir stungulyf, með því að nota viðeigandi stærð af sprautu, án þess að fjarlægja tappann úr hettuglasinu. Frostþurrkaða duftið leysist upp á innan við 2 mínútum.

Eftir blöndun inniheldur hver ml af lausn 2,5 mg af bortezomibi. Blönduð lausnin er tær og litlaus með lokasýrustig sem nemur 4 til 7. Fyrir notkun verður að skoða blönduðu lausnina m.t.t. agna og mislitunar. Verði vart við einhverja mislitun eða agnir, verður að farga blönduðu lausninni.

Bortezomib Hospira 3,5 mg stungulyfsstofn, lausn

Innihald hvers 10 ml hettuglass af Bortezomib Hospira 3,5 mg stungulyfsstofni, lausn á að leysa varlega upp með 1,4 ml af natríumklóríði 9 mg/ml (0,9%) lausn fyrir stungulyf, með því að nota viðeigandi stærð af sprautu, án þess að fjarlægja tappann úr hettuglasinu. Frostþurrkaða duftið leysist upp á innan við 2 mínútum.

Eftir blöndun inniheldur hver ml af lausn 2,5 mg af bortezomibi. Blönduð lausnin er tær og litlaus með lokasýrustig sem nemur 4 til 7. Fyrir notkun verður að skoða blönduðu lausnina m.t.t. agna og mislitunar. Verði vart við einhverja mislitun eða agnir, verður að farga blönduðu lausninni.

Förgun

Bortezomib Hospira er einungis einnota. Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

7. MARKAÐSLEYFISHAFI

Pfizer Europe MA EEIG
Boulevard de la Plaine 17
1050 Bruxelles
Belgía

8. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/16/1114/001
EU/1/16/1114/002
EU/1/16/1114/003
EU/1/16/1114/004

9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS / ENDURNÝJUNAR MARKAÐSLEYFIS

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 25. júlí 2016
Nýjasta dagsetning endurnýjunar markaðsleyfis: 28. apríl 2021

10. DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu <https://www.ema.europa.eu>

Lyfið er ekki lengur með markaðsleyfi

VIÐAUKI II

- A. FRAMLEIÐENDUR SEM ERU ÁBYRGIR FYRIR LOKASAMÞYKKT
- B. FORSENDUR FYRIR, EÐA TAKMARKANIR Á, AFGREIÐSLU OG NOTKUN
- C. AÐRAR FORSENDUR OG SKILYRÐI MARKAÐSLEYFIS
- D. FORSENDUR EÐA TAKMARKANIR ER VARÐA ÖRYGGI OG VERKUN VIÐ NOTKUN LYFSINS

A. FRAMLEIÐENDUR SEM ERU ÁBYRGIR FYRIR LOKASAMÞYKKT

Heiti og heimilisfang framleiðenda sem eru ábyrgir fyrir lokasamþykkt

Pfizer Service Company BV,
Hoge Wei 10,
1930 Zaventem,
Belgía

B. FORSENDUR FYRIR, EÐA TAKMARKANIR Á, AFGREIÐSLU OG NOTKUN

Ávísun lyfsins er háð sérstökum takmörkunum (sjá viðauka I: Samantekt á eiginleikum lyfs, kafla 4.2).

C. AÐRAR FORSENDUR OG SKILYRÐI MARKAÐSLEYFIS

• Samantektir um öryggi lyfsins (PSUR)

Skilyrði um hvernig leggja skal fram samantektir um öryggi lyfsins koma fram í lista yfir viðmiðunardagsetningar Evrópusambandsins (EURD lista) sem gerð er krafa um í grein 107c(7) í tilskipun 2001/83/EB og öllum síðari uppfærslum sem birtar eru í evrópsku lyfjavefgáttinni.

D. FORSENDUR EÐA TAKMARKANIR ER VARÐA ÖRYGGI OG VERKUN VIÐ NOTKUN LYFSINS

• Áætlun um áhættustjórnun

Markaðsleyfishafi skal sinna lyfjagátaraðgerðum sem krafist er, sem og öðrum ráðstöfunum eins og fram kemur í áætlun um áhættustjórnun í kafla 1.8.2 í markaðsleyfinu og öllum uppfærslum á áætlun um áhættustjórnun sem ákveðnar verða.

Leggja skal fram uppfærða áætlun um áhættustjórnun:

- Að beiðni Lyfjastofnunar Evrópu
- Þegar áhættustjórnunarkerfinu er breytt, sérstaklega ef það gerist í kjölfar þess að nýjar upplýsingar berast sem geta leitt til mikilvægra breytinga á hlutfalli ávinnings/áhættu eða vegna þess að mikilvægur áfangi (tengdur lyfjagát eða lágmörkun áhættu) næst

Lyfið er ekki lengur með markaðsleyfi

VIÐAUKI III
ÁLETRANIR OG FYLGISÉDILL

Lyfið er ekki lengur með markaðsleyfi

A. ÁLETRANIR

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA, BORTEZOMIB HOSPIRA 1 mg

1. HEITI LYFS

Bortezomib Hospira 1 mg stungulyfsstofn, lausn
bortezomib

2. VIRK(T) EFNI

Eitt hettuglas með stofni inniheldur 1 mg af bortezomibi (sem mannítólbórestur).

3. HJÁLPAREFNI

Mannítól (E421)

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn, lausn
1 hettuglas

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.
Einungis til notkunar undir húð eða í bláæð.
Einungis einnota.
Getur valdið dauða ef gefið er eftir öðrum íkomuleiðum.

Til notkunar undir húð: Bætið 0,4 ml af 0,9% natríumklóríði til að fá 2,5 mg/ml lokastyrk.

Til notkunar í bláæð: Bætið 1 ml af 0,9% natríumklóríði til að fá 1 mg/ml lokastyrk.

6. SÉRSTÖK VARNADARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNADARORÐ, EF MEÐ ÞARF

FRUMUDREPANDI. Sérstakar leiðbeiningar um meðhöndlun.

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP
Nota skal blönduðu lausnina strax og hún er tilbúin.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið hettuglasið í ytri öskjunni til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Fargið í samræmi við gildandi reglur.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Europe MA EEIG
Boulevard de la Plaine 17
1050 Bruxelles
Belgía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/16/1114/004

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN**15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR****16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI**

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVITT STRIKAMERKI

Á pakknungunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC
SN
NN

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA, BORTEZOMIB HOSPIRA 2,5 mg

1. HEITI LYFS

Bortezomib Hospira 2,5 mg stungulyfsstofn, lausn
bortezomib

2. VIRK(T) EFNI

Eitt hettuglas með stofni inniheldur 2,5 mg af bortezomibi (sem mannitólbórestur)

3. HJÁLPAREFNI

Mannitól (E421)

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn, lausn
1 hettuglas

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.
Einungis til notkunar undir húð eða í bláæð.
Einungis einnota.
Getur valdið dauða ef gefið er eftir öðrum íkomuleiðum.

Til notkunar undir húð: Bætið 1 ml af 0,9% natríumklóríði til að fá 2,5 mg/ml lokastyrk.

Til notkunar í bláæð: Bætið 2,5 ml af 0,9% natríumklóríði til að fá 1 mg/ml lokastyrk.

6. SÉRSTÖK VARNADARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNADARORÐ, EF MEÐ ÞARF

FRUMUDREPANDI. Sérstakar leiðbeiningar um meðhöndlun.

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP
Nota skal blönduðu lausnina strax og hún er tilbúin.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið hettuglasið í ytri öskjunni til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Fargið í samræmi við gildandi reglur.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Europe MA EEIG
Boulevard de la Plaine 17
1050 Bruxelles
Belgía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/16/1114/002

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN**15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR****16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI**

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakknungunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC
SN
NN

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA, BORTEZOMIB HOSPIRA 3 mg

1. HEITI LYFS

Bortezomib Hospira 3 mg stungulyfsstofn, lausn
bortezomib

2. VIRK(T) EFNI

Eitt hettuglas með stofni inniheldur 3 mg af bortezomibi (sem mannitólbórestur)

3. HJÁLPAREFNI

Mannitól (E421)

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn, lausn
1 hettuglas

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.
Einungis til notkunar undir húð eða í bláæð.
Einungis einnota.
Getur valdið dauða ef gefið er eftir öðrum íkomuleiðum.

Til notkunar undir húð: Bætið 1,2 ml af 0,9% natríumklóríði til að fá 2,5 mg/ml lokastyrk.

Til notkunar í bláæð: Bætið 3 ml af 0,9% natríumklóríði til að fá 1 mg/ml lokastyrk.

6. SÉRSTÖK VARNADARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNADARORÐ, EF MEÐ ÞARF

FRUMUDREPANDI. Sérstakar leiðbeiningar um meðhöndlun.

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP
Nota skal blönduðu lausnina strax og hún er tilbúin.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið hettuglasið í ytri öskjunni til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Fargið í samræmi við gildandi reglur.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Europe MA EEIG
Boulevard de la Plaine 17
1050 Bruxelles
Belgía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/16/1114/003

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN**15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR****16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI**

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakknungunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC
SN
NN

**UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM
YTRI ASKJA, BORTEZOMIB HOSPIRA 3,5 mg**

1. HEITI LYFS

Bortezomib Hospira 3,5 mg stungulyfsstofn, lausn
bortezomib

2. VIRK(T) EFNI

Eitt hettuglas með stofni inniheldur 3,5 mg af bortezomibi (sem mannítólbórestur)

3. HJÁLPAFENI

Mannítól (E421)

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn, lausn.
1 hettuglas

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.
Einungis til notkunar undir húð eða í bláæð.
Einungis einnota.
Getur valdið dauða ef gefið er eftir öðrum íkomuleiðum.

Til notkunar undir húð: Bætið 1,4 ml af 0,9% natríumklóríði til að fá 2,5 mg/ml lokastyrk.

Til notkunar í bláæð: Bætið 3,5 ml af 0,9% natríumklóríði til að fá 1 mg/ml lokastyrk.

**6. SÉRSTÖK VARNADARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN
HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ**

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNADARORÐ, EF MEÐ ÞARF

FRUMUDREPANDI. Sérstakar leiðbeiningar um meðhöndlun.

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP
Nota skal blönduðu lausnina strax og hún er tilbúin.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið hettuglasið í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Fargið í samræmi við gildandi reglur.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Europe MA EEIG
Boulevard de la Plaine 17
1050 Bruxelles
Belgía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/16/1114/001

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN**15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR****16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI**

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC
SN
NN

LÁGMARKSUPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

HETTUGLAS, BORTEZOMIB HOSPIRA 1 mg

1. HEITI LYFSINS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Bortezomib Hospira 1 mg stungulyfsstofn, lausn
bortezomib
Einungis til notkunar undir húð eða í bláæð.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 mg

6. ANNAD

Einungis einnota.

Getur valdið dauða ef gefið er eftir öðrum íkomuleiðum.

Til notkunar undir húð: Bætið 0,4 ml af 0,9% natríumklóríði til að fá 2,5 mg/ml lokastyrk.

Til notkunar í bláæð: Bætið 1 ml af 0,9% natríumklóríði til að fá 1 mg/ml lokastyrk.

Geymið hettuglasjö í ytri öskjunni til varnar gegn ljósi.

Flettið hér

LÁGMARKSUPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

HETTUGLAS, BORTEZOMIB HOSPIRA 2,5 mg

1. HEITI LYFSINS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Bortezomib Hospira 2,5 mg stungulyfsstofn, lausn
bortezomib
Einungis til notkunar undir húð eða í bláæð.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

2,5 mg

6. ANNAD

Einungis einnota.

Getur valdið dauða ef gefið er eftir öðrum íkomuleiðum.

Til notkunar undir húð: Bætið 1 ml af 0,9% natríumklóríði til að fá 2,5 mg/ml lokastyrk.

Til notkunar í bláæð: Bætið 2,5 ml af 0,9% natríumklóríði til að fá 1 mg/ml lokastyrk.

Geymið hettuglasjö í ytri öskjunni til varnar gegn ljósi.

Flettið hér

LÁGMARKSUPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

HETTUGLAS, BORTEZOMIB HOSPIRA 3 mg

1. HEITI LYFSINS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Bortezomib Hospira 3 mg stungulyfsstofn, lausn
bortezomib
Einungis til notkunar undir húð eða í bláæð.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

3 mg

6. ANNAD

Einungis einnota.

Getur valdið dauða ef gefið er eftir öðrum íkomuleiðum.

Til notkunar undir húð: Bætið 1,2 ml af 0,9% natríumklóríði til að fá 2,5 mg/ml lokastyrk.

Til notkunar í bláæð: Bætið 3 ml af 0,9% natríumklóríði til að fá 1 mg/ml lokastyrk.

Geymið hettuglasjö í ytri öskjunni til varnar gegn ljósi.

Flettið hér

LÁGMARKSUPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA
HETTUGLAS, BORTEZOMIB HOSPIRA 3,5 mg

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Bortezomib Hospira 3,5 mg stungulyfsstofn, lausn
bortezomib
Einungis til notkunar undir húð eða í bláæð.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

3,5 mg

6. ANNAD

Einungis einnota.

Getur valdið dauða ef gefið er eftir öðrum íkomuleiðum.

Til notkunar undir húð: Bætið 1,4 ml af 0,9% natríumklóríði til að fá 2,5 mg/ml lokastyrk.

Til notkunar í bláæð: Bætið 3,5 ml af 0,9% natríumklóríði til að fá 1 mg/ml lokastyrk.

Geymið hettuglasíð í ytri öskju til varnar gegn ljósi.

Flettið hér

Lyfið er ekki lengur með markaðsleyfi

B. FYLGISEDILL

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Bortezomib Hospira 1 mg stungulyfsstofn, lausn
Bortezomib Hospira 2,5 mg stungulyfsstofn, lausn
Bortezomib Hospira 3 mg stungulyfsstofn, lausn
Bortezomib Hospira 3,5 mg stungulyfsstofn, lausn
bortezomib

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

- Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.
- Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.
- Látið lækinn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1. Upplýsingar um Bortezomib Hospira og við hverju það er notað
2. Áður en byrjað er að nota Bortezomib Hospira
3. Hvernig nota á Bortezomib Hospira
4. Hugsanlegar aukaverkanir
5. Hvernig geyma á Bortezomib Hospira
6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

1. Upplýsingar um Bortezomib Hospira og við hverju það er notað

Bortezomib Hospira inniheldur virka efnið bortezomib sem er svokallaður „próteasómhemill“. Próteasóm gegna mikilvægu hlutverki í stjórnum á virkni og vexti frumna. Með því að trufla virkni próteasóma getur bortezomib dregið krabbameinsfrumur.

Bortezomib Hospira er notað til meðferðar við mergæxli (krabbameini í beinmerg) hjá sjúklingum eldri en 18 ára:

- eitt og sér eða ásamt lyfjunum pegýleruðu liposomal doxorubicini eða dexametasoni fyrir sjúklinga sem hafa versnandi sjúkdóm þrátt fyrir að hafa fengið a.m.k. eina fyrri meðferð og fyrir þá sem hafa gengist undir stofnfrumuígræðslu án árangurs eða hentar ekki stofnfrumuígræðslu.
- í samsettri meðferð með lyfjunum melfalan og prednisón, fyrir sjúklinga sem ekki hafa áður verið meðhöndlaðir við sjúkdómnum og sem ekki er hægt að gefa háskammtameðferð með krabbameinslyfjum ásamt stofnfrumuígræðslu.
- í samsettri meðferð með lyfinu dexametasoni eða dexametasoni ásamt thalidomíði hjá sjúklingum sem ekki hafa áður verið meðhöndlaðir við sjúkdómnum og fyrir háskammtameðferð með krabbameinslyfjum ásamt stofnfrumuígræðslu (innleiðslumeðferð).

Bortezomib Hospira í samsettri meðferð með lyfjunum rituximabi, cyclophosphamíði, doxorubicini og prednisóni er notað til meðferðar við möttulfrumu eitlaæxli (gerð af krabbameini sem hefur áhrif á eitlana) hjá sjúklingum 18 ára og eldri sem hafa ekki áður fengið meðferð við sjúkdómnum og ígræðslu stofnfrumna hentar ekki.

2. Áður en byrjað er að nota Bortezomib Hospira

Ekki má nota Bortezomib Hospira

- ef um er að ræða ofnæmi fyrir bortezomibi, bóri eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6)
- ef þú ert með ákveðna alvarlega lungna- eða hjartasjúkdóma

Varnaðarorð og varúðarreglur

Láttu lækninn vita ef þú ert með eitthvað af eftirtöldu:

- of fá rauð eða hvít blóðkorn
- blæðingarvandamál og/eða of fáar blóðflögur
- niðurgang, hægðatregðu, ógleði eða uppköst
- sögu um yfirlið, sundl eða vægan svima
- nýrnasjúkdóm
- í meðallagi mikil eða veruleg lifrarvandamál
- sögu um dofa, náladofa eða verk í höndum eða fótum (taugakvillar)
- hjartasjúkdóm eða blóðþrýstingsvandamál
- mæði eða hósta
- flog
- ristil (staðbundinn, þ.m.t. umhverfis augu eða útbreiddan)
- einkenni æxlislýsuheilkennis eins og vöðvakrampa, vöðvamáttleysi, ringlun, sjónskerðingu eða sjóntruflanir og mæði
- minnistap, erfiðleikar með hugsun, erfiðleikar með gang eða sjóntap. Þetta geta verið einkenni alvarlegrar sýkingar í heila og læknirinn mun hugsanlega gera frekari rannsóknir og hafa nánara eftirlit með þér.

Taka þarf blóðsýni reglulega fyrir meðferð og meðan á meðferð með Bortezomib Hospira stendur til að athuga fjölda blóðkorna.

Ef þú ert með möttulfrumu eitlaæxli og færð lyfið rituximab ásamt Bortezomib Hospira skaltu láta lækninn vita:

- ef þú telur að þú sért með eða hafir áður verið með lifrabólgu sýkingu. Í nokkrum tilfellum gætu sjúklingar sem hafa verið með lifrabólgu B fengið lifrabólgu aftur, sem getur verið banvæn. Ef þú ert með sögu um lifrabólgu B sýkingu mun læknirinn skoða þig vandlega með tilliti til einkenna virkrar lifrabólgu B.

Lesi skal fylgiseðlana fyrir öll lyfin sem eru tekin samhliða Bortezomib Hospira til upplýsinga um þau lyf áður en meðferð með Bortezomib Hospira er hafin. Þegar thalidomíð er notað þarf að gæta sérstaklega að þungunarprófunum og forvörnum til að koma í veg fyrir þungun (sjá „Meðganga og brjóstagið“ í þessum kafla).

Börn og unglingar

Ekki skal nota Bortezomib Hospira handa börnum og unglingum vegna þess að ekki er vitað hvaða áhrif lyfið hefur á þá.

Notkun annarra lyfja samhliða Bortezomib Hospira

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð.

Sérstaklega skal láta lækninn vita um lyf sem eru notuð og innihalda eitthvert eftirfarandi virkra efna:

- ketoconazol, notað til að meðhöndla sveppasýkingar
- ritonavir, notað við HIV sýkingu
- rifampicín, sýklalyf sem notað er við bakteríusýkingum
- carbamazepín, phenytoín eða phenobarbital, sem notuð eru til að meðhöndla flogaveiki
- jóhannesarjurt (*Hypericum perforatum*), sem er notuð við þunglyndi og öðrum kvillum
- sykursýkislyf til inntöku

Meðganga og brjóstagið

Ekki skal nota bortezomib á meðgöngu nema brýna nauðsyn beri til.

Konur sem geta orðið þungaðar verða að nota örugga getnaðarvörn meðan á meðferð stendur og í 8 mánuði eftir að henni lýkur. Ræddu við lækninn ef þú vilt láta frysta egg áður en meðferð er hafin.

Karlar skulu ekki geta barn meðan á notkun bortezomib stendur og þeir skulu nota örugga getnaðarvörn meðan á meðferð stendur og í allt að 5 mánuði eftir að meðferð lýkur. Ræddu við lækinn ef þú vilt láta varðveita sæði áður en meðferð er hafin.

Ekki skal gefa brjóst á meðan bortezomib er notað. Ræða skal við lækinn um hvenær sé óhætt að hefja aftur brjóstagjöf eftir að meðferð lýkur.

Thalidomíð veldur fæðingargöllum og fósturdauða. Þegar bortezomib er gefið í samsettri meðferð með thalidomíði verður að fylgja áætlun fyrir thalidomíð til að koma í veg fyrir þungun (sjá fylgiseðlinn fyrir thalidomíð).

Akstur og notkun véla

Bortezomib getur valdið þreytu, sundli, yfirliði eða þokusýn. Ekki aka eða stjórna tækjum eða vélum ef þú finnur fyrir slíkum aukaverkunum. Jafnvel þó að þú finnur ekki fyrir þeim skaltu gæta varúðar.

3. Hvernig nota á Bortezomib Hospira

Læknirinn mun reikna skammtinn af bortezomib út frá hæð þinni og þyngd (líkamsyfirborði). Venjulegur upphafsskammtur af bortezomib er 1,3 mg/m² líkamsyfirborðs tvisvar í viku.

Hugsanlegt er að læknirinn breyti skammtinum og fjölda meðferðarlota eftir því hvernig þú svarar meðferðinni, eftir því hvort ákveðnar aukaverkanir komi fram og með tilliti til undirliggjandi sjúkdóma (t.d. lifrarástand).

Versnandi mergæxli

Þegar bortezomib er gefið eitt sér eru gefnir 4 skammtar af bortezomib í bláæð eða undir húð á 1., 4., 8. og 11. degi og síðan er 10 daga „hvíldartímabil“ án meðferðar. Þetta 21 dags tímabil (3 vikur) samsvarar einni meðferðarlotu. Þú gætir fengið allt að 8 lotur (24 vikur).

Einnig er hugsanlegt að þú fái bortezomib ásamt lyfjunum pegýleruðu liposomal doxorubicini eða dexametasoni.

Þegar bortezomib er gefið ásamt pegýleruðu liposomal doxorubicini er bortezomib gefið í bláæð eða undir húð í 21 dags meðferðarlotu og pegýlerað liposomal doxorubicin 30 mg/m² er gefið á 4. degi, í 21 dags bortezomib-meðferðarlotunni með innrennsli í bláæð eftir inndælingu með bortezomibi.

Þú gætir fengið allt að 8 lotur (24 vikur).

Þegar bortezomib er gefið ásamt dexametasoni er bortezomib gefið í bláæð eða undir húð í 21 dags meðferðarlotu og dexametason 20 mg til inntöku á 1., 2., 4., 5., 8., 9., 11. og 12. degi í 21 dags bortezomib-meðferðarlotunni.

Þú gætir fengið allt að 8 lotur (24 vikur).

Áður ómeðhöndlað mergæxli

Ef þú hefur ekki fengið meðhöndlun áður við mergæxli og stofnfrumuígræðsla **hentar þér ekki** færð þú bortezomib ásamt tveimur öðrum lyfjum melfalan og prednisón.

Í slíku tilviki er lengd hverrar meðferðarlota 42 dagar (6 vikur). Þú munt fá 9 lotur (54 vikur).

- Í 1. til 4. lotu er bortezomib gefið tvisvar í viku á dögum 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29 og 32.
- Í 5. til 9. lotu er bortezomib gefið einu sinni í viku á dögum 1, 8, 22 og 29.

Melfalan (9 mg/m²) og prednisón (60 mg/m²) eru bæði gefin til inntöku á dögum 1, 2, 3 og 4 í fyrstu vikunni í hverri meðferðarlotu.

Ef þú hefur ekki fengið meðhöndlun áður við mergæxli og stofnfrumuígræðsla hentar þér færð þú bortezomib í bláæð eða undir húð ásamt lyfjunum dexametasoni eða dexametasoni og thalidomíði sem innleiðslumeðferð

Þegar bortezomib er gefið samhliða dexametasoni er bortezomib gefið í bláæð eða undir húð í 21 dags meðferðarlotu og dexametason 40 mg til inntöku á 1., 2., 3., 4., 8., 9., 10. og 11. degi í 21 dags bortezomib meðferðarlotu.

Þú munt fá 4 lotur (12 vikur).

Þegar bortezomib er gefið samhliða thalidomíði og dexametasoni er lengd meðferðarlotu 28 dagar (4 vikur).

Dexametason 40 mg til inntöku er gefið á 1., 2., 3., 4., 8., 9., 10. og 11. degi í 28 daga bortezomib-meðferðarlotunni og thalidomíð 50 mg er gefið daglega til inntöku að 14. degi fyrstu meðferðarlotu og ef það þolist vel er skammtur thalidomíðs aukinn í 100 mg frá 15.-28. dags og hugsanlega aukinn frekar í 200 mg í annarri lotu og eftirfylgjandi meðferðarlotum.

Þú gætir fengið allt að 6 lotur (24 vikur).

Áður ómeðhöndlað möttulfrumu eitlaæxli

Ef þú hefur ekki fengið meðhöndlun áður við möttulfrumu eitlaæxli færð þú bortezomib í bláæð eða undir húð ásamt lyfjunum rituximab, cyclophosphamíð, doxorubicin og prednisón.

Bortezomib er gefið í bláæð eða undir húð á 1., 4., 8. og 11. degi, síðan kemur „hvíldartímabil“ án meðferðar. Lengd meðferðarlotunnar er 21 dagur (3 vikur). Þú gætir fengið allt að 8 meðferðarlotur (24 vikur).

Eftirfarandi lyf eru gefin með innrennsli í bláæð á 1. degi hvernar 21 dags meðferðarlotu: Rituximab 375 mg/m², cyclophosphamíð 750 mg/m² og doxorubicin 50 mg/m². Prednisón 100 mg/m² er gefið til inntöku á 1., 2., 3., 4. og 5. degi bortezomib meðferðarlotunnar.

Bortezomib Hospira er gefið á eftirfarandi hátt

Lyfið er eingöngu ætlað til notkunar í bláæð eða undir húð. Bortezomib er gefið af heilbrigðisstarfsmanni sem hefur reynslu af notkun frumudrepandi lyfja.

Leysa þarf bortezomib duft upp áður en lyfið er gefið. Heilbrigðisstarfsmaður mun gera það. Fullbúinni lausninni er síðan dælt í bláæð eða undir húð. Inndæling í bláæð er hröð, tekur 3 til 5 sekúndur. Inndæling undir húð er annaðhvort gefin í læri eða kvið.

Ef þú færð of mikið af Bortezomib Hospira

Þar sem lækni eða hjúkrunarfræðingur gefa lyfið er ólíklegt að þú fái of mikið. Ef svo ólíklega vill til að um ofskömmtn sé að ræða þá fylgist lækniinn með þér með tilliti til aukaverkana.

4. Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum. Sumar þessara aukaverkana geta verið alvarlegar.

Ef þú færð bortezomib við mergæxli eða möttulfrumu eitlaæxli skaltu láta lækinn tafarlaust vita ef eitthvert eftirtalinna einkenna kemur fram:

- vöðvakrampi, vöðvamáttleysi.
- ringlun, sjónskerðing eða sjóntruflanir, blindi, flog, höfuðverkur.
- mæði, þroti á fótum eða breytingar á hjartslætti, hár blóðþrýstingur, þreyta, yfirlið.
- hósti og öndunarerfiðleikar eða þynsli fyrir brjósti.

Mjög algengt er að meðferð með bortezomib geti haft í för með sér fækkun rauðra og hvítra blóðkorna og blóðflagna. Taka þarf blóðsýni reglulega fyrir meðferð og meðan á meðferð með bortezomib stendur til að athuga fjölda blóðkorna. Fram getur komið fækkun:

- blóðflagna, sem haft getur í för með sér að minna þurfi til að valda marblettum, eða blæðingu án þess að um augljósan áverka sé að ræða (t.d. blæðing í þörmum, maga, munni og gómum eða í heila eða lifur).
- rauðra blóðkorna, sem getur valdið blóðleysi með einkennum eins og þreytu og fölva.
- hvítra blóðkorna sem haft getur í för með sér að minna þurfi til að valda sýkingum eða inflúensulíkum einkennum.

Hér á eftir eru taldar upp þær aukaverkanir sem þú gætir fengið ef þú notar bortezomib sem meðferð við mergæxli:

Mjög algengar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum)

- Viðkvæmni, dofi, náladofi eða sviðatilfinning í húð eða verkur í höndum eða fótum vegna taugaskemmda.
- Fækkun rauðra blóðkorna eða hvítra blóðkorna (sjá hér að framan).
- Hiti.
- Ógleði eða uppköst, lystarleysi.
- Hægðatregða með eða án uppþembu (getur verið veruleg).
- Niðurgangur: Ef niðurgangur kemur fram er áriðandi að drekka meira vatn en venjulega. Vera má að lækinn gefi annað lyf til að hafa stjórn á niðurgangnum.
- Þreyta, máttleysistilfinning.
- Vöðvaverkur, beinverkur.

Algengar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum)

- Lágur blóðþrýstingur, skyndilegt blóðþrýstingsfall, þegar staðið er upp, sem getur leitt til yfirliðs.
- Hár blóðþrýstingur.
- Skerðing á nýrnastarfsemi.
- Höfuðverkur.
- Almenn vanlíðan, verkur, svimi, sundl, máttleysistilfinning eða meðvitundarmissir.
- Skjálfti.
- Sýking, þ.m.t. lungnabólga, sýking í öndunarvegi, berkjubólga, sveppasýkingar, hósti með slímuppgangi, flensulík veikindi.
- Ristill (staðbundinn umhverfis augun eða dreifður um líkamann).
- Brjóstverkur eða mæði í tengslum við áreynslu.
- Mismunandi tegundir útbrot.
- Kláði í húð, hnúðar í húð og húðþurrkur.
- Roði í andliti eða sprungnar örfinar háræðar.
- Húðroði.
- Ofþornun.
- Brjóstsviði, uppþemba, ropi, vindgangur, magaverkur, blæðing frá þörmum eða maga.
- Breyting á lifrarástandi.
- Særindi í munni eða vörum, munnsár, munnsár eða særindi í hálsi.
- Þyngdartap, missir bragðskyns.
- Vöðvakrampar, vöðvakippir, vöðvamáttleysi, verkir í útlimum.
- Þokusýn.
- Sýking í ysta lagi augans og innra yfirborði augnloka (tárubólga).
- Blóðnasir.
- Erfiðleikar með svefn eða svefntruflanir, aukin svitamyndun, kvíði, skapsveiflur, depurð, eirðarleysi eða æsingur, breytingar á andlegu ástandi, vistarfíring.
- Þroti á líkamanum, þ.m.t. umhverfis augu og annars staðar á líkamanum.

Sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum)

- Hjartabilun, hjartaáfall, brjóstverkur, óþægindi fyrir brjósti, hraður eða hægur hjartsláttur.
- Nýrnabilun.
- Bláæðarbólga, blóðtappi í bláæðum og lungum.
- Vandamál tengd blóðstorknun.
- Ónógt blóðflæði.
- Bólga í himnunni sem umlykur hjartað eða vökvu umhverfis hjartað.
- Sýkingar, þ.m.t. þvagfærasýkingar, influensa, herpes veirusýkingar, sýking í eyra og húðnetjubólga.
- Blóðugar hægðir eða blæðing frá slímhúð, t.d. í munni, leggöngum.
- Kvillar í heilaæðum.
- Lömun, flog, fall, hreyfitruflanir, óeðlilegt eða breytt eða minnkað skyn (snertiskyn, heyrn, bragðskyn, lyktarskyn), athyglisruflun, skjálfti, vöðvakippir.
- Liðbólga, þ.m.t. bólga í fingra-, tá-, og kjálkaliðum.
- Sjúkdómar sem hafa áhrif á lungu, sem koma í veg fyrir að líkaminn fái nægjanlegt súrefni. Sumum þeirra fylgja öndunarerfiðleikar, mæði, mæði þrátt fyrir að ekki sé verið að reyna á sig, öndun verður grunn, erfið eða stöðvast, hvæsandi öndun.
- Hiksti, talerfiðleikar. Aukin eða minnkuð þvagmyndun (vegna nýrnaskemmda), sársaukafull þvaglát eða blóð/prótein í þvagi, vökvassöfnun.
- Breyting á meðvitund, ringlun, minnisskerðing eða minnistap.
- Ofnæmi.
- Heyrnarskerðing, heyrnarleysi eða suð fyrir eyrum, óþægindi í eyrum.
- Hormónaröskun sem getur haft áhrif á frásog salta og vatns.
- Ofvirkur skjaldkirtill.
- Ónóg insúlínframleiðsla eða ónæmi fyrir eðlilegum styrk insúlíns.
- Erting eða bólga í augum, óhóflega rök augu, verkur í augum, augnþurrkur, sýkingar í augum, hnúður á augnloki (augnaþrymill), rauð og þrútin augnlok, útferð úr augum, óeðlileg sjón, blæðing í auga.
- Eitlabólga.
- Stirðleiki í liðum eða vöðvum, þynslatilfinning, verkur í nára.
- Hárlos og óeðlileg áferð á hári.
- Ofnæmisviðbrögð.
- Roði eða verkur á stungustað.
- Verkur í munni.
- Sýking eða bólga í munni, sár í munni, vélinda, maga og þörmum, stundum fylgir verkur eða blæðing, lélegar þarmahreyfingar (m.a. þrengsli), óþægindi í kvið eða vélinda, kyngingarerfiðleikar, blóðug uppköst.
- Húðsýkingar.
- Bakteríu- og veirusýkingar.
- Tannsýking.
- Brisbólga, teppa í gallgöngum.
- Verkur í kynfærum, ristuflanir.
- Þyngdaraukning.
- Þorsti.
- Lífurarbólga.
- Kvillar sem tengjast stungustað eða inndælingartæki.
- Húðviðbrögð og kvillar í húð (sem geta verið alvarlegir og lífshættulegir), sár á húð.
- Marblettir, fall og áverkar.
- Bólga eða blæðing í æðum sem getur komið fram sem litlir rauðir eða fjólubláir dílar (venjulega á fótleggjum) eða sem stórir blettir sem líkjast marblettum undir húðinni eða vef.
- Góðkynja blöðrur.
- Alvarlegur, afturkræfur heilakvilli sem fylgir krampar, hár blóðþrýstingur, höfuðverkur, þreyta, ringlun, blinda eða aðrar sjóntruflanir.

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum)

- Hjartakvillar, m.a. hjartaáfall, hjartaöng.
- Andlitsroði.
- Mislitun æða.
- Bólga í mænutaug.
- Alvarleg taugabólga sem getur valdið lömun og öndunarerfiðleikum (Guillain-Barré heilkenni).
- Kvillar í eyrum, blæðing frá eyrum.
- Vanvirkni skjaldkirtils.
- Budd-Chiari heilkenni (klínísk einkenni sem orsakast af stíflu í bláæðum í lifur).
- Breytingar á þarmastarfsemi eða óeðlileg þarmastarfsemi.
- Blæðing í heila.
- Gulleit augu og húð (gula).
- Alvarleg ofnæmisviðbrögð (bráðafnæmislost), einkennin geta verið öndunarerfiðleikar, brjóstverkur eða þyngsli fyrir brjósti og/eða sundl/yfirlið, mikill kláði eða upphleyptir hnútar á húðinni, þroti í andliti, vörum, tungu og/eða hálsi sem getur valdið kyngingarerfiðleikum, lost.
- Kvillar í brjóstum.
- Rifur í leggöngum.
- Þroti í kynfærum.
- Óþol fyrir inntöku áfengis.
- Rýrnun eða líkamsmassatap.
- Aukin matarlyst.
- Fistill.
- Vökvasöfnun í lið.
- Blöðrur í liðhimnu (hálahimnubelgur).
- Beinbrot.
- Niðurbrot vöðvaþráða sem leiðir til fylgikvilla.
- Þroti í lifur, blæðing í lifur.
- Krabbamein í nýra.
- Kvilli í húð sem líkist psoriasis.
- Húðkrabbamein.
- Húðfölv.
- Aukinn fjöldi blóðflagna eða plasmáfrumna (ákveðin tegund hvítra blóðkorna) í blóðinu.
- Blóðkókkur í smáum æðum (segasmáæðakvilli).
- Óeðlileg viðbrögð við blóðgjöf.
- Sjónskerðing að einhverju leyti eða blinda.
- Minnkuð kynhvöt.
- Slef.
- Útstandandi augu.
- Ljósæmi.
- Hröð öndun.
- Verkur í endaparmi.
- Gallsteinar.
- Kviðslit.
- Meiðsli.
- Brothættar eða viðkvæmar neglur.
- Óeðlilegar útfellingar próteins í mikilvægum líffærum.
- Þá.
- Sár í meltingarvegi.
- Fjöllíffærabilun.
- Dauði.

Hér á eftir eru taldar upp þær aukaverkanir sem þú gætir fengið ef þú notar bortezomib ásamt öðrum lyfjum sem meðferð við möttulfrumu eitlaæxli:

Mjög algengar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum)

- Lungnabólga.
- Lystarleysi.

- Viðkvæmni, dofi, náladofi eða sviðatilfinning í húð eða verkur í höndum eða fótum vegna taugaskemmda.
- Ógleði og uppköst.
- Niðurgangur.
- Munnsár.
- Hægðatregða.
- Vöðvaverkir, beinverkir.
- Hármissir og óeðlileg áferð hárs.
- Þreyta, máttleysi.
- Hiti.

Algengar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum)

- Ristill (staðbundinn umhverfis augun eða dreifður um líkamann).
- Herpes veirusýkingar.
- Bakteríu- og veirusýkingar.
- Öndunarfærasýkingar, berkjubólga, hósti með slímuppgangi, flensulík veikindi.
- Sveppasýkingar.
- Ofnæmi.
- Ónóg insúlínframleiðsla eða ónæmi fyrir eðlilegum styrk insúlíns.
- Vökvasöfnun.
- Erfiðleikar með svefn eða svefntruflanir.
- Meðvitundarleysi.
- Breytt meðvitundarstig, ringlun.
- Sundl.
- Hraðari hjartsláttur, hár blóðþrýstingur, aukin svitamyndun.
- Óeðlileg sjón, þokusjón.
- Hjartabilun, hjartaáfall, brjóstverkur, óþægindi fyrir brjósti, hraður eða hægur hjartsláttur.
- Hár eða lágur blóðþrýstingur.
- Skyndilegt blóðþrýstingsfall þegar staðið er upp, sem getur leitt til yfirliðs.
- Mæði við áreynslu.
- Hósti.
- Hiksti.
- Suð fyrir eyrum, óþægindi í eyrum.
- Blæðing frá þörmum eða maga.
- Brjóstsviði.
- Magaverkur, uppþembá.
- Kyngingarerfiðleikar.
- Sýking eða bólga í maga og þörmum.
- Kviðverkur.
- Særindi í munni eða vörum, særindi í hálsi.
- Breyting á lifrarstarfsemi.
- Kláði í húð.
- Roði í húð.
- Útbrot.
- Vöðvakippir.
- Þvagfærasýking.
- Verkir í útlimum.
- Broti á líkamanum, þ.m.t. umhverfis augu og annars staðar á líkamanum.
- Skjálfti.
- Roði og verkur á stungustað.
- Almenn vanlíðan.
- Þyngdartap.
- Þyngdaraukning.

Sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum)

- Lifrabólga.
- Alvarleg ofnæmisviðbrögð (bráðafnæmisviðbrögð), einkennin geta verið öndunarerfiðleikar, brjóstverkur eða þyngsli fyrir brjósti, og/eða sundl/yfirlið, mikill kláði eða upphleyptir hnútar á húðinni, þroti í andliti, vörum, tungu og/eða hálsi, sem getur valdið kyngingarerfiðleikum, lost.
- Hreyfitruflanir, lömum, kippir.
- Svimi.
- Heyrnarskerðing, heyrnarleysi.
- Sjúkdómar sem hafa áhrif á lungu, sem koma í veg fyrir að líkaminn fái nægjanlegt súrefni. Sumum þeirra fylgja öndunarerfiðleikar, mæði, mæði þrátt fyrir að ekki sé verið að reyna á sig, öndun verður grunn, erfið eða stöðvast, hvæsandi öndun.
- Blóðtappi í lungum.
- Gulleit augu og húð (gula).
- Hnúður á augnloki (augnaþrymill), rauð og þrútin augnlok.

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum)

- Blóðkökkur í smáum æðum (seagasmáæðakvilli).
- Alvarleg taugabólga sem getur valdið lömum og öndunarerfiðleikum (Guillain-Barré heilkenni).

Tilkynning aukaverkana

Látið lækinn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5. Hvernig geyma á Bortezomib Hospira

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á hettuglasinu og öskjunni á eftir EXP.

Ekki þarf að geyma lyfið við sérstök hitaskilyrði.

Geymið hettuglasið í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

Nota skal blönduðu lausnina strax og hún er tilbúin. Ef tilbúin lausn er ekki notuð strax er geymslutími meðan á notkun stendur og geymsluskilyrðin fyrir notkun á ábyrgð notanda. Þó er blandaða lausnin stöðug í 8 klst. við 5°C og 25°C ef hún er geymd í upprunalegu hettuglasi og/eða sprautu og heildargeymslutími fullbunnar lausnar fyrir notkun má ekki vera lengri en 8 klst.

Bortezomib Hospira er eingöngu einnota. Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

Bortezomib Hospira inniheldur

Virka innihaldsefnið er bortezomib.

Bortezomib Hospira 1 mg stungulyfsstofn, lausn.

Hvert hettuglas með stofni inniheldur 1 mg af bortezomibi (sem mannitolbórester).

Bortezomib Hospira 2,5 mg stungulyfsstofn, lausn.

Hvert hettuglas með stofni inniheldur 2,5 mg af bortezomibi (sem mannitolbórester).

Bortezomib Hospira 3 mg stungulyfsstofn, lausn.

Hvert hettuglas með stofni inniheldur 3 mg af bortezomibi (sem mannítólbórester).

Bortezomib Hospira 3,5 mg stungulyfsstofn, lausn.

Hvert hettuglas með stofni inniheldur 3,5 mg af bortezomibi (sem mannítólbórester).

Blöndun fyrir notkun í bláæð:

Eftir blöndun inniheldur 1 ml af lausn til inndælingar í bláæð 1 mg af bortezomibi.

Blöndun fyrir notkun undir húð:

Eftir blöndun inniheldur 1 ml af lausn til inndælingar undir húð 2,5 mg af bortezomibi.

Önnur innihaldsefni eru mannítól (E421).

Lýsing á útliti Bortezomib Hospira og pakkningastærðir

Bortezomib Hospira stungulyfsstofn er hvít til beinhvít kaka eða duft.

Hver askja af 1 mg Bortezomib Hospira inniheldur silíkonhúðað 5 ml hettuglas úr gleri með gúmmítappa og álinnsigli.

Hver askja af 2,5 mg, 3 mg eða 3,5 mg Bortezomib Hospira inniheldur 10 ml hettuglas úr gleri með gúmmítappa og álinnsigli.

Markaðsleyfishafi

Pfizer Europe MA EEIG
Boulevard de la Plaine 17
1050 Bruxelles
Belgía

Framleiðandi

Pfizer Service Company BV,
Hoge Wei 10,
1930 Zaventem,
Belgía

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

AT

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.
Tel: +43 (0)1 521 15-0

BE

Pfizer SA/NV
Tél/Tel: +32 2 554 62 11

BG

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България
Тел.: +359 2 970 4333

CY

Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch)
Τηλ: +357 22817690

LV

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā
Tel.: + 371 670 35 775

LT

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje
Tel. + 370 52 51 4000

LU

Pfizer SA/NV
Tél/Tel: +32 2 554 62 11

HU

Pfizer Kft.
Tel: + 36 1 488 37 00

CZ

Pfizer, spol. s r.o.
Tel: +420-283-004-111

DK

Pfizer ApS
Tlf: + 45 44 20 11 00

DE

PFIZER PHARMA GmbH
Tel: + 49 (0)30 550055-51000

EE

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal
Tel: +372 666 7500

EL

Pfizer Ελλάς Α.Ε.
Τηλ.: +30 210 6785 800

ES

Pfizer, S.L.
Tel: +34 91 490 99 00

FR

Pfizer
Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40

HR

Pfizer Croatia d.o.o.
Tel: +385 1 3908 777

IE

Pfizer Healthcare Ireland Unlimited Company
Tel: 1800 633 363 (toll free)
+44 (0) 1304 616161

IS

Icepharma hf.
Sími: +354 540 8000

IT

Pfizer S.r.l.
Tel: +39 06 33 18 21

MT

Drugsales Ltd
Tel: +356 21 419 070/1/2

NL

Pfizer bv
Tel: +31 (0)800 63 34 636

NO

Pfizer AS
Tlf: +47 67 52 61 00

PL

Pfizer Polska Sp. z o.o.
Tel: +48 22 335 61 00

PT

Laboratórios Pfizer, Lda.
Tel: +351 21 423 55 00

RO

Pfizer România S.R.L.
Tel: +40 (0)21 207 28 00

SI

Pfizer Luxembourg SARL
Pfizer, podružnica za svetovanje s področja
farmacevtske dejavnosti, Ljubljana
Tel: +386 (0)1 52 11 400

SK

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka
Tel: +421-2-3355 5500

FI

Pfizer Oy
Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

SE

Pfizer AB
Tel: +46 (0)8 550 520 00

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu <https://www.ema.europa.eu>

Eftirfarandi upplýsingar eru eingöngu ætlaðar heilbrigðisstarfsfólki:

1. BLÖNDUN FYRIR INNDÆLINGU Í BLÁÆÐ

Ath.: Bortezomib Hospira er frumudrepandi lyf. Því skal gæta varúðar við meðhöndlun og blöndun. Mælt er með notkun hanska og annars hlífðarfatnaðar til að koma í veg fyrir að lyfið snerti húð.

SMITGÁT SKAL VIÐHÖFÐ VIÐ ALLA MEÐHÖNDLUN BORTEZOMIB HOSPIRA ÞAR SEM EKKERT ROTVARNAREFNI ER Í LYFINU.

- 1.1 **Undirbúningur 1 mg hettuglassins: bætið varlega 1,0 ml** af sæfðri, 9 mg/ml (0,9%) natríumklóríðlausn fyrir stungulyf í hettuglasið með Bortezomib Hospira duftinu með því að nota viðeigandi stærð af sprautu, án þess að fjarlægja tappann úr hettuglasinu. Frostþurrkaða duftið leysist upp á innan við 2 mínútum.

Undirbúningur 2,5 mg hettuglassins: bætið varlega 2,5 ml af sæfðri, 9 mg/ml (0,9%) natríumklóríðlausn fyrir stungulyf í hettuglasið með Bortezomib Hospira duftinu með því að nota viðeigandi stærð af sprautu, án þess að fjarlægja tappann úr hettuglasinu. Frostþurrkaða duftið leysist upp á innan við 2 mínútum.

Undirbúningur 3 mg hettuglassins: bætið varlega 3,0 ml af sæfðri, 9 mg/ml (0,9%) natríumklóríðlausn fyrir stungulyf í hettuglasið með Bortezomib Hospira duftinu með því að nota viðeigandi stærð af sprautu, án þess að fjarlægja tappann úr hettuglasinu. Frostþurrkaða duftið leysist upp á innan við 2 mínútum.

Undirbúningur 3,5 mg hettuglassins: bætið varlega 3,5 ml af sæfðri, 9 mg/ml (0,9%) natríumklóríðlausn fyrir stungulyf í hettuglasið með Bortezomib Hospira duftinu með því að nota viðeigandi stærð af sprautu, án þess að fjarlægja tappann úr hettuglasinu. Frostþurrkaða duftið leysist upp á innan við 2 mínútum.

Styrkur þeirrar lausnar sem myndast verður 1 mg/ml. Lausnin verður tær og litlaus með lokasýrustig 4 til 7. Ekki þarf að athuga sýrustig lausnarinnar.

- 1.2 Fyrir gjöf á að skoða lausnina með tilliti til agna og mislitunar. Verði vart við einhverja mislitun eða agnir verður að farga lausninni. Athugið styrkinn á hettuglasinu til að tryggja að gefinn sé réttur skammtur fyrir notkun í bláæð (1 mg/ml).
- 1.3 Blandaða lausnin er án rotvarnarefna og á að nota strax eftir blöndun. Þó hefur verið sýnt fram á efna- og eðlisfræðilegan stöðugleika í 8 klukkustundir við 25°C ef lyfið er geymt í upprunalegu hettuglasi og/eða sprautu fyrir gjöf. Heildargeymslutími blandaðs lyfs fyrir notkun má ekki vera lengri en 8 klukkustundir. Ef blandaða lausnin er ekki notuð strax, er geymslutími meðan á notkun stendur og geymsluskilyrðin fyrir notkun á ábyrgð notanda.

Ekki þarf að verja blandað lyf gegn ljósi.

2. LYFJAGJÖF

- Þegar lyfið er uppleyst skal draga upp rétt magn blandaðrar lausnar samkvæmt útreiknuðum skömmtum byggðum á líkamsyfirborði sjúklingsins.
- Athugið skammtinn og styrkinn í sprautunni fyrir notkun (athugið að sprautan sé merkt til notkunar í bláæð).
- Dælið lausninni sem stakri inndælingu í bláæð á 3-5 sekúndum um útlægan eða miðlægan æðalegg.
- Skolið útlæga eða miðlæga æðalegginn með sæfðri 9 mg/ml (0,9%) natríumklóríðlausn.

Bortezomib Hospira ER EINGÖNGU ÆTLAÐ TIL NOTKUNAR UNDIR HÚÐ EÐA Í BLÁÆÐ. Notið ekki aðrar íkomuleiðir. Gjöf í mænuvökva hefur valdið dauða.

3. FÖRGUN

Hettuglasið er eingöngu einnota og afgangslausninni verður að farga.

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

Lyfið er ekki lengur með markaðsleyfi

Eftirfarandi upplýsingar eru eingöngu ætlaðar heilbrigðisstarfsfólki:

1 mg, 2,5 mg, 3 mg og 3,5 mg hettuglasið er til notkunar undir húð, eins og lýst er hér að neðan.

1. BLÖNDUN FYRIR INNDÆLINGU UNDIR HÚÐ

Ath.: Bortezomib Hospira er frumudrepandi lyf. Því skal gæta varúðar við meðhöndlun og blöndun. Mælt er með notkun hanska og annars hlífðarfatnaðar til að koma í veg fyrir að lyfið snerti húð.

SMITGÁT SKAL VIÐHÖFÐ VIÐ ALLA MEÐHÖNDLUN BORTEZOMIB HOSPIRA ÞAR SEM EKKERT ROTVARNAREFNI ER Í LYFINU.

- 1.1 **Undirbúningur 1 mg hettuglassins: bætið varlega 0,4 ml** af sæfðri, 9 mg/ml (0,9%) natríumklóríðlausn fyrir stungulyf í hettuglasið með Bortezomib Hospira duftinu með því að nota viðeigandi stærð af sprautu, án þess að fjarlægja tappann úr hettuglasinu. Frostþurrkaða duftið leysist upp á innan við 2 mínútum.

Undirbúningur 2,5 mg hettuglassins: bætið varlega 1,0 ml af sæfðri, 9 mg/ml (0,9%) natríumklóríðlausn fyrir stungulyf í hettuglasið með Bortezomib Hospira duftinu með því að nota viðeigandi stærð af sprautu, án þess að fjarlægja tappann úr hettuglasinu. Frostþurrkaða duftið leysist upp á innan við 2 mínútum.

Undirbúningur 3 mg hettuglassins: bætið varlega 1,2 ml af sæfðri, 9 mg/ml (0,9%) natríumklóríðlausn fyrir stungulyf í hettuglasið með Bortezomib Hospira duftinu með því að nota viðeigandi stærð af sprautu, án þess að fjarlægja tappann úr hettuglasinu. Frostþurrkaða duftið leysist upp á innan við 2 mínútum.

Undirbúningur 3,5 mg hettuglassins: bætið varlega 1,4 ml af sæfðri, 9 mg/ml (0,9%) natríumklóríðlausn fyrir stungulyf í hettuglasið með Bortezomib Hospira duftinu með því að nota viðeigandi stærð af sprautu, án þess að fjarlægja tappann úr hettuglasinu. Frostþurrkaða duftið leysist upp á innan við 2 mínútum.

Styrkur þeirrar lausnar sem myndast verður 2,5 mg/ml. Lausnin verður tær og litlaus með lokasýrustig 4 til 7. Ekki þarf að athuga sýrustig lausnarinnar.

- 1.2 Fyrir gjöf á að skoða lausnina með tilliti til agna og mislitunar. Verði vart við einhverja mislitun eða agnir verður að farga lausninni. Athugið styrkinn á hettuglasinu til að tryggja að gefinn sé réttur skammtur fyrir notkun **undir húð** (2,5 mg/ml).
- 1.3 Blandaða lausnin er án rotvarnarefna og á að nota strax eftir blöndun. Þó hefur verið sýnt fram á efna- og eðlisfræðilegan stöðugleika í 8 klukkustundir við 25°C ef lyfið er geymt í upprunalegu hettuglasi og eða sprautu fyrir gjöf. Heildargeymslutími blandaðs lyfs fyrir notkun má ekki vera lengri en 8 klukkustundir. Ef blandaða lausnin er ekki notuð strax, er geymslutími meðan á notkun stendur og geymsluskilyrðin fyrir notkun á ábyrgð notanda.

Ekki þarf að verja blandað lyf gegn ljósi.

2. LYFJAGJÖF

- Þegar lyfið er uppleyst skal draga upp rétt magn blandaðrar lausnar samkvæmt útreiknuðum skömmtum byggðum á líkamsyfirborði sjúklingsins.
- Athugið skammtinn og styrkinn í sprautunni fyrir notkun (athugið að sprautan sé merkt til notkunar undir húð).
- Dælið lausninni undir húð, við 45-90° horn.

- Blandaða lausnin er gefin undir húð á lærum (hægra eða vinstra) eða kvið (hægra eða vinstra megin).
- Breyta á um stungustaði til þess að inndælingarnar gangi vel fyrir sig.
- Ef fram koma staðbundin viðbrögð á stungustað í kjölfar inndælingar Bortezomib Hospira undir húð er mælt með því annaðhvort að gefa vægari Bortezomib Hospira lausn (1 mg/ml í stað 2,5 mg/ml) undir húð eða skipta yfir í inndælingu í bláæð.

Bortezomib Hospira ER EINGÖNGU ÆTLAÐ TIL NOTKUNAR UNDIR HÚÐ EÐA Í BLÁÆÐ. Notið ekki aðrar íkomuleiðir. Gjöf í mænuvökva hefur valdið dauða.

3. FÖRGUN

Hettuglasið er eingöngu einnota og afgangslausninni verður að farga.

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

Lyfið er ekki lengur með markaðsleyfi