

**VIÐAUKI I**  
**SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS**

## 1. HEITI LYFS

Tenofovír disoproxil Viartis 245 mg filmuhúðaðar töflur.

## 2. INNIHALDSLÝSING

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 245 mg af tenófóvír tvísóproxíli (sem maleat).

### Hjálparefni með þekkta verkun

Hver tafla inniheldur 155 mg af laktósa einhýdrati.

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1.

## 3. LYFJAFORM

Filmuhúðuð tafla.

Ljósbláar, kringlóttar, tvíkúptar filmuhúðaðar töflur 12,20 mm ± 0,20 mm að þvermáli, merktar með „TN245“ á annarri hliðinni og „M“ á hinn hliðinni.

## 4. KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR

### 4.1 Ábendingar

#### HIV-1 sýking

Tenófóvír tvísóproxíl 245 mg filmuhúðaðar töflur eru ætlaðar ásamt öðrum lyfjum gegn retróveirum til meðferðar á fullorðnum einstaklingum, sem eru sýktir af HIV-1.

Hjá fullorðnum eru niðurstöður um gagnsemi tenófóvír tvísóproxíls við HIV-1 sýkingu byggðar á einni rannsókn á sjúklingum sem ekki höfðu fengið meðferð áður, þ.m.t. sjúklingum með mikinn veirufjölda (> 100.000 eintök/ml) og rannsóknum þar sem tenófóvír tvísóproxíli var bætt við stöðuga meðferð sem enn stóð yfir (einkum meðferð með þremur andretróveirulyfjum) hjá sjúklingum þar sem fyrri meðferð nægði ekki til að halda veirufjölda í skefjum (< 10.000 eintök/ml, þar sem meirihluti sjúklinga hafði < 5.000 eintök/ml).

Tenófóvír tvísóproxíl 245 mg filmuhúðaðar töflur eru einnig ætlaðar til meðferðar á unglingum sem eru sýktir af HIV-1 og með ónæmi gegn NRTI eða eiturverkanir sem koma í veg fyrir notkun lyfja sem eru fyrsti valkostur, á aldrinum 12 til < 18 ára.

Valið á tenófóvír tvísóproxíli til að meðhöndla HIV-1 sýkta sjúklinga sem hafa fengið meðferð með andretróveirulyfjum áður skal byggt á veirunæmisprófum og/eða meðferðarsögu hvers sjúklings fyrir sig.

#### Sýking af völdum lifrabólgu B

Tenófóvír tvísóproxíl 245 mg filmuhúðaðar töflur eru ætlaðar sem meðferð við langvinnri lifrabólgu B hjá fullorðnum með:

- lifrarsjúkdóm í jafnvægi ásamt merkjum um virka veirufjölgun, með viðvarandi hækkun á gildum alanín amínótransferasa (ALAT) í sermi og vefjafræðileg einkenni um virka bólgu og/eða bandvefsaukningu (sjá kafla 5.1).

- merki um lifrabólguveiru B, ónæma fyrir lamívúdíni (sjá kafla 4.8 og 5.1).
- lifrarsjúkdóm með lifrabilun (sjá kafla 4.4, 4.8 og 5.1).

Tenófóvír tvísóproxíl 245 mg filmuhúðaðar töflur eru gefnar sem meðferð við langvinnri lifrabólgu B hjá unglingum á aldrinum 12 til < 18 ára með:

- lifrarsjúkdóm í jafnvægi og merki um virkan sjúkdóm í ónæmiskerfi, þ.e. virka veirufjölgun, viðvarandi hækkun á ALAT gildum í sermi, eða vefjafræðileg einkenni um miðlungsmikla eða verulega bólgu og/eða bandvefsaukningu. Hvað varðar ákvörðun um að hefja meðferð hjá börnum, sjá kafla 4.2, 4.4, 4.8 og 5.1.

## 4.2 Skammtar og lyfjagjöf

Meðferð skal hafin af lækni með reynslu í meðferð HIV-sýkinga og/eða meðferð langvinnrar lifrabólgu B.

### Skammtar

#### *Fullorðnir*

Ráðlagður skammtur af tenófóvír tvísóproxíli við meðferð gegn HIV eða við meðferð gegn langvinnri lifrabólgu B er 245 mg (ein tafla) á dag til inntöku með mat.

Ákvörðunin um að hefja meðferð hjá börnum (unglingum) þarf að byggjast á vandlegri íhugun á þörfum hvers sjúklings og með hliðsjón af gildandi leiðbeiningum um meðferð hjá börnum, þar með talið gildi vefjafræðilegra upplýsinga í upphafi. Meta skal ávinninginn af langvarandi veirubælingu samhliða áframhaldandi meðferð gegn áhættunni af langvarandi meðferð, þar með talið tilkomu ónæmrar lifrabólgu B veiru og óvissu um langtímaáhrif eiturverkana á bein og nýru (sjá kafla 4.4).

Hækkun á ALAT gildum í sermi skal vera viðvarandi í a.m.k. 6 mánuði fyrir meðferð hjá börnum með lifrarsjúkdóm í jafnvægi vegna HBeAg jákvæðrar langvinnrar lifrabólgu B; og í a.m.k. 12 mánuði hjá sjúklingum með HBeAg-neikvæðan sjúkdóm.

#### *Lengd meðferðar hjá fullorðnum og börnum með langvinna lifrabólgu B*

Ákjósanlegasta lengd meðferðar er óþekkt. Íhuga má að hætta meðferð við eftirfarandi aðstæður:

- Hjá HBeAg jákvæðum sjúklingum sem ekki eru með skorpulifur skal gefa meðferð í minnst 12 mánuði eftir að HBe mótefnavending (hvarf HBeAg og hvarf HBV DNA ásamt staðfestum mótefnum gegn HBe í tveimur sermissýnum í röð með a.m.k. 3-6 mánaða millibili) hefur verið staðfest eða fram að HBs mótefnavendingu eða þar til verkun hverfur (sjá kafla 4.4). Reglulega skal fylgjast með ALAT gildum í sermi og HBV DNA gildum að lokinni meðferð til að greina megi veirufræðilegt bakslag.
- Hjá HBeAg neikvæðum sjúklingum sem ekki eru með skorpulifur skal gefa meðferð minnst fram að HBs mótefnavendingu eða þar til verkun hverfur greinilega. Einnig má íhuga að hætta meðferð eftir að stöðugri veirubælingu hefur verið náð (þ.e. í að minnsta kosti 3 ár), að því gefnu að fylgst sé reglulega með ALAT gildum í sermi og HBV DNA gildum að lokinni meðferð til að greina megi síðkomið veirufræðilegt bakslag. Ef lengri meðferð stendur lengur en 2 ár er mælt með reglulegu mati til staðfestingar því að viðeigandi sé fyrir sjúklinginn að halda meðferð áfram.

Hjá fullorðnum sjúklingum með vantempraðan lifrarsjúkdóm eða skorpulifur er ekki mælt með að meðferð sé hætt.

Til meðferðar við HIV-1 sýkingu og langvinnri lifrabólgu B hjá fullorðnum þar sem skömmtun í föstu formi er ekki viðeigandi. Athuga má hvort önnur hentug lyfjaform eru í boði.

Tenofovír disoproxil Viatris fæst aðeins sem 245°mg filmuhúðaðar töflur. Athuga má hvort önnur hentug lyfjaform eru í boði.

#### *Börn*

*HIV-1:* Fyrir unglunga á aldrinum 12 til < 18 ára sem vega  $\geq 35$  kg er ráðlagður skammtur af tenófóvír tvísóproxíli 245 mg (ein tafla) á dag til inntöku með mat (sjá kafla 4.8 og 5.1).

Minni skammtar af tenófóvír tvísóproxíli eru notaðir til meðferðar á HIV-1 sýktum börnum á aldrinum 2 til < 12 ára. Þar sem Tenofovír disoproxil Viatris fæst aðeins sem 245°mg filmuhúðaðar töflur hentar það ekki til notkunar hjá börnum á aldrinum 2 til < 12 ára. Athuga má hvort önnur hentug lyfjaform eru í boði.

Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi og verkun tenófóvír tvísóproxíls hjá börnum yngri en 2 ára sem eru sýktir af HIV-1. Engar upplýsingar liggja fyrir.

*Langvinn lifrabólga B:* Fyrir unglunga á aldrinum 12 til < 18 ára sem vega  $\geq 35$  kg er ráðlagður skammtur af tenófóvír tvísóproxíli 245 mg (ein tafla) á dag til inntöku með mat (sjá kafla 4.8 og 5.1). Ákjósanlegasta lengd meðferðar er óþekkt sem stendur.

Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi og verkun tenófóvír tvísóproxíls hjá börnum á aldrinum 2 til < 12 ára eða sem vega < 35 kg og eru með langvinna lifrabólgu B. Engar upplýsingar liggja fyrir.

Til meðferðar við HIV-1 sýkingu og langvinnri lifrabólgu B hjá unglingum á aldrinum 12 til < 18 ára þar sem skömmtun í föstu formi er ekki viðeigandi. Athuga má hvort önnur hentug lyfjaform eru í boði.

#### *Skammtur sem gleymist*

Ef sjúklingur tekur ekki skammt af tenófóvír tvísóproxíli en innan við 12 klst. hafa liðið frá þeim tíma þegar skammturinn er venjulega tekinn, skal sjúklingurinn taka tenófóvír tvísóproxíl með mat eins fljótt og auðið er og halda áfram eðlilegri skammtaáætlun. Ef meira en 12 klst. hafa liðið síðan sjúklingur átti að taka skammtinn af tenófóvír tvísóproxíli og nánast er komið að næsta skammti skal sjúklingur ekki taka skammtinn sem gleymdist heldur halda áfram venjulegri skammtaáætlun.

Ef sjúklingurinn kastar upp innan 1 klst. eftir töku tenófóvír tvísóproxíls, skal taka aðra töflu. Ef sjúklingurinn kastar upp meira en 1 klst. eftir töku tenófóvír tvísóproxíls þarf hann ekki að taka annan skammt.

#### Sérstakir sjúklingahópar

##### *Aldraðir*

Engar upplýsingar liggja fyrir um ráðlagðan skammt fyrir sjúklinga eldri en 65 ára (sjá kafla 4.4).

##### *Skert nýrnastarfsemi*

Tenófóvír skilst út um nýru og útsetning fyrir tenófóvíri eykst hjá sjúklingum með truflun á nýrnastarfsemi.

#### Fullorðnir

Takmörkuð gögn liggja fyrir um öryggi og verkun tenófóvír tvísóproxíls hjá fullorðnum sjúklingum með miðlungsskerta eða alvarlega skerta nýrnastarfsemi (kreatínínúthreinsun < 50 ml/mín.) og langtíma öryggisgögn hafa ekki verið metin hvað varðar væga skerðingu á nýrnastarfsemi (kreatínínúthreinsun 50-80 ml/mín.). Þess vegna á aðeins að nota tenófóvír tvísóproxíl fyrir fullorðna sjúklinga með skerta nýrnastarfsemi ef hugsanlegur ávinningur af meðferð telst vega þyngra en áhætta. Ráðlagt er að gefa tenófóvír tvísóproxíl 33 mg/g kyrni til að veita minni daglegan skammt af tenófóvír tvísóproxíli fyrir fullorðna sjúklinga með kreatínínúthreinsun < 50 ml/mín., þ.m.t. sjúklinga í blóðskilun.

*Væg skerðing á nýrnastarfsemi (kreatínínúthreinsun 50-80 ml/mín.)*

Takmarkaðar upplýsingar úr klínískum rannsóknum styðja skammtun 245 mg tenófóvír tvísóproxíls einu sinni á dag fyrir sjúklinga með væga skerðingu á nýrnastarfsemi.

*Miðlungsskert nýrnastarfsemi (kreatínínúthreinsun 30-49 ml/mín.)*

Þar sem ekki er hægt að gefa minni skammta með 245 mg töflunni má nota lengri skammtabil þegar 245 mg filmuhúðaðar töflur eru notaðar. Gefa má 245 mg tenófóvír tvísóproxíl á 48 klst. fresti byggt á líkanagerð varðandi lyfjahvarfaupplýsingar við notkun stakskammts hjá einstaklingum sem voru HIV-neikvæðir eða ekki sýktir af HBV en höfðu mismunandi stig skertrar nýrnastarfsemi, þar með talið nýrnasjúkdóm á lokastigi sem krefst blóðskilunar, en sem ekki hefur verið staðfest í klínískum rannsóknum. Því skal hafa náið eftirlit með klínískri svörun við meðferð og nýrnastarfsemi hjá þessum sjúklingum (sjá kafla 4.4 og 5.2).

*Alvarlega skert nýrnastarfsemi (kreatínínúthreinsun < 30 ml/mín.) og sjúklingar í blóðskilun*

Ekki er hægt að aðlaga skammta með fullnægjandi hætti þar sem mismunandi styrkleikar taflna eru ekki í boði og því er ekki mælt með notkun lyfsins hjá þessum hópi sjúklinga. Nota má lengri skammtabil ef engin önnur meðferð er í boði, með eftirfarandi hætti:

Alvarlega skert nýrnastarfsemi: gefa má 245 mg tenófóvír tvísóproxíl á 72-96 klst. fresti (skammtað tvisvar í viku).

Sjúklingar í blóðskilun: gefa má 245 mg tenófóvír tvísóproxíl á 7 daga fresti að lokinni blóðskilunarlotu.\*

Þessar aðlaganir á bilum milli skammta hafa ekki verið staðfestar í klínískum rannsóknum. Hermilíkön gefa til kynna að lenging skammtabíla með tenófóvír tvísóproxíl 245 mg filmuhúðuðum töflum sé ekki ákjósanlegur kostur og geti valdið auknum eituráhrifum og hugsanlega ónógri svörun. Því skal hafa náið eftirlit með klínískri svörun við meðferð og nýrnastarfsemi (sjá kafla 4.4 og 5.2).

\*Almennt, skammtagjöf einu sinni í viku miðað við 3 blóðskilunarlotur á viku, sem hver um sig er u.þ.b. 4 klst. að lengd, eða eftir samtals 12 klst. af blóðskilun.

Ekki er unnt að gefa niðurstöðu um skammtaráðleggingar fyrir sjúklinga sem ekki eru í blóðskilun með kreatínínúthreinsun < 10 ml/mín.

### Börn

Ekki er mælt með notkun tenófóvír tvísóproxíls hjá börnum með skerta nýrnastarfsemi (sjá kafla 4.4).

### *Skert lifrastarfsemi*

Engar skammtaaðlögunar er þörf hjá sjúklingum með skerta lifrastarfsemi (sjá kafla 4.4 og 5.2).

Ef hætt er að gefa tenófóvír tvísóproxíl sjúklingum með langvinna lifrabólgu B hvort sem þeir eru samhliða sýktir af HIV eða ekki skal hafa náið eftirlit með þessum sjúklingum til að leita vísbendinga um versnun lifrabólgu (sjá kafla 4.4).

### Lyfjagjöf

Tenofovír disoproxil Viatris töflur eru til inntöku með mat einu sinni á dag.

Í undantekningartilvikum má hins vegar gefa sjúklingum Tenofovír disoproxil Viatris 245 mg filmuhúðaðar töflur með því að leysa töfluna upp í að minnsta kosti 100 ml af vatni, appelsínusafa eða vínberjasafa.

## **4.3 Frábendingar**

Ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefna sem talin eru upp í kafla 6.1.

#### 4.4 Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun

##### Almennt

Bjóða skal öllum HBV sýktum sjúklingum upp á HIV mótefnaþæfingu áður en meðferð með tenófóvír tvísóproxíli er hafin (sjá hér á eftir *Samhliða sýking HIV-1 og lifrabólgu B*).

##### *Langvinn lifrabólga B*

Sjúklingar skulu hafa í huga að ekki hefur verið sýnt fram á að tenófóvír tvísóproxíl komi í veg fyrir HBV-smit með kynmökum eða blóðblöndun. Viðhalda skal áfram viðeigandi varúðarráðstöfunum.

##### Samhliða lyfjagjöf með öðrum lyfjum

- Ekki skal gefa Tenofovir disoproxil Viatrix samhliða öðrum lyfjum sem innihalda tenófóvír tvísóproxíl eða tenófóvír alafenamíð.
- Ekki skal gefa Tenofovir disoproxil Viatrix samhliða adefóvír tvípróvíli.
- Samhliða gjöf tenófóvír tvísóproxíls og dídanósíns er ekki ráðlögð (sjá kafla 4.5).

##### Þrífætt meðferð með núkleósíðum/núkleótíðum

Greint hefur verið frá hárrí tíðni þess að ekki tækist að halda veirufjölda í skefjum og að fram kæmi lyfjaónæmi, hvoru tveggja á fyrstu stigum meðferðar hjá HIV sjúklingum, þegar tenófóvír tvísóproxíl var gefið samhliða lamívúdíni og abacavíri og einnig samhliða lamívúdíni og dídanósíni sem meðferð einu sinni á dag.

##### Áhrif á nýru og bein hjá fullorðnum

###### *Áhrif á nýru*

Tenófóvír skilst aðallega út um nýru. Tilkynnt hefur verið um nýrnabilun, skerta nýrnastarfsemi, kreatínínhækkun, blóðfosfatsskort og aðlagan píplukvilla (þ.m.t. Fanconi heilkenni) við klínísku notkun tenófóvírs tvísóproxíls (sjá kafla 4.8).

###### *Eftirlit með nýrnastarfsemi*

Mælt er með að ákvarða kreatínínúthreinsun hjá öllum sjúklingum áður en meðferð með tenófóvír tvísóproxíli er hafin og einnig að haft sé eftirlit með nýrnastarfsemi (kreatínínúthreinsun og þétni fosfats í sermi) eftir tvær til fjórar vikur meðferðar, eftir þrjá mánuði meðferðar og á þriggja til sex mánaða fresti eftir það hjá sjúklingum án áhættuþátta hvað varðar nýru. Tíðara eftirlit þarf með nýrnastarfsemi hjá sjúklingum sem eiga skerta nýrnastarfsemi á hættu.

###### *Umsjón með nýrnastarfsemi*

Ef þétni fosfats í sermi er < 1,5 mg/dl (0,48 mmól/l) eða kreatínínúthreinsun lækkuð í < 50 ml/mín. hjá fullorðnum sjúklingi sem fær tenófóvír tvísóproxíl, skal nýrnastarfsemi metin aftur innan viku, þ.m.t. með mælingum á þétni glúkósa í blóði, kalíum í blóði og glúkósa í þvagi (sjá kafla 4.8, aðlagur píplukvilli). Íhuga skal jafnframt að stöðva meðferð með tenófóvír tvísóproxíli hjá fullorðnum sjúklingum með minnkun kreatínínúthreinsunar í < 50 ml/mín. eða lækkuð þétni fosfats í sermi í < 1,0 mg/dl (0,32 mmól/l). Einnig má íhuga að rjúfa meðferð með tenófóvír tvísóproxíli ef nýrnastarfsemi versnar smátt og smátt og engar aðrar orsakir liggja fyrir.

###### *Samhliða lyfjagjöf og hætta á eiturveikunum á nýru*

Forðast skal notkun tenófóvír tvísóproxíls ef verið er að gefa lyf með eiturveikun á nýru eða þau verið notuð nýverið (s.s. amínóglúkósíð, amfóterísín B, foskarnet, gancíklóvír, pentamídín, vankómýsín, cidófóvír eða interleukín-2). Sé samhliða notkun tenófóvír tvísóproxíls og lyfja með eiturveikun á nýru óhjákvæmileg, skal fylgjast vikulega með nýrnastarfsemi sjúklinga.

Tilkynnt hefur verið um tilvik bráðrar nýrnabilunar eftir að meðferð var hafin með stórum skömmtum af bólgueyðandi gigtarlyfjum (NSAIDs) eða fleiri en einu bólgueyðandi gigtarlyfi, hjá sjúklingum sem fengu meðferð með tenófóvír tvísóproxíli og sem voru með áhættuþætti hvað varðar truflun á

nýrnastarfsemi. Ef tenófóvír tvísóproxíl er gefið samhliða bólgueyðandi gigtarlyfi, skal fylgjast með nýrnastarfsemi á fullnægjandi hátt.

Tilkynnt hefur verið um aukna hættu á skertri nýrnastarfsemi hjá sjúklingum sem fá tenófóvír tvísóproxíl samhliða próteasahemli örvaðan af rítónavíri eða kóbístatí. Þörf er á nánu eftirliti með nýrnastarfsemi hjá þessum sjúklingum (sjá kafla 4.5). Hjá sjúklingum með áhættuþætti hvað varðar nýru þarf að leggja vandlegt mat á samhliða lyfjagjöf tenófóvír tvísóproxíls með örvuðum próteasahemli.

Tenófóvír tvísóproxíl hefur ekki verið metið klínískt hjá sjúklingum á lyfjum sem skiljast út með sömu flutningsleið í nýra, þ.m.t. flutningspróteinin *human organic anion transporter* (hOAT) 1 og 3 eða MRP 4 (s.s. cídófóvír, lyf þekkt fyrir eiturvekun á nýru). Þessi nýrnaflutningsprótein gætu verið ábyrg fyrir seytun í nýrnapiplum og að hluta til fyrir brottþvari tenófóvírs og cídóvírs í nýrum. Þess vegna gætu lyfjahvörf þessara efna sem seytast um sömu flutningsleið í nýra, þ.m.t. flutningspróteinin hOAT 1 og 3 eða MRP 4, breyst ef þau eru gefin saman. Samtímis notkun þessara lyfja sem seytast um sömu flutningsleið í nýra er ekki ráðlögð nema hún sé óhjákvæmileg. Ef svo er skal fylgjast með nýrnastarfsemi vikulega (sjá kafla 4.5).

#### *Skert nýrnastarfsemi*

Öryggi tenófóvír tvísóproxíls hvað varðar nýrun hefur aðeins verið rannsakað að mjög takmörkuðu leyti hjá fullorðnum sjúklingum með skerta nýrnastarfsemi (kreatínínúthreinsun < 80 ml/mín.).

*Fullorðnir sjúklingar með kreatínínúthreinsun < 50 ml/mín., þar með taldir sjúklingar í blóðskilun*  
Takmörkuð gögn liggja fyrir varðandi öryggi og verkun tenófóvír tvísóproxíls hjá sjúklingum með skerta nýrnastarfsemi. Þess vegna á aðeins að nota tenófóvír tvísóproxíl ef hugsanlegur ávinningur af meðferð telst vega þyngra en áhætta. Hjá sjúklingum með alvarlega skerta nýrnastarfsemi (kreatínínúthreinsun < 30 ml/mín.) og hjá sjúklingum sem þurfa á blóðskilun að halda er ekki mælt með notkun tenófóvír tvísóproxíls. Ef engin önnur meðferð er fyrir hendi þarf að aðlagja bil milli skammta og hafa skal náð eftirlit með nýrnastarfsemi (sjá kafla 4.2 og 5.2).

#### *Áhrif á bein*

Afbrigðileiki í beinum eins og beinmeyra, sem getur komið fram sem þrálátur eða versnandi beinverkur og getur í sjaldgæfum tilvikum stuðlað að broti, getur tengst aðlægun píplukvilla í nýrum af völdum tenófóvír tvísóproxíls (sjá kafla 4.8).

Greint hefur verið frá minnkaðri beinþéttni með tenófóvír tvísóproxíli í slembiröðuðum klínískum samanburðarrannsóknum sem stóðu í allt að 144 vikur hjá sjúklingum sem voru sýktir af HIV eða HBV (sjá kafla 4.8 og 5.1). Minnkuð beinþéttni batnaði venjulega eftir að meðferð var hætt.

Í öðrum rannsóknum (framsýnum og þversniðs) kom mesta lækkunin á beinþéttni fram hjá sjúklingum sem fengu meðferð með tenófóvír tvísóproxíli sem hluta meðferðar sem innihélt örvaðan próteasahemil.

Á heildina litið, í ljósi afbrigðileika í beinum í tengslum við tenófóvír tvísóproxíl og takmarkana langtímagagna um áhrif tenófóvír tvísóproxíls á heilbrigði beina og hættu á beinbrotum, skal íhuga skal aðrar meðferðaráætlanir handa sjúklingum með beinþynningu eða með sögu um beinbrot. Ef grunur leikur á afbrigðileika í beinum eða slíkt greinist skal leita viðeigandi sérfræðiráðgjafar.

#### Áhrif á nýru og bein hjá börnum

Óvissa ríkir varðandi langtímaáhrif eiturvekana á bein og nýru. Auk þess er ekki fyllilega ljóst hvort eiturvekanir á nýru séu afturkræfar. Því er mælt með þverfaglegri aðkomu til að meta ávinning/áhættu af meðferð í hverju tilfelli fyrir sig, ákvarða viðeigandi eftirlit meðan á meðferð stendur (m.a. hvort hætta eigi meðferð) og íhuga þörf á viðbótarmeðferð.

### *Áhrif á nýru*

Tilkynnt var um aukaverkanir á nýru sem samrýmdust aðlægum píplukvilla í nýrum hjá HIV-1 sýktum börnum á aldrinum 2 til < 12 ára í klínísku rannsókninni GS-US-104-0352 (sjá kafla 4.8 og 5.1).

### *Eftirlit með nýrnastarfsemi*

Meta skal nýrnastarfsemi (kreatínínúthreinsun og fosfat í sermi) fyrir meðferð og hafa eftirlit með henni meðan á meðferð stendur eins og hjá fullorðnum (sjá hér að ofan).

### *Umsjón með nýrnastarfsemi*

Ef þétni fosfats í sermi er staðfest sem < 3,0 mg/dl (0,96 mmól/l) hjá barni sem fær tenófóvír tvísóproxíl, skal nýrnastarfsemi metin aftur innan viku, þ.m.t. með mælingum á þétni glúkósa í blóði, kalíum í blóði og glúkósa í þvagi (sjá kafla 4.8, aðlægur píplukvilli). Ef grunur leikur á afbrigðileika í nýrum eða slíkt greinist skal leita viðeigandi sérfræðiráðgjafar hjá nýrnasérfræðingi til þess að ákveða hvort rjúfa skuli meðferð með tenófóvír tvísóproxíli. Einnig má íhuga að rjúfa meðferð með tenófóvír tvísóproxíli ef nýrnastarfsemi versnar smátt og smátt og engar aðrar orsakir liggja fyrir.

### *Samhliða lyfjagjöf og hætta á eiturveikunum á nýru*

Sömu ráðleggingar eiga við og hjá fullorðnum (sjá hér að ofan).

### *Skert nýrnastarfsemi*

Ekki er mælt með notkun tenófóvír tvísóproxíls hjá börnum með skerta nýrnastarfsemi (sjá kafla 4.2). Ekki skal hefja notkun tenófóvír tvísóproxíls hjá börnum með skerta nýrnastarfsemi og hætta skal gjöf hjá börnum sem verða fyrir skertri nýrnastarfsemi meðan á meðferð með tenófóvír tvísóproxíli stendur.

### *Áhrif á bein*

Tenófóvír tvísóproxíl gæti dregið úr beinþétni. Áhrif breytinga á beinþétni í tengslum við tenófóvír tvísóproxíl á langtíma heilbrigði beina eða hættu á beinbrotum í framtíðinni eru óviss (sjá kafla 5.1).

Ef afbrigðileiki í beinum greinist hjá börnum eða ef grunur leikur á slíku skal leita sérfræðiráðgjafar hjá innkirtlasérfræðingi og/eða nýrnasérfræðingi.

### Liffrarsjúkdómar

Upplýsingar varðandi öryggi og verkun eru mjög takmarkaðar hvað varðar lifrarþega.

Takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um öryggi og verkun tenófóvír tvísóproxíls hjá HBV sýktum sjúklingum með liffrarsjúkdóm með lifrabílu og stig > 9 samkvæmt Child-Pugh-Turcotte-skalanum (CPT). Þessir sjúklingar kunna að eiga meiri hættu á alvarlegum aukaverkunum á lifur og nýru. Því skal hafa náið eftirlit með lifrar/galls- og nýrnagildum hjá þessum sjúklingahópi.

### *Versnun lifrabólgu*

*Versnun meðan á meðferð stendur:* Sjálfkrafa versnun langvinnrar lifrabólgu B er nokkuð algeng og einkennist af skammvinnri hækkun ALAT gilda í sermi. Þegar andveirumeðferð hefur verið hafin er hugsanlegt að ALAT gildi í sermi hækki hjá sumum sjúklingum (sjá kafla 4.8). Hjá sjúklingum með liffrarsjúkdóm í jafnvægi hafði þessi hækkun ALAT gilda í sermi yfirleitt ekki í för með sér hækkun á styrk gallrauða eða lifrabílu. Sjúklingar með skorpulifur geta átt meiri hættu á liffrarsjúkdómi með lifrabílu í kjölfar versnunar lifrabólgu og því á að hafa náið eftirlit með þeim meðan á meðferð stendur.

*Versnun eftir að meðferð er hætt:* Einnig hefur verið tilkynnt um bráða versnun lifrabólgu hjá sjúklingum sem hafa hætt meðferð gegn lifrabólgu B. Versnun eftir meðferð tengist venjulega hækkun HBV DNA og gengur oftast til baka af sjálfu sér. Hins vegar hefur verið tilkynnt um alvarlega versnun, þ.m.t. dauðsföll. Fylgjast skyldi með lifrastarfsemi með reglulegu millibili, bæði með klínísku eftirliti og rannsóknum, í minnst 6 mánuði eftir að meðferð gegn lifrabólgu B er hætt. Ef við á má fyrirskipa að meðferð gegn lifrabólgu B sé hafin á ný. Hjá sjúklingum með langt genginn



lifransjúkdóm eða skorpulífur er ekki mælt með að meðferð sé hætt þar sem versnun lifrabólgu eftir að meðferð lýkur gæti leitt til lifrabilunar.

Versnun lifrarástands er einkar alvarleg og getur jafnvel valdið dauða hjá sjúklingum með lifransjúkdóm með lifrabilun.

*Samhliða sýking lifrabólgu C eða D:* Engin gögn liggja fyrir um verkun tenófóvírs hjá sjúklingum með samhliða sýkingu af völdum lifrabólguveiru C eða D.

*Samhliða sýking HIV-1 og lifrabólgu B:* Vegna hættu á myndun HIV ónæmis skal aðeins nota tenófóvír tvísóproxíl sem hluta af viðeigandi lyfjasamsetningu gegn retróveirum hjá sjúklingum sem eru samhliða sýktir af HIV/HBV. Hjá sjúklingum, sem fyrir hafa starfstruflun í lifur, þ.m.t. langvinna, virka lifrabólgu, er aukin tíðni afbrigðilegrar lifrarstarfsemi við samsetta meðferð gegn retróveirum (CART, *combination antiretroviral therapy*) og skal hafa eftirlit með þeim í samræmi við hefðbundna starfshætti. Ef vísbendingar eru um versnun lifransjúkdómsins hjá slíkum sjúklingum verður að íhuga að rjúfa eða hætta meðferð. Hins vegar ber að hafa í huga að hækkun ALAT gilda getur verið hluti af HBV úthreinsun meðan á meðferð með tenófóvíri stendur. Sjá hér á undan, *Versnun lifrabólgu*.

#### Notkun með tilteknum veirulyfjum við lifrabólgu C

Sýnt hefur verið fram á að samhliða gjöf tenófóvír tvísóproxíls og ledipasvírs/sófosbúvírs, sófosbúvírs/velpatasvírs eða sófosbúvírs/velpatasvírs/voxilaprevírs eykur plasmabéttni tenófóvírs, sérstaklega þegar það er notað ásamt meðferð við alnæmisveiru (HIV) sem inniheldur tenófóvír tvísóproxíl og lyfjahvarfahvata (ritónavír eða cobicistat). Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi tenófóvír tvísóproxíls samhliða ledipasvíri/sófosbúvíri, sófosbúvíri/velpatasvíri eða sófosbúvíri/velpatasvíri/voxilaprevíri og lyfjahvarfahvata. Íhuga skal hugsanlega áhættu og ávinning sem samhliða gjöf ledipasvírs/sófosbúvírs, sófosbúvírs/velpatasvírs eða sófosbúvírs/velpatasvírs/voxilaprevírs og tenófóvír tvísóproxíls ásamt örvuðum HIV-próteasahemli (t.d. atazanavíri eða darúnavíri) hefur í för með sér, sérstaklega hjá sjúklingum sem hafa aukna hættu á nýrnabilun. Hafa skal eftirlit með aukaverkunum sem tengjast tenófóvír tvísóproxíli hjá sjúklingum sem fá ledipasvír/sófosbúvír, sófosbúvír/velpatasvír eða sófosbúvír/velpatasvír/voxilaprevír samhliða tenófóvír tvísóproxíli og örvuðum HIV-próteasahemli.

#### Líkamsþyngd og efnaskiptabreytur

Aukning í líkamsþyngd og gildum blóðfitu og glúkósa getur komið fram við retróveirulyfjameðferð. Þær breytingar geta að hluta tengst stjórnun sjúkdómsins og lífsstíl. Hvað varðar blóðfitu eru í sumum tilvikum vísbendingar um að meðferðin sjálf hafi þessi áhrif en varðandi aukningu líkamsþyngdar eru ekki sterkar vísbendingar um að nein ákveðin meðferð hafi þessi áhrif. Vísað er til samþykkttra leiðbeininga um HIV meðferð vegna eftirlits með blóðfitu og glúkósa. Blóðfituröskun skal meðhöndla eins og klínískt á við.

#### Starfstruflun í hvatberum eftir útsetningu í móðurkviði

Núkleós(t)íðhliðstæður kunna að hafa áhrif á starfsemi hvatbera í mismunandi mæli, sem kemur greinilegast fram með stavúdíni, dídanósíni og zídóvúdíni. Greint hefur verið frá starfstruflun í hvatberum hjá HIV neikvæðum ungbörnum sem voru útsett fyrir núkleósíðhliðstæðum í móðurkviði og/eða eftir fæðingu; slíkt hefur að mestu tengst meðferð með zídóvúdíni. Helstu aukaverkanir sem greint hefur verið frá eru truflanir í blóði (blóðleysi, daufkyrningafæð) og truflanir á efnaskiptum (laktathækkun í blóði, lípasahækkun í blóði). Þessar aukaverkanir voru oft skammvinnar. Í mjög sjaldgæfum tilvikum hefur verið greint frá truflunum í taugakerfi sem koma seint fram (ofstælingu, krömpum, óeðlilegri hegðun). Hvort slíkar truflanir í taugakerfi eru skammvinnar eða varanlegar er enn ekki vítað. Þessar niðurstöður skal íhuga varðandi hvert það barn, sem útsett er í móðurkviði fyrir núkleós(t)íðhliðstæðum, með alvarlegar klínískar niðurstöður af óþekktum orsökum, einkum taugafræðilegar niðurstöður. Þessar niðurstöður hafa ekki áhrif á núgildandi ráðleggingar hér á landi um notkun meðferðar gegn retróveirum hjá þunguðum konum til að hindra HIV-smit frá móður til barns.

### Ónæmisendurvirkjunarheilkenni (Immune reactivation syndrome)

Hjá HIV-smituðum sjúklingum með alvarlegan ónæmisbrest við upphaf CART getur komið fram bólgusvörun við einkennalausum tækifærissýklum eða leifum þeirra og valdið alvarlegu klínísku ástandi eða versnun einkenna. Að jafnaði hefur slík svörun komið fram á fyrstu vikum eða mánuðum eftir að CART er hafin. Dæmin sem um ræðir eru sjónubólga vegna cytómegalóveiru, útbreiddar og/eða afmarkaðar sýkingar af völdum mykóbaktería og lungnabólga af völdum *Pneumocystis jirovecii*. Meta skal öll bólgueinkenni og hefja meðferð þegar þarf.

Einnig hefur verið greint frá því að sjálfsofnæmissjúkdómar (eins og Graves sjúkdómur og sjálfsofnæmis lifrabólga) hafi komið fram við ónæmisendurvirkjun. Hins vegar, þó er breytilegt hvenær það gerist og geta slík tilfelli komið fram mörgum mánuðum eftir upphaf meðferðar.

### Beindrep

Þrátt fyrir að orsökina sé talin margþætt (þar með talin notkun barkstera, áfengisneysla, öflug ónæmisbæling, hár líkamsþyngdarstuðull (BMI)) hefur einkum verið greint frá beindrepi hjá sjúklingum með langt genginn HIV-sjúkdóm og/eða sjúklingum sem hafa notað CART í langan tíma. Sjúklingum skal ráðlagt að leita læknaðstoðar ef þeir finna fyrir verkjum eða sársauka í liðum, stífleika í liðum eða eiga erfitt með hreyfingar.

### Aldraðir

Tenófóvír tvísóproxíl hefur ekki verið rannsakað hjá sjúklingum eldri en 65 ára. Þar sem líkur á skertri nýrnastarfsemi eru meiri hjá öldruðum en yngri sjúklingum skal gæta varúðar þegar tenófóvír tvísóproxíl er gefið öldruðum.

Tenofovir disoproxil Viartis 245 mg filmuhúðaðar töflur innihalda laktósa einhýdrat. Sjúklingar með galaktósaóþol, laktasaþurrð eða glúkósa-galaktósa vanfrásög, sem eru sjaldgæfir arfgengir kvillar, ekki nota lyfið.

## **4.5 Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir**

Rannsóknir á milliverkunum hafa eingöngu verið gerðar hjá fullorðnum.

Samkvæmt niðurstöðum *in vitro* rannsókna og samkvæmt því sem vitað er um eyðingu tenófóvírs er lítil hætta á CYP450 milliverkunum tenófóvírs og annarra lyfja.

### Ekki er mælt með samhliða notkun

Ekki skal gefa tenófóvír tvísóproxíl samhliða öðrum lyfjum sem innihalda tenófóvír tvísóproxíl eða tenófóvír alafenamíð.

Ekki skal gefa tenófóvír tvísóproxíl samhliða adefóvíri tvípívoxíli.

### Díadanósín

Ekki er mælt með samhliða lyfjagjöf tenófóvírs tvísóproxíls og díadanósíns (sjá kafla 4.4 og töflu 1).

### Lyf sem hverfa brott um nýru

Þar sem tenófóvír hverfur fyrst og fremst brott um nýrun getur samhliða lyfjagjöf tenófóvírs tvísóproxíls og lyfja sem draga úr nýrnastarfsemi eða eru í samkeppni um virka pípluseytingu með flutningspróteinunum hOAT 1, hOAT 3 eða MRP 4 (t.d. cídófóvír) aukið styrk tenófóvírs í sermi og/eða lyfsins sem er gefið samhliða.

Forðast skal notkun tenófóvír tvísóproxíls sé verið að nota lyf með eiturvekun á nýru eða hafi þau verið notuð nýverið. Nokkur dæmi um slík lyf eru, en eru ekki bundin við, aminorólíkósíðar,

amfóterísín B, foskarnet, gancíklóvír, pentamidín, vankómýsín, cídófóvír eða interleukín-2 (sjá kafla 4.4).

Þar sem takrólímus getur haft áhrif á nýrnastarfsemi er mælt með nánu eftirliti þegar það er gefið samhliða tenófóvír tvísóproxíli.

#### Aðrar milliverkanir

Milliverkanir á milli tenófóvírs tvísóproxíls og annarra lyfja eru taldar upp í töflu 1 hér á eftir (aukning er gefin til kynna sem „↑“, lækkun sem „↓“ og engin breyting sem „↔“).

**Tafla 1: Milliverkanir á milli tenófóvírs tvísóproxíls og annarra lyfja**

| Lyf eftir meðferðarsvæðum<br>(skammtur í mg)                                 | Áhrif á lyfjastyrk<br>Meðal prósentubreyting í<br>AUC, C <sub>max</sub> , C <sub>min</sub>                                                                                  | Ráðleggingar fyrir samhliða<br>lyfjagjöf með 245 mg tenófóvír<br>tvísóproxíli                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SÝKLALYF</b>                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Andretróveirulyf</b>                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Próteasahemlar</b>                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |
| Atazanavír/rítónavír<br>(300 einu sinni á dag/100 einu<br>sinni á dag)       | Atazanavír:<br>AUC: ↓ 25%<br>C <sub>max</sub> : ↓ 28%<br>C <sub>min</sub> : ↓ 26%<br>Tenófóvír:<br>AUC: ↑ 37%<br>C <sub>max</sub> : ↑ 34%<br>C <sub>min</sub> : ↑ 29%       | Ekki er mælt með skammtaaðlögun.<br>Aukin útsetning fyrir tenófóvíri getur<br>aukið aukaverkanir sem tengjast<br>tenófóvíri, þar með talið á nýrun.<br>Hafa skal náðið eftirlit með<br>nýrnastarfsemi. (sjá kafla 4.4). |
| Lopinavír/rítónavír<br>(400 tvísvar sinnum á dag/100<br>tvívar sinnum á dag) | Lopinavír/rítónavír:<br>Engin marktæk áhrif á<br>lopinavír/rítónavír<br>Lyfjahvarfabreytur.<br>Tenófóvír:<br>AUC: ↑ 32%<br>C <sub>max</sub> : ↔<br>C <sub>min</sub> : ↑ 51% | Ekki er mælt með skammtaaðlögun.<br>Aukin útsetning fyrir tenófóvíri getur<br>aukið aukaverkanir sem tengjast<br>tenófóvíri, þar með talið á nýrun.<br>Hafa skal náðið eftirlit með<br>nýrnastarfsemi. (sjá kafla 4.4). |
| Darunavír/rítónavír<br>(300/100 tvísvar sinnum á dag)                        | Darunavír<br>Engin marktæk áhrif á<br>darunavír/rítónavír<br>Lyfjahvarfabreytur.<br>Tenófóvír:<br>AUC: ↑ 22%<br>C <sub>min</sub> : ↑ 37%                                    | Ekki er mælt með skammtaaðlögun.<br>Aukin útsetning fyrir tenófóvíri getur<br>aukið aukaverkanir sem tengjast<br>tenófóvíri, þar með talið á nýrun.<br>Hafa skal náðið eftirlit með<br>nýrnastarfsemi. (sjá kafla 4.4). |

| Lyf eftir meðferðarsvæðum<br>(skammtur í mg) | Áhrif á lyfjastyrk<br>Meðal prósentubreyting í<br>AUC, C <sub>max</sub> , C <sub>min</sub>                                      | Ráðleggingar fyrir samhliða<br>lyfjagjöf með 245 mg tenófóvír<br>tvísóproxíli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NRTIs</b>                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dídanósín                                    | Þegar tenófóvír tvísóproxíl er gefið samhliða dídanósíni leiðir það til 40-60% aukningar á altækri útsetningu fyrir dídanósíni. | Ráðið er frá því að gefa tenófóvír tvísóproxíl og dídanósín samhliða (sjá kafla 4.4).<br><br>Aukin altæk útsetning fyrir dídanósíni getur aukið hættuna á aukaverkunum sem tengjast dídanósíni. Mjög sjaldan hefur verið greint frá brisbólgu og mjólkursýrublóðsýringu, stundum banvænum. Samhliða gjöf tenófóvír tvísóproxíls og dídanósíns (400 mg skammtar á dag) hefur verið sett í samhengi við verulega lækkaða CD4 frumutalningu, hugsanlega vegna milliverkunar innan frumu sem eykur fosfórýlerað (p.e. virkt) dídanósín. Minnkaður skammtur af dídanósíni (250 mg) gefinn samhliða meðferð með tenófóvír tvísóproxíli hefur verið tengdur við háa tíðni meðferðarbrests (virological failure) við ýmsar prófaðar meðferðasamsetningar til meðferðar gegn HIV-1 sýkingu. |
| Adefóvír tvípívoxíl                          | AUC: ↔<br>C <sub>max</sub> : ↔                                                                                                  | Ekki skal gefa tenófóvír tvísóproxíl samtímis adefóvír tvípívoxíli (sjá kafla 4.4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Entekavír                                    | AUC: ↔<br>C <sub>max</sub> : ↔                                                                                                  | Engar klínískt marktækar milliverkanir urðu á lyfjahvörfum þegar tenófóvír tvísóproxíl var gefið samhliða entekavíri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Lyf eftir meðferðarsvæðum<br>(skammtur í mg)                                                                                                                                                                                           | Áhrif á lyfjastyrk<br>Meðal prósentubreyting í<br>AUC, C <sub>max</sub> , C <sub>min</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ráðleggingar fyrir samhliða<br>lyfjagjöf með 245 mg tenófóvír<br>tvísóproxíli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veirulyf við lifrabólgu C</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ledipasvír/sófosbúvír<br>(90 mg/400 mg einu sinni á dag) +<br>atazanavír/rítónavír<br>(300 mg einu sinni á dag/100 mg<br>einu sinni á dag) +<br>emtricitabín/tenófóvír tvísóproxíl<br>(200 mg/245 mg einu sinni á<br>dag) <sup>1</sup> | <p>Ledipasvír:<br/>AUC: ↑ 96%<br/>C<sub>max</sub>: ↑ 68%<br/>C<sub>min</sub>: ↑ 118%</p> <p>Sófosbúvír:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔</p> <p>GS-331007<sup>2</sup>:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↑ 42%</p> <p>Atazanavír:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↑ 63%</p> <p>Rítónavír:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↑ 45%</p> <p>Emtricitabín:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Tenófóvír:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↑ 47%<br/>C<sub>min</sub>: ↑ 47%</p> | <p>Aukin plasmabéttni tenófóvírs vegna<br/>samhliða gjafar tenófóvír<br/>tvísóproxíls, ledipasvírs/sófosbúvírs<br/>og atazanavírs/rítónavírs getur aukið<br/>aukaverkanir sem tengjast tenófóvír<br/>tvísóproxíli, þar með talið á nýrun.<br/>Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi<br/>tenófóvír tvísóproxíls við notkun<br/>samhliða ledipasvíri/sófosbúvíri og<br/>lyfjahvarfahvata (t.d. rítónavíri eða<br/>cobicistati).</p> <p>Gæta skal varúðar við notkun<br/>þessarar samsetningar með tíðu<br/>eftirliti á nýrnastarfsemi, ef aðrir<br/>möguleikar eru ekki til staðar (sjá<br/>kafla 4.4).</p> |

| Lyf eftir meðferðarsvæðum<br>(skammtur í mg)                                                                                                                                                                                             | Áhrif á lyfjastyrk<br>Meðal prósentubreyting í<br>AUC, C <sub>max</sub> , C <sub>min</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ráðleggingar fyrir samhliða<br>lyfjagjöf með 245 mg tenófóvír<br>tvísóproxíli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ledipasvír/sófosbúvír<br>(90 mg/400 mg einu sinni á dag)<br>+<br>darunavír/ritónavír<br>(800 mg einu sinni á dag/100 mg<br>einu sinni á dag) +<br>emtricitabín/tenófóvír tvísóproxíl<br>(200 mg/245 mg einu sinni á<br>dag) <sup>1</sup> | <p>Ledipasvír:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Sófosbúvír:<br/>AUC: ↓ 27%<br/>C<sub>max</sub>: ↓ 37%</p> <p>GS-331007<sup>2</sup>:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Darúnavír:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Rítónavír:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↑ 48%</p> <p>Emtricitabín:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Tenófóvír:<br/>AUC: ↑ 50%<br/>C<sub>max</sub>: ↑ 64%<br/>C<sub>min</sub>: ↑ 59%</p> | <p>Aukin plasmaþéttni tenófóvírs vegna samhliða gjafar tenófóvír tvísóproxíls, ledipasvírs/sófosbúvírs og darunavírs/ritónavírs getur aukið aukaverkanir sem tengjast tenófóvír tvísóproxíli, þar með talið á nýrun. Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi tenófóvír tvísóproxíls við notkun samhliða ledipasvíri/sófosbúvíri og lyfjahvarfahvata (t.d. ritónavíri eða cobicistati).</p> <p>Gæta skal varúðar við notkun þessarar samsetningar með tíðu eftirliti á nýrnastarfsemi, ef aðrir möguleikar eru ekki til staðar (sjá kafla 4.4).</p> |

| Lyf eftir meðferðarsvæðum<br>(skammtur í mg)                                                                                                                   | Áhrif á lyfjastyrk<br>Meðal prósentubreyting í<br>AUC, C <sub>max</sub> , C <sub>min</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ráðleggingar fyrir samhliða<br>lyfjagjöf með 245 mg tenófóvír<br>tvísóproxíli                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ledipasvír/sófosbúvír<br>(90 mg/400 mg einu sinni á dag)<br>+<br>efavírenz/emtricitabín/tenófóvír<br>tvísóproxíl<br>(600 mg/200 mg/245 mg einu<br>sinni á dag) | <p>Ledipasvír:<br/>AUC: ↓ 34%<br/>C<sub>max</sub>: ↓ 34%<br/>C<sub>min</sub>: ↓ 34%</p> <p>Sófosbúvír:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔</p> <p>GS-331007<sup>2</sup>:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Efavírenz:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Emtricitabín:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Tenófóvír:<br/>AUC: ↑ 98%<br/>C<sub>max</sub>: ↑ 79%<br/>C<sub>min</sub>: ↑ 163%</p> | Ekki er mælt með skammtaaðlögun.<br>Aukin útsetning fyrir tenófóvíri getur aukið aukaverkanir sem tengjast tenófóvír tvísóproxíli, þar með talið á nýrun. Hafa skal náð eftirlit með nýrnastarfsemi. (sjá kafla 4.4). |
| Ledipasvír/sófosbúvír<br>(90 mg/400 mg einu sinni á dag)<br>+<br>emtricitabín/rilpivírín/tenófóvír<br>tvísóproxíl<br>(200 mg/25 mg/245 mg einu<br>sinni á dag) | <p>Ledipasvír:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Sófosbúvír:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔</p> <p>GS-331007<sup>2</sup>:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Emtricitabín:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Rilpivírín:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Tenófóvír:<br/>AUC: ↑ 40%<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↑ 91%</p>                 | Ekki er mælt með skammtaaðlögun.<br>Aukin útsetning fyrir tenófóvíri getur aukið aukaverkanir sem tengjast tenófóvír tvísóproxíli, þar með talið á nýrun. Hafa skal náð eftirlit með nýrnastarfsemi. (sjá kafla 4.4). |

| Lyf eftir meðferðarsvæðum<br>(skammtur í mg)                                                                                                                                       | Áhrif á lyfjastyrk<br>Meðal prósentubreyting í<br>AUC, C <sub>max</sub> , C <sub>min</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ráðleggingar fyrir samhliða<br>lyfjagjöf með 245 mg tenófóvír<br>tvísóproxíli                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ledipasvír/sófosbúvír<br>(90 mg/400 mg einu sinni á dag) +<br>dolutegravír (50 mg einu sinni á<br>dag) + emtrícítabín/tenófóvír<br>tvísóproxíl (200 mg/245 mg einu<br>sinni á dag) | <p>Sófosbúvír:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔</p> <p>GS-331007<sup>2</sup><br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Ledipasvír:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Dolutegravír<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Emtrícítabín:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Tenófóvír:<br/>AUC: ↑ 65%<br/>C<sub>max</sub>: ↑ 61%<br/>C<sub>min</sub>: ↑ 115%</p> | Ekki er mælt með skammtaaðlögun.<br>Aukin útsetning fyrir tenófóvíri getur<br>aukið aukaverkanir sem tengjast<br>tenófóvír tvísóproxíli, þar með talið á<br>nýrun. Hafa skal náð eftirlit með<br>nýrnastarfsemi (sjá kafla 4.4). |



| Lyf eftir meðferðarsvæðum<br>(skammtur í mg)                                                                                                                                                                          | Áhrif á lyfjastyrk<br>Meðal prósentubreyting í<br>AUC, C <sub>max</sub> , C <sub>min</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ráðleggingar fyrir samhliða<br>lyfjagjöf með 245 mg tenófóvír<br>tvísóproxíli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sófosbúvír/velpatasvír<br>(400 mg/100 mg einu sinni á dag) +<br>atazanavír/rítónavír<br>(300 mg einu sinni á dag/100 mg einu sinni á dag) +<br>emtrícítabín/tenófóvír tvísóproxíl<br>(200 mg/245 mg einu sinni á dag) | <p>Sófosbúvír:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔</p> <p>GS-331007<sup>2</sup>:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↑ 42%</p> <p>Velpatasvír:<br/>AUC: ↑ 142%<br/>C<sub>max</sub>: ↑ 55%<br/>C<sub>min</sub>: ↑ 301%</p> <p>Atazanavír:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↑ 39%</p> <p>Rítónavír:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↑ 29%</p> <p>Emtrícítabín:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Tenófóvír:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↑ 55%<br/>C<sub>min</sub>: ↑ 39%</p> | <p>Aukin plasmabéttni tenófóvírs vegna samhliða gjafar tenófóvír tvísóproxíls, sófosbúvírs/velpatasvírs og atazanavírs/rítónavírs getur aukið aukaverkanir sem tengjast tenófóvír tvísóproxíli, þar með talið á nýrun. Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi tenófóvír tvísóproxíls við notkun samhliða sófosbúvíri/velpatasvíri og lyfjahvarfahvata (t.d. rítónavíri eða cobicistati).</p> <p>Gæta skal varúðar við notkun þessarar samsetningar með tíðu eftirliti á nýrnastarfsemi (sjá kafla 4.4).</p> |

| Lyf eftir meðferðarsvæðum<br>(skammtur í mg)                                                                                                                                                                         | Áhrif á lyfjastyrk<br>Meðal prósentubreyting í<br>AUC, C <sub>max</sub> , C <sub>min</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ráðleggingar fyrir samhliða<br>lyfjagjöf með 245 mg tenófóvír<br>tvísóproxíli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sófosbúvír/velpatasvír<br>(400 mg/100 mg einu sinni á dag) +<br>darúnavír/rítónavír<br>(800 mg einu sinni á dag/100 mg einu sinni á dag) +<br>emtrícítabín/tenófóvír tvísóproxíl<br>(200 mg/245 mg einu sinni á dag) | <p>Sófosbúvír:<br/>AUC: ↓28%<br/>C<sub>max</sub>: ↓ 38%</p> <p>GS-331007<sup>2</sup>:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Velpatasvír:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↓ 24%<br/>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Darúnavír:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Rítónavír:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Emtrícítabín:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Tenófóvír:<br/>AUC: ↑ 39%<br/>C<sub>max</sub>: ↑ 55%<br/>C<sub>min</sub>: ↑ 52%</p> | <p>Aukin plasmaþéttni tenófóvírs vegna samhliða gjafar tenófóvír tvísóproxíls, sófosbúvírs/velpatasvírs og darúnavírs/rítónavírs getur aukið aukaverkanir sem tengjast tenófóvír tvísóproxíli, þar með talið á nýrun. Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi tenófóvír tvísóproxíls við notkun samhliða sófosbúvíri/velpatasvíri og lyfjahvarfahvata (t.d. rítónavíri eða cobicistati).</p> <p>Gæta skal varúðar við notkun þessarar samsetningar með tíðu eftirliti á nýrnastarfsemi (sjá kafla 4.4).</p> |

| Lyf eftir meðferðarsvæðum<br>(skammtur í mg)                                                                                                                                                         | Áhrif á lyfjastyrk<br>Meðal prósentubreyting í<br>AUC, C <sub>max</sub> , C <sub>min</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ráðleggingar fyrir samhliða<br>lyfjagjöf með 245 mg tenófóvír<br>tvísóproxíli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sófosbúvír/velpatasvír<br>(400 mg/100 mg einu sinni á dag) +<br>lópínavír/rítónavír:<br>(800 mg/200 mg einu sinni á dag) +<br>emtrícítabín/tenófóvír tvísóproxíl<br>(200 mg/245 mg einu sinni á dag) | <p>Sófosbúvír:<br/>AUC: ↓ 29%<br/>C<sub>max</sub>: ↓ 41%</p> <p>GS-331007<sup>2</sup>:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Velpatasvír:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↓ 30%<br/>C<sub>min</sub>: ↑ 63%</p> <p>Lópínavír:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Rítónavír:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Emtrícítabín:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Tenófóvír:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↑ 42%<br/>C<sub>min</sub>: ↔</p> | <p>Aukin plasmaþéttni tenófóvírs vegna samhliða gjafar tenófóvír tvísóproxíls, sófosbúvírs/velpatasvírs og lóopíinavírs/rítónavírs getur aukið aukaverkanir sem tengjast tenófóvír tvísóproxíli, þar með talið á nýrun. Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi tenófóvír tvísóproxíls við notkun samhliða sófosbúvíri/velpatasvíri og lyfjahvarfahvata (t.d. rítónavíri eða cobicistati).</p> <p>Gæta skal varúðar við notkun þessarar samsetningar með tíðu eftirliti á nýrnastarfsemi (sjá kafla 4.4).</p> |

| Lyf eftir meðferðarsvæðum<br>(skammtur í mg)                                                                                                                                      | Áhrif á lyfjastyrk<br>Meðal prósentubreyting í<br>AUC, C <sub>max</sub> , C <sub>min</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ráðleggingar fyrir samhliða<br>lyfjagjöf með 245 mg tenófóvír<br>tvísóproxíli                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sófosbúvír/velpatasvír<br>(400 mg/100 mg einu sinni á dag) +<br>raltegravír<br>(400 mg tvisvar á dag) +<br>emtrícítabín/tenófóvír tvísóproxíl<br>(200 mg/245 mg einu sinni á dag) | Sófosbúvír:<br>AUC: ↔<br>C <sub>max</sub> : ↔<br><br>GS-331007 <sup>2</sup> :<br>AUC: ↔<br>C <sub>max</sub> : ↔<br>C <sub>min</sub> : ↔<br><br>Velpatasvír:<br>AUC: ↔<br>C <sub>max</sub> : ↔<br>C <sub>min</sub> : ↔<br><br>Raltegravír:<br>AUC: ↔<br>C <sub>max</sub> : ↔<br>C <sub>min</sub> : ↓ 21%<br><br>Emtrícítabín:<br>AUC: ↔<br>C <sub>max</sub> : ↔<br>C <sub>min</sub> : ↔<br><br>Tenófóvír:<br>AUC: ↑ 40%<br>C <sub>max</sub> : ↑ 46%<br>C <sub>min</sub> : ↑ 70%            | Ekki er mælt með skammtaöðlögum.<br>Aukin útsetning fyrir tenófóvíri getur aukið aukaverkanir sem tengjast tenófóvír tvísóproxíli, þar með talið á nýrun. Hafa skal náð eftirlit með nýrnastarfsemi (sjá kafla 4.4). |
| Sófosbúvír/velpatasvír<br>(400 mg/100 mg einu sinni á dag) +<br>efavírenz/emtrícítabín/tenófóvír<br>disóproxíl<br>(600 mg/200 mg/245 mg einu sinni á dag)                         | Sófosbúvír:<br>AUC: ↔<br>C <sub>max</sub> : ↑ 38%<br><br>GS-331007 <sup>2</sup> :<br>AUC: ↔<br>C <sub>max</sub> : ↔<br>C <sub>min</sub> : ↔<br><br>Velpatasvír:<br>AUC: ↓ 53%<br>C <sub>max</sub> : ↓ 47%<br>C <sub>min</sub> : ↓ 57%<br><br>Efavírenz:<br>AUC: ↔<br>C <sub>max</sub> : ↔<br>C <sub>min</sub> : ↔<br><br>Emtrícítabín:<br>AUC: ↔<br>C <sub>max</sub> : ↔<br>C <sub>min</sub> : ↔<br><br>Tenófóvír:<br>AUC: ↑ 81%<br>C <sub>max</sub> : ↑ 77%<br>C <sub>min</sub> : ↑ 121% | Gert er ráð fyrir að samtímis gjöf sófosbúvírs/velpatasvírs og efavírenz minnki plasmabéttni velpatasvírs. Ekki er mælt með samhliða gjöf sófosbúvírs/velpatasvírs með lyfjameðferð sem felur í sér efavírenz.       |

| Lyf eftir meðferðarsvæðum<br>(skammtur í mg)                                                                                                                    | Áhrif á lyfjastyrk<br>Meðal prósentubreyting í<br>AUC, C <sub>max</sub> , C <sub>min</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ráðleggingar fyrir samhliða<br>lyfjagjöf með 245 mg tenófóvír<br>tvísóproxíli                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sófosbúvír/velpatasvír<br>(400 mg/100 mg einu sinni á<br>dag) +<br>emtrícítabín/rilpivírín/tenófóvír<br>dísóproxíl<br>(200 mg/25 mg/245 mg einu sinni<br>á dag) | <p>Sófosbúvír:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔</p> <p>GS-331007<sup>2</sup>:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Velpatasvír:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Emtrícítabín:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Rilpivírín:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Tenófóvír:<br/>AUC: ↑ 40%<br/>C<sub>max</sub>: ↑ 44%<br/>C<sub>min</sub>: ↑ 84%</p> | Ekki er mælt með skammtaaðlögun.<br>Aukin útsetning fyrir tenófóvíri getur<br>aukið aukaverkanir sem tengjast<br>tenófóvír tvísóproxíli, þar með talið á<br>nýrun. Hafa skal náð eftirlit með<br>nýrnastarfsemi (sjá kafla 4.4). |

| Lyf eftir meðferðarsvæðum<br>(skammtur í mg)                                                                                                                                                                                                                                | Áhrif á lyfjastyrk<br>Meðal prósentubreyting í<br>AUC, C <sub>max</sub> , C <sub>min</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ráðleggingar fyrir samhliða<br>lyfjagjöf með 245 mg tenófóvír<br>tvísóproxíli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sófosbúvír/velpatasvír/<br>voxílaprevír (400 mg/100 mg/<br>100 mg+100 mg einu sinni á<br>dag) <sup>3</sup> + darúnavír (800 mg einu<br>sinni á dag) + rítónavír (100 mg<br>einu sinni á dag) +<br>emtrícítabín/tenófóvír tvísóproxíl<br>(200 mg/245 mg einu sinni á<br>dag) | <p>Sófosbúvír:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↓ 30%<br/>C<sub>min</sub>: N/A</p> <p>GS-331007<sup>2</sup>:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: N/A</p> <p>Velpatasvír:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Voxílaprevír:<br/>AUC: ↑ 143%<br/>C<sub>max</sub>: ↑ 72%<br/>C<sub>min</sub>: ↑ 300%</p> <p>Darúnavír:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↓ 34%</p> <p>Rítónavír:<br/>AUC: ↑ 45%<br/>C<sub>max</sub>: ↑ 60%<br/>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Emtrícítabín:<br/>AUC: ↔<br/>C<sub>max</sub>: ↔<br/>C<sub>min</sub>: ↔</p> <p>Tenófóvír:<br/>AUC: ↑ 39%<br/>C<sub>max</sub>: ↑ 48%<br/>C<sub>min</sub>: ↑ 47%</p> | <p>Aukin plasmabéttni tenófóvírs vegna<br/>samhliða gjafar tenófóvír<br/>tvísóproxíls,<br/>sófosbúvírs/velpatasvírs/voxílaprevírs<br/>og darúnavírs/rítónavírs getur aukið<br/>aukaverkanir sem tengjast tenófóvír<br/>tvísóproxíli, þar með talið á nýrun.<br/>Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi<br/>tenófóvír tvísóproxíls við notkun<br/>samhliða<br/>sófosbúvíri/velpatasvíri/voxílaprevíri<br/>og lyfjahvarfahvata (t.d. rítónavíri<br/>eða cobicistati).</p> <p>Gæta skal varúðar við notkun<br/>þessarar samsetningar með tíðu<br/>eftirliti á nýrnastarfsemi (sjá<br/>kafla 4.4).</p> |

| Lyf eftir meðferðarsvæðum (skammtur í mg)                                                                                                  | Áhrif á lyfjastyrk<br>Meðal prósentubreyting í<br>AUC, C <sub>max</sub> , C <sub>min</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ráðleggingar fyrir samhliða<br>lyfjagjöf með 245 mg tenófóvír<br>tvísóproxíli |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Sófosbúvír<br>(400 mg einu sinni á dag) +<br>efavírenz/emtricitabín/tenófóvír<br>tvísóproxíl<br>(600 mg/200 mg/245 mg einu<br>sinni á dag) | Sófosbúvír:<br>AUC: ↔<br>C <sub>max</sub> : ↓ 19%<br><br>GS-331007 <sup>2</sup> :<br>AUC: ↔<br>C <sub>max</sub> : ↓ 23%<br><br>Efavírenz:<br>AUC: ↔<br>C <sub>max</sub> : ↔<br>C <sub>min</sub> : ↔<br><br>Emtricitabín:<br>AUC: ↔<br>C <sub>max</sub> : ↔<br>C <sub>min</sub> : ↔<br><br>Tenófóvír:<br>AUC: ↔<br>C <sub>max</sub> : ↑ 25%<br>C <sub>min</sub> : ↔ | Ekki þarf að breyta skömmtum.                                                 |

<sup>1</sup> Gögn mynduð við samhliða skömmtun með ledipasvíri/sófosbúvíri. Dreifð gjöf (með 12 klst. millibili) skilaði svipuðum niðurstöðum.

<sup>2</sup> Aðalumbrotsefni sófosbúvírs í blóðrás.

<sup>3</sup> Rannsókn með 100 mg aukaskammti af voxílaprevíri til að ná útsetningu fyrir voxílaprevíri sem gert er ráð fyrir hjá sjúklingum með HCV-smit.

#### Rannsóknir á öðrum lyfjum

Engar klínískt marktækar milliverkanir urðu á lyfjahvörfum þegar tenófóvír tvísóproxíl var gefið samhliða emtricitabíni, lamívúdíni, indínávíri, efavírenzi, nelfínávíri, sakvínavíri (örvaðan af rítónávíri), metadóni, ribavíríni, rifampicíni, takrólímus eða hormónagetnaðarvörninni norgestimat/etinýli estradíóli.

Tenófóvír tvísóproxíl skal taka inn með fæðu, þar sem fæða eykur aðgengi tenófóvírs (sjá kafla 5.2).

## 4.6 Frjósemi, meðganga og brjóstgjöf

### Meðganga

Mikið magn upplýsinga liggur fyrir um notkun lyfsins á meðgöngu (fleiri en 1.000 þunganir) og þær benda til þess að tenófóvír tvísóproxíl valdi hvorki vansköpun né eiturveknum á fóstur/nýbura. Dýrarannsóknir benda ekki til eiturvekana á æxlun (sjá kafla 5.3). Íhuga má notkun tenófóvír tvísóproxíls á meðgöngu ef nauðsyn krefur.

Í heimildum hefur verið sýnt fram á að útsetning fyrir tenófóvír tvísóproxíli á þriðja þriðjungi meðgöngu dregur úr hættunni á að HBV berist frá móður til ungbarns ef tenófóvír tvísóproxíl er gefið mæðrum, til viðbótar við lifrabólgu B ónæmisglóbúlín og bóluefni gegn lifrabólgu B handa ungbörnum.

Í þremur klínískum samanburðarrannsóknum var alls 327 þunguðum konum með langvinna HBV-sýkingu gefið tenófóvír tvísóproxíl (245 mg) einu sinni á dag frá 28. til 32. meðgönguviku og í 1 til 2 mánuði eftir fæðingu; konum og ungbörnum þeirra var fylgt eftir í allt að 12 mánuði eftir fæðingu. Ekkert öryggismerki kom í ljós út frá þessum gögnum.

## Brjóstagjöf

Ef eftirlit með nýburanum og fyrirbyggjandi ráðstafanir við fæðingu að því er varðar lifrabólgu B eru almennt viðunandi, má móðir með lifrabólgu B hafa barnið á brjósti.

Tenófóvír skilst út í brjóstamjólk í mjög litlu magni og útsetning barna með brjóstamjólk er talin óveruleg. Þótt langtímagögn séu takmörkuð hefur ekki verið greint frá neinum aukaverkunum hjá börnum á brjósti og HBV-smitaðar mæður sem nota tenófóvír tvísóproxíl mega hafa barn á brjósti.

Mælt er með því að konur með HIV hafi börn sín ekki á brjósti til að forðast að bera HIV-smit áfram.

## Frjósemi

Takmarkaðar klínískar upplýsingar liggja fyrir um áhrif tenófóvír tvísóproxíls á frjósemi. Dýrarannsóknir benda ekki til skaðlegra áhrifa tenófóvír tvísóproxíls á frjósemi.

### **4.7 Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla**

Engar rannsóknir hafa verið gerðar til að kanna áhrif lyfsins á hæfni til aksturs eða notkunar véla. Hins vegar skal upplýsa sjúklinga um að greint hefur verið frá tilvikum um sundl meðan á meðferð með tenófóvír tvísóproxíli stendur.

### **4.8 Aukaverkanir**

#### Samantekt á öryggi

*HIV-1 og lifrabólga B:* Í mjög sjaldgæfum atvikum hefur verið tilkynnt um skerta nýrnastarfsemi, nýrnabilun og í sjaldgæfum tilvikum aðlægan píplukvilla í nýrum (þ.m.t. Fanconi heilkenni) sem leiða stundum til afbrigðileika í beinum (sem stuðlar í sjaldgæfum tilvikum að broti) hjá sjúklingum sem fengu tenófóvír tvísóproxíl. Mælt er með eftirliti með nýrnastarfsemi hjá sjúklingum sem fá tenófóvír tvísóproxíl (sjá kafla 4.4).

*HIV-1:* Búast má við að hjá u.þ.b. þriðjungi sjúklinga komi fram aukaverkanir í tengslum við meðferð með tenófóvír tvísóproxíli samhliða öðrum lyfjum gegn retróveirum. Yfirleitt er um að ræða vægar eða miðlungsalvarlegar aukaverkanir frá meltingarvegi. Um 1% fullorðinna sjúklinga í meðferð með tenófóvír tvísóproxíli hættu meðferð vegna meltingartruflana.

*Lifrabólga B:* Búast má við að hjá u.þ.b. fjórðungi sjúklinga komi fram aukaverkanir í tengslum við meðferð með tenófóvír tvísóproxíli, yfirleitt vægar. Í klínískum rannsóknum á HBV sýktum sjúklingum var algengasta aukaverkunin af tenófóvír tvísóproxíli ógleði (5,4%).

Tilkynnt hefur verið um bráða versnun lifrabólgu hjá sjúklingum í meðferð og hjá sjúklingum sem hafa hætt meðferð gegn lifrabólgu B (sjá kafla 4.4).

#### Tafla með samantekt á aukaverkunum

Mat á aukaverkunum tenófóvír tvísóproxíls er byggt á öryggisgögnum úr klínískum rannsóknum og reynslu í kjölfar markaðssetningar. Allar aukaverkanir koma fram á töflu 2.

*Klínískar rannsóknir í tengslum við HIV-1:* Mat á aukaverkunum í gögnum úr klínískri rannsókn í tengslum við HIV-1 er byggt á reynslu úr tveimur rannsóknum á 653 meðferðarreindum sjúklingum, sem fengu meðferð með tenófóvír tvísóproxíli (fjöldi = 443) eða lyfleysu (fjöldi = 210) ásamt öðrum andretróveirulyfjum í 24 vikur og einnig úr tvíblindri rannsókn með samanburði við annað lyf þar sem 600 sjúklingar sem ekki höfðu fengið meðferð áður fengu meðferð með tenófóvír tvísóproxíli 245 mg (fjöldi = 299) eða stavúdíni (fjöldi = 301) ásamt lamívúdíni og efavírensi í 144 vikur.



*Klínískar rannsóknir í tengslum við lifrabólgu B:* Mat á aukaverkunum í gögnum úr klínískri rannsókn í tengslum við HBV er aðallega byggt á reynslu úr tveimur tvíblindum samanburðarrannsóknum þar sem 641 fullorðinn sjúklingur með langvinna lifrabólgu B og lifrarsjúkdóm í jafnvægi fékk meðferð með tenófóvír tvísóproxíli 245 mg daglega (n = 426) eða adefóvír tvípívoxíli 10 mg daglega (n = 215) í 48 vikur. Aukaverkanir sem fram komu við áframhaldandi meðferð í 384 vikur voru í samræmi við öryggismynstur tenófóvír tvísóproxíls. Eftir upphafsversnun sem var u.þ.b. -4,9 ml/mín. (með Cockcroft-Gault-jöfnu) eða -3,9 ml/mín./1,73 m<sup>2</sup> (með MDRD-jöfnu, *modification of diet in renal disease*) eftir fyrstu 4 vikur meðferðar, var árleg versnun á nýrnastarfsemi frá upphafsgildi hjá sjúklingum sem fengu meðferð með tenófóvír tvísóproxíli -1,41 ml/mín. á ári (með Cockcroft-Gault-jöfnu) og -0,74 ml/mín./1,73 m<sup>2</sup> á ári (með MDRD-jöfnu).

*Sjúklingar með lifrarsjúkdóm með lifrabílu:* Öryggismynstur tenófóvír tvísóproxíls hjá sjúklingum með lifrarsjúkdóm með lifrabílu var metið í tvíblindri rannsókn með samanburði við virkt lyf (GS-US-174-0108) þar sem fullorðnir sjúklingar fengu meðferð með tenófóvír tvísóproxíli (n = 45) eða emtrícítabíni ásamt tenófóvír tvísóproxíli (n = 45) eða entekavíri (n = 22) í 48 vikur.

Í hópnum sem fékk tenófóvír tvísóproxíl hættu 7% sjúklinga meðferð vegna aukaverkana; hjá 9% sjúklinga varð vart við staðfesta aukningu kreatínins í sermi um > 0,5 mg/dl eða staðfest fosfat í sermi sem nemur < 2 mg/dl út viku 48; Það var enginn tölfraðilega marktækur munur á samsettu hópnum sem fengu tenófóvír og hópnum sem fékk entekavír. Eftir 168 vikur upplifðu 16% (7/45) í hópnum sem fékk tenófóvír tvísóproxíl, 4% (2/45) í hópnum sem fékk emtrícítabín auk tenófóvír tvísóproxíls og 14% (3/22) í hópnum sem fékk entekavír brugðið þol. Hjá þrettán prósent (6/45) í hópnum sem fékk tenófóvír tvísóproxíl, 13% (6/45) í hópnum sem fékk emtrícítabín auk tenófóvír tvísóproxíls og 9% (2/22) í hópnum sem fékk entekavír kom fram staðfest aukning kreatínins í sermi  $\geq$  0,5 mg/dl eða staðfest fosfat í sermi sem nemur < 2 mg/dl.

Í viku 168, hjá þessum hópi sjúklinga sem voru með lifrarsjúkdóm með lifrabílu, var tíðni dauðsfalla 13% (6/45) í hópnum sem fékk tenófóvír tvísóproxíl, 11% (5/45) í hópnum sem fékk emtrícítabín auk tenófóvír tvísóproxíls og 14% (3/22) í hópnum sem fékk entekavír. Tíðni lifrarfrumukrabbameins var 18% (8/45) í hópnum sem fékk tenófóvír tvísóproxíl, 7% (3/45) í hópnum sem fékk emtrícítabín auk tenófóvír tvísóproxíls og 9% (2/22) í hópnum sem fékk entekavír.

Einstaklingar með há CPT upphafsgildi áttu meiri hættu á að fá alvarlegar aukaverkanir (sjá kafla 4.4).

*Sjúklingar með langvinna lifrabólgu B sem er ónæm fyrir lamívúdíni:* Engra nýrra aukaverkana tengdum tenófóvír tvísóproxíli varð vart í slembiráðaðri, tvíblindri rannsókn (GS-US-174-0121) þar sem 280 sjúklingar, sem voru ónæmir fyrir lamívúdíni, fengu meðferð með tenófóvír tvísóproxíli (n = 141) eða emtrícítabíni/tenófóvír tvísóproxíli (n = 139) í 240 vikur.

Þær aukaverkanir sem virðast tengjast (a.m.k gætu tengst) meðferð eru taldar upp hér á eftir. Aukaverkunum er skipt niður eftir líffærakerfum og tíðni. Innan tíðniflokka eru alvarlegustu aukaverkanirnar taldar upp fyrst. Tíðni aukaverkana er skilgreind á eftirfarandi hátt: mjög algengar ( $\geq$  1/10), algengar ( $\geq$  1/100 til < 1/10), sjaldgæfar ( $\geq$  1/1.000 til < 1/100) eða mjög sjaldgæfar ( $\geq$  1/10.000 til < 1/1.000).

**Tafla 2: Tafla með samantekt á aukaverkunum tengdum tenófóvír tvísóproxíli, byggt á reynslu af klínískri rannsókn og í kjölfar markaðssetningar.**

| Tíðni                        | Tenófóvír tvísóproxíl           |
|------------------------------|---------------------------------|
| <i>Efnaskipti og næring:</i> |                                 |
| Mjög algengar:               | blóðfosfatsskortur <sup>1</sup> |
| Sjaldgæfar:                  | blóðkalíumlækkun <sup>1</sup>   |
| Mjög sjaldgæfar:             | mjólkursýrublóðsýring           |
| <i>Taugakerfi:</i>           |                                 |
| Mjög algengar:               | sundl                           |
| Algengar:                    | höfuðverkur                     |

| Tíðni                                                     | Tenófóvír tvísóproxíl                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Meltingarfæri:</i>                                     |                                                                                                                                                                    |
| Mjög algengar:                                            | niðurgangur, uppköst, ógleði                                                                                                                                       |
| Algengar:                                                 | kviðverkir, þaninn kviður, vindgangur                                                                                                                              |
| Sjaldgæfar:                                               | brisdólga                                                                                                                                                          |
| <i>Lifur og gall:</i>                                     |                                                                                                                                                                    |
| Algengar:                                                 | auknir transamínasar                                                                                                                                               |
| Mjög sjaldgæfar:                                          | fituhrörnun í lifur, lifrabólga                                                                                                                                    |
| <i>Húð og undirhúð:</i>                                   |                                                                                                                                                                    |
| Mjög algengar:                                            | útbrot                                                                                                                                                             |
| Mjög sjaldgæfar:                                          | ofsabjúgur                                                                                                                                                         |
| <i>Stoðkerfi og bandvefur:</i>                            |                                                                                                                                                                    |
| Algengar:                                                 | minnkuð beinþéttni <sup>3</sup>                                                                                                                                    |
| Sjaldgæfar:                                               | rákvöðvalýsa <sup>1</sup> , vöðvaslen <sup>1</sup>                                                                                                                 |
| Mjög sjaldgæfar:                                          | beinmeyra (kemur fram sem beinverkur og stuðlar í sjaldgæfum tilvikum að broti) <sup>1, 2</sup> , vöðvakvilli <sup>1</sup>                                         |
| <i>Nýru og þvagfæri:</i>                                  |                                                                                                                                                                    |
| Sjaldgæfar:                                               | hækkað kreatínín, aðlagður píplukvilli í nýrum (þ.m.t. Fanconi heilkenni)                                                                                          |
| Mjög sjaldgæfar:                                          | bráð nýrnabilun, nýrnabilun, brátt pípludrep, nýrnabólga (þ.m.t. bráð millivefsnýrnabólga) <sup>2</sup> , nýrnabvaghlaup ( <i>nephrogenic diabetes insipidus</i> ) |
| <i>Almennar aukaverkanir og aukaverkanir á íkomustað:</i> |                                                                                                                                                                    |
| Mjög algengar:                                            | þróttleysi                                                                                                                                                         |
| Algengar:                                                 | þreyta                                                                                                                                                             |

<sup>1</sup> Þessi aukaverkun kann að koma fram sem afleiðing aðlags píplukvilla í nýrum. Hún er ekki talin vera í orsakasamhengi við tenófóvír tvísóproxíl þegar þessi sjúkdómur er ekki til staðar.

<sup>2</sup> Þessi aukaverkun kom fram við öryggiseftirlit í kjölfar markaðssetningar en ekki varð vart við hana í slembiröðuðum klínískum samanburðarrannsóknum eða við undanþágumeðferð með tenófóvír tvísóproxíli. Tíðniflokkurinn var áætlaður samkvæmt tölfræðilegum útreikningi, byggt á heildarfjölda sjúklinga sem fengu tenófóvír tvísóproxíl í slembiröðuðum klínískum samanburðarrannsóknum og undanþágumeðferðinni (n = 7.319).

<sup>3</sup> Tíðni þessarar aukaverkunar var áætluð byggt á öryggisupplýsingum úr mismunandi klínískum rannsóknum með tenófóvír tvísóproxíli hjá sjúklingum sem voru sýktir af HBV. Sjá einnig kafla 4.4 og 5.1.

## Lýsing á völdum aukaverkunarum

### *HIV-1 og lifrabólga B:*

#### *Skert nýrnastarfsemi*

Þar sem tenófóvír tvísóproxíl getur valdið nýrnaskaða er mælt með eftirliti með nýrnastarfsemi (sjá kafla 4.4 og 4.8 *Samantekt á öryggi*). Aðlagður píplukvilli í nýrum gekk venjulega til baka eða batnaði eftir að notkun tenófóvír tvísóproxíls var hætt. Hjá sumum sjúklingum gekk versnun kreatínínúthreinsunar ekki algjörlega til baka þrátt fyrir að notkun tenófóvír tvísóproxíls væri hætt. Sjúklingar sem eiga skerta nýrnastarfsemi á hættu (svo sem sjúklingar með áhættuþætti við grunnviðmið, langt genginn HIV-sjúkdóm, eða sjúklingar sem fengu samhliða lyf með eiturveirun á nýru) eiga aukna hættu því að ná ekki fullum bata hvað varðar nýrnastarfsemi þrátt fyrir að notkun tenófóvír tvísóproxíls sé hætt (sjá kafla 4.4).

### *Mjólkursýrublóðsýring*

Greint hefur verið frá tilvikum mjólkursýrublóðsýringar með tenófóvír tvísóproxíli einu sér eða í samsettri meðferð með öðrum andretróveirulyfjum. Sjúklingar með áhættuþætti eins og sjúklingar með ómeðhöndlaðan lifrarsjúkdóm eða sjúklingar sem fá samhliða lyf sem þekkt er að valda mjólkursýrublóðsýringu eru í aukinni hættu á að fá alvarlega mjólkursýrublóðsýringu meðan á meðferð með tenófóvír tvísóproxíli stendur, þar á meðal banvæna.

### *HIV-1:*

#### *Efnaskiptabreytur*

Líkamsþyngd og gildi blóðfitu og glúkósa geta aukist á meðan á retróveirulyfjameðferð stendur (sjá kafla 4.4).

### *Ónæmisendurvirkjunarheilkenni (Immune reactivation syndrome)*

Hjá HIV-smituðum sjúklingum með alvarlegan ónæmisbrest við upphaf CART getur komið fram bólgusvörun við einkennalausum tækifærisýkingum eða leifum þeirra. Einnig hefur verið tilkynnt um sjálfsofnæmissjúkdóma (eins og Graves sjúkdóm og sjálfsofnæmis lifrabólga). Hins vegar er breytilegt hvenær þeir koma fram og geta slík tilfelli komið fram mörgum mánuðum eftir upphaf meðferðar (sjá kafla 4.4).

### *Beindrep*

Skýrt hefur verið frá beindrepi, einkum hjá sjúklingum sem eru með almennt viðurkennda áhættuþætti, langt genginn HIV-sjúkdóm eða eftir notkun CART í langan tíma. Tíðni þessa er ekki þekkt (sjá kafla 4.4).

### *Lifrabólga B:*

#### *Versnun lifrabólgu meðan á meðferð stendur*

Í rannsókn á sjúklingum sem ekki höfðu fengið nukleósíð áður kom fram hækkun ALAT gilda sem nam  $> 10$  sinnum ULN (eðlileg efri mörk) og  $> 2$  sinnum frá upphafsgildum hjá 2,6% sjúklinga sem voru meðhöndlaðir með tenófóvír tvísóproxíli. Miðgildistími fram að hækkun ALAT gilda var 8 vikur, gildin gengu til baka með áframhaldandi meðferð og í flestum tilfellum tengdist hækkunin minnkun veirufjölda sem nam  $\geq 2 \log_{10}$  eintök/ml sem kom fram fyrir eða samtímis hækkun ALAT gilda. Mælt er með reglubundnu eftirliti á lifrarstarfsemi á meðan meðferð stendur (sjá kafla 4.4).

#### *Versnun lifrabólgu eftir að meðferð var hætt*

Hjá HBV sýktum sjúklingum hafa komið fram klínísk og rannsóknartengd merki um versnun lifrabólgu eftir að HBV meðferð var hætt (sjá kafla 4.4).

### Börn

#### *HIV-1*

Mat á aukaverkunum er byggt á tveimur slembiröðuðum rannsóknum (rannsókn GS-US-104-0321 og GS-US-104-0352) á 184 börnum sem sýkt voru af HIV-1 (á aldrinum 2 til  $< 18$  ára) og fengu meðferð með tenófóvír tvísóproxíli ( $n = 93$ ) eða lyfleysu/virku samanburðarlyfi ( $n = 91$ ) samhliða öðrum lyfjum gegn retróveirum í 48 vikur (sjá kafla 5.1). Aukaverkanir sem fram komu hjá börnum sem fengu meðferð með tenófóvír tvísóproxíli voru í samræmi við það sem kom fram í klínískum rannsóknum á tenófóvír tvísóproxíli hjá fullorðnum (sjá kafla 4.8 *Tafla með samantekt á aukaverkunum* og 5.1).

Tilkynnt hefur verið um minnkaða beinþéttni hjá börnum. Hjá unglingum sem sýktir voru af HIV-1 reyndist Z stig beinþéttni lægra hjá einstaklingum sem fengu tenófóvír tvísóproxíl en hjá einstaklingum sem fengu lyfleysu. Hjá börnum sem voru sýkt af HIV-1 reyndist Z stig beinþéttni lægra hjá einstaklingum sem skiptu yfir í tenófóvír tvísóproxíl en hjá einstaklingum sem héldu áfram meðferð með stavúdíni eða zídóvúdíni (sjá kafla 4.4 og 5.1).

Í rannsókn GS-US-104-0352 hættu 8 af 89 börnum (9,0%) sem voru útsett fyrir tenófóvír tvísóproxíli (miðgildi tenófóvír tvísóproxíl útsetningar 331 vika) notkun rannsóknarlyfsins vegna aukaverkana á nýru. Fimm þátttakendur (5,6%) sýndu rannsóknarniðurstöður sem voru í klínísku samræmi við aðlægan píplukvilla í nýrum og þar af hættu 4 meðferð með tenófóvír tvísóproxíli. Sjö sjúklingar voru með áætlaða gauklasíun (GFR) á bilinu 70 til 90 ml/mín./1,73 m<sup>2</sup>. Af þeim fengu 3 sjúklingar klínískt marktæka lækun á áætlaðri gauklasíun, sem gekk til baka eftir að meðferð með tenófóvír tvísóproxíli var hætt.

#### *Langvinn lifrabólga B*

Mat á aukaverkunum er byggt á slembiraðaðri rannsókn (rannsókn GS-US-174-0115) á 106 unglingum (á aldrinum 12 til  $< 18$  ára) með langvinna lifrabólgu B sem fengu meðferð með tenófóvír tvísóproxíl 245 mg ( $n = 52$ ) eða lyfleysu ( $n = 54$ ) í 72 vikur og á slembiraðaðri rannsókn (rannsókn GS-US-174-0144) hjá 89 sjúklingum með langvinna lifrabólgu B (2 til  $< 12$  ára) sem fengu meðferð með tenófóvír tvísóproxíli ( $n = 60$ ) eða lyfleysu ( $n = 29$ ) í 48 vikur. Aukaverkanirnar sem fram komu hjá unglingum sem fengu meðferð með tenófóvír tvísóproxíli voru í samræmi við þær sem

fram komu í klínískum rannsóknum á tenófóvír tvísóproxíli hjá fullorðnum (sjá kafla 4.8 *Tafla með samantekt á aukaverkunum* og 5.1).

Minnkuð beinþéttni hefur sést hjá börnum 2 til < 18 ára sem sýkt eru af HBV. Z-stig beinþéttni reyndist lægra hjá einstaklingum sem fengu tenófóvír tvísóproxíl en hjá einstaklingum sem fengu lyfleysu (sjá kafla 4.4 og 5.1).

#### Aðrir sérstakir sjúklingahópar

##### *Aldraðir*

Tenófóvír tvísóproxíl hefur ekki verið rannsakað hjá sjúklingum eldri en 65 ára. Þar sem líkur á skertri nýrnastarfsemi eru meiri hjá öldruðum sjúklingum skal gæta varúðar þegar tenófóvír tvísóproxíl er gefið öldruðum (sjá kafla 4.4).

##### *Sjúklingar með skerta nýrnastarfsemi*

Þar sem tenófóvír tvísóproxíl kann að valda eiturverkunum á nýrnastarfsemi er mælt með nánu eftirliti með nýrnastarfsemi fullorðinna sjúklinga með skerta nýrnastarfsemi sem eru meðhöndlaðir með Tenofovir disoproxil Viatrix (sjá kafla 4.2, 4.4 og 5.2). Ekki er mælt með notkun tenófóvír tvísóproxíls hjá börnum með skerta nýrnastarfsemi (sjá kafla 4.2 og 4.4).

#### Tilkynning aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfinu

Eftir að lyf hefur fengið markaðsleyfi er mikilvægt að tilkynna aukaverkanir sem grunur er um að tengist því. Þannig er hægt að fylgjast stöðugt með sambandinu milli ávinnings og áhættu af notkun lyfsins. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist lyfinu samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá. [Appendix V](#).

## **4.9 Ofskömmtnun**

#### Einkenni

Við ofskömmtnun skal fylgjast náið með sjúklingi um merki eitrunar (sjá kafla 4.8 og 5.3), og gefa viðeigandi stuðningsmeðferð eftir þörfum.

#### Meðferð

Tenófóvír er hægt að fjarlægja með blóðskilun; miðgildi úthreinsunar tenófóvírs við blóðskilun er 134 ml/mín. Ekki er vitað hvort unnt er að fjarlægja tenófóvír með kviðskilun.

## **5. LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR**

### **5.1 Lyfhrif**

Flokkun eftir verkun: Veirulyf til altækrar notkunar (systemic use); nukleósíða og nukleótíða bakritahemlar, ATC-flokkur: J05AF07.

#### Verkunarháttur og lyfhrif

Tenófóvír tvísóproxíl maleat er maleatsalt forlyfsins tenófóvír tvísóproxíls. Tenófóvír tvísóproxíl frásogast og umbrotnar í virka efnið tenófóvír, sem er nukleósíð einfosfat hliðstæða (nukleótíð). Tenófóvír umbrotnar síðan í virka umbrotsefnið tenófóvír tvífosfat, sem er nauðbundið og kemur í veg fyrir lengingu keðjunnar. Helmingunartími tenófóvír tvífosfats er 10 stundir innan virkjaðra, og 50 stundir innan óvirkjaðra útlægra einkjarna blóðfrumna (*peripheral blood mononuclear cells, PBMCs*). Tenófóvír tvífosfat hamlar HIV-1 bakritun og HBV fjöliliðunarensími með beinni samkeppni um bindistaði innan erfðaefnisins, og eftir innlimun inn í desoxýríbósakjarnsýruna, með því að koma í veg fyrir lengingu DNA keðjunnar. Tenófóvír tvífosfat er veikur hemill fjöliliðunarensíma  $\alpha$ ,  $\beta$ , og  $\gamma$ .

Þéttni allt að 300  $\mu\text{mól/l}$  af tenófóvíri sýndi engin áhrif á orkukorna DNA eða á framleiðslu mjólkursýru, *in vitro*.

#### *Gögn varðandi HIV*

*In vitro* andveiruvirkni fyrir HIV: Magn tenófóvírs sem nægir til að ná 50% hömlun ( $\text{EC}_{50}$ ) í HIV-1<sub>IIIB</sub> ræktuðum villistofni er 1-6  $\mu\text{mól/l}$  í eítílfrumulínunum og 1,1  $\mu\text{mól/l}$  gegn HIV-1, tegund B stofni í útlægri einkjarna blóðfrumu (PBMCs). Tenófóvír er einnig virkt gegn HIV-1 undirstofnum A, C, D, E, F, G og O og gegn HIV<sub>BaL</sub> frumeinkjörningum/átfrumum. Tenófóvír er einnig virkt *in vitro* gegn HIV-2, með meðaltals hömlunargildi ( $\text{EC}_{50}$ ) 4,9  $\mu\text{mól/l}$  í MT-4 frumum.

*Ónæmi*: Valdir voru *in vitro* og hjá nokkrum sjúklingum (sjá Verkun og öryggi) HIV-1 stofnar með minna næmi fyrir tenófóvíri og sem tjáðu K65R stökkbreytingu í bakritum. Forðast skal notkun tenófóvír tvísóproxíls hjá sjúklingum sem áður hafa fengið meðferð með andretróveirulyfjum með veirustofna þar sem K65R stökkbreytinguna er að finna (sjá kafla 4.4). Að auki var K70E skiptihvarf í HIV-1 bakrita valið af tenófóvíri og veldur örlítilli minnkun á næmi fyrir tenófóvíri.

Í klínískum rannsóknum á sjúklingum sem þegar höfðu fengið meðferð var and-HIV virkni tenófóvír tvísóproxíls 245 mg metin gegn HIV-1 stofnum sem voru ónæmir fyrir núkleósíðhemlum. Niðurstöðurnar gáfu til kynna að sjúklingar þar sem HIV tjáði 3 eða fleiri stökkbreytingar tengdar týmíðínhlíðstæðum (*Thymidine-analogue Associated Mutations, TAMs*) sem fólu í sér annaðhvort M41L eða L210W stökkbreytingu í bakritum, sýndu minnkaða svörun gagnvart meðferð með tenófóvír tvísóproxíli 245 mg.

#### Verkun og öryggi

Í rannsóknum sem stóðu yfir í 48 vikur og 144 vikur hefur verið sýnt fram á áhrif tenófóvír tvísóproxíls hjá þeim sem hafa fengið meðferð áður og þeim sem ekki hafa fengið meðferð áður, talið í sömu röð.

Í GS-99-907 rannsókninni fengu 550 meðferðarreyndir fullorðnir sjúklingar lyfleysu eða 245 mg af tenófóvír tvísóproxíli í 24 vikur. Meðalfjöldi CD4 fruma í upphafi var 427 frumur/ $\text{mm}^3$ , meðalfjöldi HIV-1 RNA í upphafi var 3,4  $\log_{10}$  eintök/ml (78% sjúklinga höfðu veirufjölda < 5.000 eintök/ml) og meðallengd fyrri HIV meðferðar var 5,4 ár. Greining í upphafi á arfgerð HIV veira sem einangraðar voru frá 253 sjúklingum sýndi að 94% sjúklinganna höfðu ónæmi vegna HIV-1 stökkbreytingar sem tengjast núkleósíða bakritahemlum, 58% höfðu stökkbreytingar sem tengjast próteasahemlum og 48% höfðu stökkbreytingar sem tengjast bakritahemlum, sem eru ekki núkleósíð.

Í 24. viku voru breytingar á vegnu meðaltali á tíma frá upphafsgildi HIV-1 RNA í plasma ( $\text{DAVG}_{24}$ ) -0,03  $\log_{10}$  eintök/ml hjá þeim sem fengu lyfleysu og -0,61  $\log_{10}$  eintök/ml hjá þeim sem fengu 245 mg af tenófóvír tvísóproxíli ( $p < 0,0001$ ). Tölfræðilega marktækur munur, tenófóvír tvísóproxíl, 245 mg, í hag, kom fram í 24. viku, á breytingu á vegnu meðaltali á tíma ( $\text{DAVG}_{24}$ ) frá upphafsfjölda CD4 frumna (+13 frumur/ $\text{mm}^3$  fyrir tenófóvír tvísóproxíl, 245 mg, en -11 frumur/ $\text{mm}^3$  fyrir lyfleysu,  $p$ -gildi = 0,0008). Andveirusvar við tenófóvír tvísóproxíli entist allar 48 vikurnar ( $\text{DAVG}_{48}$  var -0,57  $\log_{10}$  eintök/ml, hlutfall sjúklinga með HIV-1 RNA undir 400 eintök/ml var 41% og undir 50 eintök/ml 18%). Átta sjúklingar (2%) sem fengu meðferð með tenófóvír tvísóproxíli 245 mg þróuðu með sér K65R stökkbreytinguna innan fyrstu 48 viknanna.

Rannsókn GS-99-903 var 144 vikna, tvíblind rannsókn með samanburði við virkt lyf þar sem metin var virkni og öryggi tenófóvír tvísóproxíls 245 mg miðað við stavúðin þegar lyfin voru notuð samhliða lamivúðíni og efavírensi hjá HIV-1 sýktum fullorðnum sjúklingum sem ekki höfðu fengið meðferð gegn retróveirum áður. Meðalgrunnildi CD4 frumutalningar var 279 frumur/ $\text{mm}^3$ , meðalgrunnildi HIV-1 RNA í plasma var 4,91  $\log_{10}$  eintök/ml, 19% sjúklinga höfðu HIV-1-sýkingu með einkennum og 18% höfðu alnæmi. Sjúklingum var skipað í hópa eftir grunnildum HIV-1 RNA og CD4 talningar. Fjórutíu og þrjú prósent sjúklinga höfðu í upphafi veirufjölda > 100.000 eintök/ml og 39% höfðu CD4 frumutalningu < 200 frumum/ml.

Í meðferðar-ákvörðunar greiningu (intent to treat analysis) (tilvik þar sem gögn týndust eða skipt var um meðferð gegn retróveirum talin með tilvikum þar sem meðferð mistókst) voru 80% sjúklinga með HIV-1 RNA undir 400 eintök/ml og 76% sjúklinga með undir 50 eintök/ml í 48. viku meðferðar í hópnum sem fékk tenófóvír tvísóproxíl 245 mg miðað við 84% og 80% í hópnum sem fékk stavúðín. Í 144. viku voru 71% sjúklinga með HIV-1 RNA undir 400 eintök/ml og 68% sjúklinga með undir 50 eintök/ml í hópnum sem fékk tenófóvír tvísóproxíl 245 mg miðað við 64% og 63% í hópnum sem fékk stavúðín.

Meðalbreyting frá grunnildum HIV-1 RNA og CD4 talningar í 48. viku meðferðar var svipuð í báðum meðferðarhópum (-3,09 og -3,09 log<sub>10</sub> eintök/ml; +169 og 167 frumur/mm<sup>3</sup> í tenófóvír tvísóproxíl 245 mg og stavúðín hópnum, í þeirri röð). Í 144. viku meðferðar hélst meðalbreyting frá grunnildum svipuð í báðum meðferðarhópum (-3,07 og -3,03 log<sub>10</sub> eintök/ml; +263 og +283 frumur/mm<sup>3</sup> í tenófóvír tvísóproxíl 245 mg og stavúðín hópnum, í þeirri röð). Samræmi var í svörun við meðferð með tenófóvír tvísóproxíli 245 mg hver sem grunnildi HIV-1 RNA og CD4 talningar voru.

K65R stökkbreytingin sást í örlítið hærra hlutfalli sjúklinga í tenófóvír tvísóproxíl hópnum en í virka samanburðarhópnum (2,7% á móti 0,7%). Þol gegn efavírensi og lamívúðíni kom annaðhvort fram á undan eða samtímis þróun K65R í öllum tilvikum. Átta sjúklingar voru með HIV sem sýndi K65R í hópnum sem fékk tenófóvír tvísóproxíl 245 mg; 7 þessara tilvika komu fram á fyrstu 48 vikum meðferðar og það síðasta í 96. viku. Ekki reyndist verða frekari myndun K65R allt að 144. viku. Einn sjúklingur í tenófóvír tvísóproxíl arminum sýndi fram á K70E skiptihvarf veirunnar. Hvorki arfgerðar- né svipgerðargreining gaf til kynna aðrar leiðir lyfjapols gegn tenófóvíri.

#### *Gögn varðandi HBV*

*In vitro* andveiruvirkni fyrir HBV: Andveiruvirkni tenófóvírs gegn HBV *in vitro* var metin í HepG2 2.2.15 frumulínunni. EC<sub>50</sub> gildin fyrir tenófóvír voru á bilinu 0,14 til 0,15 μmól/l og CC<sub>50</sub> (50% styrkur frumueiturhrifa) gildi > 100 μmól/l.

*Ónæmi:* Ekki hafa komið í ljós neinar HBV stökkbreytingar í tengslum við ónæmi fyrir tenófóvír tvísóproxíli (sjá Verkun og öryggi). Í frumuprófum sýndu HBV stofnar sem tjáðu rtV173L, rtL180M, og rtM204I/V stökkbreytingar sem tengjast ónæmi fyrir lamívúðíni og telbivúðíni sýndu næmi fyrir tenófóvíri sem var 0,7 - 3,4 sinnum meira en hjá villistofni veiru. HBV stofnar sem tjáðu rtL180M, rtT184G, rtS202G/I, rtM204V og rtM250V stökkbreytingar sem tengjast ónæmi fyrir entekavíri sýndu næmi fyrir tenófóvíri sem var 0,6 - 6,9 sinnum meira en hjá villistofni veiru. HBV stofnar sem tjáðu stökkbreytingarnar rtA181V og rtN236T sem tengjast ónæmi fyrir adefóvíri sýndu næmi fyrir tenófóvíri sem var 2,9 – 10 sinnum meira en hjá villistofni veiru. Veirur sem innihéldu rtA181T stökkbreytinguna héldust næmar fyrir tenófóvíri með 1,5 sinnum hærri EC<sub>50</sub> gildi en villistofn veiru.

#### Verkun og öryggi

Niðurstöður um gagnsemi tenófóvír tvísóproxíls þegar um er að ræða bæði lifrarsjúkdóm í jafnvægi og með lifrabíln er byggð á veirufræðilegri, lífefnafræðilegri og sermisfræðilegri svörun, hjá fullorðnum sjúklingum með HBeAg jákvæða og HBeAg neikvæða langvinna lifrabólgu B. Þeir sjúklingar sem fengu meðferð voru meðal annars þeir sem ekki höfðu fengið meðferð áður, þeir sem höfðu fengið lamívúðín, þeir sem höfðu fengið adefóvír tvípívoxíl og sjúklingar með ónæmisstökkbreytingar hvað varðar lamívúðín og/eða adefóvír tvípívoxíl við grunnildi. Einnig hefur verið sýnt fram á ávinning byggt á vefjafræðilegri svörun hjá sjúklingum með sjúkdóm í jafnvægi.

#### *Reynsla hjá sjúklingum með lifrarsjúkdóm í jafnvægi í 48. viku (rannsóknir GS-US-174-0102 og GS-US-174-0103)*

Niðurstöður úr tveimur slembiröðuðum, tvíblindum, III. stigs rannsóknum sem stóðu í 48 vikur, þar sem tenófóvír tvísóproxíl var borið saman við adefóvír tvípívoxíl hjá fullorðnum sjúklingum með lifrarsjúkdóm í jafnvægi, koma fram á töflu 3 hér á eftir. Rannsókn GS-US-174-0103 var framkvæmd á 266 (slembiröðuðum og meðhöndluðum) HBeAg jákvæðum sjúklingum á meðan rannsókn GS-US-174-0102 var framkvæmd á 375 (slembiröðuðum og meðhöndluðum) sjúklingum sem voru HBeAg neikvæðir og HBeAb jákvæðir.

Í báðum rannsóknunum kom tenófóvír tvísóproxíl marktækt betur út en adefóvír tvípívoxíl á aðal virkniendapunktum hvað varðar fullkomna svörun (skilgreint sem HBV DNA gildi < 400 eintök/ml og minnst 2 stiga framför samkvæmt Knodell stuðli yfir drep og bólgu án versnunar á Knodell stuðli yfir bandvefsmyndun). Meðferð með tenófóvír tvísóproxíli 245 mg var einnig sett í samhengi við marktækt stærra hlutfall sjúklinga með HBV DNA < 400 eintök/ml, samanborið við meðferð með adefóvír tvípívoxíli 10 mg. Báðar meðferðir gáfu svipaðar niðurstöður hvað varðar vefjafræðilega svörun (skilgreind sem minnst 2 stiga framför samkvæmt Knodell stuðli yfir drep og bólgu án versnunar á Knodell stuðli yfir bandvefsmyndun) í 48. viku (sjá töflu 3 hér á eftir).

Í rannsókn GS-US-174-0103 náði marktækt stærra hlutfall sjúklinga í hópnum sem fékk tenófóvír tvísóproxíl eðlilegum ALAT gildum og hvarfi HBeAg miðað við hópinn sem fékk adefóvír tvípívoxíl í 48. viku (sjá töflu 3 hér á eftir).

**Tafla 3: Virknibreytur hjá HBeAg neikvæðum og HBeAg jákvæðum sjúklingum með lifrarsjúkdóm í jafnvægi í 48. viku**

|                                                                                            | <b>Rannsókn 174-0102 (HBeAg neikvæð)</b> |                                      | <b>Rannsókn 174-0103 (HBeAg jákvæð)</b> |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Breyta                                                                                     | Tenófóvír tvísóproxíl 245 mg<br>n = 250  | Adefóvír tvípívoxíl 10 mg<br>n = 125 | Tenófóvír tvísóproxíl 245 mg<br>n = 176 | Adefóvír tvípívoxíl 10 mg<br>n = 90 |
| <b>Fullkomin svörun (%)<sup>a</sup></b>                                                    | 71*                                      | 49                                   | 67*                                     | 12                                  |
| <b>Vefjafræði</b>                                                                          |                                          |                                      |                                         |                                     |
| Vefjafræðileg svörun (%) <sup>b</sup>                                                      | 72                                       | 69                                   | 74                                      | 68                                  |
| <b>Miðgildisminnkun HBV DNA frá grunnildi<sup>c</sup></b><br>(log <sub>10</sub> eintök/ml) | -4,7*                                    | -4,0                                 | -6,4*                                   | -3,7                                |
| <b>HBV DNA (%)</b>                                                                         |                                          |                                      |                                         |                                     |
| < 400 eintök/ml<br>(< 69 a.e./ml)                                                          | 93*                                      | 63                                   | 76*                                     | 13                                  |
| <b>ALAT (%)</b>                                                                            |                                          |                                      |                                         |                                     |
| Eðlilegt ALAT <sup>d</sup>                                                                 | 76                                       | 77                                   | 68*                                     | 54                                  |
| <b>Sermisfræði (%)</b>                                                                     |                                          |                                      |                                         |                                     |
| HBeAg hvarf/<br>mótefnavendingu                                                            | n/a                                      | n/a                                  | 22/21                                   | 18/18                               |
| HBsAg hvarf/<br>mótefnavendingu                                                            | 0/0                                      | 0/0                                  | 3*/1                                    | 0/0                                 |

\* p-gildi miðað við adefóvír tvípívoxíl < 0,05.

<sup>a</sup> Fullkomin svörun skilgreind sem HBV DNA gildi < 400 eintök/ml og minnst 2 stiga framför samkvæmt Knodell stuðli yfir drep og bólgu án versnunar á Knodell stuðli yfir bandvefsmyndun.

<sup>b</sup> Minnst 2 stiga framför samkvæmt Knodell stuðli yfir drep og bólgu án versnunar á Knodell stuðli yfir bandvefsmyndun.

<sup>c</sup> Miðgildisbreyting á HBV DNA frá grunnildi endurspeglar aðeins lítilega muninn á HBV DNA gildum við grunnildi og greiningarmörkum prófsins.

<sup>d</sup> Þýðið sem notað var til greiningar á eðlilegu ALAT innihélt aðeins sjúklinga með ALAT gildi hærri en ULN við grunnildi. n/a = not applicable (á ekki við).

Tenófóvír tvísóproxíl var sett í samhengi við marktækt hærra hlutfall sjúklinga með ógreinanlegt HBV DNA (< 169 eintök/ml [ $< 29$  a.e./ml]; magngreiningarmörk Roche Cobas Taqman HBV prófsins) þegar það var borið saman við adefóvír tvípívoxíl (rannsókn GS-US-174-0102; 91%, 56% og rannsókn GS-US-174-0103; 69%, 9%), hvort um sig.

Svörun við meðferð með tenófóvír tvísóproxíli var sambærileg hjá sjúklingum sem höfðu fengið núkleósíð (n = 51) og sjúklingum sem ekki höfðu fengið núkleósíð (n = 375) og hjá sjúklingum með eðlileg ALAT gildi (n = 21) og afbrigðileg ALAT gildi (n = 405) við grunnildi þegar rannsóknir GS-US-174-0102 og GS-US-174-0103 voru lagðar saman. Fjörtíu og níu af sjúklingunum 51 sem höfðu fengið núkleósíð höfðu áður fengið meðferð með lamívúdíni. Sjöttíu og þrjú prósent sjúklinga sem fengið höfðu núkleósíð og 69% þeirra sem ekki höfðu fengið núkleósíð náðu fullkominni svörun

við meðferð; 90% sjúklinga sem höfðu fengið nýkleósíð og 88% sjúklinga sem ekki höfðu fengið nýkleósíð náðu HBV DNA bælingunni < 400 eintök/ml. Allir sjúklingar sem voru með eðlileg ALAT gildi við grunnigildi og 88% sjúklinga með afbrigðileg ALAT gildi við grunnigildi náðu HBV DNA bælingunni < 400 eintök/ml.

#### Reynsla, lengri en 48 vikur, í rannsóknum GS-US-174-0102 og GS-US-174-0103

Eftir að hafa fengið tvíblindra meðferð í 48 vikur (annaðhvort 245 mg tenófóvír tvísóproxíl eða 10 mg adefóvír tvípívoxíl) í rannsóknum GS-US-174-0102 og GS-US-174-0103 skiptu sjúklingar beint yfir í opna meðferð með tenófóvír tvísóproxíli. Í rannsóknum GS-US-174-0102 og GS-US-174-0103 héldu 77% og 61% sjúklinga áfram þátttöku í rannsókninni fram að viku 384, talið í sömu röð. Í 96., 144., 192., 240., 288. og 384. viku var veirubælingu, lífefnafræðilegri og sermisfræðilegri svörun viðhaldið með áframhaldandi meðferð með tenófóvír tvísóproxíli (sjá töflur 4 og 5 hér á eftir).

**Tafla 4: Virknibreytur hjá HBeAg neikvæðum sjúklingum með lifrarsjúkdóm í jafnvægi í opinni meðferð í 96., 144., 192., 240., 288. og 384. viku**

|                                   | Rannsókn 174-0102 (HBeAg neikvæð)       |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Breyta <sup>a</sup>               | Tenófóvír tvísóproxíl 245 mg<br>n = 250 |                  |                  |                  |                  |                  | Adefóvír tvípívoxíl 10 mg skipt yfir í<br>tenófóvír tvísóproxíl 245 mg<br>n = 125 |                  |                  |                  |                  |                  |
| Vika                              | 96 <sup>b</sup>                         | 144 <sup>c</sup> | 192 <sup>g</sup> | 240 <sup>i</sup> | 288 <sup>l</sup> | 384 <sup>o</sup> | 96 <sup>c</sup>                                                                   | 144 <sup>f</sup> | 192 <sup>h</sup> | 240 <sup>j</sup> | 288 <sup>m</sup> | 384 <sup>p</sup> |
| HBV DNA (%)                       | 90                                      | 87               | 84               | 83               | 80               | 74               | 89                                                                                | 88               | 87               | 84               | 84               | 76               |
| < 400 eintök/ml<br>(< 69 a.e./ml) |                                         |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| ALAT (%)                          | 72                                      | 73               | 67               | 70               | 68               | 64               | 68                                                                                | 70               | 77               | 76               | 74               | 69               |
| Eðlilegt ALAT <sup>d</sup>        |                                         |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Sermisfræði (%)                   |                                         |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| HBeAg hvarf/<br>mótefnavendingu   | n/a                                     | n/a              | n/a              | n/a              | n/a              | n/a              | n/a                                                                               | n/a              | n/a              | n/a              | n/a              | n/a              |
| HBsAg hvarf/<br>mótefnavendingu   | 0/0                                     | 0/0              | 0/0              | 0/0              | 0/0              | 1/1 <sup>n</sup> | 0/0                                                                               | 0/0              | 0/0              | 0/0 <sup>k</sup> | 1/1 <sup>n</sup> | 1/1 <sup>n</sup> |

<sup>a</sup> Byggt á langtímamatsalgrími (LTE (Long Term Evaluation) greining) - Sjúklingar sem hættu þátttöku í rannsókninni á einhverjum tímamarki fyrir 384. viku vegna endapunkts sem skilgreindur var í aðferðarlýsingu og sjúklingar sem luku 384. viku, eru teknir með í nefnara.

<sup>b</sup> 48 vikur af tvíblindri meðferð með tenófóvír tvísóproxíli og síðan 48 vikna opin meðferð.

<sup>c</sup> 48 vikur af tvíblindri meðferð með adefóvír tvípívoxíli og síðan 48 vikna opin meðferð með tenófóvír tvísóproxíli.

<sup>d</sup> Þýðið sem notað var til greiningar á eðlilegu ALAT innihélt aðeins sjúklinga með ALAT gildi hærri en ULN við grunnigildi.

<sup>e</sup> 48 vikur af tvíblindri meðferð með tenófóvír tvísóproxíli og síðan 96 vikna opin meðferð.

<sup>f</sup> 48 vikur af tvíblindri meðferð með adefóvír tvípívoxíli og síðan 96 vikna opin meðferð með tenófóvír tvísóproxíli.

<sup>g</sup> 48 vikur af tvíblindri meðferð með tenófóvír tvísóproxíli og síðan 144 vikna opin meðferð.

<sup>h</sup> 48 vikur af tvíblindri meðferð með adefóvír tvípívoxíli og síðan 144 vikna opin meðferð með tenófóvír tvísóproxíli.

<sup>i</sup> 48 vikur af tvíblindri meðferð með tenófóvír tvísóproxíli og síðan 192 vikna opin meðferð.

<sup>j</sup> 48 vikur af tvíblindri meðferð með adefóvír tvípívoxíli og síðan 192 vikna opin meðferð með tenófóvír tvísóproxíli.

<sup>k</sup> Einn sjúklingur í þessum hóp reyndist HBsAg neikvæður í fyrsta skipti í skoðun í viku 240 og var áfram í rannsókninni til loka rannsóknartímans (*data cut-off time*). Þó var neikvætt HBsAg ekki staðfest fyrr en við næstu skoðun.

<sup>l</sup> 48 vikur af tvíblindri meðferð með tenófóvír tvísóproxíli og síðan 240 vikna opin meðferð.

<sup>m</sup> 48 vikur af tvíblindri meðferð með adefóvír tvípívoxíli og síðan 240 vikna opin meðferð með tenófóvír tvísóproxíli.

<sup>n</sup> Tölurnar sem fram koma eru samanlögð prósentugildi samkvæmt Kaplan Meier greiningu, að undanskildum upplýsingum sem safnað var eftir að emtricitabíni var bætt við opna meðferð með tenófóvír tvísóproxíli (KM-tenófóvír tvísóproxíl).

<sup>o</sup> 48 vikur af tvíblindri meðferð með tenófóvír tvísóproxíli og síðan 336 vikna opin meðferð.

<sup>p</sup> 48 vikur af tvíblindri meðferð með adefóvír tvípívoxíli og síðan 336 vikna opin meðferð með tenófóvír tvísóproxíli.

n/a = *not applicable* (á ekki við).



**Tafla 5: Virknibreytur hjá HBeAg jákvæðum sjúklingum með lifrarsjúkdóm í jafnvægi í opinni meðferð í 96., 144., 192., 240., 288. og 384. viku**

|                                   | <b>Rannsókn 174-0103 (HBeAg jákvæð)</b> |                      |                       |                       |                       |                        |                                                                                  |                      |                      |                        |                        |                        |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Breyta <sup>a</sup>               | Tenófóvír tvísóproxíl 245 mg<br>n = 176 |                      |                       |                       |                       |                        | Adefóvír tvípívoxíl 10 mg skipt yfir í<br>tenófóvír tvísóproxíl 245 mg<br>n = 90 |                      |                      |                        |                        |                        |
| Vika                              | 96 <sup>b</sup>                         | 144 <sup>c</sup>     | 192 <sup>h</sup>      | 240 <sup>i</sup>      | 288 <sup>m</sup>      | 384 <sup>o</sup>       | 96 <sup>c</sup>                                                                  | 144 <sup>f</sup>     | 192 <sup>i</sup>     | 240 <sup>k</sup>       | 288 <sup>n</sup>       | 384 <sup>p</sup>       |
| <b>HBV DNA (%)</b>                | 76                                      | 72                   | 68                    | 64                    | 61                    | 56                     | 74                                                                               | 71                   | 72                   | 66                     | 65                     | 61                     |
| < 400 eintök/ml<br>(< 69 a.e./ml) |                                         |                      |                       |                       |                       |                        |                                                                                  |                      |                      |                        |                        |                        |
| <b>ALAT (%)</b>                   | 60                                      | 55                   | 56                    | 46                    | 47                    | 47                     | 65                                                                               | 61                   | 59                   | 56                     | 57                     | 56                     |
| Eðlilegt ALAT <sup>d</sup>        |                                         |                      |                       |                       |                       |                        |                                                                                  |                      |                      |                        |                        |                        |
| <b>Sermisfræði (%)</b>            |                                         |                      |                       |                       |                       |                        |                                                                                  |                      |                      |                        |                        |                        |
| HBeAg hvarf/<br>mótefnavendingu   | 26/<br>23                               | 29/<br>23            | 34/<br>25             | 38/<br>30             | 37/<br>25             | 30/<br>20              | 24/<br>20                                                                        | 33/<br>26            | 36/<br>30            | 38/<br>31              | 40/<br>31              | 35/<br>24              |
| HBsAg hvarf/<br>mótefnavendingu   | 5/<br>4                                 | 8/<br>6 <sup>g</sup> | 11/<br>8 <sup>g</sup> | 11/<br>8 <sup>l</sup> | 12/<br>8 <sup>l</sup> | 15/<br>12 <sup>l</sup> | 6/<br>5                                                                          | 8/<br>7 <sup>g</sup> | 8/<br>7 <sup>g</sup> | 10/<br>10 <sup>l</sup> | 11/<br>10 <sup>l</sup> | 13/<br>11 <sup>l</sup> |

<sup>a</sup> Byggt á langtíamamatsalgrími (LTE (*Long Term Evaluation*)) greining) - Sjúklingar sem hættu þátttöku í rannsókninni á einhverjum tímapunkti fyrir 384. viku vegna endapunkts sem skilgreindur var í aðferðarlýsingu og sjúklingar sem luku 384. viku, eru teknir með í nefnara.

<sup>b</sup> 48 vikur af tvíblindri meðferð með tenófóvír tvísóproxíli og síðan 48 vikna opin meðferð.

<sup>c</sup> 48 vikur af tvíblindri meðferð með adefóvír tvípívoxíli og síðan 48 vikna opin meðferð með tenófóvír tvísóproxíli.

<sup>d</sup> Þýðið sem notað var til greiningar á eðlilegu ALAT innihélt aðeins sjúklinga með ALAT gildi hærri en ULN við grunnildi.

<sup>e</sup> 48 vikur af tvíblindri meðferð með tenófóvír tvísóproxíli og síðan 96 vikna opin meðferð.

<sup>f</sup> 48 vikur af tvíblindri meðferð með adefóvír tvípívoxíli og síðan 96 vikna opin meðferð með tenófóvír tvísóproxíli.

<sup>g</sup> Tölurnar sem fram koma eru samanlögð prósentugildi samkvæmt Kaplan Meier greiningu, að meðtöldum upplýsingum sem safnað var eftir að emtricitabíni var bætt við opna meðferð með tenófóvír tvísóproxíli (KM-ITT).

<sup>h</sup> 48 vikur af tvíblindri meðferð með tenófóvír tvísóproxíli og síðan 144 vikna opin meðferð.

<sup>i</sup> 48 vikur af tvíblindri meðferð með adefóvír tvípívoxíli og síðan 144 vikna opin meðferð með tenófóvír tvísóproxíli.

<sup>j</sup> 48 vikur af tvíblindri meðferð með tenófóvír tvísóproxíli og síðan 192 vikna opin meðferð.

<sup>k</sup> 48 vikur af tvíblindri meðferð með adefóvír tvípívoxíli og síðan 192 vikna opin meðferð með tenófóvír tvísóproxíli.

<sup>l</sup> Tölurnar sem fram koma eru samanlögð prósentugildi samkvæmt Kaplan Meier greiningu, að undanskildum upplýsingum sem safnað var eftir að emtricitabíni var bætt við opna meðferð með tenófóvír tvísóproxíli (KM-tenófóvír tvísóproxíl).

<sup>m</sup> 48 vikur af tvíblindri meðferð með tenófóvír tvísóproxíli og síðan 240 vikna opin meðferð.

<sup>n</sup> 48 vikur af tvíblindri meðferð með adefóvír tvípívoxíli og síðan 240 vikna opin meðferð með tenófóvír tvísóproxíli.

<sup>o</sup> 48 vikur af tvíblindri meðferð með tenófóvír tvísóproxíli og síðan 336 vikna opin meðferð.

<sup>p</sup> 48 vikur af tvíblindri meðferð með adefóvír tvípívoxíli og síðan 336 vikna opin meðferð með tenófóvír tvísóproxíli.

Bæði lágu fyrir paraðar upplýsingar um grunnildi lifrarsýna og gildi í 240. viku fyrir

331/489 sjúklinga sem héldu áfram í rannsóknum GS-US-174-0102 og GS-US-174-0103 í 240. viku (sjá töflu 6 hér á eftir). Nítiu og fimm prósent (225/237) sjúklinga sem ekki voru með skorpulífur við grunnildi og 99% (93/94) sjúklinga með skorpulífur við grunnildi sýndu annaðhvort ekki fram á neina breytingu eða bata hvað varðar bandvefsmyndun (Ishak stuðull yfir bandvefsmyndun). Af þeim 94 sjúklingum sem voru með skorpulífur við grunnildi (Ishak stuðull yfir bandvefsmyndun: 5-6), urðu 26% (24) ekki fyrir neinum breytingum hvað varðar Ishak stuðul yfir bandvefsmyndun og hjá 72% (68) hafði skorpulífur gengið til baka í 240. viku og Ishak stuðull yfir bandvefsmyndun lækkað um minnst 2 stig.

**Tafla 6: Vefjafræðileg svörun (%) hjá HBeAg neikvæðum og HBeAg jákvæðum sjúklingum með lifrarsjúkdóm í jafnvægi í 240. viku samanborið við grunnildi**

|                                            | Rannsókn 174-0102<br>(HBeAg neikvæð)                    |                                                                                                      | Rannsókn 174-0103<br>(HBeAg jákvæð)                     |                                                                                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | Tenófóvír tvísóproxíl<br>245 mg<br>n = 250 <sup>c</sup> | Adefóvír tvípívoxíl<br>10 mg skipt yfir í<br>tenófóvír tvísóproxíl<br>245 mg<br>n = 125 <sup>d</sup> | Tenófóvír tvísóproxíl<br>245 mg<br>n = 176 <sup>c</sup> | Adefóvír tvípívoxíl<br>10 mg skipt yfir í<br>tenófóvír tvísóproxíl<br>245 mg<br>n = 90 <sup>d</sup> |
| Vefjafræðileg<br>svörun <sup>a,b</sup> (%) | 88<br>[130/148]                                         | 85<br>[63/74]                                                                                        | 90<br>[63/70]                                           | 92<br>[36/39]                                                                                       |

<sup>a</sup> Þýðið sem notað var til vefjafræðilegrar greiningar innihélt aðeins sjúklinga sem lifrarsýni lágu fyrir hjá (Vantar = Útilokað) í 240. viku. Svörun eftir að emtricitabíni var bætt við er útilokuð (alls 17 einstaklingar í báðum rannsóknum).

<sup>b</sup> Minnst 2. stiga framfærð samkvæmt Knodell stuðli yfir drep og bólgu án versunar á Knodell stuðli yfir bandvefsmýndun.

<sup>c</sup> 48 vikna tvíblind meðferð með tenófóvír tvísóproxíli og síðan allt að 192 vikna opin meðferð.

<sup>d</sup> 48 vikna tvíblind meðferð með adefóvír tvípívoxíli og síðan allt að 192 vikna opin meðferð með tenófóvír tvísóproxíli.

#### *Reynsla hjá sjúklingum sem eru samhliða sýktir af HIV og hafa þegar fengið lamívúdín*

Í slembiraðaðri, 48 vikna, tvíblindri samanburðarrannsókn á tenófóvír tvísóproxíli 245 mg hjá fullorðnum sjúklingum sem voru samhliða sýktir af HIV-1 og langvinnri lifrabólgu B sem þegar höfðu fengið lamívúdín (rannsókn ACTG 5127) voru meðal HBV DNA gildi við grunnildi í sermi sjúklinga sem var slembiraðað í tenófóvír arminn 9,45 log<sub>10</sub> eintök/ml (n = 27). Meðferð með tenófóvír tvísóproxíli 245 mg var sett í samhengi við meðaltals breytingu á HBV DNA í sermi frá grunnildi hjá sjúklingum með 48 vikna gögn, uppá -5,74 log<sub>10</sub> eintök/ml (n = 18). Auk þess voru 61% sjúklinga með eðlileg ALAT gildi í 48. viku.

#### *Reynsla hjá sjúklingum með viðvarandi veirufjölgun (rannsókn GS-US-174-0106)*

Verkun og öryggi tenófóvír tvísóproxíls 245 mg eða tenófóvírs tvísóproxíls 245 mg auk 200 mg af emtricitabíni hafa verið metin í slembiraðaðri, tvíblindri rannsókn (rannsókn GS-US-174-0106) hjá HBeAg jákvæðum og HBeAg neikvæðum fullorðnum sjúklingum með viðvarandi veirudreyra (HBV DNA ≥ 1.000 eintök/ml) meðan þeir fengu adefóvír tvípívoxíl 10 mg í meira en 24 vikur. Við grunnildi höfðu 57% sjúklinga sem slembiraðað var til að fá tenófóvír tvísóproxíl miðað við 60% sjúklinga sem var slembiraðað í meðferðarhópinn sem fékk emtricitabín auk tenófóvír tvísóproxíls, áður verið meðhöndlaðir með lamívúdíni. Á heildina litið í 24. viku endaði meðferð með tenófóvír tvísóproxíli með því að 66% (35/53) sjúklinga voru með HBV DNA < 400 eintök/ml (< 69 a.e./ml) miðað við 69% (36/52) sjúklinga sem voru meðhöndlaðir með emtricitabíni auk tenófóvír tvísóproxíls (p = 0,672). Auk þess voru 55% (29/53) sjúklinga sem voru meðhöndlaðir með tenófóvír tvísóproxíli með ógreinanlegt HBV DNA (< 169 eintök/ml [< 29 a.e./ml]; magngreiningarmörk Roche Cobas TaqMan HBV prófsins) miðað við 60% (31/52) sjúklinga sem voru meðhöndlaðir með emtricitabíni auk tenófóvír tvísóproxíls (p = 0,504). Erfitt er að túlka samanburð á meðferðarhópunum eftir 24. viku þar sem rannsóknaraðilar höfðu þann valkost að breyta yfir í öfluga opna meðferð með emtricitabíni auk tenófóvír tvísóproxíls. Enn eru í gangi langtímarannsóknir til að meta ávinning/áhættu tvöfaldrar meðferðar með emtricitabíni auk tenófóvír tvísóproxíls hjá sjúklingum sem aðeins eru sýktir af HBV.

#### *Reynsla hjá sjúklingum með lifrarsjúkdóm með lifrabílu í 48. Viku (rannsókn GS-US-174-0108)*

Rannsókn GS-US-174-0108 er slembiröðuð, tvíblind rannsókn með samanburði við virkt lyf, sem metur öryggi og verkun tenófóvír tvísóproxíls (n = 45), emtricitabíns ásamt tenófóvír tvísóproxíli (n = 45) og entekavírs (n = 22) hjá sjúklingum með lifrarsjúkdóm með lifrabílu. Í hópnum sem fékk meðferð með tenófóvír tvísóproxíli var meðal CPT gildi sjúklinga 7,2, meðal HBV DNA var 5,8 log<sub>10</sub> eintök/ml og meðal ALAT gildi í sermi var 61e/l við grunnildi. Fjörutíu og tvö prósent (19/45) sjúklinga höfðu þegar fengið lamívúdín í minnst 6 mánuði, 20% (9/45) sjúklinga höfðu þegar fengið adefóvír tvípívoxíl og 9 af 45 sjúklingum (20%) sýndu fram á ónæmisstökkbreytingar hvað varðar lamívúdín og/eða adefóvír tvípívoxíl við grunnildi. Aðrir aðal öryggisendapunktur var það að meðferð var hætt vegna aukaverkana og staðfest aukning kreatíníns í sermi ≥ 0,5 mg/dl eða staðfest fosfat í sermi sem nemur < 2 mg/dl.

Hjá sjúklingum með CPT stig  $\leq 9$ , náðu 74% (29/39) úr tenófóvír tvísóproxíl meðferðarhópnum og 94% (33/35) úr meðferðarhópnum sem fékk emtrícítabín ásamt tenófóvír tvísóproxíli HBV DNA < 400 eintök/ml eftir 48 vikna meðferð.

Á heildina litið eru upplýsingar úr rannsókninni of takmarkaðar til þess að hægt sé að fá endanlega niðurstöðu varðandi samanburðinn á meðferð með emtrícítabíni ásamt tenófóvír tvísóproxíli miðað við meðferð með tenófóvír tvísóproxíli (sjá töflu 7 hér á eftir).

**Tafla 7: Gildi varðandi öryggi og verkun hjá sjúklingum með lifrabílu í 48. viku**

| Gildi                                                                                                                                   | Rannsókn 174-0108                           |                                                                     |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                         | Tenófóvír tvísóproxíl<br>245 mg<br>(n = 45) | Emtrícítabín 200 mg/<br>tenófóvír tvísóproxíl<br>245 mg<br>(n = 45) | Entekavír<br>(0,5 mg eða<br>1 mg)<br>n = 22 |
| <b>Brugðið þol (Meðferð með rannsóknarlyfi var hætt til frambúðar vegna aukaverkunar tengdri meðferð)</b>                               | 3 (7%)                                      | 2 (4%)                                                              | 2 (9%)                                      |
| n (%) <sup>a</sup>                                                                                                                      |                                             |                                                                     |                                             |
| <b>Staðfest aukning kreatíníns í sermi <math>\geq 0,5</math> mg/dl frá grunnildi eða staðfest fosfat í sermi sem nemur &lt; 2 mg/dl</b> | 4 (9%)                                      | 3 (7%)                                                              | 1 (5%)                                      |
| n (%) <sup>b</sup>                                                                                                                      |                                             |                                                                     |                                             |
| <b>HBV DNA n (%)</b>                                                                                                                    | 31/44 (70%)                                 | 36/41 (88%)                                                         | 16/22 (73%)                                 |
| < 400 eintök/ml<br>n (%)                                                                                                                |                                             |                                                                     |                                             |
| <b>ALAT n (%)</b>                                                                                                                       | 25/44 (57%)                                 | 31/41 (76%)                                                         | 12/22 (55%)                                 |
| eðlileg ALAT gildi                                                                                                                      |                                             |                                                                     |                                             |
| <b><math>\geq 2</math> stiga minnkun CPT frá grunnildi</b>                                                                              | 7/27 (26%)                                  | 12/25 (48%)                                                         | 5/12 (42%)                                  |
| n (%)                                                                                                                                   |                                             |                                                                     |                                             |
| <b>Meðal breyting á CPT stigi frá grunnildi</b>                                                                                         | -0,8                                        | -0,9                                                                | -1,3                                        |
| <b>Meðal breyting á MELD stigi (Model for End-Stage Liver Disease) frá grunnildi</b>                                                    | -1,8                                        | -2,3                                                                | -2,6                                        |

<sup>a</sup> p-gildi til samanburðar á samsettu hópnum sem fengu tenófóvír miðað við hópinn sem fékk entekavír = 0,622,

<sup>b</sup> p-gildi til samanburðar á samsettu hópnum sem fengu tenófóvír miðað við hópinn sem fékk entekavír = 1,000.

#### Reynsla, lengri en 48 vikur í rannsókn GS-US-174-0108

Þegar stuðst var við greiningu þar sem það að hætta meðferð eða skipta um meðferð samsvaraði meðferðarbresti (noncompleter/switch = failure analysis) náðu 50% (21/42) sjúklinga sem fengu tenófóvír tvísóproxíl, 76% (28/37) sjúklinga sem fengu emtrícítabín auk tenófóvír tvísóproxíls og 52% (11/21) sjúklinga sem fengu entekavír HBV DNA < 400 eintökum/ml í viku 168.

#### Reynsla hjá sjúklingum með HBV sem er ónæm fyrir lamívúdíni eftir 240 vikur (rannsókn GS-US-174-0121)

Verkun og öryggi 245 mg tenófóvír tvísóproxíls voru metin í slembiraðaðri, tvíblindri rannsókn (GS-US-174-0121) hjá HBeAg jákvæðum og HBeAg neikvæðum sjúklingum (n = 280) með lifrarsjúkdóm í jafnvægi, veirudreyra (HBV DNA  $\geq 1.000$  a.e./ml), og merki um arfgerð sem er ónæm fyrir lamívúdíni (rtM204I/V +/- rtL180M). Aðeins fimm sjúklingar sýndu ónæmisstökkbreytingar í tengslum við aðefóvír við grunnildi. Hundrað fjórtíu og einum og 139 fullorðnum sjúklingum var slembiraðað í meðferðarhóp með tenófóvír tvísóproxíli og meðferðarhóp með emtrícítabíni auk tenófóvír tvísóproxíls, talið í sömu röð. Lýðfræðilegar upplýsingar við grunnildi voru svipaðar í

báðum meðferðarhópunum: Við grunnildi voru 52,5% sjúklinga HBeAg neikvæðir, 47,5% voru HBeAg jákvæðir, meðalgildi HBV DNA var 6,5 log<sub>10</sub> eintök/ml og meðal ALAT var 79 e./l, talið í þessari röð.

Eftir 240 vikna meðferð sýndu 117 af 141 sjúklingi (83%) sem slembiraðað var til að fá tenófóvír tvísóproxíl fram á HBV DNA < 400 eintök/ml og 51 af 79 sjúklingum (65%) sýndu fram á eðlilegt ALAT. Eftir 240 vikna meðferð með emtrícítabíni auk tenófóvír tvísóproxíli höfðu 115 af 139 sjúklingum (83%) HBV DNA < 400 eintök/ml og 59 af 83 sjúklingum (71%) eðlilegt ALAT. Meðal þeirra HBeAg jákvæðu sjúklinga sem slembiraðað var til að fá tenófóvír tvísóproxíl hvarf HBeAg hjá 16 af 65 sjúklingum (25%) og hjá 8 af 65 sjúklingum (12%) fundust mótefni gegn HBe út viku 240. Hjá HBeAg jákvæðum sjúklingum sem var slembiraðað til að fá emtrícítabín auk tenófóvír tvísóproxíls hvarf HBeAg hjá 13 af 68 sjúklingum (19%) og hjá 7 af 68 sjúklingum (10%) fundust mótefni gegn HBe út viku 240. Hjá tveimur sjúklingum sem slembiraðað var til að fá tenófóvír tvísóproxíl var HBsAg horfið í viku 240, en ekki fundust mótefni gegn HBs. Hjá fimm sjúklingum sem var slembiraðað til að fá emtrícítabín auk tenófóvír tvísóproxíls hvarf HbsAg og hjá 2 af þessum 5 sjúklingum fundust mótefni gegn HBs.

#### *Klínískt ónæmi*

Fjögur hundruð tuttugu og sex HBeAg neikvæðir (GS-US-174-0102, n = 250) og HBeAg jákvæðir (GS-US-174-0103, n = 176) sjúklingar sem upphaflega var slembiraðað í tvíblinda meðferð með tenófóvír tvísóproxíli og skiptu svo yfir í opna meðferð með tenófóvír tvísóproxíli voru metnir hvað varðar arfgerðarbreytingar á HBV fjölliðunarensími frá grunnildi. Arfgerðarmat framkvæmt á öllum sjúklingum með HBV DNA > 400 eintök/ml í 48. (n = 39), 96. (n = 24), 144. (n = 6), 192. (n = 5), 240. (n = 4), 288. (n = 6) og 384. viku (n = 2) í einlyfjameðferð með tenófóvír tvísóproxíli sýndi ekki fram á þróun neinna stökkbreytinga í tengslum við ónæmi fyrir tenófóvír tvísóproxíli.

Tvö hundruð og fimmtán HBeAg neikvæðir (GS-US-174-0102, n = 125) og HBeAg jákvæðir (GS-US-174-0103, n = 90) sjúklingar sem upphaflega var slembiraðað í tvíblinda meðferð með adefóvír tvípívoxíli og skiptu svo yfir í opna meðferð með tenófóvír tvísóproxíli voru metnir hvað varðar arfgerðarbreytingar á HBV fjölliðunarensími frá grunnildi. Arfgerðarmat framkvæmt á öllum sjúklingum með HBV DNA > 400 eintök/ml í 48. (n = 16), 96. (n = 5), 144. (n = 1), 192. (n = 2), 240. (n = 1), 288. (n = 1) og 384. viku (n = 2) í einlyfjameðferð með tenófóvír tvísóproxíli sýndi ekki fram á þróun neinna stökkbreytinga í tengslum við ónæmi fyrir tenófóvír tvísóproxíli.

Í rannsókn GS-US-174-0108 fengu 45 sjúklingar (þ.m.t. 9 sjúklingar með ónæmisstökkbreytingar hvað varðar lamívúdín og/eða adefóvír tvípívoxíl við grunnildi) tenófóvír tvísóproxíl í allt að 168 vikur. Arfgerðarupplýsingar tvinnnaðra HBV stofna við grunnildi og á meðan meðferð stóð, lágu fyrir hvað varðar 6/8 sjúklinga með HBV DNA > 400 eintök/ml í viku 48. Ekki varð vart við nein amínósýruskiptihvörf í tengslum við ónæmi fyrir tenófóvír tvísóproxíli hjá þessum stofnum. Greining á arfgerð var framkvæmd hjá 5 sjúklingum í tenófóvír tvísóproxíl arminum eftir viku 48. Ekki varð vart við nein amínósýruskiptihvörf í tengslum við tenófóvír tvísóproxíl ónæmi hjá neinum sjúklingi.

Í rannsókn GS-US-174-0121 fékk 141 sjúklingur með ónæmisskiptihvörf fyrir lamívúdíni við grunnildi tenófóvír tvísóproxíl í allt að 240 vikur. Alls greindust 4 sjúklingar með veirur í blóðinu (HBV DNA > 400 eintök/ml) á síðasta tímapunkti þar sem þeir fengu tenófóvír tvísóproxíl. Þar af lágu fyrir upplýsingar um röðun tvinnnaðra HBV stofna við grunnildi og á meðan meðferð stóð hvað varðar 2 af 4 sjúklingum. Ekki varð vart við nein amínósýruskiptihvörf í tengslum við ónæmi fyrir tenófóvír tvísóproxíli hjá þessum stofnum.

Í blindaðri rannsókn á börnum (GS-US-174-0115) fengu til að byrja með 52 sjúklingar (þ.m.t. 6 sjúklingar með ónæmisstökkbreytingar hvað varðar lamívúdín við grunnildi) tenófóvír tvísóproxíl í allt að 72 vikur og eftir það skiptu 51 sjúklingar af 52 yfir í opinn tenófóvír tvísóproxíl (tenófóvír tvísóproxíl-tenófóvír tvísóproxíl) hóp. Arfgerðarmat var framkvæmt á öllum sjúklingunum innan þessa hóps með HBV DNA > 400 eintök/ml í viku 48 (n = 6), viku 72 (n = 5), viku 96 (n = 4), viku 144 (n = 2) og viku 192 (n = 3). Fimmtíu og fjórir sjúklingar (þ.m.t. 2 sjúklingar með ónæmisstökkbreytingar hvað varðar lamívúdín við grunnildi) fengu til að byrja með blindaða meðferð með lyfleysu í 72 vikur, eftir það skiptu 52 sjúklingar af þessum 54 yfir í tenófóvír tvísóproxíl

(PLB-tenófóvír tvísóproxíl hópur). Arfgerðarmat var framkvæmt á öllum sjúklingunum innan þessa hóps með HBV DNA > 400 eintök/ml í viku 96 (n = 17), viku 144 (n = 7) og viku 192 (n = 8). Ekki varð vart við nein aminósýruskiptihvörf í tengslum við ónæmi fyrir tenófóvír tvísóproxíli hjá þessum stofnum.

Í rannsókn hjá börnum (GS-US-174-0144) lágu fyrir paraðar arfgerðarupplýsingar HBV stofna sem einangraðir voru frá sjúklingum sem fengu blindaða meðferð með tenófóvír tvísóproxíli fyrir 9 af 10 sjúklingum í viku 48 sem voru með HBV DNA > 400 eintök/ml í blóðvökva. Arfgerðarupplýsingar paraðra HBV stofna við grunnildi og meðan á HBV meðferð stóð frá sjúklingum sem skiptu yfir í opna meðferð með tenófóvír tvísóproxíli úr blindaðri meðferð með tenófóvíri tvísóproxíli (TDF-TDF hópur) eða úr lyfleysu (PLB-TDF hópur) eftir a.m.k. 48 vikna blindaða meðferð lágu fyrir hjá 12 af 16 sjúklingum í viku 96, hjá 4 af 6 sjúklingum í viku 144 og hjá 4 af 4 sjúklingum í viku 192 með HBV DNA > 400 eintök/ml í blóðvökva. Ekki varð vart við neinar aminósýruskiptibreytingar sem tengdust ónæmi fyrir tenófóvír tvísóproxíli hjá þessum stofnum fram að viku 48, 96, 144 eða 192.

### Börn

*HIV-1:* Í rannsókn GS-US-104-0321 fengu 87 meðferðarreyndir sjúklingar á aldrinum 12 til < 18 ára, sem voru smitaðir af HIV-1 veirunni, meðferð með tenófóvír tvísóproxíli (n = 45) eða lyfleysu (n = 42) samhliða bestu bakgrunnsmeðferð (optimised background regimen) í 48 vikur. Vegna takmarkana rannsóknarinnar varð ekki vart við ávinning af tenófóvír tvísóproxíli samanborið við lyfleysu byggt á HIV-1 RNA í blóðvökva í viku 24. Hins vegar er búist við ávinningi hjá unglingum byggt á yfirfærslu gagna varðandi fullorðna einstaklinga og lyfjahvarfaupplýsingum sem notaðar voru til samanburðar (sjá kafla 5.2).

Í upphafi rannsóknar voru meðal Z-stig beinþéttni lendahluta hryggjar hjá sjúklingum sem fengu meðferð með tenófóvír tvísóproxíli -1,004 og hjá sjúklingum sem fengu lyfleysu -0,809. Meðal Z-stig beinþéttni líkamans í heild í upphafi voru -0,866 hjá sjúklingum sem fengu meðferð með tenófóvír og -0,584 hjá sjúklingum sem fengu lyfleysu. Meðaltalsbreytingar í viku 48 (lok tvíblinda tímabilsins) hvað varðar Z-stig beinþéttni lendahluta hryggjar voru -0,215 hjá sjúklingum sem fengu meðferð með tenófóvír tvísóproxíli og -0,165 hjá sjúklingum sem fengu lyfleysu. Meðaltalsbreytingar í viku 48 (lok tvíblinda tímabilsins) hvað varðar Z-stig líkamans í heild voru -0,254 hjá sjúklingum sem fengu meðferð með tenófóvír tvísóproxíli og -0,179 hjá sjúklingum sem fengu lyfleysu. Meðaltalstíðni beinþéttniaukningar var minni í hópnum sem fékk tenófóvír tvísóproxíl en í hópnum sem fékk lyfleysu. Beinþéttni lendahluta hryggjar minnkaði marktækt í viku 48 hjá sex unglingum í hópnum sem fékk tenófóvír tvísóproxíl og einum unglingi í hópnum sem fékk lyfleysu (skilgreint sem > 4% tap). Hjá 28 sjúklingum sem fengu 96 vikna meðferð með tenófóvír tvísóproxíli lækkuðu Z-stig beinþéttni um -0,341 hvað varðar lendahluta hryggjar og um -0,458 hvað varðar líkamann í heild.

Í rannsókn GS-US-104-0352 var 97 sjúklingum á aldrinum 2 til < 12 ára, sem þegar höfðu fengið meðferð og sýndu stöðuga veirubælingu í meðferð með stavúdíni eða zídóvúdíni, slembiraðað á þann hátt að þeir fengu ýmist tenófóvír tvísóproxíl í stað stavúdíns eða zídóvúdíns (n = 48) eða héldu áfram upphaflegri meðferð (n = 49) í 48 vikur. Í viku 48 sýndu 83% sjúklinga í hópnum sem fékk meðferð með tenófóvír tvísóproxíli og 92% sjúklinga í hópnum sem fékk meðferð með stavúdíni eða zídóvúdíni fram á HIV-1 RNA styrk < 400 eintök/ml. Munurinn á hlutfalli sjúklinga sem viðhélt < 400 eintök/ml í viku 48 var aðallega vegna þess að fleiri hættu þátttöku í hópnum sem fékk meðferð með tenófóvír tvísóproxíli. Þegar þær upplýsingar sem skorti voru ekki teknar með í reikninginn sýndu 91% sjúklinga í hópnum sem fékk meðferð með tenófóvír tvísóproxíli og 94% sjúklinga í hópnum sem fékk meðferð með stavúdíni eða zídóvúdíni fram á HIV-1 RNA styrk < 400 eintök/ml í viku 48.

Tilkynnt hefur verið um minnkaða beinþéttni hjá börnum. Hjá sjúklingum sem fengu meðferð með tenófóvír tvísóproxíl eða stavúdíni eða zídóvúdíni reyndist meðal Z stig beinþéttni lendahluta hryggjar vera -1,034 og -0,498, og meðal Z stig beinþéttni líkamans í heild var -0,471 og -0,386, í þessari sömu röð, við grunnildi. Meðaltalsbreytingar í viku 48 (lok slembiraðaða tímabilsins) voru 0,032 og 0,087 hvað varðar Z stig beinþéttni lendahluta hryggjar og -0,184 og -0,027 hvað varðar meðal Z stig beinþéttni líkamans í heild í hópnum sem fengu tenófóvír tvísóproxíl annars vegar og stavúdín eða zídóvúdín hins vegar, í þessari sömu röð. Meðaltalstíðni beinþéttniaukningar í viku 48 var svipuð hjá hópnum sem fékk tenófóvír tvísóproxíl og hjá hópnum sem fékk stavúdín eða zídóvúdín. Heildar

beinþéttiaukning var minni í hópnum sem fékk meðferð með tenófóvír tvísóproxíli en hjá hópnum sem fékk meðferð með stavúdíni eða zídóvúdíni. Einn einstaklingur sem fékk meðferð með tenófóvír tvísóproxíli og engir einstaklingar sem fengu meðferð með stavúdíni eða zídóvúdíni sýndu fram á verulega ( $> 4\%$ ) minnkun beinþéttni lendahluta hryggjar í viku 48. Z stig beinþéttni lækkuðu um  $-0,012$  hvað varðar lendahluta hryggjar og  $-0,338$  hvað varðar líkamann í heild hjá 64 einstaklingum sem fengu meðferð með tenófóvír tvísóproxíli í 96 vikur. Z stig beinþéttni var ekki aðlagð hvað varðar hæð og þyngd.

Í rannsókn GS-US-104-0352 hættu 8 af 89 börnum (9,0%) sem fengu tenófóvír tvísóproxíl notkun rannsóknarlysins vegna aukaverkana á nýru. Fimm þátttakendur (5,6%) sýndu rannsóknarniðurstöður sem voru í klínísku samræmi við aðlægan píplukvilla í nýrum og þar af hættu 4 meðferð með tenófóvír tvísóproxíli (miðgildi útsetningar fyrir tenófóvír tvísóproxíli 331 vika).

*Langvinn lifrabólga B:* Í rannsókn GS-US-174-0115 voru 106 HBeAg neikvæðir og HBeAg jákvæðir sjúklingar á aldrinum 12 til  $< 18$  ára með langvinna HBV sýkingu [HBV DNA  $\geq 10^5$  eintök/ml, hækkun á ALAT gildum í sermi ( $\geq 2 \times$  ULN) eða sögu um hækkun ALAT gilda í sermi á undanförunum 24 mánuðum] meðhöndlaðir með tenófóvír tvísóproxíli 245 mg ( $n = 52$ ) eða lyfleysu ( $n = 54$ ) í 72 vikur. Sjúklingar máttu ekki hafa fengið tenófóvír tvísóproxíl áður en hugsanlega meðferðir með interferónum ( $> 6$  mánuðum fyrir skimun) eða aðra nukleósíða/nukleótíða meðferð til inntöku gegn HBV án tenófóvír tvísóproxíls ( $> 16$  vikum fyrir skimun). Í 72. viku sýndu alls 88% (46/52) sjúklinga í meðferðarhópnum sem fékk tenófóvír tvísóproxíl og 0% (0/54) sjúklinga í hópnum sem fékk lyfleysu fram á HBV DNA  $< 400$  eintök/ml. Sjötíu og fjögur prósent (26/35) sjúklinga í hópnum sem fékk tenófóvír tvísóproxíl voru með eðlileg ALAT gildi í 72. viku samanborið við 31% (13/42) í hópnum sem fékk lyfleysu. Svörun við meðferð með tenófóvír tvísóproxíli var sambærileg hjá sjúklingum sem ekki höfðu fengið nukleós(t)íð ( $n = 20$ ) og sjúklingum sem fengið höfðu nukleós(t)íð ( $n = 32$ ), þar með talið hjá sjúklingum sem voru ónæmir fyrir lamívúdíni ( $n = 6$ ). Níutíu og fimm prósent sjúklinga sem ekki höfðu fengið nukleós(t)íð, 84% sjúklinga sem fengið höfðu nukleós(t)íð, og 83% sjúklinga sem voru ónæmir fyrir lamívúdíni sýndu fram á HBV DNA  $< 400$  eintök/ml í 72. viku. Þrjátíu og einn af þeim 32 sjúklingum sem fengið höfðu nukleós(t)íð höfðu þegar fengið lamívúdíni. Í 72. viku sýndu 96% (27/28) sjúklinga með virkt ónæmi (HBV DNA  $\geq 10^5$  eintök/ml, ALAT gildi í sermi  $> 1,5 \times$  ULN) í meðferðarhópnum sem fékk tenófóvír tvísóproxíl og 0% (0/32) sjúklinga í hópnum sem fékk lyfleysu fram á HBV DNA  $< 400$  eintök/ml. Sjötíu og fimm prósent (21/28) sjúklinga með virkt ónæmi í hópnum sem fékk tenófóvír tvísóproxíl sýndu fram á eðlileg ALAT gildi í 72. viku samanborið við 34% (11/32) í hópnum sem fékk lyfleysu.

Eftir blindaða slembiraðaða meðferð í 72 vikur gátu allir þátttakendur skipt yfir í opna meðferð með tenófóvír tvísóproxíli fram að viku 192. Eftir viku 72 var veirubælingu viðhaldið hjá þeim sem fengu tvíblinda meðferð með tenófóvír tvísóproxíli og í kjölfarið opna meðferð með tenófóvír tvísóproxíli (TDF-TDF hópur): 86,5% (45/52) þátttakenda í TDF-TDF hópnum voru með HBV DNA  $< 400$  eintök/ml í viku 192. Hjá þeim þátttakendum sem fengu lyfleysu á tvíblinda tímabilinu jókst hlutfall þeirra sem voru með HBV DNA  $< 400$  eintök/ml verulega eftir að þeir hófu opna meðferð með tenófóvír tvísóproxíli (PLB-TDF hópur): 74,1% (40/54) þátttakenda í PLB-TDF hópnum voru með HBV DNA  $< 400$  eintök/ml í viku 192. Hjá þeim þátttakendum sem voru HBeAg-jákvæðir við grunngildi var hlutfallið í TDF-TDF hópnum þar sem ALAT-gildi í sermi voru eðlileg í viku 192 75,8% (25/33). Hjá þeim sem voru HBeAg-neikvæðir við grunngildi var hlutfallið 100,0% (2/2). Svipað hlutfall þátttakenda í TDF-TDF (37,5%) og PLB-TDF hópnum (41,7%) sýndi fram á mótefnavendingu yfir í and-Hbe í viku 192.

Gögn um beinþéttni (BMD) úr rannsókninni GS-US-174-0115 eru tekin saman í Töflu 8:

**Tafla 8: Mat á beinþéttni við grunnildi, viku 72 og viku 192**

|                                                                                          | Grunngildi                                            |                                      | Vika 72                                               |                                  | Vika 192                                              |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                          | Tenófóvír<br>tvísóproxíl-<br>tenófóvír<br>tvísóproxíl | PLB-<br>tenófóvír<br>tvísóproxí<br>l | Tenófóvír<br>tvísóproxíl-<br>tenófóvír<br>tvísóproxíl | PLB-<br>tenófóvír<br>tvísóproxíl | Tenófóvír<br>tvísóproxíl-<br>tenófóvír<br>tvísóproxíl | PLB-tenófóvír<br>tvísóproxíl |
| Meðal Z-stig beinþéttni í lendhrygg <sup>a</sup>                                         | -0,42<br>(0,762)                                      | -0,26<br>(0,806)                     | -0,49<br>(0,852)                                      | -0,23<br>(0,893)                 | -0,37<br>(0,946)                                      | -0,44<br>(0,920)             |
| Meðalbreyting (staðalfrávik) Z-stiga beinþéttni í lendhrygg frá grunnildi <sup>a</sup>   | NA                                                    | NA                                   | -0,06<br>(0,320)                                      | 0,10<br>(0,378)                  | 0,02<br>(0,548)                                       | -0,10<br>(0,543)             |
| Meðal Z-stig (staðalfrávik) heildarbeinþéttni líkama <sup>a</sup>                        | -0,19<br>(1,110)                                      | -0,23<br>(0,859)                     | -0,36<br>(1,077)                                      | -0,12<br>(0,916)                 | -0,38<br>(0,934)                                      | -0,42<br>(0,942)             |
| Meðalbreyting (staðalfrávik) Z-stiga heildarbeinþéttni líkama frá grunnildi <sup>a</sup> | NA                                                    | NA                                   | -0,16<br>(0,355)                                      | 0,09<br>(0,349)                  | -0,16<br>(0,521)                                      | -0,19<br>(0,504)             |
| Beinþéttni í lendhrygg lækkuð um a.m.k. 6% <sup>b</sup>                                  | NA                                                    | NA                                   | 1,9%<br>(1 þátttakandi)                               | 0%                               | 3,8%<br>(2 þátttakendur)                              | 3,7%<br>(2 þátttakendur)     |
| Heildarbeinþéttni líkama lækkuð um a.m.k. 6%                                             | NA                                                    | NA                                   | 0%                                                    | 0%                               | 0%                                                    | 1,9%<br>(1 þátttakandi)      |
| Meðalhluftfallsaukning beinþéttni í lendhrygg                                            | NA                                                    | NA                                   | 5,14%                                                 | 8,08%                            | 10,05%                                                | 11,21%                       |
| Meðalhluftfallsaukning heildarbeinþéttni líkama                                          | NA                                                    | NA                                   | 3,07%                                                 | 5,39%                            | 6,09%                                                 | 7,22%                        |

NA = á ekki við

<sup>a</sup>Z-stig beinþéttni var ekki aðlagð hvað varðar hæð og þyngd

<sup>b</sup>Aðal öryggisendapunktur til og með viku 72

Í rannsókn GS-US-174-0144 voru 89 HBeAg-neikvæðir og -jákvæðir sjúklingar á aldrinum 2 til <12 ára með langvinna lifrabólgu B meðhöndlaðir með tenófóvír tvísóproxíli 6,5 mg/kg upp að hámarksskammtinum 245 mg (n = 60) eða lyfleysu (n = 29) einu sinni á dag í 48 vikur.

Sjúklingar máttu ekki hafa fengið tenófóvír tvísóproxíl áður, þurftu að vera með HBV DNA > 10<sup>5</sup> eintök/ml (~ 4,2 log<sub>10</sub> a.e./ml) og ALAT > 1,5 × eðlileg efri mörk (ULN) við skimun. Í 48. viku voru alls 77% (46 af 60) sjúklinga í meðferðarhópnum sem fékk tenófóvír tvísóproxíl og 7% (2 af 29) sjúklinga í hópnum sem fékk lyfleysu með HBV DNA < 400 eintök/ml (69 a.e./ml). Sextíu og sex prósent (38 af 58) sjúklinga í hópnum sem fékk tenófóvír tvísóproxíl voru með eðlileg ALAT gildi í 48. viku samanborið við 15% (4 af 27) í hópnum sem fékk lyfleysu. Tuttugu og fimm prósent (14 af 56) sjúklinga í meðferðarhópnum sem fékk tenófóvír tvísóproxíl og 24% (7 af 29) sjúklinga í hópnum sem fékk lyfleysu náðu HBeAg sermisvendingu í viku 48.

Svörun við meðferð með tenófóvír tvísóproxíli var sambærileg hjá sjúklingum sem höfðu ekki fengið meðferð áður og sjúklingum sem höfðu fengið meðferð áður og náðu 76% (38/50) sjúklinga sem höfðu ekki fengið meðferð áður og 80% (8/10) sjúklinga sem höfðu fengið meðferð áður HBV DNA < 400 eintök/ml (69 a.e./ml) í viku 48.

Svörun við meðferð með tenófóvír tvísóproxíli var einnig svipuð hjá einstaklingum sem voru HBeAg-neikvæðir samanborið við þá sem voru HBeAg-jákvæðir við upphaf rannsóknarinnar og náðu 77% (43/56) HBeAg jákvæðra og 75,0% (3/4) HBeAg neikvæðra einstaklinga HBV DNA < 400 eintök/ml (69 a.e./ml) í viku 48. Dreifing HBV arfgerða við upphaf rannsóknarinnar var svipuð á milli hópanna sem fengu tenófóvír tvísóproxíl og lyfleysu. Meirihluti sjúklinga var annaðhvort með arfgerð C (43,8%) eða D (41,6%) með lægri og svipaða tíðni arfgerða A og B (6,7% hvor um sig). Einungis 1 sjúklingur sem var slembiraðað í hópinn sem fékk tenófóvír tvísóproxíl var með arfgerð E við

upphaf rannsóknarinnar. Almennt var meðferðarsvörun við tenófóvír tvísóproxíli svipuð fyrir arfgerðir A, B, C og E [75-100% einstaklinga náðu HBV DNA <400 eintök/ml (69 a.e./ml) í viku 48] en svörunartíðni hjá einstaklingum með sýkingu af arfgerð D var minni (55%).

Eftir a.m.k. 48 vikur af blindaðri, slembiraðaðri meðferð gat hver einstaklingur skipt yfir í opna meðferð með tenófóvír tvísóproxíli fram að viku 192. Eftir viku 48 var veirubælingu viðhaldið hjá þeim sem fengu tvíblinda meðferð með tenófóvír tvísóproxíli og síðan opna meðferð með tenófóvír tvísóproxíli (TDF-TDF hópur): 83,3% (50/60) einstaklinga í TDF-TDF hópnum sýndu fram á HBV DNA < 400 eintök/ml (69 a.e./ml) í viku 192. Meðal einstaklinga sem fengu lyfleysu á tvíblinda tímabilinu jókst hlutfall einstaklinga sem sýndu fram á HBV DNA < 400 eintök/ml eftir að þeir hófu opna meðferð með tenófóvír tvísóproxíli (PLB-TDF hópur): 62,1% (18/29) einstaklinga í PLB-TDF hópnum sýndu fram á HBV DNA < 400 eintök/ml í viku 192. Hlutfall einstaklinga með eðlileg ALAT gildi í viku 192 í TDF-TDF og PLB-TDF hópnum var 79,3% og 59,3%, í þessari sömu röð (byggt á grunnviðmiðum rannsóknarstofu). Svipað hlutfall einstaklinga í TDF-TDF og PLB-TDF hópnum (33,9% og 34,5%, í þessari sömu röð) sýndi fram á HBeAg sermisvendingu í viku 192. Í báðum meðferðarhópnum náðu engir einstaklingar HBsAg sermisvendingu í viku 192. Tíðni meðferðarsvörunar við tenófóvír tvísóproxíli í viku 192 var viðhaldið hjá öllum arfgerðum A, B og C (80-100%) í TDF-TDF hópnum. Í viku 192 sést enn lægri svörunartíðni hjá einstaklingum með sýkingu af arfgerð D (77%) en með framfarir samanborið við niðurstöður eftir 48 vikur (55%).

Upplýsingar um beinþéttni úr rannsókn GS-US-174-0144 eru teknar saman í töflu 9:

**Tafla 9: Mat á beinþéttni við upphaf rannsóknar, í viku 48 og viku 192**

|                                                                                             | Upphaf rannsóknar     |                  | Vika 48                                     |                                | Vika 192                                    |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | Tenófóvír tvísóproxíl | Lyfleysa         | Tenófóvír tvísóproxíl-tenófóvír tvísóproxíl | Lyfleysa-tenófóvír tvísóproxíl | Tenófóvír tvísóproxíl-tenófóvír tvísóproxíl | Lyfleysa-tenófóvír tvísóproxíl |
| Meðal Z-stig (SD) fyrir beinþéttni í lendhrygg                                              | -0,08<br>(1,044)      | -0,31<br>(1,200) | -0,09<br>(1,056)                            | -0,16<br>(1,213)               | -0,20<br>(1,032)                            | -0,38<br>(1,344)               |
| Meðalbreyting frá upphafi (SD) á Z-stigi fyrir beinþéttni í lendhrygg                       | NA                    | NA               | -0,03<br>(0,464)                            | 0,23<br>(0,409)                | -0,15<br>(0,661)                            | 0,21<br>(0,812)                |
| Meðal (SD) Z-stig fyrir beinþéttni líkamans í heild                                         | -0,46<br>(1,113)      | -0,34<br>(1,468) | -0,57<br>(0,978)                            | -0,05<br>(1,360)               | -0,56<br>(1,082)                            | -0,31<br>(1,418)               |
| Meðalbreyting frá upphafi (SD) á Z-stigi fyrir beinþéttni líkamans í heild                  | NA                    | NA               | -0,18<br>(0,514)                            | 0,26<br>(0,516)                | -0,18<br>(1,020)                            | 0,38<br>(0,934)                |
| Lækkun uppsafnaðrar tíðni ≥ 4% frá grunnildi fyrir beinþéttni í lendarhrygg <sup>a</sup>    | NA                    | NA               | 18,3%                                       | 6,9%                           | 18,3%                                       | 6,9%                           |
| Lækkun uppsafnaðrar tíðni ≥ 4% frá grunnildi fyrir beinþéttni líkamans í heild <sup>a</sup> | NA                    | NA               | 6,7%                                        | 0%                             | 6,7%                                        | 0%                             |



|                                                              | Upphaf rannsóknar        |          | Vika 48                                               |                                       | Vika 192                                              |                                       |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                              | Tenófóvír<br>tvísóproxíl | Lyfleysa | Tenófóvír<br>tvísóproxíl-<br>tenófóvír<br>tvísóproxíl | Lyfleysa-<br>tenófóvír<br>tvísóproxíl | Tenófóvír<br>tvísóproxíl-<br>tenófóvír<br>tvísóproxíl | Lyfleysa-<br>tenófóvír<br>tvísóproxíl |
| Meðal<br>prósentaaukning<br>á beinþéttni<br>lendhryggjar     | NA                       | NA       | 3,9%                                                  | 7,6%                                  | 19,2%                                                 | 26,1%                                 |
| Meðal<br>prósentaaukning<br>á beinþéttni<br>líkamans í heild | NA                       | NA       | 4,6%                                                  | 8,7%                                  | 23,7%                                                 | 27,7%                                 |

NA = á ekki við

<sup>a</sup> Engir aðrir einstaklingar voru með  $\geq 4\%$  minnkun beinþéttni eftir viku 48

Lyfjastofnun Evrópu hefur frestað kröfu um að lagðar séu fram niðurstöður úr rannsóknum á tenófóvír tvísóproxíl hjá einum eða fleiri undirhópum barna við HIV og langvinnri lifrabólgu B (sjá upplýsingar í kafla 4.2 um notkun handa börnum).

## 5.2 Lyfjahvörf

Tenófóvír tvísóproxíl er vatnsleysanlegt estra forlyf sem umbreytist hratt *in vivo* í tenófóvír og formaldehyð.

Tenófóvír umbreytist innan frumu í tenófóvír einfosfat og virka efnið, tenófóvír tvífosfat.

### Frásög

Eftir að HIV sýktir sjúklingar hafa tekið inn tenófóvír tvísóproxíl frásogast það hratt og umbreytist í tenófóvír. Eftir að HIV sýktum sjúklingum voru gefnir endurteknir skammtar af tenófóvír tvísóproxíli með máltíð reyndust meðalgildi (frávikshlutfall, CV%) tenófóvírs vera  $C_{\max} = 326$  (36,6%) ng/ml,  $AUC = 3.324$  (41,2%) ng·klst./ml og  $C_{\min} = 64,4$  (39,4%) ng/ml. Tenófóvír reyndist ná hámarksstyrk í sermi innan 1 klukkustundar frá því að skammtur var tekinn á fastandi maga og innan 2 klukkustunda eftir inntöku með mat. Aðgengi tenófóvírs þegar sjúklingar tóku tenófóvír tvísóproxíl á fastandi maga var u.þ.b. 25%. Þegar tenófóvír tvísóproxíl var gefið til inntöku með fituríkri máltíð jókst aðgengi, þannig að  $AUC$  tenófóvírs jókst um u.þ.b. 40% og  $C_{\max}$  um u.þ.b. 14%. Eftir fyrsta skammt tenófóvír tvísóproxíls hjá mettum sjúklingum var miðgildi  $C_{\max}$  í sermi á bilinu 213 til 375 ng/ml. Hins vegar hafði gjöf tenófóvír tvísóproxíls með léttari máltíð ekki marktæk áhrif á lyfjahvörf tenófóvírs.

### Dreifing

Eftir gjöf í æð var stöðugt dreifingarrúmmál tenófóvírs metið u.þ.b. 800 ml/kg. Eftir inntöku tenófóvír tvísóproxíls dreifist tenófóvír um flesta vefi líkamans en mest uppsöfnun er í nýrum, lifur og þörmum (samkvæmt forklínískum rannsóknum). Rannsóknir *in vitro* sýndu að tenófóvír binst plasma-sermisprótínunum minna en 0,7 og 7,2% við þéttni tenófóvírs á bilinu 0,01 til 25 µg/ml.

### Umbrot

Rannsóknir *in vitro* hafa staðfest að hvorki tenófóvír tvísóproxíl né tenófóvír eru hvarfefni fyrir CYP450 ensím. Ennfremur sýndu rannsóknir að við mun hærri þéttni (um það bil 300 faldri) en sést hefur *in vivo* hamlar tenófóvír ekki *in vitro* umbroti lyfja sem miðlað er af einhverju af megin CYP450 ísóformum líkamans sem taka þátt í umbroti lyfja, (CYP3A4, CYP2D6, CYP2C9, CYP2E1, eða CYP1A1/2). Tenófóvír tvísóproxíl við þéttni 100 µmól/l sýndi engin áhrif á nein CYP450 ísóformanna, nema CYP1A1/2, þar sem lítil (6%) en tölfræðilega marktæk minnkun á umbroti hvarfefna CYP1A1/2 kom fram. Samkvæmt þessum rannsóknum er ólíklegt að komi til klínískt marktækrar milliverkunar milli tenófóvír tvísóproxíls og annarra lyfja sem eru umbrotin af CYP450.

## Brotthvarf

Útskilnaður tenófóvírs er aðallega um nýru, bæði með síun og virkum flutningi í nýrnápíplum, og skilst um 70-80% skammtsins óbreytt í þvagi eftir gjöf í æð. Heildarúthreinsun hefur verið metin u.þ.b. 230 ml/klst./kg (eða um 300 ml/mín.). Úthreinsun um nýru hefur verið metin u.þ.b. 160 ml/klst./kg (eða um 210 ml/mín.), sem er umfram gauklasíun. Það bendir til þess að virk pípluseyting sé snar þáttur í útskilnaði tenófóvírs. Eftir inngjöf er helmingunartími tenófóvírs hér um bil 12 til 18 stundir.

Rannsóknir hafa sýnt fram á það að virk pípluseyting tenófóvírs verður með innstreymi í aðlæga píplufrumu fyrir stuðlan flutningskerfanna *human organic anion transporters* (hOAT) 1 og 3 og útstreymi í þvag fyrir stuðlan fjölonæmispróteins fyrir lyfjum 4 (MRP 4).

## Línulegt/ólínulegt samband

Lyfjahvörf tenófóvírs voru óháð tenófóvír tvísóproxíl skammtastærð frá 75 til 600 mg og hafði endurtekin skammtagjöf mismunandi skammtastærðar engin áhrif þar á.

## Aldur

Rannsóknir á lyfjahvörfum hjá öldruðum (eldri en 65 ára) hafa ekki verið gerðar.

## Kyn

Þau takmörkuðu gögn, sem til eru um lyfjahvörf tenófóvírs í konum, benda ekki til munar á milli kynja.

## Þjóðerni

Takmarkaðar rannsóknir hafa farið fram á lyfjahvörfum hjá hópum af ólíku þjóðerni.

## Börn

*HIV-1:* Lyfjahvörf tenófóvírs við jafnvægi voru metin hjá 8 unglingum sem voru sýk af HIV-1 (á aldrinum 12 til < 18 ára) og með líkamsþyngd  $\geq 35$  kg. Meðaltal ( $\pm$  SD)  $C_{\max}$  var  $0,38 \pm 0,13$   $\mu\text{g/ml}$  og  $\text{AUC}_{\text{tau}}$  var  $3,39 \pm 1,22$   $\mu\text{g}\cdot\text{klst./ml}$ . Útsetning fyrir tenófóvíri sem kom fram hjá unglingum sem fengu daglega skammta til inntöku af tenófóvír tvísóproxíli 245 mg var svipuð og útsetning sem fram kom hjá fullorðnum sem fengu einn skammt á dag af tenófóvír tvísóproxíli 245 mg.

*Langvinn lifrabólga B:* Útsetning fyrir tenófóvíri við jafnvægi hjá unglingum sem voru smitaðir af HBV (á aldrinum 12 til < 18 ára) sem fengu daglegan skammt til inntöku af tenófóvír tvísóproxíli 245 mg var svipuð og útsetning sem fram kom hjá fullorðnum sem fengu einn skammt á dag af tenófóvír tvísóproxíli 245 mg.

Rannsóknir á lyfjahvörfum tenófóvír tvísóproxíl 245 mg taflna hjá börnum yngri en 12 ára eða með skerta nýrnastarfsemi hafa ekki verið gerðar.

## Skert nýrnastarfsemi

Lyfjavarfabreytur tenófóvírs voru ákvarðaðar eftir að einn skammtur af tenófóvír tvísóproxíli 245 mg var gefinn 40 fullorðnum sjúklingum sem ekki höfðu HIV- eða HBV-sýkingu en höfðu mismunandi stig skertrar nýrnastarfsemi sem skilgreind var miðað við grunnildi kreatínínúthreinsunar ( $\text{CrCl}$ ) (nýrnastarfsemi taldist eðlileg þegar  $\text{CrCl} > 80$  ml/mín; skerðing taldist væg þegar  $\text{CrCl} = 50-79$  ml/mín; miðlungs þegar  $\text{CrCl} = 30-49$  ml/mín. og alvarleg þegar  $\text{CrCl} = 10-29$  ml/mín.). Miðað við sjúklinga með eðlilega nýrnastarfsemi jókst meðalútsetning (frávikshlutfall, CV%) fyrir tenófóvíri frá 2.185 (12%) ng·klst./ml hjá sjúklingum með  $\text{CrCl} > 80$  ml/mín. í 3.064 (30%) ng·klst./ml, 6.009 (42%) ng·klst./ml og 15.985 (45%) ng·klst./ml hjá sjúklingum með

vægt, miðlungs og alvarlega skerta nýrnastarfsemi eftir því sem við á. Búið er við að skammtaráðleggingar fyrir sjúklinga með skerta nýrnastarfsemi, þar sem bil milli skammta er aukið, leiði til hærri hámarksþéttni í plasma og lægri  $C_{min}$  gilda hjá sjúklingum með skerta nýrnastarfsemi miðað við sjúklinga með eðlilega nýrnastarfsemi. Ekki er vitað um klínískar afleiðingar af þessu.

Hjá sjúklingum með nýrnasjúkdóm á lokastigi (*End Stage Renal Disease, ESRD*) ( $CrCl < 10$  ml/mín.) sem þurfa blóðskilun jókst þéttni tenófóvírs milli skilunarlota umtalsvert á 48 klst. og náði meðal- $C_{max}$  1.032 ng/ml og meðal-AUC<sub>0-48klst.</sub> 42.857 ng·klst./ml.

Ráðlagt er að aðlaga bil milli skammta af tenófóvír tvísóproxíli 245 mg hjá fullorðnum sjúklingum með kreatínínúthreinsun  $< 50$  ml/mín. eða hjá sjúklingum sem þegar eru með nýrnasjúkdóm á lokastigi (ESRD) og þurfa skilun (sjá kafla 4.2).

Lyfjahlvörf tenófóvírs hafa ekki verið rannsökuð hjá sjúklingum sem ekki eru í blóðskilun og eru með kreatínínúthreinsun  $< 10$  ml/mín. og hjá sjúklingum með ESRD sem meðhöndlaður er með kviðskilun eða öðrum tegundum skilunar.

Lyfjahlvörf tenófóvírs hafa ekki verið rannsökuð hjá börnum með skerta nýrnastarfsemi. Engar upplýsingar liggja fyrir til grundvallar ráðleggingum um skammta (sjá kafla 4.2 og 4.4).

### Skert lifrarstarfsemi

Stakur 245 mg skammtur af tenófóvír tvísóproxíli var gefinn fullorðnum sjúklingum sem ekki voru sýktir af HIV eða HBV en voru með skerta lifrarstarfsemi á mismunandi stigum, sem skilgreind var samkvæmt Child-Pugh-Turcotte-skalanum (CPT). Lyfjahlvörf tenófóvírs breyttust ekki verulega hjá sjúklingum með skerta lifrarstarfsemi, sem bendir til þess að ekki sé þörf á að aðlaga skammta hjá þeim. Meðalgildi (frávikshlutfall, CV%) tenófóvírs voru  $C_{max}$  223 (34,8%) ng/ml og AUC<sub>0-∞</sub> 2.050 (50,8%) ng·klst./ml hjá einstaklingum með eðlilega lifrarstarfsemi samanborið við 289 (46,0%) ng/ml og 2.310 (43,5%) ng·klst./ml hjá sjúklingum með miðlungsskerta lifrarstarfsemi og 305 (24,8%) ng/ml og 2.740 (44,0%) ng·klst./ml hjá sjúklingum með alvarlega skerta lifrarstarfsemi.

### Lyfjaumbrot innan frumu

Í útlægum einkjarna frumum mannsblóðs sem ekki fjölga sér (PBMCs) reyndist helmingunartími tenófóvírs tvífosfats vera um það bil 50 stundir, en helmingunartíminn í sams konar frumum, sem örvaðar voru með fýtóhemagglútíníni, reyndist um það bil 10 stundir.

## **5.3 Forklínískar upplýsingar**

Forklínískar rannsóknir á lyfjafræðilegu öryggi benda ekki til neinnar sérstakrar hættu fyrir menn. Niðurstöður klínískra rannsókna á eiturverkunum eftir endurtekna skammta hjá rottum, hundum og öpum við útsetningu sem er svipuð eða meiri en útsetning sem fæst við meðferð hjá mönnum og skipta hugsanlega máli við klíniska notkun, sýndu meðal annars fram á eiturverkanir í nýrum og beinum og lækkun á fosfatþéttni í sermi. Eiturverkun á bein greindist sem beinmeyra (apar) og minnkun beinþéttni (rottur og hundar). Eiturverkun á bein hjá ungum fullorðnum rottum og hundum kom fram við útsetningu sem nam  $\geq 5$ -faldri útsetningu hjá börnum og fullorðnum; eiturverkun á bein kom fram hjá ungum, sýktum öpum við mikla útsetningu í kjölfar lyfjagjafar undir húð ( $\geq 40$ -föld útsetning hjá sjúklingum). Niðurstöður rannsókna á rottum og öpum bentu til minnkunar frásogs fosfats í meltingarvegi með þar af leiðandi minnkun beinþéttni, sem áhrif frá efninu.

Erfðafræðilegar eiturefnarannsóknir veittu jákvæðar niðurstöður hvað varðar mælingar á eitilfrumum músa *in vitro*, tvíræðar niðurstöður hjá einum stofni sem notaður var í Ames-prófun og lítið eitt jákvæðar í USS prófi í lifrarfrumum úr rottum. Hins vegar voru niðurstöður neikvæðar úr *in vivo* smákjarnaprófi músabeinmergs.

Rannsókn á krabbameinsvaldandi áhrifum við inntöku hjá rottum og músum leiddi í ljós lágt nýgengi skeifugarnaræxla við mjög stóra skammta hjá músum. Ólíklegt er að þessi æxli skipti máli hvað menn varðar.

Rannsóknir á eiturverkunum á æxlun hjá rottum og kaninum sýndu engin áhrif á mökun, frjósemi, þungun eða fóstur. Í eiturefnarannsóknnum á tenófóvír tvísóproxíli minnkuðu hins vegar lífslíkur og þyngd unga við og eftir fæðingu við skammta sem ollu eiturverkunum hjá móður.

Virka efnið tenófóvír tvísóproxíl og megin umbrotsefni þess eru þrávirk efni í náttúrunni.

## **6. LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR**

### **6.1 Hjálparefni**

#### Kjarni töflu

Örkristallaður sellulósi  
Laktósa einhýdrat  
Hýdroxýprópýlsellulósi, lítið útskiptur  
Vatnsfrí kísilkvoða  
Magnesíum sterat

#### Filmuhúðun

Hyprómellósi  
Laktósa einhýdrat  
Títandíoxíð (E171)  
Tríasetín  
Indígótín (E132)

### **6.2 Ósamrýmanleiki**

Á ekki við.

### **6.3 Geymsluþol**

2 ár.

Aðeins fyrir glös:  
Eftir opnun: notist innan 90 daga

### **6.4 Sérstakar varúðarreglur við geymslu**

Geymið við lægri hita en 25°C. Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi og raka.

### **6.5 Gerð fláts og innihald**

Glas úr háþéttipólýetýleni (HDPE) með skrufloki eða barnaöryggisloki úr pólýprópýleni (PP) með álinnsigli, vatti og þurrkefni (kíslhlaup), afhent í eftirfarandi pakkningastærðum: 30 filmuhúðaðar töflur og fjölpakkningar með 90 (3 pakkar með 30) filmuhúðuðum töflum.

Þynnupakkningar úr OPA/ál/PE/þurrkefni/PE-áli sem innihalda 10 eða 30 filmuhúðaðar töflur.  
Rifgataðar stakskammtaþynnupakkningar úr OPA/áli/PE/þurrkefni/PE-áli sem innihalda 30 x 1 filmuhúðaðar töflur.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

## **6.6 Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun**

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

## **7. MARKAÐSLEYFISHAFI**

Viartis Limited  
Damastown Industrial Park,  
Mulhuddart, Dublin 15,  
DUBLIN  
Írland

## **8. MARKAÐSLEYFISNÚMER**

EU/1/16/1129/001  
EU/1/16/1129/002  
EU/1/16/1129/003  
EU/1/16/1129/004  
EU/1/16/1129/005  
EU/1/16/1129/006  
EU/1/16/1129/007

## **9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS / ENDURNÝJUNAR MARKAÐSLEYFIS**

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 8. desember 2016  
Nýjasta dagsetning endurnýjunar markaðsleyfis: 26. ágúst 2021

## **10. DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS**

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu <http://www.ema.europa.eu>.

Upplýsingar á íslensku eru á <http://www.serlyfjaskra.is>.

## **VIÐAUKI II**

- A. FRAMLEIÐENDUR SEM ERU ÁBYRGIR FYRIR  
LOKASAMÞYKKT**
- B. FORSENDUR FYRIR, EÐA TAKMARKANIR Á, AFGREIÐSLU OG  
NOTKUN**
- C. AÐRAR FORSENDUR OG SKILYRÐI MARKAÐSLEYFIS**
- D. FORSENDUR EÐA TAKMARKANIR ER VARÐA ÖRYGGI OG  
VERKUN VIÐ NOTKUN LYFSINS**

## **A. FRAMLEIÐENDUR SEM ERU ÁBYRGIR FYRIR LOKASAMÞYKKT**

Heiti og heimilisfang framleiðenda sem eru ábyrgir fyrir lokasamþykkt

Mylan Hungary Kft  
Mylan utca 1,  
Komarom, 2900,  
Ungverjalandi

Viatrix Germany GmbH  
Zweigniederlassung Bad Homburg v. d. Hoehe,  
Benzstrasse 1,  
Bad Homburg v. d. Hoehe,  
Hessen, 61352,  
Þýskaland

Heiti og heimilisfang framleiðenda sem er ábyrgur fyrir lokasamþykkt viðkomandi lotu skal koma fram í prentuðum fylgiseðli.

## **B. FORSENDUR FYRIR, EÐA TAKMARKANIR Á, AFGREIÐSLU OG NOTKUN**

Ávísun lyfsins er háð sérstökum takmörkunum (sjá viðauka I: Samantekt á eiginleikum lyfs, kafla 4.2).

## **C. AÐRAR FORSENDUR OG SKILYRÐI MARKAÐSLEYFIS**

### **• Samantektir um öryggi lyfsins (PSUR)**

Skilyrði um hvernig leggja skal fram samantektir um öryggi lyfsins koma fram í lista yfir viðmiðunardagsetningar Evrópusambandsins (EURD lista) sem gerð er krafa um í grein 107c(7) í tilskipun 2001/83/EB og öllum síðari uppfærslum sem birtar eru í evrópsku lyfjavefgáttinni.

## **D. FORSENDUR EÐA TAKMARKANIR ER VARÐA ÖRYGGI OG VERKUN VIÐ NOTKUN LYFSINS**

### **• Áætlun um áhættustjórnun**

Markaðsleyfishafi skal sinna lyfjagátaraðgerðum sem krafist er, sem og öðrum ráðstöfunum eins og fram kemur í áætlun um áhættustjórnun í kafla 1.8.2 í markaðsleyfinu og öllum uppfærslum á áætlun um áhættustjórnun sem ákveðnar verða.

Leggja skal fram uppfærða áætlun um áhættustjórnun:

- Að beiðni Lyfjastofnunar Evrópu.
- Þegar áhættustjórnunarkerfinu er breytt, sérstaklega ef það gerist í kjölfar þess að nýjar upplýsingar berast sem geta leitt til mikilvægra breytinga á hlutfalli ávinnings/áhættu eða vegna þess að mikilvægur áfangi (tengdur lyfjagát eða lágmörkun áhættu) næst.

**VIÐAUKI III**  
**ÁLETRANIR OG FYLGISEDILL**



## **A. ÁLETRANIR**

**UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM  
GLASAASKJA OG ÁLETRUN Á GLASI**

**1. HEITI LYFS**

Tenofovír disoproxil Viatris 245 mg filmuhúðaðar töflur  
tenófóvír tvísóproxíl

**2. VIRK(T) EFNI**

Sérhver filmuhúðuð tafla inniheldur 245 mg af tenófóvír tvísóproxíli (sem maleat).

**3. HJÁLPAREFNI**

Inniheldur laktósa einhýdrat. Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

**4. LYFJAFORM OG INNIHALD**

Filmuhúðuð tafla

30 filmuhúðaðar töflur.

**5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)**

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

**6. SÉRSTÖK VARNADARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN  
HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ**

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

**7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNADARORÐ, EF MEÐ ÞARF**

**8. FYRNINGARDAGSETNING**

EXP

<aðeins fyrir öskju>

Dagsetning opnunar:

<fyrir merkimiða á glasi og öskju>

Eftir opnun skal nota lyfið innan 90 daga

**9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI**

Geymið við lægri hita en 25°C. Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi og raka.

**10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á****11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA**

Viartis Limited  
Damastown Industrial Park,  
Mulhuddart, Dublin 15,  
DUBLIN  
Írland

**12. MARKAÐSLEYFISNÚMER**

EU/1/16/1129/001  
EU/1/16/1129/006

**13. LOTUNÚMER**

Lot

**14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN****15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR****16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI**

*[aðeins fyrir öskjuna]*

Tenofovir disoproxil Viatris 245 mg

**17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI**

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

**18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ**

PC  
SN  
NN

**UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM****YTRI ASKA FJÖLPAKKNINGAR (MEÐ BLUE BOX)****1. HEITI LYFS**

Tenofovir disoproxil Viartis 245 mg filmuhúðaðar töflur  
tenófóvír tvísóproxíl

**2. VIRK(T) EFNI**

Sérhver filmuhúðuð tafla inniheldur 245 mg af tenófóvír tvísóproxíli (sem maleat).

**3. HJÁLPAREFNI**

Inniheldur laktósa einhýdrat. Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

**4. LYFJAFORM OG INNIHALD**

Filmuhúðuð tafla

Fjölpakkning: 90 (3 pakkar með 30) filmuhúðaðar töflur

**5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)**

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.  
Til inntöku.

**6. SÉRSTÖK VARNADARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ**

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

**7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNADARORÐ, EF MEÐ ÞARF****8. FYRNINGARDAGSETNING**

EXP  
Eftir opnun skal nota lyfið innan 90 daga

**9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI**

Geymið við lægri hita en 25°C. Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi og raka.

**10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á**

**11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA**

Viartis Limited  
Damastown Industrial Park,  
Mulhuddart, Dublin 15,  
DUBLIN  
Írland

**12. MARKAÐSLEYFISNÚMER**

EU/1/16/1129/002

EU/1/16/1129/007

**13. LOTUNÚMER**

Lot

**14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN**

**15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR**

**16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI**

Tenofovir disoproxil Viatris 245 mg

**17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI**

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

**18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ**

PC  
SN  
NN

**UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM  
INNRI ASKJA FJÖLPAKKNINGAR OG MERKIMIÐI Á GLASI (ÁN BLUE BOX)**

**1. HEITI LYFS**

Tenofovir disoproxil Viatrix 245 mg filmuhúðaðar töflur  
tenófóvír tvísóproxíl

**2. VIRK(T) EFNI**

Sérhver filmuhúðuð tafla inniheldur 245 mg af tenófóvír tvísóproxíli (sem maleat).

**3. HJÁLPAREFNI**

Inniheldur laktósa einhýdrat. Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

**4. LYFJAFORM OG INNIHALD**

Filmuhúðuð tafla

30 filmuhúðaðar töflur.

<Fyrir innri öskju af fjölpakkningu>

Hluti fjölpakkningar, sem ekki má selja stakan

**5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)**

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.  
Til inntöku.

**6. SÉRSTÖK VARNADARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN  
HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ**

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

**7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNADARORÐ, EF MEÐ ÞARF**

**8. FYRNINGARDAGSETNING**

EXP

<aðeins fyrir öskju>

Dagsetning opnunar:

<fyrir merkimiða á glasi og öskju>

Eftir opnun skal nota lyfið innan 90 daga

**9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI**

Geymið við lægri hita en 25°C. Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi og raka.

**10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á****11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA**

Viatrix Limited  
Damastown Industrial Park,  
Mulhuddart, Dublin 15,  
DUBLIN  
Írland

**12. MARKAÐSLEYFISNÚMER**

EU/1/16/1129/002

EU/1/16/1129/007

**13. LOTUNÚMER**

Lot

**14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN****15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR****16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI****17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI****18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ**

## UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

### ASKJA FYRIR ÞYNNUR

#### 1. HEITI LYFS

Tenofovir disoproxil Viatrix 245 mg filmuhúðaðar töflur  
tenófóvír tvísóproxíl

#### 2. VIRK(T) EFNI

Sérhver filmuhúðuð tafla inniheldur 245 mg af tenófóvír tvísóproxíli (sem maleat).

#### 3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósaeinhýdrat. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

#### 4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Filmuhúðuð tafla

10 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

30 x 1 filmuhúðaðar töflur

#### 5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

#### 6. SÉRSTÖK VARNADARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

#### 7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNADARORÐ, EF MEÐ ÞARF

#### 8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP



**9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI**

Geymið ekki við hærri hita en 25°C. Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi og raka.

**10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á****11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA**

Viartis Limited  
Damastown Industrial Park,  
Mulhuddart, Dublin 15,  
DUBLIN  
Írland

**12. MARKAÐSLEYFISNÚMER**

EU/1/16/1129/003  
EU/1/16/1129/004  
EU/1/16/1129/005

**13. LOTUNÚMER**

Lot

**14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN****15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR****16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI**

tenofovir disoproxil viartis 245 mg

**17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI**

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

**18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ**

PC  
SN  
NN

**LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM  
ÞYNNA**

**1. HEITI LYFS**

Tenofovir disoproxil Viatris 245 mg filmuhúðaðar töflur  
tenófóvír tvísóproxíl

**2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA**

Viatris Limited

**3. FYRNINGARDAGSETNING**

EXP

**4. LOTUNÚMER**

Lot

**5. ANNAD**

## **B. FYLGISEÐILL**

## Fylgiseðill: upplýsingar fyrir sjúkling

### Tenofovir disoproxil Viatris 245 mg filmuhúðaðar töflur tenófóvír tvísóproxíl

**Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.**

- Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.
- Leitið til lækisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.
- Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.
- Látið lækinn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

**Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:**

1. Upplýsingar um Tenofovir disoproxil Viatris og við hverju það er notað
2. Áður en byrjað er að nota Tenofovir disoproxil Viatris
3. Hvernig nota á Tenofovir disoproxil Viatris
4. Hugsanlegar aukaverkanir
5. Hvernig geyma á Tenofovir disoproxil Viatris
6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

**Athugaðu að ef lyfinu hefur verið ávísað handa barni þínu er öllum upplýsingum í fylgiseðli þessum beint til barnsins (ef slíkt á við ber að skilja „þú“ sem „barnið þitt“).**

#### 1. Upplýsingar um Tenofovir disoproxil Viatris og við hverju það er notað

Tenofovir disoproxil Viatris inniheldur virka efnið *tenófóvír tvísóproxíl*. Þetta virka efni er lyf gegn *retróveirum* eða veiruhamlandi lyf sem notað er til meðferðar við HIV eða HBV sýkingu, eða hvoru tveggja. Tenófóvír er *núkleótíða bakritahemill*, almennt þekktur sem NRTI-lyf og það verkar með því að hamla eðlilegri starfsemi ensíma (við HIV *bakrita*; við lifrabólgu B *DNA fjölleiðunarensím*) sem veirur þurfa nauðsynlega á að halda til þess að geta fjölgað sér. Fyrir HIV ber ávallt að nota Tenofovir disoproxil Viatris í samsettri meðferð með öðrum lyfjum við HIV-sýkingu.

**Tenofovir disoproxil Viatris 245 mg töflur eru meðferð við HIV-sýkingu (alnæmisveira í mönnum).** Töflurnar henta fyrir:

- **fullorðna**
- **unglinga frá 12 ára allt að 18 ára sem þegar hafa fengið meðferð** með öðrum HIV-lyfjum sem ekki veita lengur fullnægjandi verkun þar sem þol hefur myndast eða þau hafa valdið aukaverkunum.

**Tenofovir disoproxil Viatris 245 mg töflur eru einnig meðferð við langvinnri lifrabólgu B, sem er sýking af völdum HBV (lifrabólguveiru B).** Töflurnar henta fyrir:

- **fullorðna**
- **unglinga frá 12 ára allt að 18 ára.**

Þú þarft ekki að vera með HIV til að fá Tenofovir disoproxil Viatris meðferð gegn lifrabólguveiru B.

Lyfið lækna ekki HIV-sýkingu. Á meðan Tenofovir disoproxil Viatris er tekið getur samt komið til sýkinga eða annarra sjúkdóma sem tengjast HIV-sýkingu. HBV getur einnig borist frá þér til annarra og því er mikilvægt er að gera varúðarráðstafanir til að forðast að sýkja annað fólk.

## 2. Áður en byrjað er að nota Tenofovir disoproxil Viatris

### Ekki má nota Tenofovir disoproxil Viatris:

- Ef um er að ræða ofnæmi fyrir tenófóvíri, tenófóvír tvísóproxíli eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins talin upp í kafla 6.

Ef þetta á við um þig, segðu þá læknum samstundis frá því og ekki taka Tenofovir disoproxil Viatris.

### Varnaðarorð og varúðarreglur

Tenofovir disoproxil Viatris minnkar ekki líkurnar á HBV smitun til annarra með kynmökum eða blóðblöndun. Þú þarft að nota varúðarráðstafanir til að forðast slíkt.

Leitið ráða hjá læknum eða lyfjafræðingi áður en Tenofovir disoproxil Viatris er notað

- **Ef þú hefur verið með nýrnasjúkdóm, eða ef einhver frávik hafa komið fram í prófum sem gætu gefið til kynna nýrnavandamál.** Tenofovir disoproxil Viatris skal ekki gefa unglingum með nýrnakvilla. Áður en meðferð hefst gæti lækinn viljað taka blóðprufur til að meta nýrnastarfsemi. Tenofovir disoproxil Viatris getur haft áhrif á nýrun á meðan á meðferð stendur. Lækinn gæti viljað taka blóðprufur meðan á meðferð stendur til þess að fylgjast með hvernig nýrun starfa. Ef þú ert fullorðinn einstaklingur gæti lækinn ráðlagt þér að taka töflurnar sjaldnar. Ekki minnka skammtinn sem þér hefur verið ávísaður, nema lækinn hafi mælt svo fyrir.

Tenofovir disoproxil Viatris er venjulega ekki tekið með öðrum lyfjum sem geta skaðað nýrun (sjá *Notkun annarra lyfja samhliða Tenofovir disoproxil Viatris*). Ef hjá því verður ekki komist mun lækinn fylgjast með nýrnastarfsemi þinni einu sinni í viku.

- **Ef þú ert með beinþynningu,** ert með sögu um beinbrot eða með beinkvilla.

Beinkvillar (koma fram sem þrálátur eða versnandi beinverkur sem valda stundum brotum) geta einnig komið fram vegna frumuskemmda í nýrnápíplum (sjá kafla 4, *Hugsanlegar aukaverkanir*). Látið lækinn vita ef þú ert með beinverki eða beinbrot.

Einnig getur verið að tenófóvír tvísóproxíl valdi minnkaðri beinþéttni. Mesta lækkunin á beinþéttni kom fram í klínískum rannsóknum hjá sjúklingum sem fengu meðferð með tenófóvír tvísóproxíli samhliða örvuðum próteasahemli.

Á heildina litið eru langtímaáhrif tenófóvír tvísóproxíls á heilbrigði beina og hættu á beinbrotum hjá fullorðnum sjúklingum og börnum óviss.

Hjá sumum fullorðnum sjúklingum með HIV, sem eru í samsettri meðferð gegn retróveirum, getur komið fram sjúkdómur í beinum sem kallast beindrep (beinvefur deyr vegna minnkaðs blóðflæðis til beina). Nokkrir af mörgum áhættuþáttum, fyrir myndun þessa sjúkdóms, geta verið lengd samsettrar meðferðar gegn retróveirum, notkun barkstera, áfengisneysla, öflug ónæmisbæling og hár líkamsþyngdarstuðull (BMI). Einkenni um beindrep eru stífleiki, verkir eða sársauki í liðum (einkum í mjöðm, hné og öxl) og erfiðleikar með hreyfingar. Ef þú færð eitthvað af þessum einkennum áttu að láta lækinn vita.

- **Ræðið við lækinn ef þú hefur sögu um lifrarsjúkdóm, þar á meðal lifrabólgu.** Sjúklingar með lifrarsjúkdóm, þar á meðal langvinna lifrabólgu B eða C, sem meðhöndlaðir eru með lyfjum gegn retróveirum, eru í aukinni hættu að fá alvarlegar, og hugsanlega banvænar, aukaverkanir í lifur. Ef þú ert sýkt/ur af lifrabólgu B mun lækinn íhuga vandlega hvaða meðferð sé best fyrir þig. Ef þú ert með sögu um lifrarsjúkdóm eða langvinna sýkingu af lifrabólgu B gæti lækinn látið taka blóðprufur til að fylgjast náið með lifrarstarfsemi.

- **Verið á varðbergi gagnvart sýkingum.** Ef þú ert með langt gengna HIV-sýkingu (alnæmi) og jafnframt aðra sýkingu, gætir þú fengið einkenni um sýkingu og bólgu, eða versnun á einkennum vegna sýkingar sem fyrir er, eftir að meðferð með Tenofovir disoproxil Viatris er hafin. Þessi einkenni gætu bent til þess ónæmiskerfi líkamans hafi eflst og sé að berjast gegn sýkingu. Vertu á varðbergi gagnvart einkennum um bólgu eða sýkingu skömmu eftir að þú byrjar að taka Tenofovir disoproxil Viatris. Ef þú tekur eftir einkennum um bólgu eða sýkingu, láttu þá lækinn strax vita.

Til viðbótar við tækifærissýkingarnar, geta sjálfsofnæmissjúkdómar (ástand sem kemur fram þegar ónæmiskerfið ræðst á heilbrigðan líkamsvef) einnig komið fram eftir að þú byrjar að taka lyf til meðhöndlunar á HIV-sýkingunni. Sjálfsofnæmissjúkdómar geta komið fram mörgum mánuðum eftir upphaf meðferðar. Ef þú tekur eftir einhverjum einkennum sýkingar eða öðrum einkennum eins og vöðvamáttleysi, máttleysi sem byrjar í höndum og fótum og færist upp eftir líkamanum í átt að bolnum, hjartsláttarónotum, skjálfta eða ofvirkni, skaltu segja lækni þínu strax frá því til að fá nauðsynlega meðferð.

- **Leitið ráða hjá lækni þínu eða lyfjafræðingi ef þú ert eldri en 65 ára.** Tenofovír tvísóproxíl hefur ekki verið rannsakað í hópi sjúklinga eldri en 65 ára. Ef aldur þinn er hærri en það og þér er ávísað Tenofovir disoproxil Viatris mun lækinn fylgjast vandlega með þér.

## Börn og unglingar

Tenofovir disoproxil Viatris 245 mg töflur henta fyrir:

- **HIV-1 sýkta unglinga á aldrinum 12 ára til allt að 18 ára sem vega minnst 35 kg og sem þegar hafa fengið meðferð** með öðrum HIV-lyfjum sem ekki veita lengur fullnægjandi verkun þar sem þol hefur myndast eða þau hafa valdið aukaverkunum.
- **HBV sýkta unglinga á aldrinum 12 ára til allt að 18 ára sem vega minnst 35 kg.**

Tenofovir disoproxil Viatris 245 mg töflur henta **ekki** fyrir eftirfarandi hópa:

- **Ekki fyrir HIV-1 sýkt börn** yngri en 12 ára
- **Ekki fyrir HBV sýkt börn** yngri en 12 ára.

Varðandi skammta sjá kafla 3, *Hvernig nota á Tenofovir disoproxil Viatris*.

## Notkun annarra lyfja samhliða Tenofovir disoproxil Viatris

Látið lækni þinn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð.

**Ekki hætta töku lyfja gegn HIV** sem lækinn hefur ávísað þér þegar þú hefur töku Tenofovir disoproxil Viatris ef þú ert með bæði HBV og HIV.

- **Ekki taka Tenofovir disoproxil Viatris** ef þú tekur nú þegar önnur lyf sem innihalda tenófovír tvísóproxíl eða tenófovír alafenamíð. Ekki taka Tenofovir disoproxil Viatris ásamt öðrum lyfjum sem innihalda adefóvír tvípívoxíl (lyf sem notað er til að meðhöndla langvinna lifrabólgu B).
- **Það er mjög mikilvægt að láta lækni þinn vita ef þú ert að taka önnur lyf sem geta skaðað nýrun.**

Þau eru:

- amínóglýkósíð, pentamídín eða vankómýsín (við bakteríusýkingu),
- amfóterísín B (við sveppasýkingu),
- foskarnet, gancíklóvír eða cídófovír (við veirusýkingu),
- interleukín-2 (til meðferðar við krabbameini),
- adefóvír tvípívoxíl (við lifrabólguveiru B),
- takrólímús (til bælingar á ónæmiskerfi),

- bólgueyðandi gigtarlyf (NSAIDs, til að draga úr verkjum í beinum eða vöðvum).
- **Önnur lyf sem innihalda dídánósín (við HIV-sýkingu):** Ef Tenofovir disoproxil Viatris er tekið með öðrum veiruhamlandi lyfjum sem innihalda dídánósín getur magn dídánósíns í blóði aukist og dregið getur úr CD4 frumutalningu. Í mjög sjaldgæfum tilfellum var tilkynnt um bólgu í brisi og mjólkursýrublóðsýringu (of mikla mjólkursýru í blóðinu), sem stundum ollu dauða, þegar lyf sem innihéldu tenófóvír tvísóproxíl og dídánósín voru tekin samhliða. Læknirinn mun íhuga vandlega hvort hann meðhöndli þig með samsetningu tenófóvírs og dídánósíns.
- **Einnig er mikilvægt að láta lækninn vita** ef þú tekur ledipasvír/sófosbúvír, sófosbúvír/velpatasvír eða sófosbúvír/velpatasvír/voxílaprevír við sýkingu af völdum lifrabólgu C.

#### Notkun Tenofovir disoproxil Viatris með mat eða drykk

Takið Tenofovir disoproxil Viatris með mat (t.d. máltíð eða snarli).

#### Meðganga og brjóstgjöf

Við meðgöngu, brjóstgjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá læknum eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

- **Forðastu að verða þunguð** meðan á Tenofovir disoproxil Viatris meðferð stendur. Þú verður að nota örugga getnaðarvörn til þess að forðast þungun.
- **Ef þú hefur tekið Tenofovir disoproxil Viatris** á meðgöngu getur læknirinn óskað eftir reglulegum blóðrannsóknnum og öðrum rannsóknnum til að fylgjast með þroska barnsins. Hjá börnum mæðra sem tóku NRTI-lyf á meðgöngu er ávinningur þess að nota vörn gegn HIV meiri en hættan á aukaverkunum.
- Ef þú ert móðir með HBV og barnið þitt hefur fengið fyrirbyggjandi meðferð við lifrabólgu B smiti við fæðingu getur verið að þú getir haft ungubarnið á brjósti en tala skal fyrst við lækninn til að fá frekari upplýsingar.
- **Ekki er mælt með** brjóstgjöf hjá konum með HIV þar sem HIV-smit getur borist til barnsins með brjóstamjólkinni. Ef þú ert með barn á brjósti eða íhugar brjóstgjöf **átt þú að ræða það við lækninn eins fljótt og auðið er.**

#### Akstur og notkun véla

Tenófóvír tvísóproxíl getur valdið sundli. Ef þú finnur fyrir sundli meðan þú tekur Tenofovir disoproxil Viatris, **aktu þá ekki eða hjóla** og notaðu hvorki tæki né vélar.

#### Tenofovir disoproxil Viatris inniheldur laktósa

**Látið lækninn vita áður en þú tekur Tenofovir disoproxil Viatris.** Ef þú hefur fengið þær upplýsingar hjá lækni að þú sért með óþol fyrir ákveðnum syknum, skaltu ræða við lækninn áður en lyfið er notað.

### 3. Hvernig nota á Tenofovir disoproxil Viatris

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá læknum eða lyfjafræðingi.

#### Ráðlagður skammtur er:

- **Fullorðnir:** 1 tafla á dag með mat (t.d. máltíð eða snarli).
- **Unglingar á aldrinum frá 12 ára allt að 18 ára sem vega minnst 35 kg:** 1 tafla á dag með mat (t.d. máltíð eða snarli).

Ef þú átt sérstaklega erfitt með að kyngja má beita skeið til að mylja töfluna. Blandaðu síðan duftinu í um það bil 100 ml (hálf glas) af vatni, appelsínusafa eða vínberjasafa og drekktu það samstundis.

- **Takið ávallt þann skammt sem lækinninn ráðleggur.** Það er gert til þess að tryggja að lyfið hafi fulla verkun og til þess að draga úr líkum á myndun ónæmis gegn meðferðinni. Breytið ekki skammtinum nema samkvæmt fyrirmælum læknisins.
- **Ef þú ert fullorðin/n og átt við nýrnavandamál að stríða,** gæti lækinninn ráðlagt þér að taka Tenofovir disoproxil Viatrix sjaldnar.
- Ef þú ert með HBV getur verið að lækinninn bjóði þér upp á HIV próf til að athuga hvort þú hefur bæði HBV og HIV. Lesið upplýsingarnar á fylgiseðlum hinna lyfjanna gegn retróveirum til að vita hvernig þau lyf skuli tekin.
- Hugsanlega henta önnur lyfjaform lyfsins betur fyrir sjúklinga sem eiga erfitt með að kyngja; leitaðu ráða hjá læknum eða lyfjafræðingi um þetta.

### **Ef tekinn er stærri skammtur en mælt er fyrir um**

Ef teknar eru í ógáti of margar Tenofovir disoproxil Viatrix töflur getur það aukið hættuna á að þú finnst fyrir hugsanlegum aukaverkunum með lyfinu (sjá kafla 4, *Hugsanlegar aukaverkanir*). Hafðu samband við lækinninn eða næstu bráðamóttöku til að fá ráðleggingar. Taktu töfluglasið með þér svo að þú getir auðveldlega lýst því sem þú hefur tekið.

### **Ef gleymist að taka Tenofovir disoproxil Viatrix**

Mikilvægt er að gleyma engum skammti af Tenofovir disoproxil Viatrix. Ef þú gleymir skammti skaltu reikna út hversu langt er síðan þú áttir að taka hann.

- **Ef minna en 12 klst. hafa liðið** frá þeim tíma sem þú tekur það vanalega inn, skal taka lyfið eins fljótt og auðið er og taka síðan næsta skammt á áætluðum tíma.
- **Ef meira en 12 klst. hafa liðið** síðan þú áttir að taka skammtinn á ekki að taka skammtinn sem sleppt var. Bíðið og takið næsta skammt á áætluðum tíma. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp töflu sem gleymst hefur að taka.

### **Ef kastað er upp innan 1 klst. eftir að Tenofovir disoproxil Viatrix er tekið,** skal taka aðra töflu.

Ekki er þörf á að taka aðra töflu ef kastað er upp í meira en 1 klst. eftir að Tenofovir disoproxil Viatrix er tekið.

### **Ef hætt er að nota Tenofovir disoproxil Viatrix**

Ekki hætta að taka Tenofovir disoproxil Viatrix nema að læknisráði. Ef hætt er töku á Tenofovir disoproxil Viatrix getur það minnkað virkni meðferðarinnar sem lækinninn hefur ráðlagt.

**Ef þú ert með lifrabólgu B eða HIV-sýkingu ásamt lifrabólgu B (samhliða sýkingu)** er mjög mikilvægt að hætta ekki meðferðinni með Tenofovir disoproxil Viatrix án þess að ræða fyrst við lækinninn. Hjá sumum sjúklingum hafa niðurstöður úr blóðprufum eða einkennum bent til þess að lifrabólga hafi versnað eftir að hætt er að taka tenófóvír tvisóproxíl. Þú gætir þurft að fara í blóðprufur í nokkra mánuði eftir að meðferð er hætt. Hjá sjúklingum með langt genginn lifrarsjúkdóm eða skorpulífur er ekki mælt með að meðferð sé hætt þar sem að hjá sumum sjúklingum getur það leitt til versunar á lifrabólgu.

- Ræðið við lækinninn áður en þú hættir að taka Tenofovir disoproxil Viatrix hver sem ástæðan er, einkum ef þú finnst fyrir aukaverkunum eða ert haldin/n öðrum sjúkdómi.
- Segið læknum samstundis frá öllum nýjum eða óvenjulegum einkennum að meðferð lokinni, einkum einkennum sem þú tengir við sýkinguna af lifrabólgu B.
- Hafið samband við lækinninn áður en þú byrjar aftur að taka Tenofovir disoproxil Viatrix töflur.



Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

#### 4. Hugsanlegar aukaverkanir

Á meðan á HIV-meðferð stendur getur líkamsþyngd, gildi blóðfitu og glúkósa aukist. Þetta er að hluta tengt betri heilsu og lífsstíl og hvað varðar blóðfitu er það stundum tengt HIV-lyfjunum sjálfum. Læknirinn mun gera próf vegna breytinganna.

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

**Hugsanlegar alvarlegar aukaverkanir: hafið strax samband við lækninn.**

- **Mjólkursýrublóðsýring** (of mikil mjólkursýra í blóðinu) er **mjög sjaldgæf** (getur komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 sjúklingum) en alvarleg aukaverkun sem getur verið banvæn. Eftirfarandi aukaverkanir geta verið einkenni um mjólkursýrublóðsýringu:
- djúp, hröð öndun
- sljóleiki
- ógleði, uppköst og kviðverkir

Ef þú heldur að þú gætir verið með **mjólkursýrublóðsýringu**, hafðu þá strax samband við lækninn.

**Aðrar hugsanlegar alvarlegar aukaverkanir**

Eftirfarandi aukaverkanir eru **sjaldgæfar** (þessar aukaverkanir geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 sjúklingum):

- **verkir í maga** (kvið) vegna bólgu í brisi
- frumuskemmdir í nýrnapiplum

Eftirfarandi aukaverkanir eru **mjög sjaldgæfar** (þessar aukaverkanir geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 sjúklingum):

- bólga í nýrum, **mikil þvaglát og þorsti**
- **breytingar á þvagi** og **bakverkur** af völdum nýrnnavandamála, þar á meðal nýrnabilunar
- mýking beina (með **beinverkjum** og sem veldur stundum brotum), vegna frumuskemmda í nýrnapiplum
- **fitulifur**

Ef talið er að þú gætir verið með einhverja af þessum alvarlegu aukaverkunum, hafið þá samband við lækninn.

**Algengustu aukaverkanirnar**

Eftirfarandi aukaverkanir eru **mjög algengar** (þessar aukaverkanir geta komið fyrir hjá að minnsta kosti 10 af hverjum 100 sjúklingum):

- niðurgangur, uppköst, ógleði, sundl, útbrot, slappleiki

*Niðurstöður úr prófum geta einnig leitt í ljós:*

- minnkað fosfat í blóði

**Aðrar hugsanlegar aukaverkanir**

Eftirfarandi aukaverkanir eru **algengar** (þessar aukaverkanir geta komið fyrir hjá allt að 10 af hverjum 100 sjúklingum):

- höfuðverkur, magaverkir, þreytutilfinning, tilfinning um þenslu í kvið, vindgangur, minnkuð beinþéttni

Niðurstöður úr prófum geta einnig leitt í ljós:

- vandamál í lifur

Eftirfarandi aukaverkanir eru **sjaldgæfar** (þessar aukaverkanir geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 sjúklingum):

- niðurbrot vöðva, verkir eða slappleiki í vöðvum

Niðurstöður úr prófum geta einnig leitt í ljós:

- minnkað kalíum í blóði
- aukið kreatínín í blóði
- vandamál í brisi

Niðurbrot vöðva, myking beina (með beinverkjum og sem veldur stundum brotum), vöðvaverkir, slappleiki í vöðvum og minnkað kalíum eða fosfat í blóði geta komið fram vegna frumuskemmda í nýrnapíplum.

Eftirfarandi aukaverkanir eru **mjög sjaldgæfar** (þessar aukaverkanir geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 sjúklingum):

- verkir í maga (kvið) vegna bólgu í lifur
- þroti í andliti, á vörum, tungu eða hálsi

### Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint **samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V**. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

## 5. Hvernig geyma á Tenofovir disoproxil Viatris

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á lyfjaglasinu og öskjunni á eftir {EXP}. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið við lægri hita en 25°C. Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi og raka. Fyrir glös: Eftir opnun glassins skal nota lyfið innan 90 daga.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

## 6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

### Tenofovir disoproxil Viatris inniheldur

- Virka innihaldsefnið er tenófóvír tvísóproxíl. Hver Tenofovir disoproxil Viatris tafla inniheldur 245 mg af tenófóvír tvísóproxíl (sem maleat).
- Önnur innihaldsefni eru örkristallaður sellulósi, laktósaehýdrat (sjá kafla 2, *Tenofovir disoproxil Viatris inniheldur laktósa*), hýdroxýprópýlsellulósi, vatnsfrí kísilkvoða, magnesíumsterat, hýprómellósi, títantvíoxíð (E171), tríasetín, indígótín (E132).

### Lýsing á útliti Tenofovir disoproxil Viatris og pakkningastærðir

Tenofovir disoproxil Viatris 245 mg filmuhúðaðar töflur eru ljósbláar, kringlóttar, tvíkúptar og merktar með „TN245“ á annarri hliðinni og „M“ á hinn hliðinni.

Þetta lyf er fáanlegt í plastglösum með skrufloki eða barnaöryggisloki og vatti sem innihalda 30 filmuhúðaðar töflur, og í fjölpakkningum með 90 filmuhúðuðum töflum sem samanstanda af 3 glösum sem hvert fyrir sig inniheldur 30 filmuhúðaðar töflur. Í glösinu er einnig þurrkefni. Ekki má borða þurrkefnið.

Töflurnar eru einnig fáanlegar í þynnupakkningum sem innihalda 10, 30 eða 30 × 1 töflur (stakskammtar).

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

#### **Markaðsleyfishafi**

Viartis Limited  
Damastown Industrial Park,  
Mulhuddart, Dublin 15,  
DUBLIN  
Írland

#### **Framleiðandi**

Mylan Hungary Kft  
Mylan utca 1,  
Komarom, H-2900,  
Ungverjalandi

Viartis Germany GmbH  
Zweigniederlassung Bad Homburg v. d. Hoehe,  
Benzstrasse 1,  
Bad Homburg v. d. Hoehe,  
Hessen, 61352,  
Þýskaland

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

#### **België/Belgique/Belgien**

Viartis  
Tél/Tel: + 32 (0)2 658 61 00

#### **Lietuva**

Viartis UAB  
Tel: + 370 5 205 1288

#### **България**

Виатрис ЕООД  
Тел.: + 359 2 44 55 400

#### **Luxembourg/Luxemburg**

Viartis  
Tél/Tel: + 32 (0)2 658 61 00  
(Belgique/Belgien)

#### **Česká republika**

Viartis CZ s.r.o.  
Tel: + 420 222 004 400

#### **Magyarország**

Viartis Healthcare Kft.  
Tel.: + 36 1 465 2100

#### **Danmark**

Viartis ApS  
Tlf: + 45 28 11 69 32

#### **Malta**

V.J. Salomone Pharma Ltd  
Tel: + 356 21 22 01 74

#### **Deutschland**

Viartis Healthcare GmbH  
Tel: + 49 800 0700 800

#### **Nederland**

Mylan BV  
Tel: + 31 (0)20 426 3300

#### **Eesti**

Viartis OÜ  
Tel: + 372 6363 052

#### **Norge**

Viartis AS  
Tlf: + 47 66 75 33 00

**Ελλάδα**

Viatri Hellas Ltd

Τηλ: + 30 2100 100 002

**España**

Viatri Pharmaceuticals, S.L.

Tel: + 34 900 102 712

**France**

Viatri Santé

Tél: + 33 4 37 25 75 00

**Hrvatska**

Viatri Hrvatska d.o.o

Tel: + 385 1 23 50 599

**Ireland**

Viatri Limited

Tel: + 353 1 8711600

**Ísland**

Icepharma hf.

Sími: + 354 540 8000

**Italia**

Viatri Italia S.r.l

Tel: + 39 02 612 46921

**Κύπρος**

CPO Pharmaceuticals Ltd.

Τηλ: + 357 22863100

**Latvija**

Viatri SIA

Tel: + 371 676 055 80

**Österreich**

Viatri Austria GmbH

Tel: + 43 1 86390

**Polska**

Viatri Healthcare Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 546 64 00

**Portugal**

Mylan, Lda.

Tel: + 351 214 127 200

**România**

BGP Products SRL

Tel: + 40 372 579 000

**Slovenija**

Viatri d.o.o.

Tel: + 386 1 23 63 180

**Slovenská republika**

Viatri Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 2 32 199 100

**Suomi/Finland**

Viatri Oy

Puh/Tel: + 358 20 720 9555

**Sverige**

Viatri AB

Tel: + 46 (0)8 630 19 00

**Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður {MM/ÁÁÁÁ}.**

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu <http://www.ema.europa.eu>.

Upplýsingar á íslensku eru á <http://www.serlyfjaskra.is>