

<u>Numero AIC (UE)</u>	<u>Nome (di fantasia)</u>	<u>Dosaggio</u>	<u>Forma farmaceutica</u>	<u>Via di somministrazione</u>	<u>Confezionamento primario</u>	<u>Contenuto (Concentrazione)</u>	<u>Numero di unità posologiche</u>
EU/1/25/1913/001	CAPVAXIVE	-- ¹	Soluzione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (vetro)	0,5 mL	1 siringa preriempita
EU/1/25/1913/002	CAPVAXIVE	-- ¹	Soluzione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (vetro)	0,5 mL	1 siringa preriempita + 1 ago
EU/1/25/1913/003	CAPVAXIVE	-- ¹	Soluzione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (vetro)	0,5 mL	1 siringa preriempita + 2 aghi
EU/1/25/1913/004	CAPVAXIVE	-- ¹	Soluzione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (vetro)	0,5 mL	10 siringhe preriempita
EU/1/25/1913/005	CAPVAXIVE	-- ¹	Soluzione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (vetro)	0,5 mL	10 siringhe preriempita + 10 aghi
EU/1/25/1913/006	CAPVAXIVE	-- ¹	Soluzione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (vetro)	0,5 mL	10 siringhe preriempita + 20 aghi

--¹

Una dose (0,5 mL) contiene:

Polisaccaride pneumococcico sierotipo 3 ¹	4 mcg
Polisaccaride pneumococcico sierotipo 6A ¹	4 mcg
Polisaccaride pneumococcico sierotipo 7F ¹	4 mcg
Polisaccaride pneumococcico sierotipo 8 ¹	4 mcg
Polisaccaride pneumococcico sierotipo 9N ¹	4 mcg
Polisaccaride pneumococcico sierotipo 10A ¹	4 mcg
Polisaccaride pneumococcico sierotipo 11A ¹	4 mcg
Polisaccaride pneumococcico sierotipo 12F ¹	4 mcg
Polisaccaride pneumococcico sierotipo 15A ¹	4 mcg
Polisaccaride pneumococcico da deOAc15B (sierotipo 15B de-O-acetilato) ¹	4 mcg
Polisaccaride pneumococcico sierotipo 16F ¹	4 mcg
Polisaccaride pneumococcico sierotipo 17F ¹	4 mcg
Polisaccaride pneumococcico sierotipo 19A ¹	4 mcg
Polisaccaride pneumococcico sierotipo 20A ¹	4 mcg

Polisaccaride pneumococcico sierotipo 22F ¹	4 mcg
Polisaccaride pneumococcico sierotipo 23A ¹	4 mcg
Polisaccaride pneumococcico sierotipo 23B ¹	4 mcg
Polisaccaride pneumococcico sierotipo 24F ¹	4 mcg
Polisaccaride pneumococcico sierotipo 31 ¹	4 mcg
Polisaccaride pneumococcico sierotipo 33F ¹	4 mcg
Polisaccaride pneumococcico sierotipo 35B ¹	4 mcg

¹Coniugato alla proteina vettrice CRM₁₉₇. CRM₁₉₇ è un mutante non tossico della tossina difterica (derivante da *Corynebacterium diphtheriae* C7) espressa in forma ricombinante in *Pseudomonas fluorescens*.

Una dose (0,5 mL) contiene circa 65 mcg di proteina vettrice CRM₁₉₇.