

<u>Numero AIC (UE)</u>	<u>Nome (di fantasia)</u>	<u>Dosaggio</u>	<u>Forma farmaceutica</u>	<u>Via di somministrazione</u>	<u>Confezionamento primario</u>	<u>Contenuto (Concentrazione)</u>	<u>Numero di unità posologiche</u>
EU/1/21/1589/001	Hukyndra	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa pre-riempita (vetro)	0,4 ml (40 mg/0,4 ml)	1 siringa pre-riempita + 1 tampone imbevuto di alcool
EU/1/21/1589/002	Hukyndra	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa pre-riempita (vetro)	0,4 ml (40 mg/0,4 ml)	2 siringhe preriempite + 2 tamponi imbevuti di alcool
EU/1/21/1589/003	Hukyndra	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa pre-riempita (vetro)	0,4 ml (40 mg/0,4 ml)	6 siringhe preriempite + 6 tamponi imbevuti di alcool
EU/1/21/1589/004	Hukyndra	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa pre-riempita (vetro) in penna pre-riempita	0,4 ml (40 mg/0,4 ml)	1 penna pre-riempita + 1 tampone imbevuto di alcool
EU/1/21/1589/005	Hukyndra	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa pre-riempita (vetro) in penna pre-riempita	0,4 ml (40 mg/0,4 ml)	2 penne pre-riempite + 2 tamponi imbevuti di alcool
EU/1/21/1589/006	Hukyndra	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa pre-riempita (vetro) in penna pre-riempita	0,4 ml (40 mg/0,4 ml)	6 penne pre-riempite + 6 tamponi imbevuti di alcool
EU/1/21/1589/007	Hukyndra	80 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa pre-riempita (vetro)	0,8 ml (80 mg/0,8 ml)	1 siringa pre-riempita + 1 tampone imbevuto di alcool