Numeri EU	Nome di fantasia	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie di destinazione	Via di somministrazione	Contenitore	Contenuto	Contenuto della confezione	Tempo di attesa
EU/2/09/098/001	Melovem	5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini e suini	Via intramuscolare Via sottocutanea	flaconcino di vetro di tipo I per iniettabili	100 ml	1 flaconcino	Carne e visceri: 15 giorni (bovini), 5 giorni (suini)
EU/2/09/098/002	Melovem	20 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini e cavalli	Via intramuscolare Via endovenosa Via sottocutanea	flaconcino di vetro di tipo I per iniettabili	50 ml	1 flaconcino	Carne e visceri: 15 giorni (bovini), 5 giorni (suini, cavalli) Latte: 5 giorni (bovini)
EU/2/09/098/003	Melovem	20 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini e cavalli	Via intramuscolare Via endovenosa Via sottocutanea	flaconcino di vetro di tipo I per iniettabili	100 ml	1 flaconcino	Carne e visceri: 15 giorni (bovini), 5 giorni (suini, cavalli) Latte: 5 giorni (bovini)
EU/2/09/098/004	Melovem	20 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini e cavalli	Via intramuscolare Via endovenosa Via sottocutanea	flaconcino di vetro di tipo I per iniettabili	250 ml	1 flaconcino	Carne e visceri: 15 giorni (bovini), 5 giorni (suini, cavalli) Latte: 5 giorni (bovini)
EU/2/09/098/005	Melovem	30 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini e suini	Via intramuscolare Via sottocutanea	Flaconcino di vetro di tipo I per iniettabili	50 ml	1 flaconcino	Carne e visceri: 15 giorni (bovini), 5 giorni (suini) Latte: 5 giorni (bovini)
EU/2/09/098/006	Melovem	30 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini e suini	Via intramuscolare Via sottocutanea	Flaconcino di vetro di tipo I per iniettabili	100 ml	1 flaconcino	Carne e visceri: 15 giorni (bovini), 5 giorni (suini) Latte: 5 giorni (bovini)
EU/2/09/098/007	Melovem	30 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini e suini	Via intramuscolare Via sottocutanea	Flaconcino di vetro di tipo I per iniettabili	250 ml	1 flaconcino	Carne e visceri: 15 giorni (bovini), 5 giorni (suini) Latte: 5 giorni (bovini)