

## Allegato A

Numero EU	Nome di fantasia	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie di destinazione	Via di somministrazione	Contenitore	Contenuto	Contenuto della confezione	Tempo di attesa
EU/2/13/148/001	Meloxidolor	5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Gatti, cani bovini e suini	Uso intramuscolare, endovenoso o sottocutaneo	Flaconcino (vetro)	10 ml	1 flaconcino	Carne e visceri: 15 giorni (bovini), 5 giorni (suini)
EU/2/13/148/002	Meloxidolor	5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Gatti, cani bovini e suini	Uso intramuscolare, endovenoso o sottocutaneo	Flaconcino (vetro)	20 ml	1 flaconcino	Carne e visceri: 15 giorni (bovini), 5 giorni (suini)
EU/2/13/148/003	Meloxidolor	5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Gatti, cani bovini e suini	Uso intramuscolare, endovenoso o sottocutaneo	Flaconcino (vetro)	100 ml	1 flaconcino	Carne e visceri: 15 giorni (bovini), 5 giorni (suini)
EU/2/13/148/004	Meloxidolor	20 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini cavalli	Uso intramuscolare, endovenoso o sottocutaneo	Flaconcino (vetro)	50 ml	1 flaconcino	Carne e visceri: 15 giorni (bovini), 5 giorni (suini, cavalli) Latte: 5 giorni (bovini)
EU/2/13/148/005	Meloxidolor	20 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini cavalli	Uso intramuscolare, endovenoso o sottocutaneo	Flaconcino (vetro)	100 ml	1 flaconcino	Carne e visceri: 15 giorni (bovini), 5 giorni (suini, cavalli) Latte: 5 giorni (bovini)
EU/2/13/148/008	Meloxidolor	5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Gatti, cani bovini e suini	Uso intramuscolare, endovenoso o sottocutaneo	Multi-confezioni	20 ml	5 flaconcini	Carne e visceri: 15 giorni (bovini), 5 giorni (suini)
EU/2/13/148/009	Meloxidolor	5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Gatti, cani bovini e suini	Uso intramuscolare, endovenoso o sottocutaneo	Multi-confezioni	20 ml	10 flaconcini	Carne e visceri: 15 giorni (bovini), 5 giorni (suini)

<b>Numero EU</b>	<b>Nome di fantasia</b>	<b>Dosaggio</b>	<b>Forma farmaceutica</b>	<b>Specie di destinazione</b>	<b>Via di somministrazione</b>	<b>Contenitore</b>	<b>Contenuto</b>	<b>Contenuto della confezione</b>	<b>Tempo di attesa</b>
EU/2/13/148/010	Meloxidolor	20 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini cavalli	Uso intramuscolare, endovenoso o sottocutaneo	Multi-confezioni	100 ml	12 flaconcini	Carne e visceri: 15 giorni (bovini), 5 giorni (suini, cavalli) Latte: 5 giorni (bovini)