

Numero UE	Nome di fantasia	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie di destinazione	Via di somministrazione	Confezionamento	Contenuto	Confezione	Tempo di attesa
EU/2/97/004/001	Metacam	5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini e suini	Uso sottocutaneo o endovenoso (bovini), uso intramuscolare (suini)	Flaconcino (vetro)	100 ml	1 flaconcino	Carne e visceri: 15 giorni (bovini), 5 giorni (suini)
EU/2/97/004/003	Metacam	1,5 mg/ml	Sospensione orale	Cani	Uso orale	Flacone (polietilene)	10 ml	1 flacone	Non pertinente
EU/2/97/004/004	Metacam	1,5 mg/ml	Sospensione orale	Cani	Uso orale	Flacone (polietilene)	32 ml	1 flacone	Non pertinente
EU/2/97/004/005	Metacam	1,5 mg/ml	Sospensione orale	Cani	Uso orale	Flacone (polietilene)	100 ml	1 flacone	Non pertinente
EU/2/97/004/006	Metacam	5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Cani e gatti	Uso sottocutaneo o endovenoso (cani), uso sottocutaneo (gatti)	Flaconcino (vetro)	10 ml	1 flaconcino	Non pertinente
EU/2/97/004/007	Metacam	20 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini e cavalli	Uso sottocutaneo o endovenoso (bovini), uso intramuscolare (suini), uso endovenoso (cavalli)	Flaconcino (vetro)	50 ml	1 flaconcino	Carne e visceri: 15 giorni (bovini), 5 giorni (suini/cavalli) Latte: 5 giorni
EU/2/97/004/008	Metacam	20 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini e cavalli	Uso sottocutaneo o endovenoso (bovini), uso intramuscolare (suini), uso endovenoso (cavalli)	Flaconcino (vetro)	100 ml	1 flaconcino	Carne e visceri: 15 giorni (bovini), 5 giorni (suini/cavalli) Latte: 5 giorni
EU/2/97/004/009	Metacam	15 mg/ml	Sospensione orale	Cavalli	Uso orale	Flacone (polietilene)	100 ml	1 flacone	Carne e visceri: 3 giorni

Numero UE	Nome di fantasia	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie di destinazione	Via di somministrazione	Confezionamento	Contenuto	Confezione	Tempo di attesa
EU/2/97/004/010	Metacam	5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini e suini	Uso sottocutaneo o endovenoso (bovini), uso intramuscolare (suini)	Flaconcino (vetro)	100 ml	12 flaconcini	Carne e visceri: 15 giorni (bovini), 5 giorni (suini)
EU/2/97/004/011	Metacam	5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Cani e gatti	Uso sottocutaneo o endovenoso (cani), uso sottocutaneo (gatti)	Flaconcino (vetro)	20 ml	1 flacone	Non pertinente
EU/2/97/004/012	Metacam	0,5 mg/ml	Sospensione orale	Cani	Uso orale	Flacone (polietilene)	15 ml	1 flacone	Non pertinente
EU/2/97/004/013	Metacam	0,5 mg/ml	Sospensione orale	Cani	Uso orale	Flacone (polietilene)	30 ml	1 flacone	Non pertinente
EU/2/97/004/014	Metacam	20 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini e cavalli	Uso sottocutaneo o endovenoso (bovini), uso intramuscolare (suini), uso endovenoso (cavalli)	Flaconcino (vetro)	50 ml	12 flaconcini	Carne e visceri: 15 giorni (bovini), 5 giorni (suini/cavalli) Latte: 5 giorni
EU/2/97/004/015	Metacam	20 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini e cavalli	Uso sottocutaneo o endovenoso (bovini), uso intramuscolare (suini), uso endovenoso (cavalli)	Flaconcino (vetro)	100 ml	12 flaconcini	Carne e visceri: 15 giorni (bovini), 5 giorni (suini/cavalli) Latte: 5 giorni
EU/2/97/004/026	Metacam	0,5 mg/ml	Sospensione orale	Gatti, porcellini d'India	Uso orale	Polietilene flacone	15 ml	1 flacone	Non pertinente

Numero UE	Nome di fantasia	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie di destinazione	Via di somministrazione	Confezionamento	Contenuto	Confezione	Tempo di attesa
EU/2/97/004/027	Metacam	20 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini e cavalli	Uso sottocutaneo o endovenoso (bovini), uso intramuscolare (suini), uso endovenoso (cavalli)	Flaconcino (vetro)	20 ml	1 flaconcino	Carne e visceri: 15 giorni (bovini), 5 giorni (suini/cavalli) Latte: 5 giorni
EU/2/97/004/028	Metacam	20 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini e cavalli	Uso sottocutaneo o endovenoso (bovini), uso intramuscolare (suini), uso endovenoso (cavalli)	Flaconcino (vetro)	20 ml	12 flaconcini	Carne e visceri: 15 giorni (bovini), 5 giorni (suini/cavalli) Latte: 5 giorni
EU/2/97/004/029	Metacam	1,5 mg/ml	Sospensione orale	Cani	Uso orale	Flacone (polietilene)	180 ml	1 flacone	Non pertinente
EU/2/97/004/030	Metacam	15 mg/ml	Sospensione orale	Cavalli	Uso orale	Flacone (polietilene)	250 ml	1 flacone	Carne e visceri: 3 giorni
EU/2/97/004/031	Metacam	20 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini e cavalli	Uso sottocutaneo o endovenoso (bovini), uso intramuscolare (suini), uso endovenoso (cavalli)	Flaconcino (vetro)	250 ml	1 flaconcino	Carne e visceri: 15 giorni (bovini), 5 giorni (suini/cavalli) Latte: 5 giorni
EU/2/97/004/032	Metacam	20 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini e cavalli	Uso sottocutaneo o endovenoso (bovini), uso intramuscolare (suini), uso endovenoso (cavalli)	Flaconcino (vetro)	250 ml	6 flaconcini	Carne e visceri: 15 giorni (bovini), 5 giorni (suini/cavalli) Latte: 5 giorni
EU/2/97/004/033	Metacam	0,5 mg/ml	Sospensione orale	Gatti, porcellini d'India	Uso orale	Polietilene flacone	10 ml	1 flacone	Non pertinente

Numero UE	Nome di fantasia	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie di destinazione	Via di somministrazione	Confezionamento	Contenuto	Confezione	Tempo di attesa
EU/2/97/004/034	Metacam	0,5 mg/ml	Sospensione orale	Gatti, porcellini d'India	Uso orale	Polietilene flacone	3 ml	1 flacone	Non pertinente
EU/2/97/004/035	Metacam	5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso sottocutaneo o endovenoso (bovini), uso intramuscolare (suini)	Flaconcino (vetro)	20 ml	1 flaconcino	Carne e visceri: 15 giorni (bovini), 5 giorni (suini)
EU/2/97/004/036	Metacam	5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso sottocutaneo o endovenoso (bovini), uso intramuscolare (suini)	Flaconcino (vetro)	20 ml	12 flaconcini	Carne e visceri: 15 giorni (bovini), 5 giorni (suini)
EU/2/97/004/037	Metacam	5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso sottocutaneo o endovenoso (bovini), uso intramuscolare (suini)	Flaconcino (vetro)	50 ml	1 flaconcino	Carne e visceri: 15 giorni (bovini), 5 giorni (suini)
EU/2/97/004/038	Metacam	5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso sottocutaneo o endovenoso (bovini), uso intramuscolare (suini)	Flaconcino (vetro)	50 ml	12 flaconcini	Carne e visceri: 15 giorni (bovini), 5 giorni (suini)
EU/2/97/004/039	Metacam	2 mg/ml	Soluzione iniettabile	Gatti	Uso sottocutaneo	Flaconcino (vetro)	10 ml	1 flaconcino	Non pertinente
EU/2/97/004/040	Metacam	2 mg/ml	Soluzione iniettabile	Gatti	Uso sottocutaneo	Flaconcino (vetro)	20 ml	1 flaconcino	Non pertinente
EU/2/97/004/041	Metacam	15 mg/ml	Sospensione orale	Suini	Uso orale	Flacone (polietilene)	100 ml	1 flacone	Carne e visceri: 5 giorni
EU/2/97/004/042	Metacam	15 mg/ml	Sospensione orale	Suini	Uso orale	Flacone (polietilene)	250 ml	1 flacone	Carne e visceri: 5 giorni
EU/2/97/004/043	Metacam	1 mg	Compresse masticabili	Cani	Uso orale	Blister (Alu/Alu)	7 compresse	1 blister (7 compresse)	Non pertinente

Numero UE	Nome di fantasia	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie di destinazione	Via di somministrazione	Confezionamento	Contenuto	Confezione	Tempo di attesa
EU/2/97/004/044	Metacam	1 mg	Compresse masticabili	Cani	Uso orale	Blister (Alu/Alu)	7 compresse	12 blister (84 compresse)	Non pertinente
EU/2/97/004/045	Metacam	1 mg	Compresse masticabili	Cani	Uso orale	Blister (Alu/Alu)	7 compresse	36 blister (252 compresse)	Non pertinente
EU/2/97/004/046	Metacam	2,5 mg	Compresse masticabili	Cani	Uso orale	Blister (Alu/Alu)	7 compresse	1 blister (7 compresse)	Non pertinente
EU/2/97/004/047	Metacam	2,5 mg	Compresse masticabili	Cani	Uso orale	Blister (Alu/Alu)	7 compresse	12 blister (84 compresse)	Non pertinente
EU/2/97/004/048	Metacam	2,5 mg	Compresse masticabili	Cani	Uso orale	Blister (Alu/Alu)	7 compresse	36 blister (252 compresse)	Non pertinente
EU/2/97/004/049	Metacam	0,5 mg/ml	Sospensione orale	Gatti, porcellini d'India	Uso orale	Polietilene flacone	30 ml	1 flacone	Non pertinente
EU/2/97/004/051	Metacam	40 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini e cavalli	Uso endovenoso (bovini e cavalli), uso sottocutaneo (bovini)	Flaconcino (vetro)	100 ml	1 flaconcino	Carne e visceri: 15 giorni (bovini), 5 giorni (cavalli) Latte: 5 giorni (bovini)
EU/2/97/004/052	Metacam	40 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini e cavalli	Uso endovenoso (bovini e cavalli); Uso sottocutaneo (bovini)	Flaconcino (vetro)	50 ml	12 flaconcini	Carne e visceri: 15 giorni (bovini), 5 giorni (cavalli) Latte: 5 giorni (bovini)
EU/2/97/004/053	Metacam	40 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini e cavalli	Uso endovenoso (bovini e cavalli); Uso sottocutaneo (bovini)	Flaconcino (vetro)	100 ml	12 flaconcini	Carne e visceri: 15 giorni (bovini), 5 giorni (cavalli) Latte: 5 giorni (bovini)