

<u>Numero AIC (UE)</u>	<u>Nome (di fantasia)</u>	<u>Dosaggio</u>	<u>Forma farmaceutica</u>	<u>Via di somministrazione</u>	<u>Confezionamento primario</u>	<u>Contenuto (Concentrazione)</u>	<u>Numero di unità posologiche</u>
EU/1/24/1849/001	mRESVIA	-- ¹	Dispersione iniettabile	Uso intramuscolare	siringa preriempita (COC) in un blister	0,5 ml	1 siringa preriempita
EU/1/24/1849/002	mRESVIA	-- ¹	Dispersione iniettabile	Uso intramuscolare	siringa preriempita (COC) in un blister	0,5 ml	10 siringhe preriempite
EU/1/24/1849/003	mRESVIA	-- ¹	Dispersione iniettabile	Uso intramuscolare	siringa preriempita (COC) in un vassoio	0,5 ml	1 siringa preriempita
EU/1/24/1849/004	mRESVIA	-- ¹	Dispersione iniettabile	Uso intramuscolare	siringa preriempita (COC) in un vassoio	0,5 ml	10 siringhe preriempite

--¹ Una dose (0,5 mL) contiene 50 microgrammi di mRNA di RSV (modificato a livello dei nucleosidi) incapsulato in nanoparticelle lipidiche.
Il principio attivo è un mRNA a singola elica con *capping* in 5' che codifica la glicoproteina F dell'RSV-A stabilizzata nella conformazione di pre-fusione.