

<u>Numero AIC (UE)</u>	<u>Nome (di fantasia)</u>	<u>Dosaggio</u>	<u>Forma farmaceutica</u>	<u>Via di somministrazione</u>	<u>Confezionamento primario</u>	<u>Contenuto (Concentrazione)</u>	<u>Numero di unità posologiche</u>
EU/1/24/1817/001	Omlyclo	75 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro)	0,5 ml (150 mg/ml)	1 siringa preriempita
EU/1/24/1817/002	Omlyclo	150 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro)	1 ml (150 mg/ml)	1 siringa preriempita
EU/1/24/1817/003	Omlyclo	150 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro)	1 ml (150 mg/ml)	6 (6 x 1) siringhe preriempite (confezione multipla)
EU/1/24/1817/004	Omlyclo	150 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro)	1 ml (150 mg/ml)	10 (10 x 1) siringhe preriempite (confezione multipla)
EU/1/24/1817/005	Omlyclo	75 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro) in penna preriempita	0,5 ml (150 mg/ml)	1 penna preriempita
EU/1/24/1817/006	Omlyclo	150 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro) in penna preriempita	1 ml (150 mg/ml)	1 penna preriempita
EU/1/24/1817/007	Omlyclo	150 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro) in penna preriempita	1 ml (150 mg/ml)	6 (6 x 1) penne preriempite (confezione multipla)
EU/1/24/1817/008	Omlyclo	150 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro) in penna preriempita	1 ml (150 mg/ml)	10 (10 x 1) penne preriempite (confezione multipla)
EU/1/24/1817/009	Omlyclo	75 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro)	0,5 ml (150 mg/ml)	3 (3 x 1) siringhe preriempite (confezione multipla)
EU/1/24/1817/010	Omlyclo	75 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro) in penna preriempita	0,5 ml (150 mg/ml)	3 (3 x 1) penne preriempite (confezione multipla)
EU/1/24/1817/011	Omlyclo	150 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro)	1 ml (150 mg/ml)	3 (3 x 1) siringhe preriempite (confezione multipla)
EU/1/24/1817/012	Omlyclo	150 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro) in penna preriempita	1 ml (150 mg/ml)	2 (2 x 1) penne preriempite (confezione multipla)
EU/1/24/1817/013	Omlyclo	150 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro) in penna preriempita	1 ml (150 mg/ml)	3 (3 x 1) penne preriempite (confezione multipla)
EU/1/24/1817/014	Omlyclo	300 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro)	2 ml (150 mg/ml)	1 siringa preriempita

<u>Numero AIC (UE)</u>	<u>Nome (di fantasia)</u>	<u>Dosaggio</u>	<u>Forma farmaceutica</u>	<u>Via di somministrazione</u>	<u>Confezionamento primario</u>	<u>Contenuto (Concentrazione)</u>	<u>Numero di unità posologiche</u>
EU/1/24/1817/015	Omlyclo	300 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro)	2 ml (150 mg/ml)	2 (2 x 1) siringhe preriempite (confezione multipla)
EU/1/24/1817/016	Omlyclo	300 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro)	2 ml (150 mg/ml)	3 (3 x 1) siringhe preriempite (confezione multipla)
EU/1/24/1817/017	Omlyclo	300 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro)	2 ml (150 mg/ml)	6 (6 x 1) siringhe preriempite (confezione multipla)