

<b>Numero AIC (UE)</b>	<b>Nome (di fantasia)</b>	<b>Dosaggio</b>	<b>Forma farmaceutica</b>	<b>Via di somministrazione</b>	<b>Confezionamento primario</b>	<b>Contenuto (Concentrazione)</b>	<b>Numero di unità posologiche</b>
EU/1/21/1612/001	Prevenar 20	-- <sup>1</sup>	Sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (vetro)	0,5 mL	1 siringa preriempita
EU/1/21/1612/002	Prevenar 20	-- <sup>1</sup>	Sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (vetro)	0,5 mL	1 siringa preriempita con ago separato
EU/1/21/1612/003	Prevenar 20	-- <sup>1</sup>	Sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (vetro)	0,5 mL	10 siringhe preriempite
EU/1/21/1612/004	Prevenar 20	-- <sup>1</sup>	Sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (vetro)	0,5 mL	10 siringhe preriempite con 10 aghi separati
EU/1/21/1612/005	Prevenar 20	-- <sup>1</sup>	Sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (vetro)	0,5 mL	50 siringhe preriempite
EU/1/21/1612/006	Prevenar 20	-- <sup>1</sup>	Sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (vetro)	0,5 mL	50 siringhe preriempite con 50 aghi separati

--<sup>1</sup> Una dose (0,5 mL) contiene:

Polisaccaride pneumococcico sierotipo 1 <sup>1 2</sup>	2,2 µg
Polisaccaride pneumococcico sierotipo 3 <sup>1 2</sup>	2,2 µg
Polisaccaride pneumococcico sierotipo 4 <sup>1 2</sup>	2,2 µg
Polisaccaride pneumococcico sierotipo 5 <sup>1 2</sup>	2,2 µg
Polisaccaride pneumococcico sierotipo 6A <sup>1 2</sup>	2,2 µg
Polisaccaride pneumococcico sierotipo 6B <sup>1 2</sup>	4,4 µg
Polisaccaride pneumococcico sierotipo 7F <sup>1 2</sup>	2,2 µg
Polisaccaride pneumococcico sierotipo 8 <sup>1 2</sup>	2,2 µg
Polisaccaride pneumococcico sierotipo 9V <sup>1 2</sup>	2,2 µg
Polisaccaride pneumococcico sierotipo 10A <sup>1 2</sup>	2,2 µg
Polisaccaride pneumococcico sierotipo 11A <sup>1 2</sup>	2,2 µg
Polisaccaride pneumococcico sierotipo 12F <sup>1 2</sup>	2,2 µg
Polisaccaride pneumococcico sierotipo 14 <sup>1 2</sup>	2,2 µg
Polisaccaride pneumococcico sierotipo 15B <sup>1 2</sup>	2,2 µg
Polisaccaride pneumococcico sierotipo 18C <sup>1 2</sup>	2,2 µg
Polisaccaride pneumococcico sierotipo 19A <sup>1 2</sup>	2,2 µg
Polisaccaride pneumococcico sierotipo 19F <sup>1 2</sup>	2,2 µg
Polisaccaride pneumococcico sierotipo 22F <sup>1 2</sup>	2,2 µg
Polisaccaride pneumococcico sierotipo 23F <sup>1 2</sup>	2,2 µg

<b><u>Numero AIC (UE)</u></b>	<b><u>Nome (di fantasia)</u></b>	<b><u>Dosaggio</u></b>	<b><u>Forma farmaceutica</u></b>	<b><u>Via di somministrazione</u></b>	<b><u>Confezionamento primario</u></b>	<b><u>Contenuto (Concentrazione)</u></b>	<b><u>Numero di unità posologiche</u></b>
-------------------------------	----------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	--	--	---

Polisaccaride pneumococcico sierotipo 33F<sup>1 2</sup> 2,2 µg

<sup>1</sup> Coniugato alla proteina vettrice CRM<sub>197</sub> (approssimativamente 51 µg per dose)

<sup>2</sup> Adsorbito su fosfato di alluminio (0,125 mg di alluminio per dose)