

<u>Numero AIC (UE)</u>	<u>Nome (di Fantasia)</u>	<u>Dosaggio</u>	<u>Forma farmaceutica</u>	<u>Via di somministrazione</u>	<u>Confezionamento primario</u>	<u>Contenuto (Concentrazione)</u>	<u>Numero di unità posologiche</u>
EU/1/05/323/001	ProQuad	§	Polvere e solvente per sospensione iniettabile	Uso sottocutaneo o intramuscolare	polvere: flaconcino (vetro di Tipo I); solvente: flaconcino (vetro di Tipo I)	0,5 ml	1 flaconcino + 1 flaconcino
EU/1/05/323/002	ProQuad	§	Polvere e solvente per sospensione iniettabile	Uso sottocutaneo o intramuscolare	polvere: flaconcino (vetro di Tipo I); solvente: flaconcino (vetro di Tipo I)	0,5 ml	10 flaconcini +10 flaconcini
EU/1/05/323/005	ProQuad	§	Polvere e solvente per sospensione iniettabile	Uso sottocutaneo o intramuscolare	polvere: flaconcino (vetro di Tipo I); solvente: siringa preriempita (vetro di Tipo I)	0,5 ml	1 flaconcino + 1 siringa preriempita senza ago
EU/1/05/323/006	ProQuad	§	Polvere e solvente per sospensione iniettabile	Uso sottocutaneo o intramuscolare	polvere: flaconcino (vetro di Tipo I); solvente: siringa preriempita (vetro di Tipo I)	0,5 ml	10 flaconcini +10 siringhe preriempite senza ago
EU/1/05/323/007	ProQuad	§	Polvere e solvente per sospensione iniettabile	Uso sottocutaneo o intramuscolare	polvere: flaconcino (vetro di Tipo I); solvente: siringa preriempita (vetro di Tipo I)	0,5 ml	20 flaconcini +20 siringhe preriempite senza ago
EU/1/05/323/008	ProQuad	§	Polvere e solvente per sospensione iniettabile	Uso sottocutaneo o intramuscolare	polvere: flaconcino (vetro di Tipo I); solvente: siringa preriempita (vetro di Tipo I)	0,5 ml	1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 ago
EU/1/05/323/009	ProQuad	§	Polvere e solvente per sospensione iniettabile	Uso sottocutaneo o intramuscolare	polvere: flaconcino (vetro di Tipo I); solvente: siringa preriempita (vetro di Tipo I)	0,5 ml	10 flaconcini +10 siringhe preriempite +10 aghi
EU/1/05/323/010	ProQuad	§	Polvere e solvente per	Uso sottocutaneo o	polvere: flaconcino	0,5 ml	1 flaconcino +1 siringa

			sospensione iniettabile	intramuscolare	(vetro di Tipo I); solvente: siringa preriempita (vetro di Tipo I)		preriempita +2 aghi
EU/1/05/323/011	ProQuad	§	Polvere e solvente per sospensione iniettabile	Uso sottocutaneo o intramuscolare	polvere: flaconcino (vetro di Tipo I); solvente: siringa preriempita (vetro di Tipo I)	0,5 ml	10 flaconcini +10 siringhe preriempite +20 aghi
EU/1/05/323/012	ProQuad	§	Polvere e solvente per sospensione iniettabile	Uso sottocutaneo o intramuscolare	polvere: flaconcino (vetro di Tipo I); solvente: siringa preriempita (vetro di Tipo I)	0,5 ml	20 flaconcini +20 siringhe preriempite +20 aghi
EU/1/05/323/013	ProQuad	§	Polvere e solvente per sospensione iniettabile	Uso sottocutaneo o intramuscolare	polvere: flaconcino (vetro di Tipo I); solvente: siringa preriempita (vetro di Tipo I)	0,5 ml	20 flaconcini +20 siringhe preriempite +40 aghi

§	Virus del morbillo ¹ ceppo Enders Edmonston (vivo, attenuato)	non meno di 3,00 log ₁₀ DICT ₅₀ *
	Virus della parotite ¹ ceppo Jeryl Lynn™ (Livello B) (vivo, attenuato)	non meno di 4,30 log ₁₀ DICT ₅₀ *
	Virus della rosolia ² ceppo Wistar RA 27/3 (vivo, attenuato)	non meno di 3,00 log ₁₀ DICT ₅₀ *
	Virus della varicella ³ ceppo Oka/Merck (vivo, attenuato)	non meno di 3,99 log ₁₀ PFU**

* 50% della dose infettante la coltura tissutale

** unità formanti placca

⁽¹⁾ Prodotto su cellule embrionali di pollo.

⁽²⁾ Prodotto su fibroblasti di polmone diploidi umani (WI-38).

⁽³⁾ Prodotto su cellule diploidi umane (MRC-5).