

<u>MA (EU) numero</u>	<u>(Fantasia) nome</u>	<u>Dosaggio</u>	<u>Forma Farmaceutica</u>	<u>Via di somministrazione</u>	<u>Confezionamento primario</u>	<u>Contenuto (concentrazione)</u>	<u>Confezione</u>
EU/1/08/463/001	Relistor	12 mg/0,6 ml	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Flaconcino (vetro)	0,6 ml (20 mg/ml)	1 flaconcino
EU/1/08/463/002	Relistor	12 mg/0,6 ml	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Flaconcino (vetro)	0,6 ml (20 mg/ml)	2 flaconcini + 2 siringhe sterili + 4 salviettine alcool imbevute
EU/1/08/463/003	Relistor	12 mg/0,6 ml	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Flaconcino (vetro)	0,6 ml (20 mg/ml)	7 flaconcini + 7 siringhe sterili + 14 salviettine alcool imbevute
EU/1/08/463/004	Relistor	8 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Siringa preriempita (vetro)	0,4 ml (20 mg/ml)	4 siringhe preriempite
EU/1/08/463/005	Relistor	8 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Siringa preriempita (vetro)	0,4 ml (20 mg/ml)	7 siringhe preriempite
EU/1/08/463/006	Relistor	8 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Siringa preriempita (vetro)	0,4 ml (20 mg/ml)	8 siringhe preriempite
EU/1/08/463/007	Relistor	8 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Siringa preriempita (vetro)	0,4 ml (20 mg/ml)	10 siringhe preriempite
EU/1/08/463/008	Relistor	12 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Siringa preriempita (vetro)	0,6 ml (20 mg/ml)	4 siringhe preriempite
EU/1/08/463/009	Relistor	12 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Siringa preriempita (vetro)	0,6 ml (20 mg/ml)	7 siringhe preriempite
EU/1/08/463/010	Relistor	12 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Siringa preriempita (vetro)	0,6 ml (20 mg/ml)	8 siringhe preriempite
EU/1/08/463/011	Relistor	12 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Siringa preriempita (vetro)	0,6 ml (20 mg/ml)	10 siringhe preriempite
EU/1/08/463/012	Relistor	12 mg/0,6 ml	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Flaconcino (vetro)	0,6 ml (20 mg/ml)	2 flaconcini + 2 siringhe sterili con ago di sicurezza + 4 salviettine alcool imbevute

<u>MA (EU) numero</u>	<u>(Fantasia) nome</u>	<u>Dosaggio</u>	<u>Forma Farmaceutica</u>	<u>Via di somministrazione</u>	<u>Confezionamento primario</u>	<u>Contenuto (concentrazione)</u>	<u>Confezione</u>
EU/1/08/463/013	Relistor	12 mg/0,6 ml	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Flaconcino (vetro)	0,6 ml (20 mg/ml)	7 flaconcini + 7 siringhe sterili con ago di sicurezza + 14 salviettine alcool imbevute