

<u>Numero AIC (UE)</u>	<u>Nome (di fantasia)</u>	<u>Dosaggio</u>	<u>Forma farmaceutica</u>	<u>Via di somministrazione</u>	<u>Contenitore primario</u>	<u>Contenuto</u>	<u>Numero di unità posologica</u>
EU/1/09/508/001	Synflorix	-- ¹	Sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	siringa pre-riempita (vetro)	0.5 ml	1 siringa preriempita
EU/1/09/508/002	Synflorix	-- ¹	Sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	siringa pre-riempita (vetro)	0.5 ml	10 siringhe preriempite
EU/1/09/508/003	Synflorix	-- ¹	Sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	siringa pre-riempita (vetro)	0.5 ml	1 siringa preriempita + 1 ago
EU/1/09/508/004	Synflorix	-- ¹	Sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	siringa pre-riempita (vetro)	0.5 ml	10 siringhe preriempite + 10 aghi
EU/1/09/508/005	Synflorix	-- ¹	Sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	siringa pre-riempita (vetro)	0.5 ml	1 siringa preriempita + 2 aghi
EU/1/09/508/006	Synflorix	-- ¹	Sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	flaconcino (vetro)	0.5 ml	1 flaconcino
EU/1/09/508/007	Synflorix	-- ¹	Sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	flaconcino (vetro)	0.5 ml	10 flaconcini
EU/1/09/508/008	Synflorix	-- ¹	Sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	flaconcino (vetro)	0.5 ml	100 flaconcini
EU/1/09/508/010	Synflorix	-- ¹	Sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	siringa pre-riempita (vetro)	0.5 ml	50 siringhe preriempite
EU/1/09/508/012	Synflorix	-- ¹	Sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	flaconcino (vetro)	2,0 ml	10 flaconcini (multidose)
EU/1/09/508/013	Synflorix	-- ¹	Sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	flaconcino (vetro)	2,0 ml	100 flaconcini (multidose)

--¹ 1 dose (0,5 ml) contiene:

Polisaccaride pneumococcico del sierotipo 1* ¹	1 microgrammo
Polisaccaride pneumococcico del sierotipo 4* ¹	3 microgrammi
Polisaccaride pneumococcico del sierotipo 5* ¹	1 microgrammo
Polisaccaride pneumococcico del sierotipo 6B* ¹	1 microgrammo
Polisaccaride pneumococcico del sierotipo 7F* ¹	1 microgrammo
Polisaccaride pneumococcico del sierotipo 9V* ¹	1 microgrammo
Polisaccaride pneumococcico del sierotipo 14* ¹	1 microgrammo

Polisaccaride pneumococcico del sierotipo 18C* ²	3 microgrammi
Polisaccaride pneumococcico del sierotipo 19F* ³	3 microgrammi
Polisaccaride pneumococcico del sierotipo 23F* ¹	1 microgrammo

* adsorbito su alluminio fosfato

0,5 milligrammi Al³⁺

¹ coniugato alla proteina D (derivata da *Haemophilus influenzae* non tipizzabile) proteina vettrice 9-16 microgrammi

² coniugato al tossoide tetanico, proteina vettrice 5-10 microgrammi

³ coniugato al tossoide difterico, proteina vettrice 3-6 microgrammi