

**ALLEGATO I**

**RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

## **1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE**

PREVYMIS 240 mg compresse rivestite con film  
PREVYMIS 480 mg compresse rivestite con film

## **2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA**

### PREVYMIS 240 mg compresse rivestite con film

Ogni compressa rivestita con film contiene 240 mg di letermovir.

### PREVYMIS 480 mg compresse rivestite con film

Ogni compressa rivestita con film contiene 480 mg di letermovir.

### Eccipiente(i) con effetti noti

Ogni compressa rivestita con film da 240 mg contiene 4 mg di lattosio (come monoidrato).  
Ogni compressa rivestita con film da 480 mg contiene 6,4 mg di lattosio (come monoidrato).

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

## **3. FORMA FARMACEUTICA**

Compressa rivestita con film (compressa)

### PREVYMIS 240 mg compresse rivestite con film

Compressa ovale di colore giallo, di dimensioni pari a 16,5 mm x 8,5 mm, con impresso “591” su un lato e il logo aziendale sull’altro.

### PREVYMIS 480 mg compresse rivestite con film

Compressa ovale biconvessa di colore rosa, di dimensioni pari a 21,2 mm x 10,3 mm, con impresso “595” su un lato e il logo aziendale sull’altro.

## **4. INFORMAZIONI CLINICHE**

### **4.1 Indicazioni terapeutiche**

PREVYMIS è indicato per la profilassi della riattivazione e della malattia da citomegalovirus (CMV) in pazienti adulti e pediatrici di peso corporeo di almeno 15 kg che sono sieropositivi per CMV riceventi [R+] trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche (*haematopoietic stem cell transplant, HSCT*).

PREVYMIS è indicato per la profilassi della malattia da CMV in pazienti adulti e pediatrici di peso corporeo di almeno 40 kg sieronegativi per CMV che hanno ricevuto un trapianto di rene da un donatore sieropositivo per CMV [D+/R-].

Devono essere prese in considerazione le linee guida ufficiali sull’uso appropriato degli agenti antivirali.

## **4.2 Posologia e modo di somministrazione**

Il trattamento con letermovir deve essere iniziato da un medico esperto nella gestione di pazienti sottoposti a trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche o trapianto di rene.

### Posologia

Letermovir è inoltre disponibile come granulato in bustina (20 mg e 120 mg) e come concentrato per soluzione per infusione (240 mg e 480 mg).

Le compresse, il granulato in bustina e il concentrato per soluzione per infusione di letermovir possono essere utilizzati indistintamente a discrezione del medico. Può essere necessario un adattamento della dose per i pazienti pediatrici di peso corporeo inferiore a 30 kg quando si passa dalla formulazione orale a quella endovenosa. Fare riferimento alle informazioni sulla prescrizione di letermovir concentrato per soluzione per infusione per le informazioni sul dosaggio.

#### *Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche (HSCT)*

La terapia con letermovir deve essere iniziata dopo HSCT. La terapia con letermovir può essere iniziata il giorno stesso del trapianto e non oltre 28 giorni dopo HSCT. La terapia con letermovir può essere iniziata prima o dopo l'atteggiamento del trapianto. La profilassi con letermovir deve continuare per 100 giorni dopo HSCT.

La profilassi con letermovir prolungata oltre 100 giorni dopo HSCT può apportare un beneficio ad alcuni pazienti ad alto rischio di riattivazione tardiva del CMV (vedere paragrafo 5.1). La sicurezza e l'efficacia di letermovir quando utilizzato per più di 200 giorni non sono state studiate in studi clinici.

#### *Pazienti adulti e pediatrici di peso corporeo di almeno 30 kg riceventi HSCT*

La dose raccomandata di letermovir è di 480 mg una volta al giorno che può essere somministrata come una compressa da 480 mg o come due compresse da 240 mg.

Per i pazienti che non riescono a deglutire le compresse, fare riferimento alle informazioni sulla prescrizione di letermovir granulato in bustina per le informazioni sul dosaggio.

#### *Adattamento della dose in pazienti adulti e pediatrici di peso corporeo di almeno 30 kg riceventi HSCT*

In caso di co-somministrazione di letermovir con ciclosporina, la dose di letermovir deve essere ridotta a 240 mg una volta al giorno (vedere paragrafi 4.5 e 5.2).

- Se la ciclosporina viene iniziata dopo l'inizio della terapia con letermovir, la dose successiva di letermovir deve essere ridotta a 240 mg una volta al giorno.
- Se la ciclosporina viene interrotta dopo l'inizio della terapia con letermovir, la dose successiva di letermovir deve essere aumentata a 480 mg una volta al giorno.
- Se la somministrazione di ciclosporina viene temporaneamente sospesa a causa di livelli elevati di ciclosporina, non è necessario alcun adattamento della dose di letermovir.

#### *Pazienti pediatrici di peso corporeo da almeno 15 kg a inferiore a 30 kg riceventi HSCT*

La dose raccomandata di letermovir è di 240 mg una volta al giorno che può essere somministrata come una compressa da 240 mg (vedere anche paragrafo 5.2).

Per i pazienti pediatrici che non riescono a deglutire le compresse, fare riferimento alle informazioni sulla prescrizione di letermovir granulato in bustina per le informazioni sul dosaggio.

*Adattamento della dose in pazienti pediatrici di peso corporeo da almeno 15 kg a inferiore a 30 kg riceventi HSCT*

In caso di co-somministrazione di letermovir per via orale con ciclosporina, la dose di letermovir deve essere ridotta a 120 mg una volta al giorno (vedere anche paragrafi 4.5 e 5.2). Per i pazienti che necessitano di una dose di 120 mg, fare riferimento alle informazioni sulla prescrizione di letermovir granulato in bustina per le informazioni sul dosaggio.

- Se la ciclosporina viene iniziata dopo l'inizio della terapia con letermovir, la dose successiva di letermovir deve essere ridotta a 120 mg una volta al giorno.
- Se la ciclosporina viene interrotta dopo l'inizio della terapia con letermovir, la dose successiva di letermovir deve essere aumentata a 240 mg una volta al giorno.
- Se la somministrazione di ciclosporina viene temporaneamente sospesa a causa di livelli elevati di ciclosporina, non è necessario alcun adattamento della dose di letermovir.

*Trapianto di rene*

La terapia con letermovir deve essere iniziata il giorno stesso del trapianto e non oltre 7 giorni post trapianto di rene e deve essere continuata per 200 giorni post trapianto.

*Pazienti adulti e pediatrici di peso corporeo di almeno 40 kg riceventi trapianto di rene*

La dose raccomandata di letermovir è di 480 mg una volta al giorno che può essere somministrata come una compressa da 480 mg o come due compresse da 240 mg.

Per i pazienti che non riescono a deglutire le compresse, fare riferimento alle informazioni sulla prescrizione di letermovir granulato in bustina per le informazioni sul dosaggio.

*Adattamento della dose in pazienti adulti e pediatrici di peso corporeo di almeno 40 kg riceventi trapianto di rene*

In caso di co-somministrazione di letermovir con ciclosporina, la dose di letermovir deve essere ridotta a 240 mg una volta al giorno (vedere anche paragrafi 4.5 e 5.2).

- Se la ciclosporina viene iniziata dopo l'inizio della terapia con letermovir, la dose successiva di letermovir deve essere ridotta a 240 mg una volta al giorno.
- Se la ciclosporina viene interrotta dopo l'inizio della terapia con letermovir, la dose successiva di letermovir deve essere aumentata a 480 mg una volta al giorno.
- Se la somministrazione di ciclosporina viene temporaneamente sospesa a causa di livelli elevati di ciclosporina, non è necessario alcun adattamento della dose di letermovir.

*Dose saltata*

Ai pazienti deve essere detto che, nel caso in cui dimenticassero di assumere una dose di letermovir, devono provvedere all'assunzione non appena se ne ricordano. Nel caso in cui non se ne ricordassero fino al momento della dose successiva, devono saltare la dose dimenticata e tornare allo schema normale. I pazienti non devono raddoppiare la dose successiva né assumere una dose superiore alla dose prescritta.

Popolazioni speciali

*Anziani*

Non è necessario alcun adattamento della dose di letermovir in base all'età (vedere paragrafi 5.1 e 5.2).

*Compromissione epatica*

In presenza di compromissione epatica di grado da lieve (Child-Pugh classe A) a moderato (Child-Pugh classe B) non è necessario alcun adattamento della dose di letermovir. Letermovir non è raccomandato in pazienti con compromissione epatica severa (Child-Pugh classe C) (vedere paragrafo 5.2).

*Compromissione epatica e renale*

Letermovir non è raccomandato in pazienti con compromissione epatica moderata associata a compromissione renale moderata o severa (vedere paragrafo 5.2).

### *Compromissione renale*

Non è raccomandato un adattamento della dose di letermovir nei pazienti con compromissione renale lieve, moderata o severa. Non possono essere formulate raccomandazioni in merito alla posologia per i pazienti con malattia renale allo stadio terminale (ESRD) sottoposti o non sottoposti a dialisi. L'efficacia e la sicurezza non sono state dimostrate in pazienti con ESRD.

### *Popolazione pediatrica*

La sicurezza e l'efficacia di letermovir nei pazienti riceventi HSCT di peso corporeo inferiore a 5 kg o nei pazienti riceventi trapianto di rene di peso corporeo inferiore a 40 kg non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Nessuna raccomandazione sulla posologia per i pazienti riceventi trapianto di rene di peso corporeo inferiore a 40 kg può essere supportata dall'estrapolazione di farmacocinetica/farmacodinamica.

### Modo di somministrazione

Per uso orale.

La compressa deve essere deglutita intera e può essere assunta durante o lontano dai pasti. La compressa non deve essere divisa, frantumata o masticata perché questi metodi non sono stati studiati.

### **4.3 Controindicazioni**

Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1.

Somministrazione concomitante con pimozide (vedere paragrafi 4.4 e 4.5).

Somministrazione concomitante con alcaloidi derivati dalla segale cornuta (vedere paragrafi 4.4 e 4.5).

Somministrazione concomitante con erba di S. Giovanni (*Hypericum perforatum*) (vedere paragrafo 4.5).

Quando letermovir è associato a ciclosporina:

- L'uso concomitante con dabigatran, atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina o pitavastatina è controindicato (vedere paragrafo 4.5).

### **4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d'impiego**

#### Monitoraggio del DNA del CMV nei riceventi HSCT

In uno studio di fase 3 (P001), la sicurezza e l'efficacia di letermovir sono state stabilite in pazienti sottoposti a HSCT con un risultato negativo al test del DNA del CMV prima dell'inizio della profilassi. Il DNA del CMV è stato monitorato settimanalmente fino alla settimana 14 post trapianto e successivamente ogni due settimane fino alla settimana 24. In presenza di DNAemia o malattia da CMV clinicamente significativa, la profilassi con letermovir è stata interrotta ed è stato iniziato il trattamento o la terapia pre-emptive standard (PET). Nei pazienti in cui è stata iniziata la profilassi con letermovir e il test del DNA del CMV al basale è successivamente risultato positivo, la profilassi poteva essere proseguita se i criteri per iniziare la PET non erano stati soddisfatti (vedere paragrafo 5.1).

#### Rischio di reazioni avverse o effetto terapeutico ridotto dovuti ad interazioni farmacologiche

L'uso concomitante di letermovir e di alcuni medicinali può determinare interazioni farmacologiche note o potenzialmente significative, alcune delle quali possono dar luogo a:

- possibili reazioni avverse clinicamente significative derivanti dalla maggiore esposizione ai medicinali concomitanti o a letermovir.
- diminuzione significativa delle concentrazioni plasmatiche dei medicinali concomitanti che può determinare una riduzione del loro effetto terapeutico.

Vedere Tabella 1 per le procedure di prevenzione o gestione di tali interazioni farmacologiche note o potenzialmente significative, comprese le raccomandazioni sul dosaggio (vedere paragrafi 4.3 e 4.5).

## Interazioni farmacologiche

Letermovir deve essere usato con cautela quando co-somministrato con medicinali che sono substrati del CYP3A con indice terapeutico ristretto (ad es., alfentanil, fentanil e chinidina), in quanto la co-somministrazione può determinare un aumento delle concentrazioni plasmatiche dei substrati del CYP3A. Si raccomanda un attento monitoraggio e/o un adattamento della dose dei substrati del CYP3A co-somministrati (vedere paragrafo 4.5).

In generale si raccomanda un monitoraggio più intenso per ciclosporina, tacrolimus, sirolimus durante le prime 2 settimane dopo l'inizio e la fine del trattamento con letermovir (vedere paragrafo 4.5) e anche se si modifica la via di somministrazione di letermovir.

Letermovir è un induttore moderato di enzimi e trasportatori. L'induzione può dare origine a ridotte concentrazioni plasmatiche di alcuni medicinali metabolizzati e trasportati (vedere paragrafo 4.5). È pertanto raccomandato un monitoraggio terapeutico del farmaco (*Therapeutic Drug Monitoring, TDM*) per voriconazolo. L'uso concomitante con dabigatran deve essere evitato a causa del rischio di riduzione dell'efficacia di dabigatran.

Letermovir può aumentare le concentrazioni plasmatiche di medicinali trasportati da OATP1B1/3, tra i quali molte statine (vedere paragrafo 4.5 e Tabella 1).

## Eccipienti

PREVYMIS contiene lattosio monoidrato. I pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al galattosio, da deficit totale di lattasi, o da malassorbimento di glucosio-galattosio, non devono assumere questo medicinale.

Questo medicinale contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per compressa, cioè essenzialmente "senza sodio".

## **4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d'interazione**

### Informazioni generali sulle differenze nell'esposizione tra diversi regimi di trattamento di letermovir

-L'esposizione plasmatica stimata di letermovir è diversa a seconda del regime posologico utilizzato (vedere tabella al paragrafo 5.2). Pertanto, le conseguenze cliniche delle interazioni farmacologiche di letermovir dipenderanno dal tipo di regime di letermovir utilizzato e se letermovir viene associato o meno a ciclosporina.

-L'associazione di ciclosporina e letermovir può determinare effetti più marcati o aggiuntivi sui medicinali concomitanti rispetto a letermovir da solo (vedere Tabella 1).

### Effetto di altri medicinali su letermovir

Le vie di eliminazione di letermovir *in vivo* sono l'escrezione biliare e la glucuronidazione. La relativa importanza di queste vie non è nota. Entrambe le vie di eliminazione comportano il trasporto attivo negli epatociti attraverso i trasportatori attivi epatici OATP1B1/3. Dopo il trasporto attivo, la glucuronidazione di letermovir è mediata da UGT1A1 e 3. Sembra che letermovir sia anche soggetto all'efflusso mediato dalla P-gp e BCRP nel fegato e nell'intestino (vedere paragrafo 5.2).

### Induttori di farmaci che metabolizzano enzimi o trasportatori

La co-somministrazione di letermovir (con o senza ciclosporina) con induttori potenti e moderati dei trasportatori (ad es., P-gp) e/o degli enzimi (ad es., UGT) non è raccomandata, in quanto può determinare un'esposizione subterapeutica di letermovir (vedere Tabella 1).

-Esempi di induttori potenti includono rifampicina, fenitoina, carbamazepina, rifabutina e fenobarbital.  
-Esempi di induttori moderati includono tioridazina, modafinil, ritonavir, lopinavir, efavirenz ed etravirina.

La co-somministrazione di rifampicina ha determinato un aumento iniziale delle concentrazioni plasmatiche di letermovir (a causa dell'inibizione di OATP1B1/3 e/o della P-gp) non clinicamente rilevante, seguito da diminuzioni delle concentrazioni plasmatiche di letermovir clinicamente rilevanti (a causa dell'induzione della P-gp/UGT) con la co-somministrazione continuativa di rifampicina (vedere Tabella 1).

#### **Effetti aggiuntivi di altri medicinali su letermovir rilevanti quando associato a ciclosporina**

##### *Inibitori di OATP1B1 o 3*

La co-somministrazione di letermovir con medicinali che sono inibitori di OATP1B1/3 può determinare un aumento delle concentrazioni plasmatiche di letermovir. Nel caso in cui letermovir venga co-somministrato con ciclosporina (potente inibitore dell'OATP1B1/3), la dose raccomandata di letermovir è di 240 mg una volta al giorno in pazienti adulti e pediatrici di peso corporeo di almeno 30 kg (vedere Tabella 1 e paragrafi 4.2 e 5.2). Se letermovir per via orale viene co-somministrato con ciclosporina in pazienti pediatrici di peso corporeo inferiore a 30 kg, la dose deve essere ridotta (vedere paragrafi 4.2 e 5.2). Si consiglia cautela se altri inibitori di OATP1B1/3 sono aggiunti a letermovir in associazione a ciclosporina.

-Esempi di inibitori di OATP1B1 includono gemfibrozil, eritromicina, claritromicina e diversi inibitori della proteasi (atazanavir, simeprevir).

##### *Inibitori della P-gp/BCRP*

I risultati *in vitro* indicano che letermovir è un substrato della P-gp/BCRP. Le variazioni delle concentrazioni plasmatiche di letermovir a causa dell'inibizione della P-gp/BCRP da itraconazolo non sono state clinicamente rilevanti.

#### **Effetto di letermovir su altri medicinali**

##### *Medicinali principalmente eliminati attraverso metabolismo o influenzati da trasporto attivo*

*In vivo* letermovir è un induttore generale di enzimi e trasportatori. A meno che un particolare enzima o trasportatore non venga anche inibito (vedere sotto) si prevede che ci sia induzione. Pertanto, letermovir può potenzialmente determinare una ridotta esposizione plasmatica e probabilmente una ridotta efficacia dei medicinali co-somministrati che sono principalmente eliminati attraverso metabolismo o trasporto attivo.

L'entità dell'effetto induttivo dipende dalla via di somministrazione di letermovir e se la ciclosporina viene usata in concomitanza. Si può prevedere che l'effetto della totale induzione avvenga dopo 10-14 giorni di trattamento con letermovir. Il tempo necessario a raggiungere lo stato stazionario di uno specifico medicinale interessato influenzera anche il tempo necessario a raggiungere l'effetto totale sulle concentrazioni plasmatiche.

*In vitro*, letermovir è un inibitore di CYP3A, CYP2C8, CYP2B6, BCRP, UGT1A1, OATP2B1 e di OAT3 a concentrazioni rilevanti *in vivo*. Sono disponibili studi *in vivo* che valutano l'effetto netto su CYP3A4, P-gp, OATP1B1/3 oltre che su CYP2C19. Non è noto l'effetto netto *in vivo* su altri enzimi e trasportatori elencati. Informazioni più dettagliate sono descritte di seguito.

Non è noto se letermovir possa influenzare l'esposizione di piperacillina/tazobactam, amfotericina B e micafungina. La potenziale interazione tra letermovir e questi medicinali non è stata studiata. Esiste un rischio teorico di ridotta esposizione a causa dell'induzione ma l'entità dell'effetto e quindi la rilevanza clinica non è al momento nota.

##### *Medicinali metabolizzati dal CYP3A*

*In vivo* letermovir è un inibitore moderato di CYP3A. La co-somministrazione di letermovir con midazolam per via orale (un substrato del CYP3A) determina un aumento di 2-3 volte le concentrazioni plasmatiche di midazolam. La co-somministrazione di letermovir può determinare aumenti clinicamente rilevanti delle concentrazioni plasmatiche dei substrati del CYP3A co-somministrati (vedere paragrafi 4.3, 4.4 e 5.2).

-Esempi di medicinali di questo tipo includono alcuni immunosoppressori (ad es., ciclosporina, tacrolimus, sirolimus), gli inibitori della HMG-CoA reduttasi e amiodarone (vedere Tabella 1). Pimozide e alcaloidi derivati dalla segale cornuta sono controindicati (vedere paragrafo 4.3). L'entità dell'effetto inibitorio del CYP3A dipende dalla via di somministrazione di letermovir e se la ciclosporina viene usata in concomitanza.

A causa dell'inibizione tempo-dipendente e della simultanea induzione, l'effetto netto inibitorio dell'enzima può non essere raggiunto prima di 10-14 giorni. Il tempo necessario a raggiungere lo stato stazionario di uno specifico medicinale interessato influenzerà anche il tempo necessario a raggiungere l'effetto totale sulle concentrazioni plasmatiche. Dopo la fine del trattamento, occorreranno 10-14 giorni prima che l'effetto inibitorio svanisca. Se si ricorre a monitoraggio, questo è raccomandato le prime 2 settimane dopo l'inizio e la fine del trattamento con letermovir (vedere paragrafo 4.4) e anche se si modifica la via di somministrazione di letermovir.

#### *Medicinali trasportati da OATP1B1/3*

Letermovir è un inibitore dei trasportatori OATP1B1/3. La somministrazione di letermovir può determinare un aumento clinicamente rilevante delle concentrazioni plasmatiche dei medicinali co-somministrati che sono substrati di OATP1B1/3.

-Esempi di medicinali di questo tipo includono gli inibitori della HMG-CoA reduttasi, fexofenadina, repaglinide e gliburide (vedere Tabella 1). Confrontando regimi di letermovir somministrati senza ciclosporina, l'effetto è più marcato dopo la somministrazione per via endovenosa rispetto alla somministrazione orale di letermovir.

È probabile che l'entità dell'inibizione di OATP1B1/3 sui medicinali co-somministrati sia maggiore quando letermovir è co-somministrato con ciclosporina (un inibitore potente di OATP1B1/3). Ciò deve essere considerato quando il regime di letermovir viene modificato durante il trattamento con un substrato di OATP1B1/3.

#### *Medicinali metabolizzati dal CYP2C9 e/o dal CYP2C19*

La co-somministrazione di letermovir con voriconazolo (un substrato del CYP2C19) determina una riduzione significativa delle concentrazioni plasmatiche di voriconazolo, indicando che letermovir è un induttore del CYP2C19. È probabile anche un'induzione del CYP2C9. Letermovir può ridurre l'esposizione ai substrati del CYP2C9 e/o del CYP2C19 determinando potenzialmente livelli subterapeutici.

-Esempi di medicinali di questo tipo includono warfarin, voriconazolo, diazepam, lansoprazolo, omeprazolo, esomeprazolo, pantoprazolo, tilidina e tolbutamide (vedere Tabella 1).

Si prevede che l'effetto sia meno pronunciato per letermovir per via orale senza ciclosporina, rispetto a letermovir per via endovenosa con o senza ciclosporina o a letermovir per via orale con ciclosporina. Ciò deve essere considerato quando il regime di letermovir viene modificato durante il trattamento con un substrato di CYP2C9 o CYP2C19. Vedere anche sopra le informazioni generali sul decorso dell'interazione.

#### *Medicinali metabolizzati dal CYP2C8*

*In vitro* letermovir inibisce il CYP2C8 ma può anche indurre il CYP2C8 in base al suo potenziale di induzione. L'effetto netto *in vivo* non è noto.

-Un esempio di medicinale che viene principalmente eliminato dal CYP2C8 è la repaglinide (vedere Tabella 1). L'uso concomitante di repaglinide e letermovir con o senza ciclosporina non è raccomandato.

#### *Medicinali trasportati dalla P-gp nell'intestino*

Letermovir è un induttore della P-gp intestinale. La somministrazione di letermovir può determinare una diminuzione clinicamente rilevante delle concentrazioni plasmatiche dei medicinali co-somministrati che sono trasportati in maniera significativa dalla P-gp nell'intestino come dabigatran e sofosbuvir.

#### *Medicinali metabolizzati da CYP2B6, UGT1A1 o trasportati da BCRP o OATP2B1*

*In vivo* letermovir è in generale un induttore ma *in vitro* è stata anche osservata l'inibizione di CYP2B6, UGT1A1, BCRP e OATP2B1. Non è noto l'effetto netto *in vivo*. Pertanto, le concentrazioni plasmatiche di medicinali che sono substrati di questi enzimi o trasportatori possono aumentare o

diminuire quando co-somministrati con letermovir. Può essere raccomandato monitoraggio addizionale; fare riferimento alle informazioni sulla prescrizione di tali medicinali.

- Esempi di medicinali che sono metabolizzati da CYP2B6 comprendono bupropione.
- Esempi di medicinali metabolizzati da UGT1A1 sono raltegravir e dolutegravir.
- Esempi di medicinali trasportati da BCRP includono rosuvastatina e sulfasalazina.
- Un esempio di un medicinale trasportato da OATP2B1 è il celiprololo.

#### *Medicinali trasportati dal trasportatore renale OAT3*

I dati *in vitro* indicano che letermovir è un inibitore di OAT3; pertanto, letermovir può essere un inibitore di OAT3 *in vivo*. Le concentrazioni plasmatiche dei medicinali trasportati da OAT3 possono essere aumentate.

- Esempi di medicinali trasportati da OAT3 includono ciprofloxacina, tenofovir, imipenem e cilastatina.

#### Informazioni generali

Se l'adattamento della dose dei medicinali concomitanti viene effettuato a causa del trattamento con letermovir, le dosi devono essere rimodulate una volta che il trattamento con letermovir è stato completato. Può anche essere necessario un adattamento della dose se si modifica la via di somministrazione o l'immunosoppressore.

La Tabella 1 fornisce un elenco delle interazioni farmacologiche stabilite o potenzialmente significative da un punto di vista clinico. Le interazioni farmacologiche descritte si basano su studi condotti con letermovir sugli adulti o rappresentano interazioni farmacologiche previste che possono verificarsi con letermovir (vedere paragrafi 4.3, 4.4, 5.1 e 5.2).

**Tabella 1: Interazioni e raccomandazioni sul dosaggio con altri medicinali. Notare che la tabella non è esaustiva ma fornisce esempi di interazioni clinicamente rilevanti. Vedere anche sopra il testo generale sulle interazioni farmacologiche.**

**Salvo diversa indicazione, gli studi di interazione sono stati effettuati sugli adulti con letermovir per via orale senza ciclosporina. Notare che la potenziale interazione e le conseguenze cliniche possono essere differenti qualora letermovir sia somministrato per via orale o per via endovenosa e se ciclosporina sia usata in concomitanza. Se si modifica la via di somministrazione**

**o se si modifica l'immunosoppressore, la raccomandazione relativa alla co-somministrazione deve essere riconsiderata.**

<b>Medicinale concomitante</b>	<b>Effetto sulla concentrazione<sup>†</sup> rapporto delle medie (intervallo di confidenza al 90%) per AUC, C<sub>max</sub> (probabile meccanismo d'azione)</b>	<b>Raccomandazioni relative alla co-somministrazione con letermovir</b>
<b>Antibiotici</b>		
nafcillina	Interazione non studiata. Previsto: ↓ letermovir  (Induzione della P-gp/UGT)	Nafcillina può ridurre le concentrazioni plasmatiche di letermovir. La co-somministrazione di letermovir e nafcillina non è raccomandata.
<b>Antifungini</b>		
fluconazolo (400 mg in dose singola)/ letermovir (480 mg in dose singola)	↔ fluconazolo AUC 1,03 (0,99; 1,08) C <sub>max</sub> 0,95 (0,92; 0,99)  ↔ letermovir AUC 1,11 (1,01; 1,23) C <sub>max</sub> 1,06 (0,93; 1,21)  Interazione allo stato stazionario non studiata. Previsto: ↔ fluconazolo ↔ letermovir	Non è necessario alcun adattamento della dose.
itraconazolo (200 mg una volta al giorno PO)/ letermovir (480 mg una volta al giorno PO)	↔ itraconazolo AUC 0,76 (0,71; 0,81) C <sub>max</sub> 0,84 (0,76; 0,92)  ↔ letermovir AUC 1,33 (1,17; 1,51) C <sub>max</sub> 1,21 (1,05; 1,39)	Non è necessario alcun adattamento della dose.
posaconazolo <sup>‡</sup> (300 mg in dose singola)/ letermovir (480 mg una volta al giorno)	↔ posaconazolo AUC 0,98 (0,82; 1,17) C <sub>max</sub> 1,11 (0,95; 1,29)	Non è necessario alcun adattamento della dose.
voriconazolo <sup>‡</sup> (200 mg due volte al giorno)/ letermovir (480 mg una volta al giorno)	↓ voriconazolo AUC 0,56 (0,51; 0,62) C <sub>max</sub> 0,61 (0,53; 0,71)  (Induzione di CYP2C9/19)	Se è necessaria la somministrazione concomitante, un TDM per voriconazolo è raccomandato le prime 2 settimane dopo l'inizio o la fine del trattamento con letermovir, e anche se si modifica la via di somministrazione di letermovir o l'immunosoppressore.

<b>Medicinale concomitante</b>	<b>Effetto sulla concentrazione<sup>†</sup> rapporto delle medie (intervallo di confidenza al 90%) per AUC, C<sub>max</sub> (probabile meccanismo d'azione)</b>	<b>Raccomandazioni relative alla co-somministrazione con letermovir</b>
<b>Antimicobatterici</b>		
Rifabutina	Interazione non studiata. Previsto: ↓ letermovir  (Induzione della P-gp/UGT)	Rifabutina può ridurre le concentrazioni plasmatiche di letermovir. La co-somministrazione di letermovir e rifabutina non è raccomandata.
rifampicina  (600 mg in dose singola PO)/ letermovir (480 mg in dose singola PO)	↔ letermovir AUC 2,03 (1,84; 2,26) C <sub>max</sub> 1,59 (1,46; 1,74) C <sub>24</sub> 2,01 (1,59; 2,54)  (Inibizione di OATP1B1/3 e/o della P-gp)	Rifampicina in dose multipla diminuisce le concentrazioni plasmatiche di letermovir. La co-somministrazione di letermovir e rifampicina non è raccomandata.
(600 mg in dose singola per via endovenosa)/ letermovir (480 mg in dose singola PO)	↔ letermovir AUC 1,58 (1,38; 1,81) C <sub>max</sub> 1,37 (1,16; 1,61) C <sub>24</sub> 0,78 (0,65; 0,93)  (Inibizione di OATP1B1/3 e/o della P-gp)	
(600 mg una volta al giorno PO)/ letermovir (480 mg una volta al giorno PO)	↓ letermovir AUC 0,81 (0,67; 0,98) C <sub>max</sub> 1,01 (0,79; 1,28) C <sub>24</sub> 0,14 (0,11; 0,19)  (Somma dell'inibizione di OATP1B1/3 e/o della P-gp e dell'induzione della P-gp/UGT)	
(600 mg una volta al giorno PO (24 ore dopo rifampicina)) <sup>§</sup> / letermovir (480 mg una volta al giorno PO)	↓ letermovir AUC 0,15 (0,13; 0,17) C <sub>max</sub> 0,27 (0,22; 0,31) C <sub>24</sub> 0,09 (0,06; 0,12)  (Induzione della P-gp/UGT)	

<b>Medicinale concomitante</b>	<b>Effetto sulla concentrazione<sup>†</sup> rapporto delle medie (intervallo di confidenza al 90%) per AUC, C<sub>max</sub> (probabile meccanismo d'azione)</b>	<b>Raccomandazioni relative alla co-somministrazione con letermovir</b>
<b>Antipsicotici</b>		
tioridazina	Interazione non studiata. Previsto: ↓ letermovir  (Induzione della P-gp/UGT)	Tioridazina può ridurre le concentrazioni plasmatiche di letermovir. La co-somministrazione di letermovir e tioridazina non è raccomandata.
<b>Antagonisti dell'endotelina</b>		
Bosentan	Interazione non studiata. Previsto: ↓ letermovir  (Induzione della P-gp/UGT)	Bosentan può ridurre le concentrazioni plasmatiche di letermovir. La co-somministrazione di letermovir e bosentan non è raccomandata.
<b>Antivirali</b>		
aciclovir <sup>‡</sup> (400 mg in dose singola)/ letermovir (480 mg una volta al giorno)	↔ aciclovir AUC 1,02 (0,87; 1,2) C <sub>max</sub> 0,82 (0,71; 0,93)	Non è necessario alcun adattamento della dose.
valaciclovir	Interazione non studiata. Previsto: ↔ valaciclovir	Non è necessario alcun adattamento della dose.
<b>Prodotti a base di erbe</b>		
erba di S. Giovanni ( <i>Hypericum perforatum</i> )	Interazione non studiata. Previsto: ↓ letermovir  (Induzione della P-gp/UGT)	L'erba di S. Giovanni può ridurre le concentrazioni plasmatiche di letermovir. La co-somministrazione di letermovir ed erba di S. Giovanni è controindicata.
<b>Medicinali per l'HIV</b>		
Efavirenz	Interazione non studiata. Previsto: ↓ letermovir (Induzione della P-gp/UGT)  ↑ o ↓ efavirenz (Inibizione o induzione di CYP2B6)	Efavirenz può ridurre le concentrazioni plasmatiche di letermovir. La co-somministrazione di letermovir ed efavirenz non è raccomandata.
etravirina, nevirapina, ritonavir, lopinavir	Interazione non studiata. Previsto: ↓ letermovir  (Induzione della P-gp/UGT)	Questi antivirali possono ridurre le concentrazioni plasmatiche di letermovir. La co-somministrazione di letermovir con questi antivirali non è raccomandata.

<b>Medicinale concomitante</b>	<b>Effetto sulla concentrazione<sup>†</sup> rapporto delle medie (intervallo di confidenza al 90%) per AUC, C<sub>max</sub> (probabile meccanismo d'azione)</b>	<b>Raccomandazioni relative alla co-somministrazione con letermovir</b>
<b>Inibitori della HMG-CoA reduttasi</b>		
atorvastatina <sup>‡</sup> (20 mg in dose singola)/ letermovir (480 mg una volta al giorno)	↑ atorvastatina AUC 3,29 (2,84; 3,82) C <sub>max</sub> 2,17 (1,76; 2,67)  (Inibizione di CYP3A, OATP1B1/3)	Gli eventi avversi associati alle statine quali la miopia devono essere attentamente monitorati. Quando co-somministrata con letermovir, la dose di atorvastatina non deve superare i 20 mg al giorno <sup>#</sup> .  Benché non sia stato studiato, si prevede che, quando letermovir è co-somministrato con ciclosporina, l'entità dell'aumento delle concentrazioni plasmatiche di atorvastatina sia maggiore rispetto alla terapia con letermovir da solo. Quando letermovir è co-somministrato con ciclosporina, l'impiego di atorvastatina è controindicato.
simvastatina, pitavastatina, rosuvastatina	Interazione non studiata. Previsto: ↑ inibitori della HMG-CoA reduttasi  (Inibizione di CYP3A, OATP1B1/3)	Letermovir può aumentare sostanzialmente le concentrazioni plasmatiche di queste statine. L'uso concomitante non è raccomandato con letermovir da solo.  Quando letermovir è co-somministrato con ciclosporina, l'impiego di queste statine è controindicato.
fluvastatina, pravastatina	Interazione non studiata. Previsto: ↑ inibitori della HMG-CoA reduttasi  (Inibizione di OATP1B1/3 e/o di BCRP)	Letermovir può aumentare le concentrazioni plasmatiche di statina.  Quando letermovir è co-somministrato con queste statine, può essere necessaria una riduzione della dose della statina <sup>#</sup> . Gli eventi avversi associati alle statine quali la miopia devono essere attentamente monitorati.  Quando letermovir è co-somministrato con ciclosporina, pravastatina non è raccomandata mentre per fluvastatina può essere necessaria una riduzione della dose <sup>#</sup> . Gli eventi avversi associati alle statine quali la miopia devono essere attentamente monitorati.

<b>Medicinale concomitante</b>	<b>Effetto sulla concentrazione<sup>†</sup> rapporto delle medie (intervallo di confidenza al 90%) per AUC, C<sub>max</sub> (probabile meccanismo d'azione)</b>	<b>Raccomandazioni relative alla co-somministrazione con letermovir</b>
<b>Immunosoppressori</b>		
ciclosporina (50 mg in dose singola)/ letermovir (240 mg una volta al giorno)	↑ ciclosporina AUC 1,66 (1,51; 1,82) C <sub>max</sub> 1,08 (0,97; 1,19)  (Inibizione di CYP3A)	In caso di co-somministrazione di letermovir con ciclosporina, la dose di letermovir deve essere ridotta a 240 mg una volta al giorno negli adulti (vedere paragrafi 4.2 e 5.1) e nei pazienti pediatrici di peso corporeo di almeno 30 kg (vedere paragrafo 4.2). Se letermovir per via orale viene co-somministrato con ciclosporina nei pazienti pediatrici di peso corporeo inferiore a 30 kg, la dose deve essere ridotta (vedere paragrafo 4.2).
ciclosporina (200 mg in dose singola)/ letermovir (240 mg una volta al giorno)	↑ letermovir AUC 2,11 (1,97; 2,26) C <sub>max</sub> 1,48 (1,33; 1,65)  (Inibizione di OATP1B1/3)	Se si modifica la via di somministrazione di letermovir e dopo l'interruzione di letermovir deve essere eseguito un frequente monitoraggio delle concentrazioni di ciclosporina nel sangue intero e la dose di ciclosporina deve essere modificata di conseguenza <sup>#</sup> .
micofenolato mofetile (1 g in dose singola)/ letermovir (480 mg una volta al giorno)	↔ acido micofenolico AUC 1,08 (0,97; 1,20) C <sub>max</sub> 0,96 (0,82; 1,12)  ↔ letermovir AUC 1,18 (1,04; 1,32) C <sub>max</sub> 1,11 (0,92; 1,34)	Non è necessario alcun adattamento della dose.

<b>Medicinale concomitante</b>	<b>Effetto sulla concentrazione<sup>†</sup> rapporto delle medie (intervallo di confidenza al 90%) per AUC, C<sub>max</sub> (probabile meccanismo d'azione)</b>	<b>Raccomandazioni relative alla co-somministrazione con letermovir</b>
sirolimus <sup>‡</sup> (2 mg in dose singola)/ letermovir (480 mg una volta al giorno)	↑ sirolimus AUC 3,40 (3,01; 3,85) C <sub>max</sub> 2,76 (2,48; 3,06)  (Inibizione di CYP3A)  Interazione non studiata. Previsto: ↔ letermovir	<p>Se si modifica la via di somministrazione di letermovir e dopo l'interruzione di letermovir deve essere eseguito un frequente monitoraggio delle concentrazioni di sirolimus nel sangue intero e la dose di sirolimus deve essere modificata di conseguenza<sup>#</sup>.</p> <p>Un monitoraggio frequente delle concentrazioni di sirolimus è raccomandato al momento dell'inizio o dell'interruzione della co-somministrazione di ciclosporina con letermovir.</p> <p>Quando letermovir è co-somministrato con ciclosporina, si rimanda anche alle informazioni sulla prescrizione di sirolimus per specifiche raccomandazioni sul dosaggio per l'uso di sirolimus con ciclosporina.</p> <p>Quando letermovir è co-somministrato con ciclosporina, l'entità dell'aumento delle concentrazioni di sirolimus può essere maggiore rispetto a letermovir da solo.</p>
tacrolimus (5 mg in dose singola)/ letermovir (480 mg una volta al giorno)	↑ tacrolimus AUC 2,42 (2,04; 2,88) C <sub>max</sub> 1,57 (1,32; 1,86)  (Inibizione di CYP3A)	<p>Se si modifica la via di somministrazione di letermovir e dopo l'interruzione di letermovir deve essere eseguito un frequente monitoraggio delle concentrazioni di tacrolimus nel sangue intero e la dose di tacrolimus deve essere modificata di conseguenza<sup>#</sup>.</p>
tacrolimus (5 mg in dose singola)/ letermovir (80 mg due volte al giorno)	↔ letermovir AUC 1,02 (0,97; 1,07) C <sub>max</sub> 0,92 (0,84; 1,00)	

<b>Medicinale concomitante</b>	<b>Effetto sulla concentrazione<sup>†</sup> rapporto delle medie (intervallo di confidenza al 90%) per AUC, C<sub>max</sub> (probabile meccanismo d'azione)</b>	<b>Raccomandazioni relative alla co-somministrazione con letermovir</b>
<b>Contraceppimenti orali</b>		
etinilestradiolo (EE) (0,03 mg)/ levonorgestrel (LNG) <sup>‡</sup> (0,15 mg) in dose singola/ letermovir (480 mg una volta al giorno)	↔ EE AUC 1,42 (1,32; 1,52) C <sub>max</sub> 0,89 (0,83; 0,96)  ↔ LNG AUC 1,36 (1,30; 1,43) C <sub>max</sub> 0,95 (0,86; 1,04)	Non è necessario alcun adattamento della dose.
Altri steroidi contraccettivi orali con effetto sistematico	Rischio di ↓ steroidi contraccettivi	Letermovir può ridurre le concentrazioni plasmatiche di altri steroidi contraccettivi orali influenzando in tal modo la loro efficacia. Per assicurare un adeguato effetto contraccettivo con un contraccettivo orale, devono essere scelti prodotti contenenti EE e LNG.
<b>Medicinali antidiabetici</b>		
repaglinide	Interazione non studiata. Previsto: ↑ o ↓ repaglinide  (Induzione di CYP2C8, inibizione di CYP2C8 e OATP1B)	Letermovir può aumentare o diminuire le concentrazioni plasmatiche di repaglinide. (L'effetto netto non è noto).  L'uso concomitante non è raccomandato.  Si prevede che, quando letermovir è co-somministrato con ciclosporina, le concentrazioni plasmatiche di repaglinide siano maggiori a causa dell'inibizione aggiuntiva del OATP1B da parte della ciclosporina. L'uso concomitante non è raccomandato <sup>#</sup> .
Gliburide	Interazione non studiata. Previsto: ↑ gliburide  (Inibizione di OATP1B1/3, inibizione di CYP3A, induzione di CYP2C9)	Letermovir può aumentare le concentrazioni plasmatiche di gliburide.  Si raccomanda un monitoraggio frequente delle concentrazioni di glucosio le prime 2 settimane dopo l'inizio o la fine del trattamento con letermovir, e anche se si modifica la via di somministrazione di letermovir.  Quando letermovir è co-somministrato con ciclosporina, si rimanda anche alle informazioni sulla prescrizione di gliburide per specifiche raccomandazioni sul dosaggio.

<b>Medicinale concomitante</b>	<b>Effetto sulla concentrazione<sup>†</sup> rapporto delle medie (intervallo di confidenza al 90%) per AUC, C<sub>max</sub> (probabile meccanismo d'azione)</b>	<b>Raccomandazioni relative alla co-somministrazione con letermovir</b>
<b>Medicinali antiepilettici (vedere anche testo generale)</b>		
carbamazepina, fenobarbital	Interazione non studiata. Previsto: ↓ letermovir  (Induzione della P-gp/UGT)	Carbamazepina o fenobarbital possono ridurre le concentrazioni plasmatiche di letermovir. La co-somministrazione di letermovir e carbamazepina o fenobarbital non è raccomandata.
fenitoina	Interazione non studiata. Previsto: ↓ letermovir  (Induzione della P-gp/UGT)  ↓ fenitoina  (Induzione di CYP2C9/19)	Fenitoina può ridurre le concentrazioni plasmatiche di letermovir.  Le termovir può ridurre le concentrazioni plasmatiche di fenitoina.  La co-somministrazione di letermovir e fenitoina non è raccomandata.
<b>Anticoagulanti orali</b>		
warfarin	Interazione non studiata. Previsto: ↓ warfarin  (Induzione di CYP2C9)	Le termovir può ridurre le concentrazioni plasmatiche di warfarin.  Quando warfarin viene co-somministrato con letermovir deve essere eseguito un monitoraggio frequente del rapporto internazionale normalizzato (INR) <sup>#</sup> . Si raccomanda un monitoraggio le prime 2 settimane dopo l'inizio o la fine del trattamento con letermovir, e anche se si modifica la via di somministrazione di letermovir o l'immunosoppressore.
dabigatran	Interazione non studiata. Previsto: ↓ dabigatran  (Induzione della P-gp intestinale)	Le termovir può ridurre le concentrazioni plasmatiche di dabigatran e può diminuire l'efficacia di dabigatran. L'uso concomitante con dabigatran deve essere evitato a causa del rischio di riduzione dell'efficacia di dabigatran.  Quando letermovir viene co-somministrato con ciclosporina, l'uso di dabigatran è controindicato.

<b>Medicinale concomitante</b>	<b>Effetto sulla concentrazione<sup>†</sup> rapporto delle medie (intervallo di confidenza al 90%) per AUC, C<sub>max</sub> (probabile meccanismo d'azione)</b>	<b>Raccomandazioni relative alla co-somministrazione con letermovir</b>
<b>Sedativi</b>		
midazolam (1 mg in dose singola per via endovenosa)/ letermovir (240 mg una volta al giorno PO)	↑ midazolam Per via endovenosa: AUC 1,47 (1,37; 1,58) C <sub>max</sub> 1,05 (0,94; 1,17)  PO: AUC 2,25 (2,04; 2,48) C <sub>max</sub> 1,72 (1,55; 1,92)  (Inibizione di CYP3A)	Durante la somministrazione di letermovir in concomitanza con midazolam si deve effettuare un attento monitoraggio clinico per depressione respiratoria e/o per sedazione prolungata. Si deve prendere in considerazione un adattamento della dose di midazolam <sup>#</sup> . L'aumento delle concentrazioni plasmatiche di midazolam può essere maggiore quando midazolam per via orale viene somministrato con letermovir alla dose clinica rispetto alla dose studiata.
<b>Agonisti oppioidi</b>		
Esempi: alfentanil, fentanil	Interazione non studiata. Previsto: ↑ oppioidi metabolizzati dal CYP3A  (Inibizione di CYP3A)	Durante la co-somministrazione si raccomanda un monitoraggio frequente delle reazioni avverse correlate a questi medicinali. Può essere necessario un adattamento della dose degli oppioidi metabolizzati dal CYP3A <sup>#</sup> (vedere paragrafo 4.4). Si raccomanda un monitoraggio se si modifica la via di somministrazione. Quando letermovir è co-somministrato con ciclosporina, l'entità dell'aumento delle concentrazioni plasmatiche degli oppioidi metabolizzati dal CYP3A può essere maggiore. Si deve effettuare un attento monitoraggio clinico per depressione respiratoria e/o per sedazione prolungata durante la co-somministrazione di letermovir in associazione a ciclosporina e alfentanil o fentanil. Si rimanda alle rispettive informazioni sulla prescrizione (vedere paragrafo 4.4).
<b>Medicinali antiaritmici</b>		
amiodarone	Interazione non studiata. Previsto: ↑ amiodarone  (principalmente inibizione di CYP3A e inibizione o induzione di CYP2C8)	Le termovir può aumentare le concentrazioni plasmatiche di amiodarone.  Durante la co-somministrazione si raccomanda un monitoraggio frequente delle reazioni avverse correlate ad amiodarone. Quando amiodarone viene co-somministrato con letermovir deve essere eseguito regolarmente un monitoraggio delle concentrazioni di amiodarone <sup>#</sup> .

<b>Medicinale concomitante</b>	<b>Effetto sulla concentrazione<sup>†</sup> rapporto delle medie (intervallo di confidenza al 90%) per AUC, C<sub>max</sub> (probabile meccanismo d'azione)</b>	<b>Raccomandazioni relative alla co-somministrazione con letermovir</b>
chinidina	Interazione non studiata. Previsto: ↑ chinidina  (Inibizione di CYP3A)	Letermovir può aumentare le concentrazioni plasmatiche di chinidina.  Si deve effettuare un attento monitoraggio clinico durante la somministrazione di letermovir con chinidina. Si rimanda alle rispettive informazioni sulla prescrizione <sup>#</sup> .
<b>Medicinali cardiovascolari</b>		
digossina <sup>‡</sup> (0,5 mg in dose singola)/ letermovir (240 mg due volte al giorno)	↔ digossina AUC 0,88 (0,80; 0,96) C <sub>max</sub> 0,75 (0,63; 0,89)  (Induzione della P-gp)	Non è necessario alcun adattamento della dose.
<b>Inibitori della pompa protonica</b>		
omeprazolo	Interazione non studiata. Previsto: ↓ omeprazolo  (Induzione di CYP2C19)  Interazione non studiata. Previsto: ↔ letermovir	Letermovir può ridurre le concentrazioni plasmatiche dei substrati del CYP2C19.  Possono essere necessari un monitoraggio clinico e un adattamento della dose.
pantoprazolo	Interazione non studiata. Previsto: ↓ pantoprazolo  (probabilmente dovuto all'induzione di CYP2C19)  Interazione non studiata. Previsto: ↔ letermovir	Letermovir può ridurre le concentrazioni plasmatiche dei substrati del CYP2C19.  Possono essere necessari un monitoraggio clinico e un adattamento della dose.
<b>Agenti promotori dello stato di veglia</b>		
modafinil	Interazione non studiata. Previsto: ↓ letermovir  (Induzione della P-gp/UGT)	Modafinil può ridurre le concentrazioni plasmatiche di letermovir. La co-somministrazione di letermovir e modafinil non è raccomandata.
* Questa tabella non include tutti i dati. † ↓ =diminuzione, ↑ =aumento ↔ =nessuna variazione clinicamente rilevante ‡ Studio di interazione unidirezionale per la valutazione dell'effetto di letermovir sul medicinale concomitante. § Questi dati sono l'effetto di rifampicina su letermovir 24 ore dopo la dose finale di rifampicina. # Fare riferimento alle rispettive informazioni sulla prescrizione.		

#### Popolazione pediatrica

Sono stati effettuati studi d'interazione solo negli adulti.

## **4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento**

### Gravidanza

Non vi sono dati sull'uso di letermovir in donne in gravidanza. Gli studi su animali hanno mostrato tossicità riproduttiva (vedere paragrafo 5.3).

Letermovir non è raccomandato durante la gravidanza e in donne in età fertile che non usano misure contraccettive.

### Allattamento

Non è noto se letermovir sia escreto nel latte materno. I dati farmacodinamici/tossicologici disponibili sull'animale hanno dimostrato l'escrezione di letermovir nel latte (vedere paragrafo 5.3). Il rischio per i neonati/lattanti non può essere escluso. Deve essere presa la decisione se interrompere l'allattamento o interrompere la terapia/astenersi dalla terapia con letermovir tenendo in considerazione il beneficio dell'allattamento per il bambino e il beneficio della terapia per la donna.

### Fertilità

Nei ratti non è stato riscontrato alcun effetto sulla fertilità femminile. Tossicità testicolare irreversibile e compromissione della fertilità sono state osservate nei maschi di ratto, ma non nei maschi di topo o scimmia (vedere paragrafo 5.3).

## **4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari**

Letermovir può alterare lievemente la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Durante il trattamento con letermovir sono stati riportati stanchezza e vertigini in alcuni pazienti. Ciò può influenzare la capacità dei pazienti di guidare veicoli e di usare macchinari (vedere paragrafo 4.8).

## **4.8 Effetti indesiderati**

### Riassunto del profilo di sicurezza

La valutazione della sicurezza di letermovir è stata basata su tre studi clinici di fase 3.

#### *HSCT*

Nello studio P001, a 565 adulti riceventi HSCT è stato somministrato letermovir o placebo fino alla settimana 14 post trapianto e sono stati seguiti per la sicurezza fino alla settimana 24 post trapianto (vedere paragrafo 5.1). Le reazioni avverse riportate più comunemente, che si sono manifestate in almeno l'1% dei soggetti nel gruppo letermovir e con frequenza maggiore rispetto al placebo, sono state: nausea (7,2%), diarrea (2,4%) e vomito (1,9%). Le reazioni avverse riportate più frequentemente che hanno condotto all'interruzione di letermovir sono state: nausea (1,6%), vomito (0,8%) e dolore addominale (0,5%).

Nello studio P040, a 218 adulti riceventi HSCT è stato somministrato letermovir o placebo dalla settimana 14 (circa 100 giorni) fino alla settimana 28 (circa 200 giorni) post HSCT e sono stati seguiti per la sicurezza fino alla settimana 48 post HSCT (vedere paragrafo 5.1). Le reazioni avverse riportate erano coerenti con il profilo di sicurezza di letermovir caratterizzato nello studio P001.

#### *Trapianto di rene*

Nello studio P002, a 292 adulti riceventi trapianto di rene è stato somministrato letermovir fino alla settimana 28 (circa 200 giorni) post trapianto (vedere paragrafo 5.1).

## Tabella delle reazioni avverse

Nei pazienti adulti che assumevano letermovir negli studi clinici sono state identificate le reazioni avverse indicate di seguito. Le reazioni avverse sono elencate di seguito secondo classificazione per sistemi e organi e frequenza. Le frequenze sono definite come segue: molto comune ( $\geq 1/10$ ), comune ( $\geq 1/100, < 1/10$ ), non comune ( $\geq 1/1\ 000, < 1/100$ ), raro ( $\geq 1/10\ 000, < 1/1\ 000$ ) o molto raro ( $< 1/10\ 000$ ).

**Tabella 2: Reazioni avverse identificate con letermovir**

Frequenza	Reazioni avverse
<i>Disturbi del sistema immunitario</i>	
Non comune	ipersensibilità
<i>Disturbi del metabolismo e della nutrizione</i>	
Non comune	appetito ridotto
<i>Patologie del sistema nervoso</i>	
Non comune	disgeusia, cefalea
<i>Patologie dell'orecchio e del labirinto</i>	
Non comune	vertigini
<i>Patologie gastrointestinali</i>	
Comune	nausea, diarrea, vomito
Non comune	dolore addominale
<i>Patologie epatobiliari</i>	
Non comune	alanina aminotransferasi aumentata, aspartato aminotransferasi aumentata
<i>Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo</i>	
Non comune	spasmi muscolari
<i>Patologie renali e urinarie</i>	
Non comune	creatinina ematica aumentata
<i>Patologie generali e condizioni relative alla sede di somministrazione</i>	
Non comune	stanchezza, edema periferico

## Popolazione pediatrica

La valutazione della sicurezza di letermovir nei pazienti pediatrici dalla nascita fino a 18 anni di età è stata basata su uno studio clinico di fase 2b (P030). Nello studio P030, 63 riceventi HSCT sono stati trattati con letermovir fino alla settimana 14 post HSCT. La loro distribuzione per età è stata la seguente: 28 adolescenti, 14 bambini di età compresa tra 7 e inferiore a 12 anni, 13 bambini di età compresa tra 2 e inferiore a 7 anni e 8 bambini di età inferiore a 2 anni (5 di loro di età inferiore a 1 anno). Le reazioni avverse erano coerenti con quelle osservate negli studi clinici di letermovir negli adulti.

## Segnalazione delle reazioni avverse sospette

La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione riportato nell'[allegato V](#).

## **4.9 Sovradosaggio**

Non c'è alcuna esperienza con il sovradosaggio di letermovir nell'uomo. Nel corso di studi clinici di fase 1, 86 soggetti adulti sani hanno ricevuto dosi di letermovir variabili nell'intervallo da 720 mg/die a 1 440 mg/die per un periodo massimo di 14 giorni. Il profilo delle reazioni avverse era simile a quello della dose clinica di 480 mg/die. Non esiste alcun antidoto specifico per il sovradosaggio di letermovir. In caso di sovradosaggio, si raccomanda di monitorare il paziente per reazioni avverse e di iniziare l'appropriato trattamento sintomatico.

Non è noto se la dialisi produca una rimozione significativa di letermovir dalla circolazione sistemica.

## **5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE**

### **5.1 Proprietà farmacodinamiche**

Categoria farmacoterapeutica: antivirali per uso sistemico, antivirali ad azione diretta, codice ATC: J05AX18

#### Meccanismo d'azione

Letermovir inibisce il complesso terminasi del DNA del CMV, che è necessario per il clivaggio e impacchettamento del DNA della progenie virale. Letermovir influenza la formazione di unità genomiche di lunghezza adeguata e interferisce con la maturazione del virione.

#### Attività antivirale

Il valore mediano della concentrazione efficace ( $EC_{50}$ ) di letermovir nei confronti di una raccolta di isolati clinici di CMV, in un modello di coltura cellulare dell'infezione, corrispondeva a 2,1 nM (intervallo=da 0,7 nM a 6,1 nM; n=74).

#### Resistenza virale

##### *In coltura cellulare*

I geni UL51, UL56 e UL89 del CMV codificano le subunità della terminasi del DNA virale del CMV. In coltura cellulare sono stati confermati CMV mutanti con ridotta sensibilità a letermovir. I valori della  $EC_{50}$  dei mutanti ricombinanti del CMV che esprimono le sostituzioni mappate in pUL51 (P91S), pUL56 (C25F, S229F, V231A, V231L, V236A, T244K, T244R, L254F, L257F, L257I, F261C, F261L, F261S, Y321C, L328V, M329T, A365S, N368D) e pUL89 (N320H, D344E) erano da 1,6 a < 10 volte superiori a quelli relativi al virus wild-type di riferimento; è improbabile che tali sostituzioni siano clinicamente rilevanti. I valori della  $EC_{50}$  dei mutanti ricombinanti del CMV che esprimono in pUL51 la sostituzione A95V o in pUL56 le sostituzioni N232Y, V236L, V236M, E237D, E237G, L241P, K258E, C325F, C325R, C325W, C325Y, R369G, R369M, R369S e R369T erano da 10 a 9 300 volte superiori a quelli relativi al virus wild-type di riferimento; alcune di queste sostituzioni sono state osservate in pazienti che hanno manifestato insuccesso della profilassi negli studi clinici (vedere sotto).

##### *Negli studi clinici*

In uno studio di fase 2b per la valutazione di dosi di letermovir da 60, 120 o 240 mg/die o placebo per un periodo massimo di 84 giorni in 131 adulti riceventi HSCT, è stata eseguita l'analisi della sequenza del DNA di una regione selezionata del gene UL56 (amminoacidi da 231 a 369) su campioni ottenuti da 12 soggetti trattati con letermovir, che avevano manifestato insuccesso della profilassi e per i quali erano disponibili campioni per l'analisi. In un soggetto (che riceveva la dose di 60 mg/die) era presente una variante genotipica (GV) resistente a letermovir (V236M).

In uno studio di fase 3 (P001), è stata eseguita l'analisi della sequenza del DNA di intere regioni codificanti dei geni UL56 e UL89 su campioni ottenuti da 40 soggetti adulti trattati con letermovir nella popolazione di pazienti randomizzati che aveva ricevuto almeno una dose del trattamento assegnato (popolazione FAS), che avevano manifestato insuccesso della profilassi e per i quali erano disponibili campioni per l'analisi. In due soggetti sono state rilevate GV resistenti a letermovir, entrambe con sostituzioni mappate in pUL56. In un soggetto era presente la sostituzione V236M e nell'altro soggetto era presente la sostituzione E237G. In un ulteriore soggetto, in cui il DNA del CMV era rilevabile al basale (e quindi non compreso nella popolazione FAS) erano presenti in pUL56 le sostituzioni C325W e R369T, rilevate dopo l'interruzione di letermovir.

In uno studio di fase 3 (P040), è stata eseguita l'analisi della sequenza del DNA di intere regioni codificanti dei geni UL51, UL56 e UL89 su campioni ottenuti da 32 soggetti adulti

(indipendentemente dal gruppo di trattamento) che avevano manifestato insuccesso della profilassi o che avevano interrotto precocemente il trattamento con viremia da CMV. Non sono state rilevate sostituzioni associate a resistenza a letermovir al di sopra del limite del 5% del test validato.

In uno studio di fase 3 (P002), è stata eseguita l'analisi della sequenza del DNA di intere regioni codificanti dei geni UL51, UL56 e UL89 su campioni ottenuti da 52 soggetti adulti trattati con letermovir che avevano manifestato malattia da CMV o che avevano interrotto precocemente il trattamento con viremia da CMV. Non sono state rilevate sostituzioni associate a resistenza a letermovir al di sopra del limite del 5% del test validato.

In uno studio di fase 2b (P030), è stata eseguita l'analisi della sequenza del DNA di intere regioni codificanti dei geni UL51, UL56 e UL89 su campioni ottenuti da 10 soggetti pediatrici trattati con letermovir durante una visita per la valutazione dell'infezione da CMV. In 2 soggetti sono state rilevate un totale di 2 sostituzioni associate alla resistenza a letermovir, entrambe mappate in pUL56. In un soggetto era presente la sostituzione R369S e nell'altro soggetto era presente la sostituzione C325W.

#### Resistenza crociata

È improbabile che si manifesti resistenza crociata con medicinali che possiedono un meccanismo d'azione differente. Letermovir è completamente attivo nei confronti di popolazioni virali con sostituzioni che conferiscono resistenza agli inibitori della DNA polimerasi del CMV (ganciclovir, cidofovir e foscarnet). Un gruppo di ceppi di CMV ricombinante con sostituzioni che conferiscono resistenza a letermovir era completamente sensibile a cidofovir, foscarnet e ganciclovir, ad eccezione di un ceppo ricombinante con la sostituzione E237G in pUL56 che conferisce una riduzione di 2,1 volte della sensibilità a ganciclovir rispetto al wild-type.

#### Elettrofisiologia cardiaca

In uno studio randomizzato, monodose, controllato con placebo e con controllo attivo (400 mg di moxifloxacina per via orale) con 4 periodi di crossover, è stato valutato l'effetto di letermovir sull'intervallo QTc in 38 soggetti adulti sani, con dosi fino a 960 mg somministrate per via endovenosa. Alla dose di 960 mg per via endovenosa, letermovir non prolunga il QTc in alcuna misura clinicamente rilevante, con concentrazioni plasmatiche circa 2 volte superiori rispetto alla dose di 480 mg per via endovenosa.

#### Efficacia e sicurezza clinica

##### *Adulti sieropositivi per CMV riceventi [R+] trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche*

###### *P001: Profilassi fino alla settimana 14 (circa 100 giorni) post HSCT*

Al fine di valutare la profilassi con letermovir come strategia di prevenzione dell'infezione o della malattia da CMV, l'efficacia di letermovir è stata valutata in uno studio di fase 3 multicentrico, in doppio cieco, controllato con placebo (P001) in adulti sieropositivi per CMV riceventi [R+] HSCT allogenico. I soggetti sono stati randomizzati (2:1) a ricevere letermovir a una dose di 480 mg una volta al giorno, aggiustata a 240 mg quando co-somministrato con ciclosporina, oppure placebo. La randomizzazione è stata stratificata per centro di sperimentazione e per rischio (alto vs. basso) di riattivazione del CMV al momento dell'ingresso nello studio. La terapia con letermovir è stata iniziata dopo HSCT (giorno 0-28 post HSCT) e continuata fino alla settimana 14 post HSCT. Letermovir è stato somministrato per via orale o per via endovenosa; la dose di letermovir era la stessa indipendentemente dalla via di somministrazione. I soggetti sono stati monitorati fino alla settimana 24 post HSCT per l'endpoint primario di efficacia e il follow-up è proseguito fino alla settimana 48 post HSCT.

I soggetti sono stati monitorati settimanalmente per il DNA del CMV, fino alla settimana 14 post HSCT e poi ogni due settimane fino alla settimana 24 post HSCT, con l'inizio della terapia

pre-emptive standard per il CMV se la DNAemia da CMV era considerata clinicamente significativa. I soggetti hanno proseguito il follow-up fino alla settimana 48 post HSCT.

Dei 565 soggetti trattati, 373 hanno ricevuto letermovir (di cui 99 hanno ricevuto almeno una dose per via endovenosa) e 192 hanno ricevuto il placebo (di cui 48 hanno ricevuto almeno una dose per via endovenosa). Il tempo mediano dell'inizio del trattamento con letermovir corrispondeva a 9 giorni dopo il trapianto. Nel trentasette per cento (37%) dei soggetti il trapianto ha attecchito al basale. L'età mediana era pari a 54 anni (intervallo: 18-78 anni); 56 (15,0%) soggetti erano di età pari o superiore a 65 anni; il 58% dei soggetti era di sesso maschile; l'82% era di etnia bianca, il 10% di etnia asiatica, il 2% di etnia nera o africana e il 7% di etnia ispanica o latina. Al basale, il 50% dei soggetti ha ricevuto un regime mieloablattivo, il 52% assumeva ciclosporina e il 42% assumeva tacrolimus. Le motivazioni principali del trapianto più comuni erano la leucemia mieloide acuta (38%), la sindrome mieloblastica (15%) e il linfoma (13%). Il dodici per cento (12%) dei soggetti era positivo per DNA del CMV al basale.

Al basale, il 31% dei soggetti era ad alto rischio di riattivazione, come definito da uno o più dei seguenti criteri: antigene leucocitario umano (*Human Leucocyte Antigen*, HLA) da donatore consanguineo (fratello) con almeno un mismatch in uno dei seguenti tre loci del gene HLA: HLA-A, -B o -DR, donatore aploidentico; donatore non consanguineo con almeno un mismatch in uno dei seguenti quattro loci del gene HLA: HLA-A, -B, -C e -DRB1; impiego di sangue del cordone ombelicale come fonte di cellule staminali; impiego di innesti *ex vivo* con deplezione di cellule T; malattia del trapianto contro l'ospite (GVHD) di grado 2 o superiore che richiede la somministrazione di corticosteroidi sistemici.

#### *Endpoint primario di efficacia*

L'endpoint primario di efficacia di infezione da CMV clinicamente significativa nello studio P001 era definito da un'incidenza di DNAemia da CMV che richiedesse una terapia pre-emptive (PET) anti-CMV o il verificarsi di una malattia da CMV con localizzazione d'organo. È stato utilizzato l'approccio non completamento=insuccesso (NC=I), secondo il quale i soggetti che interrompevano lo studio prima della settimana 24 post HSCT o che non presentavano un esito alla settimana 24 post HSCT sono stati considerati come insuccessi terapeutici.

Nell'analisi dell'endpoint primario, letermovir ha dimostrato un'efficacia superiore rispetto al placebo, come mostrato nella Tabella 3. La differenza tra i trattamenti stimata del -23,5% era statisticamente significativa (valore p unilaterale < 0,0001).

**Tabella 3: P001: Risultati di efficacia nei riceventi HSCT (approccio NC=I, popolazione FAS)**

<b>Parametro</b>	<b>Letermovir (N=325) n (%)</b>	<b>Placebo (N=170) n (%)</b>
Endpoint primario di efficacia (Percentuale di soggetti in cui si è verificato insuccesso della profilassi entro la settimana 24)	122 (37,5)	103 (60,6)
Motivi dell'insuccesso <sup>†</sup>		
Infezione da CMV clinicamente significativa	57 (17,5)	71 (41,8)
DNAemia da CMV che richiedeva la PET	52 (16,0)	68 (40,0)
Malattia da CMV con localizzazione d'organo	5 (1,5)	3 (1,8)
Interruzione dello studio	56 (17,2)	27 (15,9)
Assenza di esito	9 (2,8)	5 (2,9)
Differenza tra i trattamenti rettificata per strato (letermovir-placebo) <sup>§</sup>		
Differenza (IC 95%)	-23,5 (-32,5; -14,6)	
valore p	< 0,0001	

<sup>†</sup> Le categorie di insuccesso sono reciprocamente esclusive e basate sulla gerarchia delle categorie nell'ordine elencato.


<sup>§</sup> Gli IC al 95% e il valore p per le differenze tra i trattamenti nella percentuale di risposta sono stati calcolati usando il metodo di Mantel-Haenszel rettificato per strati, con la differenza ponderata mediante la media armonica della dimensione del campione per braccio per ogni strato (alto o basso rischio). Per dichiarare la significatività statistica è stato utilizzato un valore p unilaterale  $\leq 0,0249$ .  
FAS=Full analysis set (serie completa di analisi); la popolazione FAS include soggetti randomizzati che hanno ricevuto almeno una dose del medicinale in studio ed esclude soggetti con DNA del CMV rilevabile al basale. Approccio per la gestione di valori mancanti: approccio non completamento=insuccesso (NC=I). Con l'approccio NC=I, l'insuccesso è stato determinato da tutti i soggetti con un'infezione da CMV clinicamente significativa o che hanno interrotto prematuramente lo studio, o che non hanno presentato un esito nel corso della finestra temporale per la visita della settimana 24 post HSCT.

N=numero di soggetti in ciascun gruppo di trattamento.  
n (%)=numero (percentuale) di soggetti in ciascuna sottocategoria.

Nota: la percentuale dei soggetti con DNA del CMV rilevabile al giorno 1 che ha sviluppato infezione da CMV clinicamente significativa alla settimana 24 post HSCT nel gruppo letermovir è stata del 64,6% (31/48) rispetto al 90,9% (20/22) nel gruppo placebo. La differenza stimata (IC 95% per la differenza) è stata -26,1% (-45,9%; -6,3%), con un valore p nominale unilaterale < 0,0048.

I fattori associati alla DNAemia da CMV dopo la settimana 14 post HSCT tra i soggetti trattati con letermovir includevano l'alto rischio di riattivazione del CMV al basale, GVHD, l'uso di corticosteroidi e lo stato sierologico del donatore negativo per CMV.


**Figura 1: P001: Diagramma di Kaplan-Meier del tempo all'inizio della PET anti-CMV o all'insorgenza di malattia da CMV con localizzazione d'organo fino alla settimana 24 post trapianto nei riceventi HSCT (popolazione FAS)**



Non vi sono state differenze in termini di incidenza o di tempo dell'atteccimento tra il gruppo di letermovir e quello placebo.

L'efficacia è risultata coerentemente a favore di letermovir in tutti i sottogruppi, compresi quelli a basso e ad alto rischio di riattivazione del CMV, in regime di condizionamento e in regime immunosoppressivo concomitante (vedere Figura 2).

**Figura 2: P001: diagramma di Forest della percentuale di soggetti che iniziavano la PET anti-CMV o con malattia da CMV con localizzazione d'organo fino alla settimana 24 post HSCT per sottogruppi selezionati (approccio NC=I, popolazione FAS)**



NC=I, non completamento=insuccesso. Con l'approccio non completamento=insuccesso (NC=I), i soggetti che interrompevano lo studio prima della settimana 24 post trapianto o che non presentavano un esito alla settimana 24 post trapianto sono stati considerati come insuccessi terapeutici.

#### P040: Profilassi dalla settimana 14 (circa 100 giorni) fino alla settimana 28 (circa 200 giorni) post HSCT

L'efficacia dell'estensione della profilassi con letermovir dalla settimana 14 (circa 100 giorni) fino alla settimana 28 (circa 200 giorni) post HSCT in pazienti a rischio di infezione e malattia da CMV tardive è stata valutata in uno studio di fase 3 (P040) multicentrico, in doppio cieco, controllato con placebo in adulti sieropositivi per CMV riceventi [R+] HSCT allogenico. I soggetti idonei che avevano completato la profilassi con letermovir fino a circa 100 giorni post HSCT sono stati randomizzati (2:1) a ricevere letermovir o placebo dalla settimana 14 fino alla settimana 28 post HSCT. I soggetti sono stati monitorati fino alla settimana 28 post HSCT per l'endpoint primario di efficacia con follow-up continuo dopo la sospensione del trattamento fino alla settimana 48 post HSCT.

Dei 218 soggetti trattati, 144 soggetti hanno ricevuto letermovir e 74 hanno ricevuto il placebo. L'età mediana era pari a 55 anni (intervallo: da 20 a 74 anni); il 62% dei soggetti era di sesso maschile; il 79% era di etnia bianca; l'11% di etnia asiatica; il 2% di etnia nera e il 10% era di etnia ispanica o latina. Le motivazioni del trapianto più comuni erano la leucemia mieloide acuta (42%), la leucemia linfocitica acuta (15%) e la sindrome mielodisplastica (11%).

All'ingresso nello studio, tutti i soggetti presentavano fattori di rischio per infezione e malattia da CMV tardive, con il 64% che presentava due o più fattori di rischio. I fattori di rischio comprendevano: HLA da donatore consanguineo (fratello) con almeno un mismatch in uno dei seguenti tre loci del gene HLA: HLA-A, -B o -DR; donatore aploidentico; donatore non consanguineo

con almeno un mismatch in uno dei seguenti quattro loci del gene HLA: HLA-A, -B, -C e -DRB1; impiego di sangue del cordone ombelicale come fonte di cellule staminali; impiego di innesti *ex vivo* con deplezione di cellule T; trattamento con globulina anti-timociti; trattamento con alemtuzumab; impiego di prednisone sistematico (o equivalente) alla dose di  $\geq 1$  mg/kg di peso corporeo al giorno.

#### *Endpoint primario di efficacia*

L'endpoint primario di efficacia dello studio P040 era l'incidenza dell'infezione da CMV clinicamente significativa fino alla settimana 28 post HSCT. L'infezione da CMV clinicamente significativa è stata definita come l'insorgenza di malattia da CMV con localizzazione d'organo o l'inizio della PET anti-CMV sulla base della viremia da CMV documentata e della condizione clinica del soggetto. È stato utilizzato l'approccio *Observed Failure* (OF), secondo il quale i soggetti che avevano sviluppato un'infezione da CMV clinicamente significativa o avevano interrotto prematuramente lo studio con viremia sono stati considerati come insuccessi terapeutici.

Nell'analisi dell'endpoint primario, letermovir ha dimostrato un'efficacia superiore rispetto al placebo, come mostrato nella Tabella 4. La differenza tra i trattamenti stimata del -16,1% era statisticamente significativa (valore p unilaterale=0,0005). L'efficacia è stata costantemente a favore di letermovir nei sottogruppi in base alle caratteristiche dei soggetti (età, sesso, etnia) e ai fattori di rischio per infezione e malattia da CMV tardive.

**Tabella 4: P040: Risultati di efficacia nei riceventi HSCT a rischio di infezione e malattia da CMV tardive (approccio OF, popolazione FAS)**

Parametro	Letermovir (circa 200 giorni di letermovir) (N=144) n (%)	Placebo (circa 100 giorni di letermovir) (N=74) n (%)
<b>Insuccessi*</b>	<b>4 (2,8)</b>	<b>14 (18,9)</b>
Infezione da CMV clinicamente significativa fino alla settimana 28 <sup>†</sup>	2 (1,4)	13 (17,6)
Inizio della PET sulla base della viremia da CMV documentata	1 (0,7)	11 (14,9)
Malattia da CMV con localizzazione d'organo	1 (0,7)	2 (2,7)
Interruzione dello studio con viremia da CMV prima della settimana 28	2 (1,4)	1 (1,4)
<b>Differenza tra i trattamenti rettificata per strato (letermovir (circa 200 giorni di letermovir)-Placebo (circa 100 giorni di letermovir))<sup>‡</sup></b>		
Differenza (IC 95%)	-16,1 (-25,8; -6,5)	
valore p	0,0005	

\* Le categorie di insuccesso sono reciprocamente esclusive e basate sulla gerarchia delle categorie nell'ordine elencato.

† L'infezione da CMV clinicamente significativa è stata definita come malattia da CMV con localizzazione d'organo (accertata o probabile) o l'inizio della PET sulla base della viremia da CMV documentata e della condizione clinica del soggetto.

‡ Gli IC al 95% e il valore p per le differenze tra i trattamenti nella percentuale di risposta sono stati calcolati usando il metodo di Mantel-Haenszel rettificato per strati, con la differenza ponderata mediante la media armonica della dimensione del campione per braccio per ogni strato (donatore aploidentico sì o no). Per dichiarare la significatività statistica è stato utilizzato un valore p unilaterale  $\leq 0,0249$ .

Approccio per la gestione di valori mancanti: approccio *Observed Failure* (OF). Con l'approccio OF, l'insuccesso è stato determinato da tutti i soggetti che hanno sviluppato un'infezione da CMV clinicamente significativa o che hanno interrotto prematuramente lo studio con viremia da CMV dalla settimana 14 (circa 100 giorni) fino alla settimana 28 (circa 200 giorni) post HSCT.

N=numero di soggetti in ciascun gruppo di trattamento.

n (%)=numero (percentuale) di soggetti in ciascuna sottocategoria.

*P002: Adulto sieronegativo per CMV sottoposto a un trapianto di rene da un donatore sieropositivo per CMV [D+/R-]*

Per valutare la profilassi con letermovir come strategia preventiva per la malattia da CMV nei pazienti sottoposti a trapianto di rene, l'efficacia di letermovir è stata valutata in uno studio di non inferiorità di fase 3 (P002) multicentrico, in doppio cieco, controllato con comparatore attivo in adulti ad alto rischio [D+/R-] sottoposti a trapianto di rene. I soggetti sono stati randomizzati (1:1) a ricevere letermovir o valganciclovir. Letermovir è stato somministrato in concomitanza con aciclovir.

Valganciclovir è stato somministrato in concomitanza con placebo ad aciclovir. La randomizzazione è stata stratificata in base all'uso o non uso di un'immunoterapia antilinfocitaria altamente citolitica durante l'induzione. Il trattamento con letermovir o valganciclovir è iniziato tra il giorno 0 e il giorno 7 post trapianto di rene ed è stato proseguito fino alla settimana 28 (circa 200 giorni) post trapianto. I soggetti sono stati monitorati fino alla settimana 52 post trapianto.

Dei 589 soggetti trattati, 292 soggetti hanno ricevuto letermovir e 297 hanno ricevuto valganciclovir. L'età media era pari a 51 anni (intervallo: da 18 a 82 anni); il 72% dei soggetti era di sesso maschile; l'84% era di etnia bianca; il 2% di etnia asiatica; il 9% di etnia nera; il 17% era di etnia ispanica o latina e il 60% aveva ricevuto un rene da un donatore deceduto. Le motivazioni principali del trapianto più comuni erano la malattia cistica del rene congenita (17%), l'ipertensione (16%) e il/la diabete/nefropatia diabetica (14%).

*Endpoint primario di efficacia*

L'endpoint primario di efficacia dello studio P002 era l'incidenza della malattia da CMV (malattia da CMV con localizzazione d'organo o sindrome da CMV, confermata da un comitato di valutazione indipendente) fino alla settimana 52 post trapianto. È stato utilizzato l'approccio OF, secondo il quale i soggetti che avevano interrotto prematuramente lo studio per qualsiasi motivo o per i quali non vi erano dati al *timepoint* non sono stati considerati come insuccessi terapeutici.

Nell'analisi dell'endpoint primario, letermovir ha dimostrato una non inferiorità rispetto a valganciclovir, come mostrato nella Tabella 5.

**Tabella 5: P002: Risultati di efficacia nei riceventi trapianto di rene (approccio OF, popolazione FAS)**

Parametro	Letermovir (N=289) n (%)	Valganciclovir (N=297) n (%)
<b>Malattia da CMV* fino alla settimana 52</b>	<b>30 (10,4)</b>	<b>35 (11,8)</b>
<b>Differenza tra i trattamenti rettificata per strato (letermovir-valganciclovir)<sup>†</sup></b>		
Differenza (IC 95%)		-1,4 (-6,5; 3,8) <sup>‡</sup>

\* I casi di malattia da CMV sono stati confermati da un comitato di valutazione indipendente.

<sup>†</sup> Gli IC al 95% per le differenze tra i trattamenti nella percentuale di risposta sono stati calcolati usando il metodo di Mantel-Haenszel rettificato per strati, con la differenza ponderata mediante la media armonica della dimensione del campione per braccio per ogni strato (uso/non uso di un'immunoterapia antilinfocitaria altamente citolitica durante l'induzione).

<sup>‡</sup> Sulla base di un margine di non inferiorità del 10%, letermovir è non inferiore a valganciclovir.

Approccio per la gestione di valori mancanti: approccio *Observed Failure* (OF). Con l'approccio OF, i partecipanti che avevano interrotto prematuramente lo studio per qualsiasi motivo non sono stati considerati come insuccessi terapeutici.

Nota: Ai soggetti randomizzati nel gruppo letermovir è stato somministrato aciclovir per la profilassi del virus herpes simplex (*herpes simplex virus*, HSV) e del virus varicella zoster (*varicella zoster virus*, VZV). Ai soggetti randomizzati nel gruppo valganciclovir è stato somministrato placebo ad

aciclovir.

N=numero di soggetti in ciascun gruppo di trattamento.

n (%)=numero (percentuale) di soggetti in ciascuna sottocategoria.

L'efficacia è risultata comparabile in tutti i sottogruppi, compresi sesso, età, etnia, regione e uso/non uso di un'immunoterapia antilinfocitaria altamente citolitica durante l'induzione.

### Popolazione pediatrica

#### *P030: Pazienti pediatrici riceventi trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche*

Al fine di valutare la profilassi con letermovir come strategia di prevenzione dell'infezione o della malattia da CMV nei pazienti pediatrici sottoposti a trapianto, l'efficacia di letermovir è stata valutata in uno studio di fase 2b (P030) multicentrico, in aperto, a braccio singolo in pazienti pediatrici riceventi HSCT allogenico. La terapia con il medicinale in studio è iniziata dopo HSCT (giorno 0-28 post HSCT) e continuato fino alla settimana 14 post HSCT. Il medicinale in studio è stato somministrato per via orale o per via endovenosa; la dose di letermovir è stata basata su età, peso corporeo e formulazione.

Dei 63 soggetti trattati, 8 avevano un'età compresa tra 0 e inferiore a 2 anni, 27 avevano un'età compresa tra 2 e inferiore a 12 anni e 28 avevano un'età compresa tra 12 e inferiore a 18 anni. Al basale, l'87% dei soggetti ha ricevuto un regime mieloablattivo, il 67% assumeva ciclosporina e il 27% assumeva tacrolimus. Le motivazioni principali del trapianto più comuni erano la leucemia mieloide acuta (18%) e l'anemia aplastica (10%) nella popolazione globale e immunodeficienza combinata (37,5%) e linfostiocitosi emofagocitica familiare (25,0%) nei bambini di età inferiore a 2 anni.

#### *Endpoint secondario di efficacia*

L'endpoint di efficacia dello studio P030 è stato secondario e includeva l'incidenza di infezione da CMV clinicamente significativa fino alla settimana 14 post HSCT e fino alla settimana 24 post HSCT. L'infezione da CMV clinicamente significativa era definita come l'insorgenza della malattia da CMV con localizzazione d'organo o l'inizio della PET anti-CMV sulla base della viremia da CMV documentata e della condizione clinica del soggetto. L'incidenza di infezione da CMV clinicamente significativa è stata di 7,1% e di 10,7% rispettivamente fino alla settimana 14 post HSCT e alla settimana 24 post HSCT.

## **5.2 Proprietà farmacocinetiche**

Nei soggetti adulti sani, la farmacocinetica di letermovir è stata caratterizzata in seguito alla somministrazione per via orale e per via endovenosa. L'esposizione a letermovir è aumentata in misura superiore a quella proporzionale alla dose con entrambe le somministrazioni per via orale o per via endovenosa. È probabile che il meccanismo sia la saturazione/autoinibizione di OATP1B1/3. La farmacocinetica di letermovir è stata anche caratterizzata in seguito alla somministrazione per via orale e per via endovenosa negli adulti riceventi HSCT (vedere Tabella 6) e nei pazienti pediatrici riceventi HSCT (vedere Tabella 8 e Tabella 9) e in seguito alla somministrazione per via orale negli adulti riceventi trapianto di rene (vedere Tabella 7).

#### *Soggetti adulti sani*

La media geometrica dei valori AUC e C<sub>max</sub> allo stato stazionario era pari a 71 500 ng•hr/mL e 13 000 ng/mL, rispettivamente, con letermovir 480 mg assunto per via orale una volta al giorno.

Le termovir ha raggiunto lo stato stazionario in 9-10 giorni, con un tasso di accumulo di 1,2 per l'AUC e di 1 per la C<sub>max</sub>.

#### *Adulti riceventi HSCT*

L'AUC di letermovir è stata stimata utilizzando l'analisi farmacocinetica di popolazione usando i dati dello studio di fase 3 P001 (vedere Tabella 6). Le differenze nell'esposizione tra i regimi di

trattamento non sono clinicamente rilevanti; l'efficacia è risultata coerente in tutto l'intervallo di esposizioni osservate nello studio P001.

**Tabella 6: Valori dell'AUC di letermovir (ng•hr/mL) negli adulti riceventi HSCT**

Regime di trattamento	Mediana (intervallo di previsione 90%)*
480 mg per via orale, senza ciclosporina	34 400 (16 900; 73 700)
480 mg per via endovenosa, senza ciclosporina	100 000 (65 300; 148 000)
240 mg per via orale, con ciclosporina	60 800 (28 700; 122 000)
240 mg per via endovenosa, con ciclosporina	70 300 (46 200; 106 000)

\* Previsioni a posteriori per la popolazione ottenute dall'analisi farmacocinetica (Pharmacokinetics, PK) di popolazione usando i dati della fase 3

#### *Adulti riceventi trapianto di rene*

L'AUC di letermovir è stata stimata utilizzando l'analisi farmacocinetica di popolazione usando i dati dello studio di fase 3 P002 (vedere Tabella 7). L'efficacia è risultata coerente in tutto l'intervallo di esposizioni osservate nello studio P002.

**Tabella 7: Valori dell'AUC di letermovir (ng•hr/mL) negli adulti riceventi trapianto di rene**

Regime di trattamento	Mediana (intervallo di previsione 90%)*
480 mg per via orale, senza ciclosporina	62 200 (28 900; 145 000)
240 mg per via orale, con ciclosporina	57 700 (26 900; 135 000)

\* Le mediane e gli intervalli di previsione al 90% si basano su simulazioni che utilizzano il modello di PK di popolazione della fase 3 con variabilità interindividuale.  
Nota: la PK di letermovir non è stata studiata dopo la somministrazione per via endovenosa nei riceventi trapianto di rene; tuttavia, l'AUC prevista dopo la somministrazione per via endovenosa è simile al modello dell'AUC prevista dopo la somministrazione per via endovenosa nei riceventi HSCT (vedere Tabella 6).

#### Assorbimento

Nei soggetti adulti sani, letermovir è stato assorbito rapidamente con un tempo mediano alla concentrazione plasmatica massima ( $T_{max}$ ) da 1,5 a 3,0 ore e diminuiva con un andamento bifasico. Negli adulti riceventi HSCT, si stima che la biodisponibilità di letermovir sia circa del 35%, con letermovir alla dose di 480 mg per via orale una volta al giorno, somministrato senza ciclosporina. Si stima che la variabilità interindividuale della biodisponibilità sia circa del 37%. Negli adulti riceventi trapianto di rene, si stima che la biodisponibilità di letermovir sia circa del 60%, con letermovir alla dose di 480 mg per via orale una volta al giorno, somministrato senza ciclosporina.

#### *Effetto della ciclosporina*

Negli adulti riceventi HSCT, la co-somministrazione di ciclosporina ha determinato un aumento delle concentrazioni plasmatiche di letermovir a causa dell'inibizione del OATP1B. Nei pazienti si stima che la biodisponibilità di letermovir sia circa dell'85%, con letermovir alla dose di 240 mg per via orale una volta al giorno, co-somministrato con ciclosporina.

Se letermovir viene co-somministrato con ciclosporina, la dose raccomandata di letermovir è di 240 mg una volta al giorno in pazienti adulti e pediatrici di peso corporeo di almeno 30 kg (vedere paragrafo 4.2). Se letermovir per via orale viene co-somministrato con ciclosporina in pazienti pediatrici di peso corporeo inferiore a 30 kg, la dose deve essere ridotta (vedere paragrafo 4.2).

#### *Effetto del cibo*

In soggetti adulti sani, la somministrazione per via orale di una dose singola di una compressa di letermovir da 480 mg durante un pasto standard ad alto contenuto lipidico e calorico non ha avuto alcun effetto sull'esposizione complessiva (AUC) e ha determinato un aumento dei livelli di picco

( $C_{max}$ ) di letermovir di circa il 30%. Letermovir compresse può essere somministrato per via orale con o senza cibo, secondo quanto effettuato negli studi clinici (vedere paragrafo 4.2).

In soggetti adulti sani, la somministrazione per via orale di una dose singola di letermovir granulato da 240 mg con cibi morbidi (budino o purea di mela) ha determinato un aumento di circa il 13% e il 20% dell'esposizione complessiva (AUC) e ha determinato un aumento dei livelli di picco ( $C_{max}$ ) di letermovir di circa il 25% e il 33%. Letermovir granulato può essere somministrato con cibi morbidi, così come è avvenuto nello studio pediatrico (vedere paragrafo 4.2).

### Distribuzione

Sulla base dell'analisi farmacocinetica di popolazione, in seguito alla somministrazione endovenosa negli adulti riceventi HSCT, si stima che il volume di distribuzione medio allo stato stazionario sia 45,5 L.

*In vitro* letermovir è ampiamente legato (98,2%) alle proteine plasmatiche umane, indipendentemente dall'intervallo di concentrazione (da 3 a 100 mg/L) valutato. Una certa saturazione è stata osservata a concentrazioni inferiori. La ripartizione sangue-plasma di letermovir corrisponde a 0,56 ed è indipendente dall'intervallo delle concentrazioni (da 0,1 a 10 mg/L) valutato *in vitro*.

Negli studi preclinici sulla distribuzione, letermovir viene distribuito a organi e tessuti, con le concentrazioni più alte osservate nell'apparato gastrointestinale, nei dotti biliari e nel fegato e con concentrazioni basse nell'encefalo.

### Biotrasformazione

Nel plasma, la maggior parte dei componenti correlati a letermovir è costituita da precursori immodificati (96,6%). Non sono stati rilevati metaboliti rilevanti nel plasma. Letermovir viene parzialmente eliminato tramite glucuronidazione mediata da UGT1A1/1A3.

### Eliminazione

Nei soggetti adulti sani, con la dose di 480 mg per via endovenosa l'emivita terminale media apparente di letermovir è di circa 12 ore. Le principali vie di eliminazione di letermovir sono l'escrezione biliare e la glucuronidazione diretta. Il processo coinvolge i trasportatori del trasporto attivo epatico OATP1B1 e 3, seguito dalla glucuronidazione catalizzata da UGT1A1/3.

Sulla base dell'analisi farmacocinetica di popolazione, si stima che la CL apparente di letermovir allo stato stazionario in seguito alla somministrazione endovenosa di 480 mg negli adulti riceventi HSCT sia di 4,84 L/h. Si stima che la variabilità interindividuale della CL sia del 24,6%.

### Escrezione

Dopo somministrazione per via orale di letermovir radiomarcato, il 93,3% della radioattività è stata riscontrata nelle feci. La maggior parte di letermovir è stata escreta a livello biliare come precursore immodificato, con una quantità minore (6% della dose) sotto forma del metabolita acilglucuronide nelle feci. L'acilglucuronide è instabile nelle feci. L'escrezione urinaria di letermovir è stata trascurabile (< 2% della dose).

### Farmacocinetica in popolazioni speciali

#### *Compromissione epatica*

Nei soggetti adulti con compromissione epatica di grado moderato (Child-Pugh classe B [CP-B], punteggio 7-9) e severo (Child-Pugh classe C [CP-C], punteggio 10-15), l'AUC di letermovir libero è risultata rispettivamente di circa l'81% e 4 volte maggiore rispetto ai soggetti adulti sani. Le variazioni nell'esposizione a letermovir nei soggetti adulti con compromissione epatica moderata non sono clinicamente rilevanti.

Sono previsti aumenti marcati nell'esposizione a letermovir libero nei pazienti con compromissione epatica moderata associata a compromissione renale moderata o severa (vedere paragrafo 4.2).

#### *Compromissione renale*

##### *Studio clinico in una popolazione con compromissione renale*

Nei soggetti adulti con compromissione renale di grado moderato (eGFR pari a 31,0-56,8 mL/min/1,73m<sup>2</sup>) e severo (eGFR pari a 11,9-28,1 mL/min/1,73m<sup>2</sup>), l'AUC di letermovir libero è risultata rispettivamente di circa il 115 e l'81% maggiore rispetto ai soggetti adulti sani. Le variazioni nell'esposizione a letermovir dovute alla compromissione renale da moderata a severa non sono clinicamente rilevanti. I soggetti con ESRD non sono stati studiati.

#### *Post trapianto di rene (P002)*

Sulla base dell'analisi farmacocinetica di popolazione, l'AUC di letermovir è risultata rispettivamente di circa il 12%, 27% e 35% più alta nei soggetti adulti con compromissione renale lieve (CrCl maggiore o uguale da 60 a meno di 90 mL/min), moderata (CrCl maggiore o uguale da 30 a meno di 60 mL/min) e severa (CrCl maggiore o uguale da 15 a meno di 30 mL/min), rispetto ai soggetti adulti con CrCl maggiore o uguale a 90 mL/min. Questi cambiamenti non sono considerati clinicamente rilevanti.

#### *Peso*

Sulla base dell'analisi farmacocinetica di popolazione nei soggetti adulti sani, si stima che l'AUC di letermovir sia inferiore del 18,7% nei soggetti con peso corporeo pari a 80-100 kg rispetto a quelli con peso pari a 67 kg. Sulla base dell'analisi farmacocinetica di popolazione negli adulti riceventi trapianto di rene (P002), si stima che l'AUC di letermovir sia inferiore del 26% nei soggetti con peso corporeo superiore a 80 kg rispetto a quelli con peso inferiore o pari a 80 kg. Queste differenze non sono clinicamente rilevanti.

#### *Etnia*

Sulla base dell'analisi farmacocinetica di popolazione nei soggetti adulti sani, si stima che l'AUC di letermovir sia più elevata nella misura del 33,2% nei soggetti di etnia asiatica rispetto a quelli di etnia bianca. Questa variazione non è clinicamente rilevante.

#### *Sesso*

Sulla base dell'analisi farmacocinetica di popolazione, non vi è alcuna differenza nella farmacocinetica di letermovir nelle donne adulte rispetto agli uomini.

#### *Anziani*

Sulla base dell'analisi farmacocinetica di popolazione, l'età non ha alcun effetto sulla farmacocinetica di letermovir. Non è necessario alcun adattamento della dose in base all'età.

#### *Popolazione pediatrica*

L'AUC di letermovir nei pazienti pediatrici riceventi HSCT è stata stimata mediante l'analisi farmacocinetica di popolazione usando i dati di farmacocinetica osservati nello studio P030 (vedere Tabella 8 e Tabella 9). Le esposizioni per i pazienti pediatrici riceventi HSCT in tutte le fasce di peso corporeo rientrano nell'intervallo di esposizioni raggiunte nelle esposizioni di riferimento per gli adulti riceventi HSCT (vedere Tabella 6).

**Tabella 8: Valori dell’AUC di letermovir (ng•hr/mL) dopo somministrazione per via orale nei pazienti pediatrici riceventi HSCT**

Peso corporeo	Dose orale, senza ciclosporina	Mediana (intervallo di previsione 90%) <sup>*</sup>	Dose orale, con ciclosporina	Mediana (intervallo di previsione 90%) <sup>*</sup>
pari e superiore a 30 kg	480 mg	39 100 (18 700-81 300)	240 mg	49 100 (23 200-104 000)
da 15 kg a meno di 30 kg	240 mg	38 900 (20 200-74 300)	120 mg	51 000 (26 600-98 200)
da 7,5 kg a meno di 15 kg	120 mg	32 000 (16 700-59 300)	60 mg	41 600 (22 300-81 100)
da 5 kg a meno di 7,5 kg	80 mg	30 600 (16 200-55 000)	40 mg	39 000 (20 600-72 000)

\* Le mediane e gli intervalli di previsione al 90% si basano su simulazioni che utilizzano il modello di PK di popolazione pediatrica HSCT con variabilità interindividuale.

**Tabella 9: Valori dell’AUC di letermovir (ng•hr/mL) dopo somministrazione per via endovenosa nei pazienti pediatrici riceventi HSCT**

Peso corporeo	Dose orale, senza ciclosporina	Mediana (intervallo di previsione 90%) <sup>*</sup>	Dose orale, con ciclosporina	Mediana (intervallo di previsione 90%) <sup>*</sup>
pari e superiore a 30 kg	480 mg	111 000 (55 700-218 000)	240 mg	59 800 (28 400-120 000)
da 15 kg a meno di 30 kg	120 mg	57 200 (29 700-113 000)	120 mg	61 100 (29 900-121 000)
da 7,5 kg a meno di 15 kg	60 mg	46 000 (24 300-83 900)	60 mg	49 200 (25 800-93 800)
da 5 kg a meno di 7,5 kg	40 mg	43 400 (24 300-81 000)	40 mg	45 900 (24 900-82 200)

\* Le mediane e gli intervalli di previsione al 90% si basano su simulazioni che utilizzano il modello di PK di popolazione pediatrica HSCT con variabilità interindividuale.

### 5.3 Dati preclinici di sicurezza

#### Tossicità generale

È stata osservata tossicità testicolare irreversibile soltanto nei ratti per esposizioni sistemiche (AUC)  $\geq 3$  volte l’esposizione umana alla dose raccomandata per l’uomo (Recommended Human Dose, RHD). Tale tossicità è stata caratterizzata da degenerazione dei tubuli seminali e oligospermia e presenza di detriti cellulari negli epididimi, con riduzione del peso testicolare ed epididimario. Non è emersa tossicità testicolare nei ratti a esposizioni (AUC) simili a quelle dell’uomo alla RHD. Nei topi e nelle scimmie non è stata osservata tossicità testicolare alle dosi più alte studiate, con esposizioni rispettivamente fino a 4 e 2 volte quelle dell’uomo alla RHD. La rilevanza per l’uomo non è nota.

#### Cancerogenesi

Uno studio di cancerogenesi per via orale della durata di 6 mesi condotto su topi transgenici RasH2 (Tg.RasH2) non ha mostrato evidenza di tumorigenesi rilevante per l’uomo fino alle dosi più elevate testate, 150 mg/kg/die e 300 mg/kg/die rispettivamente nei maschi e nelle femmine.

## Mutagenesi

Letermovir non si è dimostrato genotossico in una batteria di test *in vitro* o *in vivo*, tra cui analisi di mutagenesi microbica e aberrazioni cromosomiche nelle cellule ovariche di criceto cinese, e in uno studio del micronucleo murino *in vivo*.

## Riproduzione

### *Fertilità*

Negli studi sulla fertilità e sullo sviluppo embrionale iniziale nel ratto, non vi è stato alcun effetto di letermovir sulla fertilità femminile. Nei maschi di ratto, sono state osservate riduzioni della concentrazione di spermatozoi, della loro motilità e della fertilità per esposizioni sistemiche  $\geq 3$  volte l'AUC nell'uomo alla RHD (vedere Tossicità generale).

Nelle scimmie a cui veniva somministrato letermovir, in base alla valutazione istopatologica, la misurazione della dimensione testicolare, l'analisi ematica ormonale (ormone follicolo-stimolante, inibina B e testosterone) e la valutazione degli spermatozoi (conta spermatica, motilità e morfologia), non è stata rilevata alcuna evidenza di tossicità testicolare per esposizioni sistemiche pari a circa 2 volte l'AUC nell'uomo alla RHD.

## Sviluppo

Nei ratti, è stata osservata una tossicità materna (compresa la diminuzione nel peso corporeo) alla dose di 250 mg/kg/die (circa 11 volte la AUC alla RHD); nella prole sono stati osservati una riduzione del peso fetale con ossificazione ritardata, leggero edema fetale e un aumento dell'incidenza di brevità del cordone ombelicale e di variazioni e malformazioni a livello vertebrale, costale e pelvico. Alla dose di 50 mg/kg/die (circa 2,5 volte l'AUC alla RHD) non è stato osservato alcun effetto sulla madre o sullo sviluppo fetale.

Nei conigli è stata osservata una tossicità materna (tra cui mortalità e aborti) alla dose di 225 mg/kg/die (circa 2 volte la AUC alla RHD); nella prole è stato osservato un aumento dell'incidenza di malformazioni e variazioni a livello vertebrale e costale.

Nello studio sullo sviluppo pre e postnatale, letermovir è stato somministrato per via orale a femmine di ratto gravide. Non è stata osservata alcuna tossicità sullo sviluppo fino alla massima esposizione studiata (2 volte l'AUC alla RHD).

## **6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE**

### **6.1 Elenco degli eccipienti**

#### Nucleo della compressa

Cellulosa microcristallina (E460)  
Croscarmellosa sodica (E468)  
Povidone (E1201)  
Silice colloidale anidra (E551)  
Magnesio stearato (E470b)

#### Film di rivestimento

Lattosio monoidrato  
Ipromellosa (E464)  
Titanio diossido (E171)  
Triacetina  
Ossido di ferro giallo (E172)

Ossido di ferro rosso (E172) (solo nelle compresse da 480 mg)  
Cera carnauba (E903)

## **6.2 Incompatibilità**

Non pertinente.

## **6.3 Periodo di validità**

3 anni

## **6.4 Precauzioni particolari per la conservazione**

Questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione.  
Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità.

## **6.5 Natura e contenuto del contenitore**

Confezioni da 28x1 compresse in blister divisibili per dose unitaria in poliammide/alluminio/PVC – Alluminio.

## **6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento**

Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.

## **7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Merck Sharp & Dohme B.V.  
Waarderweg 39  
2031 BN Haarlem  
Paesi Bassi

## **8. NUMERO(I) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

EU/1/17/1245/001  
EU/1/17/1245/002

## **9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE**

Data della prima autorizzazione: 8 gennaio 2018  
Data del rinnovo più recente: 24 agosto 2022

## **10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO**

Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web dell'Agenzia europea per i medicinali, <https://www.ema.europa.eu>.

## **1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE**

PREVYMIS 240 mg concentrato per soluzione per infusione  
PREVYMIS 480 mg concentrato per soluzione per infusione

## **2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA**

### PREVYMIS 240 mg concentrato per soluzione per infusione

Ciascun flaconcino contiene 240 mg (12 mL per flaconcino) di letermovir.  
Ciascun mL contiene 20 mg di letermovir.

### PREVYMIS 480 mg concentrato per soluzione per infusione

Ciascun flaconcino contiene 480 mg (24 mL per flaconcino) di letermovir.  
Ciascun mL contiene 20 mg di letermovir.

### Eccipiente(i) con effetti noti

Questo medicinale contiene 23 mg (1 mmol) di sodio per flaconcino da 240 mg.  
Questo medicinale contiene 46 mg (2 mmol) di sodio per flaconcino da 480 mg.

Questo medicinale contiene 1 800 mg di idrossipropilbetadex (ciclodestrina) per flaconcino da 240 mg.

Questo medicinale contiene 3 600 mg di idrossipropilbetadex (ciclodestrina) per flaconcino da 480 mg.

Per informazioni aggiuntive, vedere paragrafo 4.2.

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

## **3. FORMA FARMACEUTICA**

Concentrato per soluzione per infusione (concentrato sterile)

Liquido limpido, incolore

pH compreso tra 7 e 8

## **4. INFORMAZIONI CLINICHE**

### **4.1 Indicazioni terapeutiche**

PREVYMIS è indicato per la profilassi della riattivazione e della malattia da citomegalovirus (CMV) in pazienti adulti e pediatrici di peso corporeo di almeno 5 kg che sono sieropositivi per CMV riceventi [R+] trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche (*haematopoietic stem cell transplant, HSCT*).

PREVYMIS è indicato per la profilassi della malattia da CMV in pazienti adulti e pediatrici di peso corporeo di almeno 40 kg sieronegativi per CMV che hanno ricevuto un trapianto di rene da un donatore sieropositivo per CMV [D+/R-].

Devono essere prese in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antivirali.

## **4.2 Posologia e modo di somministrazione**

Il trattamento con letermovir deve essere iniziato da un medico esperto nella gestione di pazienti sottoposti a trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche o trapianto di rene.

### Posologia

Letermovir è inoltre disponibile per la somministrazione orale (compresse rivestite con film da 240 mg e 480 mg e granulato in bustina da 20 mg e 120 mg).

Le compresse, il granulato in bustina e il concentrato per soluzione per infusione di letermovir possono essere utilizzati indistintamente a discrezione del medico. Può essere necessario un adattamento della dose per i pazienti pediatrici di peso corporeo inferiore a 30 kg quando si passa dalla formulazione orale a quella endovenosa. Fare riferimento alle informazioni sulla prescrizione di letermovir compresse rivestite con film o di letermovir granulato in bustina per infusione per le informazioni sul dosaggio.

#### *Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche (HSCT)*

La terapia con letermovir deve essere iniziata dopo HSCT. La terapia con letermovir può essere iniziata il giorno stesso del trapianto e non oltre 28 giorni dopo HSCT. La terapia con letermovir può essere iniziata prima o dopo l'atteggiamento del trapianto. La profilassi con letermovir deve continuare per 100 giorni dopo HSCT.

La profilassi con letermovir prolungata oltre 100 giorni dopo HSCT può apportare un beneficio ad alcuni pazienti ad alto rischio di riattivazione tardiva del CMV (vedere paragrafo 5.1). La sicurezza e l'efficacia di letermovir quando utilizzato per più di 200 giorni non sono state studiate in studi clinici.

#### *Pazienti adulti e pediatrici di peso corporeo di almeno 30 kg riceventi HSCT*

La dose raccomandata di letermovir è di 480 mg una volta al giorno.

#### *Adattamento della dose in pazienti adulti e pediatrici di peso corporeo di almeno 30 kg riceventi HSCT*

In caso di co-somministrazione di letermovir con ciclosporina, la dose di letermovir deve essere ridotta a 240 mg una volta al giorno (vedere paragrafi 4.5 e 5.2).

- Se la ciclosporina viene iniziata dopo l'inizio della terapia con letermovir, la dose successiva di letermovir deve essere ridotta a 240 mg una volta al giorno.
- Se la ciclosporina viene interrotta dopo l'inizio della terapia con letermovir, la dose successiva di letermovir deve essere aumentata a 480 mg una volta al giorno.
- Se la somministrazione di ciclosporina viene temporaneamente sospesa a causa di livelli elevati di ciclosporina, non è necessario alcun adattamento della dose di letermovir.

#### *Pazienti pediatrici di peso corporeo inferiore a 30 kg riceventi HSCT*

Nella Tabella 1 sono riportate le dosi raccomandate di letermovir per i pazienti pediatrici di peso corporeo inferiore a 30 kg (vedere anche paragrafo 5.2). Letermovir deve essere somministrato una volta al giorno.

#### *Adattamento della dose in pazienti pediatrici di peso corporeo inferiore a 30 kg riceventi HSCT*

In caso di co-somministrazione di letermovir per via endovenosa con ciclosporina, la dose di letermovir non richiede alcun adattamento come riportato nella Tabella 1 (vedere anche paragrafi 4.5 e 5.2).

**Tabella 1: Dose raccomandata di letermovir concentrato per soluzione per infusione senza o con ciclosporina in pazienti pediatrici di peso corporeo inferiore a 30 kg**

Peso corporeo	Dose giornaliera per via endovenosa senza o con ciclosporina
da 15 kg a meno di 30 kg	120 mg
da 7,5 kg a meno di 15 kg	60 mg
da 5 kg a meno di 7,5 kg	40 mg

#### *Trapianto di rene*

La terapia con letermovir deve essere iniziata il giorno stesso del trapianto e non oltre 7 giorni post trapianto di rene e deve essere continuata per 200 giorni post trapianto.

#### *Pazienti adulti e pediatrici di peso corporeo di almeno 40 kg riceventi trapianto di rene*

La dose raccomandata di letermovir è di 480 mg una volta al giorno.

#### *Adattamento della dose in pazienti adulti e pediatrici di peso corporeo di almeno 40 kg riceventi trapianto di rene*

In caso di co-somministrazione di letermovir con ciclosporina, la dose di letermovir deve essere ridotta a 240 mg una volta al giorno (vedere anche paragrafi 4.5 e 5.2).

- Se la ciclosporina viene iniziata dopo l'inizio della terapia con letermovir, la dose successiva di letermovir deve essere ridotta a 240 mg una volta al giorno.
- Se la ciclosporina viene interrotta dopo l'inizio della terapia con letermovir, la dose successiva di letermovir deve essere aumentata a 480 mg una volta al giorno.
- Se la somministrazione di ciclosporina viene temporaneamente sospesa a causa di livelli elevati di ciclosporina, non è necessario alcun adattamento della dose di letermovir.

#### *Dose saltata*

Se una dose viene dimenticata, deve essere somministrata al paziente appena possibile. Se è il momento di somministrare la dose successiva, saltare la dose dimenticata e tornare al normale schema posologico. Non raddoppiare la dose successiva o somministrare più della dose prescritta.

#### Popolazioni speciali

##### *Anziani*

Non è necessario alcun adattamento della dose di letermovir in base all'età (vedere paragrafi 5.1 e 5.2).

##### *Compromissione epatica*

In presenza di compromissione epatica di grado da lieve (Child-Pugh classe A) a moderato (Child-Pugh classe B) non è necessario alcun adattamento della dose di letermovir. Letermovir non è raccomandato in pazienti con compromissione epatica severa (Child-Pugh classe C) (vedere paragrafo 5.2).

##### *Compromissione epatica e renale*

Le termovir non è raccomandato in pazienti con compromissione epatica moderata associata a compromissione renale moderata o severa (vedere paragrafo 5.2).

##### *Compromissione renale*

Non è raccomandato un adattamento della dose di letermovir nei pazienti con compromissione renale lieve, moderata o severa. Non possono essere formulate raccomandazioni in merito alla posologia per i pazienti con malattia renale allo stadio terminale (ESRD) sottoposti o non sottoposti a dialisi. L'efficacia e la sicurezza non sono state dimostrate in pazienti con ESRD.

PREVYMIS concentrato per soluzione per infusione contiene idrossipropilbetadex (vedere paragrafi 4.4 e 5.3). Nei pazienti con compromissione renale moderata o severa (clearance della creatinina inferiore a 50 mL/min) o nei bambini piccoli (di età inferiore a 2 anni) che ricevono PREVYMIS, può verificarsi un accumulo di idrossipropilbetadex. In questi pazienti, i livelli di creatinina sierica devono essere attentamente monitorati.

## *Popolazione pediatrica*

Se possibile, la somministrazione per via endovenosa non deve superare 4 settimane.

La sicurezza e l'efficacia di letermovir nei pazienti riceventi HSCT di peso corporeo inferiore a 5 kg o nei pazienti riceventi trapianto di rene di peso corporeo inferiore a 40 kg non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Nessuna raccomandazione sulla posologia per i pazienti riceventi trapianto di rene di peso corporeo inferiore a 40 kg può essere supportata dall'estrapolazione di farmacocinetica/farmacodinamica.

## Modo di somministrazione

Solo per uso endovenoso.

Letermovir concentrato per soluzione per infusione deve essere diluito prima della somministrazione (vedere paragrafo 6.6).

La soluzione diluita di letermovir deve essere somministrata attraverso un filtro in linea sterile da 0,2 micron o 0,22 micron in polietersulfone (PES). Non somministrare la soluzione diluita attraverso un filtro diverso da un filtro in linea sterile da 0,2 micron o 0,22 micron in PES.

Letermovir deve essere somministrato esclusivamente per infusione endovenosa.

Dopo la diluizione, letermovir deve essere somministrato per infusione endovenosa tramite catetere venoso periferico o centrale per un periodo di tempo totale di circa 60 minuti. Deve essere somministrato l'intero contenuto della sacca per via endovenosa.

## **4.3 Controindicazioni**

Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1.

Somministrazione concomitante con pimozide (vedere paragrafi 4.4 e 4.5).

Somministrazione concomitante con alcaloidi derivati dalla segale cornuta (vedere paragrafi 4.4 e 4.5).

Somministrazione concomitante con erba di S. Giovanni (*Hypericum perforatum*) (vedere paragrafo 4.5).

Quando letermovir è associato a ciclosporina:

- L'uso concomitante con dabigatran, atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina o pitavastatina è controindicato (vedere paragrafo 4.5).

## **4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d'impiego**

### Monitoraggio del DNA del CMV nei riceventi HSCT

In uno studio di fase 3 (P001), la sicurezza e l'efficacia di letermovir sono state stabilite in pazienti sottoposti a HSCT con un risultato negativo al test del DNA del CMV prima dell'inizio della profilassi. Il DNA del CMV è stato monitorato settimanalmente fino alla settimana 14 post trapianto e successivamente ogni due settimane fino alla settimana 24. In presenza di DNAemia o malattia da CMV clinicamente significativa, la profilassi con letermovir è stata interrotta ed è stato iniziato il trattamento o la terapia pre-emptive standard (PET). Nei pazienti in cui è stata iniziata la profilassi con letermovir e il test del DNA del CMV al basale è successivamente risultato positivo, la profilassi poteva essere proseguita se i criteri per iniziare la PET non erano stati soddisfatti (vedere paragrafo 5.1).

### Rischio di reazioni avverse o effetto terapeutico ridotto dovuti ad interazioni farmacologiche

L'uso concomitante di letermovir e di alcuni medicinali può determinare interazioni farmacologiche note o potenzialmente significative, alcune delle quali possono dar luogo a:

- possibili reazioni avverse clinicamente significative derivanti dalla maggiore esposizione ai medicinali concomitanti o a letermovir.

- diminuzione significativa delle concentrazioni plasmatiche dei medicinali concomitanti che può determinare una riduzione del loro effetto terapeutico.

Vedere Tabella 2 per le procedure di prevenzione o gestione di tali interazioni farmacologiche note o potenzialmente significative, comprese le raccomandazioni sul dosaggio (vedere paragrafi 4.3 e 4.5).

#### Interazioni farmacologiche

Letermovir deve essere usato con cautela quando co-somministrato con medicinali che sono substrati del CYP3A con indice terapeutico ristretto (ad es., alfentanil, fentanil e chinidina), in quanto la co-somministrazione può determinare un aumento delle concentrazioni plasmatiche dei substrati del CYP3A. Si raccomanda un attento monitoraggio e/o un adattamento della dose dei substrati del CYP3A co-somministrati (vedere paragrafo 4.5).

In generale si raccomanda un monitoraggio più intenso per ciclosporina, tacrolimus, sirofimus durante le prime 2 settimane dopo l'inizio e la fine del trattamento con letermovir (vedere paragrafo 4.5) e anche se si modifica la via di somministrazione di letermovir.

Letermovir è un induttore moderato di enzimi e trasportatori. L'induzione può dare origine a ridotte concentrazioni plasmatiche di alcuni medicinali metabolizzati e trasportati (vedere paragrafo 4.5). È pertanto raccomandato un monitoraggio terapeutico del farmaco (*Therapeutic Drug Monitoring, TDM*) per voriconazolo. L'uso concomitante con dabigatran deve essere evitato a causa del rischio di riduzione dell'efficacia di dabigatran.

Letermovir può aumentare le concentrazioni plasmatiche di medicinali trasportati da OATP1B1/3, tra i quali molte statine (vedere paragrafo 4.5 e Tabella 2).

#### Somministrazione attraverso un filtro in linea sterile da 0,2 o 0,22 micron in PES

PREVYMIS concentrato per soluzione per infusione può contenere alcune piccole particelle traslucide o bianche correlate al prodotto. La somministrazione di PREVYMIS soluzione diluita richiede sempre l'utilizzo di un filtro in linea sterile da 0,2 micron o 0,22 micron in PES, indipendentemente dal fatto che queste particelle correlate al prodotto siano visibili nel flaconcino o nella soluzione diluita (vedere paragrafi 4.2 e 6.6).

#### Eccipienti

##### Sodio

Questo medicinale contiene 23 mg (o 1 mmol) di sodio per flaconcino da 240 mg, equivalente a 1,15% dell'assunzione massima giornaliera raccomandata dall'OMS che corrisponde a 2 g di sodio per un adulto. Da tenere in considerazione in pazienti che seguono una dieta a basso contenuto di sodio.

Questo medicinale contiene 46 mg (o 2 mmol) di sodio per flaconcino da 480 mg, equivalente a 2,30% dell'assunzione massima giornaliera raccomandata dall'OMS che corrisponde a 2 g di sodio per un adulto. Da tenere in considerazione in pazienti che seguono una dieta a basso contenuto di sodio.

##### Ciclodestrina

Questo medicinale contiene 300 mg di idrossipropilbetadex (ciclodestrina) per dose da 40 mg.  
Questo medicinale contiene 450 mg di idrossipropilbetadex (ciclodestrina) per dose da 60 mg.  
Questo medicinale contiene 900 mg di idrossipropilbetadex (ciclodestrina) per dose da 120 mg.  
Questo medicinale contiene 1 800 mg di idrossipropilbetadex (ciclodestrina) per dose da 240 mg.  
Questo medicinale contiene 3 600 mg di idrossipropilbetadex (ciclodestrina) per dose da 480 mg.

## **4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d'interazione**

### Informazioni generali sulle differenze nell'esposizione tra diversi regimi di trattamento di letermovir

-L'esposizione plasmatica stimata di letermovir è diversa a seconda del regime posologico utilizzato (vedere tabella al paragrafo 5.2). Pertanto, le conseguenze cliniche delle interazioni farmacologiche di letermovir dipenderanno dal tipo di regime di letermovir utilizzato e se letermovir viene associato o meno a ciclosporina.

-L'associazione di ciclosporina e letermovir può determinare effetti più marcati o aggiuntivi sui medicinali concomitanti rispetto a letermovir da solo (vedere Tabella 2).

### Effetto di altri medicinali su letermovir

Le vie di eliminazione di letermovir *in vivo* sono l'escrezione biliare e la glucuronidazione. La relativa importanza di queste vie non è nota. Entrambe le vie di eliminazione comportano il trasporto attivo negli epatociti attraverso i trasportatori attivi epatici OATP1B1/3. Dopo il trasporto attivo, la glucuronidazione di letermovir è mediata da UGT1A1 e 3. Sembra che letermovir sia anche soggetto all'efflusso mediato dalla P-gp e BCRP nel fegato e nell'intestino (vedere paragrafo 5.2).

### Induttori di farmaci che metabolizzano enzimi o trasportatori

La co-somministrazione di letermovir (con o senza ciclosporina) con induttori potenti e moderati dei trasportatori (ad es., P-gp) e/o degli enzimi (ad es., UGT) non è raccomandata, in quanto può determinare un'esposizione subterapeutica di letermovir (vedere Tabella 2).

-Esempi di induttori potenti includono rifampicina, fenitoina, carbamazepina, rifabutina e fenobarbital.

-Esempi di induttori moderati includono tioridazina, modafinil, ritonavir, lopinavir, efavirenz ed etravirina.

La co-somministrazione di rifampicina ha determinato un aumento iniziale delle concentrazioni plasmatiche di letermovir (a causa dell'inibizione di OATP1B1/3 e/o della P-gp) non clinicamente rilevante, seguito da diminuzioni delle concentrazioni plasmatiche di letermovir clinicamente rilevanti (a causa dell'induzione della P-gp/UGT) con la co-somministrazione continuativa di rifampicina (vedere Tabella 2).

### Effetti aggiuntivi di altri medicinali su letermovir rilevanti quando associato a ciclosporina

#### *Inibitori di OATP1B1 o 3*

La co-somministrazione di letermovir con medicinali che sono inibitori di OATP1B1/3 può determinare un aumento delle concentrazioni plasmatiche di letermovir. Nel caso in cui letermovir venga co-somministrato con ciclosporina (potente inibitore dell'OATP1B1/3), la dose raccomandata di letermovir è di 240 mg una volta al giorno in pazienti adulti e pediatrici di peso corporeo di almeno 30 kg (vedere Tabella 2 e paragrafi 4.2 e 5.2). Se letermovir per via endovenosa viene co-somministrato con ciclosporina in pazienti pediatrici di peso corporeo inferiore a 30 kg, non è richiesto alcun adattamento della dose (vedere Tabella 2 e paragrafi 4.2 e 5.2). Si consiglia cautela se altri inibitori di OATP1B1/3 sono aggiunti a letermovir in associazione a ciclosporina.

-Esempi di inibitori di OATP1B1 includono gemfibrozil, eritromicina, claritromicina e diversi inibitori della proteasi (atazanavir, simeprevir).

#### *Inibitori della P-gp/BCRP*

I risultati *in vitro* indicano che letermovir è un substrato della P-gp/BCRP. Le variazioni delle concentrazioni plasmatiche di letermovir a causa dell'inibizione della P-gp/BCRP da itraconazolo non sono state clinicamente rilevanti.

## Effetto di letermovir su altri medicinali

### *Medicinali principalmente eliminati attraverso metabolismo o influenzati da trasporto attivo*

*In vivo* letermovir è un induttore generale di enzimi e trasportatori. A meno che un particolare enzima o trasportatore non venga anche inibito (vedere sotto) si prevede che ci sia induzione. Pertanto, letermovir può potenzialmente determinare una ridotta esposizione plasmatica e probabilmente una ridotta efficacia dei medicinali co-somministrati che sono principalmente eliminati attraverso metabolismo o trasporto attivo.

L'entità dell'effetto induttivo dipende dalla via di somministrazione di letermovir e se la ciclosporina viene usata in concomitanza. Si può prevedere che l'effetto della totale induzione avvenga dopo 10-14 giorni di trattamento con letermovir. Il tempo necessario a raggiungere lo stato stazionario di uno specifico medicinale interessato influenzerà anche il tempo necessario a raggiungere l'effetto totale sulle concentrazioni plasmatiche.

*In vitro*, letermovir è un inibitore di CYP3A, CYP2C8, CYP2B6, BCRP, UGT1A1, OATP2B1 e di OAT3 a concentrazioni rilevanti *in vivo*. Sono disponibili studi *in vivo* che valutano l'effetto netto su CYP3A4, P-gp, OATP1B1/3 oltre che su CYP2C19. Non è noto l'effetto netto *in vivo* su altri enzimi e trasportatori elencati. Informazioni più dettagliate sono descritte di seguito.

Non è noto se letermovir possa influenzare l'esposizione di piperacillina/tazobactam, amfotericina B e micafungina. La potenziale interazione tra letermovir e questi medicinali non è stata studiata. Esiste un rischio teorico di ridotta esposizione a causa dell'induzione ma l'entità dell'effetto e quindi la rilevanza clinica non è al momento nota.

### *Medicinali metabolizzati dal CYP3A*

*In vivo* letermovir è un inibitore moderato di CYP3A. La co-somministrazione di letermovir con midazolam per via orale (un substrato del CYP3A) determina un aumento di 2-3 volte le concentrazioni plasmatiche di midazolam. La co-somministrazione di letermovir può determinare aumenti clinicamente rilevanti delle concentrazioni plasmatiche dei substrati del CYP3A co-somministrati (vedere paragrafi 4.3, 4.4 e 5.2).

-Esempi di medicinali di questo tipo includono alcuni immunosoppressori (ad es., ciclosporina, tacrolimus, sirolimus), gli inibitori della HMG-CoA reduttasi e amiodarone (vedere Tabella 2). Pimozide e alcaloidi derivati dalla segale cornuta sono controindicati (vedere paragrafo 4.3).

L'entità dell'effetto inibitorio del CYP3A dipende dalla via di somministrazione di letermovir e se la ciclosporina viene usata in concomitanza.

A causa dell'inibizione tempo-dipendente e della simultanea induzione, l'effetto netto inibitorio dell'enzima può non essere raggiunto prima di 10-14 giorni. Il tempo necessario a raggiungere lo stato stazionario di uno specifico medicinale interessato influenzerà anche il tempo necessario a raggiungere l'effetto totale sulle concentrazioni plasmatiche. Dopo la fine del trattamento, occorreranno 10-14 giorni prima che l'effetto inibitorio svanisca. Se si ricorre a monitoraggio, questo è raccomandato le prime 2 settimane dopo l'inizio e la fine del trattamento con letermovir (vedere paragrafo 4.4) e anche se si modifica la via di somministrazione di letermovir.

### *Medicinali trasportati da OATP1B1/3*

Letermovir è un inibitore dei trasportatori OATP1B1/3. La somministrazione di letermovir può determinare un aumento clinicamente rilevante delle concentrazioni plasmatiche dei medicinali co-somministrati che sono substrati di OATP1B1/3.

-Esempi di medicinali di questo tipo includono gli inibitori della HMG-CoA reduttasi, fexofenadina, repaglinide e gliburide (vedere Tabella 2). Confrontando regimi di letermovir somministrati senza ciclosporina, l'effetto è più marcato dopo la somministrazione per via endovenosa rispetto alla somministrazione orale di letermovir.

È probabile che l'entità dell'inibizione di OATP1B1/3 sui medicinali co-somministrati sia maggiore quando letermovir è co-somministrato con ciclosporina (un inibitore potente di OATP1B1/3). Ciò deve essere considerato quando il regime di letermovir viene modificato durante il trattamento con un substrato di OATP1B1/3.

#### *Medicinali metabolizzati dal CYP2C9 e/o dal CYP2C19*

La co-somministrazione di letermovir con voriconazolo (un substrato del CYP2C19) determina una riduzione significativa delle concentrazioni plasmatiche di voriconazolo, indicando che letermovir è un induttore del CYP2C19. È probabile anche un'induzione del CYP2C9. Letermovir può ridurre l'esposizione ai substrati del CYP2C9 e/o del CYP2C19 determinando potenzialmente livelli subterapeutici.

-Esempi di medicinali di questo tipo includono warfarin, voriconazolo, diazepam, lansoprazolo, omeprazolo, esomeprazolo, pantoprazolo, tilidina e tolbutamide (vedere Tabella 2).

Si prevede che l'effetto sia meno pronunciato per letermovir per via orale senza ciclosporina, rispetto a letermovir per via endovenosa con o senza ciclosporina o a letermovir per via orale con ciclosporina. Ciò deve essere considerato quando il regime di letermovir viene modificato durante il trattamento con un substrato di CYP2C9 o CYP2C19. Vedere anche sopra le informazioni generali sul decorso dell'interazione.

#### *Medicinali metabolizzati dal CYP2C8*

*In vitro* letermovir inibisce il CYP2C8 ma può anche indurre il CYP2C8 in base al suo potenziale di induzione. L'effetto netto *in vivo* non è noto.

-Un esempio di medicinale che viene principalmente eliminato dal CYP2C8 è la repaglinide (vedere Tabella 2). L'uso concomitante di repaglinide e letermovir con o senza ciclosporina non è raccomandato.

#### *Medicinali trasportati dalla P-gp nell'intestino*

Letermovir è un induttore della P-gp intestinale. La somministrazione di letermovir può determinare una diminuzione clinicamente rilevante delle concentrazioni plasmatiche dei medicinali co-somministrati che sono trasportati in maniera significativa dalla P-gp nell'intestino come dabigatran e sofosbuvir.

#### *Medicinali metabolizzati da CYP2B6, UGT1A1 o trasportati da BCRP o OATP2B1*

*In vivo* letermovir è in generale un induttore ma *in vitro* è stata anche osservata l'inibizione di CYP2B6, UGT1A1, BCRP e OATP2B1. Non è noto l'effetto netto *in vivo*. Pertanto, le concentrazioni plasmatiche di medicinali che sono substrati di questi enzimi o trasportatori possono aumentare o diminuire quando co-somministrati con letermovir. Può essere raccomandato monitoraggio addizionale; fare riferimento alle informazioni sulla prescrizione di tali medicinali.

- Esempi di medicinali che sono metabolizzati da CYP2B6 comprendono bupropione.
- Esempi di medicinali metabolizzati da UGT1A1 sono raltegravir e doltegravir.
- Esempi di medicinali trasportati da BCRP includono rosuvastatina e sulfasalazina.
- Un esempio di un medicinale trasportato da OATP2B1 è il celiprololo.

#### *Medicinali trasportati dal trasportatore renale OAT3*

I dati *in vitro* indicano che letermovir è un inibitore di OAT3; pertanto, letermovir può essere un inibitore di OAT3 *in vivo*. Le concentrazioni plasmatiche dei medicinali trasportati da OAT3 possono essere aumentate.

-Esempi di medicinali trasportati da OAT3 includono ciprofloxacina, tenofovir, imipenem e cilastatina.

#### Informazioni generali

Se l'adattamento della dose dei medicinali concomitanti viene effettuato a causa del trattamento con letermovir, le dosi devono essere rimodulate una volta che il trattamento con letermovir è stato completato. Può anche essere necessario un adattamento della dose se si modifica la via di somministrazione o l'immunosoppressore.

La Tabella 2 fornisce un elenco delle interazioni farmacologiche stabilite o potenzialmente significative da un punto di vista clinico. Le interazioni farmacologiche descritte si basano su studi condotti con letermovir sugli adulti o rappresentano interazioni farmacologiche previste che possono verificarsi con letermovir (vedere paragrafi 4.3, 4.4, 5.1 e 5.2).

**Tabella 2: Interazioni e raccomandazioni sul dosaggio con altri medicinali. Notare che la tabella non è esaustiva ma fornisce esempi di interazioni clinicamente rilevanti. Vedere anche sopra il testo generale sulle interazioni farmacologiche.**

Salvo diversa indicazione, gli studi di interazione sono stati effettuati sugli adulti con letermovir per via orale senza ciclosporina. Notare che la potenziale interazione e le conseguenze cliniche possono essere differenti qualora letermovir sia somministrato per via orale o per via endovenosa e se ciclosporina sia usata in concomitanza. Se si modifica la via di somministrazione o se si modifica l'immunosoppressore, la raccomandazione relativa alla co-somministrazione deve essere riconsiderata.

Medicinale concomitante	Effetto sulla concentrazione <sup>†</sup> rapporto delle medie (intervallo di confidenza al 90%) per AUC, C <sub>max</sub> (probabile meccanismo d'azione)	Raccomandazioni relative alla co-somministrazione con letermovir
<b>Antibiotici</b>		
nafcillina	Interazione non studiata. Previsto: ↓ letermovir  (Induzione della P-gp/UGT)	Nafcillina può ridurre le concentrazioni plasmatiche di letermovir. La co-somministrazione di letermovir e nafcillina non è raccomandata.
<b>Antifungini</b>		
fluconazolo (400 mg in dose singola)/ letermovir (480 mg in dose singola)	↔ fluconazolo AUC 1,03 (0,99; 1,08) C <sub>max</sub> 0,95 (0,92; 0,99)  ↔ letermovir AUC 1,11 (1,01; 1,23) C <sub>max</sub> 1,06 (0,93; 1,21)  Interazione allo stato stazionario non studiata. Previsto: ↔ fluconazolo ↔ letermovir	Non è necessario alcun adattamento della dose.
itraconazolo (200 mg una volta al giorno PO)/ letermovir (480 mg una volta al giorno PO)	↔ itraconazolo AUC 0,76 (0,71; 0,81) C <sub>max</sub> 0,84 (0,76; 0,92)  ↔ letermovir AUC 1,33 (1,17; 1,51) C <sub>max</sub> 1,21 (1,05; 1,39)	Non è necessario alcun adattamento della dose.
posaconazolo <sup>‡</sup> (300 mg in dose singola)/ letermovir (480 mg una volta al giorno)	↔ posaconazolo AUC 0,98 (0,82; 1,17) C <sub>max</sub> 1,11 (0,95; 1,29)	Non è necessario alcun adattamento della dose.
voriconazolo <sup>‡</sup> (200 mg due volte al giorno)/ letermovir (480 mg una volta al giorno)	↓ voriconazolo AUC 0,56 (0,51; 0,62) C <sub>max</sub> 0,61 (0,53; 0,71)  (Induzione di CYP2C9/19)	Se è necessaria la somministrazione concomitante, un TDM per voriconazolo è raccomandato le prime 2 settimane dopo l'inizio o la fine del trattamento con letermovir, e anche se si modifica la via di somministrazione di letermovir o l'immunosoppressore.

<b>Medicinale concomitante</b>	<b>Effetto sulla concentrazione<sup>†</sup> rapporto delle medie (intervallo di confidenza al 90%) per AUC, C<sub>max</sub> (probabile meccanismo d'azione)</b>	<b>Raccomandazioni relative alla co-somministrazione con letermovir</b>
<b>Antimicobatterici</b>		
rifabutina	Interazione non studiata. Previsto: ↓ letermovir  (Induzione della P-gp/UGT)	Rifabutina può ridurre le concentrazioni plasmatiche di letermovir. La co-somministrazione di letermovir e rifabutina non è raccomandata.
(600 mg in dose singola PO)/ letermovir (480 mg in dose singola PO)	↔ letermovir AUC 2,03 (1,84; 2,26) C <sub>max</sub> 1,59 (1,46; 1,74) C <sub>24</sub> 2,01 (1,59; 2,54)  (Inibizione di OATP1B1/3 e/o della P-gp)	
(600 mg in dose singola per via endovenosa)/ letermovir (480 mg in dose singola PO)	↔ letermovir AUC 1,58 (1,38; 1,81) C <sub>max</sub> 1,37 (1,16; 1,61) C <sub>24</sub> 0,78 (0,65; 0,93)  (Inibizione di OATP1B1/3 e/o della P-gp)	Rifampicina in dose multipla diminuisce le concentrazioni plasmatiche di letermovir. La co-somministrazione di letermovir e rifampicina non è raccomandata.
(600 mg una volta al giorno PO)/ letermovir (480 mg una volta al giorno PO)	↓ letermovir AUC 0,81 (0,67; 0,98) C <sub>max</sub> 1,01 (0,79; 1,28) C <sub>24</sub> 0,14 (0,11; 0,19)  (Somma dell'inibizione di OATP1B1/3 e/o della P-gp e dell'induzione della P-gp/UGT)	
(600 mg una volta al giorno PO (24 ore dopo rifampicina)) <sup>§</sup> / letermovir (480 mg una volta al giorno PO)	↓ letermovir AUC 0,15 (0,13; 0,17) C <sub>max</sub> 0,27 (0,22; 0,31) C <sub>24</sub> 0,09 (0,06; 0,12)  (Induzione della P-gp/UGT)	
<b>Antipsicotici</b>		
tioridazina	Interazione non studiata. Previsto: ↓ letermovir  (Induzione della P-gp/UGT)	Tioridazina può ridurre le concentrazioni plasmatiche di letermovir. La co-somministrazione di letermovir e tioridazina non è raccomandata.
<b>Antagonisti dell'endotelina</b>		
bosentan	Interazione non studiata. Previsto: ↓ letermovir  (Induzione della P-gp/UGT)	Bosentan può ridurre le concentrazioni plasmatiche di letermovir. La co-somministrazione di letermovir e bosentan non è raccomandata.

<b>Medicinale concomitante</b>	<b>Effetto sulla concentrazione<sup>†</sup> rapporto delle medie (intervallo di confidenza al 90%) per AUC, C<sub>max</sub> (probabile meccanismo d'azione)</b>	<b>Raccomandazioni relative alla co-somministrazione con letermovir</b>
<b>Antivirali</b>		
aciclovir <sup>‡</sup> (400 mg in dose singola)/ letermovir (480 mg una volta al giorno)	↔ aciclovir AUC 1,02 (0,87; 1,2) C <sub>max</sub> 0,82 (0,71; 0,93)	Non è necessario alcun adattamento della dose.
valaciclovir	Interazione non studiata. Previsto: ↔ valaciclovir	Non è necessario alcun adattamento della dose.

<b>Medicinale concomitante</b>	<b>Effetto sulla concentrazione<sup>†</sup> rapporto delle medie (intervallo di confidenza al 90%) per AUC, C<sub>max</sub> (probabile meccanismo d'azione)</b>	<b>Raccomandazioni relative alla co-somministrazione con letermovir</b>
<b>Prodotti a base di erbe</b>		
erba di S. Giovanni ( <i>Hypericum perforatum</i> )	Interazione non studiata. Previsto: ↓ letermovir  (Induzione della P-gp/UGT)	L'erba di S. Giovanni può ridurre le concentrazioni plasmatiche di letermovir. La co-somministrazione di letermovir ed erba di S. Giovanni è controindicata.
<b>Medicinali per l'HIV</b>		
efavirenz	Interazione non studiata. Previsto: ↓ letermovir (Induzione della P-gp/UGT)  ↑ o ↓ efavirenz (Inibizione o induzione di CYP2B6)	Efavirenz può ridurre le concentrazioni plasmatiche di letermovir. La co-somministrazione di letermovir ed efavirenz non è raccomandata.
etravirina, nevirapina, ritonavir, lopinavir	Interazione non studiata. Previsto: ↓ letermovir  (Induzione della P-gp/UGT)	Questi antivirali possono ridurre le concentrazioni plasmatiche di letermovir. La co-somministrazione di letermovir con questi antivirali non è raccomandata.
<b>Inibitori della HMG-CoA reduttasi</b>		
atorvastatina <sup>‡</sup> (20 mg in dose singola)/ letermovir (480 mg una volta al giorno)	↑ atorvastatina AUC 3,29 (2,84; 3,82) C <sub>max</sub> 2,17 (1,76; 2,67)  (Inibizione di CYP3A, OATP1B1/3)	Gli eventi avversi associati alle statine quali la miopia devono essere attentamente monitorati. Quando co-somministrata con letermovir, la dose di atorvastatina non deve superare i 20 mg al giorno <sup>#</sup> .  Benché non sia stato studiato, si prevede che, quando letermovir è co-somministrato con ciclosporina, l'entità dell'aumento delle concentrazioni plasmatiche di atorvastatina sia maggiore rispetto alla terapia con letermovir da solo. Quando letermovir è co-somministrato con ciclosporina, l'impiego di atorvastatina è controindicato.
simvastatina, pitavastatina, rosuvastatina	Interazione non studiata. Previsto: ↑ inibitori della HMG-CoA reduttasi  (Inibizione di CYP3A, OATP1B1/3)	Le termovir può aumentare sostanzialmente le concentrazioni plasmatiche di queste statine. L'uso concomitante non è raccomandato con letermovir da solo.  Quando letermovir è co-somministrato con ciclosporina, l'impiego di queste statine è controindicato.

<b>Medicinale concomitante</b>	<b>Effetto sulla concentrazione<sup>†</sup> rapporto delle medie (intervallo di confidenza al 90%) per AUC, C<sub>max</sub> (probabile meccanismo d'azione)</b>	<b>Raccomandazioni relative alla co-somministrazione con letermovir</b>
fluvastatina, pravastatina	Interazione non studiata. Previsto: ↑ inibitori della HMG-CoA reduttasi  (Inibizione di OATP1B1/3 e/o di BCRP)	Letermovir può aumentare le concentrazioni plasmatiche di statina.  Quando letermovir è co-somministrato con queste statine, può essere necessaria una riduzione della dose della statina <sup>#</sup> . Gli eventi avversi associati alle statine quali la miopia devono essere attentamente monitorati.  Quando letermovir è co-somministrato con ciclosporina, pravastatina non è raccomandata mentre per fluvastatina può essere necessaria una riduzione della dose <sup>#</sup> . Gli eventi avversi associati alle statine quali la miopia devono essere attentamente monitorati.
<b>Immunosoppressori</b>		
ciclosporina (50 mg in dose singola)/ letermovir (240 mg una volta al giorno)	↑ ciclosporina AUC 1,66 (1,51; 1,82) C <sub>max</sub> 1,08 (0,97; 1,19)  (Inibizione di CYP3A)	In caso di co-somministrazione di letermovir con ciclosporina, la dose di letermovir deve essere ridotta a 240 mg una volta al giorno negli adulti (vedere paragrafi 4.2 e 5.1) e nei pazienti pediatrici di peso corporeo di almeno 30 kg (vedere paragrafo 4.2). Se letermovir per via endovenosa viene co-somministrato con ciclosporina nei pazienti pediatrici di peso corporeo inferiore a 30 kg, non è necessario alcun adattamento della dose (vedere paragrafo 4.2).  Se si modifica la via di somministrazione di letermovir e dopo l'interruzione di letermovir deve essere eseguito un frequente monitoraggio delle concentrazioni di ciclosporina nel sangue intero e la dose di ciclosporina deve essere modificata di conseguenza <sup>#</sup> .
micofenolato mofetile (1 g in dose singola)/ letermovir (480 mg una volta al giorno)	↔ acido micofenolico AUC 1,08 (0,97; 1,20) C <sub>max</sub> 0,96 (0,82; 1,12)  ↔ letermovir AUC 1,18 (1,04; 1,32) C <sub>max</sub> 1,11 (0,92; 1,34)	Non è necessario alcun adattamento della dose.

Medicinale concomitante	Effetto sulla concentrazione <sup>†</sup> rapporto delle medie (intervallo di confidenza al 90%) per AUC, C <sub>max</sub> (probabile meccanismo d'azione)	Raccomandazioni relative alla co-somministrazione con letermovir
sirolimus <sup>‡</sup> (2 mg in dose singola)/ letermovir (480 mg una volta al giorno)	<p>↑ sirolimus AUC 3,40 (3,01; 3,85) C<sub>max</sub> 2,76 (2,48; 3,06)</p> <p>(Inibizione di CYP3A)</p> <p>Interazione non studiata. Previsto: ↔ letermovir</p>	<p>Se si modifica la via di somministrazione di letermovir e dopo l'interruzione di letermovir deve essere eseguito un frequente monitoraggio delle concentrazioni di sirolimus nel sangue intero e la dose di sirolimus deve essere modificata di conseguenza<sup>#</sup>.</p> <p>Un monitoraggio frequente delle concentrazioni di sirolimus è raccomandato al momento dell'inizio o dell'interruzione della co-somministrazione di ciclosporina con letermovir.</p> <p>Quando letermovir è co-somministrato con ciclosporina, si rimanda anche alle informazioni sulla prescrizione di sirolimus per specifiche raccomandazioni sul dosaggio per l'uso di sirolimus con ciclosporina.</p> <p>Quando letermovir è co-somministrato con ciclosporina, l'entità dell'aumento delle concentrazioni di sirolimus può essere maggiore rispetto a letermovir da solo.</p>
tacrolimus (5 mg in dose singola)/ letermovir (480 mg una volta al giorno)	<p>↑ tacrolimus AUC 2,42 (2,04; 2,88) C<sub>max</sub> 1,57 (1,32; 1,86)</p> <p>(Inibizione di CYP3A)</p>	<p>Se si modifica la via di somministrazione di letermovir e dopo l'interruzione di letermovir deve essere eseguito un frequente monitoraggio delle concentrazioni di tacrolimus nel sangue intero e la dose di tacrolimus deve essere modificata di conseguenza<sup>#</sup>.</p>
tacrolimus (5 mg in dose singola)/ letermovir (80 mg due volte al giorno)	<p>↔ letermovir AUC 1,02 (0,97; 1,07) C<sub>max</sub> 0,92 (0,84; 1,00)</p>	

<b>Medicinale concomitante</b>	<b>Effetto sulla concentrazione<sup>†</sup> rapporto delle medie (intervallo di confidenza al 90%) per AUC, C<sub>max</sub> (probabile meccanismo d'azione)</b>	<b>Raccomandazioni relative alla co-somministrazione con letermovir</b>
<b>Contraceppimenti orali</b>		
etinilestradiolo (EE) (0,03 mg)/ levonorgestrel (LNG) <sup>‡</sup> (0,15 mg) in dose singola/ letermovir (480 mg una volta al giorno)	↔ EE AUC 1,42 (1,32; 1,52) C <sub>max</sub> 0,89 (0,83; 0,96)  ↔ LNG AUC 1,36 (1,30; 1,43) C <sub>max</sub> 0,95 (0,86; 1,04)	Non è necessario alcun adattamento della dose.
Altri steroidi contraccettivi orali con effetto sistemico	Rischio di ↓ steroidi contraccettivi	Letermovir può ridurre le concentrazioni plasmatiche di altri steroidi contraccettivi orali influenzando in tal modo la loro efficacia. Per assicurare un adeguato effetto contraccettivo con un contraccettivo orale, devono essere scelti prodotti contenenti EE e LNG.
<b>Medicinali antidiabetici</b>		
repaglinide	Interazione non studiata. Previsto: ↑ o ↓ repaglinide  (Induzione di CYP2C8, inibizione di CYP2C8 e OATP1B)	Letermovir può aumentare o diminuire le concentrazioni plasmatiche di repaglinide. (L'effetto netto non è noto).  L'uso concomitante non è raccomandato.  Si prevede che, quando letermovir è co-somministrato con ciclosporina, le concentrazioni plasmatiche di repaglinide siano maggiori a causa dell'inibizione aggiuntiva del OATP1B da parte della ciclosporina. L'uso concomitante non è raccomandato <sup>#</sup> .
gliburide	Interazione non studiata. Previsto: ↑ gliburide  (Inibizione di OATP1B1/3, inibizione di CYP3A, induzione di CYP2C9)	Letermovir può aumentare le concentrazioni plasmatiche di gliburide.  Si raccomanda un monitoraggio frequente delle concentrazioni di glucosio le prime 2 settimane dopo l'inizio o la fine del trattamento con letermovir, e anche se si modifica la via di somministrazione di letermovir.  Quando letermovir è co-somministrato con ciclosporina, si rimanda anche alle informazioni sulla prescrizione di gliburide per specifiche raccomandazioni sul dosaggio.

<b>Medicinale concomitante</b>	<b>Effetto sulla concentrazione<sup>†</sup> rapporto delle medie (intervallo di confidenza al 90%) per AUC, C<sub>max</sub> (probabile meccanismo d'azione)</b>	<b>Raccomandazioni relative alla co-somministrazione con letermovir</b>
<b>Medicinali antiepilettici (vedere anche testo generale)</b>		
carbamazepina, fenobarbital	Interazione non studiata. Previsto: ↓ letermovir  (Induzione della P-gp/UGT)	Carbamazepina o fenobarbital possono ridurre le concentrazioni plasmatiche di letermovir. La co-somministrazione di letermovir e carbamazepina o fenobarbital non è raccomandata.
fenitoina	Interazione non studiata. Previsto: ↓ letermovir  (Induzione della P-gp/UGT)  ↓ fenitoina  (Induzione di CYP2C9/19)	Fenitoina può ridurre le concentrazioni plasmatiche di letermovir.  Le termovir può ridurre le concentrazioni plasmatiche di fenitoina.  La co-somministrazione di letermovir e fenitoina non è raccomandata.
<b>Anticoagulanti orali</b>		
warfarin	Interazione non studiata. Previsto: ↓ warfarin  (Induzione di CYP2C9)	Le termovir può ridurre le concentrazioni plasmatiche di warfarin.  Quando warfarin viene co-somministrato con letermovir deve essere eseguito un monitoraggio frequente del rapporto internazionale normalizzato (INR) <sup>#</sup> . Si raccomanda un monitoraggio le prime 2 settimane dopo l'inizio o la fine del trattamento con letermovir, e anche se si modifica la via di somministrazione di letermovir o l'immunosoppressore.
dabigatran	Interazione non studiata. Previsto: ↓ dabigatran  (Induzione della P-gp intestinale)	Le termovir può ridurre le concentrazioni plasmatiche di dabigatran e può diminuire l'efficacia di dabigatran. L'uso concomitante con dabigatran deve essere evitato a causa del rischio di riduzione dell'efficacia di dabigatran.  Quando letermovir viene co-somministrato con ciclosporina, l'uso di dabigatran è controindicato.

<b>Medicinale concomitante</b>	<b>Effetto sulla concentrazione<sup>†</sup> rapporto delle medie (intervallo di confidenza al 90%) per AUC, C<sub>max</sub> (probabile meccanismo d'azione)</b>	<b>Raccomandazioni relative alla co-somministrazione con letermovir</b>
<b>Sedativi</b>		
midazolam (1 mg in dose singola per via endovenosa)/ letermovir (240 mg una volta al giorno PO)	↑ midazolam Per via endovenosa: AUC 1,47 (1,37; 1,58) C <sub>max</sub> 1,05 (0,94; 1,17)  PO: AUC 2,25 (2,04; 2,48) C <sub>max</sub> 1,72 (1,55; 1,92)  (Inibizione di CYP3A)	Durante la somministrazione di letermovir in concomitanza con midazolam si deve effettuare un attento monitoraggio clinico per depressione respiratoria e/o per sedazione prolungata. Si deve prendere in considerazione un adattamento della dose di midazolam <sup>#</sup> . L'aumento delle concentrazioni plasmatiche di midazolam può essere maggiore quando midazolam per via orale viene somministrato con letermovir alla dose clinica rispetto alla dose studiata.
<b>Agonisti oppioidi</b>		
Esempi: alfentanil, fentanil	Interazione non studiata. Previsto: ↑ oppioidi metabolizzati dal CYP3A  (Inibizione di CYP3A)	Durante la co-somministrazione si raccomanda un monitoraggio frequente delle reazioni avverse correlate a questi medicinali. Può essere necessario un adattamento della dose degli oppioidi metabolizzati dal CYP3A <sup>#</sup> (vedere paragrafo 4.4). Si raccomanda un monitoraggio se si modifica la via di somministrazione. Quando letermovir è co-somministrato con ciclosporina, l'entità dell'aumento delle concentrazioni plasmatiche degli oppioidi metabolizzati dal CYP3A può essere maggiore. Si deve effettuare un attento monitoraggio clinico per depressione respiratoria e/o per sedazione prolungata durante la co-somministrazione di letermovir in associazione a ciclosporina e alfentanil o fentanil. Si rimanda alle rispettive informazioni sulla prescrizione (vedere paragrafo 4.4).
<b>Medicinali antiaritmici</b>		
amiodarone	Interazione non studiata. Previsto: ↑ amiodarone  (principalmente inibizione di CYP3A e inibizione o induzione di CYP2C8)	Le termovir può aumentare le concentrazioni plasmatiche di amiodarone.  Durante la co-somministrazione si raccomanda un monitoraggio frequente delle reazioni avverse correlate ad amiodarone. Quando amiodarone viene co-somministrato con letermovir deve essere eseguito regolarmente un monitoraggio delle concentrazioni di amiodarone <sup>#</sup> .

<b>Medicinale concomitante</b>	<b>Effetto sulla concentrazione<sup>†</sup> rapporto delle medie (intervallo di confidenza al 90%) per AUC, C<sub>max</sub> (probabile meccanismo d'azione)</b>	<b>Raccomandazioni relative alla co-somministrazione con letermovir</b>
chinidina	Interazione non studiata. Previsto: ↑ chinidina  (Inibizione di CYP3A)	Letermovir può aumentare le concentrazioni plasmatiche di chinidina.  Si deve effettuare un attento monitoraggio clinico durante la somministrazione di letermovir con chinidina. Si rimanda alle rispettive informazioni sulla prescrizione <sup>#</sup> .
<b>Medicinali cardiovascolari</b>		
digossina <sup>‡</sup> (0,5 mg in dose singola)/ letermovir (240 mg due volte al giorno)	↔ digossina AUC 0,88 (0,80; 0,96) C <sub>max</sub> 0,75 (0,63; 0,89)  (Induzione della P-gp)	Non è necessario alcun adattamento della dose.
<b>Inibitori della pompa protonica</b>		
omeprazolo	Interazione non studiata. Previsto: ↓ omeprazolo  (Induzione di CYP2C19)  Interazione non studiata. Previsto: ↔ letermovir	Letermovir può ridurre le concentrazioni plasmatiche dei substrati del CYP2C19.  Possono essere necessari un monitoraggio clinico e un adattamento della dose.
pantoprazolo	Interazione non studiata. Previsto: ↓ pantoprazolo  (probabilmente dovuto all'induzione di CYP2C19)  Interazione non studiata. Previsto: ↔ letermovir	Letermovir può ridurre le concentrazioni plasmatiche dei substrati del CYP2C19.  Possono essere necessari un monitoraggio clinico e un adattamento della dose.
<b>Agenti promotori dello stato di veglia</b>		
modafinil	Interazione non studiata. Previsto: ↓ letermovir  (Induzione della P-gp/UGT)	Modafinil può ridurre le concentrazioni plasmatiche di letermovir. La co-somministrazione di letermovir e modafinil non è raccomandata.
<p>* Questa tabella non include tutti i dati.      † ↓=diminuzione, ↑=aumento      ↔=nessuna variazione clinicamente rilevante      ‡ Studio di interazione unidirezionale per la valutazione dell'effetto di letermovir sul medicinale concomitante.      § Questi dati sono l'effetto di rifampicina su letermovir 24 ore dopo la dose finale di rifampicina.      # Fare riferimento alle rispettive informazioni sulla prescrizione.</p>		

#### Popolazione pediatrica

Sono stati effettuati studi d'interazione solo negli adulti.

## **4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento**

### Gravidanza

Non vi sono dati sull'uso di letermovir in donne in gravidanza. Gli studi su animali hanno mostrato tossicità riproduttiva (vedere paragrafo 5.3).

Letermovir non è raccomandato durante la gravidanza e in donne in età fertile che non usano misure contraccettive.

### Allattamento

Non è noto se letermovir sia escreto nel latte materno. I dati farmacodinamici/tossicologici disponibili sull'animale hanno dimostrato l'escrezione di letermovir nel latte (vedere paragrafo 5.3). Il rischio per i neonati/lattanti non può essere escluso. Deve essere presa la decisione se interrompere l'allattamento o interrompere la terapia/astenersi dalla terapia con letermovir tenendo in considerazione il beneficio dell'allattamento per il bambino e il beneficio della terapia per la donna.

### Fertilità

Nei ratti non è stato riscontrato alcun effetto sulla fertilità femminile. Tossicità testicolare irreversibile e compromissione della fertilità sono state osservate nei maschi di ratto, ma non nei maschi di topo o scimmia (vedere paragrafo 5.3).

## **4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari**

Letermovir può alterare lievemente la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Durante il trattamento con letermovir sono stati riportati stanchezza e vertigini in alcuni pazienti. Ciò può influenzare la capacità dei pazienti di guidare veicoli e di usare macchinari (vedere paragrafo 4.8).

## **4.8 Effetti indesiderati**

### Riassunto del profilo di sicurezza

La valutazione della sicurezza di letermovir è stata basata su tre studi clinici di fase 3.

#### *HSCT*

Nello studio P001, a 565 adulti riceventi HSCT è stato somministrato letermovir o placebo fino alla settimana 14 post trapianto e sono stati seguiti per la sicurezza fino alla settimana 24 post trapianto (vedere paragrafo 5.1). Le reazioni avverse riportate più comunemente, che si sono manifestate in almeno l'1% dei soggetti nel gruppo letermovir e con frequenza maggiore rispetto al placebo, sono state: nausea (7,2%), diarrea (2,4%) e vomito (1,9%). Le reazioni avverse riportate più frequentemente che hanno condotto all'interruzione di letermovir sono state: nausea (1,6%), vomito (0,8%) e dolore addominale (0,5%).

Nello studio P040, a 218 adulti riceventi HSCT è stato somministrato letermovir o placebo dalla settimana 14 (circa 100 giorni) fino alla settimana 28 (circa 200 giorni) post HSCT e sono stati seguiti per la sicurezza fino alla settimana 48 post HSCT (vedere paragrafo 5.1). Le reazioni avverse riportate erano coerenti con il profilo di sicurezza di letermovir caratterizzato nello studio P001.

#### *Trapianto di rene*

Nello studio P002, a 292 adulti riceventi trapianto di rene è stato somministrato letermovir fino alla settimana 28 (circa 200 giorni) post trapianto (vedere paragrafo 5.1).

### Tabella delle reazioni avverse

Nei pazienti adulti che assumevano letermovir negli studi clinici sono state identificate le reazioni avverse indicate di seguito. Le reazioni avverse sono elencate di seguito secondo classificazione per sistemi e organi e frequenza. Le frequenze sono definite come segue: molto comune ( $\geq 1/10$ ), comune ( $\geq 1/100, < 1/10$ ), non comune ( $\geq 1/1\ 000, < 1/100$ ), raro ( $\geq 1/10\ 000, < 1/1\ 000$ ) o molto raro ( $< 1/10\ 000$ ).

**Tabella 3: Reazioni avverse identificate con letermovir**

Frequenza	Reazioni avverse
<i>Disturbi del sistema immunitario</i>	
Non comune	ipersensibilità
<i>Disturbi del metabolismo e della nutrizione</i>	
Non comune	appetito ridotto
<i>Patologie del sistema nervoso</i>	
Non comune	disgeusia, cefalea
<i>Patologie dell'orecchio e del labirinto</i>	
Non comune	vertigini
<i>Patologie gastrointestinali</i>	
Comune	nausea, diarrea, vomito
Non comune	dolore addominale
<i>Patologie epatobiliari</i>	
Non comune	alanina aminotransferasi aumentata, aspartato aminotransferasi aumentata
<i>Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo</i>	
Non comune	spasmi muscolari
<i>Patologie renali e urinarie</i>	
Non comune	creatinina ematica aumentata
<i>Patologie generali e condizioni relative alla sede di somministrazione</i>	
Non comune	stanchezza, edema periferico

### Popolazione pediatrica

La valutazione della sicurezza di letermovir nei pazienti pediatrici dalla nascita fino a 18 anni di età è stata basata su uno studio clinico di fase 2b (P030). Nello studio P030, 63 riceventi HSCT sono stati trattati con letermovir fino alla settimana 14 post HSCT. La loro distribuzione per età è stata la seguente: 28 adolescenti, 14 bambini di età compresa tra 7 e inferiore a 12 anni, 13 bambini di età compresa tra 2 e inferiore a 7 anni e 8 bambini di età inferiore a 2 anni (5 di loro di età inferiore a 1 anno). Le reazioni avverse erano coerenti con quelle osservate negli studi clinici di letermovir negli adulti.

### Segnalazione delle reazioni avverse sospette

La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione riportato nell'[allegato V](#).

### **4.9 Sovradosaggio**

Non c'è alcuna esperienza con il sovradosaggio di letermovir nell'uomo. Nel corso di studi clinici di fase 1, 86 soggetti adulti sani hanno ricevuto dosi di letermovir variabili nell'intervallo da 720 mg/die a 1 440 mg/die per un periodo massimo di 14 giorni. Il profilo delle reazioni avverse era simile a quello della dose clinica di 480 mg/die. Non esiste alcun antidoto specifico per il sovradosaggio di letermovir. In caso di sovradosaggio, si raccomanda di monitorare il paziente per reazioni avverse e di iniziare l'appropriato trattamento sintomatico.

Non è noto se la dialisi produca una rimozione significativa di letermovir dalla circolazione sistemica.

## **5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE**

### **5.1 Proprietà farmacodinamiche**

Categoria farmacoterapeutica: antivirali per uso sistemico, antivirali ad azione diretta, codice ATC: J05AX18

#### Meccanismo d'azione

Letermovir inibisce il complesso terminasi del DNA del CMV, che è necessario per il clivaggio e impacchettamento del DNA della progenie virale. Letermovir influenza la formazione di unità genomiche di lunghezza adeguata e interferisce con la maturazione del virione.

#### Attività antivirale

Il valore mediano della concentrazione efficace ( $EC_{50}$ ) di letermovir nei confronti di una raccolta di isolati clinici di CMV, in un modello di coltura cellulare dell'infezione, corrispondeva a 2,1 nM (intervallo=da 0,7 nM a 6,1 nM; n=74).

#### Resistenza virale

##### *In coltura cellulare*

I geni UL51, UL56 e UL89 del CMV codificano le subunità della terminasi del DNA virale del CMV. In coltura cellulare sono stati confermati CMV mutanti con ridotta sensibilità a letermovir. I valori della  $EC_{50}$  dei mutanti ricombinanti del CMV che esprimono le sostituzioni mappate in pUL51 (P91S), pUL56 (C25F, S229F, V231A, V231L, V236A, T244K, T244R, L254F, L257F, L257I, F261C, F261L, F261S, Y321C, L328V, M329T, A365S, N368D) e pUL89 (N320H, D344E) erano da 1,6 a < 10 volte superiori a quelli relativi al virus wild-type di riferimento; è improbabile che tali sostituzioni siano clinicamente rilevanti. I valori della  $EC_{50}$  dei mutanti ricombinanti del CMV che esprimono in pUL51 la sostituzione A95V o in pUL56 le sostituzioni N232Y, V236L, V236M, E237D, E237G, L241P, K258E, C325F, C325R, C325W, C325Y, R369G, R369M, R369S e R369T erano da 10 a 9 300 volte superiori a quelli relativi al virus wild-type di riferimento; alcune di queste sostituzioni sono state osservate in pazienti che hanno manifestato insuccesso della profilassi negli studi clinici (vedere sotto).

##### *Negli studi clinici*

In uno studio di fase 2b per la valutazione di dosi di letermovir da 60, 120 o 240 mg/die o placebo per un periodo massimo di 84 giorni in 131 adulti riceventi HSCT, è stata eseguita l'analisi della sequenza del DNA di una regione selezionata del gene UL56 (amminoacidi da 231 a 369) su campioni ottenuti da 12 soggetti trattati con letermovir, che avevano manifestato insuccesso della profilassi e per i quali erano disponibili campioni per l'analisi. In un soggetto (che riceveva la dose di 60 mg/die) era presente una variante genotipica (GV) resistente a letermovir (V236M).

In uno studio di fase 3 (P001), è stata eseguita l'analisi della sequenza del DNA di intere regioni codificanti dei geni UL56 e UL89 su campioni ottenuti da 40 soggetti adulti trattati con letermovir nella popolazione di pazienti randomizzati che aveva ricevuto almeno una dose del trattamento assegnato (popolazione FAS), che avevano manifestato insuccesso della profilassi e per i quali erano disponibili campioni per l'analisi. In due soggetti sono state rilevate GV resistenti a letermovir, entrambe con sostituzioni mappate in pUL56. In un soggetto era presente la sostituzione V236M e nell'altro soggetto era presente la sostituzione E237G. In un ulteriore soggetto, in cui il DNA del CMV era rilevabile al basale (e quindi non compreso nella popolazione FAS) erano presenti in pUL56 le sostituzioni C325W e R369T, rilevate dopo l'interruzione di letermovir.

In uno studio di fase 3 (P040), è stata eseguita l'analisi della sequenza del DNA di intere regioni codificanti dei geni UL51, UL56 e UL89 su campioni ottenuti da 32 soggetti adulti

(indipendentemente dal gruppo di trattamento) che avevano manifestato insuccesso della profilassi o che avevano interrotto precocemente il trattamento con viremia da CMV. Non sono state rilevate sostituzioni associate a resistenza a letermovir al di sopra del limite del 5% del test validato.

In uno studio di fase 3 (P002), è stata eseguita l'analisi della sequenza del DNA di intere regioni codificanti dei geni UL51, UL56 e UL89 su campioni ottenuti da 52 soggetti adulti trattati con letermovir che avevano manifestato malattia da CMV o che avevano interrotto precocemente il trattamento con viremia da CMV. Non sono state rilevate sostituzioni associate a resistenza a letermovir al di sopra del limite del 5% del test validato.

In uno studio di fase 2b (P030), è stata eseguita l'analisi della sequenza del DNA di intere regioni codificanti dei geni UL51, UL56 e UL89 su campioni ottenuti da 10 soggetti pediatrici trattati con letermovir durante una visita per la valutazione dell'infezione da CMV. In 2 soggetti sono state rilevate un totale di 2 sostituzioni associate alla resistenza a letermovir, entrambe mappate in pUL56. In un soggetto era presente la sostituzione R369S e nell'altro soggetto era presente la sostituzione C325W.

#### Resistenza crociata

È improbabile che si manifesti resistenza crociata con medicinali che possiedono un meccanismo d'azione differente. Letermovir è completamente attivo nei confronti di popolazioni virali con sostituzioni che conferiscono resistenza agli inibitori della DNA polimerasi del CMV (ganciclovir, cidofovir e foscarnet). Un gruppo di ceppi di CMV ricombinante con sostituzioni che conferiscono resistenza a letermovir era completamente sensibile a cidofovir, foscarnet e ganciclovir, ad eccezione di un ceppo ricombinante con la sostituzione E237G in pUL56 che conferisce una riduzione di 2,1 volte della sensibilità a ganciclovir rispetto al wild-type.

#### Elettrofisiologia cardiaca

In uno studio randomizzato, monodose, controllato con placebo e con controllo attivo (400 mg di moxifloxacina per via orale) con 4 periodi di crossover, è stato valutato l'effetto di letermovir sull'intervallo QTc in 38 soggetti adulti sani, con dosi fino a 960 mg somministrate per via endovenosa. Alla dose di 960 mg per via endovenosa, letermovir non prolunga il QTc in alcuna misura clinicamente rilevante, con concentrazioni plasmatiche circa 2 volte superiori rispetto alla dose di 480 mg per via endovenosa.

#### Efficacia e sicurezza clinica

##### *Adulti sieropositivi per CMV riceventi [R+] trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche*

###### *P001: Profilassi fino alla settimana 14 (circa 100 giorni) post HSCT*

Al fine di valutare la profilassi con letermovir come strategia di prevenzione dell'infezione o della malattia da CMV, l'efficacia di letermovir è stata valutata in uno studio di fase 3 multicentrico, in doppio cieco, controllato con placebo (P001) in adulti sieropositivi per CMV riceventi [R+] HSCT allogenico. I soggetti sono stati randomizzati (2:1) a ricevere letermovir a una dose di 480 mg una volta al giorno, aggiustata a 240 mg quando co-somministrato con ciclosporina, oppure placebo. La randomizzazione è stata stratificata per centro di sperimentazione e per rischio (alto vs. basso) di riattivazione del CMV al momento dell'ingresso nello studio. La terapia con letermovir è stata iniziata dopo HSCT (giorno 0-28 post HSCT) e continuata fino alla settimana 14 post HSCT. Letermovir è stato somministrato per via orale o per via endovenosa; la dose di letermovir era la stessa indipendentemente dalla via di somministrazione. I soggetti sono stati monitorati fino alla settimana 24 post HSCT per l'endpoint primario di efficacia e il follow-up è proseguito fino alla settimana 48 post HSCT.

I soggetti sono stati monitorati settimanalmente per il DNA del CMV, fino alla settimana 14 post HSCT e poi ogni due settimane fino alla settimana 24 post HSCT, con l'inizio della terapia

pre-emptive standard per il CMV se la DNAemia da CMV era considerata clinicamente significativa. I soggetti hanno proseguito il follow-up fino alla settimana 48 post HSCT.

Dei 565 soggetti trattati, 373 hanno ricevuto letermovir (di cui 99 hanno ricevuto almeno una dose per via endovenosa) e 192 hanno ricevuto il placebo (di cui 48 hanno ricevuto almeno una dose per via endovenosa). Il tempo mediano dell'inizio del trattamento con letermovir corrispondeva a 9 giorni dopo il trapianto. Nel trentasette per cento (37%) dei soggetti il trapianto ha attecchito al basale. L'età mediana era pari a 54 anni (intervallo: 18-78 anni); 56 (15,0%) soggetti erano di età pari o superiore a 65 anni; il 58% dei soggetti era di sesso maschile; l'82% era di etnia bianca, il 10% di etnia asiatica, il 2% di etnia nera o africana e il 7% di etnia ispanica o latina. Al basale, il 50% dei soggetti ha ricevuto un regime mieloablattivo, il 52% assumeva ciclosporina e il 42% assumeva tacrolimus. Le motivazioni principali del trapianto più comuni erano la leucemia mieloide acuta (38%), la sindrome mieloblastica (15%) e il linfoma (13%). Il dodici per cento (12%) dei soggetti era positivo per DNA del CMV al basale.

Al basale, il 31% dei soggetti era ad alto rischio di riattivazione, come definito da uno o più dei seguenti criteri: antigene leucocitario umano (*Human Leucocyte Antigen*, HLA) da donatore consanguineo (fratello) con almeno un mismatch in uno dei seguenti tre loci del gene HLA: HLA-A, -B o -DR, donatore aploidentico; donatore non consanguineo con almeno un mismatch in uno dei seguenti quattro loci del gene HLA: HLA-A, -B, -C e -DRB1; impiego di sangue del cordone ombelicale come fonte di cellule staminali; impiego di innesti *ex vivo* con deplezione di cellule T; malattia del trapianto contro l'ospite (GVHD) di grado 2 o superiore che richiede la somministrazione di corticosteroidi sistemici.

#### *Endpoint primario di efficacia*

L'endpoint primario di efficacia di infezione da CMV clinicamente significativa nello studio P001 era definito da un'incidenza di DNAemia da CMV che richiedesse una terapia pre-emptive (PET) anti-CMV o il verificarsi di una malattia da CMV con localizzazione d'organo. È stato utilizzato l'approccio non completamento=insuccesso (NC=I), secondo il quale i soggetti che interrompevano lo studio prima della settimana 24 post HSCT o che non presentavano un esito alla settimana 24 post HSCT sono stati considerati come insuccessi terapeutici.

Nell'analisi dell'endpoint primario, letermovir ha dimostrato un'efficacia superiore rispetto al placebo, come mostrato nella Tabella 4. La differenza tra i trattamenti stimata del -23,5% era statisticamente significativa (valore p unilaterale < 0,0001).

**Tabella 4: P001: Risultati di efficacia nei riceventi HSCT (approccio NC=I, popolazione FAS)**

<b>Parametro</b>	<b>Letermovir (N=325) n (%)</b>	<b>Placebo (N=170) n (%)</b>
Endpoint primario di efficacia (Percentuale di soggetti in cui si è verificato insuccesso della profilassi entro la settimana 24)	122 (37,5)	103 (60,6)
Motivi dell'insuccesso <sup>†</sup>		
Infezione da CMV clinicamente significativa	57 (17,5)	71 (41,8)
DNAemia da CMV che richiedeva la PET	52 (16,0)	68 (40,0)
Malattia da CMV con localizzazione d'organo	5 (1,5)	3 (1,8)
Interruzione dello studio	56 (17,2)	27 (15,9)
Assenza di esito	9 (2,8)	5 (2,9)
Differenza tra i trattamenti rettificata per strato (letermovir-placebo) <sup>§</sup>		
Differenza (IC 95%)	-23,5 (-32,5; -14,6)	
valore p	< 0,0001	

<sup>†</sup> Le categorie di insuccesso sono reciprocamente esclusive e basate sulla gerarchia delle categorie nell'ordine elencato.


<sup>§</sup> Gli IC al 95% e il valore p per le differenze tra i trattamenti nella percentuale di risposta sono stati calcolati usando il metodo di Mantel-Haenszel rettificato per strati, con la differenza ponderata mediante la media armonica della dimensione del campione per braccio per ogni strato (alto o basso rischio). Per dichiarare la significatività statistica è stato utilizzato un valore p unilaterale  $\leq 0,0249$ .  
FAS=Full analysis set (serie completa di analisi); la popolazione FAS include soggetti randomizzati che hanno ricevuto almeno una dose del medicinale in studio ed esclude soggetti con DNA del CMV rilevabile al basale. Approccio per la gestione di valori mancanti: approccio non completamento=insuccesso (NC=I). Con l'approccio NC=I, l'insuccesso è stato determinato da tutti i soggetti con un'infezione da CMV clinicamente significativa o che hanno interrotto prematuramente lo studio, o che non hanno presentato un esito nel corso della finestra temporale per la visita della settimana 24 post HSCT.

N=numero di soggetti in ciascun gruppo di trattamento.  
n (%)=numero (percentuale) di soggetti in ciascuna sottocategoria.

Nota: la percentuale dei soggetti con DNA del CMV rilevabile al giorno 1 che ha sviluppato infezione da CMV clinicamente significativa alla settimana 24 post HSCT nel gruppo letermovir è stata del 64,6% (31/48) rispetto al 90,9% (20/22) nel gruppo placebo. La differenza stimata (IC 95% per la differenza) è stata -26,1% (-45,9%; -6,3%), con un valore p nominale unilaterale < 0,0048.

I fattori associati alla DNAemia da CMV dopo la settimana 14 post HSCT tra i soggetti trattati con letermovir includevano l'alto rischio di riattivazione del CMV al basale, GVHD, l'uso di corticosteroidi e lo stato sierologico del donatore negativo per CMV.


**Figura 1: P001: Diagramma di Kaplan-Meier del tempo all'inizio della PET anti-CMV o all'insorgenza di malattia da CMV con localizzazione d'organo fino alla settimana 24 post trapianto nei riceventi HSCT (popolazione FAS)**



Non vi sono state differenze in termini di incidenza o di tempo dell'atteccimento tra il gruppo di letermovir e quello placebo.

L'efficacia è risultata coerentemente a favore di letermovir in tutti i sottogruppi, compresi quelli a basso e ad alto rischio di riattivazione del CMV, in regime di condizionamento e in regime immunosoppressivo concomitante (vedere Figura 2).

**Figura 2: P001: diagramma di Forest della percentuale di soggetti che iniziavano la PET anti-CMV o con malattia da CMV con localizzazione d'organo fino alla settimana 24 post HSCT per sottogruppi selezionati (approccio NC=I, popolazione FAS)**



NC=I, non completamento=insuccesso. Con l'approccio non completamento=insuccesso (NC=I), i soggetti che interrompevano lo studio prima della settimana 24 post trapianto o che non presentavano un esito alla settimana 24 post trapianto sono stati considerati come insuccessi terapeutici.

#### P040: Profilassi dalla settimana 14 (circa 100 giorni) fino alla settimana 28 (circa 200 giorni) post HSCT

L'efficacia dell'estensione della profilassi con letermovir dalla settimana 14 (circa 100 giorni) fino alla settimana 28 (circa 200 giorni) post HSCT in pazienti a rischio di infezione e malattia da CMV tardive è stata valutata in uno studio di fase 3 (P040) multicentrico, in doppio cieco, controllato con placebo in adulti sieropositivi per CMV riceventi [R+] HSCT allogenico. I soggetti idonei che avevano completato la profilassi con letermovir fino a circa 100 giorni post HSCT sono stati randomizzati (2:1) a ricevere letermovir o placebo dalla settimana 14 fino alla settimana 28 post HSCT. I soggetti sono stati monitorati fino alla settimana 28 post HSCT per l'endpoint primario di efficacia con follow-up continuo dopo la sospensione del trattamento fino alla settimana 48 post HSCT.

Dei 218 soggetti trattati, 144 soggetti hanno ricevuto letermovir e 74 hanno ricevuto il placebo. L'età mediana era pari a 55 anni (intervallo: da 20 a 74 anni); il 62% dei soggetti era di sesso maschile; il 79% era di etnia bianca; l'11% di etnia asiatica; il 2% di etnia nera e il 10% era di etnia ispanica o latina. Le motivazioni del trapianto più comuni erano la leucemia mieloide acuta (42%), la leucemia linfocitica acuta (15%) e la sindrome mielodisplastica (11%).

All'ingresso nello studio, tutti i soggetti presentavano fattori di rischio per infezione e malattia da CMV tardive, con il 64% che presentava due o più fattori di rischio. I fattori di rischio comprendevano: HLA da donatore consanguineo (fratello) con almeno un mismatch in uno dei seguenti tre loci del gene HLA: HLA-A, -B o -DR; donatore aploidentico; donatore non consanguineo

con almeno un mismatch in uno dei seguenti quattro loci del gene HLA: HLA-A, -B, -C e -DRB1; impiego di sangue del cordone ombelicale come fonte di cellule staminali; impiego di innesti *ex vivo* con deplezione di cellule T; trattamento con globulina anti-timociti; trattamento con alemtuzumab; impiego di prednisone sistematico (o equivalente) alla dose di  $\geq 1$  mg/kg di peso corporeo al giorno.

#### *Endpoint primario di efficacia*

L'endpoint primario di efficacia dello studio P040 era l'incidenza dell'infezione da CMV clinicamente significativa fino alla settimana 28 post HSCT. L'infezione da CMV clinicamente significativa è stata definita come l'insorgenza di malattia da CMV con localizzazione d'organo o l'inizio della PET anti-CMV sulla base della viremia da CMV documentata e della condizione clinica del soggetto. È stato utilizzato l'approccio *Observed Failure* (OF), secondo il quale i soggetti che avevano sviluppato un'infezione da CMV clinicamente significativa o avevano interrotto prematuramente lo studio con viremia sono stati considerati come insuccessi terapeutici.

Nell'analisi dell'endpoint primario, letermovir ha dimostrato un'efficacia superiore rispetto al placebo, come mostrato nella Tabella 5. La differenza tra i trattamenti stimata del -16,1% era statisticamente significativa (valore p unilaterale=0,0005). L'efficacia è stata costantemente a favore di letermovir nei sottogruppi in base alle caratteristiche dei soggetti (età, sesso, etnia) e ai fattori di rischio per infezione e malattia da CMV tardive.

**Tabella 5: P040: Risultati di efficacia nei riceventi HSCT a rischio di infezione e malattia da CMV tardive (approccio OF, popolazione FAS)**

Parametro	Letermovir (circa 200 giorni di letermovir) (N=144) n (%)	Placebo (circa 100 giorni di letermovir) (N=74) n (%)
<b>Insuccessi*</b>		
Infezione da CMV clinicamente significativa fino alla settimana 28 <sup>†</sup>	4 (2,8) 2 (1,4)	14 (18,9) 13 (17,6)
Inizio della PET sulla base della viremia da CMV documentata	1 (0,7)	11 (14,9)
Malattia da CMV con localizzazione d'organo	1 (0,7)	2 (2,7)
Interruzione dello studio con viremia da CMV prima della settimana 28	2 (1,4)	1 (1,4)
<b>Differenza tra i trattamenti rettificata per strato (letermovir (circa 200 giorni di letermovir)-Placebo (circa 100 giorni di letermovir))<sup>‡</sup></b>		
Differenza (IC 95%) valore p	-16,1 (-25,8; -6,5) 0,0005	

\* Le categorie di insuccesso sono reciprocamente esclusive e basate sulla gerarchia delle categorie nell'ordine elencato.

<sup>†</sup> L'infezione da CMV clinicamente significativa è stata definita come malattia da CMV con localizzazione d'organo (accertata o probabile) o l'inizio della PET sulla base della viremia da CMV documentata e della condizione clinica del soggetto.

<sup>‡</sup> Gli IC al 95% e il valore p per le differenze tra i trattamenti nella percentuale di risposta sono stati calcolati usando il metodo di Mantel-Haenszel rettificato per strati, con la differenza ponderata mediante la media armonica della dimensione del campione per braccio per ogni strato (donatore aploidentico sì o no). Per dichiarare la significatività statistica è stato utilizzato un valore p unilaterale  $\leq 0,0249$ .

Approccio per la gestione di valori mancanti: approccio *Observed Failure* (OF). Con l'approccio OF, l'insuccesso è stato determinato da tutti i soggetti che hanno sviluppato un'infezione da CMV clinicamente significativa o che hanno interrotto prematuramente lo studio con viremia da CMV dalla settimana 14 (circa 100 giorni) fino alla settimana 28 (circa 200 giorni) post HSCT.

N=numero di soggetti in ciascun gruppo di trattamento.

n (%)=numero (percentuale) di soggetti in ciascuna sottocategoria.

*P002: Adulto sieronegativo per CMV sottoposto a un trapianto di rene da un donatore sieropositivo per CMV [D+/R-]*

Per valutare la profilassi con letermovir come strategia preventiva per la malattia da CMV nei pazienti sottoposti a trapianto di rene, l'efficacia di letermovir è stata valutata in uno studio di non inferiorità di fase 3 (P002) multicentrico, in doppio cieco, controllato con comparatore attivo in adulti ad alto rischio [D+/R-] sottoposti a trapianto di rene. I soggetti sono stati randomizzati (1:1) a ricevere letermovir o valganciclovir. Letermovir è stato somministrato in concomitanza con aciclovir.

Valganciclovir è stato somministrato in concomitanza con placebo ad aciclovir. La randomizzazione è stata stratificata in base all'uso o non uso di un'immunoterapia antilinfocitaria altamente citolitica durante l'induzione. Il trattamento con letermovir o valganciclovir è iniziato tra il giorno 0 e il giorno 7 post trapianto di rene ed è stato proseguito fino alla settimana 28 (circa 200 giorni) post trapianto. I soggetti sono stati monitorati fino alla settimana 52 post trapianto.

Dei 589 soggetti trattati, 292 soggetti hanno ricevuto letermovir e 297 hanno ricevuto valganciclovir. L'età media era pari a 51 anni (intervallo: da 18 a 82 anni); il 72% dei soggetti era di sesso maschile; l'84% era di etnia bianca; il 2% di etnia asiatica; il 9% di etnia nera; il 17% era di etnia ispanica o latina e il 60% aveva ricevuto un rene da un donatore deceduto. Le motivazioni principali del trapianto più comuni erano la malattia cistica del rene congenita (17%), l'ipertensione (16%) e il/la diabete/nefropatia diabetica (14%).

*Endpoint primario di efficacia*

L'endpoint primario di efficacia dello studio P002 era l'incidenza della malattia da CMV (malattia da CMV con localizzazione d'organo o sindrome da CMV, confermata da un comitato di valutazione indipendente) fino alla settimana 52 post trapianto. È stato utilizzato l'approccio OF, secondo il quale i soggetti che avevano interrotto prematuramente lo studio per qualsiasi motivo o per i quali non vi erano dati al *timepoint* non sono stati considerati come insuccessi terapeutici.

Nell'analisi dell'endpoint primario, letermovir ha dimostrato una non inferiorità rispetto a valganciclovir, come mostrato nella Tabella 6.

**Tabella 6: P002: Risultati di efficacia nei riceventi trapianto di rene (approccio OF, popolazione FAS)**

Parametro	Letermovir (N=289) n (%)	Valganciclovir (N=297) n (%)
<b>Malattia da CMV* fino alla settimana 52</b>	<b>30 (10,4)</b>	<b>35 (11,8)</b>
<b>Differenza tra i trattamenti rettificata per strato (letermovir-valganciclovir)<sup>†</sup></b>		
Differenza (IC 95%)		-1,4 (-6,5; 3,8) <sup>‡</sup>

\* I casi di malattia da CMV sono stati confermati da un comitato di valutazione indipendente.

† Gli IC al 95% per le differenze tra i trattamenti nella percentuale di risposta sono stati calcolati usando il metodo di Mantel-Haenszel rettificato per strati, con la differenza ponderata mediante la media armonica della dimensione del campione per braccio per ogni strato (uso/non uso di un'immunoterapia antilinfocitaria altamente citolitica durante l'induzione).

‡ Sulla base di un margine di non inferiorità del 10%, letermovir è non inferiore a valganciclovir.

Approccio per la gestione di valori mancanti: approccio *Observed Failure* (OF). Con l'approccio OF, i partecipanti che avevano interrotto prematuramente lo studio per qualsiasi motivo non sono stati considerati come insuccessi terapeutici.

Nota: Ai soggetti randomizzati nel gruppo letermovir è stato somministrato aciclovir per la profilassi del virus herpes simplex (*herpes simplex virus*, HSV) e del virus varicella zoster (*varicella zoster virus*, VZV). Ai soggetti randomizzati nel gruppo valganciclovir è stato somministrato placebo ad aciclovir.

N=numero di soggetti in ciascun gruppo di trattamento.

n (%)=numero (percentuale) di soggetti in ciascuna sottocategoria.

L'efficacia è risultata comparabile in tutti i sottogruppi, compresi sesso, età, etnia, regione e uso/non uso di un'immunoterapia antilinfocitaria altamente citolitica durante l'induzione.

### Popolazione pediatrica

#### *P030: Pazienti pediatrici riceventi trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche*

Al fine di valutare la profilassi con letermovir come strategia di prevenzione dell'infezione o della malattia da CMV nei pazienti pediatrici sottoposti a trapianto, l'efficacia di letermovir è stata valutata in uno studio di fase 2b (P030) multicentrico, in aperto, a braccio singolo in pazienti pediatrici riceventi HSCT allogenico. La terapia con il medicinale in studio è iniziata dopo HSCT (giorno 0-28 post HSCT) e continuato fino alla settimana 14 post HSCT. Il medicinale in studio è stato somministrato per via orale o per via endovenosa; la dose di letermovir è stata basata su età, peso corporeo e formulazione.

Dei 63 soggetti trattati, 8 avevano un'età compresa tra 0 e inferiore a 2 anni, 27 avevano un'età compresa tra 2 e inferiore a 12 anni e 28 avevano un'età compresa tra 12 e inferiore a 18 anni. Al basale, l'87% dei soggetti ha ricevuto un regime mieloablattivo, il 67% assumeva ciclosporina e il 27% assumeva tacrolimus. Le motivazioni principali del trapianto più comuni erano la leucemia mieloide acuta (18%) e l'anemia aplastica (10%) nella popolazione globale e immunodeficienza combinata (37,5%) e linfoistiocitosi emofagocitica familiare (25,0%) nei bambini di età inferiore a 2 anni.

#### *Endpoint secondario di efficacia*

L'endpoint di efficacia dello studio P030 è stato secondario e includeva l'incidenza di infezione da CMV clinicamente significativa fino alla settimana 14 post HSCT e fino alla Settimana 24 post HSCT. L'infezione da CMV clinicamente significativa era definita come l'insorgenza della malattia da CMV con localizzazione d'organo o l'inizio della PET anti-CMV sulla base della viremia da CMV documentata e della condizione clinica del soggetto. L'incidenza di infezione da CMV clinicamente significativa è stata di 7,1% e di 10,7% rispettivamente fino alla settimana 14 post HSCT e alla settimana 24 post HSCT.

## **5.2 Proprietà farmacocinetiche**

Nei soggetti adulti sani, la farmacocinetica di letermovir è stata caratterizzata in seguito alla somministrazione per via orale e per via endovenosa. L'esposizione a letermovir è aumentata in misura superiore a quella proporzionale alla dose con entrambe le somministrazioni per via orale o per via endovenosa. È probabile che il meccanismo sia la saturazione/autoinibizione di OATP1B1/3. La farmacocinetica di letermovir è stata anche caratterizzata in seguito alla somministrazione per via orale e per via endovenosa negli adulti riceventi HSCT (vedere Tabella 7) e nei pazienti pediatrici riceventi HSCT (vedere Tabella 9 e Tabella 10) e in seguito alla somministrazione per via orale negli adulti riceventi trapianto di rene (vedere Tabella 8).

#### *Soggetti adulti sani*

La media geometrica dei valori AUC e C<sub>max</sub> allo stato stazionario era pari a 71 500 ng•hr/mL e 13 000 ng/mL, rispettivamente, con letermovir 480 mg assunto per via orale una volta al giorno.

Letermovir ha raggiunto lo stato stazionario in 9-10 giorni, con un tasso di accumulo di 1,2 per l'AUC e di 1,0 per la C<sub>max</sub>.

#### *Adulti riceventi HSCT*

L'AUC di letermovir è stata stimata utilizzando l'analisi farmacocinetica di popolazione usando i dati dello studio di fase 3 P001 (vedere Tabella 7). Le differenze nell'esposizione tra i regimi di trattamento non sono clinicamente rilevanti; l'efficacia è risultata coerente in tutto l'intervallo di esposizioni osservate nello studio P001.

**Tabella 7: Valori dell'AUC di letermovir (ng•hr/mL) negli adulti riceventi HSCT**

<b>Regime di trattamento</b>	<b>Mediana (intervallo di previsione 90%)*</b>
480 mg per via orale, senza ciclosporina	34 400 (16 900; 73 700)
480 mg per via endovenosa, senza ciclosporina	100 000 (65 300; 148 000)
240 mg per via orale, con ciclosporina	60 800 (28 700; 122 000)
240 mg per via endovenosa, con ciclosporina	70 300 (46 200; 106 000)

\* Previsioni a posteriori per la popolazione ottenute dall'analisi farmacocinetica (Pharmacokinetics, PK) di popolazione usando i dati della fase 3

*Adulti riceventi trapianto di rene*

L'AUC di letermovir è stata stimata utilizzando l'analisi farmacocinetica di popolazione usando i dati dello studio di fase 3 P002 (vedere Tabella 8). L'efficacia è risultata coerente in tutto l'intervallo di esposizioni osservate nello studio P002.

**Tabella 8: Valori dell'AUC di letermovir (ng•hr/mL) negli adulti riceventi trapianto di rene**

<b>Regime di trattamento</b>	<b>Mediana (intervallo di previsione 90%)*</b>
480 mg per via orale, senza ciclosporina	62 200 (28 900; 145 000)
240 mg per via orale, con ciclosporina	57 700 (26 900; 135 000)

\* Le mediane e gli intervalli di previsione al 90% si basano su simulazioni che utilizzano il modello di PK di popolazione della fase 3 con variabilità interindividuale.

Nota: la PK di letermovir non è stata studiata dopo la somministrazione per via endovenosa nei riceventi trapianto di rene; tuttavia, l'AUC prevista dopo la somministrazione per via endovenosa è simile al modello dell'AUC prevista dopo la somministrazione per via endovenosa nei riceventi HSCT (vedere Tabella 7).

Assorbimento

Nei soggetti adulti sani, letermovir è stato assorbito rapidamente con un tempo mediano alla concentrazione plasmatica massima ( $T_{max}$ ) da 1,5 a 3,0 ore e diminuiva con un andamento bifasico. Negli adulti riceventi HSCT, si stima che la biodisponibilità di letermovir sia circa del 35%, con letermovir alla dose di 480 mg per via orale una volta al giorno, somministrato senza ciclosporina. Si stima che la variabilità interindividuale della biodisponibilità sia circa del 37%. Negli adulti riceventi trapianto di rene, si stima che la biodisponibilità di letermovir sia circa del 60%, con letermovir alla dose di 480 mg per via orale una volta al giorno, somministrato senza ciclosporina.

*Effetto della ciclosporina*

Negli adulti riceventi HSCT, la co-somministrazione di ciclosporina ha determinato un aumento delle concentrazioni plasmatiche di letermovir a causa dell'inibizione del OATP1B. Nei pazienti si stima che la biodisponibilità di letermovir sia circa dell'85%, con letermovir alla dose di 240 mg per via orale una volta al giorno, co-somministrato con ciclosporina.

Se letermovir viene co-somministrato con ciclosporina, la dose raccomandata di letermovir è di 240 mg una volta al giorno in pazienti adulti e pediatrici di peso corporeo di almeno 30 kg (vedere paragrafo 4.2). Se letermovir per via endovenosa viene co-somministrato con ciclosporina in pazienti pediatrici di peso corporeo inferiore a 30 kg, non è richiesto alcun adattamento della dose (vedere paragrafo 4.2).

*Effetto del cibo*

In soggetti adulti sani, la somministrazione per via orale di una dose singola di una compressa di letermovir da 480 mg durante un pasto standard ad alto contenuto lipidico e calorico non ha avuto alcun effetto sull'esposizione complessiva (AUC) e ha determinato un aumento dei livelli di picco

( $C_{max}$ ) di letermovir di circa il 30%. Letermovir compresse può essere somministrato per via orale con o senza cibo, secondo quanto effettuato negli studi clinici (vedere paragrafo 4.2).

In soggetti adulti sani, la somministrazione per via orale di una dose singola di letermovir granulato da 240 mg con cibi morbidi (budino o purea di mela) ha determinato un aumento di circa il 13% e il 20% dell'esposizione complessiva (AUC) e ha determinato un aumento dei livelli di picco ( $C_{max}$ ) di letermovir di circa il 25% e il 33%. Letermovir granulato può essere somministrato con cibi morbidi, così come è avvenuto nello studio pediatrico (vedere paragrafo 4.2).

#### Distribuzione

Sulla base dell'analisi farmacocinetica di popolazione, in seguito alla somministrazione endovenosa negli adulti riceventi HSCT, si stima che il volume di distribuzione medio allo stato stazionario sia 45,5 L.

*In vitro* letermovir è ampiamente legato (98,2%) alle proteine plasmatiche umane, indipendentemente dall'intervallo di concentrazione (da 3 a 100 mg/L) valutato. Una certa saturazione è stata osservata a concentrazioni inferiori. La ripartizione sangue-plasma di letermovir corrisponde a 0,56 ed è indipendente dall'intervallo delle concentrazioni (da 0,1 a 10 mg/L) valutato *in vitro*.

Negli studi preclinici sulla distribuzione, letermovir viene distribuito a organi e tessuti, con le concentrazioni più alte osservate nell'apparato gastrointestinale, nei dotti biliari e nel fegato e con concentrazioni basse nell'encefalo.

#### Biotrasformazione

Nel plasma, la maggior parte dei componenti correlati a letermovir è costituita da precursori immodificati (96,6%). Non sono stati rilevati metaboliti rilevanti nel plasma. Letermovir viene parzialmente eliminato tramite glucuronidazione mediata da UGT1A1/1A3.

#### Eliminazione

Nei soggetti adulti sani, con la dose di 480 mg per via endovenosa l'emivita terminale media apparente di letermovir è di circa 12 ore. Le principali vie di eliminazione di letermovir sono l'escrezione biliare e la glucuronidazione diretta. Il processo coinvolge i trasportatori del trasporto attivo epatico OATP1B1 e 3, seguito dalla glucuronidazione catalizzata da UGT1A1/3.

Sulla base dell'analisi farmacocinetica di popolazione, si stima che la CL apparente di letermovir allo stato stazionario in seguito alla somministrazione endovenosa di 480 mg negli adulti riceventi HSCT sia di 4,84 L/h. Si stima che la variabilità interindividuale della CL sia del 24,6%.

#### Escrezione

Dopo somministrazione per via orale di letermovir radiomarcato, il 93,3% della radioattività è stata riscontrata nelle feci. La maggior parte di letermovir è stata escreta a livello biliare come precursore immodificato, con una quantità minore (6% della dose) sotto forma del metabolita acilglucuronide nelle feci. L'acilglucuronide è instabile nelle feci. L'escrezione urinaria di letermovir è stata trascurabile (< 2% della dose).

#### Farmacocinetica in popolazioni speciali

##### *Compromissione epatica*

Nei soggetti adulti con compromissione epatica di grado moderato (Child-Pugh classe B [CP-B], punteggio 7-9) e severo (Child-Pugh classe C [CP-C], punteggio 10-15), l'AUC di letermovir libero è risultata rispettivamente di circa l'81% e 4 volte maggiore rispetto ai soggetti adulti sani. Le variazioni nell'esposizione a letermovir nei soggetti adulti con compromissione epatica moderata non sono clinicamente rilevanti.

Sono previsti aumenti marcati nell'esposizione a letermovir libero nei pazienti con compromissione epatica moderata associata a compromissione renale moderata o severa (vedere paragrafo 4.2).

#### *Compromissione renale*

##### *Studio clinico in una popolazione con compromissione renale*

Nei soggetti adulti con compromissione renale di grado moderato (eGFR pari a 31,0-56,8 mL/min/1,73m<sup>2</sup>) e severo (eGFR pari a 11,9-28,1 mL/min/1,73m<sup>2</sup>), l'AUC di letermovir libero è risultata rispettivamente di circa il 115 e l'81% maggiore rispetto ai soggetti adulti sani. Le variazioni nell'esposizione a letermovir dovute alla compromissione renale da moderata a severa non sono clinicamente rilevanti. I soggetti con ESRD non sono stati studiati.

#### *Post trapianto di rene (P002)*

Sulla base dell'analisi farmacocinetica di popolazione, l'AUC di letermovir è risultata rispettivamente di circa il 12%, 27% e 35% più alta nei soggetti adulti con compromissione renale lieve (CrCl maggiore o uguale da 60 a meno di 90 mL/min), moderata (CrCl maggiore o uguale da 30 a meno di 60 mL/min) e severa (CrCl maggiore o uguale da 15 a meno di 30 mL/min), rispetto ai soggetti adulti con CrCl maggiore o uguale a 90 mL/min. Questi cambiamenti non sono considerati clinicamente rilevanti.

#### *Peso*

Sulla base dell'analisi farmacocinetica di popolazione nei soggetti adulti sani, si stima che l'AUC di letermovir sia inferiore del 18,7% nei soggetti con peso corporeo pari a 80-100 kg rispetto a quelli con peso pari a 67 kg. Sulla base dell'analisi farmacocinetica di popolazione negli adulti riceventi trapianto di rene (P002), si stima che l'AUC di letermovir sia inferiore del 26% nei soggetti con peso corporeo superiore a 80 kg rispetto a quelli con peso inferiore o pari a 80 kg. Queste differenze non sono clinicamente rilevanti.

#### *Etnia*

Sulla base dell'analisi farmacocinetica di popolazione nei soggetti adulti sani, si stima che l'AUC di letermovir sia più elevata nella misura del 33,2% nei soggetti di etnia asiatica rispetto a quelli di etnia bianca. Questa variazione non è clinicamente rilevante.

#### *Sesso*

Sulla base dell'analisi farmacocinetica di popolazione, non vi è alcuna differenza nella farmacocinetica di letermovir nelle donne adulte rispetto agli uomini.

#### *Anziani*

Sulla base dell'analisi farmacocinetica di popolazione, l'età non ha alcun effetto sulla farmacocinetica di letermovir. Non è necessario alcun adattamento della dose in base all'età.

#### *Popolazione pediatrica*

L'AUC di letermovir nei pazienti pediatrici riceventi HSCT è stata stimata mediante l'analisi farmacocinetica di popolazione usando i dati di farmacocinetica osservati nello studio P030 (vedere Tabella 9 e Tabella 10). Le esposizioni per i pazienti pediatrici riceventi HSCT in tutte le fasce di peso corporeo rientrano nell'intervallo di esposizioni raggiunte nelle esposizioni di riferimento per gli adulti riceventi HSCT (vedere Tabella 7).

**Tabella 9: Valori dell'AUC di letermovir (ng•hr/mL) dopo somministrazione per via orale nei pazienti pediatrici riceventi HSCT**

Peso corporeo	Dose orale, senza ciclosporina	Mediana (intervallo di previsione 90%)*	Dose orale, con ciclosporina	Mediana (intervallo di previsione 90%)*
pari e superiore a 30 kg	480 mg	39 100 (18 700-81 300)	240 mg	49 100 (23 200-104 000)
da 15 kg a meno di 30 kg	240 mg	38 900 (20 200-74 300)	120 mg	51 000 (26 600-98 200)
da 7,5 kg a meno di 15 kg	120 mg	32 000 (16 700-59 300)	60 mg	41 600 (22 300-81 100)
da 5 kg a meno di 7,5 kg	80 mg	30 600 (16 200-55 000)	40 mg	39 000 (20 600-72 000)

\* Le mediane e gli intervalli di previsione al 90% si basano su simulazioni che utilizzano il modello di PK di popolazione pediatrica HSCT con variabilità interindividuale.

**Tabella 10: Valori dell'AUC di letermovir (ng•hr/mL) dopo somministrazione per via endovenosa nei pazienti pediatrici riceventi HSCT**

Peso corporeo	Dose orale, senza ciclosporina	Mediana (intervallo di previsione 90%)*	Dose orale, con ciclosporina	Mediana (intervallo di previsione 90%)*
pari e superiore a 30 kg	480 mg	111 000 (55 700-218 000)	240 mg	59 800 (28 400-120 000)
da 15 kg a meno di 30 kg	120 mg	57 200 (29 700-113 000)	120 mg	61 100 (29 900-121 000)
da 7,5 kg a meno di 15 kg	60 mg	46 000 (24 300-83 900)	60 mg	49 200 (25 800-93 800)
da 5 kg a meno di 7,5 kg	40 mg	43 400 (24 300-81 000)	40 mg	45 900 (24 900-82 200)

\* Le mediane e gli intervalli di previsione al 90% si basano su simulazioni che utilizzano il modello di PK di popolazione pediatrica HSCT con variabilità interindividuale.

### 5.3 Dati preclinici di sicurezza

#### Tossicità generale

È stata osservata tossicità testicolare irreversibile soltanto nei ratti per esposizioni sistemiche (AUC)  $\geq$  3 volte l'esposizione umana alla dose raccomandata per l'uomo (Recommended Human Dose, RHD). Tale tossicità è stata caratterizzata da degenerazione dei tubuli seminali e oligospermia e presenza di detriti cellulari negli epididimi, con riduzione del peso testicolare ed epididimario. Non è emersa tossicità testicolare nei ratti a esposizioni (AUC) simili a quelle dell'uomo alla RHD. Nei topi e nelle scimmie non è stata osservata tossicità testicolare alle dosi più alte studiate, con esposizioni rispettivamente fino a 4 e 2 volte quelle dell'uomo alla RHD. La rilevanza per l'uomo non è nota.

È noto che, quando somministrata per via endovenosa a dosi superiori a 50 mg/kg/die, l'idrossipropilbetadex può causare vacuolizzazione renale nei ratti. È stata osservata vacuolizzazione a livello renale nei ratti a cui è stato somministrato letermovir per via endovenosa in una formulazione contenente 1 500 mg/kg/die dell'eccipiente della ciclodestrina idrossipropilbetadex.

La somministrazione parenterale di idrossipropilbetadex a  $\geq$  2 000 mg/kg è stata associata a perdita dell'udito derivante da danni all'orecchio interno in diverse specie animali. In confronto, la dose massima di idrossipropilbetadex (120 mg/kg) in PREVYMIIS per via endovenosa alla dose massima raccomandata nell'uomo (*maximum recommended human dose*, MRHD) (120 mg/kg) non è stata associata a perdita dell'udito in nessuno studio sugli animali. Il principio attivo, letermovir, non è noto per essere associato a ototossicità.

## Cancerogenesi

Uno studio di cancerogenesi per via orale della durata di 6 mesi condotto su topi transgenici RasH2 (Tg.RasH2) non ha mostrato evidenza di tumorigenesi rilevante per l'uomo fino alle dosi più elevate testate, 150 mg/kg/die e 300 mg/kg/die rispettivamente nei maschi e nelle femmine.

## Mutagenesi

Letermovir non si è dimostrato genotossico in una batteria di test *in vitro* o *in vivo*, tra cui analisi di mutagenesi microbica e aberrazioni cromosomiche nelle cellule ovariche di criceto cinese, e in uno studio del micronucleo murino *in vivo*.

## Riproduzione

### *Fertilità*

Negli studi sulla fertilità e sullo sviluppo embrionale iniziale nel ratto, non vi è stato alcun effetto di letermovir sulla fertilità femminile. Nei maschi di ratto, sono state osservate riduzioni della concentrazione di spermatozoi, della loro motilità e della fertilità per esposizioni sistemiche  $\geq 3$  volte l'AUC nell'uomo alla RHD (vedere Tossicità generale).

Nelle scimmie a cui veniva somministrato letermovir, in base alla valutazione istopatologica, la misurazione della dimensione testicolare, l'analisi ematica ormonale (ormone follicolo-stimolante, inibina B e testosterone) e la valutazione degli spermatozoi (conta spermatica, motilità e morfologia), non è stata rilevata alcuna evidenza di tossicità testicolare per esposizioni sistemiche pari a circa 2 volte l'AUC nell'uomo alla RHD.

## Sviluppo

Nei ratti, è stata osservata una tossicità materna (compresa la diminuzione nel peso corporeo) alla dose di 250 mg/kg/die (circa 11 volte la AUC alla RHD); nella prole sono stati osservati una riduzione del peso fetale con ossificazione ritardata, leggero edema fetale e un aumento dell'incidenza di brevità del cordone ombelicale e di variazioni e malformazioni a livello vertebrale, costale e pelvico. Alla dose di 50 mg/kg/die (circa 2,5 volte l'AUC alla RHD) non è stato osservato alcun effetto sulla madre o sullo sviluppo fetale.

Nei conigli è stata osservata una tossicità materna (tra cui mortalità e aborti) alla dose di 225 mg/kg/die (circa 2 volte la AUC alla RHD); nella prole è stato osservato un aumento dell'incidenza di malformazioni e variazioni a livello vertebrale e costale.

Nello studio sullo sviluppo pre e postnatale, letermovir è stato somministrato per via orale a femmine di ratto gravide. Non è stata osservata alcuna tossicità sullo sviluppo fino alla massima esposizione studiata (2 volte l'AUC alla RHD).

## **6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE**

### **6.1 Elenco degli eccipienti**

Idrossipropilbetadex (ciclodestrina)  
Sodio cloruro  
Sodio idrossido (E524)  
Acqua per preparazioni iniettabili

## **6.2 Incompatibilità**

### Medicinali incompatibili

PREVYMIS concentrato per soluzione per infusione è fisicamente incompatibile con amiodarone cloridrato, amfotericina B (liposomiale), aztreonam, cefepime cloridrato, ciprofloxacina, ciclosporina, diltiazem cloridrato, filgrastim, gentamicina solfato, levofloxacina, linezolid, lorazepam, midazolam HCl, micofenolato mofetile cloridrato, ondansetron, palonosetron.

Questo medicinale non deve essere miscelato con altri medicinali ad eccezione di quelli menzionati nel paragrafo 6.6.

### Materiali delle sacche per infusione endovenosa e dei set per infusione incompatibili

PREVYMIS concentrato per soluzione per infusione è incompatibile con plastificanti in dietilesilftalato (DEHP) e i set di tubi per somministrazione per via endovenosa contenenti poliuretano.

Questo medicinale non deve essere utilizzato con sacche per infusione endovenosa e set per infusione in materiali diversi da quelli indicati al paragrafo 6.6.

## **6.3 Periodo di validità**

Flaconcino non aperto: 3 anni

Dopo l'apertura: usare immediatamente

### Conservazione della soluzione diluita

La stabilità chimica e fisica durante l'uso è stata dimostrata per 48 ore a 25 °C e per 48 ore a 2-8 °C. Da un punto di vista microbiologico, il prodotto deve essere utilizzato immediatamente. In caso contrario, l'utilizzatore sarà responsabile dei tempi di conservazione dopo la prima apertura e delle modalità di conservazione prima dell'uso del prodotto, che normalmente dovrà essere utilizzato nell'arco delle 24 ore e conservato a una temperatura di 2-8 °C, salvo il caso in cui la diluizione sia stata eseguita in condizioni asettiche controllate e validate.

## **6.4 Precauzioni particolari per la conservazione**

Questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione.

Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Per le condizioni di conservazione dopo la diluizione vedere paragrafo 6.3.

## **6.5 Natura e contenuto del contenitore**

Flaconcino di vetro trasparente tipo I (30 mL) con tappo di clorobutile rivestito di fluoro da 20 mm con capsula rimovibile (flip-off) in alluminio contenente 12 mL (tappo verde) o 24 mL (tappo blu scuro) di soluzione.

Confezione: 1 flaconcino.

## **6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione**

I flaconcini di PREVYMIS sono esclusivamente monouso.

### Preparazione

PREVYMIS concentrato per soluzione per infusione deve essere diluito prima dell'uso endovenoso.

Prima della diluizione esaminare il contenuto del flaconcino per escludere la presenza di particelle e alterazioni del colore. PREVYMIS concentrato per soluzione per infusione è una soluzione limpida, incolore e può contenere alcune piccole particelle traslucide o bianche correlate al prodotto. Non utilizzare il flaconcino se la soluzione è opaca, presenta alterazioni del colore o contiene particelle diverse da alcune piccole particelle traslucide o bianche.

Non utilizzare PREVYMIS concentrato per soluzione per infusione con sacche per endovena e set per infusione contenenti poliuretano o plastificanti in dietilesilftalato (DEHP). I materiali privi di ftalati sono anche privi di DEHP.

Non agitare il flaconcino di PREVYMIS.

Per la **dose da 480 mg o da 240 mg**, aggiungere il contenuto di un flaconcino monodoso (12 mL (dose da 240 mg) o 24 mL (dose da 480 mg)) di PREVYMIS concentrato per soluzione per infusione a una sacca per endovena preriempita da 250 mL contenente soluzione iniettabile di sodio cloruro 9 mg/mL (0,9%) oppure destrosio al 5% e miscelare la soluzione diluita capovolgendola delicatamente. Non agitare. Se il contenuto di un flaconcino viene aggiunto a una sacca per endovena con diluente da 250 mL, gli intervalli di concentrazione finale di letermovir saranno pari a 0,9 mg/mL (per la dose da 240 mg) e a 1,8 mg/mL (per la dose da 480 mg).

Per la **dose da 120 mg o da 60 mg**, preparare PREVYMIS concentrato per soluzione per infusione secondo la Tabella 11 di seguito in soluzione iniettabile di sodio cloruro 9 mg/mL (0,9%) oppure destrosio al 5% e miscelare la soluzione diluita capovolgendola delicatamente. Non agitare.

Per la **dose da 40 mg**, preparare PREVYMIS concentrato per soluzione per infusione secondo la Tabella 12 di seguito in soluzione iniettabile di sodio cloruro 9 mg/mL (0,9%) oppure destrosio al 5% e miscelare la soluzione diluita capovolgendola delicatamente. Non agitare.

**Tabella 11: Preparazione di PREVYMIS soluzione endovenosa per le dosi da 120 mg o da 60 mg**

Dose endovenosa	Volume di 20 mg/mL di PREVYMIS concentrato per soluzione per infusione	Volume di infusione finale	Concentrazione finale di letermovir
120 mg	6 mL di 20 mg/mL	75 mL	1,6 mg/mL
60 mg	3 mL di 20 mg/mL	50 mL	1,2 mg/mL

**Tabella 12: Preparazione di PREVYMIS soluzione endovenosa per la dose da 40 mg**

Dose endovenosa	Volume di diluizione di PREVYMIS 2 mg/mL (1:10)*	Volume di infusione finale	Concentrazione finale di letermovir
40 mg	20 mL di 2 mg/mL	20 mL	2 mg/mL

\* Per preparare la diluizione di PREVYMIS 2 mg/mL, aggiungere 5 mL di PREVYMIS 20 mg/mL concentrato per soluzione per infusione dal flaconcino in 45 mL di diluente (soluzione iniettabile di sodio cloruro 9 mg/mL (0,9%) oppure destrosio al 5%) e miscelare delicatamente.

Una volta diluita, la soluzione di PREVYMIS è limpida e presenta un colore variabile da incolore a giallo. Variazioni del colore all'interno di questa gamma non influenzano la qualità del prodotto. Prima della somministrazione, la soluzione diluita deve essere esaminata visivamente per escludere la presenza di particelle e alterazioni del colore. Se la soluzione diluita è opaca, presenta alterazioni del colore o contiene particelle diverse da alcune piccole particelle traslucide o bianche, gettare la soluzione diluita.

#### Somministrazione

Vedere paragrafo 4.2.

La soluzione diluita di PREVYMIIS deve essere somministrata attraverso un filtro in linea sterile da 0,2 micron o 0,22 micron in polietersulfone (PES).

#### Soluzioni endovenose e altri medicinali compatibili

PREVYMIIS concentrato per soluzione per infusione è compatibile con soluzioni di sodio cloruro allo 0,9% e di destrosio al 5%.

PREVYMIIS non deve essere co-somministrato tramite la stessa linea (o cannula) endovenosa con altri medicinali e combinazioni di diluenti diversi da quelli elencati di seguito.

#### **Elenco dei medicinali compatibili quando PREVYMIIS e i medicinali\* sono preparati in sodio cloruro allo 0,9%**

- Ampicillina sodica
- Ampicillina sodica/Sulbactam sodico
- Globulina antitimocitaria
- Caspofungina
- Daptomicina
- Fentanil citrato
- Fluconazolo
- Insulina umana
- Magnesio solfato
- Metotrexato
- Micafungina

\* Fare riferimento alle informazioni sulla prescrizione per confermare la compatibilità della contemporanea co-somministrazione.

#### **Elenco dei medicinali compatibili quando PREVYMIIS e i medicinali\* sono preparati in destrosio al 5%**

- Amfotericina B (complesso lipidico)<sup>†</sup>
- Anidulafungina
- Cefazolina sodica
- Ceftarolina
- Ceftriaxone sodico
- Doripenem
- Famotidina
- Acido folico
- Ganciclovir sodico
- Idrocortisone succinato sodico
- Morfina solfato
- Noradrenalina bitartrato
- Pantoprazolo sodico
- Potassio cloruro
- Potassio fosfato
- Tacrolimus
- Telavancina
- Tigeciclina

\* Fare riferimento alle informazioni sulla prescrizione per confermare la compatibilità della contemporanea co-somministrazione.

<sup>†</sup> L'amfotericina B (complesso lipidico) è compatibile con PREVYMIIS. Tuttavia, l'amfotericina B (liposomiale) è incompatibile (vedere paragrafo 6.2).

#### Materiali delle sacche per endovena e dei set per infusione compatibili

PREVYMIIS è compatibile con i seguenti materiali delle sacche per endovena e dei set per infusione. Non devono essere utilizzati sacche per endovena e set per infusione in qualsiasi materiale non elencato di seguito.

##### *Materiali delle sacche per endovena*

Cloruro di polivinile (PVC), etilene vinil acetato (EVA) e poliolefine (polipropilene e polietilene)

##### *Materiali dei set di infusione*

PVC, polietilene (PE), polibutadiene (PBD), gomma di silicone (SR), copolimero stirene-butadiene (SBC), copolimero stirene-butadiene-stirene (SBS), polistirene (PS)

##### *Plastificanti*

Tris (2-etilesil) trimellitato (TOTM), butilbenzilftalato (BBP)

*Cateteri*  
Poliuretano radiopaco

Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.

**7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Merck Sharp & Dohme B.V.  
Waarderweg 39  
2031 BN Haarlem  
Paesi Bassi

**8. NUMERO(I) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

EU/1/17/1245/003  
EU/1/17/1245/004

**9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE**

Data della prima autorizzazione: 8 gennaio 2018  
Data del rinnovo più recente: 24 agosto 2022

**10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO**

Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web dell'Agenzia europea per i medicinali, <https://www.ema.europa.eu>.

## **1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE**

PREVYMIS 20 mg granulato in bustina  
PREVYMIS 120 mg granulato in bustina

## **2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA**

PREVYMIS 20 mg granulato in bustina

Ogni bustina contiene 20 mg di letermovir.

PREVYMIS 120 mg granulato in bustina

Ogni bustina contiene 120 mg di letermovir.

Eccipiente(i) con effetti noti

Ogni granulato in bustina da 20 mg contiene 1,7 mg di lattosio (come monoidrato).  
Ogni granulato in bustina da 120 mg contiene 9,9 mg di lattosio (come monoidrato).

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

## **3. FORMA FARMACEUTICA**

Granulato in bustina (granulato)

Granulato di colore beige di circa 2 mm di diametro.

## **4. INFORMAZIONI CLINICHE**

### **4.1 Indicazioni terapeutiche**

PREVYMIS è indicato per la profilassi della riattivazione e della malattia da citomegalovirus (CMV) in pazienti adulti e pediatrici di peso corporeo di almeno 5 kg che sono sieropositivi per CMV riceventi [R+] trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche (*haematopoietic stem cell transplant, HSCT*).

PREVYMIS è indicato per la profilassi della malattia da CMV in pazienti adulti e pediatrici di peso corporeo di almeno 40 kg sieronegativi per CMV che hanno ricevuto un trapianto di rene da un donatore sieropositivo per CMV [D+/R-].

Devono essere prese in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antivirali.

### **4.2 Posologia e modo di somministrazione**

Il trattamento con letermovir deve essere iniziato da un medico esperto nella gestione di pazienti sottoposti a trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche o trapianto di rene.

Posologia

Letermovir è inoltre disponibile come compresse rivestite con film (240 mg e 480 mg) e come concentrato per soluzione per infusione (240 mg e 480 mg).

Le compresse, il granulato in bustina e il concentrato per soluzione per infusione di letermovir possono essere utilizzati indistintamente a discrezione del medico. Può essere necessario un adattamento della dose per i pazienti pediatrici di peso corporeo inferiore a 30 kg quando si passa dalla formulazione orale a quella endovenosa. Fare riferimento alle informazioni sulla prescrizione di letermovir concentrato per soluzione per infusione per le informazioni sul dosaggio.

*Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche (HSCT)*

La terapia con letermovir deve essere iniziata dopo HSCT. La terapia con letermovir può essere iniziata il giorno stesso del trapianto e non oltre 28 giorni dopo HSCT. La terapia con letermovir può essere iniziata prima o dopo l'atteggiamento del trapianto. La profilassi con letermovir deve continuare per 100 giorni dopo HSCT.

La profilassi con letermovir prolungata oltre 100 giorni dopo HSCT può apportare un beneficio ad alcuni pazienti ad alto rischio di riattivazione tardiva del CMV (vedere paragrafo 5.1). La sicurezza e l'efficacia di letermovir quando utilizzato per più di 200 giorni non sono state studiate in studi clinici.

*Pazienti adulti e pediatrici di peso corporeo di almeno 30 kg riceventi HSCT*

La dose raccomandata di letermovir è di 480 mg una volta al giorno che può essere somministrata come 4 bustine da 120 mg.

*Adattamento della dose in pazienti adulti e pediatrici di peso corporeo di almeno 30 kg riceventi HSCT*

In caso di co-somministrazione di letermovir con ciclosporina, la dose di letermovir deve essere ridotta a 240 mg una volta al giorno (vedere paragrafi 4.5 e 5.2).

- Se la ciclosporina viene iniziata dopo l'inizio della terapia con letermovir, la dose successiva di letermovir deve essere ridotta a 240 mg una volta al giorno.
- Se la ciclosporina viene interrotta dopo l'inizio della terapia con letermovir, la dose successiva di letermovir deve essere aumentata a 480 mg una volta al giorno.
- Se la somministrazione di ciclosporina viene temporaneamente sospesa a causa di livelli elevati di ciclosporina, non è necessario alcun adattamento della dose di letermovir.

*Pazienti pediatrici di peso corporeo inferiore a 30 kg riceventi HSCT*

Nella Tabella 1 sono riportate le dosi raccomandate di letermovir per i pazienti pediatrici di peso corporeo inferiore a 30 kg (vedere anche paragrafo 5.2). Letermovir deve essere somministrato una volta al giorno.

Letermovir compresse rivestite con film può essere utilizzato dai pazienti in grado di deglutire le compresse. Fare riferimento alle informazioni sulla prescrizione di letermovir compresse rivestite con film per le informazioni sul dosaggio.

*Adattamento della dose in pazienti pediatrici di peso corporeo inferiore a 30 kg riceventi HSCT*

In caso di co-somministrazione di letermovir per via orale con ciclosporina, la dose di letermovir deve essere ridotta come riportato nella Tabella 1 (vedere anche paragrafi 4.5 e 5.2).

- Se la ciclosporina viene iniziata dopo l'inizio della terapia con letermovir, la dose successiva di letermovir deve essere la dose giornaliera per via orale somministrata in concomitanza con la ciclosporina (vedere Tabella 1).
- Se la ciclosporina viene interrotta dopo l'inizio della terapia con letermovir, la dose successiva di letermovir deve essere la dose giornaliera per via orale somministrata senza la ciclosporina (vedere Tabella 1).
- Se la somministrazione di ciclosporina viene temporaneamente sospesa a causa di livelli elevati di ciclosporina, non è necessario alcun adattamento della dose di letermovir.

**Tabella 1: Dose raccomandata di letermovir granulato in bustina senza o con ciclosporina in pazienti pediatrici di peso corporeo inferiore a 30 kg**

<b>Peso corporeo</b>	<b>Somministrato senza ciclosporina</b>		<b>Somministrato in concomitanza con ciclosporina</b>	
	<b>Dose giornaliera per via orale</b>	<b>Numero di bustine di letermovir una volta al giorno</b>	<b>Dose giornaliera per via orale</b>	<b>Numero di bustine di letermovir una volta al giorno</b>
da 15 kg a meno di 30 kg	240 mg	Due bustine da 120 mg	120 mg	Una bustina da 120 mg
da 7,5 kg a meno di 15 kg	120 mg	Una bustina da 120 mg	60 mg	Tre bustine da 20 mg
da 5 kg a meno di 7,5 kg	80 mg	Quattro bustine da 20 mg	40 mg	Due bustine da 20 mg

#### *Trapianto di rene*

La terapia con letermovir deve essere iniziata il giorno stesso del trapianto e non oltre 7 giorni post trapianto di rene e deve essere continuata per 200 giorni post trapianto.

#### *Pazienti adulti e pediatrici di peso corporeo di almeno 40 kg riceventi trapianto di rene*

La dose raccomandata di letermovir è di 480 mg una volta al giorno che può essere somministrata come 4 bustine da 120 mg.

#### *Adattamento della dose in pazienti adulti e pediatrici di peso corporeo di almeno 40 kg riceventi trapianto di rene*

In caso di co-somministrazione di letermovir con ciclosporina, la dose di letermovir deve essere ridotta a 240 mg una volta al giorno (vedere anche paragrafi 4.5 e 5.2).

- Se la ciclosporina viene iniziata dopo l'inizio della terapia con letermovir, la dose successiva di letermovir deve essere ridotta a 240 mg una volta al giorno.
- Se la ciclosporina viene interrotta dopo l'inizio della terapia con letermovir, la dose successiva di letermovir deve essere aumentata a 480 mg una volta al giorno.
- Se la somministrazione di ciclosporina viene temporaneamente sospesa a causa di livelli elevati di ciclosporina, non è necessario alcun adattamento della dose di letermovir.

#### *Dose saltata*

Ai pazienti deve essere detto che, nel caso in cui dimenticassero di assumere una dose di letermovir, devono provvedere all'assunzione non appena se ne ricordano. Nel caso in cui non se ne ricordassero fino al momento della dose successiva, devono saltare la dose dimenticata e tornare allo schema normale. I pazienti non devono raddoppiare la dose successiva né assumere una dose superiore alla dose prescritta.

#### Popolazioni speciali

##### *Anziani*

Non è necessario alcun adattamento della dose di letermovir in base all'età (vedere paragrafi 5.1 e 5.2).

##### *Compromissione epatica*

In presenza di compromissione epatica di grado da lieve (Child-Pugh classe A) a moderato (Child-Pugh classe B) non è necessario alcun adattamento della dose di letermovir. Letermovir non è raccomandato in pazienti con compromissione epatica severa (Child-Pugh classe C) (vedere paragrafo 5.2).

##### *Compromissione epatica e renale*

Le termovir non è raccomandato in pazienti con compromissione epatica moderata associata a compromissione renale moderata o severa (vedere paragrafo 5.2).

### *Compromissione renale*

Non è raccomandato un adattamento della dose di letermovir nei pazienti con compromissione renale lieve, moderata o severa. Non possono essere formulate raccomandazioni in merito alla posologia per i pazienti con malattia renale allo stadio terminale (ESRD) sottoposti o non sottoposti a dialisi. L'efficacia e la sicurezza non sono state dimostrate in pazienti con ESRD.

### *Popolazione pediatrica*

La sicurezza e l'efficacia di letermovir nei pazienti riceventi HSCT di peso corporeo inferiore a 5 kg o nei pazienti riceventi trapianto di rene di peso corporeo inferiore a 40 kg non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Nessuna raccomandazione sulla posologia per i pazienti riceventi trapianto di rene di peso corporeo inferiore a 40 kg può essere supportata dall'estrapolazione di farmacocinetica/farmacodinamica.

### Modo di somministrazione

Per uso orale (per ingestione o mediante sondino di alimentazione enterale).

Somministrare letermovir granulato per via orale miscelato con 1-3 cucchiaini di cibo morbido o mediante sondino nasogastrico (sondino NG) o sondino per gastrostomia (sondino G) (vedere paragrafo 6.6). Non frantumare o masticare perché questi metodi non sono stati studiati. Dopo la somministrazione è possibile consumare altro cibo o un pasto.

## **4.3 Controindicazioni**

Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1.

Somministrazione concomitante con pimozide (vedere paragrafi 4.4 e 4.5).

Somministrazione concomitante con alcaloidi derivati dalla segale cornuta (vedere paragrafi 4.4 e 4.5).

Somministrazione concomitante con erba di S. Giovanni (*Hypericum perforatum*) (vedere paragrafo 4.5).

Quando letermovir è associato a ciclosporina:

- L'uso concomitante con dabigatran, atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina o pitavastatina è controindicato (vedere paragrafo 4.5).

## **4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d'impiego**

### Monitoraggio del DNA del CMV nei riceventi HSCT

In uno studio di fase 3 (P001), la sicurezza e l'efficacia di letermovir sono state stabilite in pazienti sottoposti a HSCT con un risultato negativo al test del DNA del CMV prima dell'inizio della profilassi. Il DNA del CMV è stato monitorato settimanalmente fino alla settimana 14 post trapianto e successivamente ogni due settimane fino alla settimana 24. In presenza di DNAemia o malattia da CMV clinicamente significativa, la profilassi con letermovir è stata interrotta ed è stato iniziato il trattamento o la terapia pre-emptive standard (PET). Nei pazienti in cui è stata iniziata la profilassi con letermovir e il test del DNA del CMV al basale è successivamente risultato positivo, la profilassi poteva essere proseguita se i criteri per iniziare la PET non erano stati soddisfatti (vedere paragrafo 5.1).

### Rischio di reazioni avverse o effetto terapeutico ridotto dovuti ad interazioni farmacologiche

L'uso concomitante di letermovir e di alcuni medicinali può determinare interazioni farmacologiche note o potenzialmente significative, alcune delle quali possono dar luogo a:

- possibili reazioni avverse clinicamente significative derivanti dalla maggiore esposizione ai medicinali concomitanti o a letermovir.
- diminuzione significativa delle concentrazioni plasmatiche dei medicinali concomitanti che può determinare una riduzione del loro effetto terapeutico.

Vedere Tabella 2 per le procedure di prevenzione o gestione di tali interazioni farmacologiche note o potenzialmente significative, comprese le raccomandazioni sul dosaggio (vedere paragrafi 4.3 e 4.5).

## Interazioni farmacologiche

Letermovir deve essere usato con cautela quando co-somministrato con medicinali che sono substrati del CYP3A con indice terapeutico ristretto (ad es., alfentanil, fentanil e chinidina), in quanto la co-somministrazione può determinare un aumento delle concentrazioni plasmatiche dei substrati del CYP3A. Si raccomanda un attento monitoraggio e/o un adattamento della dose dei substrati del CYP3A co-somministrati (vedere paragrafo 4.5).

In generale si raccomanda un monitoraggio più intenso per ciclosporina, tacrolimus, sirolimus durante le prime 2 settimane dopo l'inizio e la fine del trattamento con letermovir (vedere paragrafo 4.5) e anche se si modifica la via di somministrazione di letermovir.

Letermovir è un induttore moderato di enzimi e trasportatori. L'induzione può dare origine a ridotte concentrazioni plasmatiche di alcuni medicinali metabolizzati e trasportati (vedere paragrafo 4.5). È pertanto raccomandato un monitoraggio terapeutico del farmaco (*Therapeutic Drug Monitoring, TDM*) per voriconazolo. L'uso concomitante con dabigatran deve essere evitato a causa del rischio di riduzione dell'efficacia di dabigatran.

Letermovir può aumentare le concentrazioni plasmatiche di medicinali trasportati da OATP1B1/3, tra i quali molte statine (vedere paragrafo 4.5 e Tabella 2).

## Eccipienti

PREVYMIS contiene lattosio monoidrato. I pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al galattosio, da deficit totale di lattasi, o da malassorbimento di glucosio-galattosio, non devono assumere questo medicinale.

Questo medicinale contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per bustina, cioè essenzialmente "senza sodio".

## **4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d'interazione**

### Informazioni generali sulle differenze nell'esposizione tra diversi regimi di trattamento di letermovir

-L'esposizione plasmatica stimata di letermovir è diversa a seconda del regime posologico utilizzato (vedere tabella al paragrafo 5.2). Pertanto, le conseguenze cliniche delle interazioni farmacologiche di letermovir dipenderanno dal tipo di regime di letermovir utilizzato e se letermovir viene associato o meno a ciclosporina.

-L'associazione di ciclosporina e letermovir può determinare effetti più marcati o aggiuntivi sui medicinali concomitanti rispetto a letermovir da solo (vedere Tabella 2).

### Effetto di altri medicinali su letermovir

Le vie di eliminazione di letermovir *in vivo* sono l'escrezione biliare e la glucuronidazione. La relativa importanza di queste vie non è nota. Entrambe le vie di eliminazione comportano il trasporto attivo negli epatociti attraverso i trasportatori attivi epatici OATP1B1/3. Dopo il trasporto attivo, la glucuronidazione di letermovir è mediata da UGT1A1 e 3. Sembra che letermovir sia anche soggetto all'efflusso mediato dalla P-gp e BCRP nel fegato e nell'intestino (vedere paragrafo 5.2).

### Induttori di farmaci che metabolizzano enzimi o trasportatori

La co-somministrazione di letermovir (con o senza ciclosporina) con induttori potenti e moderati dei trasportatori (ad es., P-gp) e/o degli enzimi (ad es., UGT) non è raccomandata, in quanto può determinare un'esposizione subterapeutica di letermovir (vedere Tabella 2).

-Esempi di induttori potenti includono rifampicina, fenitoina, carbamazepina, rifabutina e fenobarbital.

-Esempi di induttori moderati includono tioridazina, modafinil, ritonavir, lopinavir, efavirenz ed etravirina.

La co-somministrazione di rifampicina ha determinato un aumento iniziale delle concentrazioni plasmatiche di letermovir (a causa dell'inibizione di OATP1B1/3 e/o della P-gp) non clinicamente rilevante, seguito da diminuzioni delle concentrazioni plasmatiche di letermovir clinicamente rilevanti (a causa dell'induzione della P-gp/UGT) con la co-somministrazione continuativa di rifampicina (vedere Tabella 2).

#### Effetti aggiuntivi di altri medicinali su letermovir rilevanti quando associato a ciclosporina

##### *Inibitori di OATP1B1 o 3*

La co-somministrazione di letermovir con medicinali che sono inibitori di OATP1B1/3 può determinare un aumento delle concentrazioni plasmatiche di letermovir. Nel caso in cui letermovir venga co-somministrato con ciclosporina (potente inibitore dell'OATP1B1/3), la dose raccomandata di letermovir è di 240 mg una volta al giorno in pazienti adulti e pediatrici di peso corporeo di almeno 30 kg (vedere Tabella 2 e paragrafi 4.2 e 5.2). Se letermovir per via orale viene co-somministrato con ciclosporina in pazienti pediatrici di peso corporeo inferiore a 30 kg, la dose deve essere ridotta (vedere paragrafi 4.2 e 5.2). Si consiglia cautela se altri inibitori di OATP1B1/3 sono aggiunti a letermovir in associazione a ciclosporina.

-Esempi di inibitori di OATP1B1 includono gemfibrozil, eritromicina, claritromicina e diversi inibitori della proteasi (atazanavir, simeprevir).

##### *Inibitori della P-gp/BCRP*

I risultati *in vitro* indicano che letermovir è un substrato della P-gp/BCRP. Le variazioni delle concentrazioni plasmatiche di letermovir a causa dell'inibizione della P-gp/BCRP da itraconazolo non sono state clinicamente rilevanti.

#### Effetto di letermovir su altri medicinali

##### *Medicinali principalmente eliminati attraverso metabolismo o influenzati da trasporto attivo*

*In vivo* letermovir è un induttore generale di enzimi e trasportatori. A meno che un particolare enzima o trasportatore non venga anche inibito (vedere sotto) si prevede che ci sia induzione. Pertanto, letermovir può potenzialmente determinare una ridotta esposizione plasmatica e probabilmente una ridotta efficacia dei medicinali co-somministrati che sono principalmente eliminati attraverso metabolismo o trasporto attivo.

L'entità dell'effetto induttivo dipende dalla via di somministrazione di letermovir e se la ciclosporina viene usata in concomitanza. Si può prevedere che l'effetto della totale induzione avvenga dopo 10-14 giorni di trattamento con letermovir. Il tempo necessario a raggiungere lo stato stazionario di uno specifico medicinale interessato influenzerebbe anche il tempo necessario a raggiungere l'effetto totale sulle concentrazioni plasmatiche.

*In vitro*, letermovir è un inibitore di CYP3A, CYP2C8, CYP2B6, BCRP, UGT1A1, OATP2B1 e di OAT3 a concentrazioni rilevanti *in vivo*. Sono disponibili studi *in vivo* che valutano l'effetto netto su CYP3A4, P-gp, OATP1B1/3 oltre che su CYP2C19. Non è noto l'effetto netto *in vivo* su altri enzimi e trasportatori elencati. Informazioni più dettagliate sono descritte di seguito.

Non è noto se letermovir possa influenzare l'esposizione di piperacillina/tazobactam, amfotericina B e micafungina. La potenziale interazione tra letermovir e questi medicinali non è stata studiata. Esiste un rischio teorico di ridotta esposizione a causa dell'induzione ma l'entità dell'effetto e quindi la rilevanza clinica non è al momento nota.

##### *Medicinali metabolizzati dal CYP3A*

*In vivo* letermovir è un inibitore moderato di CYP3A. La co-somministrazione di letermovir con midazolam per via orale (un substrato del CYP3A) determina un aumento di 2-3 volte le concentrazioni plasmatiche di midazolam. La co-somministrazione di letermovir può determinare

aumenti clinicamente rilevanti delle concentrazioni plasmatiche dei substrati del CYP3A co-somministrati (vedere paragrafi 4.3, 4.4 e 5.2).

-Esempi di medicinali di questo tipo includono alcuni immunosoppressori (ad es., ciclosporina, tacrolimus, sirolimus), gli inibitori della HMG-CoA reduttasi e amiodarone (vedere Tabella 2). Pimozide e alcaloidi derivati dalla segale cornuta sono controindicati (vedere paragrafo 4.3).

L'entità dell'effetto inibitorio del CYP3A dipende dalla via di somministrazione di letermovir e se la ciclosporina viene usata in concomitanza.

A causa dell'inibizione tempo-dipendente e della simultanea induzione, l'effetto netto inibitorio dell'enzima può non essere raggiunto prima di 10-14 giorni. Il tempo necessario a raggiungere lo stato stazionario di uno specifico medicinale interessato influenzerà anche il tempo necessario a raggiungere l'effetto totale sulle concentrazioni plasmatiche. Dopo la fine del trattamento, occorreranno 10-14 giorni prima che l'effetto inibitorio svanisca. Se si ricorre a monitoraggio, questo è raccomandato le prime 2 settimane dopo l'inizio e la fine del trattamento con letermovir (vedere paragrafo 4.4) e anche se si modifica la via di somministrazione di letermovir.

#### *Medicinali trasportati da OATP1B1/3*

Letermovir è un inibitore dei trasportatori OATP1B1/3. La somministrazione di letermovir può determinare un aumento clinicamente rilevante delle concentrazioni plasmatiche dei medicinali co-somministrati che sono substrati di OATP1B1/3.

-Esempi di medicinali di questo tipo includono gli inibitori della HMG-CoA reduttasi, fexofenadina, repaglinide e gliburide (vedere Tabella 2). Confrontando regimi di letermovir somministrati senza ciclosporina, l'effetto è più marcato dopo la somministrazione per via endovenosa rispetto alla somministrazione orale di letermovir.

È probabile che l'entità dell'inibizione di OATP1B1/3 sui medicinali co-somministrati sia maggiore quando letermovir è co-somministrato con ciclosporina (un inibitore potente di OATP1B1/3). Ciò deve essere considerato quando il regime di letermovir viene modificato durante il trattamento con un substrato di OATP1B1/3.

#### *Medicinali metabolizzati dal CYP2C9 e/o dal CYP2C19*

La co-somministrazione di letermovir con voriconazolo (un substrato del CYP2C19) determina una riduzione significativa delle concentrazioni plasmatiche di voriconazolo, indicando che letermovir è un induttore del CYP2C19. È probabile anche un'induzione del CYP2C9. Letermovir può ridurre l'esposizione ai substrati del CYP2C9 e/o del CYP2C19 determinando potenzialmente livelli subterapeutici.

-Esempi di medicinali di questo tipo includono warfarin, voriconazolo, diazepam, lansoprazolo, omeprazolo, esomeprazolo, pantoprazolo, tildina e tolbutamide (vedere Tabella 2).

Si prevede che l'effetto sia meno pronunciato per letermovir per via orale senza ciclosporina, rispetto a letermovir per via endovenosa con o senza ciclosporina o a letermovir per via orale con ciclosporina. Ciò deve essere considerato quando il regime di letermovir viene modificato durante il trattamento con un substrato di CYP2C9 o CYP2C19. Vedere anche sopra le informazioni generali sul decorso dell'interazione.

#### *Medicinali metabolizzati dal CYP2C8*

*In vitro* letermovir inibisce il CYP2C8 ma può anche indurre il CYP2C8 in base al suo potenziale di induzione. L'effetto netto *in vivo* non è noto.

-Un esempio di medicinale che viene principalmente eliminato dal CYP2C8 è la repaglinide (vedere Tabella 2). L'uso concomitante di repaglinide e letermovir con o senza ciclosporina non è raccomandato.

#### *Medicinali trasportati dalla P-gp nell'intestino*

Letermovir è un induttore della P-gp intestinale. La somministrazione di letermovir può determinare una diminuzione clinicamente rilevante delle concentrazioni plasmatiche dei medicinali co-somministrati che sono trasportati in maniera significativa dalla P-gp nell'intestino come dabigatran e sofosbuvir.

*Medicinali metabolizzati da CYP2B6, UGT1A1 o trasportati da BCRP o OATP2B1*

*In vivo* letermovir è in generale un induttore ma *in vitro* è stata anche osservata l'inibizione di CYP2B6, UGT1A1, BCRP e OATP2B1. Non è noto l'effetto netto *in vivo*. Pertanto, le concentrazioni plasmatiche di medicinali che sono substrati di questi enzimi o trasportatori possono aumentare o diminuire quando co-somministrati con letermovir. Può essere raccomandato monitoraggio addizionale; fare riferimento alle informazioni sulla prescrizione di tali medicinali.

- Esempi di medicinali che sono metabolizzati da CYP2B6 comprendono bupropione.
- Esempi di medicinali metabolizzati da UGT1A1 sono raltegravir e dolutegravir.
- Esempi di medicinali trasportati da BCRP includono rosuvastatina e sulfasalazina.
- Un esempio di un medicinale trasportato da OATP2B1 è il celiprololo.

*Medicinali trasportati dal trasportatore renale OAT3*

I dati *in vitro* indicano che letermovir è un inibitore di OAT3; pertanto, letermovir può essere un inibitore di OAT3 *in vivo*. Le concentrazioni plasmatiche dei medicinali trasportati da OAT3 possono essere aumentate.

-Esempi di medicinali trasportati da OAT3 includono ciprofloxacina, tenofovir, imipenem e cilastatina.

Informazioni generali

Se l'adattamento della dose dei medicinali concomitanti viene effettuato a causa del trattamento con letermovir, le dosi devono essere rimodulate una volta che il trattamento con letermovir è stato completato. Può anche essere necessario un adattamento della dose se si modifica la via di somministrazione o l'immunosoppressore.

La Tabella 2 fornisce un elenco delle interazioni farmacologiche stabilite o potenzialmente significative da un punto di vista clinico. Le interazioni farmacologiche descritte si basano su studi condotti con letermovir sugli adulti o rappresentano interazioni farmacologiche previste che possono verificarsi con letermovir (vedere paragrafi 4.3, 4.4, 5.1 e 5.2).

**Tabella 2: Interazioni e raccomandazioni sul dosaggio con altri medicinali. Notare che la tabella non è esaustiva ma fornisce esempi di interazioni clinicamente rilevanti. Vedere anche sopra il testo generale sulle interazioni farmacologiche.**

**Salvo diversa indicazione, gli studi di interazione sono stati effettuati sugli adulti con letermovir per via orale senza ciclosporina. Notare che la potenziale interazione e le conseguenze cliniche possono essere differenti qualora letermovir sia somministrato per via orale o per via endovenosa e se ciclosporina sia usata in concomitanza. Se si modifica la via di somministrazione**

**o se si modifica l'immunosoppressore, la raccomandazione relativa alla co-somministrazione deve essere riconsiderata.**

<b>Medicinale concomitante</b>	<b>Effetto sulla concentrazione<sup>†</sup> rapporto delle medie (intervallo di confidenza al 90%) per AUC, C<sub>max</sub> (probabile meccanismo d'azione)</b>	<b>Raccomandazioni relative alla co-somministrazione con letermovir</b>
<b>Antibiotici</b>		
nafcillina	Interazione non studiata. Previsto: ↓ letermovir  (Induzione della P-gp/UGT)	Nafcillina può ridurre le concentrazioni plasmatiche di letermovir. La co-somministrazione di letermovir e nafcillina non è raccomandata.
<b>Antifungini</b>		
fluconazolo (400 mg in dose singola)/ letermovir (480 mg in dose singola)	↔ fluconazolo AUC 1,03 (0,99; 1,08) C <sub>max</sub> 0,95 (0,92; 0,99)  ↔ letermovir AUC 1,11 (1,01; 1,23) C <sub>max</sub> 1,06 (0,93; 1,21)  Interazione allo stato stazionario non studiata. Previsto: ↔ fluconazolo ↔ letermovir	Non è necessario alcun adattamento della dose.
itraconazolo (200 mg una volta al giorno PO)/ letermovir (480 mg una volta al giorno PO)	↔ itraconazolo AUC 0,76 (0,71; 0,81) C <sub>max</sub> 0,84 (0,76; 0,92)  ↔ letermovir AUC 1,33 (1,17; 1,51) C <sub>max</sub> 1,21 (1,05; 1,39)	Non è necessario alcun adattamento della dose.
posaconazolo <sup>‡</sup> (300 mg in dose singola)/ letermovir (480 mg una volta al giorno)	↔ posaconazolo AUC 0,98 (0,82; 1,17) C <sub>max</sub> 1,11 (0,95; 1,29)	Non è necessario alcun adattamento della dose.
voriconazolo <sup>‡</sup> (200 mg due volte al giorno)/ letermovir (480 mg una volta al giorno)	↓ voriconazolo AUC 0,56 (0,51; 0,62) C <sub>max</sub> 0,61 (0,53; 0,71)  (Induzione di CYP2C9/19)	Se è necessaria la somministrazione concomitante, un TDM per voriconazolo è raccomandato le prime 2 settimane dopo l'inizio o la fine del trattamento con letermovir, e anche se si modifica la via di somministrazione di letermovir o l'immunosoppressore.

<b>Medicinale concomitante</b>	<b>Effetto sulla concentrazione<sup>†</sup> rapporto delle medie (intervallo di confidenza al 90%) per AUC, C<sub>max</sub> (probabile meccanismo d'azione)</b>	<b>Raccomandazioni relative alla co-somministrazione con letermovir</b>
<b>Antimicobatterici</b>		
rifabutina	Interazione non studiata. Previsto: ↓ letermovir  (Induzione della P-gp/UGT)	Rifabutina può ridurre le concentrazioni plasmatiche di letermovir. La co-somministrazione di letermovir e rifabutina non è raccomandata.
(600 mg in dose singola PO)/ letermovir (480 mg in dose singola PO)	↔ letermovir AUC 2,03 (1,84; 2,26) C <sub>max</sub> 1,59 (1,46; 1,74) C <sub>24</sub> 2,01 (1,59; 2,54)  (Inibizione di OATP1B1/3 e/o della P-gp)	Rifampicina in dose multipla diminuisce le concentrazioni plasmatiche di letermovir. La co-somministrazione di letermovir e rifampicina non è raccomandata.
(600 mg in dose singola per via endovenosa)/ letermovir (480 mg in dose singola PO)	↔ letermovir AUC 1,58 (1,38; 1,81) C <sub>max</sub> 1,37 (1,16; 1,61) C <sub>24</sub> 0,78 (0,65; 0,93)  (Inibizione di OATP1B1/3 e/o della P-gp)	
(600 mg una volta al giorno PO)/ letermovir (480 mg una volta al giorno PO)	↓ letermovir AUC 0,81 (0,67; 0,98) C <sub>max</sub> 1,01 (0,79; 1,28) C <sub>24</sub> 0,14 (0,11; 0,19)  (Somma dell'inibizione di OATP1B1/3 e/o della P-gp e dell'induzione della P-gp/UGT)	
(600 mg una volta al giorno PO (24 ore dopo rifampicina)) <sup>§</sup> / letermovir (480 mg una volta al giorno PO)	↓ letermovir AUC 0,15 (0,13; 0,17) C <sub>max</sub> 0,27 (0,22; 0,31) C <sub>24</sub> 0,09 (0,06; 0,12)  (Induzione della P-gp/UGT)	

<b>Medicinale concomitante</b>	<b>Effetto sulla concentrazione<sup>†</sup> rapporto delle medie (intervallo di confidenza al 90%) per AUC, C<sub>max</sub> (probabile meccanismo d'azione)</b>	<b>Raccomandazioni relative alla co-somministrazione con letermovir</b>
<b>Antipsicotici</b>		
tioridazina	Interazione non studiata. Previsto: ↓ letermovir  (Induzione della P-gp/UGT)	Tioridazina può ridurre le concentrazioni plasmatiche di letermovir. La co-somministrazione di letermovir e tioridazina non è raccomandata.
<b>Antagonisti dell'endotelina</b>		
bosentan	Interazione non studiata. Previsto: ↓ letermovir  (Induzione della P-gp/UGT)	Bosentan può ridurre le concentrazioni plasmatiche di letermovir. La co-somministrazione di letermovir e bosentan non è raccomandata.
<b>Antivirali</b>		
aciclovir <sup>‡</sup> (400 mg in dose singola)/ letermovir (480 mg una volta al giorno)	↔ aciclovir AUC 1,02 (0,87; 1,2) C <sub>max</sub> 0,82 (0,71; 0,93)	Non è necessario alcun adattamento della dose.
valaciclovir	Interazione non studiata. Previsto: ↔ valaciclovir	Non è necessario alcun adattamento della dose.
<b>Prodotti a base di erbe</b>		
erba di S. Giovanni ( <i>Hypericum perforatum</i> )	Interazione non studiata. Previsto: ↓ letermovir  (Induzione della P-gp/UGT)	L'erba di S. Giovanni può ridurre le concentrazioni plasmatiche di letermovir. La co-somministrazione di letermovir ed erba di S. Giovanni è controindicata.
<b>Medicinali per l'HIV</b>		
efavirenz	Interazione non studiata. Previsto: ↓ letermovir (Induzione della P-gp/UGT)  ↑ o ↓ efavirenz (Inibizione o induzione di CYP2B6)	Efavirenz può ridurre le concentrazioni plasmatiche di letermovir. La co-somministrazione di letermovir ed efavirenz non è raccomandata.
etravirina, nevirapina, ritonavir, lopinavir	Interazione non studiata. Previsto: ↓ letermovir  (Induzione della P-gp/UGT)	Questi antivirali possono ridurre le concentrazioni plasmatiche di letermovir. La co-somministrazione di letermovir con questi antivirali non è raccomandata.

<b>Medicinale concomitante</b>	<b>Effetto sulla concentrazione<sup>†</sup> rapporto delle medie (intervallo di confidenza al 90%) per AUC, C<sub>max</sub> (probabile meccanismo d'azione)</b>	<b>Raccomandazioni relative alla co-somministrazione con letermovir</b>
<b>Inibitori della HMG-CoA reduttasi</b>		
atorvastatina <sup>‡</sup> (20 mg in dose singola)/ letermovir (480 mg una volta al giorno)	↑ atorvastatina AUC 3,29 (2,84; 3,82) C <sub>max</sub> 2,17 (1,76; 2,67)  (Inibizione di CYP3A, OATP1B1/3)	Gli eventi avversi associati alle statine quali la miopia devono essere attentamente monitorati. Quando co-somministrata con letermovir, la dose di atorvastatina non deve superare i 20 mg al giorno <sup>#</sup> .  Benché non sia stato studiato, si prevede che, quando letermovir è co-somministrato con ciclosporina, l'entità dell'aumento delle concentrazioni plasmatiche di atorvastatina sia maggiore rispetto alla terapia con letermovir da solo. Quando letermovir è co-somministrato con ciclosporina, l'impiego di atorvastatina è controindicato.
simvastatina, pitavastatina, rosuvastatina	Interazione non studiata. Previsto: ↑ inibitori della HMG-CoA reduttasi  (Inibizione di CYP3A, OATP1B1/3)	Letermovir può aumentare sostanzialmente le concentrazioni plasmatiche di queste statine. L'uso concomitante non è raccomandato con letermovir da solo.  Quando letermovir è co-somministrato con ciclosporina, l'impiego di queste statine è controindicato.
fluvastatina, pravastatina	Interazione non studiata. Previsto: ↑ inibitori della HMG-CoA reduttasi  (Inibizione di OATP1B1/3 e/o di BCRP)	Letermovir può aumentare le concentrazioni plasmatiche di statina.  Quando letermovir è co-somministrato con queste statine, può essere necessaria una riduzione della dose della statina <sup>#</sup> . Gli eventi avversi associati alle statine quali la miopia devono essere attentamente monitorati.  Quando letermovir è co-somministrato con ciclosporina, pravastatina non è raccomandata mentre per fluvastatina può essere necessaria una riduzione della dose <sup>#</sup> . Gli eventi avversi associati alle statine quali la miopia devono essere attentamente monitorati.

<b>Medicinale concomitante</b>	<b>Effetto sulla concentrazione<sup>†</sup> rapporto delle medie (intervallo di confidenza al 90%) per AUC, C<sub>max</sub> (probabile meccanismo d'azione)</b>	<b>Raccomandazioni relative alla co-somministrazione con letermovir</b>
<b>Immunosoppressori</b>		
ciclosporina (50 mg in dose singola)/ letermovir (240 mg una volta al giorno)	↑ ciclosporina AUC 1,66 (1,51; 1,82) C <sub>max</sub> 1,08 (0,97; 1,19)  (Inibizione di CYP3A)	In caso di co-somministrazione di letermovir con ciclosporina, la dose di letermovir deve essere ridotta a 240 mg una volta al giorno negli adulti (vedere paragrafi 4.2 e 5.1) e nei pazienti pediatrici di peso corporeo di almeno 30 kg (vedere paragrafo 4.2). Se letermovir per via orale viene co-somministrato con ciclosporina nei pazienti pediatrici di peso corporeo inferiore a 30 kg, la dose deve essere ridotta (vedere paragrafo 4.2).
ciclosporina (200 mg in dose singola)/ letermovir (240 mg una volta al giorno)	↑ letermovir AUC 2,11 (1,97; 2,26) C <sub>max</sub> 1,48 (1,33; 1,65)  (Inibizione di OATP1B1/3)	Se si modifica la via di somministrazione di letermovir e dopo l'interruzione di letermovir deve essere eseguito un frequente monitoraggio delle concentrazioni di ciclosporina nel sangue intero e la dose di ciclosporina deve essere modificata di conseguenza <sup>#</sup> .
micofenolato mofetile (1 g in dose singola)/ letermovir (480 mg una volta al giorno)	↔ acido micofenolico AUC 1,08 (0,97; 1,20) C <sub>max</sub> 0,96 (0,82; 1,12)  ↔ letermovir AUC 1,18 (1,04; 1,32) C <sub>max</sub> 1,11 (0,92; 1,34)	Non è necessario alcun adattamento della dose.

<b>Medicinale concomitante</b>	<b>Effetto sulla concentrazione<sup>†</sup> rapporto delle medie (intervallo di confidenza al 90%) per AUC, C<sub>max</sub> (probabile meccanismo d'azione)</b>	<b>Raccomandazioni relative alla co-somministrazione con letermovir</b>
sirolimus <sup>‡</sup> (2 mg in dose singola)/ letermovir (480 mg una volta al giorno)	↑ sirolimus AUC 3,40 (3,01; 3,85) C <sub>max</sub> 2,76 (2,48; 3,06)  (Inibizione di CYP3A)  Interazione non studiata. Previsto: ↔ letermovir	<p>Se si modifica la via di somministrazione di letermovir e dopo l'interruzione di letermovir deve essere eseguito un frequente monitoraggio delle concentrazioni di sirolimus nel sangue intero e la dose di sirolimus deve essere modificata di conseguenza<sup>#</sup>.</p> <p>Un monitoraggio frequente delle concentrazioni di sirolimus è raccomandato al momento dell'inizio o dell'interruzione della co-somministrazione di ciclosporina con letermovir.</p> <p>Quando letermovir è co-somministrato con ciclosporina, si rimanda anche alle informazioni sulla prescrizione di sirolimus per specifiche raccomandazioni sul dosaggio per l'uso di sirolimus con ciclosporina.</p> <p>Quando letermovir è co-somministrato con ciclosporina, l'entità dell'aumento delle concentrazioni di sirolimus può essere maggiore rispetto a letermovir da solo.</p>
tacrolimus (5 mg in dose singola)/ letermovir (480 mg una volta al giorno)	↑ tacrolimus AUC 2,42 (2,04; 2,88) C <sub>max</sub> 1,57 (1,32; 1,86)  (Inibizione di CYP3A)	<p>Se si modifica la via di somministrazione di letermovir e dopo l'interruzione di letermovir deve essere eseguito un frequente monitoraggio delle concentrazioni di tacrolimus nel sangue intero e la dose di tacrolimus deve essere modificata di conseguenza<sup>#</sup>.</p>
tacrolimus (5 mg in dose singola)/ letermovir (80 mg due volte al giorno)	↔ letermovir AUC 1,02 (0,97; 1,07) C <sub>max</sub> 0,92 (0,84; 1,00)	

<b>Medicinale concomitante</b>	<b>Effetto sulla concentrazione<sup>†</sup> rapporto delle medie (intervallo di confidenza al 90%) per AUC, C<sub>max</sub> (probabile meccanismo d'azione)</b>	<b>Raccomandazioni relative alla co-somministrazione con letermovir</b>
<b>Contraceppimenti orali</b>		
etinilestradiolo (EE) (0,03 mg)/ levonorgestrel (LNG) <sup>‡</sup> (0,15 mg) in dose singola/ letermovir (480 mg una volta al giorno)	↔ EE AUC 1,42 (1,32; 1,52) C <sub>max</sub> 0,89 (0,83; 0,96)  ↔ LNG AUC 1,36 (1,30; 1,43) C <sub>max</sub> 0,95 (0,86; 1,04)	Non è necessario alcun adattamento della dose.
Altri steroidi contraccettivi orali con effetto sistematico	Rischio di ↓ steroidi contraccettivi	Letermovir può ridurre le concentrazioni plasmatiche di altri steroidi contraccettivi orali influenzando in tal modo la loro efficacia. Per assicurare un adeguato effetto contraccettivo con un contraccettivo orale, devono essere scelti prodotti contenenti EE e LNG.
<b>Medicinali antidiabetici</b>		
repaglinide	Interazione non studiata. Previsto: ↑ o ↓ repaglinide  (Induzione di CYP2C8, inibizione di CYP2C8 e OATP1B)	Letermovir può aumentare o diminuire le concentrazioni plasmatiche di repaglinide. (L'effetto netto non è noto).  L'uso concomitante non è raccomandato.  Si prevede che, quando letermovir è co-somministrato con ciclosporina, le concentrazioni plasmatiche di repaglinide siano maggiori a causa dell'inibizione aggiuntiva del OATP1B da parte della ciclosporina. L'uso concomitante non è raccomandato <sup>#</sup> .
gliburide	Interazione non studiata. Previsto: ↑ gliburide  (Inibizione di OATP1B1/3, inibizione di CYP3A, induzione di CYP2C9)	Letermovir può aumentare le concentrazioni plasmatiche di gliburide.  Si raccomanda un monitoraggio frequente delle concentrazioni di glucosio le prime 2 settimane dopo l'inizio o la fine del trattamento con letermovir, e anche se si modifica la via di somministrazione di letermovir.  Quando letermovir è co-somministrato con ciclosporina, si rimanda anche alle informazioni sulla prescrizione di gliburide per specifiche raccomandazioni sul dosaggio.

<b>Medicinale concomitante</b>	<b>Effetto sulla concentrazione<sup>†</sup> rapporto delle medie (intervallo di confidenza al 90%) per AUC, C<sub>max</sub> (probabile meccanismo d'azione)</b>	<b>Raccomandazioni relative alla co-somministrazione con letermovir</b>
<b>Medicinali antiepilettici (vedere anche testo generale)</b>		
carbamazepina, fenobarbital	Interazione non studiata. Previsto: ↓ letermovir  (Induzione della P-gp/UGT)	Carbamazepina o fenobarbital possono ridurre le concentrazioni plasmatiche di letermovir. La co-somministrazione di letermovir e carbamazepina o fenobarbital non è raccomandata.
fenitoina	Interazione non studiata. Previsto: ↓ letermovir  (Induzione della P-gp/UGT)  ↓ fenitoina  (Induzione di CYP2C9/19)	Fenitoina può ridurre le concentrazioni plasmatiche di letermovir.  Le termovir può ridurre le concentrazioni plasmatiche di fenitoina.  La co-somministrazione di letermovir e fenitoina non è raccomandata.
<b>Anticoagulanti orali</b>		
warfarin	Interazione non studiata. Previsto: ↓ warfarin  (Induzione di CYP2C9)	Le termovir può ridurre le concentrazioni plasmatiche di warfarin.  Quando warfarin viene co-somministrato con letermovir deve essere eseguito un monitoraggio frequente del rapporto internazionale normalizzato (INR) <sup>#</sup> . Si raccomanda un monitoraggio le prime 2 settimane dopo l'inizio o la fine del trattamento con letermovir, e anche se si modifica la via di somministrazione di letermovir o l'immunosoppressore.
dabigatran	Interazione non studiata. Previsto: ↓ dabigatran  (Induzione della P-gp intestinale)	Le termovir può ridurre le concentrazioni plasmatiche di dabigatran e può diminuire l'efficacia di dabigatran. L'uso concomitante con dabigatran deve essere evitato a causa del rischio di riduzione dell'efficacia di dabigatran.  Quando letermovir viene co-somministrato con ciclosporina, l'uso di dabigatran è controindicato.

<b>Medicinale concomitante</b>	<b>Effetto sulla concentrazione<sup>†</sup> rapporto delle medie (intervallo di confidenza al 90%) per AUC, C<sub>max</sub> (probabile meccanismo d'azione)</b>	<b>Raccomandazioni relative alla co-somministrazione con letermovir</b>
<b>Sedativi</b>		
midazolam (1 mg in dose singola per via endovenosa)/ letermovir (240 mg una volta al giorno PO)	↑ midazolam Per via endovenosa: AUC 1,47 (1,37; 1,58) C <sub>max</sub> 1,05 (0,94; 1,17)  PO: AUC 2,25 (2,04; 2,48) C <sub>max</sub> 1,72 (1,55; 1,92)  (Inibizione di CYP3A)	Durante la somministrazione di letermovir in concomitanza con midazolam si deve effettuare un attento monitoraggio clinico per depressione respiratoria e/o per sedazione prolungata. Si deve prendere in considerazione un adattamento della dose di midazolam <sup>#</sup> . L'aumento delle concentrazioni plasmatiche di midazolam può essere maggiore quando midazolam per via orale viene somministrato con letermovir alla dose clinica rispetto alla dose studiata.
<b>Agonisti oppioidi</b>		
Esempi: alfentanil, fentanil	Interazione non studiata. Previsto: ↑ oppioidi metabolizzati dal CYP3A  (Inibizione di CYP3A)	Durante la co-somministrazione si raccomanda un monitoraggio frequente delle reazioni avverse correlate a questi medicinali. Può essere necessario un adattamento della dose degli oppioidi metabolizzati dal CYP3A <sup>#</sup> (vedere paragrafo 4.4). Si raccomanda un monitoraggio se si modifica la via di somministrazione. Quando letermovir è co-somministrato con ciclosporina, l'entità dell'aumento delle concentrazioni plasmatiche degli oppioidi metabolizzati dal CYP3A può essere maggiore. Si deve effettuare un attento monitoraggio clinico per depressione respiratoria e/o per sedazione prolungata durante la co-somministrazione di letermovir in associazione a ciclosporina e alfentanil o fentanil. Si rimanda alle rispettive informazioni sulla prescrizione (vedere paragrafo 4.4).
<b>Medicinali antiaritmici</b>		
amiodarone	Interazione non studiata. Previsto: ↑ amiodarone  (principalmente inibizione di CYP3A e inibizione o induzione di CYP2C8)	Le termovir può aumentare le concentrazioni plasmatiche di amiodarone.  Durante la co-somministrazione si raccomanda un monitoraggio frequente delle reazioni avverse correlate ad amiodarone. Quando amiodarone viene co-somministrato con letermovir deve essere eseguito regolarmente un monitoraggio delle concentrazioni di amiodarone <sup>#</sup> .

<b>Medicinale concomitante</b>	<b>Effetto sulla concentrazione<sup>†</sup> rapporto delle medie (intervallo di confidenza al 90%) per AUC, C<sub>max</sub> (probabile meccanismo d'azione)</b>	<b>Raccomandazioni relative alla co-somministrazione con letermovir</b>
chinidina	Interazione non studiata. Previsto: ↑ chinidina  (Inibizione di CYP3A)	Letermovir può aumentare le concentrazioni plasmatiche di chinidina.  Si deve effettuare un attento monitoraggio clinico durante la somministrazione di letermovir con chinidina. Si rimanda alle rispettive informazioni sulla prescrizione <sup>#</sup> .
<b>Medicinali cardiovascolari</b>		
digossina <sup>‡</sup> (0,5 mg in dose singola)/ letermovir (240 mg due volte al giorno)	↔ digossina AUC 0,88 (0,80; 0,96) C <sub>max</sub> 0,75 (0,63; 0,89)  (Induzione della P-gp)	Non è necessario alcun adattamento della dose.
<b>Inibitori della pompa protonica</b>		
omeprazolo	Interazione non studiata. Previsto: ↓ omeprazolo  (Induzione di CYP2C19)  Interazione non studiata. Previsto: ↔ letermovir	Letermovir può ridurre le concentrazioni plasmatiche dei substrati del CYP2C19.  Possono essere necessari un monitoraggio clinico e un adattamento della dose.
pantoprazolo	Interazione non studiata. Previsto: ↓ pantoprazolo  (probabilmente dovuto all'induzione di CYP2C19)  Interazione non studiata. Previsto: ↔ letermovir	Letermovir può ridurre le concentrazioni plasmatiche dei substrati del CYP2C19.  Possono essere necessari un monitoraggio clinico e un adattamento della dose.
<b>Agenti promotori dello stato di veglia</b>		
modafinil	Interazione non studiata. Previsto: ↓ letermovir  (Induzione della P-gp/UGT)	Modafinil può ridurre le concentrazioni plasmatiche di letermovir. La co-somministrazione di letermovir e modafinil non è raccomandata.
* Questa tabella non include tutti i dati. † ↓ =diminuzione, ↑ =aumento ↔ =nessuna variazione clinicamente rilevante ‡ Studio di interazione unidirezionale per la valutazione dell'effetto di letermovir sul medicinale concomitante. § Questi dati sono l'effetto di rifampicina su letermovir 24 ore dopo la dose finale di rifampicina. # Fare riferimento alle rispettive informazioni sulla prescrizione.		

#### Popolazione pediatrica

Sono stati effettuati studi d'interazione solo negli adulti.

## **4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento**

### Gravidanza

Non vi sono dati sull'uso di letermovir in donne in gravidanza. Gli studi su animali hanno mostrato tossicità riproduttiva (vedere paragrafo 5.3).

Letermovir non è raccomandato durante la gravidanza e in donne in età fertile che non usano misure contraccettive.

### Allattamento

Non è noto se letermovir sia escreto nel latte materno.

I dati farmacodinamici/tossicologici disponibili sull'animale hanno dimostrato l'escrezione di letermovir nel latte (vedere paragrafo 5.3).

Il rischio per i neonati/lattanti non può essere escluso.

Deve essere presa la decisione se interrompere l'allattamento o interrompere la terapia/astenersi dalla terapia con letermovir tenendo in considerazione il beneficio dell'allattamento per il bambino e il beneficio della terapia per la donna.

### Fertilità

Nei ratti non è stato riscontrato alcun effetto sulla fertilità femminile. Tossicità testicolare irreversibile e compromissione della fertilità sono state osservate nei maschi di ratto, ma non nei maschi di topo o scimmia (vedere paragrafo 5.3).

## **4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari**

Letermovir può alterare lievemente la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Durante il trattamento con letermovir sono stati riportati stanchezza e vertigini in alcuni pazienti. Ciò può influenzare la capacità dei pazienti di guidare veicoli e di usare macchinari (vedere paragrafo 4.8).

## **4.8 Effetti indesiderati**

### Riassunto del profilo di sicurezza

La valutazione della sicurezza di letermovir è stata basata su tre studi clinici di fase 3.

#### *HSCT*

Nello studio P001, a 565 adulti riceventi HSCT è stato somministrato letermovir o placebo fino alla settimana 14 post trapianto e sono stati seguiti per la sicurezza fino alla settimana 24 post trapianto (vedere paragrafo 5.1). Le reazioni avverse riportate più comunemente, che si sono manifestate in almeno l'1% dei soggetti nel gruppo letermovir e con frequenza maggiore rispetto al placebo, sono state: nausea (7,2%), diarrea (2,4%) e vomito (1,9%). Le reazioni avverse riportate più frequentemente che hanno condotto all'interruzione di letermovir sono state: nausea (1,6%), vomito (0,8%) e dolore addominale (0,5%).

Nello studio P040, a 218 adulti riceventi HSCT è stato somministrato letermovir o placebo dalla settimana 14 (circa 100 giorni) fino alla settimana 28 (circa 200 giorni) post HSCT e sono stati seguiti per la sicurezza fino alla settimana 48 post HSCT (vedere paragrafo 5.1). Le reazioni avverse riportate erano coerenti con il profilo di sicurezza di letermovir caratterizzato nello studio P001.

#### *Trapianto di rene*

Nello studio P002, a 292 adulti riceventi trapianto di rene è stato somministrato letermovir fino alla settimana 28 (circa 200 giorni) post trapianto (vedere paragrafo 5.1).

### Tabella delle reazioni avverse

Nei pazienti adulti che assumevano letermovir negli studi clinici sono state identificate le reazioni avverse indicate di seguito. Le reazioni avverse sono elencate di seguito secondo classificazione per sistemi e organi e frequenza. Le frequenze sono definite come segue: molto comune ( $\geq 1/10$ ), comune ( $\geq 1/100, < 1/10$ ), non comune ( $\geq 1/1\ 000, < 1/100$ ), raro ( $\geq 1/10\ 000, < 1/1\ 000$ ) o molto raro ( $< 1/10\ 000$ ).

**Tabella 3: Reazioni avverse identificate con letermovir**

Frequenza	Reazioni avverse
<i>Disturbi del sistema immunitario</i>	
Non comune	ipersensibilità
<i>Disturbi del metabolismo e della nutrizione</i>	
Non comune	appetito ridotto
<i>Patologie del sistema nervoso</i>	
Non comune	disgeusia, cefalea
<i>Patologie dell'orecchio e del labirinto</i>	
Non comune	vertigini
<i>Patologie gastrointestinali</i>	
Comune	nausea, diarrea, vomito
Non comune	dolore addominale
<i>Patologie epatobiliari</i>	
Non comune	alanina aminotransferasi aumentata, aspartato aminotransferasi aumentata
<i>Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo</i>	
Non comune	spasmi muscolari
<i>Patologie renali e urinarie</i>	
Non comune	creatinina ematica aumentata
<i>Patologie generali e condizioni relative alla sede di somministrazione</i>	
Non comune	stanchezza, edema periferico

### Popolazione pediatrica

La valutazione della sicurezza di letermovir nei pazienti pediatrici dalla nascita fino a 18 anni di età è stata basata su uno studio clinico di fase 2b (P030). Nello studio P030, 63 riceventi HSCT sono stati trattati con letermovir fino alla settimana 14 post HSCT. La loro distribuzione per età è stata la seguente: 28 adolescenti, 14 bambini di età compresa tra 7 e inferiore a 12 anni, 13 bambini di età compresa tra 2 e inferiore a 7 anni e 8 bambini di età inferiore a 2 anni (5 di loro di età inferiore a 1 anno). Le reazioni avverse erano coerenti con quelle osservate negli studi clinici di letermovir negli adulti.

### Segnalazione delle reazioni avverse sospette

La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione riportato nell'[allegato V](#).

### **4.9 Sovradosaggio**

Non c'è alcuna esperienza con il sovradosaggio di letermovir nell'uomo. Nel corso di studi clinici di fase 1, 86 soggetti adulti sani hanno ricevuto dosi di letermovir variabili nell'intervallo da 720 mg/die a 1 440 mg/die per un periodo massimo di 14 giorni. Il profilo delle reazioni avverse era simile a quello della dose clinica di 480 mg/die. Non esiste alcun antidoto specifico per il sovradosaggio di letermovir. In caso di sovradosaggio, si raccomanda di monitorare il paziente per reazioni avverse e di iniziare l'appropriato trattamento sintomatico.

Non è noto se la dialisi produca una rimozione significativa di letermovir dalla circolazione sistemica.

## **5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE**

### **5.1 Proprietà farmacodinamiche**

Categoria farmacoterapeutica: antivirali per uso sistemico, antivirali ad azione diretta, codice ATC: J05AX18

#### Meccanismo d'azione

Letermovir inibisce il complesso terminasi del DNA del CMV, che è necessario per il clivaggio e impacchettamento del DNA della progenie virale. Letermovir influenza la formazione di unità genomiche di lunghezza adeguata e interferisce con la maturazione del virione.

#### Attività antivirale

Il valore mediano della concentrazione efficace ( $EC_{50}$ ) di letermovir nei confronti di una raccolta di isolati clinici di CMV, in un modello di coltura cellulare dell'infezione, corrispondeva a 2,1 nM (intervallo=da 0,7 nM a 6,1 nM; n=74).

#### Resistenza virale

##### *In coltura cellulare*

I geni UL51, UL56 e UL89 del CMV codificano le subunità della terminasi del DNA virale del CMV. In coltura cellulare sono stati confermati CMV mutanti con ridotta sensibilità a letermovir. I valori della  $EC_{50}$  dei mutanti ricombinanti del CMV che esprimono le sostituzioni mappate in pUL51 (P91S), pUL56 (C25F, S229F, V231A, V231L, V236A, T244K, T244R, L254F, L257F, L257I, F261C, F261L, F261S, Y321C, L328V, M329T, A365S, N368D) e pUL89 (N320H, D344E) erano da 1,6 a < 10 volte superiori a quelli relativi al virus wild-type di riferimento; è improbabile che tali sostituzioni siano clinicamente rilevanti. I valori della  $EC_{50}$  dei mutanti ricombinanti del CMV che esprimono in pUL51 la sostituzione A95V o in pUL56 le sostituzioni N232Y, V236L, V236M, E237D, E237G, L241P, K258E, C325F, C325R, C325W, C325Y, R369G, R369M, R369S e R369T erano da 10 a 9 300 volte superiori a quelli relativi al virus wild-type di riferimento; alcune di queste sostituzioni sono state osservate in pazienti che hanno manifestato insuccesso della profilassi negli studi clinici (vedere sotto).

##### *Negli studi clinici*

In uno studio di fase 2b per la valutazione di dosi di letermovir da 60, 120 o 240 mg/die o placebo per un periodo massimo di 84 giorni in 131 adulti riceventi HSCT, è stata eseguita l'analisi della sequenza del DNA di una regione selezionata del gene UL56 (amminoacidi da 231 a 369) su campioni ottenuti da 12 soggetti trattati con letermovir, che avevano manifestato insuccesso della profilassi e per i quali erano disponibili campioni per l'analisi. In un soggetto (che riceveva la dose di 60 mg/die) era presente una variante genotipica (GV) resistente a letermovir (V236M).

In uno studio di fase 3 (P001), è stata eseguita l'analisi della sequenza del DNA di intere regioni codificant dei geni UL56 e UL89 su campioni ottenuti da 40 soggetti adulti trattati con letermovir nella popolazione di pazienti randomizzati che aveva ricevuto almeno una dose del trattamento assegnato (popolazione FAS), che avevano manifestato insuccesso della profilassi e per i quali erano disponibili campioni per l'analisi. In due soggetti sono state rilevate GV resistenti a letermovir, entrambe con sostituzioni mappate in pUL56. In un soggetto era presente la sostituzione V236M e nell'altro soggetto era presente la sostituzione E237G. In un ulteriore soggetto, in cui il DNA del CMV era rilevabile al basale (e quindi non compreso nella popolazione FAS) erano presenti in pUL56 le sostituzioni C325W e R369T, rilevate dopo l'interruzione di letermovir.

In uno studio di fase 3 (P040), è stata eseguita l'analisi della sequenza del DNA di intere regioni codificant dei geni UL51, UL56 e UL89 su campioni ottenuti da 32 soggetti adulti

(indipendentemente dal gruppo di trattamento) che avevano manifestato insuccesso della profilassi o che avevano interrotto precocemente il trattamento con viremia da CMV. Non sono state rilevate sostituzioni associate a resistenza a letermovir al di sopra del limite del 5% del test validato.

In uno studio di fase 3 (P002), è stata eseguita l'analisi della sequenza del DNA di intere regioni codificanti dei geni UL51, UL56 e UL89 su campioni ottenuti da 52 soggetti adulti trattati con letermovir che avevano manifestato malattia da CMV o che avevano interrotto precocemente il trattamento con viremia da CMV. Non sono state rilevate sostituzioni associate a resistenza a letermovir al di sopra del limite del 5% del test validato.

In uno studio di fase 2b (P030), è stata eseguita l'analisi della sequenza del DNA di intere regioni codificanti dei geni UL51, UL56 e UL89 su campioni ottenuti da 10 soggetti pediatrici trattati con letermovir durante una visita per la valutazione dell'infezione da CMV. In 2 soggetti sono state rilevate un totale di 2 sostituzioni associate alla resistenza a letermovir, entrambe mappate in pUL56. In un soggetto era presente la sostituzione R369S e nell'altro soggetto era presente la sostituzione C325W.

#### Resistenza crociata

È improbabile che si manifesti resistenza crociata con medicinali che possiedono un meccanismo d'azione differente. Letermovir è completamente attivo nei confronti di popolazioni virali con sostituzioni che conferiscono resistenza agli inibitori della DNA polimerasi del CMV (ganciclovir, cidofovir e foscarnet). Un gruppo di ceppi di CMV ricombinante con sostituzioni che conferiscono resistenza a letermovir era completamente sensibile a cidofovir, foscarnet e ganciclovir, ad eccezione di un ceppo ricombinante con la sostituzione E237G in pUL56 che conferisce una riduzione di 2,1 volte della sensibilità a ganciclovir rispetto al wild-type.

#### Elettrofisiologia cardiaca

In uno studio randomizzato, monodose, controllato con placebo e con controllo attivo (400 mg di moxifloxacina per via orale) con 4 periodi di crossover, è stato valutato l'effetto di letermovir sull'intervallo QTc in 38 soggetti adulti sani, con dosi fino a 960 mg somministrate per via endovenosa. Alla dose di 960 mg per via endovenosa, letermovir non prolunga il QTc in alcuna misura clinicamente rilevante, con concentrazioni plasmatiche circa 2 volte superiori rispetto alla dose di 480 mg per via endovenosa.

#### Efficacia e sicurezza clinica

##### *Adulti sieropositivi per CMV riceventi [R+] trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche*

###### *P001: Profilassi fino alla settimana 14 (circa 100 giorni) post HSCT*

Al fine di valutare la profilassi con letermovir come strategia di prevenzione dell'infezione o della malattia da CMV, l'efficacia di letermovir è stata valutata in uno studio di fase 3 multicentrico, in doppio cieco, controllato con placebo (P001) in adulti sieropositivi per CMV riceventi [R+] HSCT allogenico. I soggetti sono stati randomizzati (2:1) a ricevere letermovir a una dose di 480 mg una volta al giorno, aggiustata a 240 mg quando co-somministrato con ciclosporina, oppure placebo. La randomizzazione è stata stratificata per centro di sperimentazione e per rischio (alto vs. basso) di riattivazione del CMV al momento dell'ingresso nello studio. La terapia con letermovir è stata iniziata dopo HSCT (giorno 0-28 post HSCT) e continuata fino alla settimana 14 post HSCT. Letermovir è stato somministrato per via orale o per via endovenosa; la dose di letermovir era la stessa indipendentemente dalla via di somministrazione. I soggetti sono stati monitorati fino alla settimana 24 post HSCT per l'endpoint primario di efficacia e il follow-up è proseguito fino alla settimana 48 post HSCT.

I soggetti sono stati monitorati settimanalmente per il DNA del CMV, fino alla settimana 14 post HSCT e poi ogni due settimane fino alla settimana 24 post HSCT, con l'inizio della terapia

pre-emptive standard per il CMV se la DNAemia da CMV era considerata clinicamente significativa. I soggetti hanno proseguito il follow-up fino alla settimana 48 post HSCT.

Dei 565 soggetti trattati, 373 hanno ricevuto letermovir (di cui 99 hanno ricevuto almeno una dose per via endovenosa) e 192 hanno ricevuto il placebo (di cui 48 hanno ricevuto almeno una dose per via endovenosa). Il tempo mediano dell'inizio del trattamento con letermovir corrispondeva a 9 giorni dopo il trapianto. Nel trentasette per cento (37%) dei soggetti il trapianto ha attecchito al basale. L'età mediana era pari a 54 anni (intervallo: 18-78 anni); 56 (15,0%) soggetti erano di età pari o superiore a 65 anni; il 58% dei soggetti era di sesso maschile; l'82% era di etnia bianca, il 10% di etnia asiatica, il 2% di etnia nera o africana e il 7% di etnia ispanica o latina. Al basale, il 50% dei soggetti ha ricevuto un regime mieloablattivo, il 52% assumeva ciclosporina e il 42% assumeva tacrolimus. Le motivazioni principali del trapianto più comuni erano la leucemia mieloide acuta (38%), la sindrome mieloblastica (15%) e il linfoma (13%). Il dodici per cento (12%) dei soggetti era positivo per DNA del CMV al basale.

Al basale, il 31% dei soggetti era ad alto rischio di riattivazione, come definito da uno o più dei seguenti criteri: antigene leucocitario umano (*Human Leucocyte Antigen*, HLA) da donatore consanguineo (fratello) con almeno un mismatch in uno dei seguenti tre loci del gene HLA: HLA-A, -B o -DR, donatore aploidentico; donatore non consanguineo con almeno un mismatch in uno dei seguenti quattro loci del gene HLA: HLA-A, -B, -C e -DRB1; impiego di sangue del cordone ombelicale come fonte di cellule staminali; impiego di innesti *ex vivo* con deplezione di cellule T; malattia del trapianto contro l'ospite (GVHD) di grado 2 o superiore che richiede la somministrazione di corticosteroidi sistemici.

#### *Endpoint primario di efficacia*

L'endpoint primario di efficacia di infezione da CMV clinicamente significativa nello studio P001 era definito da un'incidenza di DNAemia da CMV che richiedesse una terapia pre-emptive (PET) anti-CMV o il verificarsi di una malattia da CMV con localizzazione d'organo. È stato utilizzato l'approccio non completamento=insuccesso (NC=I), secondo il quale i soggetti che interrompevano lo studio prima della settimana 24 post HSCT o che non presentavano un esito alla settimana 24 post HSCT sono stati considerati come insuccessi terapeutici.

Nell'analisi dell'endpoint primario, letermovir ha dimostrato un'efficacia superiore rispetto al placebo, come mostrato nella Tabella 4. La differenza tra i trattamenti stimata del -23,5% era statisticamente significativa (valore p unilaterale < 0,0001).

**Tabella 4: P001: Risultati di efficacia nei riceventi HSCT (approccio NC=I, popolazione FAS)**

<b>Parametro</b>	<b>Letermovir (N=325) n (%)</b>	<b>Placebo (N=170) n (%)</b>
Endpoint primario di efficacia (Percentuale di soggetti in cui si è verificato insuccesso della profilassi entro la settimana 24)	122 (37,5)	103 (60,6)
Motivi dell'insuccesso <sup>†</sup>		
Infezione da CMV clinicamente significativa	57 (17,5)	71 (41,8)
DNAemia da CMV che richiedeva la PET	52 (16,0)	68 (40,0)
Malattia da CMV con localizzazione d'organo	5 (1,5)	3 (1,8)
Interruzione dello studio	56 (17,2)	27 (15,9)
Assenza di esito	9 (2,8)	5 (2,9)
Differenza tra i trattamenti rettificata per strato (letermovir-placebo) <sup>§</sup>		
Differenza (IC 95%)	-23,5 (-32,5; -14,6)	
valore p	< 0,0001	

<sup>†</sup> Le categorie di insuccesso sono reciprocamente esclusive e basate sulla gerarchia delle categorie nell'ordine elencato.


<sup>§</sup> Gli IC al 95% e il valore p per le differenze tra i trattamenti nella percentuale di risposta sono stati calcolati usando il metodo di Mantel-Haenszel rettificato per strati, con la differenza ponderata mediante la media armonica della dimensione del campione per braccio per ogni strato (alto o basso rischio). Per dichiarare la significatività statistica è stato utilizzato un valore p unilaterale  $\leq 0,0249$ .  
FAS=Full analysis set (serie completa di analisi); la popolazione FAS include soggetti randomizzati che hanno ricevuto almeno una dose del medicinale in studio ed esclude soggetti con DNA del CMV rilevabile al basale. Approccio per la gestione di valori mancanti: approccio non completamento=insuccesso (NC=I). Con l'approccio NC=I, l'insuccesso è stato determinato da tutti i soggetti con un'infezione da CMV clinicamente significativa o che hanno interrotto prematuramente lo studio, o che non hanno presentato un esito nel corso della finestra temporale per la visita della settimana 24 post HSCT.

N=numero di soggetti in ciascun gruppo di trattamento.  
n (%)=numero (percentuale) di soggetti in ciascuna sottocategoria.

Nota: la percentuale dei soggetti con DNA del CMV rilevabile al giorno 1 che ha sviluppato infezione da CMV clinicamente significativa alla settimana 24 post HSCT nel gruppo letermovir è stata del 64,6% (31/48) rispetto al 90,9% (20/22) nel gruppo placebo. La differenza stimata (IC 95% per la differenza) è stata -26,1% (-45,9%; -6,3%), con un valore p nominale unilaterale < 0,0048.

I fattori associati alla DNAemia da CMV dopo la settimana 14 post HSCT tra i soggetti trattati con letermovir includevano l'alto rischio di riattivazione del CMV al basale, GVHD, l'uso di corticosteroidi e lo stato sierologico del donatore negativo per CMV.


**Figura 1: P001: Diagramma di Kaplan-Meier del tempo all'inizio della PET anti-CMV o all'insorgenza di malattia da CMV con localizzazione d'organo fino alla settimana 24 post trapianto nei riceventi HSCT (popolazione FAS)**



Non vi sono state differenze in termini di incidenza o di tempo dell'atteccimento tra il gruppo di letermovir e quello placebo.

L'efficacia è risultata coerentemente a favore di letermovir in tutti i sottogruppi, compresi quelli a basso e ad alto rischio di riattivazione del CMV, in regime di condizionamento e in regime immunosoppressivo concomitante (vedere Figura 2).

**Figura 2: P001: diagramma di Forest della percentuale di soggetti che iniziavano la PET anti-CMV o con malattia da CMV con localizzazione d'organo fino alla settimana 24 post HSCT per sottogruppi selezionati (approccio NC=I, popolazione FAS)**



NC=I, non completamento=insuccesso. Con l'approccio non completamento=insuccesso (NC=I), i soggetti che interrompevano lo studio prima della settimana 24 post trapianto o che non presentavano un esito alla settimana 24 post trapianto sono stati considerati come insuccessi terapeutici.

#### P040: Profilassi dalla settimana 14 (circa 100 giorni) fino alla settimana 28 (circa 200 giorni) post HSCT

L'efficacia dell'estensione della profilassi con letermovir dalla settimana 14 (circa 100 giorni) fino alla settimana 28 (circa 200 giorni) post HSCT in pazienti a rischio di infezione e malattia da CMV tardive è stata valutata in uno studio di fase 3 (P040) multicentrico, in doppio cieco, controllato con placebo in adulti sieropositivi per CMV riceventi [R+] HSCT allogenico. I soggetti idonei che avevano completato la profilassi con letermovir fino a circa 100 giorni post HSCT sono stati randomizzati (2:1) a ricevere letermovir o placebo dalla settimana 14 fino alla settimana 28 post HSCT. I soggetti sono stati monitorati fino alla settimana 28 post HSCT per l'endpoint primario di efficacia con follow-up continuo dopo la sospensione del trattamento fino alla settimana 48 post HSCT.

Dei 218 soggetti trattati, 144 soggetti hanno ricevuto letermovir e 74 hanno ricevuto il placebo. L'età mediana era pari a 55 anni (intervallo: da 20 a 74 anni); il 62% dei soggetti era di sesso maschile; il 79% era di etnia bianca; l'11% di etnia asiatica; il 2% di etnia nera e il 10% era di etnia ispanica o latina. Le motivazioni del trapianto più comuni erano la leucemia mieloide acuta (42%), la leucemia linfocitica acuta (15%) e la sindrome mielodisplastica (11%).

All'ingresso nello studio, tutti i soggetti presentavano fattori di rischio per infezione e malattia da CMV tardive, con il 64% che presentava due o più fattori di rischio. I fattori di rischio comprendevano: HLA da donatore consanguineo (fratello) con almeno un mismatch in uno dei seguenti tre loci del gene HLA: HLA-A, -B o -DR; donatore aploidentico; donatore non consanguineo

con almeno un mismatch in uno dei seguenti quattro loci del gene HLA: HLA-A, -B, -C e -DRB1; impiego di sangue del cordone ombelicale come fonte di cellule staminali; impiego di innesti *ex vivo* con deplezione di cellule T; trattamento con globulina anti-timociti; trattamento con alemtuzumab; impiego di prednisone sistematico (o equivalente) alla dose di  $\geq 1$  mg/kg di peso corporeo al giorno.

#### *Endpoint primario di efficacia*

L'endpoint primario di efficacia dello studio P040 era l'incidenza dell'infezione da CMV clinicamente significativa fino alla settimana 28 post HSCT. L'infezione da CMV clinicamente significativa è stata definita come l'insorgenza di malattia da CMV con localizzazione d'organo o l'inizio della PET anti-CMV sulla base della viremia da CMV documentata e della condizione clinica del soggetto. È stato utilizzato l'approccio *Observed Failure* (OF), secondo il quale i soggetti che avevano sviluppato un'infezione da CMV clinicamente significativa o avevano interrotto prematuramente lo studio con viremia sono stati considerati come insuccessi terapeutici.

Nell'analisi dell'endpoint primario, letermovir ha dimostrato un'efficacia superiore rispetto al placebo, come mostrato nella Tabella 5. La differenza tra i trattamenti stimata del -16,1% era statisticamente significativa (valore p unilaterale=0,0005). L'efficacia è stata costantemente a favore di letermovir nei sottogruppi in base alle caratteristiche dei soggetti (età, sesso, etnia) e ai fattori di rischio per infezione e malattia da CMV tardive.

**Tabella 5: P040: Risultati di efficacia nei riceventi HSCT a rischio di infezione e malattia da CMV tardive (approccio OF, popolazione FAS)**

Parametro	Letermovir (circa 200 giorni di letermovir) (N=144) n (%)	Placebo (circa 100 giorni di letermovir) (N=74) n (%)
<b>Insuccessi*</b>	<b>4 (2,8)</b>	<b>14 (18,9)</b>
Infezione da CMV clinicamente significativa fino alla settimana 28 <sup>†</sup>	2 (1,4)	13 (17,6)
Inizio della PET sulla base della viremia da CMV documentata	1 (0,7)	11 (14,9)
Malattia da CMV con localizzazione d'organo	1 (0,7)	2 (2,7)
Interruzione dello studio con viremia da CMV prima della settimana 28	2 (1,4)	1 (1,4)
<b>Differenza tra i trattamenti rettificata per strato (letermovir (circa 200 giorni di letermovir)-Placebo (circa 100 giorni di letermovir))<sup>‡</sup></b>		
Differenza (IC 95%)	-16,1 (-25,8; -6,5)	
valore p	0,0005	

\* Le categorie di insuccesso sono reciprocamente esclusive e basate sulla gerarchia delle categorie nell'ordine elencato.

† L'infezione da CMV clinicamente significativa è stata definita come malattia da CMV con localizzazione d'organo (accertata o probabile) o l'inizio della PET sulla base della viremia da CMV documentata e della condizione clinica del soggetto.

‡ Gli IC al 95% e il valore p per le differenze tra i trattamenti nella percentuale di risposta sono stati calcolati usando il metodo di Mantel-Haenszel rettificato per strati, con la differenza ponderata mediante la media armonica della dimensione del campione per braccio per ogni strato (donatore aploidentico sì o no). Per dichiarare la significatività statistica è stato utilizzato un valore p unilaterale  $\leq 0,0249$ .

Approccio per la gestione di valori mancanti: approccio *Observed Failure* (OF). Con l'approccio OF, l'insuccesso è stato determinato da tutti i soggetti che hanno sviluppato un'infezione da CMV clinicamente significativa o che hanno interrotto prematuramente lo studio con viremia da CMV dalla settimana 14 (circa 100 giorni) fino alla settimana 28 (circa 200 giorni) post HSCT.

N=numero di soggetti in ciascun gruppo di trattamento.

n (%)=numero (percentuale) di soggetti in ciascuna sottocategoria.

*P002: Adulto sieronegativo per CMV sottoposto a un trapianto di rene da un donatore sieropositivo per CMV [D+/R-]*

Per valutare la profilassi con letermovir come strategia preventiva per la malattia da CMV nei pazienti sottoposti a trapianto di rene, l'efficacia di letermovir è stata valutata in uno studio di non inferiorità di fase 3 (P002) multicentrico, in doppio cieco, controllato con comparatore attivo in adulti ad alto rischio [D+/R-] sottoposti a trapianto di rene. I soggetti sono stati randomizzati (1:1) a ricevere letermovir o valganciclovir. Letermovir è stato somministrato in concomitanza con aciclovir.

Valganciclovir è stato somministrato in concomitanza con placebo ad aciclovir. La randomizzazione è stata stratificata in base all'uso o non uso di un'immunoterapia antilinfocitaria altamente citolitica durante l'induzione. Il trattamento con letermovir o valganciclovir è iniziato tra il giorno 0 e il giorno 7 post trapianto di rene ed è stato proseguito fino alla settimana 28 (circa 200 giorni) post trapianto. I soggetti sono stati monitorati fino alla settimana 52 post trapianto.

Dei 589 soggetti trattati, 292 soggetti hanno ricevuto letermovir e 297 hanno ricevuto valganciclovir. L'età media era pari a 51 anni (intervallo: da 18 a 82 anni); il 72% dei soggetti era di sesso maschile; l'84% era di etnia bianca; il 2% di etnia asiatica; il 9% di etnia nera; il 17% era di etnia ispanica o latina e il 60% aveva ricevuto un rene da un donatore deceduto. Le motivazioni principali del trapianto più comuni erano la malattia cistica del rene congenita (17%), l'ipertensione (16%) e il/la diabete/nefropatia diabetica (14%).

*Endpoint primario di efficacia*

L'endpoint primario di efficacia dello studio P002 era l'incidenza della malattia da CMV (malattia da CMV con localizzazione d'organo o sindrome da CMV, confermata da un comitato di valutazione indipendente) fino alla settimana 52 post trapianto. È stato utilizzato l'approccio OF, secondo il quale i soggetti che avevano interrotto prematuramente lo studio per qualsiasi motivo o per i quali non vi erano dati al *timepoint* non sono stati considerati come insuccessi terapeutici.

Nell'analisi dell'endpoint primario, letermovir ha dimostrato una non inferiorità rispetto a valganciclovir, come mostrato nella Tabella 6.

**Tabella 6: P002: Risultati di efficacia nei riceventi trapianto di rene (approccio OF, popolazione FAS)**

Parametro	Letermovir (N=289) n (%)	Valganciclovir (N=297) n (%)
<b>Malattia da CMV* fino alla settimana 52</b>	<b>30 (10,4)</b>	<b>35 (11,8)</b>
Differenza tra i trattamenti rettificata per strato (letermovir-valganciclovir) <sup>†</sup> Differenza (IC 95%)		-1,4 (-6,5; 3,8) <sup>‡</sup>

\* I casi di malattia da CMV sono stati confermati da un comitato di valutazione indipendente.

<sup>†</sup> Gli IC al 95% per le differenze tra i trattamenti nella percentuale di risposta sono stati calcolati usando il metodo di Mantel-Haenszel rettificato per strati, con la differenza ponderata mediante la media armonica della dimensione del campione per braccio per ogni strato (uso/non uso di un'immunoterapia antilinfocitaria altamente citolitica durante l'induzione).

<sup>‡</sup> Sulla base di un margine di non inferiorità del 10%, letermovir è non inferiore a valganciclovir.

Approccio per la gestione di valori mancanti: approccio *Observed Failure* (OF). Con l'approccio OF, i partecipanti che avevano interrotto prematuramente lo studio per qualsiasi motivo non sono stati considerati come insuccessi terapeutici.

Nota: Ai soggetti randomizzati nel gruppo letermovir è stato somministrato aciclovir per la profilassi del virus herpes simplex (*herpes simplex virus*, HSV) e del virus varicella zoster (*varicella zoster virus*, VZV). Ai soggetti randomizzati nel gruppo valganciclovir è stato somministrato placebo ad

aciclovir.

N=numero di soggetti in ciascun gruppo di trattamento.

n (%)=numero (percentuale) di soggetti in ciascuna sottocategoria.

L'efficacia è risultata comparabile in tutti i sottogruppi, compresi sesso, età, etnia, regione e uso/non uso di un'immunoterapia antilinfocitaria altamente citolitica durante l'induzione.

### Popolazione pediatrica

#### *P030: Pazienti pediatrici riceventi trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche*

Al fine di valutare la profilassi con letermovir come strategia di prevenzione dell'infezione o della malattia da CMV nei pazienti pediatrici sottoposti a trapianto, l'efficacia di letermovir è stata valutata in uno studio di fase 2b (P030) multicentrico, in aperto, a braccio singolo in pazienti pediatrici riceventi HSCT allogenico. La terapia con il medicinale in studio è iniziata dopo HSCT (giorno 0-28 post HSCT) e continuato fino alla settimana 14 post HSCT. Il medicinale in studio è stato somministrato per via orale o per via endovenosa; la dose di letermovir è stata basata su età, peso corporeo e formulazione.

Dei 63 soggetti trattati, 8 avevano un'età compresa tra 0 e inferiore a 2 anni, 27 avevano un'età compresa tra 2 e inferiore a 12 anni e 28 avevano un'età compresa tra 12 e inferiore a 18 anni. Al basale, l'87% dei soggetti ha ricevuto un regime mieloablattivo, il 67% assumeva ciclosporina e il 27% assumeva tacrolimus. Le motivazioni principali del trapianto più comuni erano la leucemia mieloide acuta (18%) e l'anemia aplastica (10%) nella popolazione globale e immunodeficienza combinata (37,5%) e linfostiocitosi emofagocitica familiare (25,0%) nei bambini di età inferiore a 2 anni.

#### *Endpoint secondario di efficacia*

L'endpoint di efficacia dello studio P030 è stato secondario e includeva l'incidenza di infezione da CMV clinicamente significativa fino alla settimana 14 post HSCT e fino alla settimana 24 post HSCT. L'infezione da CMV clinicamente significativa era definita come l'insorgenza della malattia da CMV con localizzazione d'organo o l'inizio della PET anti-CMV sulla base della viremia da CMV documentata e della condizione clinica del soggetto. L'incidenza di infezione da CMV clinicamente significativa è stata di 7,1% e di 10,7% rispettivamente fino alla settimana 14 post HSCT e alla settimana 24 post HSCT.

## **5.2 Proprietà farmacocinetiche**

Nei soggetti adulti sani, la farmacocinetica di letermovir è stata caratterizzata in seguito alla somministrazione per via orale e per via endovenosa. L'esposizione a letermovir è aumentata in misura superiore a quella proporzionale alla dose con entrambe le somministrazioni per via orale o per via endovenosa. È probabile che il meccanismo sia la saturazione/autoinibizione di OATP1B1/3. La farmacocinetica di letermovir è stata anche caratterizzata in seguito alla somministrazione per via orale e per via endovenosa negli adulti riceventi HSCT (vedere Tabella 7) e nei pazienti pediatrici riceventi HSCT (vedere Tabella 9 e Tabella 10) e in seguito alla somministrazione per via orale negli adulti riceventi trapianto di rene (vedere Tabella 8).

#### *Soggetti adulti sani*

La media geometrica dei valori AUC e C<sub>max</sub> allo stato stazionario era pari a 71 500 ng•hr/mL e 13 000 ng/mL, rispettivamente, con letermovir 480 mg assunto per via orale una volta al giorno.

Le termovir ha raggiunto lo stato stazionario in 9-10 giorni, con un tasso di accumulo di 1,2 per l'AUC e di 1 per la C<sub>max</sub>.

#### *Adulti riceventi HSCT*

L'AUC di letermovir è stata stimata utilizzando l'analisi farmacocinetica di popolazione usando i dati dello studio di fase 3 P001 (vedere Tabella 7). Le differenze nell'esposizione tra i regimi di

trattamento non sono clinicamente rilevanti; l'efficacia è risultata coerente in tutto l'intervallo di esposizioni osservate nello studio P001.

**Tabella 7: Valori dell'AUC di letermovir (ng•hr/mL) negli adulti riceventi HSCT**

Regime di trattamento	Mediana (intervallo di previsione 90%)*
480 mg per via orale, senza ciclosporina	34 400 (16 900; 73 700)
480 mg per via endovenosa, senza ciclosporina	100 000 (65 300; 148 000)
240 mg per via orale, con ciclosporina	60 800 (28 700; 122 000)
240 mg per via endovenosa, con ciclosporina	70 300 (46 200; 106 000)

\* Previsioni a posteriori per la popolazione ottenute dall'analisi farmacocinetica (Pharmacokinetics, PK) di popolazione usando i dati della fase 3

#### *Adulti riceventi trapianto di rene*

L'AUC di letermovir è stata stimata utilizzando l'analisi farmacocinetica di popolazione usando i dati dello studio di fase 3 P002 (vedere Tabella 8). L'efficacia è risultata coerente in tutto l'intervallo di esposizioni osservate nello studio P002.

**Tabella 8: Valori dell'AUC di letermovir (ng•hr/mL) negli adulti riceventi trapianto di rene**

Regime di trattamento	Mediana (intervallo di previsione 90%)*
480 mg per via orale, senza ciclosporina	62 200 (28 900; 145 000)
240 mg per via orale, con ciclosporina	57 700 (26 900; 135 000)

\* Le mediane e gli intervalli di previsione al 90% si basano su simulazioni che utilizzano il modello di PK di popolazione della fase 3 con variabilità interindividuale.  
Nota: la PK di letermovir non è stata studiata dopo la somministrazione per via endovenosa nei riceventi trapianto di rene; tuttavia, l'AUC prevista dopo la somministrazione per via endovenosa è simile al modello dell'AUC prevista dopo la somministrazione per via endovenosa nei riceventi HSCT (vedere Tabella 7).

#### Assorbimento

Nei soggetti adulti sani, letermovir è stato assorbito rapidamente con un tempo mediano alla concentrazione plasmatica massima ( $T_{max}$ ) da 1,5 a 3,0 ore e diminuiva con un andamento bifasico. Negli adulti riceventi HSCT, si stima che la biodisponibilità di letermovir sia circa del 35%, con letermovir alla dose di 480 mg per via orale una volta al giorno, somministrato senza ciclosporina. Si stima che la variabilità interindividuale della biodisponibilità sia circa del 37%. Negli adulti riceventi trapianto di rene, si stima che la biodisponibilità di letermovir sia circa del 60%, con letermovir alla dose di 480 mg per via orale una volta al giorno, somministrato senza ciclosporina.

#### *Effetto della ciclosporina*

Negli adulti riceventi HSCT, la co-somministrazione di ciclosporina ha determinato un aumento delle concentrazioni plasmatiche di letermovir a causa dell'inibizione del OATP1B. Nei pazienti si stima che la biodisponibilità di letermovir sia circa dell'85%, con letermovir alla dose di 240 mg per via orale una volta al giorno, co-somministrato con ciclosporina.

Se letermovir viene co-somministrato con ciclosporina, la dose raccomandata di letermovir è di 240 mg una volta al giorno in pazienti adulti e pediatrici di peso corporeo di almeno 30 kg (vedere paragrafo 4.2). Se letermovir per via orale viene co-somministrato con ciclosporina in pazienti pediatrici di peso corporeo inferiore a 30 kg, la dose deve essere ridotta (vedere paragrafo 4.2).

#### *Effetto del cibo*

In soggetti adulti sani, la somministrazione per via orale di una dose singola di una compressa di letermovir da 480 mg durante un pasto standard ad alto contenuto lipidico e calorico non ha avuto alcun effetto sull'esposizione complessiva (AUC) e ha determinato un aumento dei livelli di picco

( $C_{max}$ ) di letermovir di circa il 30%. Letermovir compresse può essere somministrato per via orale con o senza cibo, secondo quanto effettuato negli studi clinici (vedere paragrafo 4.2).

In soggetti adulti sani, la somministrazione per via orale di una dose singola di letermovir granulato da 240 mg con cibi morbidi (budino o purea di mela) ha determinato un aumento di circa il 13% e il 20% dell'esposizione complessiva (AUC) e ha determinato un aumento dei livelli di picco ( $C_{max}$ ) di letermovir di circa il 25% e il 33%. Letermovir granulato può essere somministrato con cibi morbidi, così come è avvenuto nello studio pediatrico (vedere paragrafo 4.2).

### Distribuzione

Sulla base dell'analisi farmacocinetica di popolazione, in seguito alla somministrazione endovenosa negli adulti riceventi HSCT, si stima che il volume di distribuzione medio allo stato stazionario sia 45,5 L.

*In vitro* letermovir è ampiamente legato (98,2%) alle proteine plasmatiche umane, indipendentemente dall'intervallo di concentrazione (da 3 a 100 mg/L) valutato. Una certa saturazione è stata osservata a concentrazioni inferiori. La ripartizione sangue-plasma di letermovir corrisponde a 0,56 ed è indipendente dall'intervallo delle concentrazioni (da 0,1 a 10 mg/L) valutato *in vitro*.

Negli studi preclinici sulla distribuzione, letermovir viene distribuito a organi e tessuti, con le concentrazioni più alte osservate nell'apparato gastrointestinale, nei dotti biliari e nel fegato e con concentrazioni basse nell'encefalo.

### Biotrasformazione

Nel plasma, la maggior parte dei componenti correlati a letermovir è costituita da precursori immodificati (96,6%). Non sono stati rilevati metaboliti rilevanti nel plasma. Letermovir viene parzialmente eliminato tramite glucuronidazione mediata da UGT1A1/1A3.

### Eliminazione

Nei soggetti adulti sani, con la dose di 480 mg per via endovenosa l'emivita terminale media apparente di letermovir è di circa 12 ore. Le principali vie di eliminazione di letermovir sono l'escrezione biliare e la glucuronidazione diretta. Il processo coinvolge i trasportatori del trasporto attivo epatico OATP1B1 e 3, seguito dalla glucuronidazione catalizzata da UGT1A1/3.

Sulla base dell'analisi farmacocinetica di popolazione, si stima che la CL apparente di letermovir allo stato stazionario in seguito alla somministrazione endovenosa di 480 mg negli adulti riceventi HSCT sia di 4,84 L/h. Si stima che la variabilità interindividuale della CL sia del 24,6%.

### Escrezione

Dopo somministrazione per via orale di letermovir radiomarcato, il 93,3% della radioattività è stata riscontrata nelle feci. La maggior parte di letermovir è stata escreta a livello biliare come precursore immodificato, con una quantità minore (6% della dose) sotto forma del metabolita acilglucuronide nelle feci. L'acilglucuronide è instabile nelle feci. L'escrezione urinaria di letermovir è stata trascurabile (< 2% della dose).

### Farmacocinetica in popolazioni speciali

#### *Compromissione epatica*

Nei soggetti adulti con compromissione epatica di grado moderato (Child-Pugh classe B [CP-B], punteggio 7-9) e severo (Child-Pugh classe C [CP-C], punteggio 10-15), l'AUC di letermovir libero è risultata rispettivamente di circa l'81% e 4 volte maggiore rispetto ai soggetti adulti sani. Le variazioni nell'esposizione a letermovir nei soggetti adulti con compromissione epatica moderata non sono clinicamente rilevanti.

Sono previsti aumenti marcati nell'esposizione a letermovir libero nei pazienti con compromissione epatica moderata associata a compromissione renale moderata o severa (vedere paragrafo 4.2).

#### *Compromissione renale*

##### *Studio clinico in una popolazione con compromissione renale*

Nei soggetti adulti con compromissione renale di grado moderato (eGFR pari a 31,0-56,8 mL/min/1,73m<sup>2</sup>) e severo (eGFR pari a 11,9-28,1 mL/min/1,73m<sup>2</sup>), l'AUC di letermovir libero è risultata rispettivamente di circa il 115 e l'81% maggiore rispetto ai soggetti adulti sani. Le variazioni nell'esposizione a letermovir dovute alla compromissione renale da moderata a severa non sono clinicamente rilevanti. I soggetti con ESRD non sono stati studiati.

#### *Post trapianto di rene (P002)*

Sulla base dell'analisi farmacocinetica di popolazione, l'AUC di letermovir è risultata rispettivamente di circa il 12%, 27% e 35% più alta nei soggetti adulti con compromissione renale lieve (CrCl maggiore o uguale da 60 a meno di 90 mL/min), moderata (CrCl maggiore o uguale da 30 a meno di 60 mL/min) e severa (CrCl maggiore o uguale da 15 a meno di 30 mL/min), rispetto ai soggetti adulti con CrCl maggiore o uguale a 90 mL/min. Questi cambiamenti non sono considerati clinicamente rilevanti.

#### *Peso*

Sulla base dell'analisi farmacocinetica di popolazione nei soggetti adulti sani, si stima che l'AUC di letermovir sia inferiore del 18,7% nei soggetti con peso corporeo pari a 80-100 kg rispetto a quelli con peso pari a 67 kg. Sulla base dell'analisi farmacocinetica di popolazione negli adulti riceventi trapianto di rene (P002), si stima che l'AUC di letermovir sia inferiore del 26% nei soggetti con peso corporeo superiore a 80 kg rispetto a quelli con peso inferiore o pari a 80 kg. Queste differenze non sono clinicamente rilevanti.

#### *Etnia*

Sulla base dell'analisi farmacocinetica di popolazione nei soggetti adulti sani, si stima che l'AUC di letermovir sia più elevata nella misura del 33,2% nei soggetti di etnia asiatica rispetto a quelli di etnia bianca. Questa variazione non è clinicamente rilevante.

#### *Sesso*

Sulla base dell'analisi farmacocinetica di popolazione, non vi è alcuna differenza nella farmacocinetica di letermovir nelle donne adulte rispetto agli uomini.

#### *Anziani*

Sulla base dell'analisi farmacocinetica di popolazione, l'età non ha alcun effetto sulla farmacocinetica di letermovir. Non è necessario alcun adattamento della dose in base all'età.

#### *Popolazione pediatrica*

L'AUC di letermovir nei pazienti pediatrici riceventi HSCT è stata stimata mediante l'analisi farmacocinetica di popolazione usando i dati di farmacocinetica osservati nello studio P030 (vedere Tabella 9 e Tabella 10). Le esposizioni per i pazienti pediatrici riceventi HSCT in tutte le fasce di peso corporeo rientrano nell'intervallo di esposizioni raggiunte nelle esposizioni di riferimento per gli adulti riceventi HSCT (vedere Tabella 7).

**Tabella 9: Valori dell'AUC di letermovir (ng•hr/mL) dopo somministrazione per via orale nei pazienti pediatrici riceventi HSCT**

Peso corporeo	Dose orale, senza ciclosporina	Mediana (intervallo di previsione 90%)*	Dose orale, con ciclosporina	Mediana (intervallo di previsione 90%)*
pari e superiore a 30 kg	480 mg	39 100 (18 700-81 300)	240 mg	49 100 (23 200-104 000)
da 15 kg a meno di 30 kg	240 mg	38 900 (20 200-74 300)	120 mg	51 000 (26 600-98 200)
da 7,5 kg a meno di 15 kg	120 mg	32 000 (16 700-59 300)	60 mg	41 600 (22 300-81 100)
da 5 kg a meno di 7,5 kg	80 mg	30 600 (16 200-55 000)	40 mg	39 000 (20 600-72 000)

\* Le mediane e gli intervalli di previsione al 90% si basano su simulazioni che utilizzano il modello di PK di popolazione pediatrica HSCT con variabilità interindividuale.

**Tabella 10: Valori dell'AUC di letermovir (ng•hr/mL) dopo somministrazione per via endovenosa nei pazienti pediatrici riceventi HSCT**

Peso corporeo	Dose orale, senza ciclosporina	Mediana (intervallo di previsione 90%)*	Dose orale, con ciclosporina	Mediana (intervallo di previsione 90%)*
pari e superiore a 30 kg	480 mg	111 000 (55 700-218 000)	240 mg	59 800 (28 400-120 000)
da 15 kg a meno di 30 kg	120 mg	57 200 (29 700-113 000)	120 mg	61 100 (29 900-121 000)
da 7,5 kg a meno di 15 kg	60 mg	46 000 (24 300-83 900)	60 mg	49 200 (25 800-93 800)
da 5 kg a meno di 7,5 kg	40 mg	43 400 (24 300-81 000)	40 mg	45 900 (24 900-82 200)

\* Le mediane e gli intervalli di previsione al 90% si basano su simulazioni che utilizzano il modello di PK di popolazione pediatrica HSCT con variabilità interindividuale.

### 5.3 Dati preclinici di sicurezza

#### Tossicità generale

È stata osservata tossicità testicolare irreversibile soltanto nei ratti per esposizioni sistemiche (AUC)  $\geq$  3 volte l'esposizione umana alla dose raccomandata per l'uomo (Recommended Human Dose, RHD). Tale tossicità è stata caratterizzata da degenerazione dei tubuli seminali e oligospermia e presenza di detriti cellulari negli epididimi, con riduzione del peso testicolare ed epididimario. Non è emersa tossicità testicolare nei ratti a esposizioni (AUC) simili a quelle dell'uomo alla RHD. Nei topi e nelle scimmie non è stata osservata tossicità testicolare alle dosi più alte studiate, con esposizioni rispettivamente fino a 4 e 2 volte quelle dell'uomo alla RHD. La rilevanza per l'uomo non è nota.

#### Cancerogenesi

Uno studio di cancerogenesi per via orale della durata di 6 mesi condotto su topi transgenici RasH2 (Tg.RasH2) non ha mostrato evidenza di tumorigenesi rilevante per l'uomo fino alle dosi più elevate testate, 150 mg/kg/die e 300 mg/kg/die rispettivamente nei maschi e nelle femmine.

#### Mutagenesi

Letermovir non si è dimostrato genotossico in una batteria di test *in vitro* o *in vivo*, tra cui analisi di mutagenesi microbica e aberrazioni cromosomiche nelle cellule ovariche di criceto cinese, e in uno studio del micronucleo murino *in vivo*.

## Riproduzione

### *Fertilità*

Negli studi sulla fertilità e sullo sviluppo embrionale iniziale nel ratto, non vi è stato alcun effetto di letermovir sulla fertilità femminile. Nei maschi di ratto, sono state osservate riduzioni della concentrazione di spermatozoi, della loro motilità e della fertilità per esposizioni sistemiche  $\geq 3$  volte l'AUC nell'uomo alla RHD (vedere Tossicità generale).

Nelle scimmie a cui veniva somministrato letermovir, in base alla valutazione istopatologica, la misurazione della dimensione testicolare, l'analisi ematica ormonale (ormone follicolo-stimolante, inibina B e testosterone) e la valutazione degli spermatozoi (conta spermatica, motilità e morfologia), non è stata rilevata alcuna evidenza di tossicità testicolare per esposizioni sistemiche pari a circa 2 volte l'AUC nell'uomo alla RHD.

### Sviluppo

Nei ratti, è stata osservata una tossicità materna (compresa la diminuzione nel peso corporeo) alla dose di 250 mg/kg/die (circa 11 volte la AUC alla RHD); nella prole sono stati osservati una riduzione del peso fetale con ossificazione ritardata, leggero edema fetale e un aumento dell'incidenza di brevità del cordone ombelicale e di variazioni e malformazioni a livello vertebrale, costale e pelvico. Alla dose di 50 mg/kg/die (circa 2,5 volte l'AUC alla RHD) non è stato osservato alcun effetto sulla madre o sullo sviluppo fetale.

Nei conigli è stata osservata una tossicità materna (tra cui mortalità e aborti) alla dose di 225 mg/kg/die (circa 2 volte la AUC alla RHD); nella prole è stato osservato un aumento dell'incidenza di malformazioni e variazioni a livello vertebrale e costale.

Nello studio sullo sviluppo pre e postnatale, letermovir è stato somministrato per via orale a femmine di ratto gravide. Non è stata osservata alcuna tossicità sullo sviluppo fino alla massima esposizione studiata (2 volte l'AUC alla RHD).

## **6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE**

### **6.1 Elenco degli eccipienti**

Cellulosa microcristallina (E460)  
Croscarmellosa sodica (E468)  
Povidone (E1201)  
Silice colloidale anidra (E551)  
Magnesio stearato (E470b)  
Lattosio monoidrato  
Ipromellosa (E464)  
Titanio diossido (E171)  
Triacetina  
Ossido di ferro giallo (E172)  
Ossido di ferro rosso (E172)

### **6.2 Incompatibilità**

Non pertinente.

### **6.3 Periodo di validità**

3 anni

## **6.4 Precauzioni particolari per la conservazione**

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

## **6.5 Natura e contenuto del contenitore**

Bustine di Polietilene tereftalato (PET)/Foglio di alluminio/Polietilene lineare a bassa densità (LLDPE). Ogni confezione contiene 30 bustine.

## **6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento**

Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.

### Preparazione

PREVYMIS granulato viene somministrato per via orale miscelato con cibo morbido oppure mediante sondino NG o sondino G.

#### *Preparazione e somministrazione miscelato con cibo morbido*

Vedere le **Istruzioni per l'uso** per le informazioni sulla preparazione e la somministrazione di PREVYMIS granulato miscelato con cibo morbido.

- Non frantumare o masticare PREVYMIS granulato.
- Versare PREVYMIS granulato in 1 o 3 cucchiaini di cibo morbido a temperatura ambiente o inferiore. Non utilizzare cibo caldo. Esempi di cibo morbido sono la purea di mela o lo yogurt.
- Mescolare PREVYMIS granulato con cibo morbido.
- Somministrare l'intera miscela entro 10 minuti dalla miscelazione di PREVYMIS granulato con cibo morbido.

#### *Preparazione e somministrazione mediante sondino NG o sondino G*

Vedere le **Istruzioni per l'uso**, Tabella 11 (sondino NG) e Tabella 12 (sondino G), per le informazioni sulla preparazione e la somministrazione di PREVYMIS granulato mediante sondino NG o sondino G.

- Versare il volume iniziale di liquido a temperatura ambiente (latte, succo di mela, latte artificiale o acqua) in un contenitore per medicinali utilizzando la siringa. Non miscelare PREVYMIS granulato con acqua quando si somministra mediante sondino G. Non miscelare PREVYMIS granulato con liquido caldo o freddo (refrigerato).
- Versare PREVYMIS granulato nel liquido nel contenitore per medicinali.
- Attendere 10 minuti. Non agitare o far roteare il contenitore per medicinali. PREVYMIS granulato non si dissolverà ma si scioglierà o si frammenterà.
- Mescolare la miscela con la siringa. Somministrare l'intera miscela utilizzando la siringa e il sondino NG o il sondino G.
- Erogare il volume di risciacquo del liquido a temperatura ambiente (latte, succo di mela, latte artificiale o acqua) nel contenitore per medicinali utilizzando la siringa. Non risciacquare il contenitore per medicinali con acqua quando si somministra PREVYMIS mediante sondino G.
- Mescolare la miscela con la siringa. Somministrare l'intera miscela di risciacquo utilizzando la siringa e il sondino NG o il sondino G.
- Lavare il sondino NG o il sondino G con il volume di acqua raccomandato dal produttore.

**Tabella 11: Raccomandazioni per la somministrazione di PREVYTMIS granulato in bustina mediante sondino NG**

Dose	Sondino NG*	Tipo di liquido	Tipo di siringa <sup>†</sup>	Contenitore di miscelazione	Volume iniziale (mL)	Volume di risciacquo (mL)
da 120 mg a 480 mg	Qualsiasi sondino NG $\geq$ 8 Fr	Latte, succo di mela, latte artificiale, o acqua	Siringa ENFit o con cono catetere di dimensioni appropriate	Contenitore per medicinali	15	15
da 40 mg a 80 mg	Sondino NG PUR da 5 Fr o Qualsiasi sondino NG $\geq$ 6 Fr				3	2

\* Fr = French; PUR = poliuretano  
<sup>†</sup> Con la siringa ENFit, è necessaria una cannuccia per medicinali (di grande diametro) per facilitare il prelievo della miscela dal contenitore per medicinali.

**Tabella 12: Raccomandazioni per la somministrazione di PREVYTMIS granulato in bustina mediante sondino G**

Dose	Sondino G*	Tipo di liquido	Tipo di siringa <sup>†</sup>	Contenitore di miscelazione	Volume iniziale (mL)	Volume di risciacquo (mL)
da 120 mg a 480 mg	Qualsiasi sondino G	Latte, succo di mela o latte artificiale	Siringa ENFit o con cono catetere di dimensioni appropriate	Contenitore per medicinali	15	15
da 40 mg a 80 mg	Qualsiasi sondino G 12 Fr	Non utilizzare acqua			3	2

\* Fr = French  
<sup>†</sup> Con la siringa ENFit, è necessaria una cannuccia per medicinali (di grande diametro) per facilitare il prelievo della miscela dal contenitore per medicinali.

## 7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Merck Sharp & Dohme B.V.  
 Waarderweg 39  
 2031 BN Haarlem  
 Paesi Bassi

## 8. NUMERO(I) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

EU/1/17/1245/005  
 EU/1/17/1245/006

## 9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

Data della prima autorizzazione: 8 gennaio 2018  
 Data del rinnovo più recente: 24 agosto 2022

## **10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO**

Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web dell’Agenzia europea per i medicinali, <https://www.ema.europa.eu>.

## **ALLEGATO II**

- A. PRODUTTORE(I) RESPONSABILE(I) DEL RILASCIO DEI LOTTI**
- B. CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E UTILIZZO**
- C. ALTRE CONDIZIONI E REQUISITI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**
- D. CONDIZIONI O LIMITAZIONI PER QUANTO RIGUARDA L'USO SICURO ED EFFICACE DEL MEDICINALE**

## **A. PRODUTTORE(I) RESPONSABILE(I) DEL RILASCIO DEI LOTTI**

Nome e indirizzo del(dei) produttore(i) responsabile(i) del rilascio dei lotti

Organon Heist bv  
Industriepark 30  
2220 Heist-op-den-Berg  
Belgio

Merck Sharp & Dohme B.V.  
Waarderweg 39  
2031 BN Haarlem  
Paesi Bassi

Il foglio illustrativo del medicinale deve riportare il nome e l'indirizzo del produttore responsabile del rilascio dei lotti in questione.

## **B. CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E UTILIZZO**

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa (vedere allegato I: riassunto delle caratteristiche del prodotto, paragrafo 4.2).

## **C. ALTRE CONDIZIONI E REQUISITI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

- Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)**

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 *quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea per i medicinali.

## **D. CONDIZIONI O LIMITAZIONI PER QUANTO RIGUARDA L'USO SICURO ED EFFICACE DEL MEDICINALE**

- Piano di gestione del rischio (RMP)**

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

- su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;
- ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

**ALLEGATO III**  
**ETICHETTATURA E FOGLIO ILLUSTRATIVO**

## **A. ETICHETTATURA**

## **INFORMAZIONI DA APPORRE SUL CONFEZIONAMENTO SECONDARIO**

**Scatola per le compresse rivestite con film da 240 mg**

### **1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE**

PREVYMIS 240 mg compresse rivestite con film  
letermovir

### **2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA IN TERMINI DI PRINCIPIO(I) ATTIVO(I)**

Ogni compressa rivestita con film contiene 240 mg di letermovir.

### **3. ELENCO DEGLI ECCIPIENTI**

Contiene lattosio.

Per ulteriori informazioni vedere il foglio illustrativo.

### **4. FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO**

Compressa rivestita con film

28x1 compresse rivestite con film

### **5. MODO E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE**

Leggere il foglio illustrativo prima dell'uso.

Uso orale

Le compresse devono essere deglutite intere con un po' d'acqua.

### **6. AVVERTENZA PARTICOLARE CHE PRESCRIVA DI TENERE IL MEDICINALE FUORI DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI**

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

### **7. ALTRA(E) AVVERTENZA(E) PARTICOLARE(I), SE NECESSARIO**

### **8. DATA DI SCADENZA**

Scad.

### **9. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE**

Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità.

**10. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LO SMALTIMENTO DEL MEDICINALE NON UTILIZZATO O DEI RIFIUTI DERIVATI DA TALE MEDICINALE, SE NECESSARIO**

**11. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Merck Sharp & Dohme B.V.  
Waarderweg 39  
2031 BN Haarlem  
Paesi Bassi

**12. NUMERO(I) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

EU/1/17/1245/001

**13. NUMERO DI LOTTO**

Lotto

**14. CONDIZIONE GENERALE DI FORNITURA**

**15. ISTRUZIONI PER L'USO**

**16. INFORMAZIONI IN BRAILLE**

PREVYMIS 240 mg compresse

**17. IDENTIFICATIVO UNICO – CODICE A BARRE BIDIMENSIONALE**

Codice a barre bidimensionale con identificativo unico incluso.

**18. IDENTIFICATIVO UNICO – DATI LEGGIBILI**

PC  
SN  
NN

**INFORMAZIONI MINIME DA APPORRE SU BLISTER****Blister per compresse rivestite con film da 240 mg****1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE**

PREVYMIS 240 mg compresse  
letermovir

**2. NOME DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

MSD

**3. DATA DI SCADENZA**

EXP

**4. NUMERO DI LOTTO**

Lot

**5. ALTRO**

**INFORMAZIONI DA APPORRE SUL CONFEZIONAMENTO SECONDARIO****Scatola per le compresse rivestite con film da 480 mg****1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE**

PREVYMIS 480 mg compresse rivestite con film  
letermovir

**2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA IN TERMINI DI PRINCIPIO(I) ATTIVO(I)**

Ogni compressa rivestita con film contiene 480 mg di letermovir.

**3. ELENCO DEGLI ECCIPIENTI**

Contiene lattosio.

Per ulteriori informazioni vedere il foglio illustrativo.

**4. FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO**

Compressa rivestita con film  
28x1 compresse rivestite con film

**5. MODO E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE**

Leggere il foglio illustrativo prima dell'uso.

Uso orale

Le compresse devono essere deglutite intere con un po' d'acqua.

**6. AVVERTENZA PARTICOLARE CHE PRESCRIVA DI TENERE IL MEDICINALE FUORI DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI**

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

**7. ALTRA(E) AVVERTENZA(E) PARTICOLARE(I), SE NECESSARIO****8. DATA DI SCADENZA**

Scad.

**9. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE**

Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità.

**10. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LO SMALTIMENTO DEL MEDICINALE NON UTILIZZATO O DEI RIFIUTI DERIVATI DA TALE MEDICINALE, SE NECESSARIO**

**11. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Merck Sharp & Dohme B.V.  
Waarderweg 39  
2031 BN Haarlem  
Paesi Bassi

**12. NUMERO(I) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

EU/1/17/1245/002

**13. NUMERO DI LOTTO**

Lotto

**14. CONDIZIONE GENERALE DI FORNITURA**

**15. ISTRUZIONI PER L'USO**

**16. INFORMAZIONI IN BRAILLE**

PREVYMIS 480 mg compresse

**17. IDENTIFICATIVO UNICO – CODICE A BARRE BIDIMENSIONALE**

Codice a barre bidimensionale con identificativo unico incluso.

**18. IDENTIFICATIVO UNICO – DATI LEGGIBILI**

PC  
SN  
NN

**INFORMAZIONI MINIME DA APPORRE SU BLISTER****Blister per compresse rivestite con film da 480 mg****1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE**

PREVYMIS 480 mg compresse  
letermovir

**2. NOME DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

MSD

**3. DATA DI SCADENZA**

EXP

**4. NUMERO DI LOTTO**

Lot

**5. ALTRO**

## **INFORMAZIONI DA APPORRE SUL CONFEZIONAMENTO SECONDARIO**

**Scatola per il concentrato per soluzione per infusione da 240 mg**

### **1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE**

PREVYMIS 240 mg concentrato per soluzione per infusione  
letermovir

### **2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA IN TERMINI DI PRINCIPIO(I) ATTIVO(I)**

Ciascun flaconcino da 12 mL contiene 240 mg di letermovir.  
Ciascun mL contiene 20 mg di letermovir.

### **3. ELENCO DEGLI ECCIPIENTI**

Contiene sodio e ciclodestrina.  
Per ulteriori informazioni vedere il foglio illustrativo.

### **4. FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO**

Concentrato per soluzione per infusione  
1 flaalconcio

### **5. MODO E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE**

Leggere il foglio illustrativo prima dell'uso.  
Uso endovenoso dopo diluizione, **deve essere infuso attraverso un filtro in linea.**  
Esclusivamente monouso

### **6. AVVERTENZA PARTICOLARE CHE PRESCRIVA DI TENERE IL MEDICINALE FUORI DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI**

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

### **7. ALTRA(E) AVVERTENZA(E) PARTICOLARE(I), SE NECESSARIO**

### **8. DATA DI SCADENZA**

Scad.

### **9. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE**

Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

**10. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LO SMALTIMENTO DEL MEDICINALE NON UTILIZZATO O DEI RIFIUTI DERIVATI DA TALE MEDICINALE, SE NECESSARIO**

**11. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Paesi Bassi

**12. NUMERO(I) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

EU/1/17/1245/003

**13. NUMERO DI LOTTO**

Lotto

**14. CONDIZIONE GENERALE DI FORNITURA**

**15. ISTRUZIONI PER L'USO**

**16. INFORMAZIONI IN BRAILLE**

Giustificazione per non apporre il Braille accettata.

**17. IDENTIFICATIVO UNICO – CODICE A BARRE BIDIMENSIONALE**

Codice a barre bidimensionale con identificativo unico incluso.

**18. IDENTIFICATIVO UNICO – DATI LEGGIBILI**

PC  
SN  
NN

**INFORMAZIONI MINIME DA APPORRE SUI CONFEZIONAMENTI PRIMARI DI  
PICCOLE DIMENSIONI**

**Etichetta per il flaconcino di concentrato per soluzione per infusione da 240 mg**

**1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE**

PREVYMIS 240 mg concentrato sterile  
letermovir  
e.v., **deve essere infuso attraverso un filtro in linea.**

**2. MODO DI SOMMINISTRAZIONE**

**3. DATA DI SCADENZA**

EXP

**4. NUMERO DI LOTTO**

Lot

**5. CONTENUTO IN PESO, VOLUME O UNITÀ**

**6. ALTRO**

MSD

## **INFORMAZIONI DA APPORRE SUL CONFEZIONAMENTO SECONDARIO**

**Scatola per il concentrato per soluzione per infusione da 480 mg**

### **1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE**

PREVYMIS 480 mg concentrato per soluzione per infusione  
letermovir

### **2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA IN TERMINI DI PRINCIPIO(I) ATTIVO(I)**

Ciascun flaoncino da 24 mL contiene 480 mg di letermovir.  
Ciascun mL contiene 20 mg di letermovir.

### **3. ELENCO DEGLI ECCIPIENTI**

Contiene sodio e ciclodestrina.  
Per ulteriori informazioni vedere il foglio illustrativo.

### **4. FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO**

Concentrato per soluzione per infusione  
1 flaoncino

### **5. MODO E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE**

Leggere il foglio illustrativo prima dell'uso.  
Uso endovenoso dopo diluizione, **deve essere infuso attraverso un filtro in linea.**  
Esclusivamente monouso

### **6. AVVERTENZA PARTICOLARE CHE PRESCRIVA DI TENERE IL MEDICINALE FUORI DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI**

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

### **7. ALTRA(E) AVVERTENZA(E) PARTICOLARE(I), SE NECESSARIO**

### **8. DATA DI SCADENZA**

Scad.

### **9. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE**

Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

**10. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LO SMALTIMENTO DEL MEDICINALE NON UTILIZZATO O DEI RIFIUTI DERIVATI DA TALE MEDICINALE, SE NECESSARIO**

**11. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Paesi Bassi

**12. NUMERO(I) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

EU/1/17/1245/004

**13. NUMERO DI LOTTO**

Lotto

**14. CONDIZIONE GENERALE DI FORNITURA**

**15. ISTRUZIONI PER L'USO**

**16. INFORMAZIONI IN BRAILLE**

Giustificazione per non apporre il Braille accettata.

**17. IDENTIFICATIVO UNICO – CODICE A BARRE BIDIMENSIONALE**

Codice a barre bidimensionale con identificativo unico incluso.

**18. IDENTIFICATIVO UNICO – DATI LEGGIBILI**

PC

SN

NN

**INFORMAZIONI MINIME DA APPORRE SUI CONFEZIONAMENTI PRIMARI DI  
PICCOLE DIMENSIONI**

**Etichetta per il flaconcino di concentrato per soluzione per infusione da 480 mg**

**1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE**

PREVYMIS 480 mg concentrato sterile  
letermovir  
e.v., **deve essere infuso attraverso un filtro in linea.**

**2. MODO DI SOMMINISTRAZIONE**

**3. DATA DI SCADENZA**

EXP

**4. NUMERO DI LOTTO**

Lot

**5. CONTENUTO IN PESO, VOLUME O UNITÀ**

**6. ALTRO**

MSD

**INFORMAZIONI DA APPORRE SUL CONFEZIONAMENTO SECONDARIO****Scatola per il granulato in bustina da 20 mg****1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE**

PREVYMIS 20 mg granulato in bustina  
letermovir

**2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA IN TERMINI DI PRINCIPIO(I) ATTIVO(I)**

Ogni bustina di granulato contiene 20 mg di letermovir.

**3. ELENCO DEGLI ECCIPIENTI**

Contiene lattosio.

Per ulteriori informazioni vedere il foglio illustrativo.

**4. FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO**

Granulato in bustina

30 bustine

**5. MODO E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE**

Leggere il foglio illustrativo e le istruzioni per l'uso prima dell'uso.

Uso orale

**6. AVVERTENZA PARTICOLARE CHE PRESCRIVA DI TENERE IL MEDICINALE FUORI DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI**

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

**7. ALTRA(E) AVVERTENZA(E) PARTICOLARE(I), SE NECESSARIO****8. DATA DI SCADENZA**

Scad.

**9. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE**

**10. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LO SMALTIMENTO DEL MEDICINALE NON UTILIZZATO O DEI RIFIUTI DERIVATI DA TALE MEDICINALE, SE NECESSARIO**

**11. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Merck Sharp & Dohme B.V.  
Waarderweg 39  
2031 BN Haarlem  
Paesi Bassi

**12. NUMERO(I) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

EU/1/17/1245/005

**13. NUMERO DI LOTTO**

Lotto

**14. CONDIZIONE GENERALE DI FORNITURA**

**15. ISTRUZIONI PER L'USO**

**16. INFORMAZIONI IN BRAILLE**

PREVYMIS 20 mg granulato

**17. IDENTIFICATIVO UNICO – CODICE A BARRE BIDIMENSIONALE**

Codice a barre bidimensionale con identificativo unico incluso.

**18. IDENTIFICATIVO UNICO – DATI LEGGIBILI**

PC  
SN  
NN

**INFORMAZIONI MINIME DA APPORRE SUI CONFEZIONAMENTI PRIMARI DI  
PICCOLE DIMENSIONI**

**Bustina per granulato da 20 mg**

**1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE**

PREVYMIS 20 mg granulato  
letermovir

**2. MODO DI SOMMINISTRAZIONE**

Uso orale

**3. DATA DI SCADENZA**

EXP

**4. NUMERO DI LOTTO**

Lot

**5. CONTENUTO IN PESO, VOLUME O UNITÀ**

**6. ALTRO**

MSD

**INFORMAZIONI DA APPORRE SUL CONFEZIONAMENTO SECONDARIO****Scatola per il granulato in bustina da 120 mg****1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE**

PREVYMIS 120 mg granulato in bustina  
letermovir

**2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA IN TERMINI DI PRINCIPIO(I) ATTIVO(I)**

Ogni bustina di granulato contiene 120 mg di letermovir.

**3. ELENCO DEGLI ECCIPIENTI**

Contiene lattosio.

Per ulteriori informazioni vedere il foglio illustrativo.

**4. FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO**

Granulato in bustina

30 bustine

**5. MODO E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE**

Leggere il foglio illustrativo e le istruzioni per l'uso prima dell'uso.

Uso orale

**6. AVVERTENZA PARTICOLARE CHE PRESCRIVA DI TENERE IL MEDICINALE FUORI DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI**

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

**7. ALTRA(E) AVVERTENZA(E) PARTICOLARE(I), SE NECESSARIO****8. DATA DI SCADENZA**

Scad.

**9. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE**

**10. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LO SMALTIMENTO DEL MEDICINALE NON UTILIZZATO O DEI RIFIUTI DERIVATI DA TALE MEDICINALE, SE NECESSARIO**

**11. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Merck Sharp & Dohme B.V.  
Waarderweg 39  
2031 BN Haarlem  
Paesi Bassi

**12. NUMERO(I) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

EU/1/17/1245/006

**13. NUMERO DI LOTTO**

Lotto

**14. CONDIZIONE GENERALE DI FORNITURA**

**15. ISTRUZIONI PER L'USO**

**16. INFORMAZIONI IN BRAILLE**

PREVYMIS 120 mg granulato

**17. IDENTIFICATIVO UNICO – CODICE A BARRE BIDIMENSIONALE**

Codice a barre bidimensionale con identificativo unico incluso.

**18. IDENTIFICATIVO UNICO – DATI LEGGIBILI**

PC  
SN  
NN

**INFORMAZIONI MINIME DA APPORRE SUI CONFEZIONAMENTI PRIMARI DI  
PICCOLE DIMENSIONI**

**Bustina per granulato da 120 mg**

**1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE**

PREVYMIS 120 mg granulato  
letermovir

**2. MODO DI SOMMINISTRAZIONE**

Uso orale

**3. DATA DI SCADENZA**

EXP

**4. NUMERO DI LOTTO**

Lot

**5. CONTENUTO IN PESO, VOLUME O UNITÀ**

**6. ALTRO**

MSD

**B. FOGLIO ILLUSTRATIVO**

## Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

### PREVYMIS 240 mg compresse rivestite con film PREVYMIS 480 mg compresse rivestite con film letermovir

**Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere. Vedere paragrafo 4.

#### Contenuto di questo foglio

1. Cos'è PREVYMIS e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere PREVYMIS
3. Come prendere PREVYMIS
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare PREVYMIS
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### 1. Cos'è PREVYMIS e a cosa serve

PREVYMIS è un medicinale antivirale soggetto a prescrizione medica che contiene il principio attivo letermovir.

PREVYMIS è un medicinale per:

- adulti e bambini di peso corporeo di almeno 15 kg recentemente sottoposti a trapianto di cellule staminali (midollo osseo)
- adulti e bambini di peso corporeo di almeno 40 kg recentemente sottoposti a un trapianto di rene.

Il medicinale contribuisce a impedire che lei sviluppi una malattia da CMV (“citomegalovirus”).

Il CMV è un virus. Per molte persone, il CMV non determina alcun danno. Tuttavia, se il sistema immunitario si indebolisce in seguito a un trapianto di cellule staminali o a un trapianto di rene, si può facilmente sviluppare una malattia da CMV.

#### 2. Cosa deve sapere prima di prendere PREVYMIS

**Non prenda PREVYMIS se:**

- è allergico a letermovir o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- assume uno qualsiasi di questi medicinali:
  - pimozide - usato per la sindrome di Tourette
  - alcaloidi derivati dalla segale cornuta (quali ergotamina e diidroergotamina) - usati per il mal di testa da emicrania.
- assume il seguente prodotto a base di erbe:
  - erba di S. Giovanni (*Hypericum perforatum*)

Non prenda PREVYMIS se una qualsiasi delle condizioni descritte la riguarda. Se non è sicuro, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere prima di prendere PREVYMIS.

**Se sta assumendo PREVYMIS con ciclosporina, non prenda i seguenti medicinali:**

- dabigatran - usato per i coaguli sanguigni
- atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina, pitavastatina - usate per i livelli elevati di colesterolo

**Avvertenze e precauzioni**

Se sta assumendo anche un medicinale per il trattamento di livelli elevati di colesterolo (controlli la lista dei medicinali al paragrafo di seguito "Altri medicinali e PREVYMIS") deve informare immediatamente il medico se manifesta dolori o fitte muscolari di natura sconosciuta, in particolare se non si sente bene o ha febbre. Può essere necessario modificare il medicinale o la dose. Vedere il foglio illustrativo dell'altro medicinale per ulteriori informazioni.

Esami del sangue aggiuntivi possono essere necessari per monitorare i seguenti medicinali:

- ciclosporina, tacrolimus, sirolimus
- voriconazolo

**Bambini e adolescenti**

PREVYMIS non deve essere utilizzato nei bambini di peso corporeo inferiore a 5 kg sottoposti a trapianto di cellule staminali (midollo osseo) o nei bambini di peso corporeo inferiore a 40 kg sottoposti a un trapianto di rene. Questo perché PREVYMIS non è stato studiato in questi gruppi.

**Altri medicinali e PREVYMIS**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale. Questo perché PREVYMIS può influire sul modo in cui agiscono altri medicinali e gli altri medicinali possono influire sul modo in cui agisce PREVYMIS. Il medico o il farmacista le dirà se è sicuro prendere PREVYMIS con altri medicinali.

Ci sono alcuni medicinali che **non deve prendere** con PREVYMIS (controlli l'elenco riportato al paragrafo "Non prenda PREVYMIS se:").

Ci sono alcuni medicinali aggiuntivi che **non deve prendere** con PREVYMIS e ciclosporina (controlli l'elenco riportato al paragrafo "Se sta assumendo PREVYMIS con ciclosporina, non prenda i seguenti medicinali:")

Inoltre, informi il medico se sta prendendo uno qualsiasi dei seguenti medicinali. Questo perché il medico può modificare i medicinali che sta prendendo o il loro dosaggio:

- alfentanil - usato per il trattamento del dolore grave
- fentanil - usato per il trattamento del dolore grave
- chinidina - usata per il trattamento delle anomalie del ritmo cardiaco
- ciclosporina, tacrolimus, sirolimus - usati per prevenire il rigetto di trapianto
- voriconazolo - usato per il trattamento delle infezioni da funghi
- statine, come atorvastatina, fluvastatina, rosuvastatina, simvastatina, pravastatina e pitavastatina - usate per il trattamento di livelli elevati di colesterolo
- gliburide, repaglinide - usate per il trattamento di livelli elevati di zucchero nel sangue
- carbamazepina, fenobarbital, fenitoina - usati per il trattamento di crisi epilettiche o convulsive
- dabigatran, warfarin - usati per fluidificare il sangue o per i coaguli sanguigni
- midazolam - usato come sedativo
- amiodarone - usato per il trattamento del battito cardiaco irregolare
- steroidi contraccettivi orali - usati per il controllo delle nascite
- omeprazolo, pantoprazolo - usati per il trattamento delle ulcere gastriche e altri disturbi dello stomaco
- nafticillina - usata per il trattamento delle infezioni batteriche
- rifabutina, rifampicina - usate per il trattamento delle infezioni da micobatteri
- tioridazina - usata per il trattamento dei disturbi psichiatrici
- bosentan - usato per il trattamento della pressione del sangue alta nei vasi sanguigni dei polmoni
- efavirenz, etravirina, nevirapina, lopinavir, ritonavir - usati per il trattamento dell'HIV

- modafinil - usato per il trattamento dello stato di veglia.

Può chiedere al medico o al farmacista un elenco dei medicinali che possono interagire con PREVYMIS.

### **Gravidanza**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, chieda consiglio al medico prima di prendere questo medicinale. PREVYMIS non è raccomandato in gravidanza. Questo perché non è stato studiato in gravidanza e non è noto se PREVYMIS può essere pericoloso per il bambino durante la gravidanza.

### **Allattamento**

Se sta allattando o se pensa di allattare, informi il medico prima di assumere questo medicinale. L'allattamento non è raccomandato durante l'assunzione di PREVYMIS. Questo perché non è noto se PREVYMIS passi nel latte materno e possa essere trasmesso al bambino.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

PREVYMIS può influenzare in modo lieve la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari (vedere paragrafo 4 "Possibili effetti indesiderati" di seguito). Alcuni pazienti hanno riportato stanchezza (sensazione di forte stanchezza) o vertigini (sensazione di perdita dell'equilibrio) durante il trattamento con PREVYMIS. Se avverte uno di questi effetti non guidi veicoli o utilizzi macchinari fino a che l'effetto non svanisce del tutto.

### **PREVYMIS contiene lattosio**

PREVYMIS contiene lattosio monoidrato. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

### **PREVYMIS contiene sodio**

Questo medicinale contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per compressa, cioè essenzialmente "senza sodio".

## **3. Come prendere PREVYMIS**

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

### **Quanto prenderne**

La dose di PREVYMIS dipende dal suo peso corporeo e se sta prendendo anche ciclosporina. Il medico le dirà quante compresse prendere.

- Prenda PREVYMIS come indicato una volta al giorno.
- Prenda PREVYMIS alla stessa ora ogni giorno.
- Prenda questo medicinale durante o lontano dai pasti.

Le dosi raccomandate di PREVYMIS per via orale sono riportate nella Tabella 1 e nella Tabella 2.

**Tabella 1: Dosi raccomandate di PREVYMIS compresse rivestite con film senza ciclosporina**

Peso corporeo	Dose orale giornaliera di PREVYMIS	Numero di compresse di PREVYMIS una volta al giorno
30 kg e superiore	480 mg	Una compressa da 480 mg o Due compresse da 240 mg
da 15 kg a meno di 30 kg	240 mg	Una compressa da 240 mg

**Tabella 2: Dosi raccomandate di PREVYMIIS compresse rivestite con film con ciclosporina**

Peso corporeo	Dose orale giornaliera di PREVYMIIS	Numero di compresse di PREVYMIIS una volta al giorno
30 kg e superiore	240 mg	Una compressa da 240 mg
da 15 kg a inferiore a 30 kg	120 mg	Vedere il foglio illustrativo di PREVYMIIS granulato in bustine

**Come prenderlo**

- La compressa deve essere deglutita intera con un po' d'acqua. Non rompa, frantumi o mastichi la compressa poiché questi metodi non sono stati studiati.

**Se prende più PREVYMIIS di quanto deve**

Se prende più PREVYMIIS di quanto deve, contatti immediatamente il medico.

**Se dimentica di prendere PREVYMIIS**

È molto importante che lei non dimentichi o salti dosi di PREVYMIIS.

- Se dimentica una dose, la prenda non appena se ne ricorda. Tuttavia, se è quasi ora della dose successiva, salti la dose dimenticata. Prenda la dose successiva all'orario abituale.
- Non prenda una dose doppia di PREVYMIIS per compensare la dimenticanza della dose.
- Se non è sicuro su cosa fare, contatti il medico o il farmacista.

**Non interrompa l'assunzione di PREVYMIIS**

Non interrompa l'assunzione di PREVYMIIS senza averne prima parlato con il medico. Non rimanga senza PREVYMIIS. In questo modo potrà evitare di sviluppare una malattia da CMV dopo un trapianto di cellule staminali o un trapianto di rene.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere.

**4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

**Comuni:** possono interessare fino a 1 persona su 10

- diarrea
- nausea
- vomito

**Non comuni:** possono interessare fino a 1 persona su 100

- reazione allergica (ipersensibilità) - i segni possono includere affanno, difficoltà nella respirazione, eruzioni cutanee o orticaria, prurito, gonfiore
- perdita di appetito
- alterazioni del gusto
- mal di testa
- sensazione di perdita dell'equilibrio (vertigini)
- mal di stomaco
- valori anormali delle analisi di laboratorio relativi alla funzionalità del fegato (cioè, aumento dei livelli degli enzimi epatici)
- spasmi muscolari
- valori elevati di creatinina ematica degli esami del sangue
- sensazione di forte stanchezza (stanchezza)
- gonfiore delle mani o dei piedi

## **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione riportato nell'[allegato V](#). Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## **5. Come conservare PREVYMIS**

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza riportata sulla scatola dopo Scad. e sul blister dopo EXP. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

### **Cosa contiene PREVYMIS**

Il principio attivo è letermovir. Ogni compressa rivestita con film contiene 240 mg o 480 mg di letermovir.

Gli altri componenti sono:

#### Nucleo della compressa

Cellulosa microcristallina (E460), croscarmellosa sodica (E468), povidone (E1201), silice colloidale anidra (E551), magnesio stearato (E470b).

#### Film di rivestimento

Lattosio monoidrato, ipromellosa (E464), titanio diossido (E171), triacetina, ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172) (solo nelle compresse da 480 mg), cera carnauba (E903). Consulti il paragrafo 2 "PREVYMIS contiene lattosio" e "PREVYMIS contiene sodio".

### **Descrizione dell'aspetto di PREVYMIS e contenuto della confezione**

PREVYMIS 240 mg compresse rivestite con film ("compressa") è una compressa ovale di colore giallo, con impresso "591" su un lato e il logo aziendale sull'altro. La compressa misura 16,5 mm di lunghezza e 8,5 mm di larghezza.

PREVYMIS 480 mg compresse rivestite con film ("compressa") è una compressa ovale biconvessa di colore rosa, con impresso "595" su un lato e il logo aziendale sull'altro. La compressa misura 21,2 mm di lunghezza e 10,3 mm di larghezza.

Le compresse 28x1 sono confezionate in una scatola contenente blister divisibili per dose unitaria in Poliammide/Alluminio/PVC – Alluminio (per un totale di 28 compresse).

**Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio**

Merck Sharp & Dohme B.V.  
Waarderweg 39  
2031 BN Haarlem  
Paesi Bassi

**Produttore**

Organon Heist bv  
Industriepark 30  
2220 Heist-op-den-Berg  
Belgio

Merck Sharp & Dohme B.V.  
Waarderweg 39  
2031 BN Haarlem  
Paesi Bassi

Per ulteriori informazioni su questo medicinale, contatti il rappresentante locale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

**België/Belgique/Belgien**

MSD Belgium  
Tél/Tel: +32(0)27766211  
d poc\_belux@msd.com

**България**

Мерк Шарп и Доум България ЕООД  
Тел.: +359 2 819 3737  
info-msdbg@msd.com

**Česká republika**

Merck Sharp & Dohme s.r.o.  
Tel.: +420 277 050 000  
d poc\_czechslovak@msd.com

**Danmark**

MSD Danmark ApS  
Tlf.: +45 4482 4000  
dkmail@msd.com

**Deutschland**

Merck Sharp & Dohme GmbH  
Tel.: +49 (0) 89 20 300 4500  
medinfo@msd.de

**Eesti**

Merck Sharp & Dohme OÜ  
Tel: +372 614 4200  
d poc.estonia@msd.com

**Ελλάδα**

MSD A.Φ.Ε.Ε.  
Τηλ: +30 210 98 97 300  
d poc.greece@msd.com

**España**

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.  
Tel: +34 91 321 06 00  
msd\_info@msd.com

**Lietuva**

UAB Merck Sharp & Dohme  
Tel. +370 5 2780 247  
d poc\_lithuania@msd.com

**Luxembourg/Luxemburg**

MSD Belgium  
Tél/Tel: +32(0)27766211  
d poc\_belux@msd.com

**Magyarország**

MSD Pharma Hungary Kft.  
Tel.: +36 1 888 5300  
hungary\_msd@msd.com

**Malta**

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited  
Tel: 8007 4433 (+356 99917558)  
dpoccyprus@msd.com

**Nederland**

Merck Sharp & Dohme B.V.  
Tel: 0800 9999000  
(+31 23 5153153)  
medicalinfo.nl@msd.com

**Norge**

MSD (Norge) AS  
Tlf: +47 32 20 73 00  
medinfo.norway@msd.com

**Österreich**

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.  
Tel: +43 (0) 1 26 044  
d poc\_austria@msd.com

**Polska**

MSD Polska Sp. z o.o.  
Tel.: +48 22 549 51 00  
msdpolska@msd.com

**France**  
MSD France  
Tél: +33 (0)1 80 46 40 40

**Hrvatska**  
Merck Sharp & Dohme d.o.o.  
Tel: + 385 1 6611 333  
dpoc.croatia@msd.com

**Ireland**  
Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)  
Limited  
Tel: +353 (0)1 2998700  
medinfo\_irland@msd.com

**Ísland**  
Vistor ehf.  
Sími: +354 535 7000

**Italia**  
MSD Italia S.r.l.  
Tel: 800 23 99 89 (+39 06 361911)  
dpoc.italy@msd.com

**Κύπρος**  
Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited  
Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)  
dpoccyprus@msd.com

**Latvija**  
SIA Merck Sharp & Dohme Latvija  
Tel.: +371 67025300  
dpoc.latvia@msd.com

#### **Questo foglio illustrativo è stato aggiornato {MM/AAAA}.**

Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web dell’Agenzia europea per i medicinali, <https://www.ema.europa.eu>.

**Portugal**  
Merck Sharp & Dohme, Lda  
Tel.: +351 21 4465700  
inform\_pt@msd.com

**România**  
Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.  
Tel.: +40 21 529 29 00  
msdromania@msd.com

**Slovenija**  
Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.  
Tel: +386 1 520 4201  
msd.slovenia@msd.com

**Slovenská republika**  
Merck Sharp & Dohme, s. r. o.  
Tel.: +421 2 58282010  
dpoc\_czechslovak@msd.com

**Suomi/Finland**  
MSD Finland Oy  
Puh/Tel: +358 (0)9 804 650  
info@msd.fi

**Sverige**  
Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB  
Tel: +46 77 5700488  
medicinskinfo@msd.com

## Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

### PREVYMIS 240 mg concentrato per soluzione per infusione PREVYMIS 480 mg concentrato per soluzione per infusione letermovir

**Legga attentamente questo foglio prima che le venga somministrato questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere.
- Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere. Vedere paragrafo 4.

#### Contenuto di questo foglio

1. Cos'è PREVYMIS e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima che le venga somministrato PREVYMIS
3. Come viene somministrato PREVYMIS
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare PREVYMIS
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### 1. Cos'è PREVYMIS e a cosa serve

PREVYMIS è un medicinale antivirale soggetto a prescrizione medica che contiene il principio attivo letermovir.

PREVYMIS è un medicinale per:

- adulti e bambini di peso corporeo di almeno 5 kg recentemente sottoposti a trapianto di cellule staminali (midollo osseo).
- adulti e bambini di peso corporeo di almeno 40 kg recentemente sottoposti a un trapianto di rene.

Il medicinale contribuisce a impedire che lei sviluppi una malattia da CMV ("citomegalovirus").

Il CMV è un virus. Per molte persone, il CMV non determina alcun danno. Tuttavia, se il sistema immunitario si indebolisce in seguito a un trapianto di cellule staminali o a un trapianto di rene, si può facilmente sviluppare una malattia da CMV.

#### 2. Cosa deve sapere prima che le venga somministrato PREVYMIS

**PREVYMIS non deve essere somministrato se:**

- è allergico a letermovir o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- assume uno qualsiasi di questi medicinali:
  - pimozide - usato per la sindrome di Tourette
  - alcaloidi derivati dalla segale cornuta (quali ergotamina e diidroergotamina) - usati per il mal di testa da emicrania.
- assume il seguente prodotto a base di erbe:
  - erba di S. Giovanni (*Hypericum perforatum*)

PREVYMIS non deve essere somministrato se una qualsiasi delle condizioni descritte la riguarda. Se non è sicuro, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere prima che le venga somministrato PREVYMIS.

**Se sta assumendo PREVYMIS con ciclosporina, non prenda i seguenti medicinali:**

- dabigatran - usato per i coaguli sanguigni
- atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina, pitavastatina - usate per i livelli elevati di colesterolo

**Avvertenze e precauzioni**

Se sta assumendo anche un medicinale per il trattamento di livelli elevati di colesterolo (controlli la lista dei medicinali al paragrafo di seguito "Altri medicinali e PREVYMIS") deve informare immediatamente il medico se manifesta dolori o fitte muscolari di natura sconosciuta, in particolare se non si sente bene o ha febbre. Può essere necessario modificare il medicinale o la dose. Vedere il foglio illustrativo dell'altro medicinale per ulteriori informazioni.

Esami del sangue aggiuntivi possono essere necessari per monitorare i seguenti medicinali:

- ciclosporina, tacrolimus, sirolimus
- voriconazolo

**Bambini e adolescenti**

PREVYMIS non deve essere utilizzato nei bambini di peso corporeo inferiore a 5 kg sottoposti a trapianto di cellule staminali (midollo osseo) o nei bambini di peso corporeo inferiore a 40 kg sottoposti a un trapianto di rene. Questo perché PREVYMIS non è stato studiato in questi gruppi.

**Altri medicinali e PREVYMIS**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale. Questo perché PREVYMIS può influire sul modo in cui agiscono altri medicinali e gli altri medicinali possono influire sul modo in cui agisce PREVYMIS. Il medico o il farmacista le dirà se è sicuro prendere PREVYMIS con altri medicinali.

Ci sono alcuni medicinali che **non deve prendere** con PREVYMIS (controlli l'elenco riportato al paragrafo "PREVYMIS non deve essere somministrato se:").

Ci sono alcuni medicinali aggiuntivi che **non deve prendere** con PREVYMIS e ciclosporina (controlli l'elenco riportato al paragrafo "Se sta assumendo PREVYMIS con ciclosporina, non prenda i seguenti medicinali:").

Inoltre, informi il medico se sta prendendo uno qualsiasi dei seguenti medicinali. Questo perché il medico può modificare i medicinali che sta prendendo o il loro dosaggio:

- alfentanil - usato per il trattamento del dolore grave
- fentanil - usato per il trattamento del dolore grave
- chinidina - usata per il trattamento delle anomalie del ritmo cardiaco
- ciclosporina, tacrolimus, sirolimus - usati per prevenire il rigetto di trapianto
- voriconazolo - usato per il trattamento delle infezioni da funghi
- statine, come atorvastatina, fluvastatina, rosuvastatina, simvastatina, pravastatina e pitavastatina - usate per il trattamento di livelli elevati di colesterolo
- gliburide, repaglinide - usate per il trattamento di livelli elevati di zucchero nel sangue
- carbamazepina, fenobarbital, fenitoina - usati per il trattamento di crisi epilettiche o convulsive
- dabigatran, warfarin - usati per fluidificare il sangue o per i coaguli sanguigni
- midazolam - usato come sedativo
- amiodarone - usato per il trattamento del battito cardiaco irregolare
- steroidi contraccettivi orali - usati per il controllo delle nascite
- omeprazolo, pantoprazolo - usati per il trattamento delle ulcere gastriche e altri disturbi dello stomaco
- nafticillina - usata per il trattamento delle infezioni batteriche
- rifabutina, rifampicina - usate per il trattamento delle infezioni da micobatteri
- tioridazina - usata per il trattamento dei disturbi psichiatrici
- bosentan - usato per il trattamento della pressione del sangue alta nei vasi sanguigni dei polmoni
- efavirenz, etravirina, nevirapina, lopinavir, ritonavir - usati per il trattamento dell'HIV
- modafinil - usato per il trattamento dello stato di veglia.

Può chiedere al medico o al farmacista un elenco dei medicinali che possono interagire con PREVYMIS.

### **Gravidanza**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, chieda consiglio al medico prima che le venga somministrato questo medicinale. PREVYMIS non è raccomandato in gravidanza. Questo perché non è stato studiato in gravidanza e non è noto se PREVYMIS può essere pericoloso per il bambino durante la gravidanza.

### **Allattamento**

Se sta allattando o se pensa di allattare, informi il medico prima che le venga somministrato questo medicinale. L'allattamento non è raccomandato durante l'assunzione di PREVYMIS. Questo perché non è noto se PREVYMIS passi nel latte materno e possa essere trasmesso al bambino.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

PREVYMIS può influenzare in modo lieve la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari (vedere paragrafo 4 Possibili effetti indesiderati di seguito). Alcuni pazienti hanno riportato stanchezza (sensazione di forte stanchezza) o vertigini (sensazione di perdita dell'equilibrio) durante il trattamento con PREVYMIS. Se avverte uno di questi effetti non guidi veicoli o utilizzi macchinari fino a che l'effetto non svanisce del tutto.

### **PREVYMIS contiene sodio**

PREVYMIS contiene sodio. Se segue una dieta a basso contenuto di sodio, si rivolga al medico prima che le venga somministrato questo medicinale.

Ogni flaconcino da 240 mg contiene 23 mg di sodio (componente principale del sale da cucina). Questo equivale all'1,15% dell'assunzione massima giornaliera raccomandata con la dieta di un adulto.

Ogni flaconcino da 480 mg contiene 46 mg di sodio (componente principale del sale da cucina). Questo equivale al 2,30% dell'assunzione massima giornaliera raccomandata con la dieta di un adulto.

### **PREVYMIS contiene ciclodestrina**

Ogni dose da 40 mg di questo medicinale contiene 300 mg di ciclodestrina.

Ogni dose da 60 mg di questo medicinale contiene 450 mg di ciclodestrina.

Ogni dose da 120 mg di questo medicinale contiene 900 mg di ciclodestrina.

Ogni dose da 240 mg di questo medicinale contiene 1 800 mg di ciclodestrina.

Ogni dose da 480 mg di questo medicinale contiene 3 600 mg di ciclodestrina.

Se soffre di problemi ai reni, parli con il medico prima di prendere questo medicinale.

## **3. Come viene somministrato PREVYMIS**

La dose di PREVYMIS dipende dal suo peso corporeo e se sta prendendo anche ciclosporina. Il medico deciderà la dose corretta di PREVYMIS.

PREVYMIS le verrà somministrato come infusione (fleboclisi) in una vena e ciò richiederà circa 1 ora.

PREVYMIS le verrà somministrato una volta al giorno.

Le dosi raccomandate di PREVYMIS per via endovenosa sono riportate nella Tabella 1.

**Tabella 1: Dosi raccomandate di PREVYMIS concentrato per soluzione per infusione senza o con ciclosporina**

Peso corporeo	Dose giornaliera per via endovenosa senza ciclosporina	Dose giornaliera per via endovenosa con ciclosporina
30 kg e superiore	480 mg	240 mg
Peso corporeo	<b>Dose giornaliera per via endovenosa senza o con ciclosporina</b>	
da 15 kg a meno di 30 kg		120 mg
da 7,5 kg a meno di 15 kg		60 mg
da 5 kg a meno di 7,5 kg		40 mg

**Se le viene somministrato più PREVYMIS di quanto dovuto**

Se pensa che le sia stato somministrato una dose eccessiva di PREVYMIS, informi immediatamente il medico.

**Se salta l'appuntamento per la somministrazione di PREVYMIS**

È molto importante che lei non dimentichi o salti dosi di PREVYMIS.

- Se dovesse saltare l'appuntamento per la somministrazione di PREVYMIS, contatti immediatamente il medico per fissarne un altro.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere.

#### 4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

**Comuni:** possono interessare fino a 1 persona su 10

- diarrea
- nausea
- vomito

**Non comuni:** possono interessare fino a 1 persona su 100

- reazione allergica (ipersensibilità) - i segni possono includere affanno, difficoltà nella respirazione, eruzioni cutanee o orticaria, prurito, gonfiore
- perdita di appetito
- alterazioni del gusto
- mal di testa
- sensazione di perdita dell'equilibrio (vertigini)
- mal di stomaco
- valori anormali delle analisi di laboratorio relativi alla funzionalità del fegato (cioè, aumento dei livelli degli enzimi epatici)
- spasmi muscolari
- valori elevati di creatinina ematica degli esami del sangue
- sensazione di forte stanchezza (stanchezza)
- gonfiore delle mani o dei piedi

**Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione riportato nell'[allegato V](#). Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## **5. Come conservare PREVYMIS**

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza riportata sulla scatola dopo Scad. e sul flaconcino dopo EXP. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

La stabilità chimica e fisica durante l'uso è stata dimostrata per 48 ore a 25 °C e per 48 ore a 2-8 °C.

Da un punto di vista microbiologico, il prodotto deve essere utilizzato immediatamente. In caso contrario, l'utilizzatore sarà responsabile dei tempi di conservazione dopo la prima apertura e delle modalità di conservazione prima dell'uso del prodotto, che normalmente dovrà essere utilizzato nell'arco delle 24 ore e conservato a una temperatura di 2-8 °C, salvo il caso in cui la diluizione sia stata eseguita in condizioni asettiche controllate e validate.

La soluzione per infusione non utilizzata deve essere eliminata.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

### **Cosa contiene PREVYMIS**

Il principio attivo è letermovir. Ciascun flaconcino contiene 240 mg o 480 mg di letermovir. Ciascun mL di concentrato contiene 20 mg.

Gli altri componenti sono: idrossipropilbetadex (cyclodestrina), sodio cloruro, sodio idrossido (E524), acqua per preparazioni iniettabili. Consulti il paragrafo 2 "PREVYMIS contiene sodio" e "PREVYMIS contiene cyclodestrina".

### **Descrizione dell'aspetto di PREVYMIS e contenuto della confezione**

PREVYMIS 240 mg e 480 mg concentrato per soluzione per infusione (concentrato sterile) è una soluzione limpida, incolore e può contenere alcune piccole particelle traslucide o bianche correlate al prodotto.

Il concentrato per soluzione per infusione da 240 mg e 480 mg è confezionato in flaconcini di vetro trasparente. Ogni flaconcino è confezionato in una scatola.

### **Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio      Produttore**

Merck Sharp & Dohme B.V.  
Waarderweg 39  
2031 BN Haarlem  
Paesi Bassi

Organon Heist bv  
Industriepark 30  
2220 Heist-op-den-Berg  
Belgio

Merck Sharp & Dohme B.V.  
Waarderweg 39  
2031 BN Haarlem  
Paesi Bassi

Per ulteriori informazioni su questo medicinale, contatti il rappresentante locale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

**België/Belgique/Belgien**

MSD Belgium  
Tél/Tel: +32(0)27766211  
d poc\_belux@msd.com

**България**

Мерк Шарп и Доум България ЕООД  
Tel.: +359 2 819 3737  
info-msdbg@msd.com

**Česká republika**

Merck Sharp & Dohme s.r.o.  
Tel.: +420 277 050 000  
d poc\_czechslovak@msd.com

**Danmark**

MSD Danmark ApS  
Tlf.: +45 4482 4000  
dkmail@msd.com

**Deutschland**

MSD Sharp & Dohme GmbH  
Tel.: +49 (0) 89 20 300 4500  
medinfo@msd.de

**Eesti**

Merck Sharp & Dohme OÜ  
Tel: +372 614 4200  
d poc.estonia@msd.com

**Ελλάδα**

MSD A.Φ.Ε.Ε.  
Τηλ: +30 210 98 97 300  
d poc.greece@msd.com

**España**

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.  
Tel: +34 91 321 06 00  
msd\_info@msd.com

**France**

MSD France  
Tél: +33 (0)1 80 46 40 40

**Hrvatska**

Merck Sharp & Dohme d.o.o.  
Tel: + 385 1 6611 333  
d poc.croatia@msd.com

**Ireland**

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)  
Limited  
Tel: +353 (0)1 2998700  
medinfo\_irland@msd.com

**Lietuva**

UAB Merck Sharp & Dohme  
Tel. +370 5 2780 247  
d poc\_lithuania@msd.com

**Luxembourg/Luxemburg**

MSD Belgium  
Tél/Tel: +32(0)27766211  
d poc\_belux@msd.com

**Magyarország**

MSD Pharma Hungary Kft.  
Tel.: +36 1 888 5300  
hungary\_msd@msd.com

**Malta**

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited  
Tel: 8007 4433 (+356 99917558)  
dpoccyprus@msd.com

**Nederland**

Merck Sharp & Dohme B.V.  
Tel: 0800 9999000  
(+31 23 5153153)  
medicalinfo.nl@msd.com

**Norge**

MSD (Norge) AS  
Tlf: +47 32 20 73 00  
medinfo.norway@msd.com

**Österreich**

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.  
Tel: +43 (0) 1 26 044  
d poc\_austria@msd.com

**Polska**

MSD Polska Sp. z o.o.  
Tel.: +48 22 549 51 00  
msdpolska@msd.com

**Portugal**

Merck Sharp & Dohme, Lda  
Tel.: +351 21 4465700  
inform\_pt@msd.com

**România**

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.  
Tel.: +40 21 529 29 00  
msdromania@msd.com

**Slovenija**

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.  
Tel: +386 1 520 4201  
msd.slovenia@msd.com

**Ísland**

Vistor ehf.  
Sími: +354 535 7000

**Italia**

MSD Italia S.r.l.  
Tel: 800 23 99 89 (+39 06 361911)  
dpoc.italy@msd.com

**Κύπρος**

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited  
Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)  
dpoccypus@msd.com

**Latvija**

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija  
Tel.: +371 67025300  
dpoc.latvia@msd.com

**Slovenská republika**

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.  
Tel.: +421 2 58282010  
dpoc\_czechslovak@msd.com

**Suomi/Finland**

MSD Finland Oy  
Puh/Tel: +358 (0)9 804 650  
info@msd.fi

**Sverige**

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB  
Tel: +46 77 5700488  
medicinskinfo@msd.com

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato {MM/AAAA}.**

Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web dell’Agenzia europea per i medicinali, <https://www.ema.europa.eu>.

**Le informazioni seguenti sono destinate esclusivamente agli operatori sanitari:**

Istruzioni per la somministrazione di PREVYMIS concentrato per soluzione per infusione

I flaconcini di PREVYMIS concentrato per soluzione per infusione sono esclusivamente monouso. Eliminare il quantitativo di medicinale non utilizzato.

**Somministrazione attraverso un filtro in linea sterile da 0,2 o 0,22 micron in PES**

PREVYMIS concentrato per soluzione per infusione può contenere alcune piccole particelle traslucide o bianche correlate al prodotto. La somministrazione di PREVYMIS soluzione diluita richiede sempre l’utilizzo di un filtro in linea sterile da 0,2 micron o 0,22 micron in PES, indipendentemente dal fatto che queste particelle correlate al prodotto siano visibili nel flaconcino o nella soluzione diluita.

**Preparazione**

Prima dell’uso endovenoso, PREVYMIS concentrato per soluzione per infusione deve essere diluito.

- Prima della diluizione esaminare il contenuto del flaconcino per escludere la presenza di particelle e alterazioni del colore. PREVYMIS concentrato per soluzione per infusione è una soluzione limpida, incolore e può contenere alcune piccole particelle traslucide o bianche correlate al prodotto.
- Non utilizzare il flaconcino se la soluzione è opaca, presenta alterazioni del colore o contiene particelle diverse da alcune piccole particelle traslucide o bianche.
- Non utilizzare PREVYMIS concentrato per soluzione per infusione con sacche per endovena e set per infusione contenenti poliuretano o plastificanti in dietilesilftalato (DEHP). I materiali privi di ftalati sono anche privi di DEHP.
- Non agitare il flaconcino di PREVYMIS.

- Per la **dose da 480 mg o da 240 mg**, aggiungere il contenuto di un flaconcino monodose [12 mL (dose da 240 mg) o 24 mL (dose da 480 mg)] di PREVYMIS concentrato per soluzione per infusione a una sacca per endovena preriempita da 250 mL contenente soluzione iniettabile di sodio cloruro 9 mg/mL (0,9%) oppure destrosio al 5% e miscelare la soluzione diluita capovolgendola delicatamente. Non agitare. Se il contenuto di un flaconcino viene aggiunto a una sacca per endovena con diluente da 250 mL, gli intervalli di concentrazione finale di letermovir saranno pari a 0,9 mg/mL (per la dose da 240 mg) e a 1,8 mg/mL (per la dose da 480 mg).  
Per la **dose da 120 mg o da 60 mg**, preparare PREVYMIS concentrato per soluzione per infusione secondo la Tabella 1 di seguito in sodio cloruro 9 mg/mL (0,9%) oppure destrosio al 5% e miscelare la soluzione diluita capovolgendola delicatamente. Non agitare.  
Per la **dose da 40 mg**, preparare PREVYMIS concentrato per soluzione per infusione secondo la Tabella 2 di seguito in sodio cloruro 9 mg/mL (0,9%) oppure destrosio al 5% e miscelare la soluzione diluita capovolgendola delicatamente. Non agitare.

**Tabella 1: Preparazione di PREVYMIS soluzione endovenosa per le dosi da 120 mg o da 60 mg**

Dose endovenosa	Volume di 20 mg/mL di PREVYMIS concentrato per soluzione per infusione	Volume di infusione finale	Concentrazione finale di letermovir
120 mg	6 mL di 20 mg/mL	75 mL	1,6 mg/mL
60 mg	3 mL di 20 mg/mL	50 mL	1,2 mg/mL

**Tabella 2: Preparazione di PREVYMIS soluzione endovenosa per la dose da 40 mg**

Dose endovenosa	Volume di diluizione di PREVYMIS 2 mg/mL (1:10)*	Volume di infusione finale	Concentrazione finale di letermovir
40 mg	20 mL di 2 mg/mL	20 mL	2 mg/mL

\* Per preparare la diluizione di PREVYMIS 2 mg/mL, aggiungere 5 mL di PREVYMIS 20 mg/mL concentrato per soluzione per infusione dal flaconcino in 45 mL di diluente (sodio cloruro 9 mg/mL (0,9%) oppure destrosio al 5%) e miscelare delicatamente.

- Una volta diluita, la soluzione di PREVYMIS è limpida e presenta un colore variabile da incolore a giallo. Variazioni del colore all'interno di questa gamma non influenzano la qualità del prodotto. Prima della somministrazione, la soluzione diluita deve essere esaminata visivamente per escludere la presenza di particelle e alterazioni del colore. Se la soluzione diluita è opaca, presenta alterazioni del colore o contiene particelle diverse da alcune piccole particelle traslucide o bianche, gettare la soluzione diluita.

#### Somministrazione

- La soluzione diluita deve essere somministrata attraverso un filtro in linea sterile da 0,2 micron o 0,22 micron in polietersulfone (PES).
- Non somministrare la soluzione diluita attraverso un filtro diverso da un filtro in linea sterile da 0,2 micron o 0,22 micron in PES.
- Somministrare esclusivamente per infusione endovenosa.
- Dopo la diluizione, somministrare PREVYMIS per infusione endovenosa tramite catetere venoso periferico o centrale per un periodo di tempo totale di circa 60 minuti. Somministrare l'intero contenuto della sacca per endovena.

#### Soluzioni endovenose e altri medicinali compatibili

- PREVYMIS concentrato per soluzione per infusione è compatibile con soluzioni di sodio cloruro allo 0,9% e di destrosio al 5%.
- I medicinali compatibili sono elencati di seguito.
- Questo medicinale non deve essere miscelato con altri medicinali ad eccezione di quelli elencati di seguito.

- PREVYMIS non deve essere co-somministrato tramite la stessa linea (o cannula) endovenosa con altri medicinali e combinazioni di diluenti diversi da quelli elencati di seguito.

**Elenco dei medicinali compatibili quando PREVYMIS e i medicinali\* sono preparati in sodo cloruro allo 0,9%**

- |                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| • Ampicillina sodica                  | • Fluconazolo      |
| • Ampicillina sodica/Sulbactam sodico | • Insulina umana   |
| • Globulina antitimocitaria           | • Magnesio solfato |
| • Caspofungina                        | • Metotrexato      |
| • Daptomicina                         | • Micafungina      |
| • Fentanil citrato                    |                    |

\*Fare riferimento alle informazioni sulla prescrizione per confermare la compatibilità della contemporanea co-somministrazione.

**Elenco dei medicinali compatibili quando PREVYMIS e i medicinali\* sono preparati in destrosio al 5%**

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| • Amfotericina B (complesso lipidico) <sup>†</sup> | • Idrocortisone succinato sodico |
| • Anidulafungina                                   | • Morfina solfato                |
| • Cefazolina sodica                                | • Noradrenalina bitartrato       |
| • Ceftarolina                                      | • Pantoprazolo sodico            |
| • Ceftriaxone sodico                               | • Potassio cloruro               |
| • Doripenem  | • Potassio fosfato               |
| • Famotidina                                       | • Tacrolimus                     |
| • Acido folico                                     | • Telavancina                    |
| • Ganciclovir sodico                               | • Tigeciclina                    |

\* Fare riferimento alle informazioni sulla prescrizione per confermare la compatibilità della contemporanea co-somministrazione.

<sup>†</sup> L'amfotericina B (complesso lipidico) è compatibile con PREVYMIS. Tuttavia, l'amfotericina B (liposomiale) è incompatibile (vedere paragrafo 6.2).

**Materiali delle sacche per endovena e dei set per infusione compatibili**

PREVYMIS è compatibile con i seguenti materiali delle sacche per endovena e dei set per infusione. Non devono essere utilizzati sacche per endovena e set per infusione in qualsiasi materiale non elencato di seguito.

*Materiali delle sacche per endovena*

Cloruro di polivinile (PVC), etilene vinil acetato (EVA) e poliolefine (polipropilene e polietilene)

*Materiali dei set di infusione*

PVC, polietilene (PE), polibutadiene (PBD), gomma di silicone (SR), copolimero stirene-butadiene (SBC), copolimero stirene-butadiene-stirene (SBS), polistirene (PS)

*Plastificanti*

Tris (2-etilesil) trimellitato (TOTM), butilbenzilftalato (BBP)

*Cateteri*

Poliuretano radiopaco

**Medicinali incompatibili**

PREVYMIS concentrato per soluzione per infusione è fisicamente incompatibile con amiodarone cloridrato, amfotericina B (liposomiale), aztreonam, cefepime cloridrato, ciprofloxacina, ciclosporina, diltiazem cloridrato, filgrastim, gentamicina solfato, levofloxacina, linezolid, lorazepam, midazolam HCl, micofenolato mofetile cloridrato, ondansetron, palonosetron.

Materiali delle sacche per endovenosa e dei set per infusione incompatibili

PREVYMIS è incompatibile con plastificanti in dietilesilftalato (DEHP) e i set di tubi per somministrazione per endovenosa contenenti poliuretano.

Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.

## Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

### PREVYMIS 20 mg granulato in bustina PREVYMIS 120 mg granulato in bustina letermovir

**Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere. Vedere paragrafo 4.

#### Contenuto di questo foglio

1. Cos'è PREVYMIS e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere PREVYMIS
3. Come prendere PREVYMIS
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare PREVYMIS
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### 1. Cos'è PREVYMIS e a cosa serve

PREVYMIS è un medicinale antivirale soggetto a prescrizione medica che contiene il principio attivo letermovir.

PREVYMIS è un medicinale per:

- adulti e bambini di peso corporeo di almeno 5 kg recentemente sottoposti a trapianto di cellule staminali (midollo osseo).
- adulti e bambini di peso corporeo di almeno 40 kg recentemente sottoposti a un trapianto di rene.

Il medicinale contribuisce a impedire che lei sviluppi una malattia da CMV (“citomegalovirus”).

Il CMV è un virus. Per molte persone, il CMV non determina alcun danno. Tuttavia, se il sistema immunitario si indebolisce in seguito a un trapianto di cellule staminali o a un trapianto di rene, si può facilmente sviluppare una malattia da CMV.

#### 2. Cosa deve sapere prima di prendere PREVYMIS

**Non prenda PREVYMIS se:**

- è allergico a letermovir o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- assume uno qualsiasi di questi medicinali:
  - pimozide - usato per la sindrome di Tourette
  - alcaloidi derivati dalla segale cornuta (quali ergotamina e diidroergotamina) - usati per il mal di testa da emicrania.
- assume il seguente prodotto a base di erbe:
  - erba di S. Giovanni (*Hypericum perforatum*)

Non prenda PREVYMIS se una qualsiasi delle condizioni descritte la riguarda. Se non è sicuro, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere prima di prendere PREVYMIS.

**Se sta assumendo PREVYMIS con ciclosporina, non prenda i seguenti medicinali:**

- dabigatran - usato per i coaguli sanguigni
- atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina, pitavastatina - usate per i livelli elevati di colesterolo

**Avvertenze e precauzioni**

Se sta assumendo anche un medicinale per il trattamento di livelli elevati di colesterolo (controlli la lista dei medicinali al paragrafo di seguito "Altri medicinali e PREVYMIS") deve informare immediatamente il medico se manifesta dolori o fitte muscolari di natura sconosciuta, in particolare se non si sente bene o ha febbre. Può essere necessario modificare il medicinale o la dose. Vedere il foglio illustrativo dell'altro medicinale per ulteriori informazioni.

Esami del sangue aggiuntivi possono essere necessari per monitorare i seguenti medicinali:

- ciclosporina, tacrolimus, sirolimus
- voriconazolo

**Bambini e adolescenti**

PREVYMIS non deve essere utilizzato nei bambini di peso corporeo inferiore a 5 kg sottoposti a trapianto di cellule staminali (midollo osseo) o nei bambini di peso corporeo inferiore a 40 kg sottoposti a un trapianto di rene. Questo perché PREVYMIS non è stato studiato in questi gruppi.

**Altri medicinali e PREVYMIS**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale. Questo perché PREVYMIS può influire sul modo in cui agiscono altri medicinali e gli altri medicinali possono influire sul modo in cui agisce PREVYMIS. Il medico o il farmacista le dirà se è sicuro prendere PREVYMIS con altri medicinali.

Ci sono alcuni medicinali che **non deve prendere** con PREVYMIS (controlli l'elenco riportato al paragrafo "Non prenda PREVYMIS se:").

Ci sono alcuni medicinali aggiuntivi che **non deve prendere** con PREVYMIS e ciclosporina (controlli l'elenco riportato al paragrafo "Se sta assumendo PREVYMIS con ciclosporina, non prenda i seguenti medicinali:")

Inoltre, informi il medico se sta prendendo uno qualsiasi dei seguenti medicinali. Questo perché il medico può modificare i medicinali che sta prendendo o il loro dosaggio:

- alfentanil - usato per il trattamento del dolore grave
- fentanil - usato per il trattamento del dolore grave
- chinidina - usata per il trattamento delle anomalie del ritmo cardiaco
- ciclosporina, tacrolimus, sirolimus - usati per prevenire il rigetto di trapianto
- voriconazolo - usato per il trattamento delle infezioni da funghi
- statine, come atorvastatina, fluvastatina, rosuvastatina, simvastatina, pravastatina e pitavastatina - usate per il trattamento di livelli elevati di colesterolo
- gliburide, repaglinide - usate per il trattamento di livelli elevati di zucchero nel sangue
- carbamazepina, fenobarbital, fenitoina - usati per il trattamento di crisi epilettiche o convulsive
- dabigatran, warfarin - usati per fluidificare il sangue o per i coaguli sanguigni
- midazolam - usato come sedativo
- amiodarone - usato per il trattamento del battito cardiaco irregolare
- steroidi contraccettivi orali - usati per il controllo delle nascite
- omeprazolo, pantoprazolo - usati per il trattamento delle ulcere gastriche e altri disturbi dello stomaco
- nafticillina - usata per il trattamento delle infezioni batteriche
- rifabutina, rifampicina - usate per il trattamento delle infezioni da micobatteri
- tioridazina - usata per il trattamento dei disturbi psichiatrici
- bosentan - usato per il trattamento della pressione del sangue alta nei vasi sanguigni dei polmoni
- efavirenz, etravirina, nevirapina, lopinavir, ritonavir - usati per il trattamento dell'HIV

- modafinil - usato per il trattamento dello stato di veglia.

Può chiedere al medico o al farmacista un elenco dei medicinali che possono interagire con PREVYMIS.

### **Gravidanza**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, chieda consiglio al medico prima di prendere questo medicinale. PREVYMIS non è raccomandato in gravidanza. Questo perché non è stato studiato in gravidanza e non è noto se PREVYMIS può essere pericoloso per il bambino durante la gravidanza.

### **Allattamento**

Se sta allattando o se pensa di allattare, informi il medico prima di assumere questo medicinale. L'allattamento non è raccomandato durante l'assunzione di PREVYMIS. Questo perché non è noto se PREVYMIS passi nel latte materno e possa essere trasmesso al bambino.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

PREVYMIS può influenzare in modo lieve la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari (vedere paragrafo 4 "Possibili effetti indesiderati" di seguito). Alcuni pazienti hanno riportato stanchezza (sensazione di forte stanchezza) o vertigini (sensazione di perdita dell'equilibrio) durante il trattamento con PREVYMIS. Se avverte uno di questi effetti non guida veicoli o utilizzi macchinari fino a che l'effetto non svanisce del tutto.

### **PREVYMIS contiene lattosio**

PREVYMIS contiene lattosio monoidrato. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

### **PREVYMIS contiene sodio**

Questo medicinale contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per bustina, cioè essenzialmente "senza sodio".

## **3. Come prendere PREVYMIS**

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

### **Quanto prenderne**

La dose di PREVYMIS dipende dal suo peso corporeo e se sta prendendo anche ciclosporina. Il medico le dirà il numero di bustine da prendere.

- Prenda PREVYMIS come indicato una volta al giorno.

Le dosi raccomandate di PREVYMIS per via orale sono riportate nella Tabella 1 e nella Tabella 2.

**Tabella 1: Dosi raccomandate di PREVYMIS granulato in bustina senza ciclosporina**

Peso corporeo	Dose orale giornaliera di PREVYMIS	Numero di bustine di PREVYMIS una volta al giorno
30 kg e superiore	480 mg	Quattro bustine da 120 mg
da 15 kg a meno di 30 kg	240 mg	Due bustine da 120 mg
da 7,5 kg a meno di 15 kg	120 mg	Una bustina da 120 mg
da 5 kg a meno di 7,5 kg	80 mg	Quattro bustine da 20 mg

**Tabella 2: Dosi raccomandate di PREVYMIS granulato in bustina con ciclosporina**

Peso corporeo	Dose orale giornaliera di PREVYMIS	Numero di bustine di PREVYMIS una volta al giorno
30 kg e superiore	240 mg	Due bustine da 120 mg

Peso corporeo	Dose orale giornaliera di PREVYMIS	Numero di bustine di PREVYMIS una volta al giorno
da 15 kg a meno di 30 kg	120 mg	Una bustina da 120 mg
da 7,5 kg a meno di 15 kg	60 mg	Tre bustine da 20 mg
da 5 kg a meno di 7,5 kg	40 mg	Due bustine da 20 mg

### Come prenderlo

- Legga le **Istruzioni per l'uso** per il modo corretto di preparare e prendere la dose di PREVYMIS. Conservi le Istruzioni per l'uso e le segua ogni volta che prepara e pende il medicinale.
- Contatti il medico in caso di domande su come prendere PREVYMIS.

### Se prende più PREVYMIS di quanto deve

Se prende più PREVYMIS di quanto deve, contatti immediatamente il medico.

### Se dimentica di prendere PREVYMIS

È molto importante che lei non dimentichi o salti le dosi di PREVYMIS.

- Se dimentica una dose, la prenda non appena se ne ricorda. Tuttavia, se è quasi ora della dose successiva, salti la dose dimenticata. Prenda la dose successiva all'orario abituale.
- Non prenda una dose doppia di PREVYMIS per compensare la dimenticanza della dose.
- Se dimentica una dose, se non prende la dose completa o se ne ha sputato un po', contatti il medico.
- Se non è sicuro su cosa fare, contatti il medico o il farmacista.

### Non interrompa l'assunzione di PREVYMIS

Non interrompa l'assunzione di PREVYMIS senza averne prima parlato con il medico. Non rimanga senza PREVYMIS. In questo modo potrà evitare di sviluppare una malattia da CMV dopo un trapianto di cellule staminali o un trapianto di rene.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere.

## 4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

### Comuni:

- possono interessare fino a 1 persona su 10
- diarrea
  - nausea
  - vomito

### Non comuni:

- possono interessare fino a 1 persona su 100
- reazione allergica (ipersensibilità) - i segni possono includere affanno, difficoltà nella respirazione, eruzioni cutanee o orticaria, prurito, gonfiore
  - perdita di appetito
  - alterazioni del gusto
  - mal di testa
  - sensazione di perdita dell'equilibrio (vertigini)
  - mal di stomaco
  - valori anormali delle analisi di laboratorio relativi alla funzionalità del fegato (cioè, aumento dei livelli degli enzimi epatici)
  - spasmi muscolari
  - valori elevati di creatinina ematica degli esami del sangue
  - sensazione di forte stanchezza (stanchezza)

- gonfiore delle mani o dei piedi

#### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione riportato nell'[allegato V](#). Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

### **5. Come conservare PREVYMIS**

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza riportata sulla scatola dopo Scad. e sulla bustina dopo EXP. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

### **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

#### **Cosa contiene PREVYMIS**

##### **PREVYMIS 20 mg granulato in bustina:**

Il principio attivo è letermovir. Ogni bustina contiene 20 mg di letermovir.

##### **PREVYMIS 120 mg granulato in bustina:**

Il principio attivo è letermovir. Ogni bustina contiene 120 mg di letermovir.

**Gli altri componenti sono:** Cellulosa microcristallina (E460), croscarmellosa sodica (E468), povidone (E1201), silice colloidale anidra (E551), magnesio stearato (E470b), lattosio monoidrato, ipromellosa (E464), titanio diossido (E171), triacetina, ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172).

Consulti il paragrafo 2 “PREVYMIS contiene lattosio” e “PREVYMIS contiene sodio”.

#### **Descrizione dell'aspetto di PREVYMIS e contenuto della confezione**

PREVYMIS 20 mg granulato in bustina è granulato di colore beige.

PREVYMIS 120 mg granulato in bustina è granulato di colore beige.

Il granulato è fornito in bustine.

- Confezione da 30 bustine.

#### **Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e Produttore**

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Paesi Bassi

Per ulteriori informazioni su questo medicinale, contatti il rappresentante locale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

**België/Belgique/Belgien**

MSD Belgium

**Lietuva**

UAB Merck Sharp & Dohme

Tél/Tel: +32(0)27766211  
d poc\_belux@msd.com

**България**  
Мерк Шарп и Доум България ЕООД  
Тел.: +359 2 819 3737  
info-msdbg@msd.com

**Česká republika**  
Merck Sharp & Dohme s.r.o.  
Tel.: +420 277 050 000  
d poc\_czechslovak@msd.com

**Danmark**  
MSD Danmark ApS  
Tlf.: +45 4482 4000  
dkmail@msd.com

**Deutschland**  
MSD Sharp & Dohme GmbH  
Tel.: +49 (0) 89 20 300 4500  
medinfo@msd.de

**Eesti**  
Merck Sharp & Dohme OÜ  
Tel: +372 614 4200  
d poc.estonia@msd.com

**Ελλάδα**  
MSD Α.Φ.Ε.Ε.  
Τηλ: +30 210 98 97 300  
d poc.greece@msd.com

**España**  
Merck Sharp & Dohme de España, S.A.  
Tel: +34 91 321 06 00  
msd\_info@msd.com

**France**  
MSD France  
Tél: +33 (0)1 80 46 40 40

**Hrvatska**  
Merck Sharp & Dohme d.o.o.  
Tel: + 385 1 6611 333  
d poc.croatia@msd.com

**Ireland**  
Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)  
Limited  
Tel: +353 (0)1 2998700  
medinfo\_irland@msd.com

**Ísland**  
Vistor ehf.

Tel. +370 5 2780 247  
d poc\_lithuania@msd.com

**Luxembourg/Luxemburg**  
MSD Belgium  
Tél/Tel: +32(0)27766211  
d poc\_belux@msd.com

**Magyarország**  
MSD Pharma Hungary Kft.  
Tel.: +36 1 888 5300  
hungary\_msd@msd.com

**Malta**  
Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited  
Tel: 8007 4433 (+356 99917558)  
dpoccyprus@msd.com

**Nederland**  
Merck Sharp & Dohme B.V.  
Tel: 0800 9999000  
(+31 23 5153153)  
medicalinfo.nl@msd.com

**Norge**  
MSD (Norge) AS  
Tlf: +47 32 20 73 00  
medinfo.norway@msd.com

**Österreich**  
Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.  
Tel: +43 (0) 1 26 044  
d poc\_austria@msd.com

**Polska**  
MSD Polska Sp. z o.o.  
Tel.: +48 22 549 51 00  
msdpolska@msd.com

**Portugal**  
Merck Sharp & Dohme, Lda  
Tel.: +351 21 4465700  
inform\_pt@msd.com

**România**  
Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.  
Tel.: +40 21 529 29 00  
msdromania@msd.com

**Slovenija**  
Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.  
Tel: +386 1 520 4201  
msd.slovenia@msd.com

**Slovenská republika**  
Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Sími: +354 535 7000

Tel.: +421 2 58282010  
dpoc\_czechslovak@msd.com

**Italia**

MSD Italia S.r.l.

Tel: 800 23 99 89 (+39 06 361911)

dpor.italy@msd.com

**Κύπρος**

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)

dpor.cyprus@msd.com

**Suomi/Finland**

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 804 650

info@msd.fi

**Sverige**

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@msd.com

**Latvija**

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel.: +371 67025300

dpor.latvia@msd.com

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato {MM/AAAA}.**

Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web dell'Agenzia europea per i medicinali, <https://www.ema.europa.eu>.

**Istruzioni per l'uso**

Importante: legga questo opuscolo prima dell'uso

**PREVYMIS 20 mg granulato in bustina**  
**PREVYMIS 120 mg granulato in bustina**

letermovir

Queste "Istruzioni per l'uso" contengono le informazioni su come prendere PREVYMIS

### **Informazioni importanti che deve sapere prima di prendere PREVYMIS**

- Prenda PREVYMIS per via orale o lo somministri mediante sondino di alimentazione.
  - **Non** frantumi o mastichi PREVYMIS.
- Quando prenderlo:
  - Prenda il medicinale più o meno alla stessa ora ogni giorno.
- Quanto prenderne:
  - Il medico le indicherà la giusta quantità (dose) per lei, in base al peso corporeo e se sta assumendo anche ciclosporina.
  - Assuma la dose completa ogni volta.
  - Mantenga le visite mediche poiché la dose può cambiare.

**Contatti il medico** se dimentica una dose, se non prende la dose completa o se ne ha sputato un po'.

## **Come prendere PREVYMIS**

Consulti il medico su come assumere questo medicinale.

Segua **UNO** di questi modi per prendere PREVYMIS:

- Miscelare con cibo morbido – Consulti il paragrafo “Miscelare con cibo morbido”.
- Somministrare mediante sondino di alimentazione – Consulti il paragrafo “Somministrare mediante sondino di alimentazione”.

## Miscelare con cibo morbido




### Informazioni importanti sulla miscelazione di PREVYMIS con cibo morbido

- Utilizzi solo cibo a temperatura ambiente o freddo.
  - **Non** utilizzi cibo caldo




- La tempistica è importante! Prima di iniziare, si assicuri di essere pronto!
  - Deve assumere tutta la miscela entro 10 minuti dalla miscelazione di PREVYMIS con il cibo.

## Miscelare con cibo morbido



**Step 1: Lavi le mani con acqua e sapone e le asciughi.**




**Step 2: Controlli la data di scadenza posizionata sulla parte superiore della scatola.**

- Non usi PREVYMIS se è scaduto.

## Miscelare con cibo morbido

**Nota: Il medico le dirà il numero di bustine necessarie per la sua dose.**


**Step 3: Metta insieme tutti i materiali su una superficie pulita.**




**Step 4: Scelga un cibo morbido che le piace, come la purea di mela o lo yogurt.**

- **Non utilizzi cibo caldo.**

## Miscelare con cibo morbido




**Step 5: Metta da 1 a 3 cucchiai di cibo morbido nella piccola ciotola.**




**Step 6: Picchietti la/e bustina/e per staccare il granulato dal fondo della/e bustina/e.**

- Tenga la/e bustina/e con la linea tratteggiata verso l'alto.

## Miscelare con cibo morbido



**Step 7: Tagli la/e bustina/e con le forbici in corrispondenza della linea tratteggiata.**



**Step 8: Picchietti leggermente la/e bustina/e per versare con cura tutto il granulato nel cibo morbido nella stessa piccola ciotola.**

- Si assicuri che tutto il granulato vada nella piccola ciotola.
- Si assicuri che la/e bustina/e sia/siano vuota/e.
- In caso di fuoriuscita di granulato, contatti il medico.

## Miscelare con cibo morbido



**Step 9: Usi il cucchiaio per miscelare delicatamente il cibo e PREVYMIS insieme.**

## Miscelare con cibo morbido



### Step 10: Assumere TUTTA la miscela di PREVYMIS.

- Al termine, verifichi che non vi sia granulato nella ciotola o sul cucchiaio.
- Se ha fame, successivamente può mangiare altro cibo o un pasto.

Contatti il medico se non finisce tutta la miscela di PREVYMIS o ne sputa un po'.

La tempistica è importante! Deve mangiare tutta la miscela entro 10 minuti dalla miscelazione di PREVYMIS con il cibo.

## Miscelare con cibo morbido




### Step 11: Pulizia.

- Getti la/e bustina/e vuota/e nella spazzatura.
- Lavi la piccola ciotola e il cucchiaio con acqua e sapone.
- Metta tutto in un luogo pulito e asciutto.


Per maggiori informazioni, consulti i paragrafi “Come conservare le bustine di PREVYMI” e “Per saperne di più su PREVYMI”.

## Somministrare mediante sondino di alimentazione

Queste istruzioni sono solo per i pazienti con sondino di alimentazione.



Sondino per gastrostomia (sondino G)




Sondino nasogastrico (sondino NG)

**Chieda al medico come somministrare PREVYMIS mediante sondino e come pulire il sondino di alimentazione.**

## Somministrare mediante sondino di alimentazione

### Informazioni importanti sulla miscelazione di PREVYMIS con i liquidi



- PREVYMIS deve essere miscelato con latte, succo di mela o latte artificiale (LA). PREVYMIS può anche essere miscelato con acqua, ma solo quando PREVYMIS viene somministrato attraverso un sondino NG.
  - Lasci che i liquidi raggiungano la temperatura ambiente.
  - **Non** mescoli PREVYMIS con liquido caldo o freddo (refrigerato).




- La tempistica è importante! Prima di iniziare, si assicuri di essere pronto!
  - Dopo aver miscelato PREVYMIS con un liquido, deve attendere almeno 10 minuti prima di somministrarlo. In questo modo, il granulato si disgrega e non ostruisce il sondino di alimentazione.
  - Una volta pronto, seguire **immediatamente** gli step per somministrare la miscela.

## Somministrare mediante sondino di alimentazione



**Step 1: Lavi le mani con acqua e sapone e le asciughi.**




**Step 2: Controlli la data di scadenza posizionata sulla parte superiore della scatola.**

- **Non usi PREVYMIS se è scaduto.**

## Somministrare mediante sondino di alimentazione


**Nota: Il medico le dirà il numero di bustine necessarie per la sua dose.**

### Step 3: Metta insieme tutti i materiali su una superficie pulita.




- Il numero di bustine come indicato dal medico
- Forbici
- Orologio o timer
- Un piccolo bicchiere per uso domestico
- Siringa per sondino di alimentazione fornita dal medico o dal farmacista
- Contenitore per medicinali (da 15 a 30 mL) fornito dal medico o dal farmacista

## Somministrare mediante sondino di alimentazione



### Step 4: Scelga un liquido: latte, succo di mela o latte artificiale (LA).

- È possibile utilizzare anche l'acqua, ma solo quando PREVYTMIS viene somministrato tramite un sondino NG.



### Step 5: Versi una piccola quantità di liquido nel bicchiere.

- Lasci che i liquidi raggiungano la temperatura ambiente.
- **Non** usi liquido caldo o freddo (refrigerato).




### Step 6: Tiri verso l'alto lo stantuffo della siringa per prelevare il liquido dal bicchiere nella siringa.

- Il medico le indicherà la quantità di liquido da utilizzare.

## Somministrare mediante sondino di alimentazione




**Step 7: Svuoti il liquido dalla siringa nel piccolo contenitore pulito per medicinali.**




**Step 8: Picchietti la/e bustina/e per staccare il granulato dal fondo della/e bustina/e.**

- Tenga la/e bustina/e con la linea tratteggiata verso l'alto.

## Somministrare mediante sondino di alimentazione



**Step 9: Tagli la/e bustina/e con le forbici in corrispondenza della linea tratteggiata.**



**Step 10: Picchietti leggermente la/e bustina/e per versare con cura tutto il granulato nello stesso contenitore per medicinali.**

- Si assicuri che tutto il granulato vada nel piccolo contenitore.
- Si assicuri che la/e bustina/e sia/siano vuota/e.
- In caso di fuoriuscita di granulato, contatti il medico.

## Somministrare mediante sondino di alimentazione



### Step 11: Utilizzi un orologio o un timer e attenda 10 minuti.


- Non agiti o ruoti il contenitore per medicinali

**Importante:** Durante l'attesa, conservi il contenitore per medicinali in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.




- PREVYMIS non si dissolverà ma si scioglierà o si frammenterà.
- Dopo 10 minuti, la miscela sarà pronta per l'uso.
- Una volta pronto, segua gli step da 12 a 19 per somministrare la miscela.

## Somministrare mediante sondino di alimentazione




**Step 12: Mescoli delicatamente la miscela con la punta della siringa.**

- Non agiti o ruoti il contenitore per medicinali.





**Step 13: Inclini il contenitore per medicinali e tiri verso l'alto lo stantuffo della siringa per prelevare tutta la miscela dal contenitore per medicinali.**

## Somministrare mediante sondino di alimentazione




### Step 14: Somministri la miscela di PREVYMIS.

- Capovolga delicatamente la siringa per evitare che il medicinale si depositi.
  - **Non** agiti la siringa per evitare la formazione di bolle d'aria.
- Collega la siringa al sondino di alimentazione.
- Prema lentamente lo stantuffo per spostare la miscela attraverso il sondino di alimentazione.




## Somministrazione mediante sondino di alimentazione




**Step 15:** Per risciacquare, utilizzi la stessa siringa e tiri verso l'alto lo stantuffo della siringa per prelevare il liquido dallo stesso bicchiere.

- Il medico le indicherà la quantità di liquido da utilizzare.




**Step 16:** Prema lentamente lo stantuffo per aggiungere il liquido contenuto nella siringa allo stesso contenitore per medicinali.

## Somministrare mediante sondino di alimentazione




**Step 17: Mescoli delicatamente la miscela con la punta della siringa.**

- Non agiti o ruoti il contenitore per medicinali.



**Step 18: Inclini il contenitore per medicinali e tiri verso l'alto lo stantuffo della siringa per prelevare tutta la miscela dal contenitore per medicinali.**

## Somministrare mediante sondino di alimentazione




### Step 19: Somministri la miscela di risciacquo.

- Capovolga delicatamente la siringa per evitare che il medicinale si depositi.
  - **Non** agiti la siringa per evitare la formazione di bolle d'aria.
- Collega la siringa al sondino di alimentazione.
- Prema lentamente lo stantuffo per spostare la miscela attraverso il sondino di alimentazione.



Contatti il medico se non termina tutta la miscela di PREVYMIS.




## Somministrare mediante sondino di alimentazione

### Step 20: Lavi subito il sondino di alimentazione con acqua.

- Chieda al medico la quantità di acqua da usare.

## Somministrare mediante sondino di alimentazione

### Step 21: Pulizia



- Getti la/e bustina/e vuota/e nella spazzatura.
- Lavi a mano la siringa e il contenitore per medicinali con acqua calda e sapone per piatti.
  - **Non** lavi la siringa e il contenitore per medicinali in lavastoviglie.
  - **Non** far bollire la siringa e il contenitore per medicinali.
- Metta tutto in un luogo pulito e asciutto.

Per maggiori informazioni, consulti i paragrafi “Come conservare le bustine di PREVYMIS” e “Per saperne di più su PREVYMIS”.

**Come conservare le bustine di PREVYMIS**

- PREVYMIS non richiede particolari condizioni di conservazione.
- Tenga questo e tutti i medicinali fuori dalla portata dei bambini.

**Per saperne di più su PREVYMIS**

Per ulteriori informazioni sull'uso di PREVYMIS, chieda al medico o al farmacista e legga il foglio illustrativo di PREVYMIS.