

<u>RT (EU) numeris</u>	<u>(Sugalvotas) pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Vidinė pakuotė</u>	<u>Kiekis (koncentracija)</u>	<u>Pakuotės dydis</u>
EU/1/25/1913/001	CAPVAXIVE	-- ¹	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis	užpildytas švirkštas (stiklo)	0,5 ml	1 užpildytas švirkštas
EU/1/25/1913/002	CAPVAXIVE	-- ¹	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis	užpildytas švirkštas (stiklo)	0,5 ml	1 užpildytas švirkštas + 1 adatas
EU/1/25/1913/003	CAPVAXIVE	-- ¹	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis	užpildytas švirkštas (stiklo)	0,5 ml	1 užpildytas švirkštas + 2 adatas
EU/1/25/1913/004	CAPVAXIVE	-- ¹	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis	užpildytas švirkštas (stiklo)	0,5 ml	10 užpildytų švirkštų
EU/1/25/1913/005	CAPVAXIVE	-- ¹	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis	užpildytas švirkštas (stiklo)	0,5 ml	10 užpildytų švirkštų + 10 adatų
EU/1/25/1913/006	CAPVAXIVE	-- ¹	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis	užpildytas švirkštas (stiklo)	0,5 ml	10 užpildytų švirkštų + 20 adatų

--¹

1 dozėje (0,5 ml) yra:

3 serotipo pneumokokinio polisacharido ¹	4 µg
6A serotipo pneumokokinio polisacharido ¹	4 µg
7F serotipo pneumokokinio polisacharido ¹	4 µg
8 serotipo pneumokokinio polisacharido ¹	4 µg
9N serotipo pneumokokinio polisacharido ¹	4 µg
10A serotipo pneumokokinio polisacharido ¹	4 µg
11A serotipo pneumokokinio polisacharido ¹	4 µg
12F serotipo pneumokokinio polisacharido ¹	4 µg
15A serotipo pneumokokinio polisacharido	4 µg
Pneumokokinio polisacharido iš deOAc15B (de-O-acetilinto 15B serotipo) ¹	4 µg
16F serotipo pneumokokinio polisacharido ¹	4 µg
17F serotipo pneumokokinio polisacharido ¹	4 µg
19A serotipo pneumokokinio polisacharido ¹	4 µg
20A serotipo pneumokokinio polisacharido ¹	4 µg
22F serotipo pneumokokinio polisacharido ¹	4 µg
23A serotipo pneumokokinio polisacharido ¹	4 µg
23B serotipo pneumokokinio polisacharido ¹	4 µg
24F serotipo pneumokokinio polisacharido ¹	4 µg
31 serotipo pneumokokinio polisacharido ¹	4 µg
33F serotipo pneumokokinio polisacharido ¹	4 µg
35B serotipo pneumokokinio polisacharido ¹	4 µg

¹Konjuguotas su CRM197 baltymu nešikliu. CRM197 yra netoksiškas difterijos toksino mutantas (gautas iš *Corynebacterium diphtheriae* C7), rekombinantiniu būdu ekspresuojamas *Pseudomonas fluorescens*.

Vienoje dozėje (0,5 ml) yra maždaug 65 µg CRM₁₉₇ baltymo nešiklio.