

ES numeris	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Paskirties gyvūnų rūšis	Naudojimo būdas	Pirminė pakuotė	Kiekis	Pakuotės dydis	Išlauka
EU/2/20/262/001	Enteroporc Coli AC	-- ¹	Liofilizatas ir suspensija injekcinei suspensijai	Kiaulės	Leisti į raumenis	Liofilizatas: flakonas (stiklo); suspensija: flakonas (stiklo)	Liofilizatas: 10 dozių (10 ml); suspensija: 20 ml	Liofilizatas: 1 flakonas; suspensija: 1 flakonas	Nulis parų
EU/2/20/262/002	Enteroporc Coli AC	-- ¹	Liofilizatas ir suspensija injekcinei suspensijai	Kiaulės	Leisti į raumenis	Liofilizatas: flakonas (stiklo); suspensija: flakonas (PET)	Liofilizatas: 10 dozių (10 ml); suspensija: 20 ml	Liofilizatas: 1 flakonas; suspensija: 1 flakonas	Nulis parų
EU/2/20/262/003	Enteroporc Coli AC	-- ¹	Liofilizatas ir suspensija injekcinei suspensijai	Kiaulės	Leisti į raumenis	Liofilizatas: flakonas (stiklo); suspensija: flakonas (stiklo)	Liofilizatas: 25 dozės (10 ml); suspensija: 50 ml	Liofilizatas: 1 flakonas; suspensija: 1 flakonas	Nulis parų
EU/2/20/262/004	Enteroporc Coli AC	-- ¹	Liofilizatas ir suspensija injekcinei suspensijai	Kiaulės	Leisti į raumenis	Liofilizatas: flakonas (stiklo); suspensija: flakonas (PET)	Liofilizatas: 25 dozės (10 ml); suspensija: 50 ml	Liofilizatas: 1 flakonas; suspensija: 1 flakonas	Nulis parų

--¹ *C. perfringens* komponentų:

- A tipo alfa toksoido ≥ 125 sV/ml*
- C tipo beta1 toksoido $\geq 3\ 354$ sV/ml*
- A tipo beta2 toksoido ≥ 794 sV/ml*

E. coli komponentų:

- žiuželių adhezino F4ab ≥ 23 sV/ml*
- žiuželių adhezino F4ac ≥ 19 sV/ml*
- žiuželių adhezino F5 ≥ 13 sV/ml*
- žiuželių adhezino F6 ≥ 37 sV/ml*

* toksoido ir žiuželių adhezinų kiekis nurodomas santykiniais vienetais mililitre, nustatomas ELISA metodu pagal vidinį standartą.