

I PRIEDAS

**VETERINARINIŲ VAISTŲ PAVADINIMŲ, VAISTO FORMŲ, STIPRUMŲ, GYVŪNŲ RŪŠIŲ,
NAUDOJIMO BŪDO, IŠLAUKOS IR PAREIŠKĖJŲ/RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJŲ
VALSTYBĖSE NARĖSE SĄRAŠAS**

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas arba rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo dažnumas ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka
Austrija	Ceva Santé Animale Zone Industrielle La Ballastiere B.P. 126 33500 Libourne FRANCE	Colivet 2 000 000 IU/ml, Konzentrat für eine orale Lösung für Schweine und Geflügel	Kolistino sulfatas	2 MTV/ml	Koncentratas geriamajam tirpalui	Kiaulės Naminiai paukščiai	Tris paras iš eilės, įmaišius į geriamąjį vandenį.	Kiaulėms – 100 000 TV/kg kūno svorio per parą dviem po lygiai padalintomis dozėmis. Naminiams paukščiams – 75 000 TV/kg kūno svorio per parą.	Kiaulienai – 1 para. Broileriams ir vištoms dedeklėms – 1 para. Kitai paukštienai – 7 paros. Kiaušiniams – 0 parų.
Belgija	Divasa-Farmavic S.A. Ctra San Hipolito km 71 08503 Gurb-Vic (Barcelona) SPAIN	COLIPLUS 2,000,000 IU/ml concentrate for oral solution for use in drinking water for cattle, sheep, swine and chickens	Kolistino sulfatas	2 MTV/ml	Koncentratas geriamajam tirpalui	Veršeliai Ėriukai Kiaulės Naminiai paukščiai	Veršeliams, ėriukams, kiaulėms ir naminiams paukščiams – tris paras iš eilės, įmaišius į geriamąjį vandenį.	Veršeliams ir ėriukams – 100 000 TV kolistino/kg kūno svorio per parą dviem po lygiai padalintomis dozėmis, t. y. 0,50 ml vaisto/10 kg kūno svorio per parą 3 paras iš eilės. Kiaulėms – 100 000 TV kolistino/kg kūno svorio per parą, t. y. 0,50 ml vaisto/10 kg kūno svorio per parą 3 paras iš eilės.	Veršienai, ėrienai ir jų subproduktams – 7 paros. Kiaulienai ir jos subproduktams – 1 para. Broileriams ir vištoms dedeklėms – 1 para.

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas arba rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo dažnumas ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka
								Naminiam paukščiui – 75 000 TV/kg kūno svorio per parą, t. y. 37,5 ml vaisto 1 tonai kūno svorio per parą 3 paras iš eilės.	Kiaušiniams – 0 parų. Kitai paukštienai ir jos subproduktams – 7 paras. Kiaušiniams – 0 parų.
Bulgarija	Ceva Santé Animale Zone Industrielle La Ballastiere B.P. 126 33500 Libourne FRANCE	Colivet oral solution	Kolistino sulfatas	2 MTV/ml	Geriamasis tirpalas	Kiaulės Naminiai paukščiai	Gerti 3 paras.	Kiaulėms – 100 000 TV/kg kūno svorio per parą. Naminiam paukščiui – 75 000 TV/kg kūno svorio per parą.	Mėsai – 1 para. Kiaušiniams – 0 parų.
Bulgarija	Divasa-Farmavic S.A. Ctra San Hipolito km 71 08503 Gurb-Vic (Barcelona) SPAIN	COLIPLUS 2,000,000 IU/ml concentrate for oral solution for use in drinking water for cattle, sheep, swine and chickens	Kolistino sulfatas	2 MTV/ml	Koncentratas geriamajam tirpalui	Veršeliai Ėriukai Kiaulės Naminiai paukščiai	Veršeliams, ėriukams, kiaulėms ir naminiams paukščiams – tris paras iš eilės, įmaišius į geriamąjį vandenį.	Veršeliams ir ėriukams – 100 000 TV kolistino/kg kūno svorio per parą dviem po lygiai padalintomis dozėmis, t. y. 0,50 ml vaisto/10 kg kūno svorio per parą 3 paras iš eilės. Kiaulėms – 100 000 TV kolistino/kg kūno svorio per parą, t. y. 0,50 ml vaisto/10 kg kūno svorio per	Veršienai, ėrienai ir jų subproduktams – 7 paras. Kiaulienai ir jos subproduktams – 1 para. Broileriams ir vištoms

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas arba rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo dažnumas ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka
								parą 3 paras iš eilės. Naminiam paukščiui – 75 000 TV/kg kūno svorio per parą, t. y. 37,5 ml vaisto 1 tonai kūno svorio per parą 3 paras iš eilės.	dedeklėms – 1 para. Kiaušiniams – 0 parų. Kitai paukštienai ir jos subproduktams – 7 paras. Kiaušiniams – 0 parų.
Kipras	Ceva Santé Animale Zone Industrielle La Ballastiere B.P. 126 33500 Libourne FRANCE	COLIVET 2.000.000 IU/ml	Kolistino sulfatas	2 MTV/ml	Geriamasis tirpalas	Kiaulės Paukščiai	Kiaulėms – 100 000 TV/kg per parą. Naminiam paukščiui – 75 000 TV/kg per parą	Kiaulėms – 0,50 ml vaisto/10 kg kūno svorio per parą 3 paras iš eilės. Naminiam paukščiui – 37,5 ml vaisto 1 tonai kūno svorio per parą 3 paras iš eilės.	Kiaulienai ir jos subproduktams – 1 para. Broileriams ir vištoms dedeklėms – 1 para. Kitai paukštienai – 7 paras. Kiaušiniams –

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas arba rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo dažnumas ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka
									0 parų.
Čekija	Ceva Animal Health Slovakia s.r.o. Račianska 77 831 02 Bratislava SLOVAK REPUBLIC	Colivet Sol.	Kolistino sulfatas	2 MTV/ml	Geriamasis tirpalas	Kiaulės Vištos (broileriai)	Kasdien. Gerti.	Broileriams – 75 000 TV kolistino/kg kūno svorio (t. y. 0,37 ml vaisto/10 kg kūno svorio per parą 3–5 paras iš eilės, įmaišius į geriamąjį vandenį). Kiaulėms – 50 000 TV kolistino/kg kūno svorio per 12 valandų (t. y. 0,25 ml vaisto/10 kg kūno svorio per 12 valandų 3–5 paras, įmaišius į geriamąjį vandenį arba pieno pakaitalą).	Kiaulienai, broilerių mėsai ir jų subproduktams – 2 paras. Neskirti vaisto vištoms dedeklėms, kurių kiaušiniai naudojami žmonių maistui.
Danija	Ceva Animal Health A/S Andkærvej 19 7100 Vejle DENMARK	Colivet	Kolistino sulfatas	2 MTV/ml	Geriamasis tirpalas	Kiaulės	Kasdien. Gerti.	100 000 TV kolistino/kg kūno svorio kasdien 3–5 paras.	1 para.

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas arba rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo dažnumas ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka
Danija	Divasa-Farmavic S.A. Ctra San Hipolito km 71 08503 Gurb-Vic (Barcelona) SPAIN	COLIPLUS 2,000,000 IU/ml concentrate for oral solution for use in drinking water for cattle, sheep, swine and chickens	Kolistino sulfatas	2 MTV/ml	Koncentratas geriamajam tirpalui	Veršeliai Ėriukai Kiaulės Naminiai paukščiai	Veršeliams, ėriukams, kiaulėms ir naminiams paukščiams – tris paras iš eilės, įmaišius į geriamąjį vandenį.	Veršeliams ir ėriukams – 100 000 TV kolistino/kg kūno svorio per parą dviem po lygiai padalintomis dozėmis, t. y. 0,50 ml vaisto/10 kg kūno svorio per parą 3 paras iš eilės. Kiaulėms – 100 000 TV kolistino/kg kūno svorio per parą, t. y. 0,50 ml vaisto/10 kg kūno svorio per parą 3 paras iš eilės. Naminiams paukščiams – 75 000 TV/kg kūno svorio per parą, t. y. 37,5 ml vaisto 1 tonai kūno svorio per parą 3 paras iš eilės.	Mėsai ir subproduktams – 7 paras. Kiaušiniams – 0 parų.
Prancūzija	Ceva Santé Animale Zone Industrielle La Ballastiere B.P. 126 33500 Libourne FRANCE	COLISTINE CEVA 2 MUI/MI CONCENTRE POUR SOLUTION BUVABLE POUR PORCINS ET	Kolistino sulfatas	2 MTV/ml	Geriamasis tirpalas	Kiaulės Naminiai paukščiai	3 paras.	Kiaulėms – 100 000 TV kolistino/kg kūno svorio per parą 3 paras iš eilės geriamuoju būdu, t. y. 0,50 ml vaisto/10 kg kūno svorio per parą 3 paras iš eilės. Naminiams paukščiams – 75 000 TV kolistino/kg kūno	Kiaulienai ir jos subproduktams – 1 para. Mėsinėms vištoms ir vištoms dedeklėms – 1

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas arba rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo dažnumas ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka
		VOLAILLES						svorio per parą 3 paras iš eilės, t. y. 37,5 ml vaisto 1 tonai kūno svorio per parą 3 paras iš eilės.	para. Kitai paukštienai – 7 paras. Kiaušiniams – 0 parų.
Prancūzija	Ceva Santé Animale Zone Industrielle La Ballastiere B.P. 126 33500 Libourne FRANCE	COLIVET SOLUTION	Kolistino sulfatas	2 MTV/ml	Geriamasis tirpalas	Veršeliai Ėriukai Kiaulės Naminiai paukščiai	3 paras.	Veršeliams, ėriukams, kiaulėms – 100 000 TV/kg per parą. Naminiai paukščiai – 75 000 TV/kg per parą.	Veršienai, ėrienai ir jų subproduktams – 7 paras. Kiaulienai – 1 para. Mėsinėms vištoms ir vištoms dedeklėms – 1 para. Kiaušiniams – 0 parų. Kitai paukštienai – 7 paras.

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas arba rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo dažnumas ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka
									Kiaušiniams – 0 parų.
Prancūzija	Coophavet S.A.S Saint Herblion, B.P. 70089 44153 Ancenis Cedex FRANCE	COFACOLI SOLUTION	Kolistino sulfatas	2 MTV/ml	Geriamasis tirpalas	Veršeliai Ėriukai Kiaulės Naminiai paukščiai	3 paros.	Veršeliams, ėriukams, kiaulėms – 100 000 TV/kg per parą. Naminiams paukščiams – 75 000 TV/kg per parą.	Mėsai ir subproduktams – 7 paros. Kiaušiniams – 0 parų.
Prancūzija	Franvet Zone industrielle d'Etriche Route d'Avire, BP 103 49500 Segré Cedex FRANCE	MILICOLI	Kolistino sulfatas	2 MTV/ml	Geriamasis tirpalas	Veršeliai Ėriukai Kiaulės Naminiai paukščiai	3 paros.	Veršeliams, ėriukams, kiaulėms – 100 000 TV/kg per parą. Naminiams paukščiams – 75 000 TV/kg per parą.	Kiaulienai, veršienai, vištienai ir jų subproduktams – 1 para. Ėrienai ir paukštienai, išskyrus vištieną – 7 paros. Kiaušiniams – 0 parų.
Prancūzija	Laboratoires Biové 3 rue de Lorraine 62510 Arques FRANCE	ACTI COLI 2 MUI/ML	Kolistino sulfatas	2 MTV/ml	Geriamasis tirpalas	Veršeliai Ėriukai Kiaulės Naminiai	3 paros	Veršeliams, ėriukams, kiaulėms – 100 000 TV/kg per parą. Naminiams paukščiams –	Kiaulienai ir jos subproduktams – 0 parų.

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas arba rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo dažnumas ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka
						paukščiai		75 000 TV/kg per parą	Vištienai – 1 para. Kitai paukštienai – 7 paros. Veršienai – 2 paros. Ėrienai – 7 paros. Kiaušiniams – 0 parų.
Prancūzija	Laprovét 2 Chemin de la Milletière B.P. 67562 37075 Tours Cedex 2 FRANCE	COLISTINE SOLUTION E.A.F.	Kolistino sulfatas	2 MTV/ml	Geriamasis tirpalas	Veršeliai Ėriukai Kiaulės Naminiai paukščiai	3 paros.	Veršeliams, ėriukams, kiaulėms – 100 000 TV/kg per parą. Naminiams paukščiams – 75 000 TV/kg per parą.	Mėsai ir subproduktams – 7 paros. Kiaušiniams – 0 parų.
Prancūzija	Sogeval Zone Industrielle des Touches 200, avenue de Mayenne B.P. 2227	SOGECOLI 2 MILLIONS UI/ML SOLUTION BUvable	Kolistino sulfatas	2 MTV/ml	Geriamasis tirpalas	Veršeliai Ėriukai Kiaulės Naminiai paukščiai	3 paros.	Veršeliams, ėriukams, kiaulėms – 100 000 TV/kg per parą. Naminiams paukščiams – 75 000 TV/kg per parą.	Kiaulienai ir jos subproduktams – 0 parų. Vištienai – 1 para.

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas arba rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo dažnumas ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka
	53022 Laval Cedex 9 FRANCE								Kitai paukštienai – 7 paros. Veršienai – 2 paros. Ėrienai – 7 paros. Kiaušiniams – 0 parų.
Prancūzija	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M LID B.P. 27 06516 Carros Cedex FRANCE	COLISTINE SULFATE 2 MUI /ML BUVABLE VIRBAC	Kolistino sulfatas	2 MTV/ml	Geriamasis tirpalas	Veršeliai Ėriukai Kiaulės Naminiai paukščiai	3 paros	Veršeliams, ėriukams, kiaulėms – 100 000 TV/kg per parą. Naminiams paukščiams – 75 000 TV/kg per parą.	Mėsai ir subproduktams – 7 paros. Kiaušiniams – 0 parų.
Vokietija	Divasa-Farmavic S.A. Ctra San Hipolito km 71 08503 Gurb-Vic (Barcelona) SPAIN	Coliplus	Kolistino sulfatas	2 MTV/ml	Koncentratas geriamajam tirpalui	Veršeliai Ėriukai Kiaulės Naminiai paukščiai	Veršeliams, ėriukams, kiaulėms ir naminiams paukščiams – tris paras iš eilės, įmaišius į geriamąjį vandenį.	Veršeliams ir ėriukams – 100 000 TV kolistino/kg kūno svorio per parą dviem po lygiai padalintomis dozėmis, t. y. 0,50 ml vaisto/10 kg kūno svorio per parą 3 paras iš eilės. Kiaulėms – 100 000 TV kolistino/kg kūno svorio per parą, t. y. 0,50 ml	Mėsai ir subproduktams – 7 paros. Kiaušiniams – 0 parų.

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas arba rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo dažnumas ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka
								vaisto/10 kg kūno svorio per parą 3 paras iš eilės. Naminiam paukščiui – 75 000 TV/kg kūno svorio per parą, t. y. 37,5 ml vaisto 1 tonai kūno svorio per parą 3 paras iš eilės.	
Graikija	Ceva Santé Animale Zone Industrielle La Ballastiere B.P. 126 33500 Libourne FRANCE	Colivet	Kolistino sulfatas	2 MTV/ml	Koncentratas geriamajam tirpalui	Kiaulės Naminiai paukščiai	Įmaišyti į geriamąjį vandenį per parą.	Kiaulėms – 100 000 TV/kg kūno svorio per parą 3 paras. Naminiam paukščiui – 75 000 TV/kg kūno svorio per parą 3 paras.	Kiaulienai – 1 para. Broileriams ir vištoms dedeklėms – 1 para. Kitai paukštienai – 7 paras. Kiaušiniams – 0 parų.
Graikija	Divasa-Farmavic S.A. Ctra San Hipolito km 71 08503 Gurb-Vic	COLISTIN 2.000.000 IU/ML/DIVASA -FARMANIC	Kolistino sulfatas	2 MTV/ml	Koncentratas geriamajam tirpalui	Veršeliai Ėriukai Kiaulės Naminiai paukščiai	Veršeliams, ėriukams, kiaulėms ir naminiam paukščiui – tris	Veršeliams ir ėriukams – 100 000 TV kolistino/kg kūno svorio per parą dviem po lygiai padalintomis dozėmis, t. y. 0,50 ml vaisto/10 kg kūno	Mėsai ir subproduktams – 7 paras. Kiaušiniams –

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas arba rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo dažnumas ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka
	(Barcelona) SPAIN						paras iš eilės, įmaišius į geriamąjį vandenį.	svorio per parą 3 paras iš eilės. Kiaulėms – 100 000 TV kolistino/kg kūno svorio per parą, t. y. 0,50 ml vaisto/10 kg kūno svorio per parą 3 paras iš eilės. Naminiam paukščiui – 75 000 TV/kg kūno svorio per parą, t. y. 37,5 ml vaisto 1 tonai kūno svorio per parą 3 paras iš eilės.	0 parų.
Vengrija	Divasa-Farmavic S.A. Ctra San Hipolito km 71 08503 Gurb-Vic (Barcelona) SPAIN	COLIPLUS 2,000,000 IU/ml concentrate for oral solution for use in drinking water for cattle, sheep, swine and chickens	Kolistino sulfatas	2 MTV/ml	Koncentratas geriamajam tirpalui	Veršeliai Ėriukai Kiaulės Naminiai paukščiai	Veršeliams, ėriukams, kiaulėms ir naminiam paukščiui – tris paras iš eilės, įmaišius į geriamąjį vandenį.	Veršeliams ir ėriukams – 100 000 TV kolistino/kg kūno svorio per parą dviem po lygiai padalintomis dozėmis, t. y. 0,50 ml vaisto/10 kg kūno svorio per parą 3 paras iš eilės. Kiaulėms – 100 000 TV kolistino/kg kūno svorio per parą, t. y. 0,50 ml vaisto/10 kg kūno svorio per parą 3 paras iš eilės. Naminiam paukščiui – 75 000 TV/kg kūno svorio per	Mėsai ir subproduktams – 7 paras. Kiaušiniams – 0 parų.

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas arba rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo dažnumas ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka
								parą, t. y. 37,5 ml vaisto 1 tonai kūno svorio per parą 3 paras iš eilės.	
Vengrija	Coophavet S.A.S Saint Herblion, B.P. 70089 44153 Ancenis Cedex FRANCE	Cofacoli oral solution	Kolistino sulfatas	2 MTV/ml	Geriamasis tirpalas	Galvijai (veršeliai žindukliai) Kiaulės Vištos	Veršeliams, kiaulėms – 0,25 ml vaisto/10 kg kūno svorio per parą 3– 4 paras. Mėsinėms vištoms, vištoms dedeklėms – 37,5 ml vaisto 1 tonai gyvo svorio, ištirpdžius geriamajame vandenyje – 3 paras.	Veršeliams, kiaulėms – 50 000 TV/kg kūno svorio. Viščiukams broileriams, vištoms dedeklėms – 75 000 TV/kg kūno svorio per parą.	Veršienai – 3 paras. Kiaulienai – 2 paras. Mėsinėms vištoms ir vištoms dedeklėms – 2 paras. Kiaušiniams – 0 parų.

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas arba rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo dažnumas ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka
Airija	Ceva Santé Animale Zone Industrielle La Ballastiere B.P. 126 33500 Libourne FRANCE	COLISCOUR 2 000 000 IU/ml, concentrate for oral solution, pigs, poultry	Kolistino sulfatas	2 MTV/ml	Koncentratas geriamajam tirpalui	Kiaulės Naminiai paukščiai	Kasdien tris paras iš eilės. Skirtas gerti įmaišius į geriamąjį vandenį.	Kiaulėms – 100 000 TV kolistino/kg kūno svorio per parą, t. y. 0,50 ml vaisto/10 kg kūno svorio per parą. Naminiams paukščiams – 75 000 TV/kg kūno svorio per parą, t. y. 37,5 ml vaisto 1 tonai kūno svorio per parą.	Kiaulienai ir jos subproduktams – 1 para. Broileriams, vištomis dedeklėms ir jų subproduktams – 1 para. Kitai paukštienai ir jos subproduktams – 7 paras. Kiaušiniams – 0 parų.
Italija	Divasa-Farmavic S.A. Ctra San Hipolito km 71 08503 Gurb-Vic (Barcelona) SPAIN	COLIPLUS 2,000,000 IU/ml concentrate for oral solution for use in drinking water for cattle, sheep,	Kolistino sulfatas	2 MTV/ml	Koncentratas geriamajam tirpalui	Veršeliai Ėriukai Kiaulės Naminiai paukščiai	Veršeliams, ėriukams, kiaulėms ir naminiams paukščiams – tris paras iš eilės, įmaišius į geriamąjį vandenį.	Veršeliams ir ėriukams – 100 000 TV kolistino/kg kūno svorio per parą dviem po lygiai padalintomis dozėmis, t. y. 0,50 ml vaisto/10 kg kūno svorio per parą 3 paras iš eilės. Kiaulėms – 100 000 TV kolistino/kg kūno svorio per parą, t. y. 0,50 ml	Veršienai, ėrienai ir jų subproduktams – 7 paras. Kiaulienai ir jos subproduktams – 1 para.

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas arba rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo dažnumas ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka
		swine and chickens						vaisto/10 kg kūno svorio per parą 3 paras iš eilės. Naminiam paukščiui – 75 000 TV/kg kūno svorio per parą, t. y. 37,5 ml vaisto 1 tonai kūno svorio per parą 3 paras iš eilės.	Broileriams ir vištoms dedeklėms – 1 para. Kiaušiniams – 0 parų. Kitai paukštienai ir jos subproduktams – 7 paras. Kiaušiniams – 0 parų.
Latvija	Ceva Santé Animale Zone Industrielle La Ballastiere B.P. 126 33500 Libourne FRANCE	Colivet oral solution	Kolistino sulfatas	2 MTV/ml	Geriamasis tirpalas	Kiaulės Naminiai paukščiai	Gerti. Įmaišomas į geriamąjį vandenį ar pieno pakaitalą arba girdomas tiesiai gyvūnui į burną. Du kartus per parą 3–5 paras iš eilės.	Vištoms – 75 000 TV/kg kūno svorio per parą (0,37 ml Colivet/10 kg du kartus per parą) Kiaulėms – 50 000 TV kolistino/kg du kartus per parą (0,25 ml Colivet/10 kg du kartus per parą).	Valgomiems audiniams – 1 para. Kiaušiniams – 1 para.
Lietuva	Ceva Santé Animale Zone Industrielle La Ballastiere B.P. 126	COLIVET SOLUTION, geriamasis tirpalas	Kolistino sulfatas	2 MTV/ml	Geriamasis tirpalas	Kiaulės Naminiai paukščiai	Su geriamuoju vandeniu ar pieno milteliais. Skirtas gerti	Kiaulėms – 50 000 TV kolistino/kg kūno svorio, t. y. 0,25 ml Colivet tirpalo/10 kg kūno svorio du kartus per parą	Mėsai – 1 para. Paukštienai ir kiaušiniams – 1

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas arba rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo dažnumas ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka
	33500 Libourne FRANCE						įmaišius į geriamąjį vandenį.	3–5 paras iš eilės. Naminiam paukščiui – 75 000 TV/kg kūno svorio per parą, t. y. maždaug 0,37 ml Colivet tirpalo/10 kg kūno svorio per parą 3–5 paras iš eilės.	para.
Lietuva	Divasa-Farmavic S.A. Ctra San Hipolito km 71 08503 Gurb-Vic (Barcelona) SPAIN	Colistop, geriamasis tirpalas	Kolistino sulfatas	2 MTV/ml	Geriamasis tirpalas	Kiaulės Naminiai paukščiai (viščiukai broileriai)	Skirtas gerti, paprastai įmaišius į geriamąjį vandenį. 3 paras iš eilės.	Kiaulėms – 102 500 TV/kg kūno svorio kas 12 valandų 3 paras (atitinka 0,5 ml Colistop geriamojo tirpalo/10 kg kūno svorio kas 12 valandų 3 paras iš eilės). Viščiukams broileriams – 123 000 TV/kg kūno svorio per parą 3 paras (atitinka 0,06 ml Colistop geriamojo tirpalo/kg kūno svorio per parą 3 paras iš eilės).	Penimoms kiaulėms – 2 paras. Viščiukams broileriams – 7 paras.
Lietuva	Divasa-Farmavic S.A. Ctra San Hipolito km 71 08503 Gurb-Vic (Barcelona) SPAIN	COLIPLUS 2,000,000 IU/ml concentrate for oral solution for use in drinking water for	Kolistino sulfatas	2 MTV/ml	Koncentratas geriamajam tirpalui	Veršeliai Ėriukai Kiaulės Naminiai paukščiai	Veršeliams, ėriukams, kiaulėms ir naminiam paukščiui – tris paras iš eilės, įmaišius į geriamąjį vandenį.	Veršeliams ir ėriukams – 100 000 TV kolistino/kg kūno svorio per parą dviem po lygiai padalintomis dozėmis, t. y. 0,50 ml vaisto/10 kg kūno svorio per parą 3 paras iš eilės. Kiaulėms – 100 000 TV	Veršienai, ėrienai ir jų subproduktams – 7 paras. Kiaulienai ir jos subproduktams – 1 para.

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas arba rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo dažnumas ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka
		cattle, sheep, swine and chickens						kolistino/kg kūno svorio per parą, t. y. 0,50 ml vaisto/10 kg kūno svorio per parą 3 paras iš eilės. Naminiam paukščiui – 75 000 TV/kg kūno svorio per parą, t. y. 37,5 ml vaisto 1 tonai kūno svorio per parą 3 paras iš eilės.	Broileriams ir vištoms dedeklėms – 1 para. Kiaušiniams – 0 parų. Kitai paukštiesiui ir jos subproduktams – 7 paras. Kiaušiniams – 0 parų.
Lenkija	Ceva Santé Animale Zone Industrielle La Ballastiere B.P. 126 33500 Libourne FRANCE	Colivet solution	Kolistino sulfatas	2 MTV/ml	Geriamasis tirpalas	Kiaulės Vištos	Gerti įmaišius į geriamąjį vandenį ar pieną 3–5 paras.	Vištoms – 75 000 TV kolistino/1 kg kūno svorio per parą 3–5 paras (0,37 ml vaisto/10 kg kūno svorio du kartus per parą 3–5 paras). Kiaulėms – 50 000 TV kolistino/1 kg kūno svorio per parą 3–5 paras (0,25 ml vaisto/10 kg kūno svorio du	Mėsai ir subproduktams – 1 para. Kiaušiniams – 1 para.

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas arba rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo dažnumas ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka
								kartus per parą 3–5 paras).	
Lenkija	DIVASA - FARMAVIC, S.A. Ctra. Sant Hipòlit, km 71 08503 GURB - VIC (Barcelona) Spain	Coliplus 2,000,000 IU/ml Concentrate for oral solution for use in drinking water for Cattle, Sheep, Swine and Chickens	Kolistinas (kaip kolistino sulfatas)	2 MTV/ml	Koncentratas geriamajam tirpalui, skirtas įmaišyti į geriamąjį vandenį	Galvijai (veršeliai), avys (ėriukai), kiaulės ir vištos	Veršeliams, ėriukams, kiaulėms ir naminiams paukščiams – tris paras iš eilės, įmaišius į geriamąjį vandenį.	Veršeliams ir ėriukams – 100 000 TV kolistino/kg kūno svorio per parą dviem po lygiai padalintomis dozėmis, t. y. 0,50 ml vaisto/10 kg kūno svorio per parą 3 paras iš eilės. Kiaulėms – 100 000 TV kolistino/kg kūno svorio per parą, t. y. 0,50 ml vaisto/10 kg kūno svorio per parą 3 paras iš eilės. Naminiams paukščiams – 75 000 TV/kg kūno svorio per parą, t. y. 37,5 ml vaisto 1 tonai kūno svorio per parą 3 paras iš eilės.	Mėsai ir subproduktams – 7 paras. Kiaušiniams – 0 parų. Vaisto negalima skirti gyvūnams, kurių pienas naudojamas žmonių maistui.

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas arba rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo dažnumas ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka
Portugalija	Ceva Saúde Animal - Produtos Farmacêuticos e Farmacológicos, Lda Rua Doutor António Loureiro Borges, 9/9A - 9ºA Miraflores 1495-131 Algés PORTUGAL	Colivet 2 000 000 UI /ml, concentrate for oral solution for pigs and birds	Kolistino sulfatas	2 MTV/ml	Koncentratas geriamajam tirpalui	Kiaulės Naminiai paukščiai	3 paros.	Kiaulėms – 100 000 TV/kg kūno svorio per parą. Paukščiams – 75 000 TV/kg kūno svorio per parą.	Kiaulienai ir jos subproduktams – 1 para Broileriams ir vištom dedeklėms – 1 para. Kitai paukštienai – 7 paros. Kiaušiniams – 0 parų.
Portugalija	Divasa-Farmavic S.A. Ctra San Hipolito km 71 08503 Gurb-Vic (Barcelona) SPAIN	COLIPLUS 2,000,000 IU/ml concentrate for oral solution for use in drinking water for cattle, sheep, swine and chickens	Kolistino sulfatas	2 MTV/ml	Koncentratas geriamajam tirpalui	Veršeliai Ėriukai Kiaulės Naminiai paukščiai	Veršeliams, ėriukams, kiaulėms ir naminiams paukščiams – tris paras iš eilės, įmaišius į geriamąjį vandenį.	Veršeliams ir ėriukams – 100 000 TV kolistino/kg kūno svorio per parą dviem po lygiai padalintomis dozėmis, t. y. 0,50 ml vaisto/10 kg kūno svorio per parą 3 paras iš eilės. Kiaulėms – 100 000 TV kolistino/kg kūno svorio per parą, t. y. 0,50 ml vaisto/10 kg kūno svorio per parą 3 paras iš eilės.	Veršienai, ėrienai ir jų subproduktams – 7 paros. Kiaulienai ir jos subproduktams – 1 para. Broileriams ir vištom dedeklėms – 1

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas arba rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo dažnumas ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka
								Naminiam paukščiui – 75 000 TV/kg kūno svorio per parą, t. y. 37,5 ml vaisto 1 tonai kūno svorio per parą 3 paras iš eilės.	para. Kiaušiniams – 0 parų. Kitai paukštienai ir jos subproduktams – 7 paras. Kiaušiniams – 0 parų.
Rumunija	CENAVISA, S.A. Camí Pedra Estela S/N 43205 Reus SPAIN	ENTEROBAS SOLUCION	Kolistino sulfatas	2 MTV/ml	Geriamasis tirpalas	Veršeliai Kiaulės Naminiai paukščiai	Skirtas gerti (įmaišius į geriamąjį vandenį ar pieno pakaitalą) Gydymo trukmė – 4–5 paras.	Veršeliams ir kiaulėms – 100 000 TV /kg kūno svorio per parą atitinka 0,5 ml/10 kg kūno svorio per parą. Naminiam paukščiui – 100 000 TV /kg kūno svorio per parą atitinka 0,5 ml vienam litrai geriamojo vandens per parą.	Veršienai – 2 paras. Kiaulienai – 5 paras. Paukštienai – 3 paras. Kiaušiniai – vaisto negalima skirti gyvūnams, kurių kiaušiniai naudojami žmonių maistui.

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas arba rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo dažnumas ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka
Rumunija	CEVA SANTE ANIMALE ROMANIA SRL 5 Chindiei , sector 4 040185 Bucharest ROMANIA	COLIVET SOLUTION	Kolistino sulfatas	2 MTV/ml	Geriamasis tirpalas	Kiaulės Naminiai paukščiai	Skirtas gerti (įmaišius į geriamąjį vandenį) Gydymo trukmė – 3 paras iš eilės.	Kiaulėms – 100 000 TV kolistino (kaip sulfato)/ 1 kg kūno svorio per parą dviem po lygiai padalintomis dozėmis, t. y. 0,50 ml vaisto/10 kg kūno svorio per parą dviem po lygiai padalintomis dozėmis. Naminiams paukščiams – 75 000 TV kolistino/1 kg kūno svorio per parą, t. y. 37,5 ml vaisto 1 kūno svorio tonai per parą.	Kiaulienai ir jos subproduktams – 1 para. Broileriams ir vištoms dedeklėms – 1 para. Kiaušiniams – 0 parų.
Rumunija	Divasa-Farmavic S.A. Ctra San Hipolito km 71 08503 Gurb-Vic (Barcelona) SPAIN	COLIPLUS 2,000,000 IU/ml concentrate for oral solution for use in drinking water for cattle, sheep, swine and chickens	Kolistino sulfatas	2 MTV/ml	Koncentratas geriamajam tirpalui	Veršeliai Ėriukai Kiaulės Naminiai paukščiai	Veršeliams, ėriukams, kiaulėms ir naminiams paukščiams – tris paras iš eilės, įmaišius į geriamąjį vandenį.	Veršeliams ir ėriukams – 100 000 TV kolistino/kg kūno svorio per parą dviem po lygiai padalintomis dozėmis, t. y. 0,50 ml vaisto/10 kg kūno svorio per parą 3 paras iš eilės. Kiaulėms – 100 000 TV kolistino/kg kūno svorio per parą, t. y. 0,50 ml vaisto/10 kg kūno svorio per parą 3 paras iš eilės. Naminiams paukščiams – 75 000 TV/kg kūno svorio per	Mėsai ir subproduktams – 7 paras. Kiaušiniams – 0 parų.

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas arba rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo dažnumas ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka
								parą, t. y. 37,5 ml vaisto 1 tonai kūno svorio per parą 3 paras iš eilės.	
Rumunija	Divasa-Farmavic S.A. Ctra San Hipolito km 71 08503 Gurb-Vic (Barcelona) SPAIN	COLIPLUS SOLUTION	Kolistino sulfatas	2 MTV/ml	Geriamasis tirpalas	Kiaulės Broileriai	Skirtas gerti (įmaišius į geriamąjį vandenį) Gydymo trukmė – 3 paras.	Naminiam paukščiui – 0,03 ml/kg kūno svorio per parą. Kiaulėms – 0,5 ml/10 kg kūno svorio kas 12 valandų.	Mėsai – 9 paras.
Rumunija	Franvet Zone industrielle d'Etriche Route d'Avire, BP 103 49500 Segré Cedex FRANCE	MILICOLI	Kolistino sulfatas	2 MTV/ml	Geriamasis tirpalas	Veršeliai Ėriukai Kiaulės Naminiai paukščiai	Skirtas gerti (įmaišius į geriamąjį vandenį ar pieno pakaitalą). Gydymo trukmė – 3–4 paras.	Veršeliams, kiaulėms ir ėriukams – 50 000 TV/kg kūno svorio arba 0,25 ml vaisto/10 kg kūno svorio. Naminiam paukščiui – 75,000 TV/kg per parą arba 0,25 ml 1 litrui vandens.	Mėsai ir subproduktams – 7 paras. Kiaušiniams – 0 parų.
Rumunija	S.C. CRIDA PHARM S.R.L. Str. Stadionului nr. 1 Oltenita ROMANIA	COLICRID	Kolistino sulfatas	2 MTV/ml	Geriamasis tirpalas	Kiaulės Naminiai paukščiai	Skirtas gerti (įmaišius į geriamąjį vandenį) Gydymo trukmė – 3–5 paras.	Kiaulėms – 100 000 TV kolistino sulfato/1 kg kūno svorio per parą, t. y. 0,05 ml vaisto/1 kg kūno svorio per parą. Naminiam paukščiui – 100 000 TV kolistino sulfato/1 kg kūno svorio per parą, t. y. 0,05 ml vaisto/1 kg	Kiaulienai – 7 paras. Paukštienai – 3 paras.

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas arba rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo dažnumas ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka
								kūno svorio per parą.	
Rumunija	Sogeval Zone Industrielle des Touches 200, avenue de Mayenne B.P. 2227 53022 Laval Cedex 9 FRANCE	SOGECOLI	Kolistino sulfatas	2 MTV/ml	Geriamasis tirpalas	Veršeliai Ėriukai Naminiai paukščiai	Skirtas gerti. Gydymo trukmė – 3–4 paros.	Veršeliams, ėriukams – 50 000 TV/kg kūno svorio arba 0,25 ml vaisto/10 kg kūno svorio du kartus per parą – ryte ir vakare. Naminiams paukščiams – 75 000 TV/kg kūno svorio kasdien arba 0,25 ml 1 litrui vandens.	Mėsai – 7 paros.
Slovakija	Ceva Animal Health Slovakia, spol. s.r.o. Račianska 77 831 02 Bratislava SLOVAK REPUBLIC	COLIVET sol. ad us.vet.	Kolistino sulfatas	2 MTV/ml	Geriamasis tirpalas	Kiaulės Vištos	3–5 paras, įmaišyti į geriamąjį vandenį ar pieną arba girdyti tiesiai gyvūnui į burną.	Kiaulėms – 50 000 TV kolistino sulfato/kg kūno svorio (0,25 ml vaisto/10 kg kūno svorio) (du kartus). Vištoms – 75 000 TV kolistino sulfato/kg kūno svorio (0,37 ml vaisto/10 kg kūno svorio).	Mėsai – 1 para. Kiaušiniams – 1 para.
Slovakija	Divasa-Farmavic S.A. Ctra San Hipolito km 71 08503 Gurb-Vic (Barcelona) SPAIN	COLIPLUS 2 000 000 IU/ml koncentratas na perorálny roztok na použitie v pitnej vode pre hovädzí	Kolistino sulfatas	2 MTV/ml	Koncentratas geriamajam tirpalui	Veršeliai Ėriukai Kiaulės Naminiai paukščiai	Veršeliams, ėriukams, kiaulėms ir naminiams paukščiams – tris paras iš eilės, įmaišius į geriamąjį vandenį.	Veršeliams ir ėriukams – 100 000 TV kolistino/kg kūno svorio per parą dviem po lygiai padalintomis dozėmis, t. y. 0,50 ml vaisto/10 kg kūno svorio per parą 3 paras iš eilės. Kiaulėms – 100 000 TV kolistino/kg kūno svorio per	Veršienai, ėrienai ir jų subproduktams – 7 paros. Kiaulienai ir jos subproduktams – 1 para.

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas arba rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo dažnumas ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka
		dobytok, ovce, ošipané a kurčatá						parą, t. y. 0,50 ml vaisto/10 kg kūno svorio per parą 3 paras iš eilės. Naminiam paukščiui – 75 000 TV/kg kūno svorio per parą, t. y. 37,5 ml vaisto 1 tonai kūno svorio per parą 3 paras iš eilės.	Broileriams ir vištom dedeklėms – 1 para. Kiaušiniams – 0 parų. Kitai paukštienai ir jos subproduktams – 0 parų.
Ispanija	CEVA SALUD ANIMAL, S.A. Carabela La Niña nº 12 5ª planta 08017 Barcelona SPAIN	COLIVET 2,000,000 UI/ML	Kolistino sulfatas	2 MTV/ml	Geriamasis tirpalas	Kiaulės Paukščiai	3 paras. Gerti.	Kiaulėms – 100 000 TV/kg kūno svorio. Paukščiui – 75 000 TV/kg kūno svorio.	1 para
Ispanija	Divasa-Farmavic S.A. Ctra San Hipolito km 71 08503 Gurb-Vic (Barcelona) SPAIN	COLIPLUS SOLUCION	Kolistino sulfatas	2 MTV/ml	Geriamasis tirpalas	Kiaulės Paukščiai (vištos)	3 paras. Gerti.	Kiaulėms – 102 000 TV/kg kūno svorio per 12 valandų. Paukščiui – 75 000 TV/kg kūno svorio per 12 valandų.	Kiaulienai – 2 paras. Paukštienai – 7 paras.

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas arba rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo dažnumas ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka
Ispanija	Divasa-Farmavic S.A. Ctra San Hipolito km 71 08503 Gurb-Vic (Barcelona) SPAIN	COLISTINA DIVASA 2,000,000 IU/ml concentrate for oral solution for use in drinking water for cattle, sheep, swine and chickens	Kolistino sulfatas	2 MTV/ml	Koncentratas geriamajam tirpalui	Veršeliai Ėriukai Kiaulės Naminiai paukščiai	Veršeliams, ėriukams, kiaulėms ir naminiams paukščiams – tris paras iš eilės, įmaišius į geriamąjį vandenį.	Veršeliams ir ėriukams – 100 000 TV kolistino/kg kūno svorio per parą dviem po lygiai padalintomis dozėmis, t. y. 0,50 ml vaisto/10 kg kūno svorio per parą 3 paras iš eilės. Kiaulėms – 100 000 TV kolistino/kg kūno svorio per parą, t. y. 0,50 ml vaisto/10 kg kūno svorio per parą 3 paras iš eilės. Naminiams paukščiams – 75 000 TV/kg kūno svorio per parą, t. y. 37,5 ml vaisto 1 tonai kūno svorio per parą 3 paras iš eilės.	Mėsai – 7 paras. Kiaušiniams – 0 parų.
Nyderlandai	Divasa-Farmavic S.A. Ctra San Hipolito km 71 08503 Gurb-Vic (Barcelona) SPAIN	COLIPLUS 2,000,000 IU/ml concentrate for oral solution for use in drinking water for cattle, sheep,	Kolistino sulfatas	2 MTV/ml	Koncentratas geriamajam tirpalui	Veršeliai Ėriukai Kiaulės Naminiai paukščiai	Veršeliams, ėriukams, kiaulėms ir naminiams paukščiams – tris paras iš eilės, įmaišius į geriamąjį vandenį.	Veršeliams ir ėriukams – 100 000 TV kolistino/kg kūno svorio per parą dviem po lygiai padalintomis dozėmis, t. y. 0,50 ml vaisto/10 kg kūno svorio per parą 3 paras iš eilės. Kiaulėms – 100 000 TV kolistino/kg kūno svorio per	Mėsai – 7 paras. Kiaušiniams – 0 parų.

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas arba rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo dažnumas ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka
		swine and chickens						parą, t. y. 0,50 ml vaisto/10 kg kūno svorio per parą 3 paras iš eilės. Naminiam paukščiui – 75 000 TV/kg kūno svorio per parą, t. y. 37,5 ml vaisto 1 tonai kūno svorio per parą 3 paras iš eilės.	
Jungtinė Karalystė	Ceva Animal Health Ltd 90 The Broadway Chesham Buckinghamshire HP5 1EG UNITED KINGDOM	Colibird	Kolistino sulfatas	2 MTV/ml	Koncentratas geriamajam tirpalui	Naminiai paukščiai	Tris paras iš eilės, įmaišius į geriamąjį vandenį.	75 000 TV/kg kūno svorio per parą.	Mėsai – 7 paras. Kiaušiniams – 0 parų.
Jungtinė Karalystė	Ceva Animal Health Ltd 90 The Broadway Chesham Buckinghamshire HP5 1EG UNITED KINGDOM	Coliscour, oral solution of colistin sulphate 2 MIU/ml	Kolistino sulfatas	2 MTV/ml	Koncentratas geriamajam tirpalui	Kiaulės	Du kartus per parą penkias paras iš eilės (įmaišyti į geriamąjį vandenį arba girdyti tiesiai gyvūnui į burną).	50 000 TV/kg kūno svorio du kartus per parą.	Mėsai ir subproduktams – 1 para.

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas arba rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo dažnumas ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka
Jungtinė Karalystė	Divasa-Farmavic S.A. Ctra San Hipolito km 71 08503 Gurb-Vic (Barcelona) SPAIN	Coliplus 2,000,000 IU/ml Concentrate for Oral Solution for use in drinking water for Cattle, Sheep, Swine and Chickens	Kolistino sulfatas	2 MTV/ml	Koncentratas geriamajam tirpalui	Veršeliai Ėriukai Kiaulės Naminiai paukščiai	Veršeliams, ėriukams, kiaulėms ir naminiams paukščiams – tris paras iš eilės, įmaišius į geriamąjį vandenį.	Veršeliams ir ėriukams – 100 000 TV kolistino/kg kūno svorio per parą dviem po lygiai padalintomis dozėmis, t. y. 0,50 ml vaisto/10 kg kūno svorio per parą 3 paras iš eilės. Kiaulėms – 100 000 TV kolistino/kg kūno svorio per parą, t. y. 0,50 ml vaisto/10 kg kūno svorio per parą 3 paras iš eilės. Naminiams paukščiams – 75 000 TV/kg kūno svorio per parą, t. y. 37,5 ml vaisto 1 tonai kūno svorio per parą 3 paras iš eilės.	Mėsai – 7 paras. Kiaušiniams – 0 parų.

II PRIEDAS

MOKSLINĖS IŠVADOS IR PAGRINDAS KEISTI VETERINARINIO VAISTO APRAŠĄ

BENDRA VETERINARINIO VAISTO FORMULIŲ, KURIŲ SUDĖTYJE YRA 2 000 000 TV/ML KOLISTINO SULFATO IR KURIOS SKIRTOS VERŠELIAMS, ĖRIUKAMS, KIAULĖMS IR NAMINIAMS PAUKŠČIAMS GYDYTI ĮMAIŠIUS Į GERIAMĄJĮ VANDENĮ, MOKSLINIO ĮVERTINIMO SANTRAUKA

1. Įvadas

Veterinarinio vaisto formulės, kurių sudėtyje yra 2 000 000 TV/ml kolistino sulfato ir kurios skirtos įmaišyti veršeliams, kiaulėms, ėriukams ir naminiams paukščiams į geriamąjį vandenį, naudojamos kolistinui jautrių *Escherichia coli* ir *Salmonella spp* sukeltoms virškinimo trakto infekcijoms gydyti.

Kolistino sulfatas yra polipeptidinis polimiksinų grupės antibiotikas. Ši antibiotikų grupė turi polipeptidinę struktūrą, kuri iš esmės veikia baktericidiškai ir turi vidutinį antibakterinį veikimo spektrą, apimančią tik gramneigiamus mikroorganizmus.

Jungtinė Karalystė išreiškė susirūpinimą, kad veterinarinio vaisto formulių, kurių sudėtyje yra 2 000 000 TV/ml kolistino ir kurios skirtos visų rūšių maistui auginamiems gyvūnams gydyti įmaišius į geriamąjį vandenį, dozavimo ir išlaukos laikotarpių skirtumai Europos Sąjungoje gali kelti rimtą pavojų visuomenės ir gyvūnų sveikatai.

Procedūra susijusi su 47 veterinariniais vaistais, kurių rinkodaros teisės skirtingose Europos Sąjungos valstybėse narėse jau suteiktos arba laukiama, kol jos bus suteiktos (žr. I priedą).

2. Turimų duomenų aptarimas

Pareiškėjų ir rinkodaros teisės turėtojų pateikti duomenys parodė, kad minėtų veterinarinių vaistų rinkodaros teisės jau suteiktos arba laukiama, kol jos bus suteiktos, taikant įvairias rinkodaros teisės suteikimo procedūras (savitarpio pripažinimo arba nacionalines procedūras) ir remiantis įvairiais teisiniais pagrindais (pilnu ir generiniu).

Pastebėta, kad kai kurie pateikti duomenys visiškai sutapo, nors juos pateikė skirtingi pareiškėjai ir rinkodaros teisės turėtojai. Pateiktus duomenų rinkinius sudaro viešai prieinami bibliografiniai duomenys ir privatūs duomenys.

Dėl veiksmingumo gydant kiaules ikiklinikiniai duomenys atskleidė, kad kolistino sulfato dozės dydis ir intervalas tarp dozių kiaulėms parinktas atlikus farmakokinetikos ir farmakodinamikos (FK/FD) analizę. Pastebėta, kad analizė, paremta kolistino sulfato koncentracijos virškinimo trakte nustatymo po skirtingų dozių duomenimis ir iš penkių valstybių narių surinktais mažiausių *E. coli* padermių augimą slopinančių koncentracijų (MIC) duomenimis, kelia abejonių, nes vietinio poveikio virškinimo trakte surogatinis rezultatas C_{max}/MIC nebuvo patikrintas, ir nežinoma, kokia aktyviojo junginio dalis pateko į išmatas. Tai pasakius prieita prie bendros nuomonės, kad siūloma 50 000 TV vienam kūno svorio kilogramui dozė du kartus per parą yra pagrįsta. Ši dozė – tai rekomenduojama dozė daugumos į kreipimąsi įtrauktų vaistų atveju, todėl ji kliniškai taikoma jau daug metų. Kai kurių susijusių vaistų atveju buvo rekomenduojamas 5–7 parų gydymo laikotarpis, dėl kurio nuspręsta, kad, atsižvelgiant į tikslą pasiekti optimalią pusiausvyrą tarp bakterijų išnaikinimo greičio ir atsparumo išsivystymo rizikos, šis laikotarpis per ilgas. Kai kurių susijusių vaistų atveju rekomenduojamas gydymo laikotarpis buvo 3–5 paros.

Dėl veiksmingumo gydant vištas pateikta tyrimo ataskaita iš viešosios literatūros, kurioje nurodoma, kad *E. coli* sukeltos infekcijos gydytos į pašarą įmaišytu kolistino sulfatu. Šiuose tyrimuose pateikiama pakankamai įrodymų, kad vaistą galima naudoti kolibaciloze sergančioms vištoms gydyti, nors juose nurodytų į pašarą dedamų dozių ir kreipimesi daugumos vaistų atveju rekomenduotos dozės atitikimas nebuvo pakankamai pagrįstas.

Dėl neinvazinių *E. coli* sukeltų veršelių ir ėriukų virškinimo trakto infekcijų indikacijai pagrįsti pateikti duomenys buvo nepakankami. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad medžiaga plačiai vartojama šioms gyvūnų rūšims gydyti, ir tai, kad negauta jokios naujos informacijos apie naują riziką, susijusią su nepakankamu veiksmingumu ar grėsme žmonių sveikatai dėl kolistino vartojimo gydant veršelius ir ėriukus, Komitetas nusprendė, kad galima toliau naudoti kolistiną veršeliams ir ėriukams, sergantiems neinvazinių *E. coli* sukeltomis virškinimo trakto infekcijomis, gydyti. Šiuo metu rekomenduojama dozė visuose patvirtintuose veršeliams ir ėriukams skirtuose vaistuose – suderinta 100 000 TV kolistino vienam kūno svorio kilogramui dozė kasdien. Dažniausiai šiuo metu rekomenduojama gydymo veršeliams ir ėriukams skirtais vaistais trukmė – 3 paros. Dviejų vaistų atveju rekomenduojama gydymo trukmė buvo 3–4 paros iš eilės.

Veršelių, ėriukų, kiaulių ir naminių paukščių, sergančių *Salmonella* spp. infekcija, gydymo indikacijai, kuri šiuo metu patvirtinta į procedūros taikymo sritį patenkantiems vaistams, pagrįsti klinikinių duomenų nepateikta arba pateikta labai mažai. Pateikti klinikiniai vištų, sergančių salmonelioze, gydymo duomenys buvo neįtikinami, taigi šios medžiagos tinkamumas *Salmonella* infekcijoms gydyti kelia abejonių. Dėl blogos absorbcijos žarnyne kolistinas būtų veiksmingas tik prieš neinvazines *Salmonella* bakterijas. Be to, Komitetas pastebėjo, kad subklinikinės salmoneliozės gydymas siekiant sumažinti bakterijų skaičių gali sutrukdyti įgyvendinti šios ligos kontrolės programas¹. Komitetas manė, jog tai, kad pareiškėjai ir rinkodaros teisės turėtojai nepateikė jokių duomenų ar argumentų teiginiui, kad vaistas tinkamas vartoti gydant *Salmonella* infekciją, pagrįsti, gali kelti riziką visuomenės ir gyvūnų sveikatai, nes, pritaikius šį gydymą, bakterijas gali būti sunku aptikti visiškai nepašalinus infekcijos ir kolonizacijos. Dėl visiško arba dalinio neveiksmingumo zoonozinių mikroorganizmų gali likti gydomų gyvūnų organizme ir aplinkoje, ir dėl nesėkmingo gydymo bus sunkiau visiškai juos išnaikinti.

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad tvirtų išvadų dėl antimikrobinio atsparumo kolistinui neįmanoma buvo padaryti dėl naudojimo duomenų nebuvimo. Tačiau, kadangi kolistinas patvirtintas jau daugelį metų ir atsparumas jam iki šiol liko nedidelis, CVMP nuomone, turimos informacijos pakako padaryti išvada, kad atsparumas greičiausiai netaps nauja problema. Pareiškėjų ir rinkodaros teisės turėtojų gausiai pateikti duomenys apie mažiausią slopinamąją koncentraciją, apimantys laikotarpį, kurio metu buvo kliniškai naudojamas kolistino sulfatas, gana aiškiai rodo, kad šios medžiagos atveju atsparumo išsivystymo problemos nebuvo.

Trumpai tariant, CVMP nuomone, pateiktos informacijos pakako, kad būtų pagrįsta virškinimo trakto infekcijų, sukeltų kolistinui jautrių neinvazinių *E. coli*, gydymo indikacija 3–5 paras iš eilės kasdien skiriant 100 000 TV kolistino vienam kūno svorio kilogramui dozę veršeliams, ėriukams ir kiaulėms ir 75 000 TV kolistino vienam kūno svorio kilogramui dozę naminiams paukščiams. Dėl kolistinui jautrių neinvazinių *E. coli* paskirties gyvūnams sukeltų virškinimo trakto infekcijų gydymo trukmės pabrėžta, kad gydymo poveikį lengva stebėti, todėl gydymo trukmę galima koreguoti atsižvelgiant į ligos eigą.

Nustatyti išlaukos laikotarpiai valstybėse narėse svyravo nuo 1 iki 9 parų. Siekdami pagrįsti nustatytus išlaukos laikotarpius pareiškėjai ir rinkodaros teisės turėtojai pateikė aštuonis su veršeliais, vištomis ir kiaulėmis atliktus likučių išnykimo tyrimus. Pateikti likučių išnykimo tyrimai buvo peržiūrėti ir, remiantis rekomenduojamu dozavimu galvijams (100 000 TV kolistino vienam kūno svorio kilogramui kasdien 3–5 paras iš eilės) ir siūlomu suderintu dozavimu kiaulėms ir naminiams paukščiams (100 000 TV kolistino vienam kūno svorio kilogramui kasdien kiaulėms ir 75 000 TV kolistino vienam kūno svorio kilogramui kasdien naminiams paukščiams 3–5 paras iš eilės), išlaukos laikotarpiai veršeliams, kiaulėms ir vištoms buvo perskaičiuoti taikant alternatyvų metodą². Trumpai tariant vienos paros išlaukos laikotarpiai valgomiems veršelių, kiaulių ir vištų audiniams ir subproduktams laikomi pagrįstais.

Nepateikta likučių išnykimo tyrimų su ėriukais ir naminiais paukščiais, išskyrus vištas. Dabartiniuose veterinarinio vaisto aprašuose šioms gyvūnų rūšims nustatyti 7 parų išlaukos laikotarpiai. Atsižvelgdamas į plačiai žinomą faktą, kad medžiaga blogai absorbuojama iš virškinimo trakto, Komitetas nusprendė, kad veršeliams, kiaulėms ir vištoms rekomenduotas vienos paros išlaukos laikotarpis taip pat gali būti taikomas ir ėriukams bei naminiams paukščiams, išskyrus vištas.

3. Naudos ir rizikos vertinimas

Nors manyta, kad pateikti duomenys buvo blogos kokybės, o kai kuriais atvejais – nepakankami, todėl jų nepakako kai kurioms indikacijoms pagrįsti, Komitetas nusprendė, jog dokumentais pagrįstų įrodymų pakako, kad būtų įrodytas kolistino sulfato veiksmingumas gydant kolistinui jautrių neinvazinių *E. coli* sukeltas kiaulių virškinimo trakto infekcijas 3–5 paras iš eilės kasdien skiriant 100 000 TV kolistino vienam kūno svorio kilogramui dozę.

Dokumentais pagrįstų įrodymų taip pat pakako, kad būtų įrodytas kolistino sulfato veiksmingumas gydant kolistinui jautrių neinvazinių *E. coli* sukeltas naminių paukščių virškinimo trakto infekcijas 3–5 paras iš eilės kasdien skiriant 75 000 TV kolistino vienam kūno svorio kilogramui dozę.

¹ 2006 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1177/2006, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2160/2003 dėl reikalavimų taikyti specialius kontrolės metodus, nustatytus nacionalinėse salmonelių kontrolės naminiuose paukščiuose programose (OL L 212, 2006 8 2, p. 3) – <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:212:0003:0005:EN:PDF>

² CVMP nurodymai dėl požiūrio į išlaukos suderinimą gairių
<http://www.emea.europa.eu/pdfs/vet/swp/003695en.pdf>

Taigi nuspręsta, kad kolistino naudos ir rizikos balansas gydant kolistinui jautrių neinvazinių *E. coli* sukeltas kiaulių ir naminių paukščių virškinimo trakto infekcijas yra teigiamas, kai vaistas naudojamas laikantis minėtų dozių.

Laikoma, kad kolistino sulfatas plačiai naudojamas neinvazinių *E. coli* sukeltoms veršelių ir ėriukų infekcijoms gydyti. Atkreiptas dėmesys į tai, kad pareiškėjai ir rinkodaros teisės turėtojai nepateikė duomenų optimalios veršelių ir ėriukų, sergančių kolibaciloze, gydymo trukmės nustatymui pagrįsti. Tačiau geriamasis kolistinas gali būti naudingas gydant neinvazinių *E. coli* šioms gyvūnų rūšims sukeltas infekcijas, o gydymo šiuo vaistu poveikį lengva nustatyti klinikinėje praktikoje. Be to, nėra jokios naujos informacijos apie naują riziką, susijusią su nepakankamu veiksmingumu ar besivystančiu atsparumu, kuris keltų grėsmę visuomenės ar gyvūnų sveikatai, dėl kolistino naudojimo veršeliams ir ėriukams gydyti. Pateiktose periodiškai atnaujinamose saugumo ataskaitose nebuvo pranešta apie nepakankamą veiksmingumą vaistą naudojant pagal nurodytas indikacijas veršeliams ir ėriukams gydyti. Taigi nuspręsta, kad kolistino naudos ir rizikos balansas gydant neinvazinių *E. coli* sukeltas veršelių ir ėriukų virškinimo trakto infekcijas skiriant rekomenduojamą kasdieninę 100 000 TV kolistino vienam kūno svorio kilogramui dozę yra teigiamas. Dėl gydymo trukmės, atsižvelgdamas į tai, kad gydymo poveikį lengva stebėti, ir dėl to gydymo trukmė gali būti koreguojama atsižvelgiant į ligos eigą, Komitetas sutiko rekomenduoti suderintą 3–5 parų gydymo visais veršeliams ir ėriukams skirtais vaistais trukmę. Taip pat nurodyta, kad rekomenduojama paros dozė veršeliams, ėriukams ir kiaulėms turėtų būti padalinta į dvi dalis, jeigu vaistas gyvūnui bus girdomas tiesiai į burną.

Kita vertus, CVMP manė, jog tai, kad pareiškėjai ir rinkodaros teisės turėtojai nepateikė duomenų ar argumentų, pagrindžiančių teiginį „...*Salmonella spp.* sukeltoms virškinimo trakto infekcijoms gydyti...“, gali kelti riziką visuomenės ir gyvūnų sveikatai, nes, pritaikius šį gydymą, bakterijas gali būti sunku aptikti visiškai nepašalinus infekcijos ir kolonizacijos. Dėl visiško arba dalinio neveiksmingumo zoonozinių mikroorganizmų gali likti gydomų gyvūnų organizme (ir aplinkoje), ir dėl nesėkmingo gydymo bus sunkiau visiškai juos išnaikinti. Todėl kolistino naudos ir rizikos balansas gydant *Salmonella spp.* sukeltas veršelių, ėriukų, kiaulių ir naminių paukščių virškinimo trakto infekcijas pripažintas neigiamu.

Apsvarsčius pareiškėjų ir rinkodaros teisės turėtojų pateiktus likučių išnykimo duomenis vienos paros išlaukos laikotarpis valgomiems veršelių, kiaulių ir vištų audiniams ir subproduktams ir nulio parų išlaukos laikotarpis kiaušiniams pripažinti tinkamais. Likučių išnykimo duomenų nepateikta apie ėriukus ir naminių paukščių rūšis, išskyrus vištas. Dabartiniuose veterinarinio vaisto aprašuose šioms gyvūnų rūšims nustatyti 7 parų išlaukos laikotarpiai. Atsižvelgdamas į likučių išnykimo duomenis, pateiktus siekiant pagrįsti išlaukos laikotarpius veršeliams, kiaulėms ir vištoms, ir plačiai žinomą faktą, kad medžiaga blogai absorbuojama iš virškinimo trakto, Komitetas nusprendė, kad šioms gyvūnų rūšims galima rekomenduoti tą patį vienos paros išlaukos laikotarpį.

PAGRINDAS KEISTI VETERINARINIO VAISTO APRAŠĄ, ŽENKLINIMĄ IR INFORMACINĮ LAPELĮ

Kadangi:

- CVMP apsvarstė bendrai pateiktus duomenis ir bendras žinias apie medžiagą, sukauptas dėl jos plataus naudojimo veterinariniuose vaistuose daugiau kaip 20 metų. Komitetui įvertinti pateikti duomenys buvo prastos kokybės ir kai kuriais atvejais jų nepakako nurodytoms indikacijoms, dozėms, gydymo trukmei ar išlaukos laikotarpiams pagrįsti. Vienintelė nustatyta galimos rizikos sritis buvo nepakankamo veiksmingumo rizika invazinių padermių atveju ir galimybė, kad gydymas sutrukdytų įgyvendinti *Salmonella* kontrolės programas. Nebuvo jokių dokumentais pagrįstų įrodymų, rodančių aktyvesnį atsparumo vystymąsi, kuris keltų grėsmę žmonių ar gyvūnų sveikatai. Pateiktose periodiškai atnaujinamose saugumo ataskaitose nė vienai gyvūnų rūšiai patvirtintų indikacijų atžvilgiu nepranešta nei apie nepakankamą veiksmingumą, nei apie besivystantį atsparumą;
- CVMP nuomone, geriamasis kolistinas jau daugelį metų naudojamas neinvazinių *E. coli* sukeltoms veršelių, ėriukų, kiaulių ir naminių paukščių virškinimo trakto infekcijoms gydyti. Nors su šiuo kreipimusi susijusių klinikinių dokumentų pateikta nedaug, esami duomenys rodo, kad neinvazinių *E. coli* sukeltos veršelių, ėriukų, kiaulių ir naminių paukščių virškinimo trakto infekcijos gali būti veiksmingai gydomos 3–5 paras iš eilės kasdien skiriant 100 000 TV kolistino vienam kūno svorio kilogramui dozę veršeliams, ėriukams ir kiaulėms ir 75 000 TV kolistino vienam kūno svorio kilogramui dozę naminiams paukščiams;
- CVMP manė, kad pareiškėjai ir rinkodaros teisės turėtojai nepateikė jokių duomenų ar argumentų, pagrindžiančių teiginį „...*Salmonella spp.* sukeltoms virškinimo trakto infekcijoms gydyti...“, nei veršelių, nei ėriukų, nei kiaulių, nei naminių paukščių atžvilgiu. Nesant šių duomenų laikoma, kad toks vaisto naudojimas kelia riziką visuomenės ir gyvūnų sveikatai, nes, pritaikius šį gydymą, bakterijas gali būti sunku aptikti visiškai nepašalinus infekcijos ir kolonizacijos, ir dėl to zoonozinių mikroorganizmų gali likti gydomų gyvūnų organizme ir aplinkoje, o tada bus sunkiau visiškai juos išnaikinti. Taigi kolistino naudojimas *Salmonella* sukeltoms infekcijoms gydyti gali sutrukdyti įgyvendinti specialius *Salmonella* kontrolės metodus ir nacionalines programas;
- CVMP manė, kad vienos paros išlaukos laikotarpis yra pakankamas valgomiems veršelių, ėriukų ir kiaulių, kuriems 3–5 paras iš eilės kasdien buvo skiriama 100 000 TV kolistino vienam kūno svorio kilogramui dozė, audiniams ir subproduktams;
- CVMP manė, kad vienos paros išlaukos laikotarpis valgomiems naminių paukščių, kuriems 3–5 paras iš eilės kasdien buvo skiriama 75 000 TV kolistino vienam kūno svorio kilogramui dozė, audiniams ir subproduktams ir nulinis parų išlaukos laikotarpis kiaušiniams yra pakankamas;

CVMP rekomendavo pakeisti rinkodaros teises bei padaryti pakeitimus atitinkamuose veterinarinio vaisto aprašo, ženklavimo ir informacinio lapelio skyriuose ir kai taikytina, kaip nustatyta nuomonės dėl veterinarinio vaisto formulio, kurių sudėtyje yra 2 000 000 TV/ml kolistino ir kurios skirtos visų nuomonės I priede nurodytų rūšių maistui auginamiems gyvūnams gydyti įmaišius į geriamąjį vandenį, III priede.

III PRIEDAS
VETERINARINIO VAISTO APRAŠO, ŽENKLINIMO IR INFORMACINIO LAPELIO KEITIMAS

**PAKEITIMAI, KURIE TURI BŪTI ĮTRAUKTI Į ATITINKAMUS VETERINARINIO VAISTO APRAŠO
SKYRIUS**

4.2 Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Kolistinui jautrių neinvazinių *E. coli* sukeltoms virškinimo trakto infekcijoms gydyti.

Kur reikia, pašalinkite virškinimo trakto infekcijų gydymo indikacijas, išskyrus *E. coli*.

4.9 Dozės ir naudojimo būdas

Skirta gerti.

Veršeliams, ėriukams ir kiaulėms rekomenduojama dozė – 100 000 TV kolistino vienam kūno svorio kilogramui kasdien 3–5 paras iš eilės. Rekomenduojama paros dozė turėtų būti padalinta į dvi dalis, jeigu vaistas gyvūnui girdomas tiesiai į burną.

Naminiams paukščiams rekomenduojama dozė – 75 000 TV kolistino vienam kūno svorio kilogramui kasdien 3–5 paras iš eilės.

4.11 Išlauka

Mėsa ir subproduktai:

Veršeliams – 1 para

Ėriukams – 1 para

Kiaulėms – 1 para

Naminiams paukščiams – 1 para

Kiaušiniams – nulis parų.

PAKEITIMAI, KURIE TURI BŪTI ĮTRAUKTI Į ATITINKAMUS ŽENKLINIMO SKYRIUS

6. INDIKACIJA(-OS)

Kolistinui jautrių neinvazinių *E. coli* sukeltoms virškinimo trakto infekcijoms gydyti.

Kur reikia, pašalinkite virškinimo trakto infekcijų gydymo indikacijas, išskyrus *E. coli*.

8. IŠLAUKA

Mėsa ir subproduktai:

Veršeliams – 1 para

Ėriukams – 1 para

Kiaulėms – 1 para

Naminiams paukščiams – 1 para

Kiaušiniams – nulis parų.

**PAKEITIMAI, KURIE TURI BŪTI ĮTRAUKTI Į ATITINKAMUS INFORMACINIO LAPELIO
SKYRIUS**

4. INDIKACIJA (-OS)

Kolistinui jautrių neinvazinių *E. coli* sukeltoms virškinimo trakto infekcijoms gydyti.

Kur reikia, pašalinkite virškinimo trakto infekcijų gydymo indikacijas, išskyrus *E. coli*.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Skirta gerti.

Veršeliams, ėriukams ir kiaulėms rekomenduojama dozė – 100 000 TV kolistino vienam kūno svorio kilogramui kasdien 3–5 paras iš eilės. Rekomenduojama paros dozė turėtų būti padalinta į dvi dalis, jeigu vaistas gyvūnui girdomas tiesiai į burną.

Naminiams paukščiams rekomenduojama dozė – 75 000 TV kolistino vienam kūno svorio kilogramui kasdien 3–5 paras iš eilės.

10. IŠLAUKA

Mėsa ir subproduktai:

Veršeliams – 1 para

Ėriukams – 1 para

Kiaulėms – 1 para

Naminiams paukščiams – 1 para

Kiaušiniams – nulis parų.