

I PRIEDAS

**VETERINARIŲ VAISTŲ PAVADINIMŲ, VAISTO FORMŲ,
STIPRUMO, GYVŪNŲ RŪŠIŲ, NAUDOJIMO BŪDŲ, INDIKACIJŲ,
IŠLAUKOS LAIKOTARPIŲ, PAREIŠKĖJŲ IR RINKODAROS
TEISĖS TURĖTOJŲ VALSTYBĖSE NARĖSE SĄRAŠAS**

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka/indikacijos
Austrija	Chevita Tierarzneimittel Gesellschaft m.b.H.Kaplanstraß e 10 AT 4600 Wels AUSTRIA	Doxymax 500 mg/g - Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen für Schweine und Hühner	Doksiciklino hiklatas	500 mg/g	Geriamieji milteliai	Kiaulės, vištos (broileriai)	Vištos: 3–5 dienas, peroralinis, su geriamuoju vandeniu	Vištos: 25 mg doksiciklino hiklato/kg kūno svorio per parą = 1 g miltelių/20 kg per parą	Mėsa ir plaučkepeniai - vištos (broileriai) 5 paros, Kiaušiniai: negalima skirti kiaušinius dedančioms vištom. Indikacijos: <i>Mycoplasma spp.</i> , <i>M. gallisepticum</i> , <i>Escherichia coli</i> , sukeliama kvėpavimo takų infekcija; <i>Pasteurella multocida</i> sukeliamas kraujo užkrėtimas.
Belgija	DOPHARMA B.V. Zalmweg 24, P.O. BOX 205 4940 AE Raamsdonksveer THE NETHERLANDS	Doxycycline 50% Dopharma	Doksiciklino hiklatas	500 mg/g	Vandenyje tirpūs milteliai	Veršeliai, kiaulės, naminiai paukščiai	Naminiai paukščiai: 50 mg/kg per parą	3–5 dienas 500 g/1000 l geriamojo vandens	Mėsa ir plaučkepeniai - 6 paros. Indikacijos: mikroorganizmų sukeliamos kvėpavimo takų arba virškinimo sistemos infekcijos
Belgija	VIRBAC S.A. 1ère avenue - 2065 m - L.I.D. 06516 CARROS FRANCE	Pulmodox 50%	Doksiciklino hiklatas	500 mg/g	Vandenyje tirpūs milteliai	Veršeliai, kiaulės, naminiai paukščiai	Naminiai paukščiai: 50 mg/kg per parą	3–5 dienas 500 g/1000 l geriamojo vandens	Mėsa ir plaučkepeniai - 6 paros. Indikacijos: mikroorganizmų sukeliamos kvėpavimo takų arba virškinimo sistemos infekcijos

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka/indikacijos
Belgija	Eurovet Animal Health B.V. Handelsveg 25 PO Box 179 5530 AD Bladel THE NETHERLANDS	Soludox 50%	Doksiciklino hiklatas	500 mg/g	Vandenyje tirpūs milteliai	Kiaulės, naminiai paukščiai	Naminiai paukščiai: 10–20 mg/kg per parą	3–4 paros 100–200 g/1000 l geriamojo vandens	Mėsa ir plaučkepeniai - 3 paros/10 mg/kg, 12 parų/20 mg/kg. Indikacijos: kvėpavimo sistemos ligos.
Belgija	Eurovet Animal Health B.V. Handelsveg 25 PO Box 179 5530 AD Bladel THE NETHERLANDS	Soludox 15% ad. us. vet..	Doksiciklino hiklatas	150 mg/g	Vandenyje tirpūs milteliai	Kiaulės, veršeliai, naminiai paukščiai, dekoratyviniai paukščiai, balandžiai	Naminiai paukščiai: 10–20 mg/kg per parą	3–5 dienas 500 g/1000 l geriamojo vandens	Mėsa ir plaučkepeniai: 7 paros. Indikacijos: bakterijų sukeltos kvėpavimo sistemos ligos.
Belgija	Huvepharma N.V. Uitbreidingstraat 80 2600 Antwerpen BELGIUM	Hydrodoxx 500 mg/g water-soluble powder	Doksiciklino hiklatas	500 mg/g Doksiciklino hiklatas	Milteliai geriamajam tirpalui	Vištos (broileriai) ir kiaulės (mėsinės kiaulės)	Peroralinis (su geriamuoju vandeniu)	20 mg doksiciklino (hiklato)/kg x 3–5 dienas	Mėsa ir plaučkepeniai: vištos: 6 paros. Negalima naudoti dedantiems paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui. Indikacijos: vištos (broileriai) – <i>Mycoplasma gallisepticum</i> sukeltos lėtinės kvėpavimo ligos profilaktika ir gydymas.
Bulgarija	Farma Sis OOD 4 San Stefano Str. Dobrich BULGARIA	Doxinyl 10% Oral Suspension	Doksiciklino hiklatas	100 mg/ml	Geriamoji suspensija	Naminiai paukščiai	Su geriamuoju vandeniu	50–100 ml Doxinyl 10%/100 l geriamojo vandens per parą (50–100 mg doksiciklino/l geriamojo vandens), 3–	Mėsa – 5 paros

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka/indikacijos
								5 dienas	
Bulgarija	Farma Sis OOD 4 San Stefano Str. Dobrich BULGARIA	Cyvadox 10%	Doksiciklino hiklatas	100 mg/ml	Geriamoji suspensija	Naminiai paukščiai	Su geriamuoju vandeniu	0,5–1 ml/l geriamojo vandens per parą 3–5 dienas/50–100 mg doksiciklino	Mėsa – 7 paros
Bulgarija	DOPHARMA B.V. Zalmweg 24, P.O. BOX 205 4940 AE Raamsdonksveer THE NETHERLANDS	Doxycycline 50% w.s.p.	Doksiciklino hiklatas	500 mg/g	Vandenyje tirpūs milteliai	Naminiai paukščiai	Su geriamuoju vandeniu	500 g doksiciklino 50% vandenyje tirpių miltelių/100 l geriamojo vandens, 3–5 dienas	Mėsa – 4 paros
Bulgarija	Farmavet OOD 40 Otec Paisij Str. Shumen BULGARIA	Doxycycline 20% Pulvis solubilis	Doksiciklino hiklatas	200 mg/g	Vandenyje tirpūs milteliai	Naminiai paukščiai	Su geriamuoju vandeniu	50 g doksiciklino 20 %/100 l geriamojo vandens, 3–5 dienas	Mėsa – 7 paros
Bulgarija	Interchemie Werken De Adelaar BV Hosierweg 26a 5811 Ccastenray THE NETHERLANDS	Doxy – WS	Doksiciklino hiklatas	200 mg/g	Vandenyje tirpūs milteliai	Naminiai paukščiai	Su geriamuoju vandeniu	1 kg Doxy–vandenyje tirpių miltelių/2000–4000 l geriamojo vandens	Mėsa – 7 paros

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomend uojama dozė	Išlauka/ indikacijos
Bulgarija	Ceva Sante Animale France La Balastiere 33501 Libourne Cedex FRANCE	Doxyvit 50 % WSP	Doksiciklino hiklatas	500 mg/g	Vandenyje tirpūs milteliai	Naminiai paukščiai	Su geriamuoju vandeniu	2–3 g Doxyvit 50% vandenyje tirpių miltelių/ 10 l. geriamojo vandens – 5 dienas prilygsta 100–150 mg doksiciklino/l vandens	Mėsa – 7 paros
Bulgarija	Ceva Sante Animale France La Balastiere 33501 Libourne Cedex FRANCE	Doxyvit 100	Doksiciklino hiklatas	100 mg/g	Vandenyje tirpūs milteliai	Naminiai paukščiai	Su geriamuoju vandeniu	10 mg Doxyvit/kg kūno svorio per parą	Mėsa – 7 paros
Bulgarija	Vetpartners OOD Ivan Asen Str. 4270 Parvomaj BULGARIA	Polidoxichem 500/WSP	Doksiciklino hiklatas	500 mg/g	Vandenyje tirpūs milteliai	Naminiai paukščiai	Su geriamuoju vandeniu	50–100 mg doksiciklino/l geriamojo vandens, 3– 5 dienas prilygsta 0,1–0,2 g polidoxichem 500 WSP/l geriamojo vandens per parą	Mėsa – 7 paros
Bulgarija	Biovet AD 39 Petar Rakov Str. 4550 Peshtera BULGARIA	Vibravet 10% Water soluble premix	Doksiciklino hiklatas	100 mg/g	Vandenyje tirpūs milteliai	Naminiai paukščiai	Su geriamuoju vandeniu	1g Vibravet 10%/l geriamojo vandens /=67– 100 mg doksiciklino per parą, 5 dienas	Mėsa – 7 paros

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka/indikacijos
Kipras	PREMIER SHUKUROGLOU LTD	HIPRADOXI -S	Doksiciklino hiklatas	100 mg	Geriamasis tirpalas	Kiaulės, vištos (broileriai)	Peroraliniu būdu, su geriamuoju vandeniu	Broileriai: 50–100 mg doksiciklino hikalato/l vandens, 3–5 dienas	Broileriai: mėsa – 5 paros Kiaulės: mėsa – 6 paros
Čekija	Industria Italiana Integratori TREI S.p.A. Viale Corassori 62 41100 Modena ITALY	DOXIPAN 20	Doksiciklino hiklatas	20 g/100 g	Milteliai geriamajam tirpalui	Vištos (broileriai), kalakutai	Skiriamas peroraliniu būdu su geriamuoju vandeniu 5 dienas.	Broileriai: 5–7,5 g vaisto/10 l geriamojo vandens Kalakutai: 10–20 mg doksiciklino/kg kūno svorio	Broileriai: mėsa ir plaučkepeniai – 5 paros. Kalakutai: mėsa ir plaučkepeniai – 10 parų. Indikacijos: Broileriai: lėtinės kvėpavimo sistemos ligos ir susijusios infekcijos. Kalakutai: G+ ir G– mikroorganizmų ir mikoplazmų sukeltos ligos, ypač mikoplazmų ir (arba) stafilokokų sukeltas kvėpavimo ir sąnarių sindromas.
Čekija	Pharmagal s.r.o., Murgašova 5, 949 01 Nitra, Slovak Republic	DOXYGAL	Doksiciklino hiklatas	50 mg/1 g	Milteliai geriamajam tirpalui	Naminiai paukščiai	Skiriamas peroraliniu būdu su geriamuoju vandeniu, 3–5 dienas.	Gydymo profilaktika: 50 mg doksiciklino/1 l geriamojo vandens Gydymas: 100 mg doksiciklino/l geriamojo vandens	Mėsa ir plaučkepeniai – 7 paros. Negalima naudoti dedančioms vištoms, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui. Indikacijos: Po virusinės kilmės ligų prasidėjusių antrinių bakterinių infekcijų gydymas. Naminiai paukščiai: lėtinė kvėpavimo liga

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomend uojama dozė	Išlauka/ indikacijos
									(LKL) (mikoplazmozė), kolibakteriozė.

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka/indikacijos
Čekija	Lavet Pharmaceuticals Ltd., 1161 Budapest Ottó u. 14, Hungary	DOXYVIT 40 %	Doksiciklino hiklatas	40 g/100 g	Milteliai geriamajam tirpalui	Vištos (broileriai), kalakutai	Skiriamas peroraliniu būdu su geriamuoju vandeniu, 3–5 dienas.	1. Nepertraukiamą terapiją: 1,0 g DOXYVIT 40% 3–6 l geriamojo vandens. 2. Pulsinė terapija: 10–20 mg doksiciklino/kg kūno svorio, kas 4–8 valandas.	Broileriai, kalakutai: Mėsa ir plaučkepeniai – 4 paros. Negalima naudoti dedančioms vištoms, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui. Indikacijos: doksiciklinui jautrių mikroorganizmų sukeliomis kvėpavimo, žarnyno ir sisteminėmis ligomis sergančių broilerių ir kalakutų gydymas ir profilaktika. Lėtinė kvėpavimo liga (<i>Mycoplasma gallisepticum</i>, <i>Escherichia coli</i>) Oro maišų uždegimas (<i>Mycoplasma meleagridis</i>) Infekcinis sinovitas (<i>Mycoplasma synoviae</i>) Paukščių cholera (<i>Pasterella multocida</i>) Kalakutų <i>Bordetella</i> infekcijos (<i>Bordetella avium</i>) Infekcinė sloga (<i>Haemophilus paragallinarum</i>) Kolibakteriozė (<i>Escherichia coli</i>) Nekrozinis plonosios žarnos uždegimas (<i>Clostridium</i>

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomend uojama dozė	Išlauka/ indikacijos
									<i>perfringens</i>) Chlamidiozė (<i>Chlamydia psittaci</i>)

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka/indikacijos
Čekija	Laboratorios Karizoo S.A Polígono Industrial La Borda Mas Pujades 11-12 08140 Caldes de Montbui Barcelona SPAIN	KARIDOX 100 mg/ml	Doksiciklino hiklatas	100 mg/1 ml	Geriamasis tirpalas	Vištos (broileriai)	Skiriamas peroraliniu būdu su geriamuoju vandeniu, 3–5 dienas.	10–20 mg doksiciklino/kg kūno svorio per parą (t. y. 0,5–1,0 ml vaisto/l geriamojo vandens per parą).	Vištos (broileriai): Mėsa ir plaučkepeniai – 7 paros. Negalima naudoti dedančioms vištoms, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui. Indikacijos: Doksiciklinui jautrių mikroorganizmų sukeltos LKL ir mikoplazmozės gydymas ir profilaktika.
Čekija	Tekro, spol. s.r.o., Višňová 2/484, 140 00 Praha 4, Czech Republic	MEDITEK DOX 100	Doksiciklino hiklatas	100 g/kg	Milteliai geriamajam tirpalui	Broileriai	Skiriamas peroraliniu būdu su geriamuoju vandeniu, 3–5 dienas.	10 mg doksiciklino hiklato/kg kūno svorio (1,0 kg vaisto/ 1000 l geriamojo vandens)	Vištos (broileriai): Mėsa ir plaučkepeniai – 7 paros. Indikacijos: Doksiciklinui jautrių patogenų sukeltomis kvėpavimo ir virškinimo ligomis sergančių kiaušių ir broilerių gydymas ir profilaktika. Veiksminga gydyti kelių trečiosios kartos tetraciklinams atsparių bakterijų sukeltas ligas.

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomend uojama dozė	Išlauka/ indikacijos
Čekija	CHEMO IBERICA, S.A. Gran Via Carlos III, 98 7 ^a Edificio Trade 08028 Barcelona SPAIN	ORIDOX 100 mg/ml, perorální roztok pro podání v pitné vodě pro brojlerý a prasata	Doksiciklino hiklatas	100 mg/1 ml	Geriamasis tirpalas	Vištos (broileriai)	Skiriamas peroraliniu būdu su geriamuoju vandeniu, 3–5 dienas.	10–20 mg doksiciklino/ kg kūno svorio per parą (t. y. 0,5–1,0 ml vaisto/l geriamojo vandens per parą	Vištos (broileriai): Mėsa ir plaučkepeniai - 7 paros. Kiaušiniai: negalima naudoti dedančioms vištoms, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui. Indikacijos: Doksiciklinui jautrių mikroorganizmų sukeliamų LDL ir mikoplazmozės gydymas ir profilaktika.
Čekija	VIRBAC S.A. 1ère avenue - 2065 m - L.I.D. 06516 CARROS FRANCE	Pulmodox O.S.P. 5%	Doksiciklino hiklatas	0.05 g/1 g	Milteliai geriamajam tirpalui	Naminiai paukščiai	Skiriamas peroraliniu būdu su geriamuoju vandeniu, 3–5 dienas.	Naminiai paukščiai iki 2 savaičių: 1 g vaisto litrai geriamojo vandens per parą Naminiai paukščiai nuo 2 savaičių: 2 g vaisto litrai geriamojo vandens per parą Gydymo trukmė: 3–5 dienas.	Vištos (broileriai): mėsa ir plaučkepeniai - 4 paros. Negalima naudoti dedančioms vištoms, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui. Indikacijos: Doksiciklinui jautrių patogenų sukeliamomis kvėpavimo takų infekcijomis sergančių vištų (broilerių) gydymas.

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka/indikacijos
Čekija	KELA Laboratoria n.v. Industrial Zone De Kluis" St. Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten BELGIUM	Respidox 5 %	Doksiciklino hiklatas	50 mg / 1 g	Milteliai geriamajam tirpalui	Naminiai paukščiai	Skiriamas peroraliniu būdu su geriamuoju vandeniu 3 dienas.	2 g vaisto/ l geriamojo vandens	Naminiai paukščiai : Mėsa ir plaučkepeniai - 7 paros. Negalima naudoti dedančioms vištoms, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui. Indikacijos: Doksiciklinui jautrių mikroorganizmų sukeltų infekcijų gydymas. Naminiai paukščiai: LKL, kolibakteriozė, nosies gleivinės uždegimas, sinovitas, salmoneliozė, paukščių cholera, chlamidiozė
Čekija	COOPHAVET Saint Herblon 44150 Ancenis FRANCE	RONAXAN P.S. 5%	Doksiciklino hiklatas	50 mg / 1 g	Milteliai geriamajam tirpalui	Vištos	Skiriamas peroraliniu būdu Su geriamuoju vandeniu 5 dienas.	10 mg doksiciklino/ kg kūno svorio per parą (t. y. 1 g vaisto/5 kg kūno svorio.)	Vištos (broileriai) : Mėsa ir plaučkepeniai - 4 paros. Negalima naudoti dedančioms vištoms, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui. Indikacijos: Doksiciklinui jautrių patogenų sukeltomis kvėpavimo takų infekcijomis sergančių vištų (broilerių) gydymas.

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka/indikacijos
Čekija	LABORATORIOS CALIER, S.A. BARCELONÉS, 26 08520 Les Franqueses del Valles SPAIN	Doxycycline Calier 500 mg/g	Doksiciklino hiklatas	500 mg/g	Vandenyje tirpūs milteliai	Naminiai paukščiai Kiaulės	Peroralinis 3–5 dienas	20 mg/kg per parą	6 paros <i>Mycoplasma gallisepticum</i> sukeltos lėtinės kvėpavimo ligos (LKL) profilaktika ir gydymas.
Čekija	Ceva Animal Health Slovakia spol. s.r.o. Račianska 77 831 02 Bratislava SLOVAKIA	DOXYVIT 100	Doksiciklino hidrochloridas	100 g/1000 g	Milteliai geriamajam tirpalui	Naminiai paukščiai (vištos, kalakutai, žąsys)	Skiriamas peroraliniu būdu Su geriamuoju vandeniu 5 dienas.	10 mg doksiciklino/kg kūno svorio per parą, t. y. 0,1 g DOXYVIT 100/kg kūno svorio	Mėsa ir plaučkepeniai - 7 paros. Negalima naudoti dedančioms vištoms, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui. Indikacijos: Doksiciklinui jautrių mikroorganizmų sukeltomis kvėpavimo, žarnyno ir sisteminėmis infekcijomis sergančių vištų, kalakutų ir žąsų gydymas ir profilaktika: lėtinė kvėpavimo liga (<i>Mycoplasma gallisepticum</i> , <i>Escherichia coli</i>), oro maišų uždegimas (<i>Mycoplasma meleagridis</i>), sinovitas (<i>Mycoplasma synoviae</i>), paukščių cholera (<i>Pasteurella multocida</i>), Kalakutų <i>bordetella</i> infekcijos (<i>Bordetella avium</i>), infekcinė sloga (<i>Haemophilus paragallinarum</i>),

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomend uojama dozė	Išlauka/ indikacijos
									kolibakteriozė (<i>Esccherichia coli</i>), nekrozinis plonosios žarnos uždegimas (<i>Clostridium perfringens</i>), chlamidiozė (<i>Chlamydia psittaci</i>). Profilaktika esant stresą sukeliančioms aplinkybėms (vakcinacija, gyvenamosios aplinkos pokyčiai, transportavimas)
Danija	Laborartorios Karizoo S.A. Pol. Ind. La Borda c/Mas Pujades 11-12 Caldes de Montbui 08140 SPAIN	Karidox	Doksiciklino hiklatas	10 %	Geriamasis tirpalas	Vištos, kiaulės	Peroraliniu būdu (su geriamuoju vandeniu), 3–5 dienas	Vištos: 10– 20 mg doksiciklino hiklato/kg kūno svorio per parą, 3– 5 dienas (t. y. 0,5– 1,0 ml vaisto/l vandens per parą)	Mėsai auginamos vištos: 7 paros. Kiaušiniai: negalima naudoti kiaušinius dedantiems naminiams paukščiams, jeigu jų kiaušiniai skirti žmonių maistui. Indikacijos: Doksiciklinui jautrių mikroorganizmų sukeliamų LKL ir mikoplazmozės gydymas.
Danija	CHEMO IBERICA, S.A. Gran Via Carlos III, 98 7ª Edificio Trade 08028 Barcelona SPAIN	Oridox	Doksiciklino hiklatas	10 %	Geriamasis tirpalas	Vištos, kiaulės	Peroraliniu būdu (su geriamuoju vandeniu), 3–5 dienas	Vištos: 10– 20 mg Doksiciklino hiklatas/kg kūno svorio per parą, 3– 5 dienas (t. y. 0.5– 1.0 ml vaisto/l)	Mėsai auginamos vištos: 7 paros. Kiaušiniai: negalima naudoti kiaušinius dedantiems naminiams paukščiams, jeigu jų kiaušiniai skirti žmonių maistui. Indikacijos:

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka/indikacijos
								vandens per parą)	Doksiciklinui jautrių mikroorganizmų sukiamų LKL ir mikoplazmozės gydymas.
Danija	Huvepharma N.V. Uitbreidingstraat 80 2600 Antwerpen BELGIUM	HydroDoxx	Doksiciklino hiklatas	500 mg/g Doksiciklino hiklatas	Milteliai geriamajam tirpalui	Vištos (broileriai) ir kiaulės (mėsinės kiaulės)	Peroralinis (su geriamuoju vandeniu)	20 mg doksiciklino (hiklato)/kg x 3–5 dienas	Mėsa ir plaučkepeniai: vištos – 6 paros. Negalima naudoti dedantiems paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui. Indikacijos: Vištos (broileriai) – sukeliamos lėtinės kvėpavimo ligos (LKL) gydymas ir profilaktika.
Estija	Laboratorios Hipra S.A. Avda La Selva 135 17170 Amer (Girona) SPAIN	Hipradoxi-S	Doksiciklino hiklatas	100 mg/ml	Koncentratas geriamajam tirpalui	Vištos (broileriai)	Peroraliniu būdu, su geriamuoju vandeniu.	50...100 mg doksiciklino/l vandens	Mėsa ir plaučkepeniai: 5 paros. Negalima naudoti dedantiems paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui. Indikacijos: kolibakteriozė, LKL ir susijusios infekcijos.
Estija	Laboratorios Hipra S.A. Avda La Selva 135 17170 Amer (Girona) SPAIN	Hipradoxi-P	Doksiciklino hiklatas	100 mg/g	Milteliai geriamajam tirpalui	Vištos (broileriai)	Peroraliniu būdu, su geriamuoju vandeniu.	20 mg doksiciklino/kg kūno svorio per parą	Mėsa ir plaučkepeniai: 5 paros. Negalima naudoti dedantiems paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui.

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka/indikacijos
									Indikacijos: kolibakteriozė, LKL ir susijusios infekcijos.
Estija	Maxx Pharma OÜ Kaluri tee 5 Haabneeme 74001 Viimsi Harjumaa ESTONIA	Doxyprim 40%	Doksiciklino hiklatas	400 mg/g	Milteliai geriamajam tirpalui	Vištos, kalakutai	Peroraliniu būdu, su geriamuoju vandeniu.	10...20 mg/kg kūno svorio per parą, 5 dienas	Mėsa ir plaučkepeniai: 4 paros. Negalima naudoti dedantiems paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui. Indikacijos: Doksiciklinui jautrių organizmų sukeliama kvėpavimo, žarnyno ir sisteminių infekcijų gydymas.
Estija	Zoovetvaru uusaru 5 76505 Saue Harjumaa ESTONIA	Doxycyn	Doksiciklino hiklatas	200 mg/g	Milteliai geriamajam tirpalui	Vištos (broileriai)	Peroraliniu būdu, su geriamuoju vandeniu.	10 mg doksiciklino/kg kūno svorio per parą 3–5 dienas	Mėsa ir plaučkepeniai: 6 paros. Negalima naudoti dedantiems paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui. Indikacijos: Doksiciklinui jautrių mikroorganizmų, įskaitant mikoplazmas, sukeliama kvėpavimo takų ir virškinimo sistemos infekcijų, bordateliozės, chlamidiozės, pastereliozės, anaerobinių infekcijų, salmoneliozės, stafilokokozės, kolibakteriozės

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomend uojama dozė	Išlauka/ indikacijos
									gydymas.
Estija	Dutch Farm Veterinary Pharmaceuticals B.V. Veemweg 1 3771 MT Barneveld THE NETHERLANDS	Dutch Farm Doxycycline 20% WSP	Doksiciklino hiklatas	200 mg/g	Milteliai geriamajam tirpalui	Naminiai paukščiai	Peroraliniu būdu, su geriamuoju vandeniu.	15 mg doksiciklino hiklato/kg kūno svorio per parą, 3– 5 dienas.	Mėsa ir plaučkepeniai: 7 paros. Negalima naudoti dedantiems paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui. Indikacijos: Doksiciklinui jautrių mikroorganizmų sukeliamų infekcijų, ypač kvėpavimo takų infekcijų gydymas.
Vokietija	LABORATORIOS CALIER, S.A. BARCELONÉS, 26 08520 Les Franqueses del Valles SPAIN	DOXYCYCLINE CALIER 500 mg/g, Pulver zum Eingeben über das Trinkwasser für Huhn und Schwein	Doksiciklino hiklatas	500 mg/g	Vandenyje tirpūs milteliai	Naminiai paukščiai Kiaulės	Peroralinis 3–5 dienas	20 mg/kg per parą	Mėsa ir plaučkepeniai: 6 paros Indikacijos: <i>Mycoplasma gallisepticum</i> sukeliamos lėtinės kvėpavimo ligos (LKL) gydymas ir profilaktika.

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka/indikacijos
Vokietija	Huvepharma N.V. Uitbreidingstraat 80 2600 Antwerpen BELGIUM	HydroDoxx 500 mg/g Pulver zum Eingeben über das Trinkwasser	Doksiciklino hiklatas	500 mg/g	Milteliai geriamajam tirpalui	Vištos (broileriai) ir kiaulės (mėsinės kiaulės)	Peroralinis (su geriamuoju vandeniu)	20 mg doksiciklino (hiklato)/kg x 3–5 dienas	Mėsa ir plaučkepeniai: Vištos – 6 paros. Negalima naudoti dedantiems paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui. Indikacijos: Vištos (broileriai): <i>Mycoplasma gallisepticum</i> sukeltos lėtinės kvėpavimo ligos gydymas ir profilaktika.
Graikija	Durden Trading Limited 12,Kennedy Av. Nicosia CYPRUS	Stardox	Doksiciklino hiklatas	500 mg/g	Milteliai geriamajam tirpalui	Vištos (broileriai) Kiaušinių nededančios vištos Veršeliai Kiaulės	Su geriamuoju vandeniu	20 mg/kg X 4–7 paros	Mėsa ir plaučkepeniai: 14 parų Indikacijos: <i>Mycoplasma gallisepticum</i> sukeliamas LKL, kolibakteriozė
Graikija	NEW VET A.E Fleming 15 15123 Marousi Attikis GREECE	Nexyclin	Doksiciklino hiklatas	400 mg/g	Milteliai geriamajam tirpalui	Vištos (broileriai) Kalakutai Kiaulės	Su geriamuoju vandeniu	20 mg/kg	Mėsa ir plaučkepeniai: 4 paros. Indikacijos: <i>Mycoplasma gallisepticum</i> , <i>E. coli</i> , <i>Pasteurella multocida</i> , <i>Chlamydia psittaci</i> sukeltos kvėpavimo takų infekcijos

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka/indikacijos
Graikija	VIRBAC S.A. 1ère avenue - 2065 m - L.I.D. 06516 CARROS FRANCE	Pulmodox	Doksiciklino hiklatas	500 mg/g	Milteliai geriamajam tirpalui	Vištos (broileriai) Kiaušinių nededančios vištos Veršeliai Kiaulės	Su geriamuoju vandeniu	10 mg/kg X 3–5 dienas	Mėsa ir plaučkepeniai: 9 paros Indikacijos: <i>Mycoplasma</i> spp, <i>E. coli</i> , <i>Haemophilus paragalinarum</i> , <i>Bordetella avium</i> sukeliamos kvėpavimo takų infekcijos <i>Clostridium perfringens</i> ir <i>Clostridium colinum</i> sukeliamas plonosios žarnos uždegimas
Graikija	Nutri-Biomed Hellas LTD 1,V.Hugo &Chlois Metamorfosi Attikis 14452 Athens GREECE	Doxyveto	Doksiciklino hiklatas	500 mg/g	Milteliai geriamajam tirpalui	Vištos (broileriai) Kiaušinių nededančios vištos Veršeliai Kiaulės	Su geriamuoju vandeniu	25 mg/kg X 3–5 dienas	Mėsa ir plaučkepeniai: 9 paros. Indikacijos: <i>Mycoplasma</i> spp, <i>E. coli</i> , <i>Haemophilus paragalinarum</i> , <i>Bordetella avium</i> sukeliamos kvėpavimo takų infekcijos <i>Clostridium perfringens</i> ir <i>Clostridium colinum</i> sukeliamas plonosios žarnos uždegimas
Graikija	DOPHARMA B.V. Zalmweg 24, P.O. BOX 205 4940 AE Raamsdonksveer THE NETHERLANDS	Doxycyclin 50 Dopharma	Doksiciklino hiklatas	500 mg/g	Milteliai geriamajam tirpalui	Vištos (broileriai) Veršeliai Kiaulės	Su geriamuoju vandeniu	25 mg/kg X 3–5 dienas	Mėsa ir plaučkepeniai: 9 paros Indikacijos: <i>Mycoplasma</i> spp, <i>E. coli</i> , <i>Haemophilus paragalinarum</i> , <i>Bordetella avium</i> sukeliamos kvėpavimo takų infekcijos

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomend uojama dozė	Išlauka/ indikacijos
									<i>Clostridium perfringens</i> ir <i>Clostridium colinum</i> sukeliamas plonosios žarnos uždegimas
Graikija	Durden Trading Limited 12, Kennedy Av. Nicosia CYPRUS	Doxycycline 150/Durden	Doksiciklino hidrochloridas	150 mg/g	Milteliai geriamajam tirpalui	Vištos (broileriai) Kiaušinių nededančios vištos Veršeliai Kiaulės	Su geriamuoju vandeniu	10 mg/kg X 3–5 dienas	Mėsa ir plaučkepeniai: 4 paros. Indikacijos: <i>Mycoplasma gallisepticum</i> , <i>E. coli</i> , <i>Haemophilus paragallinarum</i> sukeliamos kvėpavimo takų infekcijos
Graikija	AFOI TETOROU ABE 10 km National road Athens-Lamia 14451, Metamorfo si GREECE	Doxycycline 150/Afoi Tetorou	Doksiciklino hidrochloridas	150 mg/g	Milteliai geriamajam tirpalui	Vištos (broileriai) Kiaušinių nededančios vištos Veršeliai Kiaulės	Su geriamuoju vandeniu	10 mg/kg X 3–5 dienas	Mėsa ir plaučkepeniai: 4 paros Indikacijos: <i>Mycoplasma gallisepticum</i> , <i>E. coli</i> , <i>Haemophilus paragallinarum</i> sukeliamos kvėpavimo takų infekcijos

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka/indikacijos
Ispanija	LAB. DR ESTEVE Avda Mare de Deu de Montserrat 221 08041 Barcelona SPAIN	DOX ESTEVE	Doksiciklino hiklatas	100 mg/g	Vandenyje tirpūs milteliai	Naminiai paukščiai Kiaulės Galvijai	Peroralinis 3–5 dienas	20 mg/kg per parą	Mėsa ir plaučkepeniai: 9 paros. Indikacijos: <i>Mycoplasma spp</i> (mikoplazmozė, LKL) arba <i>Pasteurella multocida</i> (pastereliozė) sukeltos infekcijos. Mėsa ir plaučkepeniai: Naminiai paukščiai – 5 paros. Kalakutai – 7 paros. Kolibakteriozė, LKL, mikoplazmozė.
Ispanija	S.P. Veterinaria SA Crt. Reus Vinyols Km 4.1 Apartado 60 Riudoms 43330 (Tarragona) SPAIN	DOXI 100 mg/ml POLVO ORAL	Doksiciklino hiklatas	10 g/ 100 g	Vandenyje tirpūs milteliai	Naminiai paukščiai Kalakutai Kiaulės	Peroralinis 3–5 dienas (naminiai paukščiai ir kalakutai) 5 paros (kiaulės)	50–100 mg/l geriamojo vandens per parą (naminiai paukščiai ir kalakutai) 10 mg/kg per parą (kiaulės)	Mėsa ir plaučkepeniai: Broileriai – 5 paros Kalakutai – 7 paros Kiaulės – 4 paros
Ispanija	FATRO URIACH VETERINARIA, S.L. Constitucion, 1 08960 Sant Just Desvern SPAIN	DOXIDOL	Doksiciklino hiklatas	10 g/ 100 g	Vandenyje tirpūs milteliai	Naminiai paukščiai Kiaulės	Peroralinis 3–5 dienas	7.5–15 mg/kg per parą	Mėsa ir plaučkepeniai: 7 paros Indikacijos: Kolibakteriozė LKL
Ispanija	DIVASA-FARMAVIC, S.A. CTRA. SANT HIPOLIT, KM. 71	DOXIVET 20	Doksiciklino hiklatas	200 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Naminiai paukščiai Kiaulės	Peroralinis 3–5 dienas	10–20 mg/kg per parą	Mėsa ir plaučkepeniai: 7 paros Indikacijos:

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka/indikacijos
	08503 GURB – VIC SPAIN								kolibakteriozė, LKL, mikoplazmozė
Ispanija	MEVET, S. A. POLIGONO INDUSTRIAL EL SEGRE, PARCELA409-410 25191 Lérida SPAIN	DOXICIVALL POLVO	Doksiciklino hiklatas	500 mg/g	Vandenyje tirpūs milteliai	Naminiai paukščiai Kiaulės	Peroralinis 3–5 dienas	20 mg/kg per parą	Mėsa ir plaučkepeniai: 4 paros Indikacijos: kolibakteriozė, LKL, mikoplazmozė
Ispanija	Laboratorios Hipra S.A. Avda La Selva 135 17170 Amer (Girona) SPAIN	HIPRADOXI-S	Doksiciklino hiklatas	100 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Naminiai paukščiai Kiaulės	Peroralinis 3–5 dienas	50–100 mg/l geriamojo vandens per parą	Mėsa ir plaučkepeniai: 5 paros Indikacijos: kolibakteriozė, LKL, mikoplazmozė
Ispanija	LAMONS, S.A. POL.IND.MECANOV A, NAVES 27-28 25191 LLEIDA SPAIN	DOXICICLINA 10 % LAMONS	Doksiciklino hiklatas	100 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Naminiai paukščiai Kiaulės	Peroralinis 3–5 dienas	50–100 mg/l geriamojo vandens per parą	Mėsa ir plaučkepeniai: 5 paros Indikacijos: kolibakteriozė, LKL, mikoplazmozė
Ispanija	Laboratorios Hipra S.A. Avda La Selva 135 17170 Amer (Girona) SPAIN	HIPRADOXI-P	Doksiciklino hiklatas	100 mg/g	Vandenyje tirpūs milteliai	Naminiai paukščiai Kiaulės	Peroralinis 3–5 dienas	20 mg/kg per parą	Mėsa ir plaučkepeniai: 5 paros Indikacijos: kolibakteriozė, LKL ir susijusios infekcijos
Ispanija	POLICHEM, S.A. Ctra. Reus-Cambrils, Km. 3 43206 Reus SPAIN	DOXICHEM	Doksiciklino hiklatas	500 mg/g	Vandenyje tirpūs milteliai	Naminiai paukščiai	Peroralinis 3–5 dienas	50–100 mg/l geriamojo vandens per parą	Mėsa ir plaučkepeniai: 7 paros Indikacijos: kolibakteriozė, LKL, mikoplazmozė

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomend uojama dozė	Išlauka/ indikacijos
Ispanija	SUPER ´S DIANA, S.L Ctra. Barcelona - Ripoll, Km 17 08150 Parets del Valles SPAIN	DOXBRON	Doksiciklino hiklatas	500 mg/g	Vandenyje tirpūs milteliai	Naminiai paukščiai	Peroralinis 3–5 dienas	50–100 mg/l geriamojo vandens per parą	Mėsa ir plaučkepeniai: 7 paros Indikacijos: kolibakteriozė, LKL, mikoplazmozė
Ispanija	COTECNICA - COOPERATIVA TECNICA AGROPECUARIA Ctra. N II KM 494,5 25250 Bellpuig (Lerida) SPAIN	DOXICICLINA 500 USO VETERINARIO COTECNICA	Doksiciklino hiklatas	500 mg/g	Vandenyje tirpūs milteliai	Naminiai paukščiai	Peroralinis 3–5 dienas	50–100 mg/l geriamojo vandens per parą	Mėsa ir plaučkepeniai: 7 paros Indikacijos: kolibakteriozė, LKL, mikoplazmozė
Ispanija	CENAVISA, S.A. Camí Pedra Estela S/N 43205 Reus SPAIN	LAFIDOX POLVO ORAL	Doksiciklino hiklatas	500 mg/g	Vandenyje tirpūs milteliai	Naminiai paukščiai	Peroralinis 3–5 dienas	50–100 mg/l geriamojo vandens per parą	Mėsa ir plaučkepeniai: 7 paros Indikacijos: kolibakteriozė, LKL, mikoplazmozė
Ispanija	LABORATORIOS SYVA, S.A. PARROCO PABLO DIEZ, 49-57 24010 TROBAJO DEL CAMINO SPAIN	SYVADOX 10 %	Doksiciklino hiklatas	100 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Naminiai paukščiai Kiaulės	Peroralinis 3–5 dienas	50–100 mg/l geriamojo vandens per parą	Mėsa ir plaučkepeniai: 7 paros Indikacijos: kolibakteriozė, LKL, mikoplazmozė
Ispanija	INVESA INTERNACIONAL, S.A. Esmeralda, 19 - 4º 08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT	DX-10	Doksiciklino hiklatas	100 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Naminiai paukščiai Kiaulės	Peroralinis 3–5 dienas	50–100 mg/l geriamojo vandens per parą	Mėsa ir plaučkepeniai: 7 paros Indikacijos: kolibakteriozė, LKL, mikoplazmozė

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomend uojama dozė	Išlauka/ indikacijos
	SPAIN								
Ispanija	CENAVISA, S.A. Camí Pedra Estela S/N 43205 Reus SPAIN	DOXICICLINA 500 GANADEXIL	Doksiciklino hiklatas	500 mg/g	Vandenyje tirpūs milteliai	Naminiai paukščiai Kalakutai	Peroralinis 3–5 dienas	50–100 mg/l geriamojo vandens per parą	Mėsa ir plaučkepeniai: 7 paros Indikacijos: kolibakteriozė, LKL, mikoplazmozė
Ispanija	DIVASA- FARMAVIC, S.A. CTRA. SANT HIPOLIT, KM. 71 08503 GURB – VIC SPAIN	DOXIVET 5	Doksiciklino hiklatas	50 mg/g	Vandenyje tirpūs milteliai	Naminiai paukščiai Kalakutai	Peroralinis 3–5 dienas	50–100 mg/l geriamojo vandens per parą	Mėsa ir plaučkepeniai: 7 paros Indikacijos: kolibakteriozė, LKL, mikoplazmozė
Ispanija	INDUSTRIAL VETERINARIA S.A. Esmeralda, 19 - 4º 08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT SPAIN	DOXINYL	Doksiciklino hiklatas	100 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Naminiai paukščiai Kiaulės	Peroralinis 3–5 dienas	50–100 mg/l geriamojo vandens per parą	Mėsa ir plaučkepeniai: 7 paros Indikacijos: kolibakteriozė, LKL, mikoplazmozė
Ispanija	JAER, S.A. Barcelona, 411 08620 San Vicens del Horts SPAIN	MASTERMIX DOXICICLINA	Doksiciklino hiklatas	50 mg/g	Vandenyje tirpūs milteliai	Naminiai paukščiai Kalakutai	Peroralinis 3–5 dienas	50–100 mg/l geriamojo vandens per parą	Mėsa ir plaučkepeniai: 7 paros Indikacijos: kolibakteriozė, LKL, mikoplazmozė
Ispanija	Laboratorios Karizoo S.A Polígono Industrial La Borda Mas Pujades 11-12 08140 Caldes de Montbui Barcelona SPAIN	KARIDOX	Doksiciklino hiklatas	100 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Naminiai paukščiai Kiaulės	Peroralinis 3–5 dienas	10– 20 mg/kg per parą	Mėsa ir plaučkepeniai: 7 paros Indikacijos: LKL, mikoplazmozė

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomend uojama dozė	Išlauka/ indikacijos
Ispanija	CHEMO IBERICA, S.A. Gran Via Carlos III, 98 7 ^a Edificio Trade 08028 Barcelona SPAIN	SOLDOXIN	Doksiciklino hiklatas	100 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Naminiai paukščiai Kiaulės	Peroralinis 3–5 dienas	10– 20 mg/kg per parą	Mėsa ir plaučkepeniai: 7 paros Indikacijos: LKL, mikoplazmozė
Ispanija	LABORATORIOS CALIER, S.A. BARCELONÉS, 26 08520 Les Franqueses del Valles SPAIN	CALIERDOXINA 50 % P O	Doksiciklino hiklatas	500 mg/g	Vandenyje tirpūs milteliai	Naminiai paukščiai	Peroralinis 5 paros	20 mg/kg per parą	Mėsa ir plaučkepeniai: 7 paros Indikacijos: LKL, mikoplazmozė
Ispanija	LABORATORIOS CALIER, S.A. BARCELONÉS, 26 08520 Les Franqueses del Valles SPAIN	GANAMIX DOXICICLINA 50 % P O	Doksiciklino hiklatas	500 mg/g	Vandenyje tirpūs milteliai	Naminiai paukščiai	Peroralinis 5 paros	20 mg/kg per parą	Mėsa ir plaučkepeniai: 7 paros Indikacijos: LKL, mikoplazmozė
Ispanija	S.P. Veterinaria SA Crt. Reus Vinyols Km 4.1 Apartado 60 Riudoms 43330 (Tarragona) SPAIN	HIDRODOX 10 %	Doksiciklino hiklatas	100 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Naminiai paukščiai Kiaulės	Peroralinis 3–5 dienas	50–100 mg/l geriamojo vandens per parą	Mėsa ir plaučkepeniai: 7 paros Indikacijos: kolibakteriozė, LKL, mikoplazmozė
Ispanija	VIRBAC ESPAÑA, S.A. Angel Guimera, 179-181 08950 Esplugues de Llobregat SPAIN	PULMODOX P.O.S.	Doksiciklino hiklatas	500 mg/g	Vandenyje tirpūs milteliai	Naminiai paukščiai	Peroralinis 3–5 dienas	50–100 mg/l geriamojo vandens per parą	Mėsa ir plaučkepeniai: 7 paros Indikacijos: LKL, mikoplazmozė

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka/indikacijos
Ispanija	Huvepharma N.V. Uitbreidingstraat 80 2600 Antwerpen BELGIUM	DILUDOX	Doksiciklino hiklatas	500 mg/g Doksiciklino hiklatas	Milteliai geriamajam tirpalui	Vištos (broileriai) ir Kiaulės (mėsinės kiaulės)	Peroralinis (su geriamuoju vandeniu)	20 mg doksiciklino (hiklato)/kg x 3–5 dienas	Mėsa ir plaučkepeniai: vištos – 6 paros. Negalima naudoti dedantiems paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui. Indikacijos: vištos (broileriai) – <i>Mycoplasma gallisepticum</i> sukeltos lėtinės kvėpavimo ligos (LKL) gydymas ir profilaktika.
Ispanija	LABORATORIOS CALIER, S.A. BARCELONÉS, 26 08520 Les Franqueses del Valles SPAIN	DOXICICLINA CALIER 500 mg/g	Doksiciklino hiklatas	500 mg/g	Vandenyje tirpūs milteliai	Naminiai paukščiai Kiaulės	Peroralinis 3–5 dienas	20 mg/kg per parą	Mėsa ir plaučkepeniai: 6 paros Indikacijos: <i>Mycoplasma gallisepticum</i> sukeltos lėtinės kvėpavimo ligos (LKL) gydymas ir profilaktika.
Ispanija	LABORATORIOS MAYMO, S.A. Via Augusta, 302 08017 Barcelona SPAIN	MAYDOX PS	Doksiciklino hidrochloridas	50 mg/g	Vandenyje tirpūs milteliai	Naminiai paukščiai Kalakutai	Peroralinis 3–5 dienas	50–100 mg/l geriamojo vandens per parą	Mėsa ir plaučkepeniai: 7 paros Indikacijos: kolibakteriozė, LKL, mikoplazmozė

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomend uojama dozė	Išlauka/ indikacijos
Prancūzija	COOPHAVET Saint Herblon 44150 Ancenis FRANCE	RONAXAN P.S. 5 %	Doksiciklino hiklatas	50 mg/g	Vandenyje tirpūs milteliai	Kalakutai Kiaulės Broileriai Veršeliai	Profilaktika 1–3 paros Gydymas: 3–5 dienas	10 mg/kg per parą	Mėsa ir plaučkepeniai: Kalakutai – 6 paros Broileriai – 4 paros Indikacijos: Broileriai ir kalakutai – kvėpavimo takų infekcijų gydymas ir profilaktika.
Prancūzija	FRANVET ZI d'Etriche-Route d'Avire BP 103 49500 Segré Cedex FRANCE	DOXY 5 FRANVET	Doksiciklino hiklatas	50 mg/g	Vandenyje tirpūs milteliai	Kalakutai, Kiaulės Vištos Veršeliai	Profilaktika 1–3 paros Gydymas: 3–5 dienas	10 mg/kg per parą	Mėsa ir plaučkepeniai: Kalakutai – 6 paros Vištos – 4 paros Indikacijos: Kvėpavimo takų infekcijų gydymas ir profilaktika.
Prancūzija	VIRBAC S.A. 1ère avenue - 2065 m - L.I.D. 06516 CARROS FRANCE	PULMODOX P.O.S. 5 %	Doksiciklino hiklatas	50 mg/g	Vandenyje tirpūs milteliai	Kiaulės Veršeliai Naminiai paukščiai	Profilaktika 1–3 paros Gydymas: 3–5 dienas	10 mg/kg per parą	Mėsa ir plaučkepeniai: Kalakutai – 6 paros Vištos – 4 paros Indikacijos: Kvėpavimo takų infekcijų gydymas ir profilaktika.
Prancūzija	Sogeval Laboratoires 200 route De Mayenne 53 022 Laval Cedex FRANCE	DOXYVAL 5 %	Doksiciklino hiklatas	50 mg/g	Vandenyje tirpūs milteliai	Kalakutai Kiaulės Broileriai Veršeliai	Profilaktika 1–3 paros Gydymas: 3–5 dienas	10 mg/kg per parą	Mėsa ir plaučkepeniai: Kalakutai – 6 paros Vištos – 4 paros Indikacijos: Kvėpavimo takų infekcijų gydymas ir profilaktika.

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomend uojama dozė	Išlauka/ indikacijos
Prancūzija	Laboratoires Biove 3 rue de Lorraine 62510 Arques FRANCE	ACTI DOXY 5	Doksiciklino hiklatas	50 mg/g	Vandenyje tirpūs milteliai	Kalakutai Kiaulės Broileriai Veršeliai	Profilaktika 1–3 paros Gydymas: 3–5 dienas	10 mg/kg per parą	Mėsa ir plaučkepeniai: Kalakutai – 6 paros Vištos – 4 paros Indikacijos: Kvėpavimo takų infekcijų gydymas ir profilaktika.
Prancūzija	Ceva Sante Animale France La Balastiere 33501 Libourne Cedex FRANCE	DOXYVIT	Doksiciklino hiklatas	50 mg/g	Vandenyje tirpūs milteliai	Kalakutai Kiaulės Broileriai Veršeliai	Profilaktika 1–3 paros Gydymas: 3–5 dienas	10 mg/kg per parą	Mėsa ir plaučkepeniai: Kalakutai – 6 paros Vištos – 4 paros Indikacijos: Kvėpavimo takų infekcijų gydymas ir profilaktika.
Prancūzija	Noe 10 rue Clement Ader ZA Le Patis 78120 Rambouillet FRANCE	COMPOMIX V DOXYCYCLINE	Doksiciklino hiklatas	50 mg/g	Vandenyje tirpūs milteliai	Kalakutai Kiaulės Broileriai Veršeliai	Profilaktika 1–3 paros Gydymas: 3–5 dienas	10 mg/kg per parą	Mėsa ir plaučkepeniai: Kalakutai – 6 paros Vištos – 4 paros Indikacijos: Kvėpavimo takų infekcijų gydymas ir profilaktika.
Prancūzija	CHEMO IBERICA, S.A. Gran Via Carlos III, 98 7 ^a Edificio Trade 08028 Barcelona SPAIN	SOLDOXIN 100 MG/ML SOLUTION BUVABLE POUR POULES POULETS ET PORCINES	Doksiciklino hiklatas	100 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Kiaulės Vištos Broileriai	VIŠTOS (broileriai): 10– 20 mg doksiciklino/kg kūno svorio per parą	3–5 dienas	Indikacijos: VIŠTOS (BROILERIAI) Doksiciklinui jautrių mikroorganizmų sukeliamų lėtinės kvėpavimo ligos ir mikoplazmozės gydymas ir profilaktika.
Prancūzija	Laborartorios Karizoo S.A. Pol. Ind. La Borda c/Mas Pujades 11-12 Caldes de Montbui 08140	DOXYSOL 10 %	Doksiciklino hiklatas	100 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Kiaulės Vištos Broileriai	VIŠTOS (broileriai): 10– 20 mg doksiciklino/kg kūno svorio per parą	3–5 dienas	Indikacijos: VIŠTOS (BROILERIAI). Doksiciklinui jautrių mikroorganizmų sukeliamų lėtinės kvėpavimo ligos ir mikoplazmozės

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomend uojama dozė	Išlauka/ indikacijos
	SPAIN								gydymas ir profilaktika.
Prancūzija	Huvepharma N.V. Uitbreidingstraat 80 2600 Antwerpen BELGIUM	HYDRODOXX 500 MG/G POUDRE POUR ADMINISTRATIO N DANS L'EAU DE BOISSON POUR POULETS ET PORCS	Doksiciklino hiklatas	500 mg/g doksiciklino hiklatas	Milteliai geriamajam tirpalui	Vištos (broileriai) ir kiaulės (mėsinės kiaulės)	Peroralinis (su geriamuoju vandeniu)	20 mg doksiciklino (hiklato)/kg x 3–5 dienas	Mėsa ir plaučkepeniai: Vištos – 6 paros. Negalima naudoti dedantiems paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui. Indikacijos: vištos (broileriai) – <i>Mycoplasma gallisepticum</i> sukeliamos lėtinės kvėpavimo ligos gydymas ir profilaktika.
Prancūzija	LABORATORIOS CALIER, S.A. BARCELONÉS, 26 08520 Les Franqueses del Valles SPAIN	DOXYCYCLINE CALIER 500 MG/G POUDRE POUR ADMINISTRATIO N DANS L'EAU DE BOISSON POUR POULETS ET PORCINS	Doksiciklino hiklatas	500 mg/g	Vandenyje tirpūs milteliai	Naminiai paukščiai Kiaulės	Peroralinis 3–5 dienas	20 mg/kg per parą	Mėsa ir plaučkepeniai: 6 paros Indikacijos: <i>Mycoplasma gallisepticum</i> sukeliamos lėtinės kvėpavimo ligos (LKL) gydymas ir profilaktika.

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka/indikacijos
Vengrija	COOPHAVET Saint Herblon 44150 Ancenis FRANCE	Ronaxan P.S. 5 % oldható por	Doksiciklino hiklatas	5 g/100 g	Milteliai geriamajam tirpalui	Vištos	Viščiukai iki 2 savaičių: 1 g miltelių/l geriamojo vandens per parą. Viščiukai nuo 2 savaičių: 2 g miltelių/l geriamojo vandens.	10 mg doksiciklino/ kg kūno svorio per parą, 3–5 dienas.	Mėsa ir plaučkepeniai: 4 paros Indikacijos: LKL, mikoplazmų sukeltų ligų ir kitų infekcijų gydymas.
Vengrija	DOPHARMA B.V. Zalmweg 24, P.O. BOX 205 4940 AE Raamsdonksveer THE NETHERLANDS	Doxycycline 50 % WSP	Doksiciklino hiklatas	500 mg/g	Milteliai geriamajam tirpalui	Vištos	500 g vaisto ištirpinama 1000 litrų geriamoj o vandens.	25 mg doksiciklino/ kg kūno svorio per parą, 3–5 dienas.	Mėsa ir plaučkepeniai: 4 paros Indikacijos: viščių kvėpavimo ligų gydymas ir kontrolė
Vengrija	Kon-Pharma GmbH. 30625 Hannover GERMANY	Doxy 50 % por belsóleges oldathoz	Doksiciklino hiklatas	500 mg/g	Milteliai geriamajam tirpalui	Vištos, kalakutai	Vištos: 500 mg vaisto ištirpinama 1 litrų geriamojo vandens. Kalakutai: 400 mg vaisto 1 litrų geriamojo vandens	30 mg doksiciklino/ kg kūno svorio per parą, 5 dienas.	Mėsa ir plaučkepeniai: vištos ir kalakutai – 11 parų.
Vengrija	V.M.D. Állatgyógyászati Kft. 1093 Budapest HUNGARY	Doxyveto-50	Doksiciklino hiklatas	500 mg/g	Milteliai geriamajam tirpalui	Vištos	Nepertraukiamas gydymas: 0.2 g vaisto/l geriamojo vandens. Pulsinis gydymas: apskaičiuotą vaisto kiekį reikia ištirpinti per 8 valandas išgeriamame geriamojo vandens kiekyje.	10 mg doksiciklino/ kg kūno svorio per parą, 5 dienas.	Mėsa ir plaučkepeniai: 10 parų. Indikacijos: LKL ir pastereliozės gydymas; sinovitu sergančių kalakutų gydymas.

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka/indikacijos
Vengrija	Novartis Animal Health d.o.o. Verovskava 57 1000 Ljubljana SLOVENIA	Doxeryl 50 % por belsőleges oldathoz	Doksiciklino hiklatas	500 mg/g	Milteliai geriamajam tirpalui	Vištos	5 g vaisto 100 kg kūno svorio per parą, ištirpinama geriamajame vandenyje.	25 mg doksiciklino/kg kūno svorio per parą, 3–5 dienas.	Mėsa ir plaučkepeniai: 6 paros Indikacijos: LKL, pastereliozės, kolibakteriozės, <i>Haemophilus</i> ir <i>Clostridium</i> bakterijų infekcijų gydymas.
Vengrija	Animal-Med Kft. 1029 Budapest HUNGARY	Anidox 10 % por belsőleges oldathoz	Doksiciklino hiklatas	100 mg/g	Milteliai geriamajam tirpalui	Vištos	1000 g vaisto ištirpinama 1000 litrų geriamojo vandens.	10 mg doksiciklino/kg kūno svorio per parą, 5 dienas.	Mėsa ir plaučkepeniai: 12 parų Indikacijos: mikoplazmozės, pastereliozės, kolibakteriozės gydymas.
Vengrija	Animal-Med Kft. 1029 Budapest HUNGARY	Anidox 100 % por belsőleges oldathoz	Doksiciklino hiklatas	1000 mg/g	Milteliai geriamajam tirpalui	Vištos	100 g vaisto ištirpinama 1000 litrų geriamojo vandens.	10 mg doksiciklino/kg kūno svorio per parą, 5 dienas.	Mėsa ir plaučkepeniai: 12 parų Indikacijos: <i>Mycoplasma gallisepticum</i> , <i>E. coli</i> , <i>Bordetella avium</i> , <i>Haemophilus paragallinarum</i> ir <i>Pasteurella multocida</i> sukeltų infekcijų gydymas.
Vengrija	Lavet Pharmaceuticals Ltd., 1161 Budapest Ottó u. 14, Hungary	Doxyprim 40 % vízoldékony pulvis	Doksiciklino hiklatas	400 mg/g	Milteliai geriamajam tirpalui	Vištos, kalakutai	Nepertraukiamas gydymas: 1 g vaisto/ 3–6 litrai geriamojo vandens. Pulsinis gydymas: apskaičiuotą vaisto kiekį reikia ištirpinti per 4–8 valandas išgeriamame	10–20 mg/doksi ciklino/kg kūno svorio per parą, 3–5 dienas.	Mėsa ir plaučkepeniai: 4 paros Indikacijos: <i>Mycoplasma gallisepticum</i> , <i>E. coli</i> , <i>Bordetella avium</i> , <i>Haemophilus paragallinarum</i> ir <i>Pasteurella multocida</i> sukeltų infekcijų

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomend uojama dozė	Išlauka/ indikacijos
							geriamojo vandens kiekyje.		gydymas.
Vengrija	CHEMIFARMA S.p.A Via Don Eugenio Servadei 16 47100 Forli ITALY	Doxifarm 50 % WSP	Doksiciklino hiklatas	500 mg/g	Milteliai geriamajam tirpalui	Vištos	40 g vaisto/100 kg kūno svorio/100 litrų geriamojo vandens.	20 mg doksiciklino/ kg kūno svorio per parą, 5 dienas.	Mėsa ir plaučkepeniai: 5 paros Indikacijos: LKL, mikoplazmozės, sinovito, kolibakteriozės, klubinės žarnos uždegimo (nekrozinio ir opinio), <i>haemophilus</i> bakterijų sukeltų infekcijų gydymas.
Vengrija	VIRBAC S.A. 1ère avenue - 2065 m - L.I.D. 06516 CARROS FRANCE	Pulmodox 50 % WSP	Doksiciklino hiklatas	500 mg/g	Milteliai geriamajam tirpalui	Vištos	500 g vaisto ištirpinama 1000 litrų geriamojo vandens.	25 mg doksiciklino/ kg kūno svorio per parą, 3–5 dienas.	Mėsa ir plaučkepeniai: 4 paros Indikacijos: LKL ir kitų <i>Mycoplasma spp.</i> , <i>Pasteurella spp.</i> , <i>E.</i> <i>coli</i> ir <i>Chlamydia</i> <i>psittaci</i> sukeltų kvėpavimo takų infekcijų gydymas.

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka/indikacijos
Vengrija	Phylaxia Pharma Zrt. 8000 Székesfehérvár HUNGARY	Doxyphyl SP	Doksiciklino hiklatas	300 mg/g	Milteliai geriamajam tirpalui	Vištos, kalakutai	40 g vaisto/1200 kg kūno svorio per parą, apskaičiuotą vaisto kiekį reikia ištirpinti per 3 valandas išgeriamame vandens kiekyje.	10 mg doksiciklino/kg kūno svorio per parą, 3–5 dienas.	Mėsa ir plaučkepeniai: vištos – 7 paros, kalakutai – 10 parų. Indikacijos: <i>Mycoplasma spp.</i> , <i>E. coli</i> , <i>Haemophilus paragallinarum</i> , <i>Bordetella avium</i> sukeltų kvėpavimo sistemos infekcijų ir <i>Clostridium perfringens</i> ir <i>Cl. colinum</i> sukeltos klubinės žarnos infekcijos uždegimo gydymas.
Vengrija	Eurovet Animal Health B.V. Handelsveg 25 PO Box 179 5530 AD Bladel THE NETHERLANDS	Soludox 50 % pulvis	Doksiciklino hiklatas	500 mg/g	Milteliai geriamajam tirpalui	Vištos	Ištirpinama geriamajame vandenyje.	10 mg/kg kūno svorio ir 20 mg/kg kūno svorio per parą, 4 dienas.	Mėsa ir plaučkepeniai: vištos, gydytos 10 mg/kg kūno svorio – 5 paros, vištos, gydytos 20 mg/kg kūno svorio – 12 parų. Indikacijos: Doksiciklinui jautrių bakterijų sukeltų kvėpavimo sistemos ir kitų ligų gydymas.
Vengrija	CHEMO IBERICA, S.A. Gran Via Carlos III, 98 7ª Edificio Trade 08028 Barcelona SPAIN	Oridox 100 mg/ml belsólages oldat	Doksiciklino hiklatas	100 mg/ml	Koncentratas geriamajam tirpalui	Vištos	100 mg/ml geriamasis koncentratas, ištirpinamas geriamajame vandenyje.	10–20 mg/doksiciklino/kg kūno svorio per parą, 3–5 dienas.	Mėsa ir plaučkepeniai: 7 paros. Indikacijos: Doksiciklinui jautrių bakterijų sukeltų kvėpavimo sistemos ir kitų ligų gydymas.

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka/indikacijos
Vengrija	Laboratorios Karizoo S.A Polígono Industrial La Borda Mas Pujades 11-12 08140 Caldes de Montbui Barcelona SPAIN	Karidox 100 mng/ml belsóleges oldat	Doksiciklino hiklatas	100 mg/ml	Koncentratas geriamajam tirpalui	Vištos	100 mg/ml geriamasis koncentratas, ištirpinamas geriamajame vandenyje.	10–20 mg/doksi ciklino/kg kūno svorio per parą, 3–5 dienas.	Mėsa ir plaučkepeniai: 7 paros. Indikacijos: LKL ir kitų mikoplazmų sukeliamų ligų gydymas ir profilaktika
Vengrija	CENAVISA, S.A. Camí Pedra Estela S/N 43205 Reus SPAIN	Doxycen belsóleges oldat	Doksiciklino hiklatas	200 mg/ml	Koncentratas geriamajam tirpalui	Vištos	1 ml/20 kg kūno svorio per parą Ištirpinama geriamajame vandenyje.	10 mg doksiciklino/kg kūno svorio per parą, 5 dienas.	Mėsa ir plaučkepeniai: 5 paros. Indikacijos: LKL, mikoplazmozės ir kolibakteriozės gydymas.
Vengrija	Lavet Pharmaceuticals Ltd., 1161 Budapest Ottó u. 14, Hungary	Doxyvit 100 WSP	Doksiciklino hidrochloridas	100 mg/g	Milteliai geriamajam tirpalui	Vištos, kalakutai, žąsys	Nepertraukiamas gydymas: 1 g vaisto/l geriamojo vandens. Pulsinis gydymas: apskaičiuotą vaisto kiekį reikia ištirpinti 6–8 valandas išgeriamo geriamojo vandens kiekyje.	10 mg/doksi ciklino/kg kūno svorio per parą, 3–5 dienas.	Mėsa ir plaučkepeniai: vištos, kalakutai, žąsys – 7 paros. Indikacijos: Kvėpavimo sistemos ir vidurių ligomis sergančių mėsinų vištų gydymas.
Vengrija	Industria Italiana Integratori TREI S.p.A. Viale Corassori 62 41100 Modena ITALY	Doxipan 20 WSP	Doksiciklino hidrochloridas	200 mg/g	Milteliai geriamajam tirpalui	Vištos	5–7,5 g vaisto, ištirpinama 10 l geriamojo vandens.	10–15 mg/doksiciklino/kg kūno svorio per parą, 3–5 dienas.	Mėsa ir plaučkepeniai: 5 paros. Indikacijos: LKL, mikoplazmozės, sinovito, kolibakteriozės, klubinės žarnos uždegimo (nekrozinio ir opinio), <i>haemophilus</i> bakterijų sukeliamų

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka/indikacijos
									infekcijų gydymas.
Vengrija	Laboratorios Hipra S.A. Avda La Selva 135 17170 Amer (Girona) SPAIN	Hipradoxi-S oral solutio	Doksiciklino hidrochloridas	100 mg/ml	Koncentratas geriamajam tirpalui	Vištos	100 mg/ml geriamojo koncentrato ištirpinama 1 litrų geriamojo vandens.	10 mg doksiciklino/kg kūno svorio per parą, 5 dienas.	Mėsa ir plaučkepeniai: 5 paros Indikacijos: LKL ir kitų mikoplazmų sukeliama ligų gydymas ir profilaktika.
Airija	S.P. Veterinaria SA C/ta. Reus Vinyols Km 4.1 Apartado 60 Riudoms 43330 (Tarragona) SPAIN	DOXIVEX 10% Concentrate for oral solution.	Doksiciklino hiklatas	100 mg/ml	Koncentratas geriamajam tirpalui	Vištos (broileriai) ir kiaulės	Skiriamas peroraliniu būdu su geriamuoju vandeniu., 3–5 dienas	Vištos (broileriai) : 50–100 mg doksiciklino/l geriamojo vandens per parą (prilygsta 0,5–1,0 ml DOXIVEX 10 %/l geriamojo vandens per parą), 3–5 dienas	Mėsa ir plaučkepeniai - 7 paros. Negalima naudoti dedantiems paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui. Indikacijos: Kolibakteriozės, lėtinė kvėpavimo ligos (LKL) ir doksiciklinui jautrių mikroorganizmų sukeltos mikoplazmozės gydymas.
Airija	Huvepharma N.V. Uitbreidingstraat 80 2600 Antwerpen BELGIUM	Aquadoxx 500 mg/g water-soluble powder	Doksiciklino hiklatas	500 mg/g doksiciklino hiklato	Milteliai geriamajam tirpalui	Vištos (broileriai) ir kiaulės (mėsinės kiaulės)	Peroralinis (su geriamuoju vandeniu)	20 mg doksiciklino (hiklato)/kg x 3–5 dienas	Mėsa ir plaučkepeniai: Vištos – 6 paros. Negalima naudoti dedantiems paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui. Indikacijos: vištos (broileriai): <i>Mycoplasma</i>

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka/indikacijos
									<i>gallisepticum</i> sukeltos lėtinės kvėpavimo ligos (LKL) gydymas ir profilaktika.
Italija	CEVA VETEM S.P.A. Via Colleoni n.15 20041 Agrate Brianza (Milano) ITALY	DOXICICLINA 20% CEVA VETEM	Doksiciklino hiklatas	200 g doksiciklino 1 kg vaisto	Vandenyje tirpūs milteliai	broileriai, kalakutai	su geriamuoju vandeniu	Broileriai, Kalakutai: 1 g / 10 kg kūno svorio 5 dienas.	Mėsa ir plaučkepeniai: Broileriai – 7 paros Kalakutai – 8 paros Indikacijos: Broileriai – lėtinės kvėpavimo ligos gydymas Kalakutai – infekcinio sinusito gydymas
Italija	CHEMIFARMA S.p.A Via Don Eugenio Servadei 16 47100 Forlì ITALY	DOXICICLINA 50 % CHEMIFARMA	Doksiciklino hiklatas	500 g doksiciklino. 1 kg vaisto	Vandenyje tirpūs milteliai	broileriai, kiaulės	su geriamuoju vandeniu	Broileriai: 20 mg doksiciklino/kg kūno svorio(3–5 dienas) Kiaulės: 20 mg doksiciklino/kg kūno svorio 3–5 dienas	Mėsa ir plaučkepeniai: Broileriai – 6 paros. Negalima naudoti vištoms, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui. Kiaulės – 5 paros. Indikacijos: Broileriai – Pasteurella sooo, Mycoplasma spp, Haemophilus gallinarum, <i>Bordetella avium</i> ir <i>Chlamydia psittaci</i> sukeliama lėtinė kvėpavimo liga..

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka/indikacijos
Italija	SINTOFARM S.P.A. Via Togliatti n.5 42016 Guastalla (Reggio Emilia) ITALY	DOXIFARM 50%	Doksiciklino hiklatas	500 mg doksiciklino hiklato (prilygsta 433,3 mg doksiciklino 1 g vaisto)	Vandenyje tirpūs milteliai	broileriai, kiaulės	su geriamuoju vandeniu	Broileriai: 25 mg doksiciklino hiklato/kg kūno svorio(3–5 dienas) Kiaulės: 20 mg doksiciklino hiklato/kg kūno svorio 5 dienas	Mėsa ir plaučkepeniai: Broileriai – 6 paros. Negalima naudoti vištoms, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui. Kiaulės – 4 paros. Indikacijos: Broileriai – <i>Mycoplasma spp</i> , <i>Haemophilus paragallinarum</i> , <i>Escherichia coli</i> sukeltos kvėpavimo sistemos ligos gydymas ir kontrolė. <i>Clostridium perfringens</i> ir <i>Clostridium colinum</i> sukeltos plonosios žarnos uždegimas.
Italija	INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI TREI SpA Via Affarosa n.4 42010 Rio Saliceto (Reggio Emilia) ITALY	DOXIPAN 54	Doksiciklino hiklatas	500 g doksiciklino 1 kg vaisto	Vandenyje tirpūs milteliai	broileriai, kalakutai, kiaulės	su geriamuoju vandeniu	Broileriai: 10 mg doksiciklino/kg kūno svorio Kalakutai: 20 mg doksiciklino/kg kūno svorio Kiaulės: 10 mg doksiciklino/kg kūno svorio, 5 dienas	Mėsa ir plaučkepeniai: Broileriai – 3 paros. Negalima naudoti vištoms, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui. Kalakutai – 10 parų. Kiaulės – 4 paros. Indikacijos: Broileriai – lėtinė kvėpavimo liga. Kalakutai – mikoplazmų ir (arba) stafilokokų sukelti kvėpavimo ir sąnarių sindromai

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomend uojama dozė	Išlauka/ indikacijos
Italija	INTERVET ITALIA S.R.L. Via W. Tobagi n.7 20068 Peschiera Borromeo (Milano) ITALY	NAXOCET	Doksiciklino hiklatas	500 mg doksiciklino hiklato 1 g vaisto	Vandenyje tirpūs milteliai	broileriai	su geriamuoju vandeniu	Broileriai: 20 mg doksiciklino hiklato/kg kūno svorio, 5 dienas.	Mėsa ir plaučkepeniai: Broileriai – 8 paros. Negalima naudoti vištoms, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui. Indikacijos: <i>Mycoplasma spp.</i> sukeliama lėtinė kvėpavimo liga.
Lietuva	DOPHARMA B.V. Zalmweg 24, P.O. BOX 205 4940 AE Raamsdonksveer THE NETHERLANDS	DOXYCYCLINE 50 %, geriamieji milteliai	Doksiciklino hiklatas	500 mg/g	Geriamieji milteliai	Veršeliai, kiaulės ir naminiai paukščiai.	4–7 dienas su geriamuoju vandeniu	Naminiai paukščiai: 40 mg 1 kg kūno svorio, arba 200– 400 g per 1 000 litrų geriamojo vandens, 4– 7 dienas.	Mėsa ir plaučkepeniai: Naminiai paukščiai – 4 paros. Negalima naudoti paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui. Indikacijos: naminių paukščių gydymas: <i>Clamidia psittaci</i> sukeliama ornitozė, <i>E.</i> <i>coli</i> sukeliama kolibakteriozė, <i>Mycoplasma</i> <i>gallisepticum</i> sukeliama LKL.

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka/indikacijos
Lietuva	Lavet Pharmaceuticals Ltd., 1161 Budapest Ottó u. 14, Hungary	DOXYPRIM 40 % geriamieji milteliai	Doksiciklino hiklatas	400 mg/g	Geriamieji milteliai	Vištos, kalakutai ir kiaulės.	Vištoms ir kalakutams skiriama 5 dienas su geriamuoju vandeniu	Vištos ir kalakutai: 10–20 mg doksiciklino hiklato/kg kūno svorio per parą, taikoma pulsinis gydymas, kai reikiamas paros kiekis skiriamas kartu su nedideliu vandens kiekiu, kurį paukščiai išgeria per 4–8 valandas arba skiriamas nuolat 67–133 mg doksiciklino hiklato/1 l geriamojo vandens.	Mėsa ir plaučkepeniai: Valgomi vištų ir kalakutų audiniai – 4 paros. Indikacijos: Vištos ir kalakutai – lėtinės kvėpavimo sistemos ligos (<i>Mycoplasma gallisepticum</i> , <i>E. coli</i>), oro maišų uždegimas (<i>Mycoplasma meleagridis</i>), infekcinis sinovitas (<i>Mycoplasma synoviae</i>), kolibakteriozė (<i>E. coli</i>), paukščių cholera (<i>Pasteurella multocida</i>), kalakutų bordeteliozė (<i>Bordetella avium</i>), infekcinė sloga (<i>Haemophilus paragallinarum</i>), nekrozinis plonosios žarnos uždegimas (<i>Clostridium perfringens</i>), chlamidiozė (<i>Chlamydia psittaci</i>).
Lietuva	Eurovet Animal Health B.V. Handelsveg 25 PO Box 179 5530 AD Bladel THE NETHERLANDS	SOLUDOX 50 %, geriamieji milteliai	Doksiciklino hiklatas	500 mg/g	Geriamieji milteliai	Kiaulės ir vištos.	Skiriama peroraliniu būdu su geriamuoju vandeniu, 4 dienas.	Vištos: 10* mg doksiciklino hiklato/kg kūno svorio per parą, 4 dienas; 20* mg doksiciklino hiklato/kg	Indikacijos: Doksiciklinui jautrių mikroorganizmų, kaip antai <i>Pasteurella multocida</i> ir <i>Ornithobacterium rhinotracheale</i> sukeliomomis infekcijomis sergančių vištų gydymas.

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomend uojama dozė	Išlauka/ indikacijos
								kūno svorio per parą, 4 dienas. * Didžiausią dozę rekomenduoj ama naudoti gydant infekcijas, kurias sukelia vidutiniškai jautrių padermių bakterijų (minimali slopinamoji koncentracij a (MSK) iki 2 µg/ml) sukeliamas ligas, o mažiausia dozė skiriama gydant (labai) jautrių padermių (MSK iki 0,5–1,0 µg/ml) bakterijų sukeliamas ligas.	

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka/indikacijos
Nyderlandai	DOPHARMA B.V. Zalmweg 24, P.O. BOX 205 4940 AE Raamsdonksveer THE NETHERLANDS	Doxycycline-hyclaat 50%	Doksiciklino hiklatas	Viename grame miltelių: 500 mg doksiciklino hiklato.	Milteliai geriamajam tirpalui	Veršeliai, kiaušinių nededančios vištos ir kalakutai.	Kiaušinių nededančios vištos ir kalakutai: peroralinis, su geriamuoju vandeniu, pagal kūno svorį 4–7 dienas.	Kiaušinių nededančios vištos ir kalakutai: 20 mg doksiciklino hiklato/kg	Kalakutai – mėsa: 28 paros. Kiaušinių nededančios vištos – mėsa: 14 parų. Indikacijos Kalakutai: – <i>Chlamydia psittaci</i> sukelia ornitozė. – <i>E. coli</i> sukelia kolibakteriozė – <i>Mycoplasma gallisepticum</i> sukelia LKL Kiaušinių nededančios vištos – <i>E. coli</i> sukelia kolibakteriozė.
Nyderlandai	Dutch Farm Veterinary Pharmaceuticals B.V. Veemweg 1 3771 MT Barneveld THE NETHERLANDS	Doxycycline 20% W.O.	Doksiciklino hiklatas	Viename grame miltelių: 200 mg doksiciklino hiklato	Milteliai geriamajam tirpalui	Kiaušinių nededančios vištos	Peroralinis, su geriamuoju vandeniu, 3 dienas	10 mg doksiciklino hiklato/kg kūno svorio per parą, 3 dienas	Mėsa: 7 paros. Indikacija Kiaušinių nededančios vištos: – <i>Mycoplasma synoviae</i> sukeliamas poliartritas; – LKL, įskaitant sukeliamas <i>Mycoplasma gallisepticum</i> bakterijų; – <i>Escherichia coli</i> sukelia kolibakteriozė

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka/indikacijos
Nyderlandai	DOPHARMA B.V. Zalmweg 24, P.O. BOX 205 4940 AE Raamsdonksveer THE NETHERLANDS	Doxycycline-hyclaat 20%	Doksiciklino hiklatas	Viename grame miltelių: 200 mg doksiciklino hiklato.	Milteliai geriamajam tirpalui	Veršeliai, kiaulės, vištos ir kalakutai.	Vištos ir kalakutai: peroralinis, su geriamuoju vandeniu, 4–7 dienas.	Vištos ir kalakutai: 20 mg doksiciklino hiklato/kg kūno svorio	Kalakutai – mėsa: 28 paros. Vištos – mėsa: 14 parų, kiaušiniai: 10 parų. Indikacija Kalakutai: – <i>Chlamydia psittaci</i> sukeliama ornitozė – <i>E. coli</i> sukeliama kolibakteriozė – <i>Lycoplasma gallisepticum</i> sukeliama LKL Indikacija Vištos: – <i>E. coli</i> sukeliama kolibakteriozė – <i>Mycoplasma gallisepticum</i> sukeliama LKL
Nyderlandai	Dutch Farm International B.V. Nieuw Walden 112 1394 PE Nederhorst den Berg THE NETHERLANDS	Doxycycline 20% W.O.	Doksiciklino hiklatas	Viename grame miltelių: 200 mg doksiciklino hiklato.	Milteliai geriamajam tirpalui	Kiaušinių nededančios vištos (broileriai).	Peroralinis su geriamuoju vandeniu.	10 mg doksiciklino hiklato per kg kūno svorio/ parą 3 dienas.	Mėsa: 7 paros. Negalima naudoti vištoms, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui. Indikacija Kiaušinių nededančios vištos: – <i>Mycoplasma synoviae</i> sukeliama poliartritas; – LKL, įskaitant sukeliamas <i>Mycoplasma gallisepticum</i> ; – <i>Escherichia coli</i> sukeliama

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka/indikacijos
									kolibakteriozė.
Nyderlandai	DOPHARMA B.V. Zalmweg 24, P.O. BOX 205 4940 AE Raamsdonksveer THE NETHERLANDS	Doxycycline-hyclaat 50%	Doksiciklino hiklatas	Viename grame miltelių: 500 mg doksiciklino hiklato.	Milteliai geriamajam tirpalui	Veršeliai, kiaulės, kiaušinių nededančios vištos.	Kiaušinių nededančios vištos: peroralinis, su geriamuoju vandeniu, 4–5 dienas.	Kiaušinių nededančios vištos: 20 mg doksiciklino hiklato/kg kūno svorio per parą, 4–5 dienas.	Kiaušinių nededančios vištos – mėsa: 14 parų. Indikacija Kiaušinių nededančios vištos: – <i>E. coli</i> sukeliama kolibakteriozė – <i>Mycoplasma gallisepticum</i> sukeliama LKL
Nyderlandai	DOPHARMA B.V. Zalmweg 24, P.O. BOX 205 4940 AE Raamsdonksveer THE NETHERLANDS	Doxycycline 50% WSP	Doksiciklino hiklatas	Viename grame miltelių: 500 mg doksiciklino hiklato.	Milteliai geriamajam tirpalui	Kiaušinių nededančios vištos.	Kiaušinių nededančios vištos: peroralinis, su geriamuoju vandeniu.	Kiaušinių nededančios vištos: 25 mg doksiciklino hiklato/kg kūno svorio per parą, 3–5 dienas.	Kiaušinių nededančios vištos – mėsa: 6 paros. Indikacija Kiaušinių nededančios vištos: – <i>Mycoplasma spp.</i> (<i>M. gallisepticum</i> , <i>M. synoviae</i> ir <i>M. meleagridis</i>), <i>E. coli</i> ir <i>Haemophilus paragallinarum</i> sukeliama kvėpavimo

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomend uojama dozė	Išlauka/ indikacijos
									takų infekcijos; – <i>Clostridium perfringens</i> en <i>Clostridium colinum</i> sukeliamas plonosios žarnos uždegimas.
Nyderlandai	Interchemie Werken De Adelaar BV Hosterweg 26a 5811 Ccastenray THE NETHERLANDS	Doxy WS	doksiciklino hiklato	Viename grame miltelių: 200 mg doksiciklino hiklato.	Milteliai geriamajam tirpalui	Kiaušinių nededančios vištos (broileriai).	Peroralinis, su geriamuoju vandeniu.	10 mg doksiciklino hiklato/kg kūno svorio per parą 3 dienas.	Mėsa: 7 paros. Indikacija Kiaušinių nededančios vištos: – <i>Mycoplasma synoviae</i> sukeliamas poliartritas; – LKL, įskaitant sukeliamas <i>Mycoplasma gallisepticum</i> ; – <i>Escherichia coli</i> sukeliama kolibakteriozė.
Nyderlandai	Eurovet Animal Health B.V. Handelsveg 25 PO Box 179 5530 AD Bladel THE NETHERLANDS	Soludox 50%	Doksiciklino hiklatas	Viename grame miltelių: 500 mg doksiciklino hiklato.	Milteliai geriamajam tirpalui	Kiaulės ir kiaušinių nededančios vištos.	Kiaušinių nededančios vištos: peroralinis, su geriamuoju vandeniu.	Kiaušinių nededančios vištos: <i>Pasteurella multocida</i> sukeliama pastereliozė: 10 mg doksiciklino hiklato/kg kūno svorio	Kiaušinių nededančios vištos: (pastereliozė) – mėsa: 5 paros. (ORT) – mėsa: 12 parų. Negalima naudoti vištoms, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui.

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomend uojama dozė	Išlauka/ indikacijos
								per parą, 3–4 dienas; <i>Ornithobacterium rhinotracheale</i> (ORT) sukeliamos infekcijos: 20 mg doksiciklino hiklato/kg kūno svorio per parą, 3–4 dienas.	
Nyderlandai	Eurovet Animal Health B.V. Handelsveg 25 PO Box 179 5530 AD Bladel THE NETHERLANDS	Doxyfar 50%	Doksiciklino hiklatas	Viename grame miltelių: 500 mg doksiciklino hiklato.	Milteliai geriamajam tirpalui	Kiaulės ir kiaušinių nededančios vištos.	Kiaušinių nededančios vištos: peroralinis, su geriamuoju vandeniu.	Kiaušinių nededančios vištos: <i>Pasteurella multocida</i> sukeliamą pastereliozę: 10 mg doksiciklino hiklato/kg kūno svorio per parą, 3–4 dienas; <i>Ornithobacterium rhinotracheale</i> (ORT) sukeliamos kvėpavimo takų infekcijos: 20 mg doksiciklino hiklato/kg kūno svorio per parą, 3–	Kiaušinių nededančios vištos: (pastereliozė) – mėsa: 5 paros. (ORT) – mėsa: 12 parų. Negalima naudoti vištoms, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui.

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomend uojama dozė	Išlauka/ indikacijos
								4 dienas.	
Nyderlandai	Kepto B.V. Maagdenburgstra t 38 7421 ZE Deventer THE NETHERLANDS	Doxy 200 W.S.P.	Doksiciklino hiklatas	Viename grame miltelių: 200 mg doksiciklino hiklato.	Milteliai geriamajam tirpalui	Kiaušinių nededančios vištos (broileriai).	Peroralinis. su geriamuoju vandeniu.	10 mg doksiciklino hiklato/kg kūno svorio per parą 3 dienas.	Mėsa: 7 paros. Negalima naudoti vištoms, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui. Indikacija: – <i>Mycoplasma synoviae</i> sukeltas poliartritas; – LKL, įskaitant sukeliamas <i>Mycoplasma gallisepticum</i> ; – <i>Escherichia coli</i> sukeliama kolibakteriozė.
Nyderlandai	Eurovet Animal Health B.V. Handelsveg 25 PO Box 179 5530 AD Bladel THE NETHERLANDS	Soludox 50%	Doksiciklino hiklatas	Viename grame miltelių: 500 mg doksiciklino hiklato.	Milteliai geriamajam tirpalui	Kiaulės ir kiaušinių nededančios vištos.	Kiaušinių nededančios vištos: Peroralinis Su geriamuoju vandeniu.	Kiaušinių nededančios vištos: 10 mg doksiciklino hiklato/kg kūno svorio per parą, 3– 4 dienas.	Kiaušinių nededančios vištos – mėsa: 5 paros. Indikacija: <i>Pasteurella multocida</i> sukeliama pastereliozė.

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka/indikacijos
Nyderlandai	Laboratorios Karizoo S.A Polígono Industrial La Borda Mas Pujades 11-12 08140 Caldes de Montbui Barcelona SPAIN	Karidox 10% Oral Solution	Doksiciklino hiklatas	Viename mililitrų: 100 mg doksiciklino (hiklato).	Geriamasis tirpalas	Kiaulės ir vištos (broileriai).	Vištos (broileriai): peroralinis, su geriamuoju vandeniu.	Vištos (broileriai): 10–20 mg doksiciklino/kg kūno svorio per parą, 3–5 dienas	Vištos (broileriai) – mėsa: 7 paros. Indikacija: Doksiciklinui jautrių mikroorganizmų sukeltų LKL ir mikoplazmozės gydymas ir profilaktika.
Nyderlandai	Huvepharma, Uitbreidingstraat 80 2600 Antwerpen BELGIUM	HydroDox 500 mg/g	Doksiciklino hiklatas	Per g: 500 mg doksiciklino hiklatas.	Milteliai geriamajam tirpalui	Kiaulės ir vištos (broileriai).	Vištos (broileriai): peroralinis, su geriamuoju vandeniu.	Vištos (broileriai): 20 mg doksiciklino/kg kūno svorio per parą, 3–5 dienas	Vištos (broileriai) – Mėsa: 6 paros. Negalima naudoti vištoms, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui.
Nyderlandai	CHEMO IBERICA, S.A. Gran Via Carlos III, 98 7 ^a Edificio Trade 08028 Barcelona SPAIN	Soldoxin	Doksiciklino hiklatas	Viename mililitrų: 100 mg doksiciklino (hiklato).	Geriamasis tirpalas	Kiaulės ir vištos (broileriai).	Vištos (broileriai): peroralinis, su geriamuoju vandeniu.	Vištos (broileriai): 10–20 mg doksiciklino/kg kūno svorio per parą, 3–5 dienas	Vištos (broileriai) – Mėsa: 7 paros. Negalima naudoti vištoms, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui. Indikacija: Doksiciklinui jautrių mikroorganizmų sukeltų LKL ir mikoplazmozės gydymas ir profilaktika.
Lenkija	DOPHARMA B.V. Zalmweg 24, P.O. BOX 205 4940 AE Raamsdonksveer THE NETHERLANDS	Doxymed 50	Doksiciklino hiklatas	500 mg/g	Milteliai geriamajam tirpalui	Vištos	250–500 ml vaisto/1000 l geriamojo vandens	25 mg doksiciklino hiklato/kg kūno svorio per parą, 3–5 dienas	Mėsa ir plaučkepeniai: 4 paros. Negalima naudoti kiaušinius dedančioms vištoms.

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka/indikacijos
Lenkija	Eurovet Animal Health B.V. Handelsveg 25 PO Box 179 5530 AD Bladel THE NETHERLANDS	Soludox 50%	Doksiciklino hiklatas	500 mg/g	Geriamieji milteliai	Vištos	2 g vaisto/ 100 kg kūno svorio per parą gydant pastereliozę arba 4 g vaisto/ 100 kg kūno svorio per parą gydant <i>Ornithobacterium rhinotracheale</i> infekciją.	10 mg doksiciklino hiklato/kg kūno svorio per parą gydant pastereliozę arba 20 mg doksiciklino hiklato/kg kūno svorio per parą gydant <i>Ornithobacterium rhinotracheale</i> bakterijų infekciją, 3–4 dienas.	Mėsa ir plaučkepeniai: 5 paros gydant pastereliozę. 12 parų gydant <i>Ornithobacterium rhinotracheale</i> bakterijų infekciją. Negalima naudoti kiaušinius dedančioms vištom.
Lenkija	Laboratorios Hipra S.A. Avda La Selva 135 17170 Amer (Girona) SPAIN	Hipradoxi-S	Doksiciklino hiklatas	100 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vištos	0,5–1,0 ml vaisto/l geriamojo vandens	50–100 mg doksiciklino hiklato/l geriamojo vandens, 3–5 dienas	Mėsa ir plaučkepeniai: 5 paros. Negalima naudoti kiaušinius dedančioms vištom.
Lenkija	Oropharma n.v. Dijkstraat 30 9140 Temse BELGIUM	Ornicure	Doksiciklino hiklatas	300 mg/4 g	Geriamieji milteliai	balandžiai, papūgos	Balandžiai: 4 g vaisto 2 litrams geriamojo vandens, papūgos: 4 g vaisto 0,5 litro	15 mg/kg kūno svorio per parą, 5 dienas; gydant papūgų ligą arba	Negalima naudoti balandžiams, kurie skirti žmonių maistui.

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka/indikacijos
								klinikinę ornitozę – 3–4 savaites	
Lenkija	Novartis Animal Health d.o.o. Verovskava 57 1000 Ljubljana SLOVENIA	Doxeryl 50%	Doksiciklino hiklatas	500 mg/g	Milteliai geriamajam tirpalui	Vištos (broileriai)	25 mg doksiciklino hiklato/kg kūno svorio per parą	25 mg doksiciklino hiklato/kg kūno svorio per parą, 3–5 dienas	Mėsa ir plaučkepeniai: 4 paros. Negalima naudoti kiaušinius dedančioms vištom.
Lenkija	S.P. Veterinaria SA Crtá. Reus Vinyols Km 4.1 Apartado 60 Riudoms 43330 (Tarragona) SPAIN	Doxivex 10%	Doksiciklino hiklatas	100 mg/ml	Koncentratas geriamajam tirpalui	Vištos (broileriai)	05–1,0 ml vaisto/l geriamojo vandens	50–100 mg doksiciklino hiklato/l geriamojo vandens per parą, 3–5 dienas	Mėsa ir plaučkepeniai: 7 paros. Negalima naudoti kiaušinius dedančioms vištom.
Lenkija	CHEMO IBERICA, S.A. Gran Via Carlos III, 98 7ª Edificio Trade 08028 Barcelona SPAIN	Oridox	Doksiciklino hiklatas	100 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vištos (broileriai)	05–1,0 ml vaisto/l geriamojo vandens	10–20 mg doksiciklino hiklato/kg kūno svorio per parą, 3–5 dienas	Mėsa ir plaučkepeniai: 7 paros. Negalima naudoti kiaušinius dedančioms vištom.
Lenkija	Laboratorios Karizoo S.A Polígono Industrial La Borda Mas Pujades 11-12 08140 Caldes de Montbui Barcelona SPAIN	Karidox	Doksiciklino hiklatas	100 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vištos (broileriai)	05–1,0 ml vaisto/l geriamojo vandens	10–20 mg doksiciklino hiklato/kg kūno svorio per parą, 3–5 dienas	Mėsa ir plaučkepeniai: 7 paros. Negalima naudoti kiaušinius dedančioms vištom.

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomend uojama dozė	Išlauka/ indikacijos
Lenkija	Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego S.A. Grójecka 6 05-651 Drwalew POLAND	Doxymina 20%	Doksiciklino hiklatas	200 mg/g	Geriamieji milteliai	Vištos	25–50 g vaisto/l geriamojo vandens	10 mg doksiciklino hiklato/kg kūno svorio per parą, 3– 5 dienas	Mėsa ir plaučkepeniai: 7 paros. Negalima naudoti kiaušinius dedančioms vištom.
Lenkija	V.M.D.n.v./ s.a. Hoge Muew 900 2370 Arendonk BELGIUM	Doxycycline hyclate 50%	Doksiciklino hiklatas	500 mg	Milteliai geriamajam tirpalui	Vištos	25 mg doksiciklino hiklato/kg kūno svorio per parą	25 mg doksiciklino hiklato/kg kūno svorio per parą, 3– 5 dienas	Mėsa ir plaučkepeniai: 5 paros. Negalima naudoti kiaušinius dedančioms vištom.
Lenkija	INDUSTRIAL VETERINARIA S.A. Esmeralda, 19 - 4º 08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT SPAIN	Doxinyl	Doksiciklino hiklatas	100 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vištos (broileriai)	0,5– 1,0 ml vaisto/l geriamojo vandens per parą	50–100 mg doksiciklino hiklato/l geriamojo vandens, 3– 5 dienas	Mėsa ir plaučkepeniai: 7 paros. Negalima naudoti kiaušinius dedančioms vištom.
Lenkija	Biofaktor Sp. z o.o.(Skierniewice) Czysta 4 96-100 Skierniewice POLAND	Doxycyclinum 20%	Doksiciklino hiklatas	200 mg/ml	Milteliai geriamajam tirpalui	Vištos, kalakutai	25–50 g vaisto/l geriamojo vandens	10 mg doksiciklino hiklato/kg kūno svorio per parą, 3– 5 dienas	Mėsa ir plaučkepeniai: 4 paros. Negalima naudoti kiaušinius dedančioms vištom.
Lenkija	Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. Fleminga 2 03-176 Warszawa POLAND	Doxycyclinum wet proszek	Doksiciklino hiklatas	200 mg/g	Milteliai geriamajam tirpalui	Vištos, kalakutai,	25–50 g miltelių/l geriamojo vandens	10 mg doksiciklino hiklato/kg kūno svorio per parą, 3– 5 dienas	Mėsa ir plaučkepeniai: 7 paros. Negalima naudoti kiaušinius dedančioms vištom.
Lenkija	Sogeval Laboratoires 200 route De Mayenne 53 022 Laval Cedex FRANCE	DOXYVAL 20%	Doksiciklino hiklatas	20 g/ 100 g	Geriamieji milteliai	Vištos (broileriai)	5 g vaisto 100 kg kūno svorio per parą arba 0,5 g – /l geriamojo vandens	10 mg doksiciklino hiklato/kg kūno svorio per parą, 3– 5 dienas	Mėsa ir plaučkepeniai: 4 paros. Negalima naudoti kiaušinius dedančioms vištom.

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka/indikacijos
Lenkija	Eurovet Animal Health B.V. Handelsveg 25 PO Box 179 5530 AD Bladel THE NETHERLANDS	Soludox 15%	Doksiciklino hiklatas	150 mg/g	Geriamieji milteliai	Vištos, kalakutai, balandžiai, narvuose laikomi paukščiai	10–20 mg doksiciklino hiklato/kg kūno svorio per parą	10–20 mg/kg kūno svorio per parą, 3–5 dienas. Gydant <i>Chlamydia psittaci</i> bakterijų infekciją – 30–45 dienas.	Mėsa ir plaučkepeniai: 7 paros. Negalima naudoti kiaušinius dedančioms vištoms arba balandžiams, kurie skirti žmonių maistui.
Portugalija	CEVA Saúde Animal –Produtos farmacêuticos e Imunológicos Lda. Ceva Saúde Animal Lda. Rua Doutor António Loureiro Borges 9/9ª 9º A Miraflores 1495-131 Algés PORTUGAL	DOXYPRIM 400 mg / g Pó para Solução Oral para Suínos, Frangos e Perus.	Doksiciklino hiklatas	doksiciklino hiklato 400 mg / g	Milteliai geriamajam tirpalui	Kiaulės, vištos, kalakutai	Peroraliniu būdu, su geriamuoju vandeniu	Broileriai ir kalakutai: 20 mg doksiciklino hiklato/kg kūno svorio, 5 dienas.	Vištos (broileriai) – mėsa ir plaučkepeniai - 5 paros; Kalakutai mėsa ir plaučkepeniai - 6 paros; Negalima naudoti dedantiems paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui.
Portugalija	DIVASA FARMAVIC DE PORTUGAL Produtos e Equipamentos Veterinários Lda. Parque Empresarial de Vialonga Armazém nº 21 Casal do Bagulho Granja de Alpriate 2625-607 Vialonga PORTUGAL	DOXYVET-10	Doksiciklino hiklatas	doksiciklino hiklato 10 g; Bromexin Cloridrate 1g	Geriamasis tirpalas	Galvijai (veršeliai), kiaulės, broileriai, kalakutai, avys, ožkos (ožkiukai)	Peroraliniu būdu, su geriamuoju vandeniu	Broileriai ir kalakutai: 50–100 mg/litrui vandens per parą, 3–5 dienas (prilygsta 0,5–1 ml DOXYVET–10 / litrui vandens per parą)	Mėsa ir plaučkepeniai: 5 paros

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka/indikacijos
Portugalija	DOPHARMA B.V. Zalmweg 24, P.O. BOX 205 4940 AE Raamsdonksveer THE NETHERLANDS	VETADOXI 50	Doksiklino hiklatas	doksiklino hiklato 500 mg/g	Geriamieji milteliai	Galvijai (veršeliai), kiaulės ir paukščiai	Peroraliniu būdu, su geriamuoju vandeniu, pienu ar pašaru	25 mg/kg kūno svorio (paukščiai); 200 g/1000 l vandens per parą, 3–5 dienas; 500 g/1000 l geriamojo vandens (paukščiai)	Mėsa ir plaučkepeniai: 5 paros. Negalima naudoti dedantiems paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui.
Portugalija	S.P. Veterinaria SA Crt. Reus Vinyols Km 4.1 Apartado 60 Riudoms 43330 (Tarragona) SPAIN	Hidrodox 10% Concentrado para solução oral para aves (frangos de carne) e suínos	Doksiklino hiklatas	Doksiklino (hiklato) 100 mg	Koncentrata s geriamajam tirpalui	Vištos (broileriai) ir kiaulės	Peroraliniu būdu, su geriamuoju vandeniu	Broileriai: 50–100 mg doksiklino hiklato/l geriamojo vandens per parą (0,5–1,0 ml veterinarinio vaisto/geriamojo vandens per parą), 3–5 dienas.	Paukščiai (broileriai) Mėsa ir plaučkepeniai - 7 paros. Negalima naudoti dedantiems paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui.
Portugalija	Univete SA Rua D. Jerónimo Osório, 5 B 1400-119 Lisboa PORTUGAL	UNIDOXINA 200 mg/ml solução oral para suínos e aves	Doksiklino hiklatas	Doksiklino (hiklato) 200 mg	Geriamasis tirpalas	Vištos (broileriai) ir kiaulės	Peroraliniu būdu, su geriamuoju vandeniu	Broileriai ir kalakutai: 20 mg doksiklino hiklato/kg kūno svorio, 5 dienas.	Vištos (broileriai) – mėsa ir plaučkepeniai - 7 paros. Negalima naudoti dedantiems paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui.

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka/indikacijos
Rumunija	DELOS IMPEX* 96 SRL 17, Pictor Ștefan Luchian sector 2 Bucharest ROMANIA	Doxidem 20	Doksiciklino hiklatas	200 mg/ml doksiciklino hiklato	Geriamasis tirpalas	Naminiai paukščiai (negalima naudoti paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui)	Peroralinis	– 75 ml vaisto/100 litrų geriamojo vandens per parą, 3–5 dienas iš eilės – jauniems naminiams paukščiams iki 4 savaičių – 150 ml vaisto/100 litrų geriamojo vandens per parą, 3–5 dienas iš eilės – suaugusiems naminiams paukščiams	Mėsa ir plaučkepeniai - 28 paros Indikacijos: Naminiai paukščiai – mikoplazmozės, pastereliozės, kolibakteriozė, stafilokokozės gydymas. Lėtinė kvėpavimo liga, <i>Pasteurella spp.</i>, <i>Mycoplasma spp.</i>, <i>Salmonella spp.</i>, <i>E. coli.</i>, <i>Haemophilus paragallinarium</i>, <i>Staphylococcus</i> sukeltos infekcijos, kampilobakterijų sukeltas hepatitas ir dermatitas.

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka/indikacijos
Rumunija	DELOS IMPEX* 96 SRL 17, Pictor Ștefan Luchian sector 2 Bucharest ROMANIA	Doxidem 50	Doksiciklino hiklatas	500 mg/g doksiciklino hiklato	Vandenyje tirpūs milteliai	Naminiai paukščiai (negalima naudoti paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui) Kiaulės	Peroralinis (su geriamuoju vandeniu)	– 20–40 mg vaisto/kg kūno svorio per parą, 5 dienas iš eilės, <i>per os</i> ; '– 200–300 g vaisto/1000 l geriamojo vandens, 5 dienas iš eilės	Mėsa ir plaučkepeniai - 28 paros Indikacijos: lėtinė kvėpavimo liga, <i>Pasteurella spp.</i> , <i>Mycoplasma spp.</i> , <i>Salmonella spp.</i> , <i>E. coli.</i> , <i>Haemophilus paragallinarium</i> , stafilokokų sukeltos bakterijos, kampilobakterijų sukeltas hepatitas, dermatitas ir kitos doksiciklinui jautrių mikroorganizmų sukeltos ligos.
Rumunija	DOPHARMA B.V. Zalmweg 24, P.O. BOX 205 4940 AE Raamsdonksveer THE NETHERLANDS	Doxycycline 50% WSP	Doksiciklino hiklatas	500 mg/g doksiciklino hiklato	Vandenyje tirpūs milteliai	Naminiai paukščiai (negalima naudoti paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui) Veršeliai Kiaulės	Peroralinis (su geriamuoju vandeniu)	40 mg/kg kūno svorio arba 200–400 g/1000 l geriamojo vandens, 4–7 dienas	Mėsa ir plaučkepeniai - Naminiai paukščiai 4 paros Indikacijos: <i>Chlamydia psittaci</i> sukeliamas ornitozė (kalakutai); '– <i>E. coli</i> sukeliamas kolibakteriozė (vištos ir kalakutai); '– <i>Mycoplasma gallisepticum</i> sukeliamos LKL (vištos ir kalakutai);

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka/indikacijos
Rumunija	FRANVET ZI d'Etriche-Route d'Avire BP 103 49500 Segré Cedex FRANCE	Doxy 5 Franvet	Doksiciklino hiklatas	50 mg/g doksiciklino (hiklato)	Vandenyje tirpūs milteliai	Naminiai paukščiai (negalima naudoti paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui) Veršeliai Kiaulės	Peroralinis (su geriamuoju vandeniu arba skystu pašaru)	1 g vaisto/l geriamojo vandens per parą, 3–5 dienas – naminiam paukščiui iki 2 savaičių; 2 g vaisto/l geriamojo vandens per parą, 3–5 dienas naminiam paukščiui nuo 2 savaičių	Mėsa ir plaučkepeniai - naminiai paukščiai – 4 paros Indikacijos: the Doksiciklinui jautrių mikroorganizmų sukeltų kvėpavimo takų infekcijų gydymas ir profilaktika.
Rumunija	INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI TREI SpA Via Affarosa n.4 42010 Rio Saliceto (Reggio Emilia) ITALY	Doxipan 20	Doksiciklino hiklatas	200 mg/g doksiciklino hiklato	Vandenyje tirpūs milteliai	Naminiai paukščiai Kiaulės	Peroralinis (su geriamuoju vandeniu)	5–7,5 g/10 l geriamojo vandens	Mėsa ir plaučkepeniai - naminiai paukščiai – 5 paros Indikacijos: Lėtinė kvėpavimo liga ir susijusios komplikacijos.
Rumunija	PHYLAXIA PHARMA LTD 1103 Budapest Gergely u.79 HUNGARY	Doxyphyl SP A.U.V.	Doksiciklino hiklatas	300 mg/g doksiciklino hiklato	Vandenyje tirpūs milteliai	Naminiai paukščiai (viščiukai, vištos, kalakutai)	Peroralinis (su geriamuoju vandeniu)	10 mg/kg kūno svorio, 3–5 dienas arba 100 mg vaisto/l geriamojo vandens	Viščiukai, vištos: 7 paros Kalakutai: 7 paros (negalima naudoti paukščiui, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui). Indikacijos: Kelių bakterinių infekcijų gydymas ir profilaktika.

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomend uojama dozė	Išlauka/ indikacijos
Rumunija	LABORATORIOS SYVA S.A. Avda. Parroco Pablo Diez, 49-57 24010 Leon SPAIN	Syvadox 10%	Doksiciklino hiklatas	100 mg/1 ml doksiciklino (hiklato)	Geriamasis tirpalas	Vištos (negalima naudoti paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui)	Peroralinis (su geriamuoju vandeniu)	50–100 mg doksiciklino/l geriamojo vandens per parą (prilygsta 0,5–1,0 ml vaisto/l geriamojo vandens per parą, 3–5 dienas	Vištos – 7 paros (negalima naudoti paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui). Indikacijos: pirmiau minėtų doksiciklinui jautrių bakterijų sukeliamos kolibakteriozė, LKL, mikoplazmozė.
Rumunija	VMD Berendonk 74 2370 Arendonk BELGIUM	Doxyveto 50S	Doksiciklino hiklatas	500 mg/g doksiciklino (hiklato)	Vandenyje tirpūs milteliai	Naminiai paukščiai Kiaulės Veršeliai Ėriukai	Peroralinis (su geriamuoju vandeniu arba pašaru)	20 mg doksiciklino/ kg kūno svorio per parą su geriamuoju vandeniu arba 300 g vaisto/1000 l geriamojo vandens arba 600 g /1000 kg pašaro, 3–5 dienas	Naminiai paukščiai – 8 paros Indikacijos: LKL (<i>Mycoplasma gallisepticum</i>), ornitozė (<i>Chlamidia psittaci</i>), infekcinis sinovitas (<i>Mycoplasma synoviae</i>), paukščių cholera (<i>Pasteurella multocida</i>).
Rumunija	CHEMIFARMA S.p.A Via Don Eugenio Servadei 16 47100 Forlì ITALY	Doxiciclina 50%	Doksiciklino hiklatas	500 mg/g doksiciklino	Vandenyje tirpūs milteliai	Vištos (broileriai) Kiaulės	Peroralinis (<i>per os</i> , su geriamuoju vandeniu arba skystu pašaru)	40 g vaisto/100 kg kūno svorio (20 mg of doksiciklino/ kg kūno svorio) prilygsta maždaug 15–30 g vaisto/100 l vandens, 3–	Broileriai – 5 paros Indikacijos: lėtinė kvėpavimo liga ir kitos kvėpavimo sistemos ligos, ypač sukeliamos <i>Pasteurella spp.</i> , <i>Mycoplasma spp.</i> , <i>Haemophilus gallinarium</i> , <i>Bordetella avium</i> ir <i>Chlamidia psittaci</i> bakterijų.

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka/indikacijos
								5 dienas.	
Rumunija	Lavet Pharmaceuticals Ltd., 1161 Budapest Ottó u. 14, Hungary	Doxiprim 40% Soluble Powder	Doksiciklino hiklatas	400 mg/g doksiciklino hiklato	Vandenyje tirpūs milteliai	Vištos Kalakutai (negalima naudoti paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui) Kiaulės	Peroralinis (su geriamuoju vandeniu)	20 mg doksiciklino hiklato/kg kūno svorio	Vištos ir kalakutai – 4 paros (negalima naudoti paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui). Indikacijos: doksiciklinui jautrių organizmų sukeliamų kvėpavimo, žarnyno ir sisteminių infekcijų LKL (<i>Mycoplasma gallisepticum</i> , <i>E. coli</i>), oro maišų uždegimo (<i>Mycoplasma maleagris</i>), infekcinio sinovito (<i>Mycoplasma synoviae</i>), paukščių choleros (<i>Pasteurella multocida</i>), infekcinės slogos (<i>Haemophilus paragallinarum</i>), kolibakteriozės (<i>E. coli</i>), kalakutų bordeteliozės (<i>Bordetella avium</i>), nekrozinio plonosios žarnos uždegimo (<i>Clostridium perfringens</i>),

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka/indikacijos
									chlamidiozės (<i>Chlamidia psittaci</i>) gydymas. Stresą keliančių aplinkybių, vakcinacijos, laikymo vietos pokyčių ir vežimo sukeltų antrinių bakterijų profilaktika..
Rumunija	Novartis Animal Health d.o.o. Verovskava 57 1000 Ljubljana SLOVENIA	Doxeryl 50%	Doksiciklino hiklatas	500 mg/g doksiciklino hiklato	Vandenyje tirpūs milteliai	Naminiai paukščiai (negalima naudoti paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui) Kiaulės	Peroralinis (su geriamuoju vandeniu)	25 mg doksiciklino hiklato/kg kūno svorio, 3–5 dienas iš eilės.	Naminiai paukščiai – 4 paros (negalima naudoti paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui). Indikacija: <i>Mycoplasma spp.</i> (<i>M. gallisepticum</i> , <i>M. synoviae</i> ir <i>M. melagris</i>), <i>E. coli</i> , <i>Haemophilus paragallinarum</i> ir <i>Ornithobacterium rhinotracheale</i> sukeltos kvėpavimo takų infekcijos. <i>Clostridium</i>

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka/indikacijos
									<i>perfringens</i> ir <i>Clostridium colinum</i> sukeliama plonosios žarnos uždegimas. <i>Pasteurella multocida</i> sukeliama kraujo užkrėtimas.
Rumunija	CEVA SANTE ANIMALE ROMANIA SRL 5 Chindiei , sector 4, Bucharest ROMANIA	Doxyvit 50% WSP	Doksiciklino hiklatas	500 mg/g doksiciklino hiklato	Vandenyje tirpūs milteliai	Naminiai paukščiai (vištos ir kalakutai) (negalima naudoti paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui) Kiaulės	Peroralinis (su geriamuoju vandeniu)	15 mg doksiciklino/kg kūno svorio, 5 dienas iš eilės arba 2 g vaisto/10 l geriamojo vandens ir prilygsta 100 mg doksiciklino/l geriamojo vandens	Naminiai paukščiai (vištos ir kalakutai) – 7 paros (negalima naudoti paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui). Indikacijos: Kolibakteriozė, LKL ir mikoplazmozė, <i>Clostridium perfringens</i> , chlamidiozė, <i>Bordetella avium</i> sukeliama infekcinė sloga.
Rumunija	Laboratorios Karizoo S.A Polígono Industrial La Borda Mas Pujades 11-12 08140 Caldes de Montbui Barcelona SPAIN	Karidox 100 mg/ml oral solution for use in drinking water for chickens and pigs	Doksiciklino hiklatas	100 mg/ml doksiciklino (hiklato)	Geriamasis tirpalas	Naminiai paukščiai (vištos) (negalima naudoti paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui) Kiaulės	Peroralinis (su geriamuoju vandeniu)	10–20 mg doksiciklino/kg kūno svorio, 3–5 dienas.	Naminiai paukščiai (vištos) t? paros (negalima naudoti paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui). Indikacijos: Doksiciklinui jautrių mikroorganizmų

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka/indikacijos
									sukeliamų LKL ir mikoplazmozės gydymas ir profilaktika.
Rumunija	S.C. VIM SPECTRUM SRL 409 Sighisoarei Targu Mures ROMANIA	Vidoxim 10% powder for oral solution for pigs and poultry	Doksiciklino hiklatas	100 mg/g doksiciklino hiklato	Vandenyje tirpūs milteliai	Naminiai paukščiai (negalima naudoti paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui) Kiaulės	Peroralinis (su geriamuoju vandeniu)	1000 g vaisto/1000 l geriamojo vandens, 5 dienas	Naminiai paukščiai 10 parų (negalima naudoti paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui). Indikacijos: <i>Mycoplasma gallisepticum</i> , <i>E. coli</i> , <i>Bordetella avium</i> , <i>Haemophilus paragallinarium</i> ir <i>Pasteurella multocida</i> sukeltos infekcijos.
Rumunija	S.C. VIM SPECTRUM SRL 409 Sighisoarei Targu Mures ROMANIA	Vidoxim 100% powder for oral solution for pigs and poultry	Doksiciklino hiklatas	1000 mg/g doksiciklino hiklato	Vandenyje tirpūs milteliai	Naminiai paukščiai (negalima naudoti paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui) Kiaulės	Peroralinis (su geriamuoju vandeniu)	100 g vaisto/1000 l geriamojo vandens, 5 dienas	Naminiai paukščiai – 10 parų (negalima naudoti paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui). Indikacijos: <i>M. gallisepticum</i> , <i>E. coli</i> , <i>Bordetella avium</i> , <i>Haemophilus paragallinarium</i> ir <i>P. multocida</i> sukeltos infekcijos.

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka/indikacijos
Rumunija	CHEMO IBERICA, S.A. Gran Via Carlos III, 98 7 ^a Edificio Trade 08028 Barcelona SPAIN	Oridox (Soldoxin) 100 mg/ml oral solution for use in drinking water for chickens and pigs	Doksiciklino hiklatas	100 mg/ml doksiciklino (hiklato)	Geriamasis tirpalas	Vištos (broileriai) (negalima naudoti paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui) Kiaulės	Peroralinis (su geriamuoju vandeniu)	10–20 mg doksiciklino/kg kūno svorio, 3–5 dienas.	Naminiai paukščiai (vištos) – 7 paros (negalima naudoti paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui). Doksiciklinui jautrių mikroorganizmų sukeliama LKL ir mikoplazmozės gydymas ir profilaktika.
Rumunija	Huvepharma N.V. Uitbreidingstraat 80 2600 Antwerpen BELGIUM	HydroDoxx 500 mg/g Water Soluble Powder	Doksiciklino hiklatas	500 mg/g doksiciklino hiklato	Milteliai geriamajam tirpalui	Vištos (broileriai) ir kiaušės (mėsinės kiaušės)	Peroralinis (su geriamuoju vandeniu)	20 mg doksiciklino (hiklato)/kg x 3–5 dienas	Mėsa ir plaukėpeniai: vištos – 6 paros. Negalima naudoti dedantiems paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui. Indikacijos: vištos (broileriai): <i>Mycoplasma gallisepticum</i> sukeltos lėtinės kvėpavimo ligos (LKL) gydymas ir profilaktika.
Rumunija	CEVA PHYLAXIA VETERINARY BIOLOGICALS CO. LTD. 1107 Budapesta Szallas u.5 HUNGARY	Doxivit 100	Doksiciklino hidrochloridas	100 mg/g doksiciklino hidrochlorido	Vandenyje tirpūs milteliai	Naminiai paukščiai (vištos, kalakutai ir žąsys) Kiaulės	Peroralinis (su geriamuoju vandeniu)	10 mg doksiciklino hidrochlorido /kg kūno svorio per parą, 5 dienas	Naminiai paukščiai – 7 paros (negalima naudoti paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui). Indikacijos: LKL (<i>Mycoplasma gallisepticum</i> , <i>E. coli</i>), infekcinė sloga (<i>Haemophilus paragallinarum</i>),

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka/indikacijos
									paukščių cholera (<i>Pasteurella multocida</i>), kolibakteriozė (<i>E. coli</i>), oro maišų uždegimas (<i>Mycoplasma maleagris</i>), chlamidžiozė (<i>Chlamidia psittaci</i>), nekrozinis plonosios žarnos uždegimas (<i>Clostridium perfringens</i>).
Rumunija	PHARMATEKA BT 1046 Budapest Szigyarto u. 10 / 20 Kossuth Str. Pusztaberki, 2658 HUNGARY	DOXY H 10%	Doksiciklino hidrochloridas	100 mg/g doksiciklino hidrochlorid o	Vandenyje tirpūs milteliai	Naminiai paukščiai	Peroralinis (su geriamuoju vandeniu)	1 g vaisto/l geriamojo vandens, 3– 5 dienas	Naminiai paukščiai – 10 parų (negalima naudoti paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui).
Rumunija	s.c. romvac company s.a.Șos. Centurii, nr. 7 Voluntari ROMANIA	Doxiciclina 10%	Doksiciklino hidrochloridas	100 mg/g doksiciklino hidrochlorid o	Vandenyje tirpūs milteliai	Naminiai paukščiai, įskaitant balandžius Kiaulės Galvijai (veršeliai)	Peroralinis (su geriamuoju vandeniu)	2 g vaisto/10 kg kūno svorio per parą, 5– 8 dienas	Naminiai paukščiai (vištos) – 5 paros (negalima naudoti paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui).
Rumunija	S.C. Crida pharm s.r.l 2 Intrarea Vagonetului Bl. 101, Ap. 47, sector 6 Bucharest ROMANIA	Doxicol 60%	Doksiciklino hidrochloridas	600 mg/g doksiciklino hidrochlorid o	Vandenyje tirpūs milteliai	Naminiai paukščiai Kiaulės	Peroralinis (su geriamuoju vandeniu arba feed)	Broileriai 0– 14 parų: 50 g/1000 l vandens; broileriai 15 –28 paros: 100 g/1000 l vandens; broileriai 29 –35 paros: 120 g/1000 l	Naminiai paukščiai 5 paros (negalima naudoti paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui). Indikacijos: Kolibakteriozės, kvėpavimo sistemos ligų, mikoplazmozės gydymas ir

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka/indikacijos
								vandens;	profilaktika.
Slovėnija	Novartis Veterina d.o.o. Verovškova 57 1000 Ljubljana SLOVENIA	DOXYRIL 50%	Doksiciklino hiklatas	50% (500 mg/g)	Milteliai geriamajam tirpalui	Kiaulės, naminiai paukščiai	Kiaulės ir naminiai paukščiai: vieną kartą per parą, 3–5 dienas iš eilės, su geriamuoju vandeniu	Kiaulės: 20 mg doksiciklino hiklato 1 kg kūno svorio; Naminiai paukščiai: 25 mg doksiciklino hiklato/kg kūno svorio	Mėsa ir plaučkepeniai: naminiai paukščiai – 4 paros; Indikacijos: kvėpavimo sistemos infekcijos (<i>M. gallisepticum</i> , <i>M. synoviae</i> ir <i>M. melagris</i>), <i>Escherichia coli</i> , <i>Haemophilus paragallinarum</i> , <i>Ornithobacterium rhinotracheale</i> ; plonosios žarnos uždegimas (<i>Clostridium perfringens</i> ir <i>Clostridium colinum</i> ; kraujo užkrėtimas (<i>Pasteurella multocida</i>).

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka/indikacijos
Slovakija	Trei Bio pharmaceutical division, Industria Italiana Integratori Trei Via Affarosa n.4 42010 Rio Saliceto (Reggio Emilia) ITALY	DOXIPAN 20 plv.sol. ad us.vet.	Doksiciklino hiklatas	20 g/100 g	Vandenyje tirpūs milteliai	Veršeliai, kiaulės, naminiai paukščiai–broileriai, kalakutai	5 dienas, su geriamuoju vandeniu	Naminiai paukščiai – broileriai: 5–7,5 g vaisto/10 l geriamojo vandens. Kalakutai: 10–20 mg veikliosios medžiagos/kg ūno svorio prilygsta 50–100 g vaisto/100 litrų geriamojo vandens. Veršeliai, kiaulės: 10 mg veikliosios medžiagos/kg ūno svorio per parą prilygsta 0,5 g vaisto/10 kg kūno svorio	Mėsa: broileriai – 5 paros, kalakutai – 10 parų. Indikacijos: broileriai – lėtinė kvėpavimo liga ir susijusios komplikacijos Kalakutai: Gramteigiamų ir gramneigiamų bakterijų, doksiciklinui jautrių mikropazmų sukeltos infekcijos, ypač mikoplazmų ir (arba) stafilokokų sukelti kvėpavimo ir sąnarių sindromai.
Slovakija	DIVASA-FARMAVIC, S.A. CTRA. SANT HIPOLIT, KM. 71 08503 GURB – VIC SPAIN	DOXIVET 10% plv.sol. a.u.v.	Doksiciklino hiklatas	100 mg/ml	Vandenyje tirpūs milteliai	Naminiai paukščiai: (vištos ir kalakutai), Galvijai ir kiaulės	4–5 dienas su geriamuoju vandeniu	0,5 ml vaisto/l geriamojo vandens	Mėsa: 5 paros Indikacijos: Gydytas of LKL, mikoplazmozės, kiaulės enzootic pneumonia, bronchopneumonias, chlamidiasis, unspecific diarrheas.

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka/indikacijos
Slovakija	Novartis Animal Health d.o.o. Verovskava 57 1000 Ljubljana SLOVENIA	DOXYRIL 500 mg/g prášok na perorálny roztok ad us.vet.	Doksiciklino hiklatas	500 mg/g	Vandenyje tirpūs milteliai	Kiaulės, broileriai	3–5 dienas iš eilės su geriamuoju vandeniu	Kiaulės: 20 mg doksiciklino hiklato/kg kūno svorio Broileriai: 25 mg doksiciklino hiklato/kg kūno svorio	Valgomi audiniai: broileriai – 4 paros. Indikacijos: doksiciklinui jautrių mikroorganizmų sukeliamų infekcijų gydymas, ypač (broileriai): <i>Mycoplasma spp.</i> (<i>M. gallisepticum</i> , <i>M. synoviae</i> ir <i>M. meleagridis</i>), <i>Escherichia coli</i> , <i>Haemophilus paragallinarum</i> ir <i>Ornithobacterium rhinotracheale</i> sukeliamos kvėpavimo takų infekcijos, <i>Clostridium perfringens</i> ir <i>Clostridium colinum</i> sukeliamas plonosios žarnos uždegimas, <i>Pasteurella multocida</i> sukeliamas kraujo užkrėtimas.

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka/indikacijos
Slovakija	Lavet Pharmaceuticals Ltd., 1161 Budapest Ottó u. 14, Hungary	DOXYVIT 40% plv.sol.	Doksiciklino hiklatas	40 g/100 g	Vandenyje tirpūs milteliai	Naminiai paukščiai: (vištos ir kalakutai) ir kiaulės	3–5 dienas su geriamuoju vandeniu; naminiai paukščiai: su geriamuoju vandeniu; kiaulės: su geriamuoju vandeniu arba pašaru	Vištos ir kalakutai: 10–20 mg aktyvaus doksiciklino hiklato/kg kūno svorio) per parą, nepertraukia mas gydymas: 1 g vaisto/3–6 l geriamojo vandens, pakartotinis gydymas: 25–50 mg vaisto/kg kūno svorio (10–20 mg doksiciklino hiklato/kg kūno svorio), su geriamuoju vandeniu	Viščiukų ir kalakutų mėsa: 4 paros. Indikacijos: doksiciklinui jautrių organizmų sukeltamų kvėpavimo, žarnyno ir sisteminių infekcijų gydymas ir profilaktika: vVištos, kalakutai – lėtinė kvėpavimo liga (<i>Mycoplasma gallisepticum</i> , <i>E. coli</i>), oro maišų uždegimas (<i>M.meleagridis</i>), infekcinis sinovitas (<i>M.synoviae</i>), paukščių cholera (<i>P. multocida</i>), kalakutų bordeteliozė (<i>Bordetella avium</i>), infekcinė sloga (<i>Haemophilus paragallinarum</i>), colibacilosis (<i>E. coli</i>), nekrozinis plonosios žarnos uždegimas (<i>Clostridium prefringens</i>), chlamidiozė (<i>CH. psittaci</i>).

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka/indikacijos
Slovakija	Tekro, spol. s.r.o., Višňová 2/484, 140 00 Praha 4, Czech Republic	Meditek DOX 100 plv.sol. ad us.vet.	Doksiciklino hiklatas	100 g/1000 g	Vandenyje tirpūs milteliai	Broileriai, kiaulės	3–5 dienas su geriamuoju vandeniu	Broileriai: 10 mg doksiciklino hiklato/kg kūno svorio (prilygsta 1 kg vaisto/1000 l geriamojo vandens)	Broilerių ir kiaulių mėsa: 7 paros. Indikacijos: doksiciklinui jautrių organizmų sukeliamų kvėpavimo ir virškinimo sistemų ligų gydymas ir profilaktika: broileriai – LKL, mikoplazmozė, oro maišų uždegimas, sinovitas, pastereliozė, infekcinė cholera, kolibakteriozė, chlamidiozė, nekrozinis plonosios žarnos uždegimas.
Slovakija	Pharmagal s.r.o., Murgašova 5, 949 01 Nitra, Slovak Republic	DOXYGAL plv.sol. ad us.vet.	Doksiciklino hiklatas	5 g/100 g	Vandenyje tirpūs milteliai	Kiaulės, naminiai paukščiai, veršeliai, triušiai	Naminiai paukščiai: Profilaktika – 5 dienas, gydymas – 3 dienas, su geriamuoju vandeniu Kiaulės, veršeliai, triušiai: 5 dienas, su geriamuoju vandeniu arba pašaru	Naminiai paukščiai – profilaktika: 50 mg veikliosios medžiagos/l geriamojo vandens (1 g vaisto/l vandens) gydymas: 100 mg veikliosios medžiagos/l vandens (2 g vaisto/l vandens)	Naminių paukščių ir triušių mėsa: 7 paros. Indikacijos: naminiai paukščiai – LKL (mikoplazmozė), kolibakteriozė.

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka/indikacijos
Slovakija	COOPHAVET Saint Herblon 44150 Ancenis FRANCE	RONAXAN 5 % plv.sol. ad us.vet.	Doksiciklino hiklatas	5 g/100 g	Vandenyje tirpūs milteliai	Kiaulės, naminiai paukščiai, veršeliai	Profilaktika: 1–3 dienas, gydymas: 3–5 dienas, su geriamuoju vandeniu arba pašaru	10 mg veikliosios medžiagos/kg kūno svorio per parą (1 g vaisto/5 kg kūno svorio per parą). Naminiai paukščiai – iki 2 savaičių: 1 g vaisto/litrui geriamojo vandens per parą; nuo 2 savaičių: 2 g/litrui vandens per parą	Naminių paukščių mėsa – 4 paros. Indikacijos: naminiai paukščiai – kvėpavimo takų infekcijos gydymas ir profilaktika.
Slovakija	Laboratorios Karizoo S.A Polígono Industrial La Borda Mas Pujades 11-12 08140 Caldes de Montbui Barcelona SPAIN	KARIDOX 100 mg/ml roztok pre podávanie hydine a ošípaným perorálne v pitnej vode	Doksiciklino hiklatas	100 mg/ml	Vandenyje tirpūs milteliai	Vištos (broileriai), kiaulės	Broileriai: 3–5 dienas, Kiaulės: 5 paros, Su geriamuoju vandeniu	Broileriai: 10–20 mg doksiciklino/kg kūno svorio per parą, (0,5–1,0 ml vaisto/litrui geriamojo vandens),	Mėsa ir plaučkepeniai - vištos (broileriai) – 7 paros. Indikacijos: vištos (broileriai) – doksiciklinui jautrių mikroorganizmų sukiamų lėtinės kvėpavimo ligos (LKL) ir mikoplazmozės gydymas ir profilaktika.

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomenduojama dozė	Išlauka/indikacijos
Slovakija	CHEMO IBERICA, S.A. Gran Via Carlos III, 98 7 ^a Edificio Trade 08028 Barcelona SPAIN	ORIDOX 100 mg/ml roztok pre podávanie hydine a ošípaným perorálne v pitnej vode	Doksiciklino hiklatas	100 mg/ml	Vandenyje tirpūs milteliai	Vištos (broileriai), kiaulės	Broileriai: 3–5 dienas, kiaulės: 5 paros, su geriamuoju vandeniu	Broileriai: 10–20 mg doksiciklino/kg kūno svorio per parą, (0,5–1,0 ml vaisto/l geriamojo vandens),	Mėsa ir plaučkepeniai - vištos (broileriai) – 7 paros. Indikacijos: vištos (broileriai) – doksiciklinui jautrių mikroorganizmų sukiamų lėtinės kvėpavimo ligos (LKL) ir mikoplazmozės gydymas ir profilaktika.
Jungtinė Karalystė	Laboratorios Karizoo S.A Polígono Industrial La Borda Mas Pujades 11-12 08140 Caldes de Montbui Barcelona SPAIN	Karidox 100mg/ml Oral Solution for use in drinking water for Chickens and Pigs	Doksiciklino hiklatas	100 mg/ml doksiciklino (doksiciklino hiklato)	Geriamasis tirpalas	Vištos (broileriai) ir kiaulės	Peroralinis (su geriamuoju vandeniu)	10–20 mg doksiciklino/kg x 3–5 dienas	Mėsa ir plaučkepeniai: vištos (broileriai) – 7 paros. Indikacijos: vištos (broileriai) – doksiciklinui jautrių mikroorganizmų sukiamų lėtinės kvėpavimo ligos (LKL) ir mikoplazmozės gydymas ir profilaktika.
Jungtinė Karalystė	CHEMO IBERICA, S.A. Gran Via Carlos III, 98 7 ^a Edificio Trade 08028 Barcelona SPAIN	Soldoxin 100mg/ml Oral Solution for use in drinking water for chickens and pigs	Doksiciklino hiklatas	100 mg/ml doksiciklino (doksiciklino hiklato)	Geriamasis tirpalas	Vištos (broileriai) ir kiaulės	Peroralinis (su geriamuoju vandeniu)	10–20 mg doksiciklino/kg x 3–5 dienas	Mėsa ir plaučkepeniai: vištos (broileriai) – 7 paros. Indikacijos: vištos (broileriai) – doksiciklinui jautrių mikroorganizmų sukiamų lėtinės kvėpavimo ligos (LKL) ir mikoplazmozės gydymas ir profilaktika..

Valstybė narė/EEE	Pareiškėjas / rinkodaros teisės turėtojas	Vaisto pavadinimas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšis	Naudojimo dažnis ir būdas	Rekomend uojama dozė	Išlauka/ indikacijos
Jungtinė Karalystė	Huvepharma N.V. Uitbreidingstraat 80 2600 Antwerpen BELGIUM	HydroDoxx 500 mg/g Water Soluble Powder	Doksiciklino hiklatas	500 mg/g doksiciklino hiklato	Milteliai geriamajam tirpalui	Vištos (broileriai) ir kiaulės (mėsinės kiaulės)	Peroralinis (su geriamuoju vandeniu)	20 mg doksiciklino (hiklato)/kg x 3–5 dienas	Mėsa ir plaučkepeniai: vištos – 6 paros. Indikacijos: vištos (broileriai) – <i>Mycoplasma gallisepticum</i> sukeliamos lėtinės kvėpavimo ligos (LKL) gydymas ir profilaktika.
JUNGTINĖ KARALYSTĖ	VMD NV, HOGE MAUW 900-2370 Arendonk BELGIUM	Doxyveto 50 s plus	Doksiciklino hiklatas	50% w/w doksiciklino hiklato	Powder, Peroralinis administrati on	Kiaušinių nededančios vištos	Peroralinis (su geriamuoju vandeniu)	25 mg doksiciklino (hiklato)/kg x 3–5 dienas	Mėsa ir plaučkepeniai - 6 paros Indikacijos: <i>Mycoplasma spp.</i> , <i>E. coli</i> ir <i>Haemophilus paragallinarum</i> sukeliamo kvėpavimo takų infekcijos. <i>Clostridium perfringens</i> ir <i>Clostridium colinum</i> sukeliamas plonosios žarnos uždegimas.

II PRIEDAS

MOKSLINĖS IŠVADOS IR VETERINARINIO VAISTO APRAŠO PAKEITIMO PAGRINDAS

NAMINIAMS PAUKŠČIAMS SKIRIAMŲ VANDENYJE TIRPIŲ MILTELIŲ IR GERIAMŲJŲ TIRPALŲ, KURIŲ SUDĖTYJE YRA DOKSICIKLINO HIKLATO (*žr. I priedą*), MOKSLINIO ĮVERTINIMO BENDROJI SANTRAUKA

1. Įvadas

Naminiams paukščiams su geriamuoju vandeniu skiriamais vandenyje tirpiaisi milteliais ir geriamaisiais tirpalais, kurių sudėtyje yra doksiciklino hiklato, gydomos kvėpavimo ir virškinimo sistemų infekcijos, kurias sukelia skirtingi doksiciklinui jautrūs bakteriniai patogenai.

Doksiciklinas yra tetraciklino darinys, kuris naudojamas panašiai kaip ir tetraciklinas. Visų tetraciklinų veikimo spektras yra platus, jie veikia gramneigiamas ir gramteigiamas bakterijas, chlamidijas, riketsijas, mikoplazmas ir spirochetas. Kai kurias iš šių rūšių doksiciklinas veikia labiau nei kiti tetraciklinai. Visų pirmą tai yra bakteriostatinis antibiotikas, kurio veikimo mechanizmas pagrįstas baltymų sintezės slopinimu.

Jungtinė Karalystė išreiškė rūpestį, kad įvairiose Europos Sąjungos šalyse nustatytų visų stiprumų naminiams paukščiams su geriamuoju vandeniu skiriamų vandenyje tirpių miltelių ir geriamųjų tirpalų, kurių sudėtyje yra doksiciklino hiklato, dozavimo, didžiausios ir mažiausios dozės, gydymo trukmės ir išlaukos skirtumai gali kelti pavojų ir gyvūnų, ir žmonių sveikatai, ir paprašė Veterinarių vaistų komiteto (CVMP) pateikti savo nuomonę šiuo klausimu.

Procedūra buvo susijusi su 179 veterinariniais vaistais, kurių rinkodaros teisės suteiktos arba tebesvarstomos skirtingose Europos Sąjungos valstybėse narėse (*žr. I priedą*).

2. Turimų duomenų aptarimas

Iš visų pareiškėjų ir (arba) rinkodaros teisės turėtojų pateiktų duomenų tik devyniolika atsakymų pateikti su išsamiais dokumentų rinkiniais, kurie buvo parengti vadovaujantis Direktyvos 2001/82/EB 12 straipsnio 3 dalimi. Devyni atsakymai pateikti su generinių vaistų dokumentų rinkiniais, parengtais pagal Direktyvos 2001/82/EB 13 straipsnį. Keturiuose atsakymuose raštu pateiktoje informacijoje nebuvo duomenų, susijusių su CVMP iškeltais klausimais. Vienas atsakymas gautas pasibaigus nustatytam atsakymų pateikimo terminui, todėl jis nebuvo priimtas, ir CVMP vertinimą atliko, neatsižvelgdamas į su tuo vaistu susijusius duomenis.

Iš pateiktų duomenų buvo matyti, kad susijusių veterinarinių vaistų rinkodaros teisės suteiktos arba tebesvarstomos pagal skirtingas rinkodaros teisės suteikimo procedūras (savitarpio pripažinimo arba nacionalines procedūras) ir vadovaujantis skirtingu teisiniu pagrindu (pateikus išsamią, generinio vaisto ir informuoto sutikimo paraišką).

Atkreiptas dėmesys į tai, kad kurie pateikti duomenys buvo identiški, tačiau juos pateikė skirtingi rinkodaros teisės turėtojai.

Nuspręsta, kad tik pirmiau minėtuose devyniolikoje atsakymų, su kuriais pateikti išsamūs dokumentų rinkiniai parengti vadovaujantis Direktyvos 2001/82/EB 12 straipsnio 3 dalimi, buvo tinkamai atsakyta į iškeltus konkrečius klausimus. Pateikti duomenų paketai sudaryti iš viešai prieinamų bibliografinių duomenų ir nuosavybės teise saugomų duomenų.

Siekdami pagrįsti susijusių vaistų veiksmingumą pareiškėjai ir (arba) rinkodaros teisės turėtojai pateikė iš viso 11 nuosavybės teise saugomų originalių tyrimų, įskaitant 3 eksperimentinius infekcinius

tyrimus ir natūraliomis sąlygomis atliktus 8 klinikinius tyrimus. Visi tyrimai, išskyrus vieną, buvo atliekami su mėsinėmis vištomis. Šis vienas tyrimas atliktas su kalakutais.

Atliekant tyrimus buvo naudojami skirtingų vaisto formų veterinariniai vaistai, kurių sudėtyje buvo skirtingos koncentracijos doksiciklino hiklato arba doksiciklino hidrochlorido; beveik visų preparatų sudėtyje buvo rūgščių (dažniausiai citrinų rūgšties).

Dokumentai, kuriais pagrįsti nuosavybės teise saugomi originalūs tyrimai, buvo labai skirtingi ir daugeliu atvejų neatitiko dabartinių standartų. Visų pirma nepateikta informacijos apie tyrimo sąlygas (tyrimo vietos ligos istoriją, laikymo ir šėrimo sąlygas, šviesos ir tamsos ciklą) bei gydymo tvarkaraštį (ar vaistai buvo skiriami *ad libitum* 24 val. per parą, ar taikytas pulsinis gydymas) arba jos pateikta labai nedaug.

Remiantis su mėsinėmis vištomis, kurios buvo dirbtinai užkrėstos *Mycoplasma gallisepticum*, atliktu geros laboratorinės praktikos (GLP) kriterijus atitinkančiu dozės nustatymo tyrimu, galima nustatyti terapinę vaisto dozę – 20 mg/kg kūno svorio, kuri skiriama 5 dienas iš eilės. Pateikti septyni natūraliomis sąlygomis atlikti klinikiniai tyrimai su mėsinėmis vištomis, kurios sirgo kvėpavimo liga ir kurių *M. gallisepticum* sukelta infekcija buvo patvirtinta. Atliekant visus, išskyrus du, tyrimus, 5 dienas iš eilės buvo skiriama 20 mg/kg kūno svorio doksiciklino hiklato paros dozė. Vieno iš šių tyrimų duomenimis, remiantis objektyviais parametrais, kaip antai, reikšmingai sumažėjusiais gyvūnų, kuriems nustatyti patologiniai pakitimai, procentine dalimi ir ligai būdingų pakitimų vertinimo balų skaičiumi bei reikšmingai mažesniu *M. gallisepticum* atsinaujinimo po gydymo greičiu, galima patvirtinti šios tikslinės dozės veiksmingumą. Nenustatyta jokių su gydymu susijusių nepageidaujamų reiškinių. Kiti tyrimai tik parodo tikslinės dozės veiksmingumą, kadangi jų metu buvo naudojamas subjektyvus pirminis sukeliama pakitimo rodiklis – klinikinės būklės pagerėjimas, ir šie tyrimai buvo nepakankamai pagrįsti dokumentais. Taigi, 5 dienas iš eilės skiriamos terapinės 20 mg/kg kūno svorio dozės veiksmingumas, gydant *M. gallisepticum* sukeliama kvėpavimo liga sergančias vištas, buvo patvirtintas klinikiniu tyrimu, atliktu su mėsinėmis vištomis, kurios sirgo kvėpavimo liga ir kurių *M. gallisepticum* sukelta infekcija buvo patvirtinta.

Dėl *Pasteurella multocida* sukeltos infekcijos, pateikti du eksperimentiniai tyrimai su mėsinėmis vištomis, t. y. vienas leidinyje paskelbtas tyrimas (Semjen et al., (1998)¹ ir vienas nuosavybės teise saugomas tyrimas. Abu tyrimai buvo atliekami panašiomis eksperimentinėmis sąlygomis. Šie tyrimai rodo, kad 4 (5) dienas skiriama 10 mg/kg kūno svorio doksiciklino paros dozė yra veiksminga, gydant dirbtinai sukeltą paukščių cholera – tai rodo reikšmingai sumažėjęs paukščių mirtingumas ir ligai būdingų patologinių pakitimų skaičius bei tyrime naudotos padermės bakterijų atsinaujinimo greitis, palyginti su dirbtinai užkrėstais negydomais kontroliniais gyvūnais. Taip pat nustatyta, kad doksiciklinas yra pranašesnis už chlortetraciliną, kuris buvo naudojamas kaip teigiamos kontrolės priemonė. Tačiau leidinyje paskelbtame straipsnyje pateikta nepakankamai informacijos, kuria remiantis būtų galima apskaičiuoti faktinę tiriamųjų gyvūnų suvartotą vaisto dozę. Atliekant nuosavybės teisę saugomą tyrimą, viduriavimas buvo vienas iš pagrindinių dirbtinai užkrėstiems, bet negydomiems gyvūnams nustatytų klinikinių simptomų, tačiau tai nėra tipinis *pastereliozės* požymis. Pasibaigus stebėjimo laikotarpiui, gyvūnams, kuriems gydymas buvo taikomas, nustatyti lengvi klinikiniai simptomai, ir keli gyvūnai nugaišo. Nepaisant to, kad nebuvo pateikta jokių natūraliomis sąlygomis atliktų klinikinių tyrimų, kuriais būtų galima pagrįsti eksperimentinėmis sąlygomis gautus rezultatus, atsižvelgiant į pakankamą šio patogeno jautrumą doksiciklinui (MIK90 iki 2 µg/ml), su *P. multocida* susijusių kvėpavimo takų infekcijų gydymas doksiciklinu yra pagrįstas.

¹ Semjen G., Magyar T, Laczay P.: *Therapeutic efficacy of doxycycline against experimental Pasteurella multocida infection in broiler chickens*. Act. Vet. Hung. 46 (1), p. 85-93, 1998.

Dėl *Escherichia coli* sukiamų infekcijų, pateikti trys leidiniuose paskelbti tyrimai su eksperimentiniais modeliais (George *et al.*, 1977²; Goren *et al.*, 1988³; Velkers *et al.*, 2005⁴) ir vienas klininis veiksmingumo tyrimas. Goren *et al.* (1988)³ atliktas tyrimas buvo suplanuotas kaip dozės titravimo tyrimas, 5 dienas iš eilės su geriamuoju vandeniu skiriant 25–1000 ppm doksiciklino dozes. Nustatytas aiškus dozės ir atsakomosios reakcijos santykis. Palyginus su užkrėstais negydomais kontroliniais gyvūnais, nustatyta, kad skiriant ne mažesnę kaip 400 ppm (prilygsta 96 mg/kg kūno svorio) dozę, doksiciklinu galima veiksmingai mažinti gyvūnų mirtingumą ir *kolibakteriozei* būdingų patologinių pakitimų (perikardito, oro maišų uždegimo ir perihepatito) dažnį bei gerinti vištų klinikinę būklę. Palankiausi rezultatai gauti 5 dienas iš eilės skiriant didžiausią bandomąją dozę, t. y. 1000 ppm, kuri prilygsta 196 mg/kg kūno svorio. Skiriant šias dozes, vidutinė kraujo plazmoje susidariusi doksiciklino koncentracija (matuojama 2-ą gydymo dieną) buvo 3,6 µg/ml. O atliekant George *et al.* (1977)² tyrimą, palyginus su dirbtinai užkrėstų negydomų kontrolinių gyvūnų duomenimis, įrodyta, kad doksiciklinas yra veiksmingas, mažinant gyvūnų mirtingumą ir tipinių patologinių pakitimų skaičių, kai 3 dienas iš eilės su geriamuoju vandeniu skiriama 50 ppm dozė, ir kad jis yra pranašesnis už chlortetracikliną ir spektinomyciną, kurie buvo naudojami kaip teigiamos kontrolės priemonės. Tačiau George *et al.* (1977)² straipsnyje pateikta nepakankamai informacijos (apie gyvūnų kūno svorį ir suvartoto vandens kiekį), kad būtų galima apskaičiuoti faktinę tiriamųjų gyvūnų per parą suvartotą vaisto dozę.

Eksperimentinėmis sąlygomis tiriant homeopatinių vaistų veiksmingumą gydant *kolibakterioze* sergančias mėsines vištas, doksiciklinas buvo naudojamas kaip kontrolinis vaistas (Velkers *et al.*, 2005)⁴. Įrodyta, kad 5 dienas iš eilės skiriama 250 mg/l geriamojo vandens doksiciklino paros dozė yra veiksminga siekiant išvengti gyvūnų žūties ir mažinti *E. coli* sukiamų pakitimų skaičių ir augimo slopinimą. Tačiau šiame leidinyje paskelbtame straipsnyje nepateikta būtinos informacijos, pagal kurią būtų galima nustatyti faktinę tiriamųjų paukščių per parą suvartotą vaisto dozę.

Šiuos infekcinius *kolibakteriozės* tyrimus buvo sunku palyginti dėl didelių eksperimentinių sąlygų skirtumų, pvz., naudotų skirtingų padermių bakterijų ir infekcinių dozių, skirtingo gydymo pradžios laiko ir skirtingų tyrime naudotų vištų (pagal amžių, svorį ir veislę). Todėl atsižvelgiant į šiuos tyrimus negalima padaryti jokių tvirtų išvadų.

Buvo pateiktas vienas GKP kriterijus atitinkantis, natūraliomis sąlygomis atliktas atviras klininis tyrimas su *kolibakterioze* sergančiomis mėsinėmis vištomis. 3 dienas buvo skiriama tikslinė 25 mg/kg kūno svorio doksiciklino paros dozė. Veiksmingumo vertinimas pagrįstas mirtingumo, klinikinių stebėjimų ir mikrobiologiniais duomenimis. Rezultatai parodė, kad doksiciklinas veiksmingai gerina vištų klinikinę būklę ir laipsniškai mažina jų mirtingumą. Atkreiptas dėmesys į kelis tyrimo trūkumus (pvz., nesudaryta kontrolinė grupė).

Dėl *Ornithobacterium rhinotracheale* sukiamų infekcijų, pateiktas vienas GKP kriterijus atitinkantis, kontroliuojamas patvirtinamasis veiksmingumo tyrimas su eksperimentinėmis sąlygomis *O. rhinotracheale* dirbtinai užkrėstomis vištomis. Tyrimas buvo atliekamas dviem etapais: bandomajame etape siekta nustatyti optimalią infekcinę dozę, po jo sekė patvirtinamasis etapas. Esant net ir didžiausiai infekcinei dozei, klinikiniai simptomai vištoms beveik nepasireiškė. Tačiau bandomojo

² George BA, Fagerberg DJ, Quarles CL, Fenton JM.: *Comparison of therapeutic efficacy of doxycycline, chlortetracycline and lincomycin-spectinomycin on E. coli infection of young chickens*. Poult Sci. 1977 Mar; 56(2):452-8.

³ Goren E, de Jong WA, Doornenbal P, Laurensse T.: *Therapeutic efficacy of doxycycline hyclate in experimental Escherichia coli infection in broilers*. Vet Q. 1988 Jan; 10(1):48-52.

⁴ Velkers FC, te Loo AJ, Madin F, van Eck JH.: *Isopathic and pluralist homeopathic treatment of commercial broilers with experimentally induced colibacillosis*. Res Vet Sci. 2005 Feb; 78(1):77-83.

etapo duomenys rodo, kad palyginti su negydytais kontroliniais gyvūnais, esant didžiausiai infekcinei dozei reikšmingai sumažėjo vištų, kurios 4 dienas buvo gydomos 20 mg/kg doksiciklino paros doze, oro maišų pakitimų. Patvirtinamajame etape ir klinikinė, ir patologinė negydytų kontrolinių gyvūnų reakcija į dirbtinai sukeltą *O. rhinotracheale* infekciją buvo silpna. Antibakterinių medžiagų veiksmingumas pagal *O. rhinotracheale* atsinaujinimo greitį nebuvo patvirtintas. Šio tyrimo metu tikriausiai nebandyta nustatyti faktinės vištų suvartojamos vaisto dozės. Tai buvo vienintelis tyrimas, pateiktas siekiant pagrįsti vaisto vartojimą *O. rhinotracheale* sukeltoms infekcijoms gydyti. Taigi, remiantis pateiktais duomenimis, negalima patvirtinti jokios terapinės vaisto dozės *O. rhinotracheale* sukeliama kvėpavimo ligai gydyti.

Su *chlamidioze* susiję pateikti duomenys buvo neįtikinami, todėl informacijos šiuo metu patvirtintų ir su šia kreipimosi procedūra susijusių vaistų vištų ir kitų paskirties gyvūnų rūšių chlamidiozės gydymo indikacijai pagrįsti nepakako.

Pateikti trys tyrimai, susiję su doksiciklino veiksmingumu gydant kalakutus ir žąsis. Doksiciklinas buvo skiriamas kvėpavimo liga ir oro maišų uždegimu bei kvėpavimo liga ir sąnarių sindromu (*mikoplazmos, stafilokokai*) sergantiems kalakutams. Žąsys doksiciklinu buvo gydomos nuo kvėpavimo sutrikimo sindromo (*mikoplazmozė*). Kadangi visi trys tyrimai buvo nepakankamai pagrįsti dokumentais (t. y. nepateikta informacijos apie diagnostines procedūras, mikrobiologiją, klinikinius stebėjimus), jų rezultatų neįmanoma tinkamai paaiškinti.

Klinikinių duomenų, kuriais būtų galima pagrįsti kitas šiuo metu patvirtintas su šia procedūra susijusių vaistų vištų ir kitų paskirties gyvūnų rūšių gydymo indikacijas (pvz., *M. meleagridis*, *M. synoviae*, *Haemophilus paragallinarum*, *Clostridium perfringens*, *Clostridium colinum*, *Bordetella avium* ir pan. sukeliama infekcijų gydymą) nepateikta arba jų pateikta labai nedaug.

Taigi, komitetas nusprendė, kad doksiciklino veiksmingumas gydant *M. gallisepticum* sukeliama lėtinę kvėpavimo ligą buvo pakankamai pagrįstas klinikinės dozės nustatymo tyrimu ir klinikiniais tyrimais, kurie atlikti komercinio naudojimo sąlygomis, vištoms skiriant 20 mg/kg vaisto dozę 5 dienas iš eilės. Kalbant apie *P. multocida* sukeltas infekcijas, tyrimo su eksperimentiniais modeliais rezultatai rodo, kad gydymas veiksmingas, kai 4 arba 5 dienas skiriama 10 mg/kg kūno svorio vaisto dozė, tačiau nebuvo pateikta jokių komercinėmis sąlygomis gautų patvirtinamųjų klinikinių duomenų. Nepaisant to, kadangi buvo įrodyta, jog *P. multocida* yra jautrios doksiciklinui, MIK90 esant iki 2 µg/ml, ir buvo atlikta jų farmakokinetinė ir farmakodinaminė analizė, sprendimas įtraukti *P. multocida* sukeltas infekcijas į vištų gydymo indikaciją yra pagrįstas.

Dėl *E. coli* sukeliama naminių paukščių infekcijų pateikta nepakankamai duomenų. Remiantis dviem pateiktais su vištomis atliktais eksperimentiniais *E. coli* infekciniais tyrimais, nepavyko nustatyti jokios terapinės dozės režimo. Pateikto natūraliomis sąlygomis atlikto klinikinio tyrimo, kurio metu *kolibakterioze* sergantys broileriai 3 dienas buvo gydomi 25 mg/kg doksiciklino doze, rezultatai taip pat buvo neįtikinami. Iš farmakodinaminių duomenų matyti, kad *E. coli* padermių bakterijų jautrumas doksiciklinui labai skiriasi – MIK90 rodikliai svyruoja nuo 2 iki 32 µg/ml. Vokietijoje užregistruoti naujausi iš vištų išskiriamų *E. coli* bakterijų atsparumo rodikliai svyruoja nuo 19,3 iki 37 % (Wallmann et al, 2007)⁵. Būtų galima teigti, kad doksiciklinu galima veiksmingai gydyti *E. coli* sukeltomis infekcijomis sergančius broilerius, tačiau tik jeigu prieš pradedant tyrimą patvirtinamas šių bakterijų jautrumas doksiciklinui.

⁵ Wallmann, J.; Schroer, U.; Kaspar, H.: *Quantitative resistance level (MIC) of bacterial pathogens* (*Escherichia coli*, *Pasteurella multocida*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella* sp., *Staphylococcus aureus*) *isolated from chickens and turkeys*: National Resistance Monitoring by the BVL 2004/2005 (2007) Berl. Munch. Tierarztl. Wochenschr.; 120; 452-463.

Nepaisant pateiktų tyrimų trūkumų, nepakankamų plačiai pripažįstamu vaisto naudojimu pagrįstų duomenų, susijusių su kai kuriomis indikacijomis ir dozavimo režimais, ir su vaistų neveiksmingumu susijusios naujos farmakologinio budrumo informacijos stokos, galima padaryti išvadą, kad dabartinės vaistų, kurių sudėtyje yra doksiciklino, dozės ir indikacijos yra saugios ir veiksmingos.

Rinkodaros teisės turėtojų pateikti likučių pasišalinimo tyrimai parodė, kad esant galimybei buvo taikomas komiteto rekomenduojamas statistinis išlaukos nustatymo metodas⁶. Atliekant kai kuriuos tyrimus, doksiciklino likučių pasišalinimo kinetiniai duomenys nebuvo įrodyti, nes vaisto likučių audiniuose aptikta tik vieną arba du kartus po vaisto naudojimo nutraukimo. Tokiais atvejais buvo taikomas kitas metodas⁶ arba tyrimas buvo laikomas patvirtinamuoju. Likučių tyrimai buvo atliekami daugiausia su vištomis. Atlikti ir du likučių tyrimai su kalakutais. Vištomis skiriamos vaisto paros dozės svyravo nuo 10,36 (14,47) iki 25 mg/kg kūno svorio. Atliekant aštuonis tyrimus, buvo skiriama maždaug 20 mg/kg kūno svorio doksiciklino paros dozė. Dviejuose tyrimuose galutinio preparato koncentracija geriamajame vandenyje buvo nurodyta, tačiau nepatikslinkta faktinė gyvūnų suvartota vaisto dozė mg/kg kūno svorio. Atliekant visus tyrimus gydymas buvo tęsiamas penkias dienas iš eilės.

Kadangi galiausiai nuspręsta, kad nėra būtinybės peržiūrėti vaisto dozę, susijusių vaistų išlaukos peržiūrėti taip pat nereikėjo.

3. Naudos ir rizikos vertinimas

Apsvarsčius visus pareiškėjų ir (arba) rinkodaros teisės turėtojų pateiktus duomenis, nuspręsta, kad buvo pateikta pakankamai dokumentais pagrįstų įrodymų, siekiant pagrįsti priimtina doksiciklino hiklato veiksmingumą gydant su *Mycoplasma gallisepticum* susijusiomis kvėpavimo takų infekcijomis sergančias mėsines vištas, kai 5 dienas iš eilės skiriama 20 mg/kg kūno svorio paros dozė. Tačiau nepateikta jokių dokumentais pagrįstų įrodymų, kad su *Mycoplasma gallisepticum* susijusių kvėpavimo takų infekcijų gydymas taikant kitus patvirtintus vaisto dozavimo režimus (10-25 mg/kg kūno svorio) yra neveiksmingas.

Nuspręsta, kad doksiciklino hiklato naudojimas pagal visas deklaruojamas vištų gydymo indikacijas ir doksiciklino naudojimas kitų rūšių naminiams paukščiams gydyti yra plačiai pripažįstamas. Nors pareiškėjai ir rinkodaros teisės turėtojai nepateikė tinkamų dokumentais pagrįstų įrodymų pagal visas kitas indikacijas visų kitų rūšių gyvūnams skiriamoms nustatytoms vaisto dozėms pagrįsti, nebuvo pateikta ir jokios naujos informacijos apie kokį nors nežinomą pavojų, susijusį su doksiciklino neveiksmingumu gydant naminius paukščius. Pateiktuose susijusių vaistų periodiškai atnaujinamuose saugumo protokoluose nebuvo nurodyta, kad pagal kurią nors iš deklaruojamų indikacijų ar gydant kurios nors paskirties rūšies gyvūnus vaistas būtų buvęs neveiksmingas.

Dėl atsparumo, 2009 m. paskelbti naujausio visos Europos zoonozinių ir simbiotinių vidurių bakterijų atsparumo antibakterinėms medžiagoms tyrimo⁷ rezultatai atskleidė, kad iš vištų išskirtos *E. coli* bakterijos yra itin atsparios tetraciklinams.

Todėl CVMP rekomenduoja, atsižvelgiant į rekomendacijas CVMP gairėse dėl antibakterinių medžiagų aprašo (EMA/CVMP/SAGAM/383441/2005)⁸ ir informaciją apie teisingą vaistų skyrimą, į visų su šia

⁶ CVMP rekomendacinis pranešimas dėl išlaukos laikotarpių suderinimo metodo (angl. *CVMP Note for guidance: Approach towards harmonisation of withdrawal periods*) <http://www.ema.europa.eu/pdfs/vet/swp/003695en.pdf>.

⁷ De Jong et al.: *A pan-European survey of antimicrobial susceptibility towards human-use antimicrobial drugs among zoonotic and commensal enteric bacteria isolated from healthy food producing animals*. J. Antimicrob. Chemotherapy 63, 733-744, 2009

⁸ CVMP peržiūrėtos antibakterinių vaistų aprašo gairės (angl. *CVMP revised guideline on the SPC for antimicrobial products* (EMA/CVMP/SAGAM/383441/2005) - <http://www.ema.europa.eu/pdfs/vet/sagam/38344105enfin.pdf>

procedūra susijusių vaistų preparato informacinius dokumentus įtraukti visus atitinkamus teiginius apie apdairų antibakterinių medžiagų naudojimą.

VETERINARINIO VAISTO APRAŠO, ŽENKLINIMO IR PAKUOTĖS LAPELIO PAKEITIMO PAGRINDAS

Kadangi:

- CVMP nusprendė, kad doksiciklino hiklato naudojimas yra plačiai pripažįstamas. Nepateikta jokių dokumentais pagrįstų įrodymų, kurie patvirtintų nežinomą su doksiciklino neveiksmingumu gydant naminius paukščius susijusią riziką. Pateiktuose susijusių vaistų periodiškai atnaujinamuose saugumo protokoluose nenurodyta, kad pagal kurią nors iš patvirtintų indikacijų gydant kurios nors patvirtintos rūšies gyvūnus vaistas būtų buvęs neveiksmingas. Todėl, nepaisant to, kad pateikta nepakankamai dokumentais pagrįstų įrodymų vaisto naudojimui pagal kai kurias šiuo metu patvirtintas indikacijas ir kai kurioms tikslinėms gyvūnų rūšims pagrįsti, su šia procedūra susijusių vaistų bendras naudos ir rizikos vertinimas tebėra toks pat;
- CVMP nuomone, 2009 m. paskelbtas naujausias visos Europos zoonozinių ir simbiotinių vidurių bakterijų atsparumo antibakterinėms medžiagoms tyrimas atskleidė, kad iš vištų išskirtos *E. coli* bakterijos yra itin atsparios tetraciklinams. Todėl nuspręsta, kad atsižvelgiant į rekomendacijas CVMP gairėse dėl antibakterinių medžiagų aprašo ir informaciją apie teisingą su šia kreipimosi procedūra susijusių vaistų skyrimą, į preparato informacinius dokumentus reikėtų įtraukti visus atitinkamus standartinius teiginius apie apdairų antibakterinių medžiagų naudojimą;

CVMP rekomendavo leisti keisti rinkodaros teises ir iš dalies pakeisti susijusius veterinarinio vaisto aprašo skyrius, ženklšinimą ir pakuotės lapelį, kad į juos būtų įtraukta bent ta informacija, kuri pateikta šios nuomonės I priede nurodytų naminiams paukščiams su geriamuoju vandeniu skiriamų vandenyje tirpių miltelių ir geriamųjų tirpalų, kurių sudėtyje yra doksiciklino hiklato, III priede.

III PRIEDAS

VETERINARINIO VAISTO APRAŠO, ŽENKLINIMO IR PAKUOTĖS LAPELIO PAKEITIMAS

SUSIJUSIŲ VETERINARINIO VAISTO APRAŠO SKYRIŲ PAKEITIMAI

4.5 Specialios atsargumo priemonės, skiriant vaistą gyvūnams

Specialios atsargumo priemonės, skiriant vaistą gyvūnams

Dėl bakterijų jautrumo doksiciklinui kintamumo (laiko ir geografinės vietovės atžvilgiu) primygtinai rekomenduojama imti bakteriologinius mėginius iš ūkyje sergančių paukščių ir atlikti mikroorganizmų jautrumo tyrimus.

Didelis iš vištų išskirtų *E. coli* bakterijų atsparumas tetraciklinams patvirtintas dokumentais. Todėl *E. coli* bakterijų sukeltas infekcijas šiuo vaistu galima pradėti gydyti tik atlikus jų jautrumo tyrimą.

Kadangi tikslinių patogenų gali nepavykti išnaikinti, gydymą vaistais reikia taikyti vadovaujantis ir gero valdymo praktika, t. y. laikytis higienos, užtikrinti tinkamą vėdinimą ir vengti gyvūnų pertekliaus jų laikymo vietoje.

4.9 Dozės ir naudojimo būdas

Skiriamas su geriamuoju vandeniu.

<patvirtinta dozė> mg doksiciklino hiklato /kg kūno svorio per parą, kuri prilygsta mg <vaisto pavadinimas>/kg kūno svorio, ...<patvirtinta gydymo trukmė> dienas (-ų) iš eilės.

Atsižvelgiant į rekomenduojamą dozę ir gydytinių paukščių skaičių ir svorį, tikslus <vaisto pavadinimas> paros kiekis apskaičiuojamas naudojant šią formulę:

$$\frac{\text{.....mg [vaisto pavadinimas]} \quad \text{gydytinių paukščių vidutinis}}{\text{/kg} \quad \text{kūno svorio per parą} \quad \times \quad \text{kūno svoris (kg)}} = \frac{\text{.... mg [vaisto pavadinimas]} \text{ /l}}{\text{geriamojo vandens}}$$

Vidutinis vieno paukščio per parą suvartojamo vandens kiekis (l)

Siekiant užtikrinti tinkamą vaisto dozę, reikia kuo tiksliau nustatyti gyvūno kūno svorį.

Išgeriamo su vaistais sumaišyto vandens kiekis priklauso nuo paukščių klinikinės būklės. Siekiant gauti tinkamą dozę, gali tekti koreguoti vaisto koncentraciją geriamajame vandenyje.

Jeigu naudojamos ne pilnos pakuotės, rekomenduojama naudoti tinkamai sukalibruotą svėrimo įrangą. Vaisto paros dozę reikia įmaišyti į tokį geriamojo vandens kiekį, kad visas vaistas būtų suvartotas per 24 val. Kas 24 val. geriamasis vanduo su vaistais turėtų būti ruošiamas naujai. Rekomenduojama paruošti koncentruotą tirpalą ruošinį (maždaug 100 gramų vaisto vienam litrui geriamojo vandens) ir prireikus jį toliau skiesti iki terapinės koncentracijos. Taip pat koncentruotą tirpalą galima naudoti su proporciniu vandens prisotinimo vaistais įrenginiu.

SUSIJUSIŲ ŽENKLINIMO DALIŲ PAKEITIMAI

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį.

SUSIJUSIŲ PAKUOTĖS LAPELIO SKYRIŲ PAKEITIMAI

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Reikia laikytis šių nurodymų dėl vaisto dozavimo:

<patvirtinta dozė> mg doksiciklino hiklato /kg kūno svorio per dieną, kuri prilygsta mg <vaisto pavadinimas>/kg kūno svorio, ...<patvirtinta gydymo trukmė> dienas (-as) iš eilės.

Atsižvelgiant į rekomenduojamą dozę ir gydytinų paukščių skaičių ir svorį, tikslus <vaisto pavadinimas> paros kiekis apskaičiuojamas naudojant šią formulę:

$$\frac{.....\text{mg [vaisto pavadinimas]} \quad \text{gydytinų paukščių vidutinis} / \text{kg} \quad \text{kūno svorio per parą} \quad \times \quad \text{kūno svoris (kg)}}{\text{Vidutinis vieno paukščio per parą suvartojamo vandens kiekis (l)}} = \text{ mg [vaisto pavadinimas] / l geriamojo vandens}$$

Siekiant užtikrinti tinkamą vaisto dozę, reikia kuo tiksliau nustatyti gyvūno kūno svorį.

Išgeriamo su vaistais sumaišyto vandens kiekis priklauso nuo paukščių klinikinės būklės. Siekiant gauti tinkamą dozę, gali tekti koreguoti vaisto koncentraciją geriamajame vandenyje. Jeigu naudojamos ne pilnos pakuotės, rekomenduojama naudoti tinkamai sukalibruotą svėrimo įrangą. Vaisto paros dozę reikia įmaišyti į tokį geriamojo vandens kiekį, kad visas vaistas būtų suvartotas per 24 val. Kas 24 val. geriamasis vanduo su vaistais turėtų būti ruošiamas naujai. Rekomenduojama paruošti koncentruotą tirpalo ruošinį (maždaug 100 gramų vaisto vienam litrui geriamojo vandens) ir prireikus jį toliau skiesti iki terapinės koncentracijos. Taip pat koncentruotą tirpalą galima naudoti su proporciniu vandens prisotinimo vaistais įrenginiu.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Dėl bakterijų jautrumo doksiciklinui kintamumo (laiko ir geografinės vietovės atžvilgiu) primygtinai rekomenduojama imti bakteriologinius mėginius iš ūkyje sergančių paukščių ir atlikti mikroorganizmų jautrumo tyrimus.

Didelis iš vištų išskirtų *E. coli* bakterijų atsparumas tetraciklinams patvirtintas dokumentais. Todėl *E. coli* bakterijų sukeltas infekcijas šiuo vaistu galima pradėti gydyti tik atlikus jų jautrumo tyrimą.

Kadangi tikslinių patogenų gali nepavykti išnaikinti, gydymą vaistais reikia taikyti vadovaujantis ir gero valdymo praktika, t. y. laikytis higienos, užtikrinti tinkamą vėdinimą ir vengti gyvūnų pertekliaus jų laikymo vietoje.