

I PRIEDAS

**VAISTINIŲ PREPARATŲ PAVADINIMŲ, FARMACINIŲ FORMŲ, STIPRUMO,
VARTOJIMO BŪDŲ, RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJŲ ŠALYSE NARĖSE
SĄRAŠAS**

„Artiss“ ir susiję pavadinimai; „Tisseel“ ir susiję pavadinimai; „Tissucol“ ir susiję pavadinimai

Valstybė narė (EEB)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Austrija	Baxter AG Industriestraße 67 1221 Vienna Austria	ARTISS – Lösungen für einen Gewebekleber	Fibrinogenas: 91 mg/ml Aprotininas: 3000 KTV/ml Trombinas: 4 TV/ml Kalcio chloridas: 40 µmol/ml	Tirpalas audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos
Austrija	Baxter AG Industriestraße 67 1221 Vienna Austria	ARTISS LYO – Pulver und Lösungsmittel für einen Gewebekleber	Fibrinogenas: 91 mg/ml Aprotininas: 3000 KTV/ml Trombinas: 4 TV/ml Kalcio chloridas: 40 µmol/ml	Milteliai ir tirpiklis audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos
Austrija	Baxter AG Industriestraße 67 1221 Vienna Austria	Tisseel - Lösungen für einen Gewebekleber	Fibrinogenas: 91 mg/ml Aprotininas: 3000 KTV/ml Trombinas: 500 TV/ml Kalcio chloridas: 40 µmol/ml	Tirpalas audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos
Austrija	Baxter AG Industriestraße 67 1221 Vienna Austria	Tisseel Lyo - Pulver und Lösungsmittel für einen Gewebekleber	Fibrinogenas: 91 mg/ml Aprotininas: 3000 KTV/ml Trombinas: 500 TV/ml Kalcio chloridas: 40 µmol/ml	Milteliai ir tirpiklis audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos
Belgija	Baxter SA Boulevard René Branquart 80 7860 Lessines Belgium	Artiss	Fibrinogenas: 91 mg/ml Aprotininas: 3000 KTV/ml Trombinas: 4 TV/ml Kalcio chloridas: 40 µmol/ml	Tirpalas audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos
Belgija	Baxter AG Industriestraße 67 1221 Vienna Austria	Tissucol Duo 500	„TISSUCOL“ IR APROTININO švirkštas: bendrojo baltymo 100–130 mg/ml; krešėjimą skatinančio baltymo 75–115 mg/ml, iš kurių fibrinogeno 70–110 mg/ml ir plazmos fibronektino 2–9 mg/ml; XIII faktoriaus 10–50 TV/ml; plazminogeno 0,04–0,12 mg/ml; aprotinino 3000 KTV/ml (1,67 EPU/ml); TROMBINO IR KALCIO CHLORIDO švirkštas: baltymų 50 mg/ml; trombino 500 TV/ml; kalcio chlorido 40 µmol/ml	Tirpalas audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos

Valstybė narė (EEB)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Belgija	Baxter AG Industriestraße 67 1221 Vienna Austria	Tissucol Kit	1 buteliukas: bendrojo baltymo 100–130 mg/ml; krešėjimą skatinančio baltymo 75–115 mg/ml, XIII faktoriaus 10–50 TV/ml; plazminogeno 0,04–0,12 mg/ml; 2 buteliukas: galvijų aprotinino 3000 KTV/ml (1,67 EPU/ml); 3 buteliukas: žmogaus trombino 500 TV/ml; baltymų 50 mg/ml; 4 buteliukas: žmogaus trombino 4 TV/ml; baltymų 50 mg/ml; 5 buteliukas: kalcio chlorido 40 µmol/ml	Milteliai ir tirpiklis audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos
Belgija	Baxter AG Industriestraße 67 1221 Vienna Austria	Tissucol S/D	Žmogaus fibrinogenas (krešėjimą skatinantis baltymas): 72–110 mg/ml XIII faktoriaus ≤ 10 TV/ml Aprotininas: 3000 KTV/ml Žmogaus trombinas: 500 TV/ml Kalcio chloridas: 40 µmol/ml	Tirpalas audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos
Belgija	Baxter AG Industriestraße 67 1221 Vienna Austria	Tissucol S/D Kit	Žmogaus fibrinogenas (krešėjimą skatinantis baltymas): 72–110 mg/ml XIII faktoriaus ≤ 10 TV/ml Aprotininas: 3000 KTV/ml Žmogaus trombinas: 500 TV/ml Kalcio chloridas: 40 µmol/ml	Milteliai ir tirpiklis audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos
Bulgarija	Baxter d.o.o. Železna cesta 18 1000 Ljubljana Slovenia	Artiss solution for sealant frozen	Žmogaus fibrinogeno 91 mg/ml Aprotinino 3000 KTV/ml Žmogaus trombino 4 TV/ml Kalcio chlorido 40 µmol/ml	Tirpalas audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos
Bulgarija	Baxter d.o.o. Železna cesta 18 1000 Ljubljana Slovenia	Tisseel Lyo powders and solvents for sealant	Žmogaus fibrinogeno 91 mg/ml Aprotinino 3000 KTV/ml Žmogaus trombino 4 TV/ml Kalcio chlorido 40 µmol/ml	Milteliai ir tirpiklis audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos
Bulgarija	Baxter d.o.o. Železna cesta 18 1000 Ljubljana Slovenia	Tisseel solutions for sealant	Žmogaus fibrinogeno 72–110 mg/ml Aprotinino 3000 KTV/ml Žmogaus trombino 500 TV/ml Kalcio chlorido 40 µmol/ml	Tirpalas audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos
Čekija	Baxter Czech spol. s r.o. Karla Engliš 3201/6 150 00 Praha 5 Czech Republic	Artiss	Fibrinogenas: 91 mg/ml Aprotininas: 3000 KTV/ml Trombinas: 4 TV/ml Kalcio chloridas: 40 µmol/ml	Tirpalas audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos

Valstybė narė (EEB)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Čekija	Baxter Czech spol. s r.o. Karla Engliš 3201/6 150 00 Praha 5 Czech Republic	Tisseel	Fibrinogenas: 91 mg/ml Aprotininas: 3000 KTV/ml Trombinas: 500 TV/ml Kalčio chloridas: 40 µmol/ml	Tirpalas audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos
Čekija	Baxter Czech spol. s r.o. Karla Engliš 3201/6 150 00 Praha 5 Czech Republic	Tisseel Lyo	Fibrinogenas: 91 mg/ml Aprotininas: 3000 KTV/ml Trombinas: 500 TV/ml Kalčio chloridas: 40 µmol/ml	Milteliai ir tirpiklis audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos
Danija	Baxter A/S Gydevang 43 DK-3450 Allerød Denmark	Artiss	Fibrinogenas: 91 mg/ml Aprotininas: 3000 KTV/ml Trombinas: 4 TV/ml Kalčio chloridas: 40 µmol/ml	Tirpalas audinių klijams	Vartoti į pažeistą vietą
Danija	Baxter AG Industriestraße 67 1221 Vienna Austria	Tisseel Duo Quick	Fibrinogeno 90 mg/ml Fibronektino 6 mg/ml Aprotinino 3000 KTV/ml XIII krešėjimo faktoriaus 30 TV/ml Plazminogeno 80 µg/ml Žmogaus trombino 500 TV/ml Kalčio chlorido dihidrato 40 µg/ml	Tirpalas audinių klijams	Vartoti į pažeistą vietą
Danija	Baxter A/S Gydevang 43 DK-3450 Allerød Denmark	Tisseel	Fibrinogenas: 91 mg/ml Aprotininas: 3000 KTV/ml Trombinas: 500 TV/ml Kalčio chloridas: 40 µmol/ml	Tirpalas audinių klijams	Vartoti į pažeistą vietą
Suomija	Baxter Oy, PL 119, 00181 Helsinki Finland	Artiss	Fibrinogenas: 91 mg/ml Aprotininas: 3000 KTV/ml Trombinas: 4 TV/ml Kalčio chloridas: 40 µmol/ml	Tirpalas audinių klijams	Vietinis
Suomija	Baxter AG Industriestraße 67 1221 Vienna Austria	Tisseel	Fibrinogeno 72–110 mg/ml Žmogaus XIII krešėjimo faktoriaus 10 TV/ml Aprotininas: 3000 KTV/ml Trombinas: 500 TV/ml Kalčio chloridas: 40 µmol/ml	Tirpalas audinių klijams	Vietinis

Valstybė narė (EEB)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Suomija	Baxter AG Industriestraße 67 1221 Vienna Austria	Tisseel duo quick	Žmogaus plazmos baltymo 100–130 mg/ml: fibrinogeno 90 mg/ml Plazmos fibronektino 5,5 mg/ml Žmogaus XIII krešėjimo faktoriaus 30 TV/ml Aprotinino 1,67 Eur. farmak. vnt./ml XIII krešėjimo faktoriaus 30 TV/ml Plazminogeno 80 µg/ml Žmogaus trombino 500 TV/ml Žmogaus plazmos baltymo 50 mg/ml Kalcio chlorido dihidrato 40 µg/ml	Tirpalas audinių klijams	Vietinis
Prancūzija	BAXTER SAS 6 Avenue Louis Pasteur 78310 MAUREPAS FRANCE	ARTISS solution for sealant	Fibrinogeno 91 mg/ml Aprotininas: 3000 KTV/ml Trombinas: 4 TV/ml Kalcio chloridas: 40 µmol/ml	Tirpalas audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos
Prancūzija	BAXTER SAS 6 Avenue Louis Pasteur 78310 MAUREPAS FRANCE	TISSUCOL KIT	1-asis komponentas: Žmogaus fibrinogeno 90,00 mg/ml XIII faktorius: 10,00 TV/ml Fibronektinas: 5,50 mg/ml Plazminogenas: 0,08 mg/ml Aprotinino 3000,0 KTV***/ml 2-asis komponentas: Trombino 500 TV/ml	Milteliai, tirpalas ir tirpiklis audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos
Vokietija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Artiss	Fibrinogenas: 91 mg/ml Aprotininas: 3000 KTV/ml Trombinas: 4 TV/ml Kalcio chloridas: 40 µmol/ml	Tirpalas audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos
Vokietija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Tissucol-Duo S 0,5 ml/1ml/2 ml Immuno	1 komponentas: Fibrinogenas: 70–110 mg/ml XIII krešėjimo faktorius: 10–50 TV/ml Plazmos fibronektinas: 2–9 mg/ml Aprotininas (galvijų): 3000 KTV/ml 2 komponentas: Trombino (žmogaus) 500 TV/ml Kalcio chloridas: 5,88 mg/ml	Milteliai ir tirpiklis audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos

Valstybė narė (EEB)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Vokietija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Tissucol- Kit 1,0/2,0/5,0 Immuno	1 komponentas: Fibrinogenas: 70–110 mg/ml Plazmos fibronektinas: 2–9 mg/ml XIII krešėjimo faktorius: 10–50 TV/ml Aprotinino tirpalas: 3000 KTV/ml 2 komponentas: Liofilizuotas trombinas S: 500 TV/ml Liofilizuotas trombinas L: 4 TV/ml Kalcio chloridas: 5,88 mg/ml	Milteliai ir tirpiklis audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos
Graikija	BAXTER HELLAS LTD 3 Metsovou str, 14121-N Irakleio, Athens Greece	ARTISS	Fibrinogenas: 91 mg/ml Aprotininas: 3000 KTV/ml Trombinas: 4 TV/ml Kalcio chloridas: 40 µmol/ml	Tirpalas audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos
Graikija	BAXTER HELLAS LTD 3 Metsovou str, 14121-N Irakleio, Athens Greece	TISSEEL	Fibrinogenas: 91 mg/ml Aprotininas: 3000 KTV/ml Trombinas: 500 TV/ml Kalcio chloridas: 40 µmol/ml	Tirpalas audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos
Graikija	BAXTER HELLAS LTD 3 Metsovou str, 14121-N Irakleio, Athens Greece	TISSEEL LYO	Fibrinogenas: 91 mg/ml Aprotininas: 3000 KTV/ml Trombinas: 500 TV/ml Kalcio chloridas: 40 µmol/ml	Milteliai ir tirpiklis audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos
Vengrija	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. IX. em. 1138 Budapest Hungary	TISSEEL LYO por és oldószer szövetragasztóhoz	Fibrinogenas: 91 mg/ml Aprotininas: 3000 KTV/ml Trombinas: 500 TV/ml Kalcio chloridas: 40 µmol/ml	Milteliai ir tirpiklis audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos

Valstybė narė (EEB)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Vengrija	Baxter AG Industriestraße 67 1221 Vienna Austria	TISSUCOL Kit 1,0 kétkomponensű fibrinragasztó	1-asis komponentas: Bendrojo baltymo 100–130 mg; Krešėjimą skatinantis baltymas: 75–115 mg, iš kurių fibrinogeno 70–110 mg; Plazmos fibronektino 2–9 mg/ml; XIII faktoriaus 10–50 TV; Plazminogeno 0,04–0,12 mg; Aprotinino 3000 KTV; 2-asis komponentas: Trombino 500 TV arba trombino 4 TV; Kalcio chlorido dihidrato 5,88 mg	Milteliai ir tirpiklis audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos
Vengrija	Baxter AG Industriestraße 67 1221 Vienna Austria	TISSUCOL Kit 2,0 kétkomponensű fibrinragasztó	1-asis komponentas: Bendrojo baltymo 200–260 mg; Krešėjimą skatinantis baltymas: 150–230 mg, iš kurių fibrinogeno 140–220 mg; Plazmos fibronektino 4–18 mg; XIII faktoriaus 20–100 TV; Plazminogeno 0,08–0,24 mg; Aprotinino 6000 KTV; 2-asis komponentas: Trombino 1000 arba 8 TV; Kalcio chlorido dihidrato 11,76 mg	Milteliai ir tirpiklis audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos
Vengrija	Baxter AG Industriestraße 67 1221 Vienna Austria	TISSUCOL Kit 5,0 kétkomponensű fibrinragasztó	1-asis komponentas: Bendrojo baltymo 500–650 mg; Krešėjimą skatinantis baltymas: 375–575 mg, iš kurių fibrinogeno 350–550 mg; Plazmos fibronektino 10–45 mg; XIII faktoriaus 50–250 TV; Plazminogeno 0,2–0,6 mg; Aprotinino 15000 KTV; 2-asis komponentas: Trombino 2500 arba 20 TV; Kalcio chlorido dihidrato 29,4 mg	Milteliai ir tirpiklis audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos

Valstybė narė (EEB)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugavotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Islandija	Baxter Medical AB, Isafjordsgatan 30B P.O. Box 63 164 94 Kista, Sweden	Artiss	Žmogaus fibrinogeno 91 mg/ml Aprotinino 3000 KTV/ml (galvijų) Žmogaus trombino 4 TV ³ /ml Kalcio chlorido 40 mikromol/ml	Tirpalas audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos
Islandija	Baxter AG Industriestraße 67 1221 Vienna Austria	TISSEEL	Žmogaus fibrinogeno 91 mg/ml Žmogaus XIII faktoriaus 10 TV/ml Galvijų aprotinino 3000 KTV/ml Žmogaus trombino 500 TV/ml Kalcio chlorido 40 mikromol/ml	Tirpalas audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos
Islandija	Baxter AG Industriestraße 67 1221 Vienna Austria	Tisseel Duo Quick	„Tisseel“ tirpalo ml – Fibrinogeno 90 mg Fibronektino 5,5 mg XIII faktoriaus 30 TV Aprotinino (galvijų) 3000 KTV Plazminogeno 80 mikrogramų Trombino tirpalo ml Žmogaus trombino 500 TV Kalcio chlorido 40 mikromol	Tirpalas audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos
Airija	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE, United Kingdom	Artiss solutions for sealant, deep frozen	Žmogaus fibrinogenas: 72–110 mg/ml Aprotininas: 3000 KTV/ml Žmogaus trombinas: 4 TV/ml Kalcio chloridas: 40 μmol/ml	Tirpalas audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos
Airija	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE, United Kingdom	Tiseel Ready to use Solutions for Sealant	Žmogaus fibrinogenas: 72–110 mg/ml Aprotininas: 3000 KTV/ml Žmogaus trombinas: 500 TV/ml Kalcio chloridas: 40 μmol/ml	Tirpalas audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos
Airija	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE, United Kingdom	TISSEEL Lyo	Žmogaus fibrinogenas: 72–110 mg/ml Aprotininas: 3000 KTV/ml Žmogaus trombinas: 500 TV/ml Kalcio chloridas: 40 μmol/ml	Milteliai ir tirpiklis audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos

Valstybė narė (EEB)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Italija	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria, 20 00144 Roma Italy	ARTISS	Fibrinogenas: 91 mg/ml Aprotininas: 3000 KTV/ml Trombinas: 4 TV/ml Kalcio chloridas: 40 µmol/ml	Tirpalas audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos
Italija	Baxter AG Industriestraße 67 1221 Vienna Austria	TISSEEL	Fibrinogenas: 91 mg/ml Aprotininas: 3000 KTV Trombinas: 500 TV/ml Kalcio chloridas: 40 µmol/ml XIII faktoriaus ≤ 10 TV/ml	Tirpalas audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos
Liuksemburgas	Baxter SA Boulevard René Branquart 80 7860 Lessines Belgium	Artiss	Fibrinogenas: 91 mg/ml Aprotininas: 3000 KTV/ml Trombinas: 4 TV/ml Kalcio chloridas: 40 µmol/ml	Tirpalas audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos
Liuksemburgas	Baxter AG Industriestraße 67 1221 Vienna Austria	Tissucol S/D Kit	Žmogaus fibrinogeno (krešėjimą skatinančių baltymų) 72–110 mg/ml XIII faktoriaus ≤ 10 TV/ml Aprotinino 3000 KTV/ml Žmogaus trombino 500 TV/ml Kalcio chlorido 40 µmol/ml	Milteliai ir tirpiklis audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos
Malta	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE, United Kingdom	TISSEEL KIT 2.0 ml, Two-Component Fibrin Sealant	Fibrinogenas: 70–110 mg/ml Plazmos fibronektinas (CIG): 2–9 mg/ml XIII faktorius: 10–50 V/ml Plazminogenas: 0,04–0,12 mg/ml	Milteliai ir tirpiklis audinių klijams	Vartoti ant odos
Malta	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE, United Kingdom	TISSEEL Lyo, Two-Component Fibrin Sealant	Fibrinogenas: 72–110 mg/ml Aprotininas: 3000 KTV/ml Trombinas: 45–55 mg bendrojo baltymo yra 500 TV/ml Kalcio chloridas: 40 µmol/ml	Milteliai ir tirpiklis audinių klijams	Vartoti ant odos
Norvegija	Baxter AS, Gjerdrumsvei 11, 0484 Oslo, Norway	Artiss	Žmogaus fibrinogenas: 91 mg ¹ / ml Aprotininas: 3000 KTV ² /ml Žmogaus trombinas: 4 TV ³ /ml Kalcio chloridas: 40 µmol/ml	Tirpalas audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos
Norvegija	Baxter AS, Gjerdrumsvei 11, 0484 Oslo, Norway	Tisseel	Žmogaus fibrinogenas: 91 mg ¹ /ml Aprotininas: 3000 KTV ² /ml Žmogaus trombinas: 500 TV ³ /ml Kalcio chloridas: 40 µmol/ml	Tirpalas audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos

Valstybė narė (EEB)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Norvegija	Baxter AS, Gjerdrumsvei 11, 0484 Oslo, Norway	Tisseel	Žmogaus fibrinogenas: 91 mg ¹ /ml Aprotininas: 3000 KTV ² /ml Žmogaus trombinas: 500 TV ³ /ml Kalcio chloridas: 40 μmol/ml	Milteliai ir tirpiklis audinių klįjams	Vartoti ant pažeistos vietos
Lenkija	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	Artiss	Fibrinogenas: 91 mg/ml Aprotininas: 3000 KTV/ml Trombinas: 4 TV/ml Kalcio chloridas: 40 μmol/ml	Tirpalas audinių klįjams	Vartoti ant pažeistos vietos
Lenkija	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	Tisseel	Fibrinogenas: 91 mg/ml Aprotininas: 3000 KTV/ml Trombinas: 500 TV/ml Kalcio chloridas: 40 μmol/ml	Tirpalas audinių klįjams	Vartoti ant pažeistos vietos
Lenkija	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	Tisseel Lyo	Fibrinogenas: 91 mg/ml Aprotininas: 3000 KTV/ml Trombinas: 500 TV/ml Kalcio chloridas: 40 μmol/ml	Milteliai ir tirpiklis audinių klįjams	Vartoti ant pažeistos vietos
Portugalija	Baxter Médico-Farmacêutica, Lda. Zona Industrial da Abrunheira - Edifício 10 - Sintra Business Park 2710-089 Sintra Portugal	Artiss	Žmogaus fibrinogenas: 91 mg/ml Aprotininas: 3000 KTV ² /ml Žmogaus trombinas: 4 TV ³ /ml Kalcio chloridas: 40 micromol/ml	Tirpiklis audinių klįjams	Vartoti ant pažeistos vietos
Portugalija	Baxter Médico-Farmacêutica, Lda. Zona Industrial da Abrunheira - Edifício 10 - Sintra Business Park 2710-089 Sintra Portugal	Tisseel	Žmogaus fibrinogenas: 72–110 mg/ml XIII faktorius: ≤10 TV Aprotininas: 3000 KTV ² /ml Žmogaus trombinas: 500 TV ³ /ml Kalcio chloridas: 40 micromol/ml	Audinių klįjai	Vartoti ant pažeistos vietos
Portugalija	Baxter Médico-Farmacêutica, Lda. Zona Industrial da Abrunheira - Edifício 10 - Sintra Business Park 2710-089 Sintra Portugal	Tisseellyo	Žmogaus fibrinogenas (72–110 mg/ml) XIII faktorius (≤ 10 TV) Aprotininas (3000 KTV ² /ml) Žmogaus trombinas (500 TV ³ /ml) Kalcio chloridas (40 mikromol/ml)	Milteliai ir tirpiklis audinių klįjams	Vartoti ant pažeistos vietos

Valstybė narė (EEB)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Ispanija	BAXTER, S.L. Polígono Industrial Sector 14 Pouet de Camilo, 2 46394 Ribarroja del Turia Valencia Spain	ARTISS soluciones para adhesivo tisular Ultracongeladas	Fibrinogenas: 91 mg/ml Aprotininas: 3000 KTV/ml Trombinas: 4 TV/ml Kalcio chloridas: 40 µmol/ml	Tirpalas audinių klijams	Vartoti į pažeistą vietą
Ispanija	BAXTER, S.L. Polígono Industrial Sector 14 Pouet de Camilo, 2 46394 Ribarroja del Turia Valencia Spain	TISSUCOL DUO 2,0 ml	„TISSUCOL“ IR APROTININO švirkštas: bendrojo baltymo 100–130 mg/ml; krešėjimą skatinančio baltymo 75–115 mg/ml, iš kurių fibrinogeno 70–110 mg/ml ir plazmos fibronektino 2–9 mg/ml; XIII faktoriaus 10–50 TV/ml; plazminogeno 0,04–0,12 mg/ml; aprotinino 3000 KTV/ml (1,67 EPU/ml); TROMBINO IR KALCIO CHLORIDO švirkštas: baltymų 50 mg/ml; trombino 500 TV/ml; kalcio chlorido 40 µmol/ml	Tirpalas audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos
Ispanija	BAXTER, S.L. Polígono Industrial Sector 14 Pouet de Camilo, 2 46394 Ribarroja del Turia Valencia Spain	TISSUCOL DUO 5,0 ml	„TISSUCOL“ IR APROTININO švirkštas: bendrojo baltymo 100–130 mg/ml; krešėjimą skatinančio baltymo 75–115 mg/ml, iš kurių fibrinogeno 70–110 mg/ml ir plazmos fibronektino 2–9 mg/ml; XIII faktoriaus 10–50 TV/ml; plazminogeno 0,04–0,12 mg/ml; aprotinino 3000 KTV/ml (1,67 EPU/ml); TROMBINO IR KALCIO CHLORIDO švirkštas: baltymų 50 mg/ml; trombino 500 TV/ml; kalcio chlorido 40 µmol/ml	Tirpalas audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos
Švedija	Baxter Medical AB, Isafjordsgatan 30B P.O. Box 63 164 94 Kista, Sweden	Artiss	Fibrinogenas: 91 mg/ml Aprotininas: 3000 KTV/ml Trombinas: 4 TV/ml Kalcio chloridas: 40 µmol/ml	Tirpalas audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos

Valstybė narė (EEB)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Svedija	Baxter AG Industriestraße 67 A- 1221 Vienna Austria	Tisseel	Fibrinogenas: 91 mg/ml Aprotininas: 3000 KTV/ml Trombinas: 500 TV/ml Kalčio chloridas: 40 µmol/ml XIII faktorius: 10 TV/ml	Tirpalas audinių klįjams	Vartoti ant pažeistos vietos
Svedija	Baxter AG Industriestraße 67 A- 1221 Vienna Austria	Tisseel Duo Quick	Fibrinogenas: 90 mg/ml Aprotininas: 3000 KTV/ml Trombinas: 500 TV/ml Kalčio chloridas: 40 µmol/ml XIII faktorius: 30 TV/ml Plazminogenas: 0,08 mg/ml Fibronektinas: 5,5 mg/ml	Tirpalas audinių klįjams	Vartoti ant pažeistos vietos
Nyderlandai	Baxter B.V. Kobaltweg 49, 3542 CE Utrecht The Netherlands	ARTISS, oplossingen voor weefsellijm (RVG 100631)	Fibrinogenas: 91 mg/ml Aprotininas: 3000 KTV/ml Trombinas: 4 TV/ml Kalčio chloridas: 40 µmol/ml	Tirpalas audinių klįjams	Vartoti ant pažeistos vietos
Nyderlandai	Baxter AG Industriestraße 67 A- 1221 Vienna Austria	Tisseel (RVG 35050/1/2)	Fibrinogenas: 91 mg/ml Aprotininas (sintetinis): 3000 KTV/ml Trombinas: 500 TV/ml Kalčio chloridas: 40 µmol/ml XIII faktorius: ≤ 10 TV/ml	Tirpalas audinių klįjams	Vartoti ant pažeistos vietos
Nyderlandai	Baxter AG Industriestraße 67 A- 1221 Vienna Austria	Tissucol Duo (RVG 17099)	Fibrinogenas: 70–110 mg/ml Fibronektinas: 2–9 mg/ml Trombinas: 500 TV/ml Kalčio chloridas: 40 µmol/ml XIII faktorius: 10–50 TV/ml Aprotininas (galvijų): 3000 KTV/ml	Tirpalas audinių klįjams	Vartoti ant pažeistos vietos
Nyderlandai	Baxter AG Industriestraße 67 A- 1221 Vienna Austria	Tissucol, Kit (RVG 17100/1/2/3)	Fibrinogenas: 70–110 mg/ml Fibronektinas: 2–9 mg/ml Trombinas: 500 TV/ml Kalčio chloridas: 40 µmol/ml XIII faktorius: 10–50 TV/ml Aprotininas (galvijų): 3000 KTV/ml	Milteliai ir tirpiklis audinių klįjams	Vartoti ant pažeistos vietos
Jungtinė Karalystė	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE, United Kingdom	Artiss, solution for sealant deep frozen	Žmogaus fibrinogenas: 110 mg/ml Aprotininas: 3750 KTV/ml Žmogaus trombinas: 5 TV/ml Kalčio chloridas: 44 µmol/ml	Tirpalas audinių klįjams	Vartoti ant pažeistos vietos

Valstybė narė (EEB)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Jungtinė Karalystė	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE, United Kingdom	Tisseel Lyo Two-component Fibrin Sealant	Fibrinogenas: 75 mg/ml Žmogaus trombinas: 500 TV/ml Aprotininas: 3000 KTV/ml Kalcio chloridas: 40 µmol/ml	Milteliai audinių klijams ir tirpalas audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos
Jungtinė Karalystė	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE, United Kingdom	Tisseel Ready to use Solutions for Sealant	Žmogaus fibrinogenas: 110 mg/ml Aprotininas: 3000 KTV/ml Žmogaus trombinas: 500 TV/ml Kalcio chloridas: 40 µmol/ml	Tirpalas audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos

„Berioplast“ ir susiję pavadinimai

Valstybė narė (EEB)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Austrija	CSL Behring GmbH Emil-von-Behring-Straße 76 D-35041 Marburg Germany	Berioplast P Combi-Set Pulver und Lösungsmittel für einen Gewebekleber	Fibrinogenas: 90 mg/ml XIII krešėjimo faktorius: 60 U/ml Aprotininas : 1000 KIU = 0,56 EPU Trombino : 500 IU /ml Kalcio chlorido dihidrato: 5,9 mg/ml	Milteliai ir tirpiklis audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos
Prancūzija	CSL Behring GmbH Emil-von-Behring-Straße 76 D-35041 Marburg Germany	BERIPLAST P 0.5 ml, 1 ml, 3 ml, powders and solvents for sealant Combi-Set	Fibrinogenas: 90 mg/ml XIII krešėjimo faktorius: 60 U/ml Aprotininas : 1000 KIU = 0,56 EPU Trombino : 500 IU /ml Kalcio chlorido dihidrato: 5,9 mg/ml	Milteliai ir tirpiklis audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos
Vokietija	CSL Behring GmbH Emil-von-Behring-Straße 76 D-35041 Marburg Germany	Berioplast P Combi-Set 0,5ml/1ml/3ml	Combi-Set 1: Fibrinogenas: 90 mg/ml XIII krešėjimo faktorius: 60 U/ml Aprotininas: 1000 KIU/ml=0.56 PEU/ml Combi-Set 2: Trombino : 500 IU/ml Kalcio chloridas: 5,9 mg/ml	Milteliai ir tirpiklis audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos
Graikija	CSL BEHRING 5 Hadjiyianni Mexi str, 11528-Athens Greece	BERIPLAST P	Fibrinogenas: 90 mg/ml XIII krešėjimo faktorius: 60 U/ml Aprotininas : 1000 UIC/ml Trombino : 500 UI/ml Kalcio chlorido dihidrato: 5,9 mg/ml	Milteliai ir tirpiklis audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos

Valstybė narė (EEB)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugulvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Graikija	CSL BEHRING 5 Hadjiyianni Mexi str, 11528-Athens Greece	BERIPLAST P	Fibrinogenas: 90 mg/ml XIII krešėjimo faktorius: 60 U/ml Aprotininas : 1000 UIC/ml Trombino : 500 UI/ml Kalcio chlorido dihidrato: 5,9 mg/ml	Milteliai ir tirpiklis audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos
Graikija	CSL BEHRING 5 Hadjiyianni Mexi str, 11528-Athens Greece	BERIPLAST P	Fibrinogenas: 90 mg/ml XIII krešėjimo faktorius: 60 U/ml Aprotininas : 1000 UIC/ml Trombino : 500 UI/ml Kalcio chlorido dihidrato: 5,9 mg/ml	Milteliai ir tirpiklis audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos
Vengrija	CSL Behring GmbH Emil-von-Behring-Straße 76 D-35041 Marburg Germany	BERIPLAST P COMBI-SET 1 ml szövetragasztó készlet	Combi-Set 1: Fibrinogenas: 90 mg/ml XIII krešėjimo faktorius: 60 U/ml Aprotininas: 1000 KIU/ml=0.56 PEU/ml Combi-Set 2: Trombino : 500 IU/ml	Milteliai ir tirpiklis audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos
Vengrija	CSL Behring GmbH Emil-von-Behring-Straße 76 D-35041 Marburg Germany	BERIPLAST P COMBI-SET 3 ml szövetragasztó készlet	Combi-Set 1: Fibrinogenas: 90 mg/ml XIII krešėjimo faktorius: 60 U/ml Aprotininas: 1000 KIU/ml=0.56 PEU/ml Combi-Set 2: Trombino : 500 IU/ml	Milteliai ir tirpiklis audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos
Italija	CSL Behring GmbH Emil-von-Behring-Straße 76 D-35041 Marburg Germany	BERIPLAST P	Fibrinogenas: 90 mg/ml XIII krešėjimo faktorius: 60 U/ml Aprotininas : 1000 KIU/ml Trombino : 500 IU/ml Kalcio chloridas: 5.9 mg/ml	Milteliai ir tirpiklis audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos
Nyderlandai	CSL Behring GmbH, Emil-von-Behring-Strasse 76 35041 Marburg Germany	Beriplast P Combi-Set, weefsellijm - 26655/6/7	Fibrinogenas: 90 mg/ml Aprotininas (galvijų): 1000 KIU/ml Trombino : 500 IU/ml Kalcio chloridas: 5,9 mg/ml XIII krešėjimo faktorius: 60 U/ml	Milteliai ir tirpiklis audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos
Slovakija	CSL Behring GmbH, Emil-von-Behring-Strasse 76 35041 Marburg Germany	Beriplast P Combi-Set 0,5 ml, Beriplast P Combi-Set 1 ml, Beriplast P Combi-Set 3 ml	Žmogaus fibrinogeno: 90 mg XIII krešėjimo faktorius: 60 UI Aprotininas : 1000 KUI Trombin: 7,6 mg Kalcio chloridas: 5,9 mg	Milteliai ir tirpiklis audinių klijams	Vartoti ant pažeistos vietos

Valstybė narė (EEB)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Slovėnija	CSL Behring GmbH, Emil-von-Behring-Strasse 76 35041 Marburg Germany	Beriplast P Combi-Set 1 ml prašek in vehikel za lepilo za tkiva	Žmogaus fibrinogeno: 90 mg/ml XIII krešėjimo faktorius: 60 e/ml Aprotininas : 1000 EIK/ml Trombino : 7,6 mg/ml Kalcio chloridas: 5,9 mg/ml	Milteliai ir tirpiklis audinių klajams	Vartoti ant pažeistos vietos
Slovėnija	CSL Behring GmbH, Emil-von-Behring-Strasse 76 35041 Marburg Germany	Beriplast P Combi-Set 3 ml prašek in vehikel za lepilo za tkiva	Žmogaus fibrinogeno: 90 mg/ml XIII krešėjimo faktorius: 60 e/ml Aprotininas : 1000 EIK/ml Trombino : 7,6 mg/ml Kalcio chloridas: 5,9 mg/ml	Milteliai ir tirpiklis audinių klajams	Vartoti ant pažeistos vietos
Ispanija	CSL Behring GmbH, Emil-von-Behring-Strasse 76 35041 Marburg Germany	BERIPLAST P COMBI-SET 0,5 ml	Fibrinogenas: 90 mg/ml XIII krešėjimo faktorius: 60 U/ml Aprotininas : 1000 KIU = 0,56 EPU Trombino : 500 IU /ml Kalcio chlorido dihidrato: 5,9 mg/ml	Milteliai ir tirpiklis audinių klajams	Vartoti ant pažeistos vietos
Ispanija	CSL Behring GmbH, Emil-von-Behring-Strasse 76 35041 Marburg Germany	BERIPLAST P COMBI-SET 1 ml	Fibrinogenas: 90 mg/ml XIII krešėjimo faktorius: 60 U/ml Aprotininas : 1000 KIU = 0,56 EPU Trombino : 500 IU /ml Kalcio chlorido dihidrato: 5,9 mg/ml	Milteliai ir tirpiklis audinių klajams	Vartoti ant pažeistos vietos
Ispanija	CSL Behring GmbH, Emil-von-Behring-Strasse 76 35041 Marburg Germany	BERIPLAST P COMBI-SET 3 ml	Fibrinogenas: 90 mg/ml XIII krešėjimo faktorius: 60 U/ml Aprotininas : 1000 KIU = 0,56 EPU Trombino : 500 IU /ml Kalcio chlorido dihidrato: 5,9 mg/ml	Milteliai ir tirpiklis audinių klajams	Vartoti ant pažeistos vietos