

I PRIEDAS

**Vaistų pavadinimų, vaistų formų, stiprumo, vartojimo būdų, pareiškėjų,
rinkodaros teisės turėtojų valstybėse narėse sąrašas**

Valstybė narė (EEB)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Danija	Omrix Biopharmaceuticals S.A., Chaussee de Waterloo 200, B-1640 Rhode-St-Genese Belgija	Quixil	Žmogaus fibronektinas: 30 mg Žmogaus fibrinogenas: 30 mg Arginino hidrochloridas: 19 mg Traneksamo rūgštis: 95 mg Glicinas: 7,9 mg Natrio chloridas: 7 mg	Silanto tirpalas	Vartoti į pažeistą vietą
Prancūzija	Omrix Biopharmaceuticals S.A., Chaussee de Waterloo 200, B-1640 Rhode-St-Genese Belgija	QUIXIL silanto tirpalas	1-asis komponentas (BAC) Fibrinogenas – fibronektinas: 40 mg/ml–60 mg/ml Traneksamo rūgštis: 85 mg/ml–105 mg/ml 2-asis komponentas (trombinas) Trombinas: 800 TV/ml–1200 TV/ml Kalcio chloridas: 5,6 mg/ml–6,2 mg/ml	Silanto tirpalas	Vartoti ant pažeistos vietos
Italija	Omrix Biopharmaceuticals S.A., Chaussee de Waterloo 200, B-1640 Rhode-St-Genese Belgija	QUIXIL	Fibrinogenas ir fibronektinas: 40 mg/ml–60 mg/ml Traneksamo rūgštis: 85 mg/ml–105 mg/ml Trombinas: 800 TV/ml–1200 TV/ml Kalcio chloridas: 5,6 mg/ml–6,2 mg/ml	Silanto tirpalas	Vartoti ant pažeistos vietos
Jungtinė Karalystė	Omrix Biopharmaceuticals S.A., Chaussee de Waterloo 200, B-1640 Rhode-St-Genese Belgija	Quixil	Krešus baltymų koncentratas: 50 mg/ml Trombinas: 1000 TV/ml Kalcio chloridas: 5,9 mg/ml Traneksamo rūgštis: 95 mg/ml	Silanto tirpalas	Vartoti ant pažeistos vietos