

<u>ES numurs</u>	<u>(Izdomāts) nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>	<u>Iepakojums</u>	<u>Saturs (koncentrācija)</u>	<u>Iepakojuma izmērs</u>
EU/1/08/463/001	Relistor	12 mg/0,6 ml	Šķīdums injekcijām	Zemādas lietošana	pudelīte (stikla)	0,6 ml (20 mg/ml)	1 pudelīte
EU/1/08/463/002	Relistor	12 mg/0,6 ml	Šķīdums injekcijām	Zemādas lietošana	pudelīte (stikla)	0,6 ml (20 mg/ml)	2 pudelītes + 2 sterilas šļirces + 4 alkohola uztriepes
EU/1/08/463/003	Relistor	12 mg/0,6 ml	Šķīdums injekcijām	Zemādas lietošana	pudelīte (stikla)	0,6 ml (20 mg/ml)	7 pudelītes + 7 sterilas šļirces + 14 alkohola uztriepes
EU/1/08/463/004	Relistor	8 mg	Šķīdums injekcijām	Zemādas lietošana	iepriekš uzpildīta šļirce (stikla)	0,4 ml (20 mg/ml)	4 iepriekš uzpildītas šļirces
EU/1/08/463/005	Relistor	8 mg	Šķīdums injekcijām	Zemādas lietošana	iepriekš uzpildīta šļirce (stikla)	0,4 ml (20 mg/ml)	7 iepriekš uzpildītas šļirces
EU/1/08/463/006	Relistor	8 mg	Šķīdums injekcijām	Zemādas lietošana	iepriekš uzpildīta šļirce (stikla)	0,4 ml (20 mg/ml)	8 iepriekš uzpildītas šļirces
EU/1/08/463/007	Relistor	8 mg	Šķīdums injekcijām	Zemādas lietošana	iepriekš uzpildīta šļirce (stikla)	0,4 ml (20 mg/ml)	10 iepriekš uzpildītas šļirces
EU/1/08/463/008	Relistor	12 mg	Šķīdums injekcijām	Zemādas lietošana	iepriekš uzpildīta šļirce (stikla)	0,6 ml (20 mg/ml)	4 iepriekš uzpildītas šļirces
EU/1/08/463/009	Relistor	12 mg	Šķīdums injekcijām	Zemādas lietošana	iepriekš uzpildīta šļirce (stikla)	0,6 ml (20 mg/ml)	7 iepriekš uzpildītas šļirces
EU/1/08/463/010	Relistor	12 mg	Šķīdums injekcijām	Zemādas lietošana	iepriekš uzpildīta šļirce (stikla)	0,6 ml (20 mg/ml)	8 iepriekš uzpildītas šļirces
EU/1/08/463/011	Relistor	12 mg	Šķīdums injekcijām	Zemādas lietošana	iepriekš uzpildīta šļirce (stikla)	0,6 ml (20 mg/ml)	10 iepriekš uzpildītas šļirces
EU/1/08/463/012	Relistor	12 mg/0,6 ml	Šķīdums injekcijām	Subkutā na lietošana	flakons (stikla)	0,6 ml (20 mg/ml)	2 flakoni + 2 sterilas šļirces ar adatas aizsargu + 4 spirta salvetes
EU/1/08/463/013	Relistor	12 mg/0,6 ml	Šķīdums injekcijām	Subkutā na lietošana	flakons (stikla)	0,6 ml (20 mg/ml)	7 flakoni + 7 sterilas šļirces ar adatas aizsargu + 14 spirta salvetes