



EUROPEAN MEDICINES AGENCY
SCIENCE MEDICINES HEALTH

EMA/5294/2022
EMA/V/C/005464

Felpreva (*tigolaners/emodepsīds/prazikvantels*)

Felpreva pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES

Kas ir *Felpreva* un kāpēc tās lieto?

Felpreva ir pretparazītu zāles, ko lieto, lai ārstētu kaķus, kuriem ir jauktas parazitāras invāzijas/infekcijas (ko izraisa vairāk nekā viens parazīts) vai kuriem šādas invāzijas risks. Tās satur aktīvās vielas tigolaneru, emodepsīdu un prazikvantelu.

Kā lieto *Felpreva*?

Felpreva ir aplikatorā pieejams šķīdums pilināšanai uz ādas, kas jau ir piepildīts ar pareizo zāļu daudzumu, kāds nepieciešams viena kaķa ārstēšanai (ir pieejami 3 aplikatoru izmēri, dažāda kaķa svara ārstēšanai). Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti.

Aplikatora saturu uzpilda uz kaķa ādas, pāršķirot spalvas uz kaķa kakla aizmugurējās daļas pie galvas pamatnes.

Felpreva lieto apaļtārpu, plakantārpu, blusu, ērcu un kašķa infestāciju ārstēšanai. Plaušu tārpu gadījumā ārstēšana ar *Felpreva* pēc divām nedēļām jāturpina ar ārstēšanu, kas satur emodepsīdu un prazikvantelu tikai noteiktā kombinācijā.

Papildu informāciju par *Felpreva* lietošanu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā vai sazināties ar veterinārārstu vai farmaceitu.

Kā *Felpreva* darbojas?

Felpreva trīs aktīvās vielas mijiedarbojas ar dažādām parazītu daļām. Tigolaners aizkavē noteiktu ērcu, blusu un kašķērcu nervu sistēmas receptoru darbību, bet emodepsīds aizkavē apaļtārpu nervu sistēmas receptorus, kā rezultātā tie tiek paralizēti un iet bojā. Prazikvantels bojā plakantārpu ādai līdzīgo ārējo slāni, izraisot to paralīzi un bojāeju.

Kādi *Felpreva* ieguvumi atklāti pētījumos?

Felpreva efektivitāti pētīja gan laboratorijas pētījumos, gan lauka pētījumos dažādās vietās Eiropā.

Blusu un ērcu invāzijas

Official address Domenico Scarlattilaan 6 • 1083 HS Amsterdam • The Netherlands

Address for visits and deliveries Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question Go to www.ema.europa.eu/contact **Telephone** +31 (0)88 781 6000

An agency of the European Union



Lauka pētījumā vairākās ES valstīs 323 kaķiem ar blusu un/vai ērcu invāziju tika veikta vienreizēja ārstēšana ar *Felpreva* vai arīgi lietojamām salīdzinājuma zālēm, kas satur fluralaneru. Pētījumā pierādīja, ka *Felpreva* ir tikpat efektīvas kā salīdzinājuma zāles un samazina blusu vai ērcu skaitu kaķiem vismaz par 90 % līdz 13 nedēļām pēc ārstēšanas.

Ausu ērcu invāzijas

Lauka pētījumā divās Eiropas valstīs 148 kaķiem, kuriem diagnosticēti ausu ērces, deva vienu *Felpreva* vai salīdzinājuma zāļu (kas satur selamektīnu un sarolaneru) devu. Pētījuma beigās visi kaķi tika izārstēti abās ārstēšanas grupās.

Citā lauka pētījumā ar 20 kaķiem, kuriem diagnosticēts notoedrozs kašķis (ko izraisa *Notoedres cati* ērces), ārstēšana ar vienu *Felpreva* devu samazināja ērcu skaitu par 100 %.

Apaltārpi un plakantārpi

Piecās Eiropas valstīs tika veikts lauka pētījums, lai pierādītu *Felpreva* efektivitāti pret apaltārpiem un plakantārpiem salīdzinājumā ar citām zālēm, kas satur eprinomektīnu un prazikvantelu. Šajā pētījumā tika ārstēti 195 kaķi, kuri ir dabiski inficēti ar plakantārpiem, zarnu apaltārpiem vai kaķu plaušu tārpiem, un tika pierādīts, ka abas zāles ir gandrīz 100 % efektīvas pret apaltārpiem un plaušu tārpiem un 100 % efektīvas pret plakantārpiem.

Iepriekš tika veikti papildpētījumi ar *Profender*, kas satur divas no trim *Felpreva* aktīvajām vielām, par kurām pierādīts, ka tās ir gandrīz 100 % efektīvas pret plakantārpiem, zarnu apaltārpiem un plaušu tārpiem.

Kāds risks pastāv, lietojot *Felpreva*?

Visbiežākās *Felpreva* blakusparādības (kas var rasties vairāk nekā 1 no 10 dzīvniekiem) ir kosmētiska iedarbība, piemēram, īslaicīga apmatojuma saslēšanās aplikācijas vietā. Ļoti retos gadījumos var rasties vieglas un pārejošas reakcijas zāļu lietošanas vietā, kā arī gremošanas trakta (zarnu) traucējumi.

Pilnu visu blakusparādību un ierobežojumu sarakstu, lietojot *Felpreva*, skatīt zāļu lietošanas instrukcijā.

Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personai, kura ievada zāles vai nonāk saskarē ar dzīvnieku?

Zāļu aprakstā ir ietverta drošuma informācija, kā arī *Felpreva* lietošanas instrukcija, tostarp attiecīgi piesardzības pasākumi, kas jāievēro veselības aprūpes speciālistiem un dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem, jo īpaši grūtniecēm un bērniem.

Ja cilvēks nejauši norijis zāles, nekavējoties jāvēršas pie ārsta pēc palīdzības.

Ja zāles nejauši nonāk saskarē ar ādu vai acīm, skartā vieta nekavējoties jānoskalo ar ūdeni.

Grūtniecēm, uzklājot zāles, jāvalkā cimdi, lai izvairītos no tiešas saskares ar zālēm. Jāizvairās arī no saskares ar zāļu lietošanas vietu. Pirmajās 24 stundās pēc zāļu ievadīšanas bērni ir jātur prom no ārstētajiem dzīvniekiem līdz brīdim, kad apstrādātā vieta vairs nav pamanāma.

Pilnu ierobežojumu sarakstu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā.

Kāpēc *Felpreva* tika reģistrētas ES?

Eiropas Zāļu aģentūra nolēma, ka ieguvums, lietojot *Felpreva*, pārsniedz šo zāļu radīto risku un zāles var reģistrēt lietošanai ES.

Cita informācija par *Felpreva*

Felpreva 2021. gada 11. novembrī tika izsniegta reģistrācijas apliecība, kas derīga visā ES.

Sīkāka informācija par *Felpreva* ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē:

ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/felpreva.

Šis kopsavilkums pēdējo reizi atjaunināts 2021. gada oktobrī.