

I PIELIKUMS

**VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMU, ZĀĻU FORMU, STIPRUMU, DZĪVNIEKU SUGU, LIETOŠANAS
VEIDU, IZDALĪŠANĀS PERIODU UN PIETEIKUMA IESNIEDZĒJU/REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS
ĪPAŠNIEKU SARAKSTS DALĪBVALSTĪS**

Dalībvalsts/ EEZ	Pieteikuma iesniedzējs/ Reģistrācijas apliecības ipašnieks	Zāļu nosaukums	SNN	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Lietošanas biežums un veids	Ieteicamā deva	Izdalīšanās periods
Austrija	Ceva Santé Animale Zone Industrielle La Ballastiere B.P. 126 33500 Libourne FRANCIJA	Colivet 2 000 000 IU/ml, Konzentrat für eine orale Lösung für Schweine und Geflügel	Kolistīna sulfāts	2 MSV/ml	Koncentrāts iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai	Cūkas Mājputni	Trīs dienas pēc kārtas dzeramā ūdenī	Cūkas: 100 000 SV /kg ķermeņa masas dienā divās vienādās dienas devās. Mājputni: 75 000 SV /kg ķermeņa masas dienā	Cūkas: gaļa: 1 diena Broileri un dējējvistas: 1 diena Citi mājputni: 7 dienas Olas: nulle dienas
Beļģija	Divasa-Farmavic S.A. Ctra San Hipolito km 71 08503 Gurb-Vic (Barcelona) SPĀNIJA	COLIPLUS 2,000,000 IU/ml concentrate for oral solution for use in drinking water for cattle, sheep, swine and chickens	Kolistīna sulfāts	2 MSV/ml	Koncentrāts iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai	Teļi Jēri Cūkas Mājputni	Teļi, jēri, cūkas, mājputni: trīs dienas pēc kārtas dzeramā ūdenī.	Teļi un jēri: 100 000 SV kolistīna/kg ķermeņa masas dienā, sadalot divās vienādās devās, t. i., 0,50 ml preparāta/10 kg ķermeņa masas dienā trīs dienas pēc kārtas Cūkas: 100 000 SV kolistīna/kg ķermeņa masas dienā, t. i., 0,50 ml preparāta/10 kg ķermeņa masas dienā trīs dienas pēc kārtas Mājputni: 75 000 SV kolistīna/kg ķermeņa masas dienā, t. i., 37,5 ml preparāta/1 tonnu ķermeņa masas dienā trīs dienas pēc kārtas.	Teļi, jēri: gaļa un subprodukti 7 dienas Cūkas: gaļa un subprodukti 1 diena. Broileri un dējējvistas: 1 diena. Olas: nulle dienas Citi mājputni: gaļa un subprodukti – 7 dienas Olas: nulle

Dalībvalsts/ EEZ	Pieteikuma iesniedzējs/ Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	SNN	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Lietošanas biežums un veids	Ieteicamā deva	Izdalīšanās periods
									dienas
Bulgārija	<i>Ceva Santé Animale Zone Industrielle La Ballastiere B.P. 126 33500 Libourne FRANCIJA</i>	<i>Colivet oral solution</i>	Kolistīna sulfāts	2 MSV/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Cūkas Mājputni	Iekšķīgi: 3 dienas	Cūkas: 100 000 SV /kg ķermeņa masas dienā Mājputni: 75 000 SV/kg ķermeņa masas dienā	Gaļa: 1 diena Olas: nulle dienas
Bulgārija	<i>Divasa-Farmavic S.A. Ctra San Hipolito km 71 08503 Gurb-Vic (Barcelona) SPĀNIJA</i>	<i>COLIPLUS 2,000,000 IU/ml concentrate for oral solution for use in drinking water for cattle, sheep, swine and chickens</i>	Kolistīna sulfāts	2 MSV/ml	Koncentrāts iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai	Teļi Jēri Cūkas Mājputni	Teļi, jēri, cūkas, mājputni: trīs dienas pēc kārtas dzeramā ūdenī.	Teļi un jēri: 100 000 SV kolistīna/kg ķermeņa masas dienā, sadalot divās vienādās devās, t. i., 0,50 ml preparāta/10 kg ķermeņa masas dienā trīs dienas pēc kārtas Cūkas: 100 000 SV kolistīna/kg ķermeņa masas dienā, t. i., 0,50 ml preparāta/10 kg ķermeņa masas dienā trīs dienas pēc kārtas Mājputni: 75 000 SV kolistīna/kg ķermeņa masas dienā, t. i., 37,5 ml preparāta/1 tonnu ķermeņa masas dienā trīs dienas pēc kārtas.	Teļi, jēri: gaļa un subprodukti 7 dienas Cūkas: gaļa un subprodukti 1 diena Broileri un dējējvistas: 1 diena Olas: nulle dienas Citi mājputni: gaļa un subprodukti: 7 dienas Olas: nulle dienas

Dalībvalsts/ EEZ	Pieteikuma iesniedzējs/ Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	SNN	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Lietošanas biežums un veids	Ieteicamā deva	Izdalīšanās periods
Kipra	<i>Ceva Santé Animale Zone Industrielle La Ballastiere B.P. 126 33500 Libourne FRANCIJA</i>	<i>COLIVET 2.000.000 IU/ml</i>	Kolistīna sulfāts	2 MSV/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Cūkas Putni	Cūkas: 100 000 SV/kg dienā Mājputni: 75 000 SV/kg dienā	Cūkas: 0,50 ml preparāta uz 10 kg ķermeņa masas dienā trīs dienas pēc kārtas Mājputni: 37,5 ml preparāta uz tonnu ķermeņa masas dienā trīs dienas pēc kārtas.	Gaļa un subprodukti: cūkas: 1 diena Broileri un dējējvistas: 1 diena Citi mājputni: 7 dienas Olas: nulle dienas
Čehijas Republika	<i>Ceva Animal Health Slovakia s.r.o. Račianska 77 831 02 Bratislava SLOVĀKIJA</i>	<i>Colivet Sol.</i>	Kolistīna sulfāts	2 MSV/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Cūkas Cāļi (broileri)	Katru dienu. Iekšķīgi.	Broileri: 75 000 SV kolistīna uz kg ķermeņa masas (t. i., 0,37 ml preparāta uz 10 kg ķermeņa masas dienā 3–5 dienas ar dzeramo ūdeni) Cūkas: 50 000 SV kolistīna uz kg ķermeņa masas ik pēc 12 stundām (t. i., 0,25 ml preparāta uz 10 kg ķermeņa masas ik pēc 12 stundām 3–5 dienas ar dzeramo ūdeni vai piena aizstājēju).	Gaļa un subprodukti: cūkas un broileri: 2 dienas. Nelietot dējējvistām, kuru olas tiek izmantotas cilvēka uzturā

Dalībvalsts/ EEZ	Pieteikuma iesniedzējs/ Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	SNN	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Lietošanas biežums un veids	Ieteicamā deva	Izdalīšanās periods
Dānija	<i>Ceva Animal Health A/S Andkærvej 19 7100 Vejle DĀNIJA</i>	Colivet	Kolistīna sulfāts	2 MSV/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Cūkas	Katru dienu. Iekšķīgi	100 000 SV kolistīna/ kg ķermeņa masas dienā 3–5 dienas	1 diena
Dānija	<i>Divasa-Farmavic S.A. Ctra San Hipolito km 71 08503 Gurb-Vic (Barcelona) SPĀNIJA</i>	<i>COLIPLUS 2,000,000 IU/ml concentrate for oral solution for use in drinking water for cattle, sheep, swine and chickens</i>	Kolistīna sulfāts	2 MSV/ml	Koncentrāts iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai	Teļi Jēri Cūkas Mājputni	Teļi, jēri, cūkas, mājputni: trīs dienas pēc kārtas dzeramā ūdenī.	Teļi un jēri: 100 000 SV kolistīna/kg ķermeņa masas dienā, sadalot divās vienādās devās, t. i., 0,50 ml preparāta/10 kg ķermeņa masas dienā trīs dienas pēc kārtas Cūkas: 100 000 SV kolistīna/kg ķermeņa masas dienā, t. i., 0,50 ml preparāta/10 kg ķermeņa masas dienā trīs dienas pēc kārtas Mājputni: 75 000 SV kolistīna/kg ķermeņa masas dienā, t. i., 37,5 ml preparāta/1 tonnu ķermeņa masas dienā trīs dienas pēc kārtas.	Gaļa un subprodukti: 7 dienas Olas: nulle dienas
Francija	<i>Ceva Santé Animale Zone Industrielle La Ballastiere B.P. 126 33500 Libourne</i>	<i>COLISTINE CEVA 2 MUI/MI CONCENTRE POUR SOLUTION</i>	Kolistīna sulfāts	2 MSV/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Cūkas Mājputni	3 dienas	Cūkas: 100 000 SV kolistīna uz kg ķermeņa masas dienā trīs dienas pēc kārtas iekšķīgi, t. i., 0,50 ml preparāta uz 10 kg ķermeņa masas dienā trīs	Gaļa un subprodukti: cūkas: 1 diena Cāļi un

Dalībvalsts/ EEZ	Pieteikuma iesniedzējs/ Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	SNN	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Lietošanas biežums un veids	Ieteicamā deva	Izdalīšanās periods
	FRANCIJA	BUVABLE POUR PORCINS ET VOLAILLES						dienas pēc kārtas. Mājputni: 75 000 SV kolistīna uz kg ķermeņa masas dienā trīs dienas pēc kārtas iekšķīgi, t. i., 37,5 ml preparāta uz tonnu ķermeņa masas dienā trīs dienas pēc kārtas	dējējvistas: 1 diena Citi mājputni: 7 dienas Olas: nulle dienas
Francija	Ceva Santé Animale Zone Industrielle La Ballastiere B.P. 126 33500 Libourne FRANCIJA	COLIVET SOLUTION	Kolistīna sulfāts	2 MSV/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Teļi Jēri Cūkas Mājputni	3 dienas	Teļi, jēri, cūkas: 100 000 SV/kg dienā Mājputni: 75 000 SV/kg dienā	Gaļa un subprodukti: teļi un jēri: 7 dienas Cūkas: 1 diena Cāļi un dējējvistas: 1 diena Citi putni: 7 dienas Olas: nulle dienas
Francija	Coophavet S.A.S Saint Herblion, B.P. 70089 44153 Ancenis Cedex FRANCIJA	COFACOLI SOLUTION	Kolistīna sulfāts	2 MSV/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Teļi Jēri Cūkas Mājputni	3 dienas	Teļi, jēri, cūkas: 100 000 SV/kg dienā Mājputni: 75 000 SV /kg dienā	Gaļa un subprodukti: 7 dienas. Olas: nulle dienas

Dalībvalsts/ EEZ	Pieteikuma iesniedzējs/ Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	SNN	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Lietošanas biežums un veids	Ieteicamā deva	Izdalīšanās periods
Francija	<i>Franvet</i> <i>Zone industrielle</i> <i>d'Etriche</i> <i>Route d'Avire, BP</i> <i>103</i> <i>49500 Segré Cedex</i> FRANCIJA	<i>MILICOLI</i>	Kolistīna sulfāts	2 MSV/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Teļi Jēri Cūkas Mājputni	3 dienas	Teļi, jēri, cūkas: 100 000 SV/kg dienā Mājputni: 75 000 SV/kg dienā	Gaļa un subprodukti: cūkas, teļi, cāļi: 1 diena Jēri un mājputni, izņemot cāļus: 7 dienas Olas: nulle dienas
Francija	<i>Laboratoires Biové</i> <i>3 rue de Lorraine</i> <i>62510 Arques</i> FRANCIJA	<i>ACTI COLI 2</i> <i>MUI/ML</i>	Kolistīna sulfāts	2 MSV/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Teļi Jēri Cūkas Mājputni	3 dienas	Teļi, jēri, cūkas: 100 000 SV/kg dienā Mājputni: 75 000 SV/kg dienā	Gaļa un subprodukti: cūkas: 0 dienas Cāļi: 1 diena Citi mājputni: 7 dienas Teļi: 2 dienas Jēri: 7 dienas Olas: nulle dienas
Francija	<i>Laprovat</i> <i>2 Chemin de la</i> <i>Milletière</i> <i>B.P. 67562</i> <i>37075 Tours Cedex 2</i> FRANCIJA	<i>COLISTINE</i> <i>SOLUTION</i> <i>E.A.F.</i>	Kolistīna sulfāts	2 MSV/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Teļi Jēri Cūkas Mājputni	3 dienas	Teļi, jēri, cūkas: 100 000 SV/kg dienā Mājputni: 75 000 SV/kg dienā	Gaļa un subprodukti: 7 dienas. Olas: nulle dienas

Dalībvalsts/ EEZ	Pieteikuma iesniedzējs/ Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	SNN	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Lietošanas biežums un veids	Ieteicamā deva	Izdalīšanās periods
Francija	Sogeval Zone Industrielle des Touches 200, avenue de Mayenne B.P. 2227 53022 Laval Cedex 9 FRANCIJA	<i>SOGECOLI 2 MILLIONS UI/ML SOLUTION BUVABLE</i>	Kolistīna sulfāts	2 MSV/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Teļi Jēri Cūkas Mājputni	3 dienas	Teļi, jēri, cūkas: 100 000 SV/kg dienā Mājputni: 75 000 SV/kg dienā	Gaļa un subprodukti: cūkas: 0 dienas Cāļi: 1 diena Citi mājputni: 7 dienas. Teļi: 2 dienas Jēri: 7 dienas Olas: nulle dienas
Francija	<i>Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M LID B.P. 27 06516 Carros Cedex FRANCIJA</i>	<i>COLISTINE SULFATE 2 MUI /ML BUVABLE VIRBAC</i>	Kolistīna sulfāts	2 MSV/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Teļi Jēri Cūkas Mājputni	3 dienas	Teļi, jēri, cūkas: 100 000 SV/kg dienā Mājputni: 75 000 SV/kg dienā.	Gaļa un subprodukti: 7 dienas. Olas: nulle dienas
Vācija	<i>Divasa-Farmavic S.A. Ctra San Hipolito km 71 08503 Gurb-Vic (Barcelona) SPĀNIJA</i>	<i>Coliplus</i>	Kolistīna sulfāts	2 MSV/ml	Koncentrāts iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai	Teļi Jēri Cūkas Mājputni	Teļi, jēri, cūkas, mājputni: trīs dienas pēc kārtas dzeramā ūdenī.	Teļi un jēri: 100 000 SV kolistīna/kg ķermeņa masas dienā, sadalot divās vienādās devās, t. i., 0,50 ml preparāta/10 kg ķermeņa masas dienā trīs dienas pēc kārtas. Cūkas: 100 000 SV kolistīna/kg ķermeņa masas dienā, t. i., 0,50 ml preparāta/10 kg	Gaļa un subprodukti: 7 dienas Olas: nulle dienas

Dalībvalsts/ EEZ	Pieteikuma iesniedzējs/ Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	SNN	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Lietošanas biežums un veids	Ieteicamā deva	Izdalīšanās periods
								ķermeņa masas dienā trīs dienas pēc kārtas. Mājputni: 75 000 SV kolistīna/kg ķermeņa masas dienā, t. i., 37,5 ml preparāta/1 tonnu ķermeņa masas dienā trīs dienas pēc kārtas.	
Grieķija	<i>Ceva Santé Animale Zone Industrielle La Ballastiere B.P. 126 33500 Libourne FRANCIJA</i>	<i>Colivet</i>	Kolistīna sulfāts	2 MSV/ml	Koncentrāts iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai	Cūkas Mājputni	Dzeramā ūdenī katru dienu	Cūkas: 100 000 SV/kg ķermeņa masas x 3 dienas Mājputni: 75 000 SV/kg ķermeņa masas x 3 dienas	Cūkas: 1 diena Broileri un dējējvistas: 1 diena Citi mājputni: 7 dienas Olas: nulle dienas
Grieķija	<i>Divasa-Farmavic S.A. Ctra San Hipolito km 71 08503 Gurb-Vic (Barcelona) SPĀNIJA</i>	<i>COLISTIN 2.000.000 IU/ML/DIVASA- FARMANIC</i>	Kolistīna sulfāts	2 MSV/ml	Koncentrāts iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai	Teļi Jēri Cūkas Mājputni	Teļi, jēri, cūkas, mājputni: trīs dienas pēc kārtas dzeramā ūdenī	Teļi un jēri: 100 000 SV kolistīna/kg ķermeņa masas, sadalot divās vienādās devās, t. i., 0,50 ml preparāta/10 kg ķermeņa masas dienā trīs dienas pēc kārtas Cūkas: 100 000 SV kolistīna/kg ķermeņa masas, t. i., 0,50 ml preparāta/10 kg ķermeņa masas dienā trīs dienas pēc kārtas	Gaļa un subprodukti: 7 dienas Olas: nulle dienas

Dalībvalsts/ EEZ	Pieteikuma iesniedzējs/ Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	SNN	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Lietošanas biežums un veids	Ieteicamā deva	Izdalīšanās periods
								Mājputni: 75 000 SV kolistīna/kg ķermeņa masas, t. i., 37,5 ml preparāta/1 tonnu ķermeņa masas dienā trīs dienas pēc kārtas	
Ungārija	<i>Divasa-Farmavic S.A. Ctra San Hipolito km 71 08503 Gurb-Vic (Barcelona) SPĀNIJA</i>	<i>COLIPLUS 2,000,000 IU/ml concentrate for oral solution for use in drinking water for cattle, sheep, swine and chickens</i>	Kolistīna sulfāts	2 MSV/ml	Koncentrāts iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai	Teļi Jēri Cūkas Mājputni	Teļi, jēri, cūkas, mājputni: trīs dienas pēc kārtas dzeramā ūdenī	Teļi un jēri: 100 000 SV kolistīna/kg ķermeņa masas dienā, sadalot divās vienādās devās, t. i., 0,50 ml preparāta/10 kg ķermeņa masas dienā trīs dienas pēc kārtas Cūkas: 100 000 SV kolistīna/kg ķermeņa masas dienā, t. i., 0,50 ml preparāta/10 kg ķermeņa masas dienā trīs dienas pēc kārtas Mājputni: 75 000 SV kolistīna/kg ķermeņa masas dienā, t. i., 37,5 ml preparāta/1 tonnu ķermeņa masas dienā trīs dienas pēc kārtas	Gaļa un subprodukti: 7 dienas Olas: nulle dienas.
Ungārija	<i>Coophavet S.A.S Saint Herblion, B.P. 70089 44153 Ancenis Cedex FRANCIJA</i>	<i>Cofacoli oral solution</i>	Kolistīna sulfāts	2 MSV/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Liellopi (zīdāmi teļi) Cūkas Cāļi	Teļi, cūkas: 0,25 ml preparāta/10 kg ķermeņa masas divreiz dienā 3 – 4 dienas	Teļi, cūkas: 50 000 SV/kg ķermeņa masas Broileri, dējējvistas: 75 000 SV /kg ķermeņa masas dienā	Teļi: 3 dienas Cūkas: 2 dienas Cāļi un dējējvistas: 2

Dalībvalsts/ EEZ	Pieteikuma iesniedzējs/ Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	SNN	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Lietošanas biežums un veids	Ieteicamā deva	Izdalīšanās periods
							Cāļi, dējējvistas: 37,5 ml preparāta/tonnu dzīvsvara, izšķīdinot dzeramā ūdenī, 3 dienas		dienas Olas: nulle dienas.
Īrija	<i>Ceva Santé Animale Zone Industrielle La Ballastiere B.P. 126 33500 Libourne FRANCIJA</i>	<i>COLISCOUR 2 000 000 IU/ml, concentrate for oral solution, pigs, poultry</i>	Kolistīna sulfāts	2 MSV/ml	Koncentrāts iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai	Cūkas Mājputni	Katru dienu trīs dienas pēc kārtas. Lieto iekšķīgi ar dzeramo ūdeni.	Cūkas: 100 000 SV kolistīna uz kg ķermeņa masas dienā, t. i., 0,50 ml preparāta uz 10 kg ķermeņa masas dienā Mājputni: 75 000 SV kolistīna uz kg ķermeņa masas dienā, t. i., 37,5 ml preparāta uz tonnu ķermeņa masas dienā	Cūkas: gaļa un subprodukti: 1 diena Broileri un dējējvistas: gaļa un subprodukti: 1 diena Citi mājputni: gaļa un subprodukti: 7 dienas Olas: nulle dienas.
Itālija	<i>Divasa-Farmavic S.A. Ctra San Hipolito km 71 08503 Gurb-Vic (Barcelona) SPĀNIJA</i>	<i>COLIPLUS 2,000,000 IU/ml concentrate for oral solution for use in drinking water for cattle, sheep, swine and chickens</i>	Kolistīna sulfāts	2 MSV/ml	Koncentrāts iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai	Teļi Jēri Cūkas Mājputni	Teļi, jēri, cūkas, mājputni: trīs dienas pēc kārtas dzeramā ūdenī.	Teļi un jēri: 100 000 SV kolistīna/kg ķermeņa masas dienā, sadalot divās vienādās devās, t. i., 0,50 ml preparāta/10 kg ķermeņa masas dienā trīs dienas pēc kārtas Cūkas: 100 000 SV kolistīna/kg	Teļi, jēri: gaļa un subprodukti: 7 dienas Cūkas: gaļa un subprodukti: 1 diena Broileri un

Dalībvalsts/ EEZ	Pieteikuma iesniedzējs/ Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	SNN	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Lietošanas biežums un veids	Ieteicamā deva	Izdalīšanās periods
								ķermeņa masas dienā, t. i., 0,50 ml preparāta/10 kg ķermeņa masas dienā trīs dienas pēc kārtas. Mājputni: 75 000 SV kolistīna/kg ķermeņa masas dienā, t. i., 37,5 ml preparāta/1 tonnu ķermeņa masas dienā trīs dienas pēc kārtas.	dējējvistas: 1 diena. Olas: nulle dienas Citi mājputni: gaļa un subprodukti: 7 dienas. Olas: nulle dienas
Latvija	<i>Ceva Santé Animale Zone Industrielle La Ballastiere B.P. 126 33500 Libourne FRANCIJA</i>	<i>Colivet oral solution</i>	Kolistīna sulfāts	2 MSV/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Cūkas Mājputni	Iekšķīgai lietošanai. Lietošana ar dzeramo ūdeni vai pienu vai tieši mutē. Divreiz dienā 3–5 dienas pēc kārtas.	Cāji: 75 000 SV kolistīna uz kg dienā (0,37 ml <i>Colivet</i> uz 10 kg divreiz dienā) Cūkas: 50 000 SV kolistīna uz kg divreiz dienā (0,25 ml <i>Colivet</i> uz 10 kg divreiz dienā).	Pārtikā izmantojami audi: 1 diena Olas: 1 diena
Lietuva	<i>Ceva Santé Animale Zone Industrielle La Ballastiere B.P. 126 33500 Libourne FRANCIJA</i>	<i>COLIVET SOLUTION, geriamasis tirpalas</i>	Kolistīna sulfāts	2 MSV/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Cūkas Mājputni	Ar dzeramo ūdeni vai piena pulveri. Iekšķīgi ar dzeramo ūdeni.	Cūkas: 50 000 SV/kg ķermeņa masas, t. i., 0,25 ml <i>Colivet</i> šķīduma uz 10 kg ķermeņa masas divreiz dienā 3–5 dienas pēc kārtas. Mājputni: 75 000 SV/kg ķermeņa masas dienā, t. i., aptuveni 0,37 ml <i>Colivet</i> šķīduma uz 10 kg ķermeņa masas divreiz dienā 3–5 dienas	Gaļa: 1 diena. Mājputni: gaļa un olas: 1 diena

Dalībvalsts/ EEZ	Pieteikuma iesniedzējs/ Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	SNN	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Lietošanas biežums un veids	Ieteicamā deva	Izdalīšanās periods
								pēc kārtas.	
Lietuva	<i>Divasa-Farmavic S.A. Ctra San Hipolito km 71 08503 Gurb-Vic (Barcelona) SPĀNIJA</i>	<i>Colistop, geriamasis tirpalas</i>	Kolistīna sulfāts	2 MSV/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Cūkas Mājputni (broileri)	Iekšķīgai lietošanai, parasti ar dzeramo ūdeni. trīs dienas pēc kārtas	Cūkas – 102 500 SV/kg ķermeņa masas ik pēc 12 stundām trīs dienas (atbilst 0,5 ml <i>Colistop</i> šķīduma/10 kg ķermeņa masas ik pēc 12 stundām, trīs dienas pēc kārtas). Broileri: 123 000 SV/kg ķermeņa masas dienā trīs dienas (atbilst 0,06 ml <i>Colistop</i> šķīduma/kg ķermeņa masas dienā, trīs dienas pēc kārtas).	Nobarojamas cūkas: 2 dienas Broileri: 7 dienas
Lietuva	<i>Divasa-Farmavic S.A. Ctra San Hipolito km 71 08503 Gurb-Vic (Barcelona) SPĀNIJA</i>	<i>COLIPLUS 2,000,000 IU/ml concentrate for oral solution for use in drinking water for cattle, sheep, swine and chickens</i>	Kolistīna sulfāts	2 MSV/ml	Koncentrāts iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai	Teļi Jēri Cūkas Mājputni	Teļi, jēri, cūkas, mājputni: trīs dienas pēc kārtas dzeramā ūdenī	Teļi un jēri: 100 000 SV kolistīna/kg ķermeņa masas dienā, sadalot divās vienādās devās, t. i., 0,50 ml preparāta/10 kg ķermeņa masas dienā trīs dienas pēc kārtas. Cūkas: 100 000 SV kolistīna/kg ķermeņa masas dienā, t. i., 0,50 ml preparāta/10 kg ķermeņa masas dienā trīs dienas pēc kārtas. Mājputni: 75 000 SV kolistīna/kg ķermeņa masas	Teļi, jēri: gaļa un subprodukti: 7 dienas Cūkas: gaļa un subprodukti: 1 diena Broileri un dējējvistas: 1 diena Olas: nulle dienas Citi mājputni:

Dalībvalsts/ EEZ	Pieteikuma iesniedzējs/ Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	SNN	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Lietošanas biežums un veids	Ieteicamā deva	Izdalīšanās periods
								dienā, t. i., 37,5 ml preparāta/1 tonnu ķermeņa masas dienā trīs dienas pēc kārtas	gaļa un subprodukti: 7 dienas. Olas: nulle dienas
Polija	<i>Ceva Santé Animale Zone Industrielle La Ballastiere B.P. 126 33500 Libourne FRANCIJA</i>	<i>Colivet solution</i>	Kolistīna sulfāts	2 MSV/ml	šķīdums iekšķīgai lietošanai	Cūkas Cāļi	Lietošana ar dzeramo ūdeni vai pienu. 3–5 dienas	Cāļi: 75 000 SV kolistīna/1 kg ķermeņa masas dienā 3–5 dienas (0,37 ml preparāta/10 kg ķermeņa masas divreiz dienā 3– 5 dienas) Cūkas: 50 000 SV kolistīna/1 kg ķermeņa masas dienā 3–5 dienas, 0,25 ml preparāta/10 kg ķermeņa masas divreiz dienā 3– 5 dienas	Gaļa un subprodukti: 1 diena Olas: 1 diena
Polija	<i>DIVASA - FARMAVIC, S.A. Ctra. Sant Hipòlit, km 71 08503 GURB - VIC (Barcelona) Spānija</i>	<i>Coliplus 2,000,000 IU/ml concentrate for oral solution for use in drinking water for cattle, sheep, swine and chickens</i>	Kolistīns (kolistīna sulfāta formā)	2 MSV/ml	Koncentrāts iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai lietošanai kopā ar dzeramo ūdeni	Liellopi (teļi), aitas (jēri), cūkas un cāļi	Teļi, jēri, cūkas, mājputni: trīs dienas pēc kārtas dzeramā ūdenī	Teļi un jēri: 100 000 SV kolistīna/kg ķermeņa masas dienā, sadalot divās vienādās devās, t. i., 0,50 ml preparāta/10 kg ķermeņa masas dienā trīs dienas pēc kārtas Cūkas: 100 000 SV kolistīna/kg ķermeņa masas, t. i., 0,50 ml preparāta/10 kg ķermeņa masas dienā trīs dienas pēc kārtas Mājputni: 75 000 SV	Gaļa un subprodukti: 7 dienas Olas: nulle dienas. Nav atļauts lietot dzīvniekiem, kuru pienu izmanto cilvēka uzturā.

Dalībvalsts/ EEZ	Pieteikuma iesniedzējs/ Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	SNN	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Lietošanas biežums un veids	Ieteicamā deva	Izdalīšanās periods
								kolistīna/kg ķermeņa masas dienā, t. i., 37,5 ml preparāta/1 tonnu ķermeņa masas dienā trīs dienas pēc kārtas	
Portugāle	<i>Ceva Saúde Animal - Produtos Farmacêuticos e Farmacológicos, Lda Rua Doutor António Loureiro Borges, 9/9A - 9ºA Miraflores 1495-131 Algés PORTUGĀLE</i>	<i>Colivet 2 000 000 UI /ml, concentrate for oral solution for pigs and birds</i>	Kolistīna sulfāts	2 MSV/ml	Koncentrāts iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai	Cūkas Mājputni	3 dienas	Cūkas: 100 000 SV/kg ķermeņa masas dienā Putni: 75 000 SV/kg ķermeņa masas dienā	Gaļa un subprodukti: cūkas: 1 diena Broileri un dējējvistas: 1 diena Citi putni: 7 dienas Olas: nulle dienas
Portugāle	<i>Divasa-Farmavic S.A. Ctra San Hipólito km 71 08503 Gurb-Vic (Barcelona) SPĀNIJA</i>	<i>COLIPLUS 2,000,000 IU/ml concentrate for oral solution for use in drinking water for cattle, sheep, swine and chickens</i>	Kolistīna sulfāts	2 MSV/ml	Koncentrāts iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai	Teļi Jēri Cūkas Mājputni	Teļi, jēri, cūkas, mājputni: trīs dienas pēc kārtas dzeramā ūdenī.	Teļi un jēri: 100 000 SV kolistīna/kg ķermeņa masas dienā, sadalot divās vienādās devās, t. i., 0,50 ml preparāta/10 kg ķermeņa masas dienā trīs dienas pēc kārtas Cūkas: 100 000 SV kolistīna/kg ķermeņa masas dienā, t. i., 0,50 ml preparāta/10 kg ķermeņa masas dienā trīs	Teļi, jēri: gaļa un subprodukti: 7 dienas Cūkas: gaļa un subprodukti: 1 diena Broileri un dējējvistas: 1 diena

Dalībvalsts/ EEZ	Pieteikuma iesniedzējs/ Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	SNN	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Lietošanas biežums un veids	Ieteicamā deva	Izdalīšanās periods
								dienas pēc kārtas Mājputni: 75 000 SV kolistīna/kg ķermeņa masas dienā, t. i., 37,5 ml preparāta/1 tonnu ķermeņa masas dienā trīs dienas pēc kārtas	Olas: nulle dienas Citi mājputni: gaļa un subprodukti: 7 dienas Olas: nulle dienas
Rumānija	CENAVISA, S.A. Camí Pedra Estela S/N 43205 Reus SPĀNIJA	ENTEROBAS SOLUCION	Kolistīna sulfāts	2 MSV/ml	šķīdums iekšķīgai lietošanai	Teļi Cūkas Mājputni	Iekšķīgi (ar dzeramo ūdeni vai piena aizstājēju): 4–5 dienas	Teļi un cūkas: 100 000 SV/kg ķermeņa masas dienā, kas atbilst 0,5 ml/10 kg ķermeņa masas dienā Mājputni: 100 000 SV/kg ķermeņa masas dienā, kas atbilst 0,5 ml/litru dzeramā ūdens dienā	Gaļa: teļi – 2 dienas Cūkas: 5 dienas Mājputni: 3 dienas Olas: nelietot dzīvniekiem, kuru olas tiek izmantotas cilvēka uzturā.
Rumānija	CEVA SANTE ANIMALE ROMANIA SRL 5 Chindiei , sector 4 040185 Bucharest RUMĀNIJA	COLIVET SOLUTION	Kolistīna sulfāts	2 MSV/ml	šķīdums iekšķīgai lietošanai	Cūkas Mājputni	Iekšķīgai lietošanai (ar dzeramo ūdeni): Trīs dienas pēc kārtas	Cūkas: 100 000 SV kolistīna (sulfāta formā)/1 kg ķermeņa masas divās vienādās dienas devās, t. i., 0,5 ml preparāta uz 10 kg ķermeņa masas divās vienādi dalītās dienas devās. Mājputni: 75 000 SV kolistīna (sulfāta formā)/1 kg ķermeņa masas dienā, t. i., 37,5 ml preparāta uz vienu tonnu	Gaļa un subprodukti: cūkas: 1 diena Broileri un dējējvistas: 1 diena Olas: nulle dienas

Dalībvalsts/ EEZ	Pieteikuma iesniedzējs/ Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	SNN	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Lietošanas biežums un veids	Ieteicamā deva	Izdalīšanās periods
								ķermeņa masas dienā	
Rumānija	<i>Divasa-Farmavic S.A. Ctra San Hipolito km 71 08503 Gurb-Vic (Barcelona) SPĀNIJA</i>	<i>COLIPLUS 2,000,000 IU/ml concentrate for oral solution for use in drinking water for cattle, sheep, swine and chickens</i>	Kolistīna sulfāts	2 MSV/ml	Koncentrāts iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai	Teļi Jēri Cūkas Mājputni	Teļi, jēri, cūkas, mājputni: trīs dienas pēc kārtas dzeramā ūdenī	Teļi un jēri: 100 000 SV kolistīna/kg ķermeņa masas dienā, sadalot divās vienādās devās, t. i., 0,50 ml preparāta /10 kg ķermeņa masas dienā trīs dienas pēc kārtas Cūkas: 100 000 SV kolistīna/kg ķermeņa masas dienā, t. i., 0,50 ml preparāta/10 kg ķermeņa masas dienā trīs dienas pēc kārtas Mājputni: 75 000 SV kolistīna/kg ķermeņa masas dienā, t. i., 37,5 ml preparāta uz vienu tonnu ķermeņa masas dienā trīs dienas pēc kārtas	Gaļa un subprodukti: 7 dienas Olas: nulle dienas
Rumānija	<i>Divasa-Farmavic S.A. Ctra San Hipolito km 71 08503 Gurb-Vic (Barcelona) SPĀNIJA</i>	<i>COLIPLUS SOLUTION</i>	Kolistīna sulfāts	2 MSV/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Cūkas, Broileri	Iekšķīgai lietošanai (ar dzeramo ūdeni): trīs dienas	Mājputni: 0,03 ml/kg ķermeņa masas dienā Cūkas: 0,5 ml/10 kg ķermeņa masas ik pēc 12 stundām	Gaļa: 9 dienas

Dalībvalsts/ EEZ	Pieteikuma iesniedzējs/ Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	SNN	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Lietošanas biežums un veids	Ieteicamā deva	Izdalīšanās periods
Rumānija	<i>Franvet</i> <i>Zone industrielle</i> <i>d'Etriche</i> <i>Route d'Avire, BP</i> <i>103</i> <i>49500 Segré Cedex</i> FRANCIJA	<i>MILICOLI</i>	Kolistīna sulfāts	2 MSV/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Teļi Jēri Cūkas Mājputni	Iekšķīgai lietošanai (ar dzeramo ūdeni vai piena aizstājēju): 3 - 4 dienas	Teļi, cūkas un jēri: 50 000 SV/kg ķermeņa masas vai 0,25 ml preparāta/10 kg ķermeņa masas Mājputni: 75 000 SV/kg dienā vai 0,25 ml uz vienu litru ūdens	Gaļa un subprodukti: 7 dienas Olas: nulle dienas
Rumānija	<i>S.C. CRIDA PHARM</i> <i>S.R.L.</i> <i>Str. Stadionului nr. 1</i> <i>Oltenita</i> RUMĀNIJA	<i>COLICRID</i>	Kolistīna sulfāts	2 MSV/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Cūkas Mājputni	Iekšķīgai lietošanai (ar dzeramo ūdeni): 3–5 dienas	Cūkas: 100 000 SV kolistīna sulfāta uz 1 kg ķermeņa masas dienā, t. i., 0,05 ml preparāta uz 1 kg ķermeņa masas dienā Mājputni: 100 000 SV kolistīna sulfāta uz 1 kg ķermeņa masas dienā, t. i., 0,05 ml preparāta uz 1 kg ķermeņa masas dienā	Gaļa: cūkas: 7 dienas Mājputni: 3 dienas
Rumānija	<i>Sogeval</i> <i>Zone Industrielle des</i> <i>Touches</i> <i>200, avenue de</i> <i>Mayenne</i> <i>B.P. 2227</i> <i>53022 Laval Cedex 9</i> FRANCIJA	<i>SOGECOLI</i>	Kolistīna sulfāts	2 MSV/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Teļi Jēri Mājputni	Iekšķīgai lietošanai: 3–4 dienas	Teļi, jēri: 50 000 SV/kg ķermeņa masas vai 0,25 ml /10 kg ķermeņa masas divreiz dienā, no rīta un vakarā Mājputni: 75 000 SV/kg ķermeņa masas dienā vai 0,25 ml uz vienu litru ūdens	Gaļa: 7 dienas
Slovākija	<i>Ceva Animal Health</i> <i>Slovakia, spol. s.r.o.</i> <i>Račianska 77</i> <i>831 02 Bratislava</i> SLOVĀKIJA	<i>COLIVET sol. ad</i> <i>us.vet.</i>	Kolistīna sulfāts	2 MSV/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Cūkas, cāļi	3–5 dienas ar dzeramo ūdeni, pienu vai tiešā veidā	Cūkas: 50 000 SV kolistīna sulfāta/kg ķermeņa masas (0,25 ml preparāta/10 kg ķermeņa masas) (divas reizes) Cāļi: 75 000 SV kolistīna sulfāta/kg ķermeņa masas (0,37 ml preparāta/10 kg ķermeņa masas)	Gaļa: 1 diena. Olas: 1 diena.

Dalībvalsts/ EEZ	Pieteikuma iesniedzējs/ Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	SNN	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Lietošanas biežums un veids	Ieteicamā deva	Izdalīšanās periods
Slovākija	<i>Dívasa-Farmavic S.A. Ctra San Hipolito km 71 08503 Gurb-Vic (Barcelona) SPĀNIJA</i>	<i>COLIPLUS 2 000 000 IU/ml koncentrāt na perorálny roztok na použitie v pitnej vode pre hovädzí dobytok, ovce, ošípané a kurčatá</i>	Kolistīna sulfāts	2 MSV/ml	Koncentrāts iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai	Teļi Jēri Cūkas Mājputni	Teļi, jēri, cūkas, mājputni: trīs dienas pēc kārtas dzeramā ūdenī	Teļi un jēri: 100 000 SV kolistīna/kg ķermeņa masas dienā, sadalot divās vienādās devās, t. i., 0,50 ml preparāta/10 kg ķermeņa masas dienā trīs dienas pēc kārtas Cūkas: 100 000 SV kolistīna uz 1 kg ķermeņa masas dienā, t. i., 0,50 ml preparāta/10 kg ķermeņa masas dienā trīs dienas pēc kārtas Mājputni: 75 000 SV kolistīna uz 1 kg ķermeņa masas dienā, t. i., 37,5 ml preparāta uz vienu tonnu ķermeņa masas dienā trīs dienas pēc kārtas	Teļi, jēri: gaļa un subprodukti: 7 dienas Cūkas: gaļa un subprodukti: 1 diena Broileri un dējējvistas: 1 diena Olas: nulle dienas Citi mājputni: gaļa un subprodukti: nulle dienas.
Spānija	<i>CEVA SALUD ANIMAL, S.A. Carabela La Niña n° 12 5ª planta 08017 Barcelona SPĀNIJA</i>	<i>COLIVET 2,000,000 UI/ML</i>	Kolistīna sulfāts	2 MSV/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Cūkas Putni	3 dienas. Iekšķīgi	Cūkas: 100 000 SV/kg ķermeņa masas Putni: 75 000 SV/kg ķermeņa masas	1 diena

Dalībvalsts/ EEZ	Pieteikuma iesniedzējs/ Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	SNN	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Lietošanas biežums un veids	Ieteicamā deva	Izdalīšanās periods
Spānija	<i>Divasa-Farmavic S.A. Ctra San Hipolito km 71 08503 Gurb-Vic (Barcelona) SPĀNIJA</i>	<i>COLIPLUS SOLUCION</i>	Kolistīna sulfāts	2 MSV/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Cūkas Putni (cāji)	3 dienas. Iekšķīgi	Cūkas: 102 500 SV/kg ķermeņa masas/12 stundās Putni: 123 000 SV/kg ķermeņa masas/12 stundās	Cūkas: 2 dienas Putni: 7 dienas
Spānija	<i>Divasa-Farmavic S.A. Ctra San Hipolito km 71 08503 Gurb-Vic (Barcelona) SPĀNIJA</i>	<i>COLISTINA DIVASA 2,000,000 IU/ml concentrate for oral solution for use in drinking water for cattle, sheep, swine and chickens</i>	Kolistīna sulfāts	2 MSV/ml	Koncentrāts iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai	Teļi Jēri Cūkas Mājputni	Teļi, jēri, cūkas, mājputni: trīs dienas pēc kārtas dzeramā ūdenī	Teļi un jēri: 100 000 SV kolistīna uz 1 kg ķermeņa masas dienā, sadalot divās vienādās devās, t. i., 0,50 ml preparāta/10 kg ķermeņa masas dienā trīs dienas pēc kārtas Cūkas: 100 000 SV kolistīna/kg ķermeņa masas dienā, t. i., 0,50 ml preparāta/10 kg ķermeņa masas dienā trīs dienas pēc kārtas Mājputni: 75 000 SV kolistīna/kg ķermeņa masas dienā, t. i., 37,5 ml preparāta uz vienu tonnu ķermeņa masas dienā trīs dienas pēc kārtas	Gaļa: 7 dienas Olas: nulle dienas

Dalībvalsts/ EEZ	Pieteikuma iesniedzējs/ Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	SNN	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Lietošanas biežums un veids	Ieteicamā deva	Izdalīšanās periods
Nīderlande	<i>Dívasa-Farmavic S.A. Ctra San Hipolito km 71 08503 Gurb-Vic (Barcelona) SPĀNIJA</i>	<i>COLIPLUS 2,000,000 IU/ml concentrate for oral solution for use in drinking water for cattle, sheep, swine and chickens</i>	Kolistīna sulfāts	2 MSV/ml	Koncentrāts iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai	Teļi Jēri Cūkas Mājputni	Teļi, jēri, cūkas, mājputni: trīs dienas pēc kārtas dzeramā ūdenī	Teļi un jēri: 100 000 SV kolistīna uz 1 kg ķermeņa masas dienā, sadalot divās vienādās devās, t. i., 0,50 ml preparāta/10 kg ķermeņa masas dienā trīs dienas pēc kārtas Cūkas: 100 000 SV kolistīna uz 1 kg ķermeņa masas dienā, t. i., 0,50 ml preparāta/10 kg ķermeņa masas dienā trīs dienas pēc kārtas Mājputni: 75 000 SV kolistīna/kg ķermeņa masas dienā, t. i., 37,5 ml preparāta uz vienu tonnu ķermeņa masas dienā trīs dienas pēc kārtas	Gaļa: 7 dienas Olas: nulle dienas
Apvienotā Karaliste	<i>Ceva Animal Health Ltd 90 The Broadway Chesham Buckinghamshire HP5 1EG APVIENOTĀ KARALISTE</i>	<i>Colibird</i>	Kolistīna sulfāts	2 MSV/ml	Koncentrāts iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai	Mājputni	Trīs dienas pēc kārtas dzeramā ūdenī	75 000 SV/kg ķermeņa masas dienā	Gaļa: 7 dienas Olas: nulle dienas

Dalībvalsts/ EEZ	Pieteikuma iesniedzējs/ Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	SNN	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Lietošanas biežums un veids	Ieteicamā deva	Izdalīšanās periods
Apvienotā Karaliste	<i>Ceva Animal Health Ltd</i> 90 The Broadway Chesham Buckinghamshire HP5 1EG APVIENOTĀ KARALISTE	<i>Coliscour, oral solution of colistin sulphate 2 MIU/ml</i>	Kolistīna sulfāts	2 MSV/ml	Koncentrāts iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai	Cūkas	Divreiz dienā piecas dienas pēc kārtas (ar dzeramo ūdeni vai tieši mutē)	50 000 SV/kg ķermeņa masas divreiz dienā	Gaļa un subprodukti: 1 diena
Apvienotā Karaliste	<i>Divasa-Farmavic S.A.</i> <i>Ctra San Hipolito km</i> <i>71</i> <i>08503 Gurb-Vic</i> <i>(Barcelona)</i> SPĀNIJA	<i>Coliplus</i> <i>2,000,000</i> <i>IU/ml</i> <i>concentrate for</i> <i>oral solution for</i> <i>use in drinking</i> <i>water for cattle,</i> <i>sheep, swine</i> <i>and chickens</i>	Kolistīna sulfāts	2 MSV/ml	Koncentrāts iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai	Teļi Jēri Cūkas Mājputni	Teļi, jēri, cūkas, mājputni: trīs dienas pēc kārtas dzeramā ūdenī	Teļi un jēri: 100 000 SV kolistīna/kg ķermeņa masas dienā, sadalot divās vienādās devās, t. i., 0,50 ml preparāta/10 kg ķermeņa masas dienā trīs dienas pēc kārtas Cūkas: 100 000 SV kolistīna/kg ķermeņa masas dienā, t. i., 0,50 ml preparāta/10 kg ķermeņa masas dienā trīs dienas pēc kārtas Mājputni: 75 000 SV kolistīna/kg ķermeņa masas dienā, t. i., 37,5 ml preparāta uz vienu tonnu ķermeņa masas dienā trīs dienas pēc kārtas	Gaļa: 7 dienas Olas: nulle dienas.

II PIELIKUMS

ZINĀTNISKIE SECINĀJUMI UN PAMATOJUMS ZĀĻU APRAKSTA IZMAIŅĀM

VISPĀRĒJS ZINĀTNISKĀ NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS VETERINĀRĀM ZĀLĒM, KAS SATUR 2 000 000 SV/ML KOLISTĪNA SULFĀTA UN IR PAREDZĒTAS LIETOŠANAI AR DZERAMO ŪDENI TELĒM, JĒRIEM, CŪKĀM UN MĀJPUTNU SUGĀM

1. Ievads

Veterinārās zāles, kas satur 2 000 000 SV/ml kolistīna sulfāta un ir paredzētas lietošanai ar dzeramo ūdeni telēm, cūkām, jēriem un mājputniem, tiek izmantotas pret kolistīnu jutīgu *Escherichia coli* un *Salmonella* sugu izraisītu kuņģa-zarnu trakta infekciju ārstēšanai.

Kolistīna sulfāts ir polipeptīdu antibiotika, kas pieder polimiksīnu antibiotiku grupai. Šīs grupas antibiotikām ir polipeptīdu struktūra ar galvenokārt baktericīdu iedarbību un vidēji plašu antibakteriālo spektru, kas ietver tikai gramnegatīvos mikroorganismus.

Apvienotā Karaliste izteica bažas, ka devu un izdalīšanās perioda atšķirības Eiropas Savienībā veterinārām zālēm, kas satur 2 000 000 SV/ml kolistīna un ir paredzētas lietošanai ar dzeramo ūdeni uzturā izmantojamām dzīvnieku sugām, var izraisīt nopietnu risku sabiedrības un dzīvnieku veselībai.

Procedūra attiecās uz 47 veterinārām zālēm, kas reģistrētas vai ir reģistrācijas procesā dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs (skatīt I pielikumu).

2. Pieejamo datu apspriešana

Pieteikuma iesniedzēju/reģistrācijas apliecības īpašnieku iesniegtie dati liecināja, ka minētās veterinārās zāles ir reģistrētas vai ir reģistrācijas procesā ar dažādām reģistrācijas procedūrām (savstarpējās atzīšanas vai nacionālās procedūras) un ar atšķirīgu tiesību aktu pamatojumu (pilnīgu un ģenērisku).

Tika ņemts vērā, ka daļa iesniegto datu ir identiska, bet tos iesnieguši dažādi pieteikuma iesniedzēji/reģistrācijas apliecību īpašnieki. Iesniegto datu paketes ietver bibliogrāfiskus datus, kas pieejami publiski, un ar īpašumtiesībām aizsargātus datus.

Attiecībā uz efektivitāti cūkām preklīniskie dati liecināja, ka kolistīna sulfāta devas un to lietošanas biežums cūkām ir noteikts, izmantojot farmakokinētikas/farmakodinamikas (FK/FD) analīzi. Tika ņemts vērā, ka analīze, kas pamatota ar kolistīna sulfāta koncentrācijas noteikšanu kuņģa-zarnu traktā pēc dažāda līmeņa iedarbības un ar informāciju par minimālo inhibējošo koncentrāciju (MIK) *E. coli* celmiem, kas apkopota piecās Eiropas valstīs, var būt apšaubāma, jo surogātrādītājs C_{max}/MIK nav apstiprināts, lai vērtētu vietēju iedarbību kuņģa-zarnu traktā, un nebija informācijas par aktīvā savienojuma daļu, kas izdalās izkārnījumos. Panākta vienošanās, ka ierosinātā deva 50 000 SV uz kilogramu ķermeņa masas divreiz dienā ir pamatota. Šī deva bija ieteicamā deva lielākajai daļai šajā pārskatīšanas procedūrā iekļauto preparātu, un tādēļ tā ir lietota klīnikā daudzus gadus. Dažiem no iekļautajiem preparātiem ieteicamais ārstēšanas periods bija 5–7 dienas, ko uzskatīja par pārāk garu, ņemot vērā mērķi sasniegt optimālu līdzsvaru starp bakterioloģiskās izārstēšanas rādītāju un rezistences rašanās risku. Dažiem iekļautajiem preparātiem ieteicamais ārstēšanas intervāls bija 3–5 dienas.

Attiecībā uz iedarbīgumu, ārstējot cāļus, tika iesniegts ziņojums par pētījumiem no publiski pieejamas literatūras par *E. coli* infekciju ārstēšanu, pievienojot kolistīna sulfātu barībai. Šie pētījumi sniedz pietiekamu atbalstu cāļu kolibacilozes ārstēšanai, lai gan atbilstība starp devām, kas šajos pētījumos lietotas kopā ar barību un devu, kas ieteikta lielākajai daļai šajā pārskatīšanas procedūrā ietvertu preparātu (75 000 SV kolistīna uz kilogramu ķermeņa masas vienreiz dienā trīs dienas), nebija pilnībā pamatota.

Attiecībā uz neinvazīvu *E. coli* celmu izraisītām kuņģa-zarnu trakta infekcijām telēm un jēriem, iesniegtie dati indikācijas pamatošanai bija ierobežoti. Tomēr, ņemot vērā plašo šīs vielas lietojumu šīm sugām un faktu, ka nebija informācijas, kas liecinātu par kādu jaunu risku, kas saistīts ar kolistīna lietošanu telēm un jēriem neefektivitātes vai cilvēka veselības apdraudējuma ziņā, Komiteja uzskatīja, ka kolistīna lietošanu telēm un jēriem neinvazīvu *E. coli* izraisītu kuņģa-zarnu trakta infekciju ārstēšanā var turpināt. Deva, kas pašlaik ieteikta visiem telu un jēru ārstēšanai reģistrētiem preparātiem, ir saskaņota deva 100 000 SV kolistīna uz kilogramu ķermeņa masas dienā. Ārstēšanas ilgums, kas pašlaik ieteikts telu un jēru ārstēšanai reģistrētiem preparātiem, lielākajā daļā gadījumu bija trīs dienas. Diviem preparātiem ieteicamais ārstēšanas ilgums bija 3–4 dienas pēc kārtas.

Attiecībā uz *Salmonella* sugu izraisītu infekciju ārstēšanu telēm, jēriem, cūkām un mājputniem, klīniskie dati netika iesniegti vai bija ļoti ierobežoti, lai pamatotu šo indikāciju pašlaik šīs procedūras ietvaros reģistrētiem preparātiem. Iesniegtie klīniskie dati par salmonellozes ārstēšanu cāļiem nebija pārliecinoši un šīs vielas piemērotība salmonellu infekciju ārstēšanai var būt apšaubāma. Sliktās uzsūkšanās dēļ zarnās kolistīns darbotos vienīgi pret neinvazīvām salmonellām. Komiteja ņēma vērā,

ka subklīniskas salmonellu infekcijas ārstēšana ar mērķi mazināt baktēriju skaitu varētu ietekmēt šīs slimības kontroles programmas¹. Komiteja uzskatīja, ka pieteikuma iesniedzēju/reģistrācijas apliecības īpašnieku nespēja sniegt datus vai pamatojumu, lai atbalstītu salmonellu infekcijas ārstēšanas ierosinājumu, var izraisīt risku sabiedrības un dzīvnieku veselībai, jo ārstēšana varētu apgrūtināt baktēriju konstatēšanu, pilnībā nelikvidējot infekciju/kolonizāciju. Pilnīgs vai daļējs efektivitātes trūkums var izraisīt zoonotisku mikroorganismu savairošanos ārstētiem dzīvniekiem un vidē un kavēt efektīvu elimināciju neefektīvas ārstēšanas dēļ.

Attiecībā uz antibakteriālo rezistenci pret kolistīnu jānorāda, ka viennozīmīgs secinājums par antibakteriālo rezistenci nav izdarāms, jo nav informācijas par patēriņu. Tomēr, tā kā kolistīns ir apstiprināts desmitiem gadu un līdz šim rezistence ir saglabājusies zemā līmenī, CVMP uzskata, ka ir pieejama pietiekama informācija, lai secinātu, ka rezistence nav uzskatāma par problēmu. Plašie pieteikuma iesniedzēju/reģistrācijas apliecības īpašnieku iesniegtie MIK dati par periodu, kurā kolistīna sulfāts lietots klīnikā, pietiekami skaidri liecina, ka rezistence pret šo vielu nebija radījusi bažas.

Kopumā CVMP uzskatīja, ka ir pietiekami daudz informācijas, lai atbalstītu neinvazīvu, pret kolistīnu jutīgu *E. coli* izraisītu kuņģa-zarnu trakta infekciju ārstēšanu, ja preparātu lieto devā 100 000 SV kolistīna uz kilogramu ķermeņa masas dienā teļiem, jēriem, cūkām un 75 000 SV kolistīna uz kilogramu ķermeņa masas dienā mājputniem 3–5 dienas pēc kārtas. Attiecībā uz neinvazīvu *E. coli* izraisītu kuņģa-zarnu trakta infekciju ārstēšanas ilgumu mērķa sugām atzīmēja, ka ārstēšanas efektu ir viegli uzraudzīt un tādēļ ārstēšanas ilgumu var pielāgot atbilstoši slimības norisei.

Noteiktais izdalīšanās periods dalībvalstīs bija robežās no vienas līdz deviņām dienām. Lai atbalstītu noteiktos izdalīšanās periodus, pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecību īpašnieki iesniedza astoņus pētījumus par atliekvielu daudzuma mazināšanos teļiem, cūkām un cāļiem. Iesniegtie atliekvielu daudzuma mazināšanās pētījumi bija pārskatīti un balstīti uz ieteicamajām devām liellopiem (100 000 SV kolistīna uz kilogramu ķermeņa masas dienā 3–5 dienas pēc kārtas) un uz ierosināto saskaņoto devu cūkām un mājputniem (100 000 SV kolistīna uz kilogramu ķermeņa masas dienā cūkām un 75 000 SV kolistīna uz kilogramu ķermeņa masas dienā mājputniem 3–5 dienas), izdalīšanās periodus teļiem, cūkām un cāļiem pārrēķināja, izmantojot alternatīvu metodi². Kopumā par pamatotu atzina šādu izdalīšanās periodu: viena diena pārtikā izmantojamiem teļu, cūku un cāļu audiem un subproduktiem un nulle dienas olām.

Pētījumi par atliekvielu daudzuma mazināšanos jēriem un citām mājputnu sugām, izņemot cāļus, netika iesniegti. Pašlaik spēkā esošajos zāļu aprakstos izdalīšanās periods šīm sugām ir norādīts septiņas dienas. Ņemot vērā vispārējās zināšanas par vielas slikto uzsūkšanos kuņģa-zarnu traktā, Komiteja uzskatīja, ka izdalīšanās periods – viena diena, kas ieteikts teļiem, cūkām un cāļiem, piemērojams arī jēriem un citām mājputnu sugām.

3. Ieguvumu un riska novērtējums

Lai gan iesniegto datu kvalitāte novērtēta kā zema un dažos gadījumos – nepietiekama, tādējādi tie neatbalsta dažas no ierosinātajām indikācijām, Komiteja atzina, ka ir pietiekami daudz dokumentētu pierādījumu par kolistīna sulfāta efektivitāti, lietojot cūkām neinvazīvu, pret kolistīnu jutīgu *E. coli* izraisītu kuņģa-zarnu trakta infekciju ārstēšanā devā 100 000 SV kolistīna uz kg ķermeņa masas dienā 3–5 dienas pēc kārtas.

Bija iesniegti arī pietiekami dokumentēti pierādījumi par kolistīna efektivitāti, lietojot mājputniem neinvazīvu, pret kolistīnu jutīgu *E. coli* izraisītu kuņģa-zarnu trakta infekciju ārstēšanā devā 75 000 SV kolistīna uz kg ķermeņa masas dienā 3–5 dienas pēc kārtas.

Līdz ar to kolistīna ieguvumu un riska attiecību neinvazīvu *E. coli* izraisītu kuņģa-zarnu trakta infekciju ārstēšanā cūkām un mājputniem, lietojot minētajās devās, uzskatīja par pozitīvu.

Kolistīna sulfāta lietošana neinvazīvu *E. coli* izraisītu infekciju ārstēšanā teļiem un jēriem uzskatāma par labi pierādītu. Tika ņemts vērā, ka pieteikuma iesniedzēji/reģistrācijas apliecības īpašnieki nebija iesnieguši datus, lai atbalstītu optimālā terapijas ilguma noteikšanu kolibacilozes gadījumā teļiem un jēriem. Tomēr iekšķīgi lietots kolistīns var būt noderīgs neinvazīvu *E. coli* izraisītu infekciju ārstēšanā šīm sugām, un ārstēšanas efekts ir viegli konstatējams klīniskā praksē. Turklāt nav iegūta jauna

¹ Komisijas Regula (EK) Nr. 1177/2006 (2006. gada 1. augusts), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2160/2003 par īpašu kontroles metožu izmantošanu dalībvalstu programmās par salmonellas apkarošanu mājputnos (OV L 212, 2.8.2006., 3. lpp.). - <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:212:0003:0005:EN:PDF>

² CVMP piezīmes regulai: pieeja izdalīšanās periodu saskaņošanai
<http://www.emea.europa.eu/pdfs/vet/swp/003695en.pdf>.

informācija, kas liecinātu par jaunu risku saistībā ar kolistīna lietošanu teļiem un jēriem neefektivitātes vai sabiedrības vai dzīvnieku veselībai nozīmīgas rezistences rašanās dēļ. Iesniegtajā periodiski atjaunojamā drošības ziņojumā netiek ziņots par neefektivitāti ierosināto indikāciju gadījumā teļiem un jēriem. Līdz ar to uzskatīja, ka kolistīna ieguvumu un riska attiecība neinvazīvu *E. coli* izraisītu kuņģa-zarnu trakta infekciju ārstēšanā teļiem un jēriem ar ieteicamo devu 100 000 SV uz kilogramu ķermeņa masas dienā ir pozitīva. Attiecībā uz ārstēšanas ilgumu, ņemot vērā faktu, ka ārstēšanas efektu ir viegli novērot un tādēļ ārstēšanas ilgumu var pielāgot atbilstoši slimības gaitai, Komiteja vienojās ieteikt saskaņot ārstēšanas ilgumu 3–5 dienas visiem teļiem un jēriem paredzētiem preparātiem. Turklāt atzīmēja, ka ieteicamā dienas deva teļiem, jēriem un cūkām jāsadala divās devās, ja preparāts jāievada tieši dzīvniekam mutē.

Turpretim CVMP uzskatīja, ka pieteikuma iesniedzēju/reģistrācijas apliecības īpašnieku nespēja sniegt datus vai pamatojumu, lai atbalstītu ierosinājumu "...salmonellu sugu izraisītu kuņģa-zarnu trakta infekciju ārstēšanai...", var izraisīt risku sabiedrības un dzīvnieku veselībai, jo ārstēšana varētu apgrūtināt baktēriju konstatēšanu, pilnībā nelikvidējot infekciju/kolonizāciju. Pilnīgs vai daļējs efektivitātes trūkums var izraisīt zoonotisku mikroorganismu savairošanos ārstētiem dzīvniekiem (un vidē) un kavēt efektīvu salmonellu elimināciju neefektīvas ārstēšanas dēļ. Līdz ar to kolistīna ieguvumu un riska attiecību salmonellu sugu izraisītu kuņģa-zarnu trakta infekciju ārstēšanā teļiem, jēriem, cūkām un mājputniem uzskatīja par negatīvu.

Ņemot vērā informāciju par atliekvielu daudzuma mazināšanos, ko iesnieguši pieteikuma iesniedzēji/reģistrācijas apliecības īpašnieki, izdalīšanās periodu – vienu dienu pārtikā izmantojamiem teļu, cūku un cāļu audiem un subproduktiem un nulle dienas olām – uzskatīja par pietiekamu. Nebija pieejama informācija par atliekvielu daudzuma mazināšanos jēriem un citām mājputnu sugām, izņemot cāļus. Izdalīšanās periods, kas norādīts spēkā esošajos zāļu aprakstos, šīm sugām ir septiņas dienas. Ņemot vērā iesniegtos atliekvielu daudzuma mazināšanās datus, lai atbalstītu izdalīšanās periodus teļiem, cūkām un cāļiem, kā arī vispārzināmo faktu, ka viela slikti uzsūcas kuņģa-zarnu traktā, Komiteja uzskatīja, ka šīm dzīvnieku sugām būtu iesakāms tāds pats izdalīšanās periods, proti, viena diena.

PAMATOJUMS ZĀĻU APRAKSTA, MARĶĒJUMA TEKSTA UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS IZMAIŅĀM

Tā kā:

- *CVMP* ņēma vērā visus iesniegtos datus un vispārējās zināšanas par vielu, ko sniedz tās plašais lietojums veterinārijā vairāk nekā 20 gadu laikā. Komitejai novērtēšanai iesniegtie dati bija zemas kvalitātes un dažos gadījumos nesniedza pamatojumu ierosinājumiem, devām, ārstēšanas ilgumam vai izdalīšanās periodiem. Vienīgā joma, kurā konstatēja iespējamu risku, bija neefektivitātes risks invazīvu celmu gadījumā un iespējama ietekme uz salmonellu kontroles programmām. Nebija dokumentētu pierādījumu, kas liecinātu par cilvēka vai dzīvnieku veselībai nozīmīgas rezistences rašanos. Iesniegtajā periodiski atjaunojamā drošības ziņojumā apstiprināto indikāciju gadījumā nevienā no apstiprinātajām mērķa sugām netika ziņots par neefektivitāti vai rezistences rašanos;
- *CVMP* ņēma vērā, ka kolistīns iekšķīgi neinvazīvu *E. coli* izraisītu kuņģa-zarnu trakta infekciju ārstēšanai teļiem, jēriem, cūkām un mājputniem ir lietots desmitiem gadu. Lai gan klīniskā dokumentācija, kas iesniegta saistībā ar šo pārskatīšanas procedūru, ir ierobežota, dati liecināja, ka neinvazīvas *E. coli* infekcijas teļiem, jēriem, cūkām un mājputniem var efektīvi ārstēt, lietojot devu 100 000 SV kolistīna uz kilogramu ķermeņa masas dienā teļiem, jēriem, cūkām un 75 000 SV kolistīna uz kilogramu ķermeņa masas dienā mājputniem, ja ārstēšanas ilgums ir 3–5 dienas pēc kārtas.
- *CVPM* ņēma vērā, ka pieteikuma iesniedzēji/reģistrācijas apliecības īpašnieki neiesniedza datus vai pamatojumu, lai atbalstītu ierosinājumu "... salmonellu sugu izraisītu kuņģa-zarnu trakta infekciju ārstēšanai..." teļiem, jēriem, cūkām vai mājputniem. Tā kā nav šādu datu, uzskata, ka šī lietošana var izraisīt risku sabiedrības un dzīvnieku veselībai, jo ārstēšanas dēļ var būt grūti konstatēt baktērijas un ir nepilnīgas infekcijas/kolonizācijas eliminācijas risks, tādēļ iespējama zoonotisku mikroorganismu saglabāšanās ārstētiem dzīvniekiem un apkārtējā vidē, kas kavē efektīvu elimināciju. Līdz ar to kolistīna lietošana salmonellu izraisītu infekciju ārstēšanā var ietekmēt specifiskās salmonellu kontroles metodes un nacionālās programmas;
- *CVMP* uzskatīja, ka, lietojot kolistīnu devā 100 000 SV uz kilogramu ķermeņa masas dienā 3–5 dienas, pietiekams izdalīšanās periods pārtikā izmantojamiem teļu, jēru un cūku audiem un subproduktiem ir viena diena;
- *CVMP* uzskatīja, ka, lietojot kolistīnu devā 75 000 SV uz kg ķermeņa masas dienā 3–5 dienas pēc kārtas, pietiekams izdalīšanās periods pārtikā izmantojamiem mājputnu audiem un subproduktiem ir viena diena, bet olām – nulle dienas;

CVMP ieteica veikt atzinuma III pielikumā norādītās izmaiņas reģistrācijas apliecībās un, ja piemērojams, attiecīgajos zāļu apraksta, marķējuma teksta un lietošanas instrukcijas apakšpunktos veterinārām zālēm, kas satur kolistīnu 2 000 000 SV/ml un ir paredzētas lietošanai kopā ar dzeramo ūdeni uzturā lietojamām dzīvnieku sugām, kas norādītas atzinuma I pielikumā.

III PIELIKUMS
ZĀĻU APRAKSTA, MARĶĒJUMA TEKSTA UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS IZMAIŅAS

ATTIECĪGAJOS ZĀĻU APRAKSTA APAKŠPUNKTOS IEKĻAUJAMĀS IZMAIŅAS

4.2. lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Neinvazīvu, pret kolistīnu jutīgu *E. coli* izraisītu kuņģa-zarnu trakta infekciju ārstēšana.

Nepieciešamības gadījumā dzēst informāciju par citu baktēriju, nevis *E. coli* izraisītu kuņģa-zarnu trakta infekciju ārstēšanu.

4.9. Devas un lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai.

Teljiem, jēriem un cūkām ieteicamā deva ir 100 000 SV kolistīna uz kilogramu ķermeņa masas dienā 3–5 dienas pēc kārtas. Ja preparāts jālieto tieši dzīvniekam mutē, ieteicamā dienas deva jāsadala divās devās.

Mājputniem ieteicamā deva ir 75 000 SV kolistīna uz kilogramu ķermeņa masas dienā 3–5 dienas pēc kārtas.

4.11. Izdalīšanās periods (izdalīšanās no organisma)

Gaja un subprodukti:

Telji: 1 diena

Jēri: 1 diena

Cūkas: 1 diena

Mājputni: 1 diena

Olas: nulle dienas

ATTIECĪGAJOS MARĶĒJUMA TEKSTA APAKŠPUNKTOS IEKĻAUJAMĀS IZMAIŅAS

6. INDIKĀCIJA(S)

Neinvazīvu, pret kolistīnu jutīgu *E. coli* izraisītu kuņģa-zarnu trakta infekciju ārstēšana.

Nepieciešamības gadījumā dzēst informāciju par citu baktēriju, nevis *E. coli* izraisītu kuņģa-zarnu trakta infekciju ārstēšanu.

8. IZDALĪŠANĀS PERIODS (ZĀĻU IZDALĪŠANĀS PERIODS NO ORGANISMA)

Gaļa un subprodukti:

Teļi: 1 diena

Jēri: 1 diena

Cūkas: 1 diena

Mājputni: 1 diena

Olas: nulle dienas

ATTIECĪGAJOS LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS APAKŠPUNKTOS IEKĻAUJAMĀS IZMAIŅAS

4. INDIKĀCIJA(-S)

Neinvazīvu, pret kolistīnu jutīgu *E. coli* izraisītu kuņģa-zarnu trakta infekciju ārstēšana.

Nepieciešamības gadījumā dzēst informāciju par citu baktēriju, nevis *E. coli* izraisītu kuņģa-zarnu trakta infekciju ārstēšanu.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA(-IEM) UN PAŅĒMIENA

Iekšķīgai lietošanai.

Teļiem, jēriem un cūkām ieteicamā deva ir 100 000 SV kolistīna uz kilogramu ķermeņa masas dienā 3–5 dienas pēc kārtas. Ja preparāts jālieto tieši dzīvniekam mutē, ieteicamā dienas deva jāsadala divās devās.

Mājputniem ieteicamā deva ir 75 000 SV kolistīna uz kilogramu ķermeņa masas dienā 3–5 dienas pēc kārtas.

10. IZDALĪŠANĀS PERIODS (ZĀĻU IZDALĪŠANĀS PERIODS NO ORGANISMA)

Gaļa un subprodukti:

Teļi: 1 diena

Jēri: 1 diena

Cūkas: 1 diena

Mājputni: 1 diena

Olas: nulle dienas