

I PIELIKUMS

**VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMU, ZĀĻU FORMU, STIPRUMU,
DZĪVNIEKU SUGU, LIETOŠANAS VEIDU,
INDIKĀCIJU/IZDALĪŠANĀS PERIODU UN PIETEIKUMA
IESNIEDZĒJU/REGISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKU
SARAKSTS DALĪBVALSTĪS**

Dalībvalsts/ EEZ	Pieteikuma iesniedzējs/ Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	SNN	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Lietošanas biežums un veids	Ieteicamā deva	Izdalīšanās periods(- i) / Indikācijas
Austrija	<i>Chevita Tierarzneimittel Gesellschaft m.b.H.Kaplanstraße 10 AT 4600 Wels AUSTRIJA</i>	<i>Doxymax 500 mg/g - Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen für Schweine und Hühner</i>	Doksiciklīna hiklāts	500 mg/g	Pulveris iekšķīgai lietošanai	Cūkas, cāļi (broileri)	Cāļi: 3–5 dienas, iekšķīgi ar dzeramo ūdeni	Cāļi: 25 mg doksiciklīna hiklāta/kg ķermeņa masas dienā = 1 g pulvera/20 kg dienā	Gaļa un subprodukti: cāļiem (broileriem) 5 dienas Olas: nav paredzēts lietošanai dējējvistām Indikācijas: <i>Mycoplasma</i> sugu (<i>M. gallisepticum</i>), <i>Escherichia coli</i> izraisīta elpceļu infekcija, <i>Pasteurella multocida</i> izraisīta septicēmija
Beļģija	<i>DOPHARMA B.V. Zalmweg 24, P.O. BOX 205 4940 AE Raamsdonksveer NĪDERLANDE</i>	<i>Doxycycline 50 % Dopharma</i>	Doksiciklīna hiklāts	500 mg/g	Ūdenī šķīstošs pulveris	Teļi, cūkas, mājputni	Mājputni: 50 mg/kg dienā	3–5 dienas 500 g/1000 l dzeramā ūdens	Gaļa un subprodukti: 6 dienas. Indikācijas: mikroorganismu izraisītas elpceļu vai kuņģa-zarnu trakta infekcijas
Beļģija	<i>VIRBAC S.A. 1ère avenue - 2065 m - L.I.D. 06516 CARROS FRANCIJA</i>	<i>Pulmodox 50 %</i>	Doksiciklīna hiklāts	500 mg/g	Ūdenī šķīstošs pulveris	Teļi, cūkas, mājputni	Mājputni: 50 mg/kg dienā	3–5 dienas 500 g/1000 l dzeramā ūdens	Gaļa un subprodukti: 6 dienas. Indikācijas: mikroorganismu izraisītas elpceļu vai kuņģa-zarnu trakta infekcijas
Beļģija	<i>Eurovet Animal Health B.V. Handelsveg 25 PO Box 179 5530 AD Bladel NĪDERLANDE</i>	<i>Soludox 50 %</i>	Doksiciklīna hiklāts	500 mg/g	Ūdenī šķīstošs pulveris	Cūkas, mājputni	Mājputni: 10–20 mg/kg dienā	3–4 dienas 100– 200 g/1000 l dzeramā ūdens	Gaļa un subprodukti: 3 dienas/10 mg/kg 12 dienas/20 mg/kg Indikācijas: elpceļu slimības

Dalībvalsts/ EEZ	Pieteikuma iesniedzējs/ Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	SNN	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Lietošanas biežums un veids	Ieteicamā deva	Izdalīšanās periods(- i) / Indikācijas
Beļģija	<i>Eurovet Animal Health B.V. Handelsveg 25 PO Box 179 5530 AD Bladel NĪDERLANDE</i>	<i>Soludox 15 % ad. us. vet..</i>	Doksiciklīna hiklāts	150 mg/g	Ūdenī šķīstošs pulveris	Cūkas, teļi, mājputni, sugas putni, baloži	Mājputni: 10–20 mg/kg dienā	3–5 dienas 500 g/1000 l dzeramā ūdens	Gaļa un subprodukti: 7 dienas. Indikācijas: mikroorganismu izraisītas elpceļu slimības
Beļģija	<i>Huvepharma N.V. Uitbreidingstraat 80 2600 Antwerpen BEĻĢIJA</i>	<i>Hydrodoxx 500 mg/g water- soluble powder</i>	Doksiciklīna hiklāts	500 mg/g doksiciklīna hiklāta	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošan ai	Cāļi (broileri) un cūkas (nobarojamas cūkas)	Iekšķīgi (ar dzeramo ūdeni)	20 mg doksiciklīna (hiklāta)/kg x 3–5 dienas	Gaļa un subprodukti: Cāļi: 6 dienas. Nelietot dējējputniem, kuru olas izmanto cilvēku uzturā. Indikācijas: Cāļi (broileri): <i>Mycoplasma gallisepticum</i> izraisītas hroniskas elpceļu slimības (HES) profilakse un ārstēšana.
Bulgārija	<i>Farma Sis OOD 4 San Stefano Str. Dobrich BULGĀRIJA</i>	<i>Doxinyl 10 % Oral Suspension</i>	Doksiciklīna hiklāts	100 mg/ml	Suspensija iekšķīgai lietošanai	Mājputni	Ar dzeramo ūdeni	50–100 ml <i>Doxinyl 10 %</i> 100 l dzeramā ūdens dienā (50–100 mg doksiciklīna 1 l dzeramā ūdens) 3–5 dienas	Gaļa – 5 dienas
Bulgārija	<i>Farma Sis OOD 4 San Stefano Str. Dobrich BULGĀRIJA</i>	<i>Cyvadox 10 %</i>	Doksiciklīna hiklāts	100 mg/ml	Suspensija iekšķīgai lietošanai	Mājputni	Ar dzeramo ūdeni	0,5–1 ml 1 litrā dzeramā ūdens dienā \3–5 dienas\ 50–100 mg doksiciklīna	Gaļa – 7 dienas

Dalībvalsts/ EEZ	Pieteikuma iesniedzējs/ Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	SNN	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Lietošanas biežums un veids	Ieteicamā deva	Izdalīšanās periods(- i) / Indikācijas
Bulgārija	DOPHARMA B.V. Zalmweg 24, P.O. BOX 205 4940 AE Raamsdonksveer NĪDERLANDE	<i>Doxycycline 50 % w.s.p.</i>	Doksiciklīna hiklāts	500 mg/g	Ūdenī šķīstošs pulveris	Mājputni	Ar dzeramo ūdeni	500 g <i>Doxycycline 50 % w.s.p.</i> 100 l dzeramā ūdens /3-5 dienas/	Gaļa – 4 dienas
Bulgārija	Farmavet OOD 40 Otec Paisij Str. Shumen BULGĀRIJA	<i>Doxycycline 20 % Pulvis solubilis</i>	Doksiciklīna hiklāts	200 mg/g	Ūdenī šķīstošs pulveris	Mājputni	Ar dzeramo ūdeni	50 g <i>Doxycycline 20 % w.s.p.</i> 100 l dzeramā ūdens/3-5 dienas/	Gaļa-7 dienas
Bulgārija	Interchemie Werken De Adelaar BV Hosterweg 26a 5811 Ccastenray NĪDERLANDE	<i>Doxy – WS</i>	Doksiciklīna hiklāts	200 mg/g	Ūdenī šķīstošs pulveris	Mājputni	Ar dzeramo ūdeni	1 kg <i>Doxy-WS 2000 – 4000 l</i> dzeramā ūdens	Gaļa – 7 dienas
Bulgārija	Ceva Sante Animale France La Balastiere 33501 Libourne Cedex FRANCIJA	<i>Doxyvit 50 % WSP</i>	Doksiciklīna hiklāts	500 mg/g	Ūdenī šķīstošs pulveris	Mājputni	Ar dzeramo ūdeni	2-3 g <i>Doxyvit 50 % WSP</i> 10 l dzeramā ūdens – 5dienas /atbilst 100- 150 mg doksiciklīna 1 litrā ūdens	Gaļa – 7 dienas
Bulgārija	Ceva Sante Animale France La Balastiere 33501 Libourne Cedex FRANCIJA	<i>Doxyvit 100</i>	Doksiciklīna hiklāts	100 mg/g	Ūdenī šķīstošs pulveris	Mājputni	Ar dzeramo ūdeni	10 mg <i>Doxyvit</i> uz kg ķermeņa masas dienā	Gaļa – 7 dienas

Dalībvalsts/ EEZ	Pieteikuma iesniedzējs/ Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	SNN	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Lietošanas biežums un veids	Ieteicamā deva	Izdalīšanās periods(- i) / Indikācijas
Bulgārija	<i>Vetpartners OOD Ivan Asen Str. 4270 Parvomaj BULGĀRIJA</i>	<i>Polidoxichem 500/WSP</i>	Doksiciklīna hiklāts	500 mg/g	Ūdenī šķīstošs pulveris	Mājputni	Ar dzeramo ūdeni	50–100 mg doksiciklīna 1 litrā dzeramā ūdens/3–5 dienas/atbilst 0,1–0,2 g <i>Polidoxichem 500 WSP</i> 1 litrā dzeramā ūdens dienā	Gaļa – 7 dienas
Bulgārija	<i>Biovet AD 39 Petar Rakov Str. 4550 Peshtera BULGĀRIJA</i>	<i>Vibravet 10 % Water soluble premix</i>	Doksiciklīna hiklāts	100 mg/g	Ūdenī šķīstošs pulveris	Mājputni	Ar dzeramo ūdeni	1 g <i>Vibravet 10 %</i> 1 litrā dzeramā ūdens/= 67– 100 mg doksiciklīna dienā. 5 dienas.	Gaļa – 7 dienas
Kipra	<i>PREMIER SHUKUROGLOU LTD</i>	<i>HIPRADOXI-S</i>	Doksiciklīna hiklāts	100 mg	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Cūkas, cāļi (broileri)	Iekšķīgi, ar dzeramo ūdeni	Broileriem: 50–100 mg doksiciklīna hiklāta/l ūdens 3–5 dienas	Broileriem: Gaļa: 5 dienas Cūkas: Gaļa: 6 dienas
Čehijas Republika	<i>Industria Italiana Integratori TREI S.p.A. Viale Corassori 62 41100 Modena ITĀLIJA</i>	<i>DOXIPAN 20</i>	Doksiciklīna hiklāts	20 g/100 g	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošan ai	Cāļi – broileri, tītari	Iekšķīgai lietošanai ar dzeramo ūdeni 5 dienas.	Broileri: 5–7,5 g preparāta/10 l dzeramā ūdens tītari: 10–20 mg doksiciklīna/k g ķermeņa masas	Cāļi (broileri): Gaļa un subprodukti: 5 dienas. Tītari: Gaļa un subprodukti: 10 dienas. Indikācijas: Cāļi (broileri): hroniskas elpceļu slimības un ar tām saistītās infekcijas. Tītari: grampozitīvu un gramnegatīvu mikroorganismu un mikoplazmu izraisītas slimības, jo īpaši

Dalībvalsts/ EEZ	Pieteikuma iesniedzējs/ Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	SNN	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Lietošanas biežums un veids	Ieteicamā deva	Izdalīšanās periods(- i) / Indikācijas
									mikoplazmu un/vai stafilokoku izraisīts elpceļu un locītavu sindroms.
Čehijas Republika	<i>Pharmagal s.r.o., Murgašova 5, 949 01 Nitra, Slovākija</i>	<i>DOXYGAL</i>	Doksiciklīna hiklāts	50 mg/1 g	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošan ai	Mājputni	Iekšķīgai lietošanai ar dzeramo ūdeni 3–5 dienas.	Terapijai un profilaksei: 50 mg doksiciklīna/1 l dzeramā ūdens Terapijai: 100 mg doksiciklīna/1 l dzeramā ūdens	Gaļa un subprodukti: 7 dienas. Nedrīkst lietot dējējvistām, kuru olas izmanto cilvēku uzturā. Indikācijas: lieto sekundāru bakteriālu infekciju ārstēšanai pēc vīrusu izcelsmes slimībām. Mājputni: HES (mikoplazmoze), kolibaciloze

Dalībvalsts/ EEZ	Pieteikuma iesniedzējs/ Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	SNN	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Lietošanas biežums un veids	Ieteicamā deva	Izdalīšanās periods(- i) / Indikācijas
Čehijas Republika	<i>Lavet Pharmaceuticals Ltd., 1161 Budapest Ottó u. 14, Ungārija</i>	<i>DOXYVIT 40 %</i>	Doksiciklīna hiklāts	40 g/100 g	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošan ai	Cāļi – broileri, tītari	Iekšķīgai lietošanai ar dzeramo ūdeni 3–5 dienas.	1. Nepārtraukta terapija: 1,0 g <i>DOXYVIT</i> 40 % uz 3–6 l dzeramā ūdens 2. Pulsa terapija: 10–20 mg doksiciklīna/k g ķermeņa masas ik pēc 4–8 stundām.	Cāļi (broileri), tītari: Gaļa un subprodukti: 4 dienas. Nedrīkst lietot dējējvistām, kuru olas izmanto cilvēku uzturā. Indikācijas: pret doksiciklīnu jutīgu mikroorganismu izraisītu elpceļu, zarnu un sistēmisku infekciju ārstēšana un profilakse broileriem un tītariem. Hroniska elpceļu slimība (<i>Mycoplasma gallisepticum</i> , <i>Escherichia coli</i>) Aerosakulīts (<i>Mycoplasma meleagridis</i>) Infekciozs sinovīts (<i>Mycoplasma synoviae</i>) Putnu holēra (<i>Pasterella multocida</i>) Bordetellu infekcijas tītariem (<i>Bordetella avium</i>) Infekciozas iesnas (<i>Haemophilus paragallinarum</i>) Kolibacilioze (<i>Escherichia coli</i>) Nekrotisks enterīts (<i>Clostridium perfringens</i>) Hlamidioze (<i>Chlamydia psittaci</i>)

Dalībvalsts/ EEZ	Pieteikuma iesniedzējs/ Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	SNN	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Lietošanas biežums un veids	Ieteicamā deva	Izdalīšanās periods(- i) / Indikācijas
Čehijas Republika	Laboratorios Karizoo S.A Polígono Industrial La Borda Mas Pujades 11-12 08140 Caldes de Montbui Barcelona SPĀNIJA	KARIDOX 100 mg/ml	Doksiciklīna hiklāts	100 mg/1 ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Cāji (broileri)	Iekšķīgai lietošanai ar dzeramo ūdeni 3–5 dienas.	10–20 mg doksiciklīna/k g ķermeņa masas dienā (t. i., 0,5– 1,0 ml preparāta/l dzeramā ūdens dienā).	Cāji (broileri): Gaļa un subprodukti: 7 dienas. Nedrīkst lietot dējējvistām, kuru olas izmanto cilvēku uzturā. Indikācijas: pret doksiciklīnu jutīgu mikroorganismu izraisītas hroniskas elpceļu slimības (HES) un mikoplazmozes ārstēšana un profilakse.
Čehijas Republika	Tekro, spol. s.r.o., Višňová 2/484, 140 00 Praha 4, Čehijas Republika	MEDITEK DOX 100	Doksiciklīna hiklāts	100 g/kg	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošan ai	Broileri	Iekšķīgai lietošanai ar dzeramo ūdeni 3–5 dienas.	10 mg doksiciklīna hiklāta/1 kg ķermeņa masas (1,0 kg preparāta/100 0 l dzeramā ūdens)	Cāji (broileri): Gaļa un subprodukti: 7 dienas. Indikācijas: pret doksiciklīnu jutīgu patogēnu mikroorganismu izraisītas elpceļu un kuņģa-zarnu trakta infekcijas slimību profilakse un ārstēšana cūkām un broileriem. Tas ir efektīvs pret vairākām baktērijām, kas ir rezistentas pret pirmās paaudzes tetraciklīniem.

Dalībvalsts/ EEZ	Pieteikuma iesniedzējs/ Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	SNN	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Lietošanas biežums un veids	Ieteicamā deva	Izdalīšanās periods(- i) / Indikācijas
Čehijas Republika	CHEMO IBERICA, S.A. Gran Vía Carlos III, 98 7ª Edificio Trade 08028 Barcelona SPĀNIJA	ORIDOX 100 mg/ml, perorální roztok pro podání v pitné vodě pro brojleru a prasata	Doksiciklīna hiklāts	100 mg/1 ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Cāļi (broileri)	Iekšķīgai lietošanai ar dzeramo ūdeni 3–5 dienas.	10–20 mg doksiciklīna/k g ķermeņa masas dienā (t. i., 0,5– 1,0 ml preparāta/l dzeramā ūdens dienā	Cāļi (broileri): Gaļa un subprodukti: 7 dienas. Olas: Nedrīkst lietot dējējvistām, kuru olas izmanto cilvēku uzturā. Indikācijas: pret doksiciklīnu jutīgu mikroorganismu izraisītas hroniskas elpceļu slimības (HES) un mikoplazmozes ārstēšana un profilakse.
Čehijas Republika	VIRBAC S.A. 1ère avenue - 2065 m - L.I.D. 06516 CARROS FRANCIJA	Pulmodox O.S.P. 5 %	Doksiciklīna hiklāts	0,05 g/1 g	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai	Mājputni	Iekšķīgai lietošanai ar dzeramo ūdeni 3–5 dienas.	Mājputni līdz divu nedēļu vecumam: 1 g preparāta uz litru dzeramā ūdens un dienā Mājputni pēc divu nedēļu vecuma: 2 g preparāta uz litru dzeramā ūdens un dienā Ārstēšanas ilgums: 3–5 dienas.	Cāļi (broileri): Gaļa un subprodukti: 4 dienas. Nedrīkst lietot dējējvistām, kuru olas izmanto cilvēku uzturā. Indikācijas: pret doksiciklīnu jutīgu patogēnu mikroorganismu izraisītu elpceļu infekciju ārstēšana cāļiem (broileriem).

Dalībvalsts/ EEZ	Pieteikuma iesniedzējs/ Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	SNN	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Lietošanas biežums un veids	Ieteicamā deva	Izdalīšanās periods(- i) / Indikācijas
Čehijas Republika	<i>KELA Laboratoria n.v. Industrial Zone De Kluis" St. Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten BEĻĢIJA</i>	<i>Respidox 5 %</i>	Doksiciklīna hiklāts	50 mg/1 g	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošan ai	Mājputni	Iekšķīgai lietošanai ar dzeramo ūdeni 3 dienas.	2 g preparāta/l dzeramā ūdens	Mājputni: Gaļa un subprodukti: 7 dienas. Nedrīkst lietot dējējvistām, kuru olas izmanto cilvēku uzturā. Indikācijas: Pret doksiciklīnu jutīgu mikroorganismu izraisītu infekciju ārstēšana. Mājputni: HES, kolibaciloze, deguna gļotādas iekaisums, sinovīts, salmoneloze, putnu holēra, hlamidioze.
Čehijas Republika	<i>COOPHAVET Saint Herblon 44150 Ancenis FRANCIJA</i>	<i>RONAXAN P.S. 5 %</i>	Doksiciklīna hiklāts	50 mg/1 g	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošan ai	Cāji	Iekšķīgai lietošanai ar dzeramo ūdeni 5 dienas.	10 mg doksiciklīna/k g ķermeņa masas dienā (t. i., 1 g preparāta/5 k g ķermeņa masas)	Cāji (broileri): Gaļa un subprodukti: 4 dienas. Nedrīkst lietot dējējvistām, kuru olas izmanto cilvēku uzturā. Indikācijas: pret doksiciklīnu jutīgu patogēnu mikroorganismu izraisītu elpceļu infekciju ārstēšana cāļiem (broileriem).
Čehijas Republika	<i>LABORATORIOS CALIER, S.A. BARCELONÉS, 26 08520 Les Franqueses del Valles</i>	<i>Doxycycline Calier 500 mg/g</i>	Doksiciklīna hiklāts	500 mg/g	Ūdenī šķīstošs pulveris	Mājputni Cūkas	Iekšķīgi 3 – 5 dienas	20 mg/kg dienā	6 dienas. <i>Mycoplasma gallisepticum</i> izraisītas hroniskas elpceļu slimības (HES) profilakse un ārstēšana

Dalībvalsts/ EEZ	Pieteikuma iesniedzējs/ Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	SNN	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Lietošanas biežums un veids	Ieteicamā deva	Izdalīšanās periods(- i) / Indikācijas
	SPĀNIJA								
Čehijas Republika	<i>Ceva Animal Health Slovakia spol. s.r.o. Račianska 77 831 02 Bratislava SLOVĀKIJA</i>	DOXYVIT 100	Doksiciklīna hidrohlorīds	100 g/1000 g	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošan ai	Mājputni (cāļi, tītari, zosis)	Iekšķīgai lietošanai ar dzeramo ūdeni 5 dienas.	10 mg doksiciklīna/k g ķermeņa masas dienā, t. i., 0,1 g <i>DOXYVIT 100/kg</i> ķermeņa masas	Gaļa un subprodukti: 7 dienas. Nedrīkst lietot dējējvistām, kuru olas izmanto cilvēku uzturā. Indikācijas: pret doksiciklīnu jutīgu mikroorganismu izraisītu elpceļu, zarnu un sistēmisku infekciju ārstēšana un profilakse dējējvistām, tītariem un zosīm: hronisku elpceļu slimība (<i>Mycoplasma gallisepticum</i> , <i>Escherichia coli</i>), aerosakulīts (<i>Mycoplasma meleagridis</i>), sinovīts (<i>Mycoplasma synoviae</i>), putnu holēra (<i>Pasteurella mul tocida</i>), bordetelu infekcijas tītariem (<i>Bordetella avium</i>), infekciozās iesnas (<i>Haemophilus paragallinarum</i>), kolibaciloze (<i>Escherichia coli</i>), nekrotisks enterīts (<i>Clostridium perfringens</i>), hlamidioze (<i>Chlamydia psittaci</i>), profilakse stresa

Dalībvalsts/ EEZ	Pieteikuma iesniedzējs/ Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	SNN	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Lietošanas biežums un veids	Ieteicamā deva	Izdalīšanās periods(- i) / Indikācijas
									apstākļos (vakcinācija, dzīvesvietas pārmaiņas, transportēšana)
Dānija	Laboratorios Karizoo S.A. Pol. Ind. La Borda c/Mas Pujades 11-12 Caldes de Montbui 08140 SPĀNIJA	Karidox	Doksiciklīna hiklāts	10 %	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Cāļi, cūkas	Iekšķīgi (ar dzeramo ūdeni) 3– 5 dienas	Cāļiem: 10– 20 mg doksiciklīna hiklāta uz kg ķermeņa masas dienā 3–5 dienas (t. i., 0,5– 1,0 ml preparāta/litr u ūdens dienā)	Nokaušanai paredzēti cāļi: 7 dienas. Olas: nedrīkst lietot olas dējošiem mājputniem, ja olas paredzētas izmantošanai cilvēku uzturā. Indikācijas: pret doksiciklīnu jutīgu mikroorganismu izraisītas HES un mikoplazmozes profilakse un ārstēšana.
Dānija	CHEMO IBERICA, S.A. Gran Via Carlos III, 98 7ª Edificio Trade 08028 Barcelona SPĀNIJA	Oridox	Doksiciklīna hiklāts	10 %	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Cāļi, cūkas	Iekšķīgi (ar dzeramo ūdeni) 3– 5 dienas	Cāļiem: 10– 20 mg doksiciklīna hiklāta uz kg ķermeņa masas dienā 3–5 dienas (t. i., 0,5– 1,0 ml preparāta/litr u ūdens dienā)	Nokaušanai paredzēti cāļi: 7 dienas. Olas: nedrīkst lietot olas dējošiem mājputniem, ja olas paredzētas izmantošanai cilvēku uzturā. Indikācijas: pret doksiciklīnu jutīgu mikroorganismu izraisītas HES un mikoplazmozes profilakse un ārstēšana.

Dalībvalsts/ EEZ	Pieteikuma iesniedzējs/ Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	SNN	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Lietošanas biežums un veids	Ieteicamā deva	Izdalīšanās periods(- i) / Indikācijas
Dānija	Huvepharma N.V. Uitbreidingstraat 80 2600 Antwerpen BEĻĢIJA	HydroDoxx	Doksiciklīna hiklāts	500 mg/g doksiciklīna hiklāta	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošan ai	Cāļi (broileri) un cūkas (nobarojamas cūkas)	Iekšķīgi (ar dzeramo ūdeni)	20 mg doksiciklīna (hiklāta)/kg x 3–5 dienas	Gaļa un subprodukti: Cāļi: 6 dienas. Nelietot dējējputniem, kuru olas izmanto cilvēku uzturā. Indikācijas: Cāļi (broileri): <i>Mycoplasma gallisepticum</i> izraisītas hroniskas elpceļu slimības (HES) profilakse un ārstēšana.
Igaunija	Laboratorios Hipra S.A. Avda La Selva 135 17170 Amer (Girona) SPĀNIJA	Hipradoxi-S	Doksiciklīna hiklāts	100 mg/ml	Koncentrāts iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošan ai	cāļi (broileri)	Iekšķīgai lietošanai ar dzeramo ūdeni.	50...100 mg doksiciklīna/lit ru ūdens	Gaļa un subprodukti: 5 dienas. Nav reģistrēts lietošanai dējējputniem, kuru olas izmanto cilvēku uzturā. Indikācijas: kolibaciloze, HES un ar to saistītās infekcijas.
Igaunija	Laboratorios Hipra S.A. Avda La Selva 135 17170 Amer (Girona) SPĀNIJA	Hipradoxi-P	Doksiciklīna hiklāts	100 mg/g	pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošan ai	cāļi (broileri)	Iekšķīgai lietošanai ar dzeramo ūdeni.	20 mg doksiciklīna/k g ķermeņa masas dienā	Gaļa un subprodukti: 5 dienas. Nav reģistrēts lietošanai dējējputniem, kuru olas izmanto cilvēku uzturā. Indikācijas: kolibaciloze, HES un ar to saistītās infekcijas.
Igaunija	Maxx Pharma OÜ Kaluri tee 5 Haabneeme 74001 Viimsi Harjumaa IGAUNIJA	Doxyprim 40 %	Doksiciklīna hiklāts	400 mg/g	pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošan ai	cāļi, tītari	Iekšķīgai lietošanai ar dzeramo ūdeni.	10...20 mg/kg ķermeņa masas dienā 5 dienas	Gaļa un subprodukti: 4 dienas. Nav reģistrēts lietošanai dējējputniem, kuru olas izmanto cilvēku uzturā. Indikācijas: pret doksiciklīnu jutīgu mikroorganismu izraisītu elpceļu, zarnu

Dalībvalsts/ EEZ	Pieteikuma iesniedzējs/ Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	SNN	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Lietošanas biežums un veids	Ieteicamā deva	Izdalīšanās periods(- i) / Indikācijas
									un sistēmisku infekciju ārstēšana.
Igaunija	Zoovetvaru uusaru 5 76505 Saue Harjumaa IGAUNIJA	Doxycin	Doksiciklīna hiklāts	200 mg/g	pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošan ai	cāļi (broileri)	Iekšķīgai lietošanai ar dzeramo ūdeni	10 mg doksiciklīna/k g ķermeņa masas dienā 3–5 dienas	Gaļa un subprodukti: 6 dienas. Nelietot dējējputniem, kuru olas izmanto cilvēku uzturā. Indikācijas: pret doksiciklīnu jutīgu mikroorganismu, tostarp mikoplazmu, izraisītu elpceļu un gremošanas sistēmas infekciju, bordeteliozes, hlamidiozes, pasterelezes, anaerobo infekciju, salmonelozes, stafilokokozes, kolibacilozes ārstēšana.
Igaunija	Dutch Farm Veterinary Pharmaceuticals B.V. Veemweg 1 3771 MT Barneveld NĪDERLANDE	Dutch Farm Doxycycline 20 % WSP	Doksiciklīna hiklāts	200 mg/g	pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošan ai	mājputni	iekšķīgai lietošanai ar dzeramo ūdeni.	15 mg doksiciklīna hiklāta/kg ķermeņa masas dienā 3–5 dienas.	Gaļa un subprodukti: 7 dienas. Nelietot dējējputniem, kuru olas izmanto cilvēku uzturā. Indikācijas: pret doksiciklīnu jutīgu mikroorganismu izraisītu infekciju, jo īpaši elpceļu infekciju ārstēšana.

Dalībvalsts/ EEZ	Pieteikuma iesniedzējs/ Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	SNN	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Lietošanas biežums un veids	Ieteicamā deva	Izdalīšanās periods(- i) / Indikācijas
Vācija	LABORATORIOS CALIER, S.A. BARCELONÉS, 26 08520 Les Franqueses del Valles SPĀNIJA	DOXYCYCLINE CALIER 500 mg/g, Pulver zum Eingeben über das Trinkwasser für Huhn und Schwein	Doksiciklīna hiklāts	500 mg/g	Ūdenī šķīstošs pulveris	Mājputni Cūkas	Iekšķīgi 3–5 dienas	20 mg/kg dienā	Gaļa un subprodukti: 6 dienas. Indikācijas: <i>Mycoplasma gallisepticum</i> izraisītas hroniskas elpceļu slimības (HES) profilakse un ārstēšana
Vācija	Huvepharma N.V. Uitbreidingstraat 80 2600 Antwerpen BEĻĢIJA	HydroDoxx 500 mg/g Pulver zum Eingeben über das Trinkwasser	Doksiciklīna hiklāts	500 mg/g	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošan ai	Cāļi (broileri) un cūkas (nobarojamas cūkas)	Iekšķīgi (ar dzeramo ūdeni)	20 mg doksiciklīna (hiklāta)/kg x 3–5 dienas	Gaļa un subprodukti: Cāļi: 6 dienas. Neliotot dējējputniem, kuru olas izmanto cilvēku uzturā. Indikācijas: Cāļi (broileri): <i>Mycoplasma gallisepticum</i> izraisītas hroniskas elpceļu slimības (HES) profilakse un ārstēšana.
Grieķija	Durden Trading Limited 12,Kennedy Av. Nicosia KIPRA	Stardox	Doksiciklīna hiklāts	500 mg/g	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošan ai	Cāļi (broileri) Olas nedējoši cāļi Teļi Cūkas	Ar dzeramo ūdeni	20 mg/kg X 4–7 dienas	Gaļa un subprodukti: 14 dienas. Indikācijas: <i>Mycoplasma gallisepticum</i> izraisīta HES, kolibaciloze
Grieķija	NEW VET A.E Fleming 15 15123 Marousi Attikis GRIEĶIJA	Nexyclin	Doksiciklīna hiklāts	400 mg/g	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošan ai	Cāļi (broileri) Tītari Cūkas	Ar dzeramo ūdeni	20 mg/kg	Gaļa un subprodukti: 4 dienas. Indikācijas: <i>Mycoplasma gallisepticum</i> , <i>E.coli</i> <i>Pasteurella multocida</i> , <i>Chlamydia psittaci</i> izraisītas elpceļu infekcijas

Dalībvalsts/ EEZ	Pieteikuma iesniedzējs/ Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	SNN	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Lietošanas biežums un veids	Ieteicamā deva	Izdalīšanās periods(- i) / Indikācijas
Grieķija	VIRBAC S.A. 1ère avenue - 2065 m - L.I.D. 06516 CARROS FRANCIJA	<i>Pulmodox</i>	Doksiciklīna hiklāts	500 mg/g	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošan ai	Cāļi (broileri) Olas nedējoši cāļi Teļi Cūkas	Ar dzeramo ūdeni	10 mg/kg X 3–5 dienas	Gaļa un subprodukti: 9 dienas. Indikācijas: <i>Mycoplasma</i> sugu, <i>E.coli</i> , <i>Haemophilus</i> <i>paragalarum</i> , <i>Bordetella avium</i> izraisītas elpceļu infekcijas. <i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> un <i>colinum</i> izraisīts enterīts
Grieķija	Nutri-Biomed Hellas LTD 1,V.Hugo &Chlois Metamorfosi Attikis 14452 Athens GRIEĶIJA	<i>Doxyveto</i>	Doksiciklīna hiklāts	500 mg/g	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošan ai	Cāļi (broileri) Olas nedējoši cāļi Teļi Cūkas	Ar dzeramo ūdeni	25 mg/kg X 3–5 dienas	Gaļa un subprodukti: 9 dienas. Indikācijas: <i>Mycoplasma</i> sugu, <i>E.coli</i> , <i>Haemophilus</i> <i>paragalarum</i> , <i>Bordetella avium</i> izraisītas elpceļu infekcijas. <i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> un <i>colinum</i> izraisīts enterīts
Grieķija	DOPHARMA B.V. Zalmweg 24, P.O. BOX 205 4940 AE Raamsdonksveer NĪDERLANDE	<i>Doxycyclin 50</i> <i>Dopharma</i>	Doksiciklīna hiklāts	500 mg/g	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošan ai	Cāļi (broileri) Teļi Cūkas	Ar dzeramo ūdeni	25 mg/kg X 3–5 dienas	Gaļa un subprodukti: 9 dienas. Indikācijas: <i>Mycoplasma</i> sugu, <i>E.coli</i> , <i>Haemophilus</i> <i>paragalarum</i> , <i>Bordetella avium</i> izraisītas elpceļu infekcijas. <i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> un <i>colinum</i> izraisīts enterīts

Dalībvalsts/ EEZ	Pieteikuma iesniedzējs/ Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	SNN	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Lietošanas biežums un veids	Ieteicamā deva	Izdalīšanās periods(- i) / Indikācijas
Grieķija	<i>Durden Trading Limited</i> 12, Kennedy Av. Nicosia KIPRA	<i>Doxycycline 150/Durden</i>	Doksiciklīna hidrohlorīds	150 mg/g	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošan ai	Cāļi (broileri) Olas nedējoši cāļi Teļi Cūkas	Ar dzeramo ūdeni	10 mg/kg X 3–5 dienas	Gaļa un subprodukti: 4 dienas. Indikācijas: <i>Mycoplasma gallisepticum</i> , <i>E.coli</i> , <i>Haemophilus paragallinarum</i> izraisītas elpceļu infekcijas
Grieķija	<i>AFOI TETOROU ABE</i> 10 km National road Athens-Lamia 14451, Metamorfofi GRIEĶIJA	<i>Doxycycline 150/Afoi Totorou</i>	Doksiciklīna hidrohlorīds	150 mg/g	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošan ai	Cāļi (broileri) Olas nedējoši cāļi Teļi Cūkas	Ar dzeramo ūdeni	10 mg/kg X 3–5 dienas	Gaļa un subprodukti: 4 dienas Indikācijas: <i>Mycoplasma gallisepticum</i> , <i>E.coli</i> , <i>Haemophilus paragallinarum</i> izraisītas elpceļu infekcijas
Spānija	<i>LAB. DR ESTEVE</i> Avda Mare de Deu de Montserrat 221 08041 Barcelona SPĀNIJA	<i>DOX ESTEVE</i>	Doksiciklīna hiklāts	100 mg/g	Ūdenī šķīstošs pulveris	Mājputni Cūkas Liellopi	Iekšķīgi 3–5 dienas	20 mg/kg dienā	Gaļa un subprodukti: 9 dienas. Indikācijas: <i>Mycoplasma</i> sugu (mikoplazmozes, HES) vai <i>Pasteurella multocida</i> (pasterelozes) izraisītu infekciju ārstēšana. Gaļa un subprodukti: Mājputni: 5 dienas. Titari: 7 dienas. kolibaciloze, HES, mikoplazmoze.

Dalībvalsts/ EEZ	Pieteikuma iesniedzējs/ Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	SNN	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Lietošanas biežums un veids	Ieteicamā deva	Izdalīšanās periods(- i) / Indikācijas
Spānija	S.P. Veterinaria SA Crt. Reus Vinyols Km 4.1 Apartado 60 Riudoms 43330 (Tarragona) SPĀNIJA	DOXI 100 mg/ml POLVO ORAL	Doksiciklīna hiklāts	10 g/100 g	Ūdenī šķīstošs pulveris	Mājputni Tītari Cūkas	Iekšķīgi 3–5 dienas (mājputni un tītari) 5 dienas (cūkas)	50–100 mg/l dzeramā ūdens dienā (mājputni un tītari) 10 mg/kg dienā (cūkas)	Gaļa un subprodukti: Broileriem: 5 dienas Tītari: 7 dienas Cūkas: 4 dienas.
Spānija	FATRO URIACH VETERINARIA, S.L. Constitucion, 1 08960 Sant Just Desvern SPĀNIJA	DOXIDOL	Doksiciklīna hiklāts	10 g/100 g	Ūdenī šķīstošs pulveris	Mājputni Cūkas	Iekšķīgi 3–5 dienas	7,5–15 mg/kg dienā	Gaļa un subprodukti: 7 dienas. Indikācijas: kolibaciloze, HES
Spānija	DIVASA-FARMAVIC, S.A. CTRA. SANT HIPOLIT, KM. 71 08503 GURB – VIC SPĀNIJA	DOXIVET 20	Doksiciklīna hiklāts	200 mg/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Mājputni Cūkas	Iekšķīgi 3–5 dienas	10–20 mg/kg dienā	Gaļa un subprodukti: 7 dienas. Indikācijas: kolibaciloze, HES, mikoplazmoze
Spānija	MEVET, S. A. POLIGONO INDUSTRIAL EL SEGRE, PARCELA409-410 25191 Lérida SPĀNIJA	DOXICIVALL POLVO	Doksiciklīna hiklāts	500 mg/g	Ūdenī šķīstošs pulveris	Mājputni Cūkas	Iekšķīgi 3–5 dienas	20 mg/kg dienā	Gaļa un subprodukti: 4 dienas. Indikācijas: kolibaciloze, HES, mikoplazmoze
Spānija	Laboratorios Hipra S.A. Avda La Selva 135 17170 Amer (Girona) SPĀNIJA	HIPRADOXI-S	Doksiciklīna hiklāts	100 mg/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Mājputni Cūkas	Iekšķīgi 3–5 dienas	50–100 mg/l dzeramā ūdens dienā	Gaļa un subprodukti: 5 dienas. Indikācijas: kolibaciloze, HES, mikoplazmoze.
Spānija	LAMONS, S.A. POL.IND.MECANOV A, NAVES 27-28 25191 LLEIDA SPĀNIJA	DOXICICLINA 10 % LAMONS	Doksiciklīna hiklāts	100 mg/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Mājputni Cūkas	Iekšķīgi 3–5 dienas	50–100 mg/l dzeramā ūdens dienā	Gaļa un subprodukti: 5 dienas. Indikācijas: kolibaciloze, HES,

Dalībvalsts/ EEZ	Pieteikuma iesniedzējs/ Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	SNN	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Lietošanas biežums un veids	Ieteicamā deva	Izdalīšanās periods(- i) / Indikācijas
									mikoplazmoze.
Spānija	Laboratorios Hipra S.A. Avda La Selva 135 17170 Amer (Girona) SPĀNIJA	HIPRADOXI-P	Doksiciklīna hiklāts	100 mg/g	Ūdenī šķīstošs pulveris	Mājputni Cūkas	Iekšķīgi 3–5 dienas	20 mg/kg dienā	Gaļa un subprodukti: 5 dienas. Indikācijas: kolibaciloze, HES un ar to saistītās infekcijas.
Spānija	POLICHEM, S.A. Ctra. Reus- Cambrils, Km. 3 43206 Reus SPĀNIJA	DOXICHEM	Doksiciklīna hiklāts	500 mg/g	Ūdenī šķīstošs pulveris	Mājputni	Iekšķīgi 3–5 dienas	50–100 mg/l dzeramā ūdens dienā	Gaļa un subprodukti: 7 dienas. Indikācijas: kolibaciloze, HES, mikoplazmoze.
Spānija	SUPER ´S DIANA, S.L Ctra. Barcelona - Ripoll, Km 17 08150 Parets del Valles SPĀNIJA	DOXBON	Doksiciklīna hiklāts	500 mg/g	Ūdenī šķīstošs pulveris	Mājputni	Iekšķīgi 3–5 dienas	50–100 mg/l dzeramā ūdens dienā	Gaļa un subprodukti: 7 dienas. Indikācijas: kolibaciloze, HES, mikoplazmoze.
Spānija	COTECNICA - COOPERATIVA TECNICA AGROPECUARIA Ctra. N II KM 494,5 25250 Bellpuig (Lerida) SPĀNIJA	DOXICICLINA 500 USO VETERINARIO COTECNICA	Doksiciklīna hiklāts	500 mg/g	Ūdenī šķīstošs pulveris	Mājputni	Iekšķīgi 3–5 dienas	50–100 mg/l dzeramā ūdens dienā	Gaļa un subprodukti: 7 dienas. Indikācijas: kolibaciloze, HES, mikoplazmoze.

Dalībvalsts/ EEZ	Pieteikuma iesniedzējs/ Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	SNN	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Lietošanas biežums un veids	Ieteicamā deva	Izdalīšanās periods(- i) / Indikācijas
Spānija	CENAVISA, S.A. Camí Pedra Estela S/N 43205 Reus SPĀNIJA	LAFIDOX POLVO ORAL	Doksiciklīna hiklāts	500 mg/g	Ūdenī šķīstošs pulveris	Mājputni	Iekšķīgi 3–5 dienas	50–100 mg/l dzeramā ūdens dienā	Gaļa un subprodukti: 7 dienas. Indikācijas: kolibaciloze, HES, mikoplazmoze.
Spānija	LABORATORIOS SYVA, S.A. PARROCO PABLO DIEZ, 49-57 24010 TROBAJO DEL CAMINO SPĀNIJA	SYVADOX 10 %	Doksiciklīna hiklāts	100 mg/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Mājputni Cūkas	Iekšķīgi 3–5 dienas	50–100 mg/l dzeramā ūdens dienā	Gaļa un subprodukti: 7 dienas. Indikācijas: kolibaciloze, HES, mikoplazmoze.
Spānija	INVESA INTERNACIONAL, S.A. Esmeralda, 19 - 4º 08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT SPĀNIJA	DX-10	Doksiciklīna hiklāts	100 mg/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Mājputni Cūkas	Iekšķīgi 3–5 dienas	50–100 mg/l dzeramā ūdens dienā	Gaļa un subprodukti: 7 dienas. Indikācijas: kolibaciloze, HES, mikoplazmoze.
Spānija	CENAVISA, S.A. Camí Pedra Estela S/N 43205 Reus SPĀNIJA	DOXICICLINA 500 GANADEXIL	Doksiciklīna hiklāts	500 mg/g	Ūdenī šķīstošs pulveris	Mājputni Tītari	Iekšķīgi 3–5 dienas	50–100 mg/l dzeramā ūdens dienā	Gaļa un subprodukti: 7 dienas. Indikācijas: kolibaciloze, HES, mikoplazmoze.
Spānija	DIVASA-FARMAVIC, S.A. CTRA. SANT HIPOLIT, KM. 71 08503 GURB – VIC SPĀNIJA	DOXIVET 5	Doksiciklīna hiklāts	50 mg/g	Ūdenī šķīstošs pulveris	Mājputni Tītari	Iekšķīgi 3–5 dienas	50–100 mg/l dzeramā ūdens dienā	Gaļa un subprodukti: 7 dienas. Indikācijas: kolibaciloze, HES, mikoplazmoze.
Spānija	INDUSTRIAL VETERINARIA S.A. Esmeralda, 19 - 4º 08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT SPĀNIJA	DOXINYL	Doksiciklīna hiklāts	100 mg/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Mājputni Cūkas	Iekšķīgi 3–5 dienas	50–100 mg/l dzeramā ūdens dienā	Gaļa un subprodukti: 7 dienas. Indikācijas: kolibaciloze, HES, mikoplazmoze.

Dalībvalsts/ EEZ	Pieteikuma iesniedzējs/ Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	SNN	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Lietošanas biežums un veids	Ieteicamā deva	Izdalīšanās periods(- i) / Indikācijas
Spānija	JAER, S.A. Barcelona, 411 08620 San Vicens del Horts SPĀNIJA	MASTERMIX DOXICICLINA	Doksiciklīna hiklāts	50 mg/g	Ūdenī šķīstošs pulveris	Mājputni Tītari	Iekšķīgi 3–5 dienas	50–100 mg/l dzeramā ūdens dienā	Gaļa un subprodukti: 7 dienas. Indikācijas: kolibaciloze, HES, mikoplazmoze.
Spānija	Laboratorios Karizoo S.A Polígono Industrial La Borda Mas Pujades 11-12 08140 Caldes de Montbui Barcelona SPĀNIJA	KARIDOX	Doksiciklīna hiklāts	100 mg/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Mājputni Cūkas	Iekšķīgi 3–5 dienas	10–20 mg/kg dienā	Gaļa un subprodukti: 7 dienas. Indikācijas: HES, mikoplazmoze.
Spānija	CHEMO IBERICA, S.A. Gran Via Carlos III, 98 7ª Edificio Trade 08028 Barcelona SPĀNIJA	SOLDOXIN	Doksiciklīna hiklāts	100 mg/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Mājputni Cūkas	Iekšķīgi 3–5 dienas	10–20 mg/kg dienā	Gaļa un subprodukti: 7 dienas. Indikācijas: HES, mikoplazmoze.
Spānija	LABORATORIOS CALIER, S.A. BARCELONÉS, 26 08520 Les Franqueses del Valles SPĀNIJA	CALIERDOXINA 50 % P O	Doksiciklīna hiklāts	500 mg/g	Ūdenī šķīstošs pulveris	Mājputni	Iekšķīgi 5 dienas.	20 mg/kg dienā	Gaļa un subprodukti: 7 dienas. Indikācijas: HES, mikoplazmoze.
Spānija	LABORATORIOS CALIER, S.A. BARCELONÉS, 26 08520 Les Franqueses del Valles SPĀNIJA	GANAMIX DOXICICLINA 50 % P O	Doksiciklīna hiklāts	500 mg/g	Ūdenī šķīstošs pulveris	Mājputni	Iekšķīgi 5 dienas.	20 mg/kg dienā	Gaļa un subprodukti: 7 dienas. Indikācijas: HES, mikoplazmoze.

Dalībvalsts/ EEZ	Pieteikuma iesniedzējs/ Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	SNN	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Lietošanas biežums un veids	Ieteicamā deva	Izdalīšanās periods(- i) / Indikācijas
Spānija	S.P. Veterinaria SA Crt. Reus Vinyols Km 4.1 Apartado 60 Riudoms 43330 (Tarragona) SPĀNIJA	HIDRODOX 10 %	Doksiciklīna hiklāts	100 mg/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Mājputni Cūkas	Iekšķīgi 3–5 dienas	50–100 mg/l dzeramā ūdens dienā	Gaļa un subprodukti: 7 dienas. Indikācijas: kolibaciloze, HES, mikoplazmoze.
Spānija	VIRBAC ESPAÑA, S.A. Angel Guimera, 179-181 08950 Esplugues de Llobregat SPĀNIJA	PULMODOX P.O.S.	Doksiciklīna hiklāts	500 mg/g	Ūdenī šķīstošs pulveris	Mājputni	Iekšķīgi 3–5 dienas	50–100 mg/l dzeramā ūdens dienā	Gaļa un subprodukti: 7 dienas. Indikācijas: HES, mikoplazmoze.
Spānija	Huvepharma N.V. Uitbreidingstraat 80 2600 Antwerpen BEĻĢIJA	DILUDOX	Doksiciklīna hiklāts	500 mg/g doksiciklīna hiklāta	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošan ai	Cāļi (broileri) un cūkas (nobarojamas cūkas)	Iekšķīgi (ar dzeramo ūdeni)	20 mg doksiciklīna (hiklāta)/kg x 3–5 dienas	Gaļa un subprodukti: Cāļi: 6 dienas. Nelietot dējējputniem, kuru olas izmanto cilvēku uzturā. Indikācijas: Cāļi (broileri): <i>Mycoplasma gallisepticum</i> izraisītas hroniskas elpceļu slimības (HES) profilakse un ārstēšana.
Spānija	LABORATORIOS CALIER, S.A. BARCELONÉS, 26 08520 Les Franqueses del Valles SPĀNIJA	DOXICICLINA CALIER 500 mg/g	Doksiciklīna hiklāts	500 mg/g	Ūdenī šķīstošs pulveris	Mājputni Cūkas	Iekšķīgi 3–5 dienas	20 mg/kg dienā	Gaļa un subprodukti: 6 dienas. Indikācijas: <i>Mycoplasma gallisepticum</i> izraisītas hroniskas elpceļu slimības (HES) profilakse un ārstēšana

Dalībvalsts/ EEZ	Pieteikuma iesniedzējs/ Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	SNN	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Lietošanas biežums un veids	Ieteicamā deva	Izdalīšanās periods(- i) / Indikācijas
Spānija	LABORATORIOS MAYMO, S.A. Via Augusta, 302 08017 Barcelona SPĀNIJA	MAYDOX PS	Doksiciklīna hidrohlorīds	50 mg/g	Ūdenī šķīstošs pulveris	Mājputni Tītari	Iekšķīgi 3–5 dienas	50–100 mg/l dzeramā ūdens dienā	Gaļa un subprodukti: 7 dienas. Indikācijas: kolibaciloze, HES, mikoplazmoze.
Francija	COOPHAVET Saint Herblon 44150 Ancenis FRANCIJA	RONAXAN P.S. 5 %	Doksiciklīna hiklāts	50 mg/g	Ūdenī šķīstošs pulveris	Tītari Cūkas Broileri Teļi	Profilakse 1–3 dienas Ārstēšana: 3–5 dienas	10 mg/kg dienā	Gaļa un subprodukti: Tītari: 6 dienas. Broileriem: 4 dienas. Indikācijas: Broileri un tītari: Elpceļu infekciju profilakse un ārstēšana.
Francija	FRANVET ZI d'Etriche-Route d'Avire BP 103 49500 Segré Cedex FRANCIJA	DOXY 5 FRANVET	Doksiciklīna hiklāts	50 mg/g	Ūdenī šķīstošs pulveris	Tītari Cūkas Vistas Teļi	Profilakse 1–3 dienas Ārstēšana: 3–5 dienas	10 mg/kg dienā	Gaļa un subprodukti: Tītari: 6 dienas. Vistas: 4 dienas. Indikācijas: elpceļu infekciju profilakse un ārstēšana.
Francija	VIRBAC S.A. 1ère avenue - 2065 m - L.I.D. 06516 CARROS FRANCIJA	PULMODOX P.O.S. 5 %	Doksiciklīna hiklāts	50 mg/g	Ūdenī šķīstošs pulveris	Cūkas Teļi Mājputni	Profilakse 1–3 dienas Ārstēšana: 3–5 dienas	10 mg/kg dienā	Gaļa un subprodukti: Tītari: 6 dienas. Vistas: 4 dienas. Indikācijas: elpceļu infekciju profilakse un ārstēšana.
Francija	Sogeval Laboratoires 200 route De Mayenne 53 022 Laval Cedex FRANCIJA	DOXYVAL 5 %	Doksiciklīna hiklāts	50 mg/g	Ūdenī šķīstošs pulveris	Tītari Cūkas Broileri Teļi	Profilakse 1–3 dienas Ārstēšana: 3–5 dienas	10 mg/kg dienā	Gaļa un subprodukti: Tītari: 6 dienas. Vistas: 4 dienas. Indikācijas: elpceļu infekciju profilakse un ārstēšana.

Dalībvalsts/ EEZ	Pieteikuma iesniedzējs/ Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	SNN	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Lietošanas biežums un veids	Ieteicamā deva	Izdalīšanās periods(- i) / Indikācijas
Francija	Laboratoires Biove 3 rue de Lorraine 62510 Arques FRANCIJA	ACTI DOXY 5	Doksiciklīna hiklāts	50 mg/g	Ūdenī šķīstošs pulveris	Tītari Cūkas Broileri Teļi	Profilakse 1–3 dienas Ārstēšana: 3–5 dienas	10 mg/kg dienā	Gaļa un subprodukti: Tītari: 6 dienas. Vistas: 4 dienas. Indikācijas: elpceļu infekciju profilakse un ārstēšana.
Francija	Ceva Sante Animale France La Balastiere 33501 Libourne Cedex FRANCIJA	DOXYVIT	Doksiciklīna hiklāts	50 mg/g	Ūdenī šķīstošs pulveris	Tītari Cūkas Broileri Teļi	Profilakse 1–3 dienas Ārstēšana: 3–5 dienas	10 mg/kg dienā	Gaļa un subprodukti: Tītari: 6 dienas. Vistas: 4 dienas. Indikācijas: elpceļu infekciju profilakse un ārstēšana.
Francija	Noe 10 rue Clement Ader ZA Le Patis 78120 Rambouillet FRANCIJA	COMPOMIX V DOXYCYCLINE	Doksiciklīna hiklāts	50 mg/g	Ūdenī šķīstošs pulveris	Tītari Cūkas Broileri Teļi	Profilakse 1–3 dienas Ārstēšana: 3–5 dienas	10 mg/kg dienā	Gaļa un subprodukti: Tītari: 6 dienas. Vistas: 4 dienas. Indikācijas: elpceļu infekciju profilakse un ārstēšana.
Francija	CHEMO IBERICA, S.A. Gran Via Carlos III, 98 7ª Edificio Trade 08028 Barcelona SPĀNIJA	SOLDOXIN 100 mg/ML SOLUTION BUVABLE POUR POULES POULETS ET PORCINES	Doksiciklīna hiklāts	100 mg/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Cūkas Vistas Broileri	CĀĻI (broileri): 10– 20 mg doksiciklīna/kg ķermeņa masas dienā	3–5 dienas	Indikācijas: CĀĻI (BROILERI): pret doksiciklīnu jutīgu mikroorganismu izraisītas hroniskas elpceļu slimības (HES) un mikoplazmozes profilakse un ārstēšana.
Francija	Laboratorios Karizoo S.A. Pol. Ind. La Borda c/Mas Pujades 11-12 Caldes de Montbui 08140 SPĀNIJA	DOXYSOL 10 %	Doksiciklīna hiklāts	100 mg/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Cūkas Vistas Broileri	CĀĻI (broileri): 10– 20 mg doksiciklīna/kg ķermeņa masas dienā	3–5 dienas	Indikācijas: CĀĻI (BROILERI): pret doksiciklīnu jutīgu mikroorganismu izraisītas hroniskas elpceļu slimības (HES) un mikoplazmozes profilakse un ārstēšana.

Dalībvalsts/ EEZ	Pieteikuma iesniedzējs/ Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	SNN	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Lietošanas biežums un veids	Ieteicamā deva	Izdalīšanās periods(- i) / Indikācijas
Francija	Huvepharma N.V. Uitbreidingstraat 80 2600 Antwerpen BEĻĢIJA	HYDRODOXX 500 mg/G POUDRE POUR ADMINISTRATION DANS L'EAU DE BOISSON POUR POULETS ET PORCS	Doksiciklīna hiklāts	500 mg/g doksiciklīna hiklāta	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošan ai	Cāļi (broileri) un cūkas (nobarojamas cūkas)	Iekšķīgi (ar dzeramo ūdeni)	20 mg doksiciklīna (hiklāta)/kg x 3–5 dienas	Gaļa un subprodukti: Cāļi: 6 dienas. Nelietot dējējputniem, kuru olas izmanto cilvēku uzturā. Indikācijas: Cāļi (broileri): <i>Mycoplasma gallisepticum</i> izraisītas hroniskas elpceļu slimības (HES) profilakse un ārstēšana.
Francija	LABORATORIOS CALIER, S.A. BARCELONÉS, 26 08520 Les Franqueses del Valles SPĀNIJA	DOXYCYCLINE CALIER 500 mg/G POUDRE POUR ADMINISTRATION DANS L'EAU DE BOISSON POUR POULETS ET PORCINS	Doksiciklīna hiklāts	500 mg/g	Ūdenī šķīstošs pulveris	Mājputni Cūkas	Iekšķīgi 3–5 dienas	20 mg/kg dienā	Gaļa un subprodukti: 6 dienas. Indikācijas: <i>Mycoplasma gallisepticum</i> izraisītas hroniskas elpceļu slimības (HES) profilakse un ārstēšana
Ungārija	COOPHAVET Saint Herblon 44150 Ancenis FRANCIJA	Ronaxan P.S. 5 % oldható por	Doksiciklīna hiklāts	5 g/100 g	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošan ai	Cāļi	Cāļi līdz 2 nedēļu vecumam: 1 g pulvera/1 litru dzeramā ūdens dienā. Cāļi pēc 2 nedēļu vecuma: 2 g pulvera/1 litru dzeramā ūdens.	10 mg doksiciklīna/k g ķermeņa masas dienā 3–5 dienas.	Gaļa un subprodukti: 4 dienas. Indikācijas: HES un mikoplazmu izraisītu slimību un citu infekciju ārstēšanai.

Dalībvalsts/ EEZ	Pieteikuma iesniedzējs/ Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	SNN	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Lietošanas biežums un veids	Ieteicamā deva	Izdalīšanās periods(- i) / Indikācijas
Ungārija	DOPHARMA B.V. Zalmweg 24, P.O. BOX 205 4940 AE Raamsdonksveer NĪDERLANDE	Doxycycline 50 % WSP	Doksiciklīna hiklāts	500 mg/g	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošan ai	Cāji	500 g preparāta izšķīdināti 1000 litros dzeramā ūdens.	25 mg doksiciklīna/k g ķermeņa masas dienā 3–5 dienas.	Gaļa un subprodukti: 4 dienas. Indikācijas: elpceļu slimību ārstēšanai un kontrolei cājiem.
Ungārija	Kon-Pharma GmbH. 30625 Hannover VĀCIJA	Doxy 50 % por belsőleges oldathoz	Doksiciklīna hiklāts	500 mg/g	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošan ai	Cāji, tītari	Cāji: 500 mg preparāta izšķīdināti 1 litrā dzeramā ūdens. Tītari: 400 mg preparāta/1 l dzeramā ūdens.	30 mg doksiciklīna/k g ķermeņa masas dienā 5 dienas.	Gaļa un subprodukti: Cāji un tītari: 11 dienas.
Ungārija	V.M.D. Állatgyógyászati Kft. 1093 Budapest UNGĀRIJA	Doxyveto-50	Doksiciklīna hiklāts	500 mg/g	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošan ai	Cāji	Nepārtraukta terapija: 0,2 g preparāta/1 litru dzeramā ūdens. Pulsa terapija: aprēķinātais preparāta daudzums jāizšķīdina astoņu stundu laikā izdzeramā ūdens daudzumā.	10 mg doksiciklīna/k g ķermeņa masas dienā 5 dienas.	Gaļa un subprodukti: 10 dienas. Indikācijas: HES un pastereļozes ārstēšanai; sinovīts tītariem.
Ungārija	Novartis Animal Health d.o.o. Verovskava 57 1000 Ljubljana SLOVĒNIJA	Doxyril 50 % por belsőleges oldathoz	Doksiciklīna hiklāts	500 mg/g	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošan ai	Cāji	5 g preparāta/100 kg ķermeņa masas dienā, izšķīdinot dzeramā ūdenī.	25 mg doksiciklīna/k g ķermeņa masas dienā 3–5 dienas.	Gaļa un subprodukti: 6 dienas. Indikācijas: HES, pastereļozes, kolibacilozes, Haemophilus un Clostridium infekciju ārstēšanai.

Dalībvalsts/ EEZ	Pieteikuma iesniedzējs/ Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	SNN	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Lietošanas biežums un veids	Ieteicamā deva	Izdalīšanās periods(- i) / Indikācijas
Ungārija	<i>Animal-Med Kft. 1029 Budapest UNGĀRIJA</i>	<i>Anidox 10 % por belsőleges oldathoz</i>	Doksiciklīna hiklāts	100 mg/g	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošan ai	Cāļi	1 000 g preparāta izšķīdināti 1000 litros dzeramā ūdens.	10 mg doksiciklīna/k g ķermeņa masas dienā 5 dienas.	Gaļa un subprodukti: 12 dienas. Indikācijas: mikoplazmozes, pastereļozes, kolibacilozes ārstēšanai.
Ungārija	<i>Animal-Med Kft. 1029 Budapest UNGĀRIJA</i>	<i>Anidox 100 % por belsőleges oldathoz</i>	Doksiciklīna hiklāts	1000 mg/g	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošan ai	Cāļi	100 g preparāta izšķīdināti 1000 litros dzeramā ūdens.	10 mg doksiciklīna/k g ķermeņa masas dienā 5 dienas.	Gaļa un subprodukti: 12 dienas. Indikācijas: <i>Mycoplasma gallisepticum, E. coli, Bordetella avium, Haemophilus paragallinarum</i> un <i>Pasteurella multocida</i> izraisītu infekciju ārstēšanai
Ungārija	<i>Lavet Pharmaceuticals Ltd., 1161 Budapest Ottó u. 14, Ungārija</i>	<i>Doxyprim 40 % vízoldékony pulvis</i>	Doksiciklīna hiklāts	400 mg/g	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošan ai	Cāļi, tītari	Nepārtraukta terapija: 1 g preparāta/3-6 litriem dzeramā ūdens. Pulsa terapija: aprēķinātais preparāta daudzums jāizšķīdina 4-8 stundu laikā izdzeramā ūdens daudzumā.	10-20 mg doksiciklīna/k g ķermeņa masas dienā 3-5 dienas.	Gaļa un subprodukti: 4 dienas. Indikācijas: <i>Mycoplasma gallisepticum, E. coli, Bordetella avium, Haemophilus paragallinarum</i> un <i>Pasteurella multocida</i> izraisītu infekciju ārstēšanai

Dalībvalsts/ EEZ	Pieteikuma iesniedzējs/ Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	SNN	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Lietošanas biežums un veids	Ieteicamā deva	Izdalīšanās periods(- i) / Indikācijas
Ungārija	CHEMIFARMA S.p.A Via Don Eugenio Servadei 16 47100 Forlì ITĀLIJA	Doxifarm 50 % WSP	Doksiciklīna hiklāts	500 mg/g	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošan ai	Cāļi	40 g preparāta/100 kg ķermeņa masas/100 litriem dzeramā ūdens.	20 mg doksiciklīna/k g ķermeņa masas dienā 5 dienas.	Gaļa un subprodukti: 5 dienas. Indikācijas: HES, mikoplazmozes, sinovīta, kolibacilozes, ileīta (nekrotiska un čūlaina), <i>Haemophilus</i> infekcijas ārstēšanai.
Ungārija	VIRBAC S.A. 1ère avenue - 2065 m - L.I.D. 06516 CARROS FRANCIJA	Pulmodox 50 % WSP	Doksiciklīna hiklāts	500 mg/g	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošan ai	Cāļi	500 g preparāta izšķīdināti 1000 litros dzeramā ūdens.	25 mg doksiciklīna/k g ķermeņa masas dienā 3–5 dienas.	Gaļa un subprodukti: 4 dienas. Indikācijas: HES un citu <i>Mycoplasma</i> sugu, <i>Pasteurella</i> sugu, <i>E. Coli</i> un <i>Chlamydia psittaci</i> izraisītu elpceļu slimību ārstēšanai.
Ungārija	Phylaxia Pharma Zrt. 8000 Székesfehérvár UNGĀRIJA	Doxyphyl SP	Doksiciklīna hiklāts	300 mg/g	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošan ai	cāļi, tītari	40 g preparāta/1200 kg ķermeņa masas dienā, aprēķinātais preparāta daudzums jāizšķīdina trīs stundu laikā izdzeramā ūdens daudzumā.	10 mg doksiciklīna/k g ķermeņa masas dienā 3–5 dienas.	Gaļa un subprodukti: Cāļi: 7 dienas, tītari: 10 dienas. Indikācijas: <i>Mycoplasma</i> sugu, <i>E.</i> <i>coli</i> , <i>Haemophilus</i> <i>paragallinarum</i> , <i>Bordetella avium</i> izraisītu elpceļu infekciju un <i>Clostridium</i> <i>perfringens</i> un <i>Cl.</i> <i>colinum</i> izraisīta ileīta ārstēšanai.
Ungārija	Eurovet Animal Health B.V. Handelsveg 25 PO Box 179 5530 AD Bladel NĪDERLANDE	Soludox 50 % pulvis	Doksiciklīna hiklāts	500 mg/g	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošan ai	Cāļi	Izšķīdināts dzeramā ūdenī.	10 mg/kg ķermeņa masas un 20 mg/kg ķermeņa masas dienā 4 dienas.	Gaļa un subprodukti: Cāļiem, kas ārstēti ar devu 10 mg/kg ķermeņa masas: 5 dienas, cāļiem, kas ārstēti ar devu 20 mg/kg ķermeņa masas: 12 dienas.

Dalībvalsts/ EEZ	Pieteikuma iesniedzējs/ Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	SNN	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Lietošanas biežums un veids	Ieteicamā deva	Izdalīšanās periods(- i) / Indikācijas
									Indikācijas: pret doksiciklīnu jutīgu baktēriju izraisītu elpceļu un citu slimību ārstēšanai.
Ungārija	CHEMO IBERICA, S.A. Gran Via Carlos III, 98 7ª Edificio Trade 08028 Barcelona SPĀNIJA	Oridox 100 mg/ml belsóleges oldat	Doksiciklīna hiklāts	100 mg/ml	Koncentrāts iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošan ai	Cāļi	100 mg/ml koncentrāta iekšķīgai lietošanai izšķīdināti dzeramā ūdenī.	10–20 mg doksiciklīna/k g ķermeņa masas dienā 3–5 dienas.	Gaļa un subprodukti: 7 dienas. Indikācijas: pret doksiciklīnu jutīgu baktēriju izraisītu elpceļu un citu slimību ārstēšanai.
Ungārija	Laboratorios Karizoo S.A Polígono Industrial La Borda Mas Pujades 11-12 08140 Caldes de Montbui Barcelona SPĀNIJA	Karidox 100 mng/ml belsóleges oldat	Doksiciklīna hiklāts	100 mg/ml	Koncentrāts iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošan ai	Cāļi	100 mg/ml koncentrāta iekšķīgai lietošanai izšķīdināti dzeramā ūdenī.	10–20 mg doksiciklīna/k g ķermeņa masas dienā 3–5 dienas.	Gaļa un subprodukti: 7 dienas. Indikācijas: HES vai citu mikoplazmu izraisītu slimību ārstēšanai un profilaksei.
Ungārija	CENAVISA, S.A. Camí Pedra Estela S/N 43205 Reus SPĀNIJA	Doxycen belsóleges oldat	Doksiciklīna hiklāts	200 mg/ml	Koncentrāts iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošan ai	Cāļi	1 ml/20 kg ķermeņa masas dienā, izšķīdinot dzeramā ūdenī.	10 mg doksiciklīna/k g ķermeņa masas dienā 5 dienas.	Gaļa un subprodukti: 5 dienas. Indikācijas: HES, mikoplazmozes un kolibacilozes ārstēšanai.

Dalībvalsts/ EEZ	Pieteikuma iesniedzējs/ Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	SNN	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Lietošanas biežums un veids	Ieteicamā deva	Izdalīšanās periods(- i) / Indikācijas
Ungārija	<i>Lavet Pharmaceuticals Ltd., 1161 Budapest Ottó u. 14, Ungārija</i>	<i>Doxyvit 100 WSP</i>	Doksiciklīna hidrohlorīds	100 mg/g	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošan ai	Cāļi, tītari, zosis	Nepārtraukta terapija: 1 g preparāta/1 l dzeramā ūdens. Pulsa terapija: aprēķinātais preparāta daudzums jāizšķīdina 6–8 stundu laikā izdzeramā ūdens daudzumā.	10 mg doksiciklīna/k g ķermeņa masas dienā 3–5 dienas.	Gaļa un subprodukti: Cāļi, tītari, zosis: 7 dienas Indikācijas: elpceļu un zarnu slimību ārstēšana broileriem.
Ungārija	<i>Industria Italiana Integratori TREI S.p.A. Viale Corassori 62 41100 Modena ITĀLIJA</i>	<i>Doxipan 20 WSP</i>	Doksiciklīna hidrohlorīds	200 mg/g	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošan ai	Cāļi	5–7,5 g preparāta izšķīdināti 10 litros dzeramā ūdens.	10–15 mg doksiciklīna/k g ķermeņa masas dienā 3–5 dienas.	Gaļa un subprodukti: 5 dienas. Indikācijas: HES, mikoplazmozes, sinovīta, kolibacilozes, ileīta (nekrotiska un čūlaina), <i>Haemophilus</i> infekcijas ārstēšanai.
Ungārija	<i>Laboratorios Hipra S.A. Avda La Selva 135 17170 Amer (Girona) SPĀNIJA</i>	<i>Hipradoxi-S oral solutio</i>	Doksiciklīna hidrohlorīds	100 mg/ml	Koncentrāts iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošan ai	Cāļi	100 mg/ml koncentrāta iekšķīgai lietošanai izšķīdināti 1 l dzeramā ūdens.	10 mg doksiciklīna/k g ķermeņa masas dienā 5 dienas.	Gaļa un subprodukti: 5 dienas. Indikācijas: HES vai citu mikoplazmu izraisītu slimību ārstēšanai un profilaksei.
Īrija	<i>S.P. Veterinaria SA Crta. Reus Vinyols Km 4.1 Apartado 60 Riudoms 43330 (Tarragona) SPĀNIJA</i>	<i>DOXIVEX 10 % Concentrate for oral solution.</i>	Doksiciklīna hiklāts	100 mg/ml	Koncentrāts iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošan ai	Cāļi (broileri) un cūkas	Iekšķīgai lietošanai ar dzeramo ūdeni 3–5 dienas	Cāļi (broileri): 50–100 mg doksiciklīna/lit ru dzeramā ūdens dienā (atbilst 0,5– 1,0 ml <i>DOXIVEX</i> 10 %/litru dzeramā ūdens dienā) 3–5 dienas.	Gaļa un subprodukti: 7 dienas. Nedrīkst lietot dējējputniem, kuru olas izmanto cilvēku uzturā. Indikācijas: pret doksiciklīnu jutīgu mikroorganismu izraisītas kolibacilozes, hroniskas elpceļu slimības (HES) un mikoplazmozes

Dalībvalsts/ EEZ	Pieteikuma iesniedzējs/ Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	SNN	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Lietošanas biežums un veids	Ieteicamā deva	Izdalīšanās periods(- i) / Indikācijas
									ārstēšana.
Īrija	Huvepharma N.V. Uitbreidingstraat 80 2600 Antwerpen BEĻĢIJA	Aquadoxx 500 mg/g water- soluble powder	Doksiciklīna hiklāts	500 mg/g doksiciklīna hiklāta	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošan ai	Cāļi (broileri) un cūkas (nobarojamas cūkas)	Iekšķīgi (ar dzeramo ūdeni)	20 mg doksiciklīna (hiklāta)/kg x 3–5 dienas	Gaļa un subprodukti: Cāļi: 6 dienas. Nelietot dējējputniem, kuru olas izmanto cilvēku uzturā. Indikācijas: Cāļi (broileri): <i>Mycoplasma gallisepticum</i> izraisītas hroniskas elpceļu slimības (HES) profilakse un ārstēšana.
Itālija	CEVA VETEM S.P.A. Via Colleoni n.15 20041 Agrate Brianza (Milano) ITĀLIJA	DOXICICLINA 20 % CEVA VETEM	Doksiciklīna hiklāts	200 g doksiciklīna uz 1 kg produkta	Ūdenī šķīstošs pulveris	broileri, tītari	dzeramais ūdens	Broileri, tītari: 1 g/10 kg ķermeņa masas 5 dienās.	Gaļa un subprodukti: Broileri: 7 dienas. tītari: 8 dienas. Indikācijas: Broileri: hroniskas elpceļu slimības ārstēšana. Tītari: infekcioza sinusīta ārstēšana.

Itālija	CHEMIFARMA S.p.A Via Don Eugenio Servadei 16 47100 Forlì ITĀLIJA	DOXICICLINA 50 % CHEMIFARMA	Doksiciklīna hiklāts	500 g doksiciklīna uz 1 kg produkta	Ūdenī šķīstošs pulveris	broileri, cūkas	dzeramais ūdens	Broileri: 20 mg doksiciklīna/ 1 kg ķermeņa masas (3–5 dienas) Cūkas: 20 mg doksiciklīna/ 1 kg ķermeņa	Gaļa un subprodukti: Broileri: 6 dienas Nelietot vistām, kuru olas izmanto cilvēku uzturā. Cūkas: 5 dienas. Indikācijas: Broileri: hroniska <i>Pasteurella</i> sugu, <i>Mycoplasma</i> sugu, <i>Haemophilus</i> <i>gallinarum</i> , <i>Bordetella</i>
---------	---	-----------------------------------	-------------------------	--	-------------------------------	-----------------	-----------------	--	---

								masas 3–5 dienas	<i>avium</i> un <i>Clamidia psittaci</i> izraisīta elpceļu slimība.
Itālija	SINTOFARM S.P.A. Via Togliatti n.5 42016 Guastalla (Reggio Emilia) ITĀLIJA	DOXIFARM 50 %	Doksiciklīna hīklāts	500 mg doksiciklīna hīklāta (atbilst 433,3 mg doksiciklīna) uz 1 g produkta	Ūdenī šķīstošs pulveris	broileri, cūkas	dzeramais ūdens	Broileri: 25 mg doksiciklīna hīklāta/1 kg ķermeņa masas (3–5 dienas) Cūkas: 20 mg doksiciklīna hīklāta/1 kg ķermeņa masas 5 dienas	Gaļa un subprodukti: Broileri: 6 dienas Nelietot vistām, kuru olas izmanto cilvēku uzturā. Cūkas: 4 dienas. Indikācijas: Broileri: <i>Mycoplasma</i> sugu, <i>Haemophilus paragallinarum</i> , <i>Escherichia coli</i> izraisītas elpceļu slimības ārstēšana un kontrole. <i>Clostridium perfringens</i> un <i>Clostridium colinum</i> izraisīts enterīts.
Itālija	INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI TREI SpA Via Affarosa n.4 42010 Rio Saliceto (Reggio Emilia) ITĀLIJA	DOXIPAN 54	Doksiciklīna hīklāts	500 g doksiciklīna uz 1 kg produkta	Ūdenī šķīstošs pulveris	broileri, tītari, cūkas	dzeramais ūdens	Broileri: 10 mg doksiciklīna/1 kg ķermeņa masas Tītari: 20 mg doksiciklīna/1 kg ķermeņa masas Cūkas: 10 mg doksiciklīna/1 kg ķermeņa masas 5 dienas	Gaļa un subprodukti: Broileri: 3 dienas Nelietot vistām, kuru olas izmanto cilvēku uzturā. Tītari: 10 dienas. Cūkas: 4 dienas. Indikācijas: Broileri: hroniska elpceļu slimība. Tītari: mikoplazmu un/vai stafilokoku izraisīti elpceļu un locītavu sindromi
Itālija	INTERVET ITALIA S.R.L. Via W. Tobagi n.7 20068 Peschiera Borromeo (Milano) ITĀLIJA	NAXOCET	Doksiciklīna hīklāts	500 mg doksiciklīna hīklāta uz 1 g produkta	Ūdenī šķīstošs pulveris	broileri	dzeramais ūdens	Broileri: 20 mg doksiciklīna hīklāta/1 kg ķermeņa masas 5 dienas	Gaļa un subprodukti: Broileri: 8 dienas Nelietot vistām, kuru olas izmanto cilvēku uzturā. Indikācijas:

									mikoplazmu sugu izraisīta hroniska elpceļu slimība.
Lietuva	DOPHARMA B.V. Zalmweg 24, P.O. BOX 205 4940 AE Raamsdonksveer NĪDERLANDE	DOXYCYCLINE 50 %, geriamieji miltelīai	Doksiciklīna hiklāts	500 mg/g	Pulveris iekšķīgai lietošanai	Teļi, cūkas un mājputni.	4–7 dienas kopā ar dzeramo ūdeni	Mājputni: 40 mg uz 1 kg ķermeņa masas vai 200–400 g uz 1000 litriem dzeramā ūdens 4–7 dienas.	Gaļa un subprodukti: Mājputni – 4 dienas. Nelietot dzīvniekiem, kuru olas izmanto cilvēku uzturā. Indikācijas: Mājputnu ārstēšanai: <i>Clamidia psittaci</i> izraisīta ornitoze, <i>E. coli</i> izraisīta kolibakterioze, <i>Mycoplasma gallisepticum</i> izraisīta HES
Lietuva	Lavet Pharmaceuticals Ltd., 1161 Budapest Ottó u. 14, Ungārija	DOXYPRIM 40 % geriamieji miltelīai	Doksiciklīna hiklāts	400 mg/g	Pulveris iekšķīgai lietošanai	Cāļi, tītari un cūkas.	Jālieto 5 dienas cāļiem un tītariem kopā ar dzeramo ūdeni.	Cāļi un tītari: 10–20 mg doksiciklīna hiklāta uz 1 kg ķermeņa masas dienā, lieto pulsu veidā, ja dienā lietojamais daudzums tiek lietots ar ierobežotu daudzumu ūdens, kas putniem jāizdzer 4–8 stundu laikā, vai nepārtraukti 67– 133 mg/ml doksiciklīna hiklāta uz 1 l dzeramā	Gaļa un subprodukti: Ēdami cāļu un tītaru audi – 4 dienas. Indikācijas: Cāļiem un tītariem indikācijas ir šādas: hroniskas elpceļu slimības (<i>Mycoplasma gallisepticum</i> , <i>E. coli</i>), aerosakulīts (<i>Mycoplasma meleagridis</i>), infekciozais sinovīts (<i>Mycoplasma synoviae</i>), kolibaciloze (<i>E. coli</i>), putnu holēra (<i>Pasteurella multocida</i>), tītaru bordeteloze (<i>Bordetella avium</i>), infekciozās iesnas (<i>Haemophilus paragallinarum</i>), nekrotisks enterīts

								ūdēns.	(<i>Clostridium perfringens</i>), hlamīdīoze (<i>Chlamydia psittaci</i>).
Lietuva	<i>Eurovet Animal Health B.V.</i> Handelsveg 25 PO Box 179 5530 AD Bladel NĪDERLANDE	<i>SOLUDOX 50 %, geriamieji miltelīai</i>	Doksīcīklīna hīklāts	500 mg/g	Pulveris iekšķīgai lietošanai	Cūkas un cāļi.	Jālieto iekšķīgi kopā ar dzeramo ūdeni 4 dienas.	Cāļi: 10* mg doksīcīklīna hīklāta uz 1 kg ķermeņa masas dienā 4 dienas; 20* mg doksīcīklīna hīklāta uz 1 kg ķermeņa masas dienā 4 dienas. * Lielāko devu ieteicams lietot, ja infekcijas izraisa vidēji jutīgi celmi (MIK līdz 2 µg/ml), bet mazāko devu var lietot pret (loti) jutīgiem celmiem (MIK līdz 0,5–1,0 µg/ml)	Indikācijas: pret doksīcīklīnu jutīgu mikroorganismu, piemēram, <i>Pasteurella multocida</i> un <i>Ornithobacterium rhinotracheale</i> , izraisītu infekciju ārstēšana cāļiem.

Nīderlande	DOPHARMA B.V. Zalmweg 24, P.O. BOX 205 4940 AE Raamsdonksveer NĪDERLANDE	Doxycycline- hyclaat 50 %	Doksiciklīna hiklāts	Uz gramu pulvera: 500 mg doksiciklīna hiklāta.	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavoša nai	Teļi, olas nedējoši cāļi un tītari.	Olas nedējoši cāļi un tītari: iekšķīgi ar dzeramo ūdeni, uz ķermeņa masu dienā 4–7 dienas.	Olas nedējoši cāļi un tītari: 20 mg doksiciklīna hiklāta uz kg	Tītari – gaļa: 28 dienas. Olas nedējoši cāļi – gaļa: 14 dienas. Indikācijas: Tītari: - <i>Chlamydia psittaci</i> izraisīta ornitoze - <i>E. coli</i> izraisīta kolibaciloze - <i>Mycoplasma</i> <i>gallisepticum</i> izraisīta HES Olas nedējoši cāļi: <i>E. coli</i> izraisīta kolibaciloze
Nīderlande	Dutch Farm Veterinary Pharmaceuticals B.V. Veemweg 1 3771 MT Barneveld NĪDERLANDE	Doxycycline 20 % W.O.	Doksiciklīna hiklāts	Uz gramu pulvera: 200 mg doksiciklīna hiklāta.	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavoša nai	Olas nedējoši cāļi	Iekšķīgi ar dzeramo ūdeni 3 dienas	10 mg doksiciklīna hiklāta uz kg ķermeņa masas dienā 3 dienas	Gaļa: 7 dienas. Indikācijas olas nedējošiem cāļiem: - <i>Mycoplasma synoviae</i> izraisīts poliartrīts; - HES, ko citu baktēriju vidū izraisījusi arī <i>Mycoplasma</i> <i>gallisepticum</i> ; - <i>Escherichia coli</i> izraisīta kolibaciloze
Nīderlande	DOPHARMA B.V. Zalmweg 24, P.O. BOX 205 4940 AE Raamsdonksveer NĪDERLANDE	Doxycycline- hyclaat 20 %	Doksiciklīna hiklāts	Uz gramu pulvera: 200 mg doksiciklīna hiklāta.	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavoša nai	Teļi, cūkas, cāļi un tītari.	Cāļi un tītari: iekšķīgi ar dzeramo ūdeni 4– 7 dienas	Cāļi un tītari: 20 mg doksiciklīna hiklāta uz kg ķermeņa masas	Tītari – gaļa: 28 dienas. Cāļi – gaļa: 14 dienas, olas: 10 dienas. Indikācijas tītariem: - <i>Chlamydia psittaci</i> izraisīta ornitoze - <i>E. coli</i> izraisīta kolibaciloze - <i>Mycoplasma</i> <i>gallisepticum</i> izraisīta HES Indikācijas cāļiem: - <i>E.</i>

									<i>coli</i> izraisīta kolibaciloze - <i>Mycoplasma gallisepticum</i> izraisīta HES
Nīderlande	<i>Dutch Farm International B.V. Nieuw Walden 112 1394 PE Nederhorst den Berg NĪDERLANDE</i>	<i>Doxycycline 20 % W.O.</i>	Doksiciklīna hīklāts	Uz gramu pulvera: 200 mg doksiciklīna hīklāta.	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai	Olas nedējoši cāļi (broileri).	Iekšķīgi (ar dzeramo ūdeni).	10 mg doksiciklīna hīklāta uz kg ķermeņa masas dienā 3 dienas.	Gaļa: 7 dienas. Nelietot cāļiem, kuru olas izmanto cilvēku uzturā. Indikācijas olas nedējošiem cāļiem: - <i>Mycoplasma synoviae</i> izraisīts poliartrīts; - HES, ko citu baktēriju vidū izraisījusi arī <i>Mycoplasma gallisepticum</i> ; - <i>Escherichia coli</i> izraisīta kolibaciloze.
Nīderlande	<i>DOPHARMA B.V. Zalmweg 24, P.O. BOX 205 4940 AE Raamsdonksveer NĪDERLANDE</i>	<i>Doxycycline-hyclaat 50 %</i>	Doksiciklīna hīklāts	Uz gramu pulvera: 500 mg doksiciklīna hīklāta.	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai	Telji, cūkas, olas nedējoši cāļi.	Olas nedējoši cāļi: iekšķīgi ar dzeramo ūdeni 4–5 dienas	Olas nedējoši cāļi: 20 mg doksiciklīna hīklāta uz kg ķermeņa masas dienā 4–5 dienas.	Olas nedējoši cāļi - gaļa: 14 dienas. Indikācijas olas nedējošiem cāļiem: - <i>E. coli</i> izraisīta kolibaciloze - <i>Mycoplasma gallisepticum</i> izraisīta HES
Nīderlande	<i>DOPHARMA B.V. Zalmweg 24, P.O. BOX 205 4940 AE Raamsdonksveer NĪDERLANDE</i>	<i>Doxycycline 50 % WSP</i>	Doksiciklīna hīklāts	Uz gramu pulvera: 500 mg doksiciklīna hīklāta.	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai	Olas nedējoši cāļi.	Olas nedējoši cāļi: iekšķīgi ar dzeramo ūdeni.	Olas nedējoši cāļi: 25 mg doksiciklīna hīklāta uz kg ķermeņa masas dienā 3–5 dienas.	Olas nedējoši cāļi - gaļa: 6 dienas. Indikācijas olas nedējošiem cāļiem: - Elpceļu infekcijas, ko izraisījušas <i>Mycoplasma</i> sugas (<i>M. gallisepticum</i> , <i>M. synoviae</i> un <i>M. meleagridis</i>), <i>E. coli</i> un <i>Haemophilus</i>

									<i>paragallinarum</i> ; - <i>Clostridium perfringens</i> un <i>Clostridium colinum</i> izraisīts enterīts.
Nīderlande	<i>Interchemie Werken De Adelaar BV Hosterweg 26a 5811 Ccastenray NĪDERLANDE</i>	<i>Doxy WS</i>	Doksiciklīna hīklāts	Uz gramu pulvera: 200 mg doksiciklīna hīklāta.	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai	Olas nedējoši cāļi (broileri).	Iekšķīgi (ar dzeramo ūdeni).	10 mg doksiciklīna hīklāta uz kg ķermeņa masas dienā 3 dienas.	Gaļa: 7 dienas. Indikācijas olas nedējošiem cāļiem: - <i>Mycoplasma synoviae</i> izraisīts poliartrīts; - HES, ko citu baktēriju vidū izraisījusi arī <i>Mycoplasma gallisepticum</i> ; - <i>Escherichia coli</i> izraisīta kolibaciloze.
Nīderlande	<i>Eurovet Animal Health B.V. Handelsveg 25 PO Box 179 5530 AD Bladel NĪDERLANDE</i>	<i>Soludox 50 %</i>	Doksiciklīna hīklāts	Uz gramu pulvera: 500 mg doksiciklīna hīklāta.	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai	Cūkas un olas nedējoši cāļi.	Olas nedējoši cāļi: iekšķīgi ar dzeramo ūdeni.	Olas nedējoši cāļi: - <i>Pasteurella multocida</i> izraisīta pastereloze: 10 mg doksiciklīna uz kg ķermeņa masas dienā 3–4 dienas. <i>Ornithobacterium rhinotracheale</i> (ORT) izraisītas infekcijas: 20 mg doksiciklīna hīklāta uz kg ķermeņa masas dienā 3–4 dienas.	Olas nedējoši cāļi: pastereloze – gaļa: 5 dienas. – ORT – gaļa: 12 dienas. Nelietot cāļiem, kuru olas izmanto cilvēku uzturā.

Nīderlande	<i>Eurovet Animal Health B.V. Handelsveg 25 PO Box 179 5530 AD Bladel NĪDERLANDE</i>	<i>Doxyfar 50 %</i>	Doksiciklīna hīklāts	Uz gramu pulvera: 500 mg doksiciklīna hīklāta.	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai	Cūkas un olas nedējoši cāļi.	Olas nedējoši cāļi: iekšķīgi ar dzeramo ūdeni.	Olas nedējoši cāļi: <i>Pasteurella multocida</i> izraisīta <i>pastereloze</i> : 10 mg doksiciklīna hīklāta uz kg ķermeņa masas dienā 3–4 dienas. <i>Ornithobacterium rhinotracheale</i> (ORT) izraisītas elpceļu infekcijas: 20 mg doksiciklīna hīklāta uz kg ķermeņa masas dienā 3–4 dienas.	Olas nedējoši cāļi: <i>pastereloze</i> - gaļa: 5 dienas. - ORT – gaļa: 12 dienas. Nelietot cāļiem, kuru olas izmanto cilvēku uzturā.
Nīderlande	<i>Kepro B.V. Maagdenburgstraat 38 7421 ZE Deventer NĪDERLANDE</i>	<i>Doxy 200 W.S.P.</i>	Doksiciklīna hīklāts	Uz gramu pulvera: 200 mg doksiciklīna hīklāta.	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai	Olas nedējoši cāļi (broileri).	Iekšķīgi (ar dzeramo ūdeni).	10 mg doksiciklīna hīklāta uz kg ķermeņa masas dienā 3 dienas.	Gaļa: 7 dienas. Nelietot cāļiem, kuru olas izmanto cilvēku uzturā. Indikācijas: - <i>Mycoplasma synoviae</i> izraisīts poliartrīts; - HES, ko citu baktēriju vidū izraisījusi arī <i>Mycoplasma gallisepticum</i> ; - <i>Escherichia coli</i> izraisīta kolibaciloze.

Nīderlande	<i>Eurovet Animal Health B.V. Handelsveg 25 PO Box 179 5530 AD Bladel NĪDERLANDE</i>	<i>Soludox 50 %</i>	Doksiciklīna hīklāts	Uz gramu pulvera: 500 mg doksiciklīna hīklāta.	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai	Cūkas un olas nedējoši cāļi.	Olas nedējoši cāļi: iekšķīgi ar dzeramo ūdeni.	Olas nedējoši cāļi: 10 mg doksiciklīna hīklāta uz kg ķermeņa masas dienā 3–4 dienas.	Olas nedējoši cāļi – gaļa: 5 dienas. Indikācijas: <i>Pasteurella multocida</i> izraisīta pastereleze
Nīderlande	<i>Laboratorios Karizoo S.A Polígono Industrial La Borda Mas Pujades 11-12 08140 Caldes de Montbui Barcelona SPĀNIJA</i>	<i>Karidox 10 % Oral Solution</i>	Doksiciklīna hīklāts	Uz ml: 100 mg doksiciklīna (hīklāta formā).	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Cūkas un cāļi (broileri).	Cāļi (broileri): iekšķīgi ar dzeramo ūdeni.	Cāļi (broileri): 10–20 mg doksiciklīna uz kg ķermeņa masas dienā 3–5 dienas.	Cāļi (broileri) – gaļa: 7 dienas. Indikācijas: Pret doksiciklīnu jutīgu mikroorganismu izraisītas HES un mikoplazmozes profilakse un ārstēšana.
Nīderlande	<i>Huvepharma, Uitbreidingstraat 80 2600 Antwerpen BEĻĢIJA</i>	<i>HydroDoxx 500 mg/g</i>	Doksiciklīna hīklāts	Uz g: 500 mg doksiciklīna hīklāta.	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai	Cūkas un cāļi (broileri).	Cāļi (broileri): iekšķīgi ar dzeramo ūdeni.	Cāļi (broileri): 20 mg doksiciklīna uz kg ķermeņa masas dienā 3 – 5 dienas.	Cāļi (broileri) – gaļa: 6 dienas. Nelietot cāļiem, kuru olas izmanto cilvēku uzturā.
Nīderlande	<i>CHEMO IBERICA, S.A. Gran Via Carlos III, 98 7ª Edificio Trade 08028 Barcelona SPĀNIJA</i>	<i>Soldoxin</i>	Doksiciklīna hīklāts	Uz ml: 100 mg doksiciklīna (hīklāta formā).	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Cūkas un cāļi (broileri).	Cāļi (broileri): iekšķīgi ar dzeramo ūdeni.	Cāļi (broileri): 10–20 mg doksiciklīna uz kg ķermeņa masas dienā 3–5 dienas.	Cāļi (broileri) – gaļa: 7 dienas. Nelietot cāļiem, kuru olas izmanto cilvēku uzturā. Indikācijas: Pret doksiciklīnu jutīgu mikroorganismu izraisītas HES un mikoplazmozes profilakse un ārstēšana.

Polija	<i>DOPHARMA B.V. Zalmweg 24, P.O. BOX 205 4940 AE Raamsdonksveer NĪDERLANDE</i>	<i>Doxymed 50</i>	Doksiciklīna hiklāts	500 mg/g	pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavoša nai	cāļi	250–500 ml preparāta/1000 litriem dzeramā ūdens	25 mg doksiciklīna hiklāta/kg ķermeņa masas dienā 3–5 dienas	Gaļa un subprodukti: 4 dienas. Nav paredzēts lietošanai dējējvistām.
Polija	<i>Eurovet Animal Health B.V. Handelsveg 25 PO Box 179 5530 AD Bladel NĪDERLANDE</i>	<i>Soludox 50 %</i>	Doksiciklīna hiklāts	500 mg/g	Pulveris iekšķīgai lietošanai	cāļi	2 g preparāta/100 kg ķermeņa masas dienā pastorelozes gadījumā vai 4 g preparāta/100 kg ķermeņa masas dienā <i>Ornithrobacterium rhinotracheale</i> infekcijas gadījumā.	10 mg doksiciklīna hiklāta/kg ķermeņa masas dienā pastorelozes gadījumā vai 20 mg doksiciklīna hiklāta/kg ķermeņa masas dienā <i>Ornithrobact erium rhinotracheal e</i> infekcijas gadījumā 3– 4 dienas.	Gaļa un subprodukti: 5 dienas pastereozes gadījumā. 12 dienas <i>Ornithrobacterium rhinotracheale</i> infekcijas gadījumā. Nav paredzēts lietošanai dējējvistām.
Polija	<i>Laboratorios Hipra S.A. Avda La Selva 135 17170 Amer (Girona) SPĀNIJA</i>	<i>Hipradoxi-S</i>	Doksiciklīna hiklāts	100 mg/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	cāļi	0,5–1,0 ml preparāta/1 l dzeramā ūdens	50–100 mg doksiciklīna hiklāta/1 l dzeramā ūdens 3–5 dienas	Gaļa un subprodukti: 5 dienas. Nav paredzēts lietošanai dējējvistām.
Polija	<i>Oropharma n.v. Dijkstraat 30 9140 Temse BEĻĢIJA</i>	<i>Ornicure</i>	Doksiciklīna hiklāts	300 mg/4 g	Pulveris iekšķīgai lietošanai	baloži, papagaiļi	Baloži: 4 g preparāta/2 l dzeramā ūdens, papagaiļi: 4 g preparāta/0,5 l	15 mg/kg ķermeņa masas dienā 5 dienas, papagaiļiem vai klīniskas ornitozes gadījumā 3– 4 nedēļas.	Nav paredzēts lietošanai baložiem, kurus izmanto cilvēku uzturā.
Polija	<i>Novartis Animal Health d.o.o. Verovskava 57 1000 Ljubljana SLOVĒNIJA</i>	<i>Doxiryl 50 %</i>	Doksiciklīna hiklāts	500 mg/g	pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavoša nai	cāļi (broileri)	25 mg doksiciklīna hiklāta/kg ķermeņa masas dienā	25 mg doksiciklīna hiklāta/kg ķermeņa masas dienā 3–5 dienas	Gaļa un subprodukti: 4 dienas. Nav paredzēts lietošanai dējējvistām.

Polija	<i>S.P. Veterinaria SA Crt. Reus Vinyols Km 4.1 Apartado 60 Riudoms 43330 (Tarragona) SPĀNIJA</i>	<i>Doxivex 10 %</i>	Doksiciklīna hiklāts	100 mg/ml	Koncentrāts iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavoša nāi	cāļi (broileri)	0,5–1,0 ml preparāta/1 l dzeramā ūdens	50–100 mg doksiciklīna hiklāta/1 l dzeramā ūdens dienā 3–5 dienas	Gaļa un subprodukti: 7 dienas. Nav paredzēts lietošanai dējējvistām.
Polija	<i>CHEMO IBERICA, S.A. Gran Via Carlos III, 98 7ª Edificio Trade 08028 Barcelona SPĀNIJA</i>	<i>Oridox</i>	Doksiciklīna hiklāts	100 mg/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	cāļi (broileri)	0,5–1,0 ml preparāta/1 l dzeramā ūdens	10–20 mg doksiciklīna hiklāta/kg ķermeņa masas dienā 3–5 dienas	Gaļa un subprodukti: 7 dienas. Nav paredzēts lietošanai dējējvistām.
Polija	<i>Laboratorios Karizoo S.A Polígono Industrial La Borda Mas Pujades 11-12 08140 Caldes de Montbui Barcelona SPĀNIJA</i>	<i>Karidox</i>	Doksiciklīna hiklāts	100 mg/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	cāļi (broileri)	0,5–1,0 ml preparāta/1 l dzeramā ūdens	10–20 mg doksiciklīna hiklāta/kg ķermeņa masas dienā 3–5 dienas	Gaļa un subprodukti: 7 dienas. Nav paredzēts lietošanai dējējvistām.
Polija	<i>Drwalewski Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego S.A. Grójecka 6 05-651 Drwalew POLIJA</i>	<i>Doxymina 20 %</i>	Doksiciklīna hiklāts	200 mg/g	Pulveris iekšķīgai lietošanai	cāļi	25–50 g preparāta/1 l dzeramā ūdens	10 mg doksiciklīna hiklāta/kg ķermeņa masas dienā 3–5 dienas	Gaļa un subprodukti: 7 dienas. Nav paredzēts lietošanai dējējvistām.
Polija	<i>V.M.D.n.v./ s.a. Hoge Muew 900 2370 Arendonk BEĻGIJA</i>	<i>Doxycycline hyclate 50 %</i>	Doksiciklīna hiklāts	500 mg	pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavoša nāi	cāļi	25 mg doksiciklīna hiklāta/kg ķermeņa masas dienā	25 mg doksiciklīna hiklāta/kg ķermeņa masas dienā 3–5 dienas	Gaļa un subprodukti: 5 dienas. Nav paredzēts lietošanai dējējvistām.
Polija	<i>INDUSTRIAL VETERINARIA S.A. Esmeralda, 19 – 4º 08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT SPĀNIJA</i>	<i>Doxinyl</i>	Doksiciklīna hiklāts	100 mg/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	cāļi (broileri)	0,5–1,0 ml preparāta/1 litru dzeramā ūdens dienā	50–100 mg doksiciklīna hiklāta/1 l dzeramā ūdens 3–5 dienas	Gaļa un subprodukti: 7 dienas. Nav paredzēts lietošanai dējējvistām.

Polija	<i>Biofaktor Sp. z o.o. (Skierniewice) Czysta 4 96-100 Skierniewice POLIJA</i>	<i>Doxycyclinum 20 %</i>	Doksiciklīna hīklāts	200 mg/ml	pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai	cāļi, tītari	25–50 g preparāta/1 l dzeramā ūdens	10 mg doksiciklīna hīklāta/kg ķermeņa masas dienā 3–5 dienas	Gaļa un subprodukti: 4 dienas. Nav paredzēts lietošanai dējējvistām.
Polija	<i>Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. Fleminga 2 03-176 Warszawa POLIJA</i>	<i>Doxycyclinum wet proszek</i>	Doksiciklīna hīklāts	200 mg/g	pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai	cāļi, tītari	25–50 g pulvera/1 l dzeramā ūdens	10 mg doksiciklīna hīklāta/kg ķermeņa masas dienā 3–5 dienas	Gaļa un subprodukti: 7 dienas. Nav paredzēts lietošanai dējējvistām.
Polija	<i>Sogeval Laboratoires 200 route De Mayenne 53 022 Laval Cedex FRANCIJA</i>	<i>DOXYVAL 20 %</i>	Doksiciklīna hīklāts	20 g/100 g	Pulveris iekšķīgai lietošanai	cāļi (broileri)	5 g preparāta/100 kg ķermeņa masas dienā vai 0,5 g/1 l dzeramā ūdens	10 mg doksiciklīna hīklāta/kg ķermeņa masas dienā 3–5 dienas	Gaļa un subprodukti: 4 dienas. Nav paredzēts lietošanai dējējvistām.
Polija	<i>Eurovet Animal Health B.V. Handelsveg 25 PO Box 179 5530 AD Bladel NĪDERLANDE</i>	<i>Soludox 15%</i>	Doksiciklīna hīklāts	150 mg/g	Pulveris iekšķīgai lietošanai	cāļi, tītari, baloži, sprostas putni	10–20 mg doksiciklīna hīklāta/kg ķermeņa masas dienā	10–20 mg doksiciklīna/kg ķermeņa masas dienā 3–5 dienas. <i>Chlamydia psittaci</i> infekcijas gadījumā 30–45 dienas.	Gaļa un subprodukti: 7 dienas. Nav paredzēts lietošanai vistām un baložiem, kurus izmanto cilvēku uzturā.
Portugāle	<i>CEVA Saúde Animal –Produtos farmacêuticos e Imunológicos Lda. Ceva Saúde Animal Lda. Rua Doutor António Loureiro Borges 9/9ª 9º A Miraflôres 1495-131 Algés PORTUGĀLE</i>	<i>DOXYPRIM 400 mg/g Pó para Solução Oral para Suínos, Frangos e Perus.</i>	Doksiciklīna hīklāts	Doksiciklīna hīklāts 400 mg/g	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai	Cūkas, cāļi, tītari	Iekšķīgai lietošanai ar dzeramo ūdeni	Broileri un tītari: 20 mg doksiciklīna hīklāta/kg ķermeņa masas 5 dienas.	Cāļu (broileru) gaļa un subprodukti: 5 dienas; tītaru gaļa un subprodukti: 6 dienas. Nedrīkst lietot dējējputniem, kuru olas izmanto cilvēku uzturā.

Portugāle	<i>DIVASA FARMAVIC DE PORTUGAL Produtos e Equipamentos Veterinários Lda. Parque Empresarial de Vialonga Armazém nº 21 Casal do Bagulho Granja de Alpriate 2625-607 Vialonga PORTUGĀLE</i>	<i>DOXYVET-10</i>	Doksiciklīna hīklāts	Doksiciklīna hīklāts 10 g; bromeksīna hloridrāts 1 g	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Liellopi (teļi), cūkas, broileri, tītari, aitas, kazas (kazlēni)	Iekšķīgai lietošanai ar dzeramo ūdeni	Broileri un tītari: 50–100 mg/litru ūdens dienā 3–5 dienas (atbilst 0,5–1 ml <i>DOXIVET-10</i> /litru ūdens dienā	Gaļa un subprodukti: 5 dienas.
Portugāle	<i>DOPHARMA B.V. Zalmweg 24, P.O. BOX 205 4940 AE Raamsdonksveer NĪDERLANDE</i>	<i>VETADOXI 50</i>	Doksiciklīna hīklāts	Doksiciklīna hīklāts 500 mg/g	Pulveris iekšķīgai lietošanai	Liellopi (teļi), cūkas un putni	Iekšķīgai lietošanai ar dzeramo ūdeni, pienu vai barību	25 mg/kg ķermeņa masas putniem; 200 g/1000 l ūdens dienā 3–5 dienas; 500 g/1000 l dzeramā ūdens putniem	Gaļa un subprodukti: 5 dienas. Nedrīkst lietot dējējputniem, kuru olas izmanto cilvēku uzturā.
Portugāle	<i>S.P. Veterinaria SA Crta. Reus Vinyols Km 4.1 Apartado 60 Riudoms 43330 (Tarragona) SPĀNIJA</i>	<i>Hidrodox 10 % Concentrado para solução oral para aves (frangos de carne) e suínos</i>	Doksiciklīna hīklāts	100 mg doksiciklīna (hīklāta formā)	Koncentrāts iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai	Cāļi (broileri) un cūkas	Iekšķīgai lietošanai ar dzeramo ūdeni	Broileriem: 50–100 mg doksiciklīna hīklāta/l dzeramā ūdens dienā (0,5–1,0 ml VMP dzeramā ūdenī dienā) 3–5 dienas.	Putnu (broileru) gaļa un subprodukti: 7 dienas. Nedrīkst lietot dējējputniem, kuru olas izmanto cilvēku uzturā.
Portugāle	<i>Univete SA Rua D. Jerónimo Osório, 5 B 1400-119 Lisboa PORTUGĀLE</i>	<i>UNIDOXINA 200 mg/ml solução oral para suínos e aves</i>	Doksiciklīna hīklāts	200 mg doksiciklīna (hīklāta formā)	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Cāļi (broileri) un cūkas	Iekšķīgai lietošanai ar dzeramo ūdeni	Broileri un tītari: 20 mg doksiciklīna hīklāta/kg ķermeņa masas 5 dienas.	Cāļu (broileru) gaļa un subprodukti: 7 dienas. Nedrīkst lietot dējējputniem, kuru olas izmanto cilvēku uzturā.

Rumānija	DELOS IMPEX' 96 SRL 17, Pictor Ștefan Luchian sector 2 Bucharest RUMĀNIJA	Doxidem 20	Doksiciklīna hiklāts	200 mg/ml doksiciklīna hiklāta.	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Mājputni (nav paredzēts lietošanai dzīvniekiem, kuru olas izmanto cilvēku uzturā)	Iekšķīgi	- 75 ml preparāta/10 0 litriem dzeramā ūdens dienā 3–5 dienas pēc kārtas jauniem putniem līdz 4 nedēļu vecumam - 150 ml preparāta/10 0 litriem dzeramā ūdens dienā 3–5 dienas pēc kārtas pieaugušiem mājputniem	Gaļa un subprodukti: 28 dienas. Indikācijas: Mājputni: mikoplazmozes, pasterelozes, kolibacilozes un stafilokokozes ārstēšanai. Hroniska elpceļu slimība, <i>Pasteurella</i> sugu, <i>Mycoplasma</i> sugu, <i>Salmonella</i> sugu, <i>E. coli</i>, <i>Haemophilus</i> <i>paragallinarium</i>, <i>Staphylococcus</i> izraisītas infekcijas, <i>Campylobacter</i> izraisīts hepatīts un dermatīts.
----------	---	------------	-------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	---	----------	---	---

Rumānija	DELOS IMPEX' 96 SRL 17, Pictor Ștefan Luchian sector 2 Bucharest RUMĀNIJA	Doxidem 50	Doksiciklīna hiklāts	500 mg/g doksiciklīna hiklāta	Ūdenī šķīstošs pulveris	Mājputni (nav paredzēts lietošanai dzīvniekiem, kuru olas izmanto cilvēku uzturā) Cūkas	Iekšķīgi (ar dzeramo ūdeni)	- 20–40 mg preparāta/kg ķermeņa masas dienā 5 dienas pēc kārtas, iekšķīgi; - 200–300 g preparāta /1000 litriem dzeramā ūdens 5 dienas pēc kārtas	Gaļa un subprodukti: 28 dienas. Indikācijas: hroniska elpceļu slimība, <i>Pasteurella</i> suga, <i>Mycoplasma</i> suga, <i>Salmonella</i> suga, <i>E. coli</i> , <i>Haemophilus</i> <i>paragallinarium</i> , <i>Staphylococcus</i> izraisītas infekcijas, <i>Campylobacter</i> izraisīts hepatīts, dermatīts un citas pret doksiciklīnu jutīgu mikroorganismu izraisītas infekcijas.
Rumānija	DOPHARMA B.V. Zalmweg 24, P.O. BOX 205 4940 AE Raamsdonksveer NĪDERLANDE	Doxycycline 50 % WSP	Doksiciklīna hiklāts	500 mg/g doksiciklīna hiklāta	Ūdenī šķīstošs pulveris	Mājputni (nav paredzēts lietošanai dzīvniekiem, kuru olas izmanto cilvēku uzturā) Teļi Cūkas	Iekšķīgi (ar dzeramo ūdeni)	40 mg/kg ķermeņa masas vai 200– 400 g/1000 litriem dzeramā ūdens 4–7 dienas	Gaļa un subprodukti: Mājputni – 4 dienas. Indikācijas: <i>Chlamydia</i> <i>psittaci</i> izraisīta ornitoze tītariem; '- <i>E. coli</i> izraisīta kolibaciloze cāļiem un tītariem; '- <i>Mycoplasma</i> <i>gallisepticum</i> izraisīta HES cāļiem un tītariem

Rumānija	FRANVET ZI d'Etriche-Route d'Avire BP 103 49500 Segré Cedex FRANCIJA	Doxy 5 Franvet	Doksiciklīna hiklāts	50 mg/g doksiciklīna (hiklāta formā)	Ūdenī šķīstošs pulveris	Mājputni (nav paredzēts lietošanai dzīvniekiem, kuru olas izmanto cilvēku uzturā) Teļi Cūkas	Iekšķīgi (ar dzeramo ūdeni vai šķidru barību)	1 g preparāta/1 l dzeramā ūdens dienā 3–5 dienas mājputniem līdz divu nedēļu vecumam – 2 g preparāta/1 l dzeramā ūdens dienā 3–5 dienas mājputniem pēc divu nedēļu vecuma	Gaļa un subprodukti: Mājputni – 4 dienas. Indikācijas: pret doksiciklīnu jutīgu mikroorganismu izraisītu elpceļu infekciju profilakse un ārstēšana.
Rumānija	INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI TREI SpA Via Affarosa n.4 42010 Rio Saliceto (Reggio Emilia) ITĀLIJA	Doxipan 20	Doksiciklīna hiklāts	200 mg/g doksiciklīna hiklāta	Ūdenī šķīstošs pulveris	Mājputni Cūkas	Iekšķīgi (ar dzeramo ūdeni)	5–7,5 g preparāta uz 10 litriem dzeramā ūdens	Gaļa un subprodukti: Mājputni – 5 dienas. Indikācijas: hroniska elpceļu slimība un ar to saistītās komplikācijas.
Rumānija	PHYLAXIA PHARMA LTD 1103 Budapest Gergely u.79 UNGĀRIJA	Doxyphyl SP A.U.V.	Doksiciklīna hiklāts	300 mg/g doksiciklīna hiklāta	Ūdenī šķīstošs pulveris	Mājputni (cāļi, vistas, tītari)	Iekšķīgi (ar dzeramo ūdeni)	10 mg/kg ķermeņa masas 3–5 dienas vai 100 mg preparāta/1 l dzeramā ūdens	Cāļi, vistas: 7 dienas. Tītari: 7 dienas (nav paredzēts lietošanai dzīvniekiem, kuru olas izmanto cilvēku uzturā) Indikācijas: vairāku bakteriālu infekciju profilaksei un ārstēšanai.
Rumānija	LABORATORIOS SYVA S.A. Avda. Parroco Pablo Diez, 49-57 24010 Leon SPĀNIJA	Syvadox 10 %	Doksiciklīna hiklāts	100 mg/1 ml doksiciklīna (hiklāta formā)	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Cāļi (nav paredzēts lietošanai dzīvniekiem, kuru olas izmanto cilvēku uzturā)	Iekšķīgi (ar dzeramo ūdeni)	50–100 mg doksiciklīna/ 1 l dzeramā ūdens dienā (atbilst 0,5– 1,0 ml preparāta/ l dzeramā)	Cāļiem 7 dienas (nav paredzēts lietošanai dzīvniekiem, kuru olas izmanto cilvēku uzturā) Indikācijas:

								ūdens dienā 3–5 dienas	kolibaciloze, HES, mikoplazmoze, ja tās ierosina iepriekš minētie mikroorganismi, kas ir jutīgi pret doksiciklīnu.
Rumānija	VMD Berendonk 74 2370 Arendonk BEĻĢIJA	Doxyveto 50S	Doksiciklīna hiklāts	500 mg/g doksiciklīna (hiklāta formā)	Ūdenī šķīstošs pulveris	Mājputni Cūkas Teļi Jēri	Iekšķīgi (ar dzeramo ūdeni vai barību)	20 mg doksiciklīna/ kg ķermeņa masas dienā ar dzeramo ūdeni vai 300 g preparāta/10 00 litriem dzeramā ūdens vai 600 g/1000k g barības 3– 5 dienas	Mājputni – 8 dienas. Indikācijas: HES (<i>Mycoplasma gallisepticum</i>), ornitoze (<i>Chlamidia psittaci</i>), infekciozs sinovīts (<i>Mycoplasma synoviae</i>), putnu holēra (<i>Pasteurella multocida</i>).
Rumānija	CHEMIFARMA S.p.A Via Don Eugenio Servadei 16 47100 Forlì ITĀLIJA	Doxiciclina 50 %	Doksiciklīna hiklāts	500 mg/g doksiciklīna	Ūdenī šķīstošs pulveris	Broileri Cāļi Cūkas	Iekšķīgi (ar dzeramo ūdeni vai šķīdru barību)	40 g preparāta/10 0 kg ķermeņa masas (20 mg doksiciklīna/ kg ķermeņa masas), kas atbilst aptuveni 15– 30 g preparāta/10 0 litriem ūdens 3–5 dienas.	Broileriem 5 dienas. Indikācijas: <i>Pasteurella</i> sugu, <i>Mycoplasma</i> sugu, <i>Haemophilus gallinarium</i> , <i>Bordetella avium</i> un <i>Chlamidia psittaci</i> izraisīta hroniska elpceļu slimība un citas elpceļu slimības.

Rumānija	<i>Lavet Pharmaceuticals Ltd., 1161 Budapest Ottó u. 14, Ungārija</i>	<i>Doxiprim 40 % Soluble Powder</i>	Doksiciklīna hīklāts	400 mg/g doksiciklīna hīklāta	Ūdenī šķīstošs pulveris	Cāļi, tītari (nav paredzēts lietošanai dzīvniekiem, kuru olas izmanto cilvēku uzturā), cūkas	Iekšķīgi (ar dzeramo ūdeni)	20 mg doksiciklīna hīklāta/kg ķermeņa masas	Cāļiem un tītariem 4 dienas (nav paredzēts lietošanai dzīvniekiem, kuru olas izmanto cilvēku uzturā) Indikācijas: pret doksiciklīnu jutīgu mikroorganismu izraisītu elpceļu, zarnu un sistēmisku infekciju ārstēšana: HES (<i>Mycoplasma gallisepticum</i>, <i>E. coli</i>), aerosakulīts (<i>Mycoplasma maleagris</i>), infekciozais sinovīts (<i>Mycoplasma synoviae</i>), putnu holēra (<i>Pasteurella multocida</i>), infekciozās iesnas (<i>Haemophilus paragallinarum</i>), kolibaciloze (<i>E. Coli</i>), tītaru bordeteloze (<i>Bordetella avium</i>), nekrotisks enterīts (<i>Clostridium perfringens</i>), hlamidioze (<i>Chlamidia psittaci</i>). Sekundāru bakteriālu infekciju profilakse stresa, vakcinācijas, mājvietas maiņas vai transportēšanas gadījumā.
----------	---	-------------------------------------	----------------------	-------------------------------	-------------------------	--	-----------------------------	---	---

Rumānija	<i>Novartis Animal Health d.o.o. Verovskava 57 1000 Ljubljana SLOVĒNIJA</i>	<i>Doxyryl 50 %</i>	Doksiciklīna hīklāts	500 mg/g doksiciklīna hīklāta	Ūdenī šķīstošs pulveris	Mājputni (nav paredzēts lietošanai dzīvniekiem, kuru olas izmanto cilvēku uzturā) Cūkas	Iekšķīgi (ar dzeramo ūdeni)	25 mg doksiciklīna hīklāta/kg ķermeņa masas 3–5 dienas pēc kārtas	Mājputniem 4 dienas (nav paredzēts lietošanai dzīvniekiem, kuru olas izmanto cilvēku uzturā) Indikācijas: Elpceļu infekcijas, ko izraisa <i>Mycoplasma</i> sugas (<i>M. gallisepticum</i> , <i>M. synoviae</i> un <i>M. melagris</i>), <i>E. coli</i> , <i>Haemophilus paragallinarum</i> un <i>Ornithobacterium rhinotracheale</i> . <i>Clostridium perfringens</i> un <i>Clostridium colinum</i> izraisīts enterīts. <i>Pasteurella multocida</i> izraisīta septicēmija.
Rumānija	<i>CEVA SANTE ANIMALE ROMANIA SRL 5 Chindiei , sector 4, Bucharest RUMĀNIJA</i>	<i>Doxyvīt 50 % WSP</i>	Doksiciklīna hīklāts	500 mg/g doksiciklīna hīklāta	Ūdenī šķīstošs pulveris	Mājputni (nav paredzēts lietošanai dzīvniekiem, kuru olas izmanto cilvēku uzturā), cūkas	Iekšķīgi (ar dzeramo ūdeni)	15 mg doksiciklīna/kg ķermeņa masas 5 dienas pēc kārtas vai 2 g preparāta /10 litriem dzeramā ūdens, kas atbilst 100 mg doksiciklīna/l ūdens	Mājputniem (cāļiem un tītariem) 7 dienas (nav paredzēts lietošanai dzīvniekiem, kuru olas izmanto cilvēku uzturā) Indikācijas: kolibaciloze, HES un mikoplazmoze, <i>Clostridium perfringens</i> , hlamidioze, <i>Bordetella avium</i> izraisītas infekciozās iesnas.

Rumānija	<i>Laboratorios Karizoo S.A Polígono Industrial La Borda Mas Pujades 11-12 08140 Caldes de Montbui Barcelona SPĀNIJA</i>	<i>Karidox 100 mg/ml oral solution for use in drinking water for chickens and pigs</i>	Doksiciklīna hīklāts	100 mg/ml doksiciklīna (hīklāta formā)	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Mājputni (cāļi) (nav paredzēts lietošanai dzīvniekiem, kuru olas izmanto cilvēku uzturā) Cūkas	Iekšķīgi (ar dzeramo ūdeni)	10–20 mg doksiciklīna/kg ķermeņa masas 3–5 dienas.	Mājputniem (cāļiem) 14 dienas (nav paredzēts lietošanai dzīvniekiem, kuru olas izmanto cilvēku uzturā) Indikācijas: Pret doksiciklīnu jutīgu mikroorganismu izraisītas HES un mikoplazmozes profilakse un ārstēšana.
Rumānija	<i>S.C. VIM SPECTRUM SRL 409 Sighisoarei Targu Mures RUMĀNIJA</i>	<i>Vidoxim 10 % powder for oral solution for pigs and poultry</i>	Doksiciklīna hīklāts	100 mg/g doksiciklīna hīklāta	Ūdenī šķīstošs pulveris	Mājputni (nav paredzēts lietošanai dzīvniekiem, kuru olas izmanto cilvēku uzturā) Cūkas	Iekšķīgi (ar dzeramo ūdeni)	1000 g preparāta/1000 litriem dzeramā ūdens 5 dienas	Mājputniem 10 dienas (nav paredzēts lietošanai dzīvniekiem, kuru olas izmanto cilvēku uzturā) Indikācijas: <i>Mycoplasma gallisepticum</i> , <i>E. coli</i> , <i>Bordetella avium</i> , <i>Haemophilus paragallinarium</i> un <i>Pasteurella multocida</i> izraisītas infekcijas.
Rumānija	<i>S.C. VIM SPECTRUM SRL 409 Sighisoarei Targu Mures RUMĀNIJA</i>	<i>Vidoxim 100 % powder for oral solution for pigs and poultry</i>	Doksiciklīna hīklāts	1000 mg/g doksiciklīna hīklāta	Ūdenī šķīstošs pulveris	Mājputni (nav paredzēts lietošanai dzīvniekiem, kuru olas izmanto cilvēku uzturā) Cūkas	Iekšķīgi (ar dzeramo ūdeni)	100 g preparāta/1000 litriem dzeramā ūdens 5 dienas	Mājputniem 10 dienas (nav paredzēts lietošanai dzīvniekiem, kuru olas izmanto cilvēku uzturā) Indikācijas: <i>M. gallisepticum</i> , <i>E. coli</i> , <i>Bordetella avium</i> , <i>Haemophilus paragallinarium</i> un <i>P. multocida</i> izraisītas infekcijas.
Rumānija	<i>CHEMO IBERICA, S.A. Gran Via Carlos III, 98 7ª</i>	<i>Oridox (Soldoxin) 100 mg/ml oral solution for use in drinking water</i>	Doksiciklīna hīklāts	100 mg/ml doksiciklīna (hīklāta formā)	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Cāļi (broileri) (nav paredzēts lietošanai dzīvniekiem,	Iekšķīgi (ar dzeramo ūdeni)	10–20 mg doksiciklīna/kg ķermeņa masas 3–5	Mājputniem (cāļiem) 7 dienas (nav paredzēts lietošanai dzīvniekiem, kuru olas izmanto

	<i>Edificio Trade 08028 Barcelona SPĀNIJA</i>	<i>for chickens and pigs</i>				kuru olas izmanto cilvēku uzturā) Cūkas		dienas.	cilvēku uzturā). Pret doksiciklīnu jutīgu mikroorganismu izraisītas HES un mikoplazmozes profilakse un ārstēšana.
Rumānija	<i>Huvepharma N.V. Uitbreidingstraat 80 2600 Antwerpen BEĻĢIJA</i>	<i>HydroDoxx 500 mg/g Water Soluble Powder</i>	Doksiciklīna hiklāts	500 mg/g doksiciklīna hiklāta	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavoša nāi	Cāļi (broileri) un cūkas (nobarojamas cūkas)	Iekšķīgi (ar dzeramo ūdeni)	20 mg doksiciklīna (hiklāta)/kg x 3–5 dienas	Gaļa un subprodukti: Cāļi: 6 dienas. Nelietot dējējputniem, kuru olas izmanto cilvēku uzturā. Indikācijas: Cāļi (broileri): <i>Mycoplasma gallisepticum</i> izraisītas hroniskas elpceļu slimības (HES) profilakse un ārstēšana.
Rumānija	<i>CEVA PHYLAXIA VETERINARY BIOLOGICALS CO. LTD. 1107 Budapesta Szallas u.5 UNGĀRIJA</i>	<i>Doxivit 100</i>	Doksiciklīna hidrohlorīds	100 mg/g doksiciklīna hidrohlorīda	Ūdenī šķīstošs pulveris	Mājputni (cāļi, tītari un zosis), cūkas	Iekšķīgi (ar dzeramo ūdeni)	10 mg doksiciklīna hidrohlorīda/ kg ķermeņa masas dienā 5 dienas	Mājputniem 7 dienas (nav paredzēts lietošanai dzīvniekiem, kuru olas izmanto cilvēku uzturā) Indikācijas: HES (<i>Mycoplasma gallisepticum</i> , <i>E. coli</i>), infekciozās iesnas (<i>Haemophilus paragallinarum</i>), putnu gripa (<i>Pasteurella multocida</i>), kolibaciloze (<i>E. coli</i>), aerosakulīts (<i>Mycoplasma maleagris</i>), hlamidioze (<i>Chlamidia psittaci</i>), nekrotisks enterīts (<i>Clostridium perfringens</i>).

Rumānija	PHARMATEKA BT 1046 Budapest Szigyarto u. 10/20 Kossuth Str. Pusztaberki, 2658 UNGĀRIJA	DOXY H 10 %	Doksiciklīna hidrohlorīds	100 mg/g doksiciklīna hidrohlorīda	Ūdenī šķīstošs pulveris	Mājputni	Iekšķīgi (ar dzeramo ūdeni)	1 g preparāta/1 l dzeramā ūdens 3–5 dienas	Mājputniem 10 dienas (nav paredzēts lietošanai dzīvniekiem, kuru olas izmanto cilvēku uzturā)
Rumānija	s.c. romvac company s.a. Șos. Centurii, nr. 7 Voluntari RUMĀNIJA	Doxiciclina 10 %	Doksiciklīna hidrohlorīds	100 mg/g doksiciklīna hidrohlorīda	Ūdenī šķīstošs pulveris	Mājputni, arī baloži, cūkas, liellopi (teļi)	Iekšķīgi (ar dzeramo ūdeni)	2 g preparāta/10 kg ķermeņa masas dienā 5–8 dienas	Mājputniem (cāļiem) 5 dienas (nav paredzēts lietošanai dzīvniekiem, kuru olas izmanto cilvēku uzturā).
Rumānija	S.C. Crida pharm s.r.l 2 Intrarea Vagonetului Bl. 101, Ap. 47, sector 6 Bucharest RUMĀNIJA	Doxicol 60 %	Doksiciklīna hidrohlorīds	600 mg/g doksiciklīna hidrohlorīda	Ūdenī šķīstošs pulveris	Mājputni Cūkas	Iekšķīgi (ar dzeramo ūdeni vai barību)	Broileriem 0 – 14 dienu vecumā: 50 g/1000 litriem ūdens; broileriem 15–28 dienu vecumā: 100 g/1000 litriem ūdens; broileriem 29–35 dienu vecumā: 120 g/1000 litriem ūdens	Mājputniem 5 dienas (nav paredzēts lietošanai dzīvniekiem, kuru olas izmanto cilvēku uzturā) Indikācijas: kolibacilozes, elpceļu slimību, mikoplazmozes profilakse un ārstēšana.

Slovēnija	Novartis Veterina d.o.o. Verovškova 57 1000 Ljubljana SLOVĒNIJA	DOXYRIL 50 %	Doksiciklīna hiklāts	50 % (500 mg/g)	pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavoša nai	cūkas, mājputni	Cūkām un mājputniem: vienreiz dienā 3–5 dienas pēc kārtas dzeramā ūdenī	Cūkas 20 mg doksiciklīna hiklāta uz 1 kg ķermeņa masas; mājputniem 25 mg doksiciklīna hiklāta uz 1 kg ķermeņa masas	Gaļa un subprodukti: mājputni: 4 dienas. Indikācijas: elpceļu infekcijas (<i>M. gallisepticum</i> , <i>M. synoviae</i> un <i>M. melagris</i>), <i>Escherichia coli</i> , <i>Haemophilus paragallinarum</i> , <i>Ornithobacterium rhinotracheale</i> ; enterīts (<i>Clostridium perfringens</i> un <i>Clostridium colinum</i>); septicēmija (<i>Pasteurella multocida</i>)
Slovākija	Trei Bio pharmaceutical division, Industria Italiana Integratori Trei Via Affarosa n.4 42010 Rio Saliceto (Reggio Emilia) ITĀLIJA	DOXIPAN 20 plv.sol. ad us.vet.	Doksiciklīna hiklāts	20 g/100 g	Ūdenī šķīstošs pulveris	Teļi, cūkas, mājputni- broileri, tītari	5 dienas dzeramā ūdenī	Mājputniem- broileiem: 5–7,5 g preparāta/10 litriem dzeramā ūdens. Tītariem: 10–20 mg aktīvās vielas uz ķermeņa masu, kas atbilst 50– 100 g preparāta/10 0 litriem dzeramā ūdens. Teļiem, cūkām: 10 mg aktīvās vielas uz ķermeņa masu dienā, kas atbilst	Gaļa: broileiem 5 dienas, tītariem 10 dienas. Indikācijas: Broileiem: hroniska elpceļu slimība un ar to saistītās komplikācijas. Tītari: grampozitīvu un gramnegatīvu mikroorganismu, pret doksiciklīnu jutīgu mikroorganismu izraisītas infekcijas, īpaši elpceļu un locītavu sindroms, ko izraisa mikoplazmas un/vai stafilokoki

								0,5 g preparāta/10 kg ķermeņa masas	
Slovākija	<i>DIVASA- FARMAVIC, S.A. CTRA. SANT HIPOLIT, KM. 71 08503 GURB – VIC SPĀNIJA</i>	<i>DOXIVET 10 % plv.sol. a.u.v.</i>	Doksiciklīna hiklāts	100 mg/ml	Ūdenī šķīstošs pulveris	Mājputni: (cāļi un tītari), liellopi un cūkas	4–5 dienas dzeramā ūdenī	0,5 ml preparāta/lit ru dzeramā ūdens	Gaļa: 5 dienas. Indikācijas: HES, mikoplazmozes, cūku zoonotiskās pneimonijas, bronhopneimonijas, hlamidiozes, nespecifisku caureju ārstēšana.
Slovākija	<i>Novartis Animal Health d.o.o. Verovskava 57 1000 Ljubljana SLOVĒNIJA</i>	<i>DOXYRIL 500 mg/g prášok na perorálny roztok ad us.vet.</i>	Doksiciklīna hiklāts	500 mg/g	Ūdenī šķīstošs pulveris	Cūkas, broileri	3–5 dienas pēc kārtas dzeramā ūdenī	Cūkas 20 mg doksiciklīna hiklāta/kg ķermeņa masas Broileriem: 25 mg doksiciklīna hiklāta/kg ķermeņa masas	Ēdami audi: broileriem 4 dienas. Indikācijas: Pret doksiciklīnu jutīgu mikroorganismu izraisītu infekciju ārstēšana, jo īpaši: Broileriem: <i>Mycoplasma</i> sugu (<i>M.gallisepticum</i> , <i>M.synoviae</i> un <i>M.meleagridis</i>), <i>Escherichia coli</i> , <i>Haemophilus paragallinarum</i> un <i>Ornithobacterium rhinotracheale</i> izraisītas elpceļu infekcijas, <i>Clostridium perfringens</i> un <i>Clostridium colinum</i> izraisīts enterīts, <i>Pasteurella multocida</i> izraisīta septicēmija

Slovākija	Lavet Pharmaceuticals Ltd., 1161 Budapest Ottó u. 14, Ungārija	DOXYVIT 40 % plv.sol.	Doksiciklīna hiklāts	40 g/100 g	Ūdenī šķīstošs pulveris	Mājputni: (cāji un tītari) un cūkas	3–5 dienas dzeramā ūdenī, mājputniem dzeramā ūdenī, cūkām: dzeramā ūdenī, ar barību	Cāļiem un tītariem: 10– 20 mg aktīvā doksiciklīna hiklāta/kg ķermeņa masas) dienā, nepārtraukta terapija: 1 g preparāta/3– 6 litriem dzeramā ūdens, atkārtotai terapijai: 25–50 mg preparāta/kg ķermeņa masas (10– 20 mg doksiciklīna hiklāta/kg ķermeņa masas) dzeramā ūdenī	Cāju un tītaru gaļa: 4 dienas. Indikācijas: pret doksiciklīnu jutīgu mikroorganismu izraisītu elpceļu, zarnu un sistēmisku infekciju ārstēšana un profilakse: cāļiem, tītariem: hroniska elpceļu slimība (<i>Mycoplasma gallisepticum</i> , <i>E.coli</i>), aerosakulīts (<i>M.meleagridis</i>), infekciozais sinovīts (<i>M.synoviae</i>), putnu holēra (<i>P. multocida</i>), tītaru bordeteloze (<i>Bordetella avium</i>), infekciozās iesnas (<i>Haemophilus paragallinarum</i>), kolibaciloze (<i>E.coli</i>), nekrotisks enterīts (<i>Clostridium prefringens</i>), hlamidioze (<i>CH. psittaci</i>)
-----------	--	--------------------------	-------------------------	------------	-------------------------------	---	--	---	--

Slovākija	<i>Tekro, spol. s.r.o., Višňová 2/484, 140 00 Praha 4, Čehijas Republika</i>	<i>Meditek DOX 100 plv.sol. ad us.vet.</i>	Doksiciklīna hiklāts	100 g/1000 g	Ūdenī šķīstošs pulveris	Broileri, cūkas	3–5 dienas kopā ar dzeramo ūdeni	Broileriem: 10 mg doksiciklīna hiklāta/kg ķermeņa masas (atbilst 1 kg preparāta/10 00 litriem dzeramā ūdens)	Broileru un cūku gaļa: 7 dienas. Indikācijas: pret doksiciklīnu jutīgu mikroorganismu izraisītu elpceļu, kuņģa-zarnu trakta slimību ārstēšana un profilakse: broileriem: HES, mikoplazmoze, aerosakulīts, sinovīts, pastereloze, infekciozā holēra, kolibaciloze, hlamidioze, nekrotiskais enterīts
Slovākija	<i>Pharmagal s.r.o., Murgašova 5, 949 01 Nitra, Slovākija</i>	<i>DOXYGAL plv.sol. ad us.vet.</i>	Doksiciklīna hiklāts	5 g/100 g	Ūdenī šķīstošs pulveris	Cūkas, mājputni, teļi, truši	Mājputni: profilaksei 5 dienas, ārstēšanai 3 dienas dzeramā ūdenī. Cūkām, teļiem, trušiem: 5 dienas dzeramā ūdenī, ar barību	Mājputni: Profilakse: 50 mg aktīvās vielas/1 l dzeramā ūdens (1 g preparāta/1 l ūdens), ārstēšana: 100 mg aktīvās vielas/1 l dzeramā ūdens (2 preparāta/1 l ūdens)	Mājputnu un trušu gaļa: 7 dienas. Indikācijas: Mājputni: HES (mikoplazmoze), kolibaciloze.

Slovākija	COOPHAVET Saint Herblon 44150 Ancenis FRANCIJA	RONAXAN 5 % plv.sol. ad us.vet.	Doksiciklīna hiklāts	5 g/100 g	Ūdenī šķīstošs pulveris	Cūkas, mājputni, teļi	Profilakse: 1–3 dienas, ārstēšana: 3–5 dienas dzeramā ūdenī, ar barību	10 mg aktīvās vielas/kg ķermeņa masas dienā (1 g preparāta/5 kg ķermeņa masas dienā) Mājputni: - līdz divu nedēļu vecumam: 1 g preparāta/lit ru dzeramā ūdens dienā, - pēc divu nedēļu vecuma: 2 g/litru ūdens dienā	Mājputnu gaļai 4 dienas. Indikācijas: Mājputni: elpceļu infekciju profilakse un ārstēšana.
Slovākija	Laboratorios Karizoo S.A Polígono Industrial La Borda Mas Pujades 11-12 08140 Caldes de Montbui Barcelona SPĀNIJA	KARIDOX 100 mg/ml roztok pre podávanie hydine a ošípaným perorálne v pitnej vode	Doksiciklīna hiklāts	100 mg/ml	Ūdenī šķīstošs pulveris	Cāļi (broileri), cūkas	Broileriem: 3–5 dienas, cūkām: 5 dienas kopā ar dzeramo ūdeni	Broileriem: 10–20 mg doksiciklīna/ kg ķermeņa masas dienā, (0,5– 1,0 ml preparāta/lit ru dzeramā ūdens)	Gaļa un subprodukti: cāļiem (broileriem) 7 dienas Indikācijas: Cāļi (broileri): pret doksiciklīnu jutīgu mikroorganismu izraisītas hroniskas elpceļu slimības (HES) un mikoplazmozes profilakse un ārstēšana.

Slovākija	CHEMO IBERICA, S.A. Gran Via Carlos III, 98 7 ^a Edificio Trade 08028 Barcelona SPĀNIJA	ORIDOX 100 mg/ml roztok pre podávanie hydine a ošípaným perorálne v pitnej vode	Doksiciklīna hiklāts	100 mg/ml	Ūdenī šķīstošs pulveris	Cāļi (broileri), cūkas	Broileriem: 3–5 dienas, cūkām: 5 dienas kopā ar dzeramo ūdeni	Broileriem: 10–20 mg doksiciklīna/ kg ķermeņa masas dienā, (0,5– 1,0 ml preparāta/lit ru dzeramā ūdens)	Gaļa un subprodukti: cāļiem (broileriem) 7 dienas. Indikācijas: Cāļi (broileri): pret doksiciklīnu jutīgu mikroorganismu izraisītas hroniskas elpceļu slimības (HES) un mikoplazmozes profilakse un ārstēšana.
Apvienotā Karaliste	Laboratorios Karizoo S.A Polígono Industrial La Borda Mas Pujades 11-12 08140 Caldes de Montbui Barcelona SPĀNIJA	Karidox 100mg/ml Oral Solution for use in drinking water for Chickens and Pigs	Doksiciklīna hiklāts	100 mg/ml doksiciklīna (doksiciklīna hiklāta formā)	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Cāļi (broileri) un cūkas	Iekšķīgi (ar dzeramo ūdeni)	10–20 mg doksiciklīna/ kg x 3–5 dienas	Gaļa un subprodukti: Cāļi (broileri): 7 dienas. Indikācijas: CĀĻI (BROILERI): pret doksiciklīnu jutīgu mikroorganismu izraisītas hroniskas elpceļu slimības (HES) un mikoplazmozes profilakse un ārstēšana.
Apvienotā Karaliste	CHEMO IBERICA, S.A. Gran Via Carlos III, 98 7 ^a Edificio Trade 08028 Barcelona SPĀNIJA	Soldoxin 100mg/ml Oral Solution for use in drinking water for chickens and pigs	Doksiciklīna hiklāts	100 mg/ml doksiciklīna (doksiciklīna hiklāta formā)	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Cāļi (broileri) un cūkas	Iekšķīgi (ar dzeramo ūdeni)	10–20 mg doksiciklīna/ kg x 3–5 dienas	Gaļa un subprodukti: Cāļi (broileri): 7 dienas. Indikācijas: CĀĻI (BROILERI): pret doksiciklīnu jutīgu mikroorganismu izraisītas hroniskas elpceļu slimības (HES) un mikoplazmozes profilakse un ārstēšana.

Apvienotā Karaliste	Huvepharma N.V. <i>Uitbreidingstraat 80</i> 2600 Antwerpen BEĻĢIJA	HydroDoxx 500 mg/g Water Soluble Powder	Doksiciklīna hīklāts	500 mg/g doksiciklīna hīklāta	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai	Cāļi (broileri) un cūkas (nobarojamas cūkas)	Iekšķīgi (ar dzeramo ūdeni)	20 mg doksiciklīna (hīklāta)/kg x 3–5 dienas	Gaļa un subprodukti: Cāļi: 6 dienas. Indikācijas: Cāļi (broileri): <i>Mycoplasma gallisepticum</i> izraisītas hroniskas elpceļu slimības (HES) profilakse un ārstēšana.
APVIENOTĀ KARALISTE	VMD NV, HOGE MAUW 900-2370 Arendonk BEĻĢIJA	Doxyveto 50 s plus	Doksiciklīna hīklāts	50 % doksiciklīna hīklāts	Pulveris iekšķīgai lietošanai	Olas nedējoši cāļi	Iekšķīgi (ar dzeramo ūdeni)	25 mg doksiciklīna (hīklāta)/kg x 3–5 dienas	Gaļa un subprodukti: 6 dienas Indikācijas: <i>Mycoplasma</i> suga, <i>E. coli</i> un <i>Haemophilus paragallinarum</i> izraisītas elpceļu infekcijas. <i>Clostridium perfringens</i> un <i>Clostridium colinum</i> izraisīts enterīts.

II PIELIKUMS

ZINĀTNISKIE SECINĀJUMI UN PAMATOJUMS ZĀĻU APRAKSTA GROZĪJUMU VEIKŠANAI

VISPĀRĒJS ZINĀTNISKĀ NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS DOKSICIKLĪNA HIKLĀTU SATUROŠIEM ŪDENĪ ŠĶĪSTOŠIEM PULVERIEM UN IEKŠĶĪGI LIETOJAMIEM ŠĶĪDUMIEM, KAS INDICĒTI LIETOŠANAI MĀJPUTNIEM (*skatīt I pielikumu*)

1. Ievads

Doksiciklīna hiklātu saturošus ūdenī šķīstošus pulverus un šķīdumus iekšķīgai lietošanai, kas indicēti lietošanai mājputniem ar dzeramo ūdeni, izmanto dažādu pret doksiciklīnu jutīgu baktēriju izraisītu elpceļu un kuņģa-zarnu trakta infekciju ārstēšanai.

Doksiciklīns ir tetraciklīna atvasinājums ar līdzīgu izmantojumu kā tetraciklīnam. Visiem tetraciklīniem ir plašs darbības spektrs, kas ietver grampozitīvas un gramnegatīvas baktērijas, hlamīdijas, riketsijas, mikoplazmas un spirohetas. Doksiciklīnam raksturīga izteiktāka aktivitāte pret dažām no šīm sugām nekā citiem tetraciklīniem. Tas ir galvenokārt bakteriostatisks antibakteriāls līdzeklis, un tā galvenais darbības mehānisms ir olbaltumu sintēzes nomākums.

Apvienotā Karaliste izteica bažas, ka dažādas devas, devu diapazoni, ārstēšanas ilgums un neizmantošanas periodi cilvēku uzturā, kas noteikti Eiropas Savienībā visiem doksiciklīnu saturošā ūdenī šķīstošā pulvera un iekšķīgi lietojamā šķīduma stiprumiem, kas indicēti lietošanai mājputniem ar dzeramo ūdeni, var izraisīt iespējami nopietnu risku gan dzīvnieku, gan cilvēku veselībai, un tādēļ tā lūdza CVMP sniegt atzinumu par šo jautājumu.

Procedūra ietvēra 179 veterinārās zāles, kas reģistrētas dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs vai kuru reģistrācijas process vēl notiek (skatīt I pielikumu).

2. Pieejamo datu apspriešana

No visiem pieteikuma iesniedzēju/reģistrācijas apliecības īpašnieku iesniegtajiem datiem tikai deviņpadsmit atbildes bija ar pilnīgiem dosjē, kas sagatavoti atbilstoši Direktīvas 2001/82/EK 12. panta 3. apakšpunktam. Deviņas atbildes ietvēra ģenēriskus dosjē, kas sagatavoti saskaņā ar Direktīvas 2001/82/EK 13. pantu. Četrām atbildēm rakstveidā iesniegtā informācija nesaturēja informāciju par CVMP uzdotajiem jautājumiem. Vienu atbildi saņēma pēc iesniegšanas termiņa beigām un tādēļ to nepieņēma, un CVMP veica tās novērtējumu, ņemot vērā preparātam specifiskos datus.

Pieejamie dati liecināja, ka minētās veterinārās zāles ir reģistrētas vai atrodas reģistrācijas procesā ar dažādām reģistrācijas procedūrām (savstarpējās atzīšanas vai nacionālām procedūrām) un, pamatojoties uz dažādu tiesību aktu bāzi (pilnīga, ģenēriska un informēta piekrišana).

Ņēma vērā, ka dažas iesniegtās informācijas daļas bija identiskas, bet tās iesniedza dažādi reģistrācijas apliecības īpašnieki.

Tikai iepriekš minētās deviņpadsmit atbildes, kas saturēja pilnīgus dosjē, kas sagatavoti atbilstoši Direktīvas 2001/82/EK 12. panta 3. apakšpunktam, uzskatīja par atbilstošas kvalitātes, lai atbildētu uz specifiskiem uzdotiem jautājumiem. Iesnietās datu paketes ietver bibliogrāfiskus datus, kas pieejami publiskā telpā, un ar īpašumtiesībām aizsargātus datus.

Lai atbalstītu minēto preparātu efektivitāti, pieteikuma iesniedzēji/reģistrācijas apliecības īpašnieki iesniedza kopumā 11 oriģinālus ar īpašumtiesībām aizsargātus pētījumus, tostarp trīs eksperimentālas infekcijas pētījumus un astoņus klīniskus reālos apstākļos veiktus pētījumus. Visi pētījumi, izņemot vienu, bija veikti broileriem. Šis viens pētījums bija veikts tītariem.

Pētījumos izmantoja dažādas preparāta zāļu formas, kas satur doksiciklīna hīklātu/hidrohlorīdu dažādās koncentrācijās; gandrīz visu zāļu formu sastāvā bija skābinātājs (parasti citronskābe).

Oriģinālo, ar īpašumtiesībām aizsargāto pētījumu dokumentācija bija ļoti dažāda un daudzos gadījumos neatbilda spēkā esošiem standartiem. Īpaši pietrūka informācijas par pētījuma apstākļiem (pētījuma centra medicīniskā vēsture, dzīves un barošanas apstākļi, gaismas/tumsas cikls), kā arī par ārstēšanas shēmu (zāles pieejamas pēc izvēles 24 stundas/pulsa terapija), vai arī šī informācija bija ļoti ierobežota.

Pamatojoties uz LLP atbilstošu devas noteikšanas pētījumu broileriem, kas mākslīgi inficēti ar *Mycoplasma gallisepticum*, var noteikt terapeitisko devu 20 mg/kg ķermeņa masas piecas dienas pēc kārtas. Tika iesniegti septiņi klīniski reālos apstākļos veikti pētījumi broileriem ar elpceļu slimību un apstiprinātu *M. gallisepticum* infekciju. Doksiciklīna hīklātu visos pētījumos, izņemot divus, lietoja mērķa devā 20 mg/kg ķermeņa masas dienā piecas dienas pēc kārtas. Viens no šiem pētījumiem kalpo par apstiprinošu šīs mērķa devas efektivitātes pierādījumu, ņemot vērā tādus objektīvus parametrus kā nozīmīgs tādu dzīvnieku procentuālā daudzuma samazinājums, kam ir patoloģiski bojājumi un slimībai atbilstošs kopējais bojājumu vērtējums, kā arī nozīmīga *M. gallisepticum* izdalīšanas samazināšanās pēc ārstēšanas. Ar ārstēšanu saistītas blakusparādības nekonstatēja. Citos pētījumos iegūti pierādījumi, kas atbalsta mērķa devu, tādēļ, ka tika izmantots subjektīvs primārais vērtētais rādītājs – klīniska uzlabošanās – un tādēļ ka šie pētījumi bija slikti dokumentēti. Terapeitisko devu 20 mg/kg ķermeņa masas piecas dienas pēc kārtas apstiprināja *M. gallisepticum* izraisītas elpceļu slimības ārstēšanai cāļiem, pamatojoties uz reālos apstākļos veiktu klīnisku pētījumu broileriem ar elpceļu slimību un apstiprinātu *M. gallisepticum* infekciju.

Attiecībā uz *Pasteurella multocida* infekciju tika iesniegti divi eksperimentāli pētījumi, kas veikti ar broileriem, t. i., viena publikācija (Semjen et al., 1998)¹ un viens oriģinālpētījums. Eksperimentālie apstākļi abos pētījumos bija līdzīgi. Abi pētījumi liecina, ka doksiciklīns dienas devā 10 mg/kg ķermeņa masas 4 (5) dienas pēc kārtas bija efektīvs inducētas akūtas putnu holēras ārstēšanā, par ko liecina nozīmīga mirstības un slimībai raksturīgu patoloģisku bojājumu, kā arī ierosinātāja celma izdalīšanas samazināšanās, salīdzinot ar inficētiem neārstētiem kontroles grupas dzīvniekiem. Pierādīts, ka doksiciklīns ir pārāks par hlortetraciklīnu, kas izmantots par pozitīvu kontroles līdzekli. Tomēr publikācijā nav sniegts pietiekami daudz informācijas, lai aprēķinātu reālo pētījuma dzīvnieku lietoto devu. Ar īpašumtiesībām aizsargātā pētījumā viens no galvenajiem inficētajiem neārstētajiem dzīvniekiem novērotajiem klīniskiem simptomiem bija caureja, kas nav raksturīga pasterelozes gadījumā. Pēc novērošanas perioda ārstētiem dzīvniekiem konstatēja vieglus klīniskus simptomus un dažos gadījumos – nāves iestāšanos. Neraugoties uz to, ka netika iesniegts neviens reālos apstākļos veikts klīnisks pētījums, lai apstiprinātu rezultātus, kas iegūti eksperimentālos apstākļos, doksiciklīna lietošana ar *P. multocida* saistītu elpceļu infekciju ārstēšanai ir pamatota, ņemot vērā šī patogēna labo jutību pret doksiciklīnu (MIK90 līdz 2 µg/ml).

Attiecībā uz *Escherichia coli* infekcijām tika iesniegtas trīs eksperimentālu modeļu pētījumu publikācijas (George et al., 1977²; Goren et al., 1988³, Velkers et al., 2005⁴) un viens klīniskās efektivitātes

¹ Semjen G., Magyar T., Laczay P.: Therapeutic efficacy of doxycycline against experimental *Pasteurella multocida* infection in broiler chickens. Act. Vet. Hung. 46 (1), 85.–93. lpp., 1998.

² George BA, Fagerberg DJ, Quarles CL, Fenton JM.: Comparison of therapeutic efficacy of doxycycline, chlortetracycline and lincomycin-spectinomycin on *E. coli* infection of young chickens. Poult Sci. 1977 Mar;56(2):452-8.

³ Goren E, de Jong WA, Doornenbal P, Laurence T.: Therapeutic efficacy of doxycycline hyclate in experimental *Escherichia coli* infection in broilers. Vet Q. 1988 Jan;10(1):48-52.

⁴ Velkers FC, te Loo AJ, Madin F, van Eck JH.: Isopathic and pluralist homeopathic treatment of commercial broilers with experimentally induced colibacillosis. Res Vet Sci. 2005 Feb;78(1):77-83.

pētījums. *Goren et al.* (1988)³ publicētais pētījums bija plānots kā devas titrēšanas pētījums, lietojot doksiciklīnu pa 25–1000 ppm dzeramajā ūdenī piecas dienas pēc kārtas. Varēja pierādīt tiešu sakarību starp devu un atbildes reakciju. Salīdzinot ar neārstētiem kontroles grupas dzīvniekiem, doksiciklīnam pierādīta efektivitāte mirstības un kolibacilozes patoloģisku bojājumu (perikardīta, aerosakulīta un perihepatīta) mazināšanā, kā arī cāļu klīniskās veiktspējas uzlabošanā, lietojot par 400 ppm lielākas devas (kas atbilst 96 mg/kg ķermeņa masas). Labākos rezultātus ieguva, lietojot lielāko pārbaudīto devu, t. i., 1000 ppm, kas atbilst 196 mg/kg ķermeņa masas, piecas dienas. Lietojot šo devu, vidējais doksiciklīna līmenis plazmā sasniedza 3,6 µg/ml (nosakot otrajā ārstēšanas dienā). Turpretim *George et al.* (1977)² pētījumā pierādīts, ka doksiciklīns, lietojot 50 ppm ar dzeramo ūdeni trīs dienas pēc kārtas, efektīvi mazina mirstību un raksturīgos patoloģiskos bojājumus, salīdzinot ar neārstētiem kontroles grupas dzīvniekiem, un pierādīts, ka tas ir pārāks par hlortetraciklīnu un linkomicīnu-spektinomicīnu, kas izmantoti kā pozitīvi kontroles līdzekļi. Tomēr *George et al.* (1977)² rakstā nav pietiekami daudz informācijas (ķermeņa masa un ūdens patēriņš), lai aprēķinātu, kādu reāli dienas devu saņēmuši pētāmie dzīvnieki.

Eksperimentālos apstākļos, pētot homeopātiskus līdzekļus kolibacilozes ārstēšanā broileriem, doksiciklīnu izmantoja kā kontroles līdzekli (*Velkers et al.*, 2005)⁴. Pierādīts, ka, lietojot dienas devu 250 mg/l dzeramā ūdens piecas dienas pēc kārtas, doksiciklīns efektīvi novērš mirstību, mazina *E. coli* izraisītu bojājumu rašanos un nomāc to augšanu. Tomēr publikācijā nebija iekļauta informācija, kas nepieciešama, lai noskaidrotu, kādu īsti dienas devu saņēmuši pētītie putni.

Šo kolibacilozi vērtējošo infekcijas pētījumu salīdzināšana bija problemātiska, jo būtiski atšķīrās eksperimenta apstākļi, piemēram, tika izmantoti dažādi infekciju izraisītie celmi un infekciozās devas, dažāds bija ārstēšanas sākšanas laiks un atšķirīgi bija izmantotie cāļi (vecums, ķermeņa masa un šķirne). Tādēļ viennozīmīgus secinājumus no šiem pētījumiem nevar izdarīt.

Tika iesniegts viens LKP atbilstošs atklāts reālu apstākļu pētījums ar kolibacilozi slimojošiem broileriem. Doksiciklīnu lietoja dienas mērķa devā 25 mg/kg ķermeņa masas trīs dienas. Efektivitāti novērtēja, ņemot vērā informāciju par mirstību, klīniskos novērojumus un mikrobioloģiskos datus. Rezultāti liecināja, ka doksiciklīns efektīvi uzlaboja cāļu klīnisko veiktspēju un pakāpeniski mazināja mirstību. Pētījumam konstatēti vairāki trūkumi (piemēram, kontroles grupas neesamība).

Attiecībā uz *Ornithobacterium rhinotracheale* infekcijām tika iesniegts viens LKP atbilstošs kontrolēts efektivitāti apstiprinošs pētījums cāļiem, kas eksperimentāli inficēti ar *O. rhinotracheale*. Pētījums notika divās fāzēs, sākotnējā fāzē noteica optimālu infekciozo devu, pēc tam tika veikta apstiprinošā fāze. Klīnisko simptomu pēc inficēšanās praktiski nebija, pat izmantojot lielāko infekciozo devu. Tomēr sākotnējās fāzes dati liecina, ka ar augstāko infekciozo devu inficētos cāļus ārstējot ar doksiciklīnu devā 20 mg/kg ķermeņa masas dienā četras dienas, konstatēta nozīmīga gaisa maisa bojājumu mazināšanās, salīdzinot ar neārstētiem kontroles grupas dzīvniekiem. Apstiprinošā fāzē neārstētiem kontroles grupas dzīvniekiem gan klīniskā, gan patoloģiskā atbildes reakcija pret mākslīgo *O. rhinotracheale* infekciju bija zema. Kā liecina *O. rhinotracheale* izdalīšanas dati, antibakteriālā efektivitāte nav apstiprināta. Acīmredzot netika veikti mēģinājumi noteikt reālo devu cāļiem. Šis bija vienīgais pētījums, kas iesniegts ierosinātās *O. rhinotracheale* indikācijas atbalstam. Pamatojoties uz iesniegtajiem datiem, nav iespējams apstiprināt terapeitisku devu *O. rhinotracheale* izraisītas elpceļu slimības ārstēšanai.

Par hlamidiozi iesniegtie dati nebija pārliecinoši un tādēļ nebija pietiekami informācijas, lai atbalstītu šo indikāciju ne cāļiem, ne citām mērķa sugām pašlaik reģistrētiem preparātiem, kas ietverti šajā pārskatīšanas procedūrā.

Tika iesniegti trīs pētījumi par doksiciklīna efektivitāti tītariem un zosīm. Tītariem doksiciklīnu lietoja elpceļu slimības un aerosakulīta, kā arī elpceļu slimības un locītavu sindroma (*Mycoplasma*, *Staphylococcus*) ārstēšanai. Zosis ārstēja ar doksiciklīnu respiratorā distresa dēļ (*mikoplazmoze*). Tā

kā visi trīs pētījumi bija slikti dokumentēti (piemēram, trūka nozīmīgas informācijas par diagnostiskām procedūrām, mikrobioloģiskām atradēm, klīniskiem novērojumiem u. c.), rezultātus nav iespējams pilnvērtīgi interpretēt.

Lai atbalstītu citas indikācijas (piemēram, *M. meleagridis*, *M. synoviae*, *Haemophilus paragallinarum*, *Clostridium perfringens*, *Clostridium colinum*, *Bordetella avium* u. c. mikroorganismu izraisītas infekcijas) cāļiem vai citām mērķa sugām, kurām šobrīd apstiprināti šajā procedūrā ietvertie preparāti, netika iesniegta nekāda informācija vai tā bija ļoti ierobežota.

Komiteja uzskatīja, ka doksiciklīna efektivitāte *M. gallisepticum* izraisītas hroniskas elpceļu slimības ārstēšanā klīniskā devas noteikšanas pētījumā un klīniskos pētījumos, kas veikti komerciālas lietošanas apstākļos cāļiem, lietojot 20 mg/kg devu piecas dienas pēc kārtas, ir pietiekami pierādīta. Attiecībā uz *P. multocida* infekcijām eksperimentāla modeļa pētījuma rezultāti liecina, ka izmantojama terapeitiskā deva 10 mg/kg ķermeņa masas četras vai piecas dienas, bet apstiprinoši klīniskie dati, kas būtu iegūti komerciālos apstākļos, netika iesniegti. Tomēr, tā kā pierādīts, ka *P. multocida* ir jutīga pret doksiciklīnu ar MIK90 līdz 2 µg/ml un to apliecina farmakokinētikas/farmakodinamikas analīze, *P. multocida* infekciju norādīšana kā indikācija cāļiem ir pamatota.

Attiecībā uz *E. coli* infekcijām mājputniem iesniegtie dati nebija pietiekami. Izmantojot divus iesniegtos eksperimentālos *E. coli* infekcijas pētījumus cāļiem, terapeitisku dozēšanas shēmu nebija iespējams noteikt. Tāpat nebija pārliecinoši iesniegtā reālos apstākļos veiktā klīniskā pētījuma rezultāti broileriem, kas slimo ar kolibacilozi un tiek ārstēti ar doksiciklīnu devā 25 mg/kg trīs dienas. Kā liecina farmakodinamikas dati, *E. coli* celmiem konstatēta ļoti dažāda jutība pret doksiciklīnu ar MIK90 vērtībām 2–32 µg/ml. Jaunākie rezistences dati, kas iegūti par *E. coli*, kas izolētas no cāļiem, ir saņemti no Vācijas un ir robežās no 19,3 līdz 37 % (Wallmann et al, 2007)⁵. Var izteikt apgalvojumu, ka doksiciklīnu var efektīvi lietot *E. coli* infekciju ārstēšanā broileriem, ja pirms ārstēšanas sākšanas tiek apstiprināta jutība pret doksiciklīnu.

Neskatoties uz iesniegto pētījumu trūkumiem un datu neesamību par dažām indikācijām un devām, pamatojoties uz plašo lietošanu un jaunas farmakovigilances informācijas neesamību saistībā ar efektivitāti, var secināt, ka pašreizējās devas un indikācijas doksiciklīnu saturošiem līdzekļiem var uzskatīt par drošām un efektīvām.

Reģistrācijas apliecības īpašnieku iesniegtie pētījumi par atliekvielu daudzuma mazināšanos liecināja, ka, kad vien iespējams, neizmantošanas periodu cilvēku uzturā noteikšanai izmantota Komitejas ieteiktā statistiskā pieeja.⁶ Dažos pētījumos doksiciklīna atliekvielu daudzuma mazināšanās kinētika netika pierādīta, jo atliekvielas audos noteica tikai vienā vai divos laika brīžos pēc zāļu lietošanas pārtraukšanas. Šajos gadījumos tika izmantota alternatīva pieeja⁶ vai pētījumu uzskatīja par apstiprinošu. Atliekvielu pētījumi bija veikti galvenokārt cāļiem. Divi atliekvielu pētījumi bija veikti tītariem. Cāļiem lietotā deva bija 10,36 mg/kg ķermeņa masas, 14,47 mg/kg ķermeņa masas un 25 mg/kg ķermeņa masas. Dienas devu aptuveni 20 mg doksiciklīna/kg ķermeņa masas lietoja astoņos pētījumos. Divos pētījumos norādīta gala produkta koncentrācija dzeramajā ūdenī, bet nav norādīts, kādu reāli devu dzīvnieki saņēmuši, nosakot mg uz kg ķermeņa masas. Visos pētījumos ārstēšanas ilgums bija piecas dienas pēc kārtas.

⁵ Wallmann, J.; Schroer, U.; Kaspar, H.: Quantitative resistance level (MIC) of bacterial pathogens (*Escherichia coli*, *Pasteurella multocida*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella sp.*, *Staphylococcus aureus*) isolated from chickens and turkeys: National Resistance Monitoring by the BVL 2004/2005 (2007) Berl. Munch. Tierarztl. Wochenschr.; 120; 452–463.

⁶ CVMP piezīme vadlīnijām: pieeja neizmantošanas periodu cilvēku uzturā saskaņošanai <http://www.ema.europa.eu/pdfs/vet/swp/003695en.pdf>.

Tā kā nekonstatēja nepieciešamību pārskatīt lietoto devu, līdz ar to ietverto preparātu neizmantošanas periods cilvēku uzturā nav jāpārskata.

3. Ieguvuma un riska novērtējums

Ņemot vērā visus pieteikuma iesniedzēju/reģistrācijas apliecības īpašnieku iesniegtos datus, iegūts pietiekami daudz dokumentētu pierādījumu, kas apliecina pieņemamu doksiciklīna hīklāta efektivitāti, lietojot broileriem ar *Mycoplasma gallisepticum* saistītu, pret doksiciklīnu jutīgu elpceļu infekciju ārstēšanā dienas devā 20 mg/kg ķermeņa masas piecas dienas pēc kārtas. Taču nebija dokumentētu pierādījumu par neefektivitāti ar *Mycoplasma gallisepticum* saistītas elpceļu infekcijas ārstēšanā, lietojot kādu citu no apstiprinātajām dozēšanas shēmām (10–25 mg/kg ķermeņa masas).

Doksiciklīna hīklāta lietošana visām ierosinātajām indikācijām cāļiem, kā arī doksiciklīna hīklāta lietošana citām mājputnu sugām tika uzskatīta par labi zināmu. Lai gan pieteikuma iesniedzēju/reģistrācijas apliecības īpašnieku iesniegtie dati nesniedza pietiekami dokumentētus pierādījumus, lai atbalstītu apstiprinātās devas visām citām indikācijām un sugām, tomēr nebija jaunas informācijas, kas liecinātu par jaunu risku neefektivitātes veidā, lietojot doksiciklīnu mājputniem. Iesniegtajos izskatīto preparātu periodiski atjaunojamos drošības ziņojumos informācija par neefektivitāti nevienai no ierosinātajām indikācijām nevienai mērķa sugai nav sniegta.

Attiecībā uz rezistenci, nesen visā Eiropā veikta antibakteriālās jutības pētījuma rezultāti pret antibiotikām zoonotiskām un fizioloģiskām zarnu baktērijām, kas publicēti 2009. gadā⁷, liecināja par izteiktu no cāļiem izdalītas *E. coli* rezistenci pret tetraciklīniem.

Tādēļ CVMP iesaka visu šajā procedūrā ietverto preparātu informācijā iekļaut stingras norādes saskaņā ar CVMP vadlīniju par antibakteriālo līdzekļu zāļu aprakstiem (EMA/CVMP/SAGAM/383441/2005)⁸ un informāciju par pareizu lietošanu.

⁷ De Jong et al.: A pan-European survey of antimicrobial susceptibility towards human-use antimicrobial drugs among zoonotic and commensal enteric bacteria isolated from healthy food producing animals. J. Antimicrob. Chemotherapy 63, 733–744, 2009.

⁸ CVMP pārskatītā vadlīnija par antibakteriālo līdzekļu zāļu aprakstiem (EMA/CVMP/SAGAM/383441/2005) - <http://www.ema.europa.eu/pdfs/vet/sagam/38344105enfin.pdf>.

PAMATOJUMS ZĀĻU APRAKSTA, MARĶĒJUMA TEKSTA UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS GROZĪJUMU VEIKŠANAI

Tā kā:

- *CVMP* uzskatīja, ka doksiciklīna hīklāta lietošana ir labi zināma. Nebija dokumentētu pierādījumu, kas liecinātu par jaunu risku saistībā ar doksiciklīna lietošanu mājputniem neefektivitātes veidā. Iesniegtajos periodiski atjaunojamās drošības ziņojumos nav ziņots ne par neefektivitātes, ne rezistences problēmu kādai no apstiprinātajām indikācijām kādai no apstiprinātajām sugām. Tādēļ, neraugoties uz faktu, ka dažām pašlaik apstiprinātām indikācijām un mērķa sugām trūkst dokumentētu pierādījumu, kopējais ieguvuma un riska vērtējums šajā procedūrā ietvertajiem preparātiem nemainās;
- *CVMP* uzskatīja, ka attiecībā uz rezistenci nesen visā Eiropā veikta pētījuma rezultāti par jutību pret antibiotikām zoonotiskām un fizioloģiskām zarnu baktērijām, kas publicēti 2009. gadā, liecināja par izteiktu no cāļiem izdalītas *E. coli* rezistenci pret tetraciklīniem. Tādēļ uzskatīja, ka šajā pārskatīšanas procedūrā ietverto preparātu aprakstos jāiekļauj standarta norādījums par apdomīgu lietošanu saskaņā ar *CVMP* vadlīniju par antibakteriālo līdzekļu zāļu aprakstiem un informācija par pareizu preparāta lietošanu;

CVMP ieteica veikt grozījumus lēmuma I pielikumā minēto preparātu reģistrācijas apliecībās un atbilstošos zāļu apraksta, marķējuma teksta un lietošanas instrukcijas apakšpunktos ūdenī šķīstošiem pulveriem un iekšķīgi lietojamiem šķīdumiem, kas satur doksiciklīna hīklātu un ir indicēti lietošanai mājputniem ar dzeramo ūdeni, iekļaujot vismaz to informāciju, kas norādīta III pielikumā.

III PIELIKUMS

GROZĪJUMI ZĀĻU APRAKSTĀ, MARĶĒJUMA TEKSTĀ UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJĀ

GROZĪJUMI, KAS JĀVEIC ATBILSTOŠOS ZĀĻU APRAKSTA APAKŠPUNKTOS

4.5. Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Ņemot vērā atšķirīgo baktēriju jutību pret doksiciklīnu (atkarībā no laika un ģeogrāfiskā novietojuma), stingri ieteicams ņemt paraugus bakterioloģiskai analīzei un mikroorganismu jutības noteikšanai no saimniecībā esošiem slimiem putniem.

Dokumentēta augsta no cāļiem izdalītu *E. coli* rezistence pret tetraciklīniem. Tādēļ preparātu *E. coli* izraisītu infekciju ārstēšanai drīkst lietot tikai pēc baktēriju jutības noteikšanas.

Tā kā mērķa patogēnu izskaušana var nenotikt, zāles jālieto apvienojumā ar labas ārstēšanas prakses principiem, piemēram, ievērojot higiēnas noteikumus, kārtīgi veicot ventilāciju, neturot pārāk daudz dzīvnieku vienkopus.

4.9. Devas un lietošanas veids

Lietojams kopā ar dzeramo ūdeni.

<apstiprinātā deva> mg doksiciklīna hīklāta/kg ķermeņa masas dienā, kas atbilst mg <preparāta nosaukums> uz kg ķermeņa masas ...<apstiprinātais ārstēšanas ilgums> dienas pēc kārtas.

Ņemot vērā ieteicamo devu un ārstējamo putnu skaitu un svaru, precīzs dienā lietojamais <preparāta nosaukums> daudzums jāaprēķina pēc šādas formulas:

$$\frac{\text{.....mg [preparāta nosaukums]/kg ķermeņa masas dienā} \times \text{Ārstējamo putnu vidējā ķermeņa masa (kg)}}{\text{Vidējais ūdens patēriņš dienā (l) vienam putnam}} = \frac{\text{.... mg [preparāta nosaukums] uz l}}{\text{dzeramā ūdens}}$$

Lai nodrošinātu pareizu devu, ķermeņa masa jānosaka pēc iespējas precīzāk.

Ūdens, kuram pievienotas zāles, dzeršana ir atkarīga no putnu klīniskā stāvokļa. Lai putni uzņemto nepieciešamo devu, zāļu koncentrācija dzeramajā ūdenī var būt jāpielāgo.

Ja izmanto pusi iepakojuma, ieteicams izmantot atbilstoši kalibrētus svarus. Dienā lietojamais daudzums jāpievieno dzeramajam ūdenim, lai viss zāļu daudzums tiktu uzņemts 24 stundu laikā. Ik pēc 24 stundām jāgatavo svaigs ūdens ar zālēm. Ieteicams sagatavot koncentrētu priekššķīdumu – aptuveni 100 grami preparāta uz litru dzeramā ūdens – un to pēc tam atšķaidīt līdz terapeitiskai koncentrācijai, ja nepieciešams. Koncentrēto šķīdumu var lietot arī ar proporcionālu ūdens dozatoru.

GROZĪJUMI, KAS VEICAMI ATBILSTOŠOS MARĶĒJUMA TEKSTA APAKŠPUNKTOS

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

GROZĪJUMI, KAS VEICAMI ATBILSTOŠOS LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS APAKŠPUNKTOS

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Jāievēro šādi ieteikumi par devām:

<apstiprinātā deva> mg doksiciklīna hīklāta/kg ķermeņa masas dienā, kas atbilst mg <preparāta nosaukums> uz kg ķermeņa masas ...<apstiprinātais ārstēšanas ilgums> dienas pēc kārtas.

Ņemot vērā ieteicamo devu un ārstējamo putnu skaitu un svaru, precīzs dienā lietojamais <preparāta nosaukums> daudzums jāaprēķina pēc šādas formulas:

$$\frac{\text{.....mg [preparāta nosaukums]/kg ķermeņa masas dienā} \times \text{Ārstējamo putnu vidējā ķermeņa masa (kg)}}{\text{Vidējais ūdens patēriņš dienā (l) vienam putnam}} = \frac{\text{.... mg [preparāta nosaukums] uz l}}{\text{dzeramā ūdens}}$$

Lai nodrošinātu pareizu devu, ķermeņa masa jānosaka pēc iespējas precīzāk.

Ūdens, kuram pievienotas zāles, dzeršana ir atkarīga no putnu klīniskā stāvokļa. Lai putni uzņemto nepieciešamo devu, zāļu koncentrācija dzeramajā ūdenī var būt jāpielāgo.

Ja izmanto pusi iepakojuma, ieteicams izmantot atbilstoši kalibrētus svarus. Dienā lietojamais daudzums jāpievieno dzeramajam ūdenim, lai viss zāļu daudzums tiktu uzņemts 24 stundu laikā. Ik pēc 24 stundām jāgatavo svaigs ūdens ar zālēm. Ieteicams sagatavot koncentrētu priekššķīdumu – aptuveni 100 gramu preparāta uz litru dzeramā ūdens – un to pēc tam atšķaidīt līdz terapeitiskai koncentrācijai, ja nepieciešams. Koncentrēto šķīdumu var lietot arī ar proporcionālu ūdens dozatoru.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Ņemot vērā atšķirīgo baktēriju jutību pret doksiciklīnu (atkarībā no laika un ģeogrāfiskā novietojuma), stingri ieteicams ņemt paraugus bakterioloģiskai analīzei un mikroorganismu jutības noteikšanai no saimniecībā esošiem slimiem putniem.

Dokumentēta augsta no cāļiem izdalītu *E. coli* rezistence pret tetraciklīniem. Tādēļ preparātu *E. coli* izraisītu infekciju ārstēšanai drīkst lietot tikai pēc baktēriju jutības noteikšanas.

Tā kā mērķa patogēnu izskaušana var nenotikt, zāles jālieto apvienojumā ar labas ārstēšanas prakses principiem, piemēram, ievērojot higiēnas noteikumus, kārtīgi veicot ventilāciju, neturot pārāk daudz dzīvnieku vienkopus.