

I. PIELIKUMS

**Zāļu nosaukumi, zāļu formas, stiprumi, lietošanas veidi, reģistrācijas
apliecību īpašnieki dalībvalstīs**

Dalībvalsts (EEA)	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Strength	Zāļu forma	Lietošanas veids
Dānija	Omrix Biopharmaceuticals S.A., Chaussee de Waterloo 200, B-1640 Rhode-St-Genese Beļģija	Quixil	Human Fibronectin: 30 mg Human Fibrinogen: 30 mg Arginine Hydrochloride: 19 mg Tranexamic Acid: 95 mg Glycine: 7.9 mg Sodium Chloride: 7 mg	Šķīdumi sīlanta pagatavošanai	Lietošanai bojājumā
Francija	OMRIX Biopharmaceuticals S.A. Chaussée de Waterloo 200 1640 Rhode-St-Genèse Beļģija	QUIXIL šķīdumi audu līmes pagatavošanai	Component 1: (BAC) Fibrinogen-Fibronectin: 40 mg/ml–60 mg/ml Tranexamic Acid: 85 mg/ml–105 mg/ml Component 2: Thrombin Thrombin: 800 IU/ml–1200 IU/ml Calcium Chloride: 5.6 mg/ml–6.2 mg/ml	Šķīdumi sīlanta pagatavošanai	Lietošanai ap audu bojājuma vietu
Itālija	OMRIX Biopharmaceuticals S.A. Chaussée de Waterloo 200 1640 Rhode-St-Genèse Beļģija	QUIXIL	Fibrinogen and Fibronectin: 40 mg/ml–60 mg/ml Tranexamic Acid: 85 mg/ml–105 mg/ml Thrombin: 800 IU/ml–1200 IU/ml Calcium Chloride: 5.6 mg/ml–6.2 mg/ml	Šķīdumi sīlanta pagatavošanai	Lietošanai ap audu bojājuma vietu
Lielbritānija	Omrix Biopharmaceuticals S.A., Chaussee de Waterloo 200, B-1640 Rhode-St-Genese Beļģija	Quixil	Clottable protein: 50 mg/ml Thrombin: 1000 IU/ml Calcium Chloride: 5.9 mg/ml Tranexamic Acid: 95 mg/ml	Šķīdumi sīlanta pagatavošanai	Lietošanai ap audu bojājuma vietu