

I. PIELIKUMS

**ZĀĻU NOSAUKUMI, ZĀĻU FORMAS, STIPRUMI,
LIETOŠANAS VEIDS, PIETEIKUMA IESNIEDZĒJI UN REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBU
ĪPAŠNIEKI DALĪBVALSTĪS**

<u>Dalībvalsts</u> <u>EU/EEA</u>	<u>Reģistrācijas</u> <u>apliecības īpašnieks</u>	<u>Piešķirtais</u> <u>nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Austrija	Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Floridsdorfer Hauptstraße 1 A - 1210 Wien Austria	Sortis 10 mg - Filmdabletēm	10mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Austrija	Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Floridsdorfer Hauptstraße 1 A - 1210 Wien Austria	Sortis 20 mg - Filmdabletēm	20mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Austrija	Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Floridsdorfer Hauptstraße 1 A - 1210 Wien Austria	Sortis 40 mg - Filmdabletēm	40mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Austrija	Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Floridsdorfer Hauptstraße 1 A - 1210 Wien Austria	Sortis 80 mg - Filmdabletēm	80mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Beļģija	Pfizer SA Boulevard de la Plaine 17 B-1050 Brussels, Belgium	Lipitor	10mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Beļģija	Pfizer SA Boulevard de la Plaine 17 B-1050 Brussels, Belgium	Lipitor	20mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u> <u>EU/EEA</u>	<u>Reģistrācijas</u> <u>apliecības īpašnieks</u>	<u>Piešķirtais</u> <u>nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Beļģija	Pfizer SA Boulevard de la Plaine 17 B-1050 Brussels, Belgium	Lipitor	40mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Beļģija	Pfizer SA Boulevard de la Plaine 17 B-1050 Brussels, Belgium	Lipitor	80mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Bulgārija	Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	Sortis	10mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Bulgārija	Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	Sortis	20mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Bulgārija	Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	Sortis	40mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u> <u>EU/EEA</u>	<u>Reģistrācijas</u> <u>apliecības īpašnieks</u>	<u>Piešķirtais</u> <u>nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Bulgārija	Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	Sortis	80mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Kipra	Pfizer Hellas A. E. 243, Messoghion Ave., 154 51 Neo Psychiko, Athens, Greece	Lipitor	10mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Kipra	Pfizer Hellas A. E. 243, Messoghion Ave., 154 51 Neo Psychiko, Athens, Greece	Lipitor	20mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Kipra	Pfizer Hellas A. E. 243, Messoghion Ave., 154 51 Neo Psychiko, Athens, Greece	Lipitor	40mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Čehijas Republika	Pfizer, spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Prague 5, Czech Republic	Sortis	10mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Čehijas Republika	Pfizer, spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Prague 5, Czech Republic	Sortis	20mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Čehijas Republika	Pfizer, spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Prague 5, Czech Republic	Sortis	40mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u> <u>EU/EEA</u>	<u>Reģistrācijas</u> <u>apliecības īpašnieks</u>	<u>Piešķirtais</u> <u>nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Čehijas Republika	Pfizer, spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Prague 5, Czech Republic	Sortis	80mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Dānija	Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup, Denmark	Zarator	10mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Dānija	Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup, Denmark	Zarator	20mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Dānija	Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup, Denmark	Zarator	40mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Dānija	Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup, Denmark	Zarator	80mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Igaunija	Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	Sortis	10mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Igaunija	Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	Sortis	20mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u> <u>EU/EEA</u>	<u>Reģistrācijas</u> <u>apliecības īpašnieks</u>	<u>Piešķirtais</u> <u>nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Igaunija	Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	Sortis	40mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Igaunija	Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	Sortis 80 mg	80mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Somija	Pfizer Oy, Tietokuja 4, 00330 Helsinki, Finland	Lipitor	10mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Somija	Pfizer Oy, Tietokuja 4, 00330 Helsinki, Finland	Lipitor	20mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Somija	Pfizer Oy, Tietokuja 4, 00330 Helsinki, Finland	Lipitor	40mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Somija	Pfizer Oy, Tietokuja 4, 00330 Helsinki, Finland	Lipitor	80mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Somija	Pfizer Oy, Tietokuja 4, 00330 Helsinki, Finland	Orbeos	10mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Somija	Pfizer Oy, Tietokuja 4, 00330 Helsinki, Finland	Orbeos	20mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Somija	Pfizer Oy, Tietokuja 4, 00330 Helsinki, Finland	Orbeos	40mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u> <u>EU/EEA</u>	<u>Reģistrācijas</u> <u>apliecības īpašnieks</u>	<u>Piešķirtais</u> <u>nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Somija	Pfizer Oy, Tietokuja 4, 00330 Helsinki, Finland	Orbeos	80mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Francija	Pfizer Holding France 23-25 Avenue du Docteur Lannelongue 75668 Paris Cedex 14 France	Tahor	10mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Francija	Pfizer Holding France 23-25 Avenue du Docteur Lannelongue 75668 Paris Cedex 14 France	Tahor	20mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Francija	Pfizer Holding France 23-25 Avenue du Docteur Lannelongue 75668 Paris Cedex 14 France	Tahor	40mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Francija	Pfizer Holding France 23-25 Avenue du Docteur Lannelongue 75668 Paris Cedex 14 France	Tahor	80mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Pfizer Pharma GmbH, Linkstraße 10 10785 Berlin, Germany	Sortis 10 mg	10mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Pfizer Pharma GmbH, Linkstraße 10 10785 Berlin, Germany	Sortis 20 mg	20mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Pfizer Pharma GmbH, Linkstraße 10 10785 Berlin, Germany	Sortis 40 mg	40mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u> <u>EU/EEA</u>	<u>Reģistrācijas</u> <u>apliecības īpašnieks</u>	<u>Piešķirtais</u> <u>nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Vācija	Pfizer Pharma GmbH, Linkstraße 10 10785 Berlin, Germany	Sortis 80 mg	80mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Pfizer Pharma GmbH, Linkstraße 10 10785 Berlin, Germany	Lipimar 10 mg	10mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Pfizer Pharma GmbH, Linkstraße 10 10785 Berlin, Germany	Lipimar 20 mg	20mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Pfizer Pharma GmbH, Linkstraße 10 10785 Berlin, Germany	Lipimar 40 mg	40mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Pfizer Pharma GmbH, Linkstraße 10 10785 Berlin, Germany	Lipimar 80 mg	80mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Parke-Davis GmbH, Linkstraße 10 10785 Berlin, Germany	Atorvastatin 10 mg PD	10mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Parke-Davis GmbH, Linkstraße 10 10785 Berlin, Germany	Atorvastatin 20 mg PD	20mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Parke-Davis GmbH, Linkstraße 10 10785 Berlin, Germany	Atorvastatin 40 mg PD	40mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Pfizer Pharma GmbH, Linkstraße 10 10785 Berlin, Germany	Atorvastatin 80 mg PD	80mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Grieķija	Pfizer Hellas A. E. 243, Messoghion Ave., 154 51 Neo Psychiko, Athens, Greece	Lipitor	10mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u> <u>EU/EEA</u>	<u>Reģistrācijas</u> <u>apliecības īpašnieks</u>	<u>Piešķirtais</u> <u>nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Grieķija	Pfizer Hellas A. E. 243, Messoghion Ave., 154 51 Neo Psychiko, Athens, Greece	Lipitor	20mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Grieķija	Pfizer Hellas A. E. 243, Messoghion Ave., 154 51 Neo Psychiko, Athens, Greece	Lipitor	40mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Grieķija	Pfizer Hellas A. E. 243, Messoghion Ave., 154 51 Neo Psychiko, Athens, Greece	Lipitor	80mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Grieķija	WIN MEDICA Ltd 41 Papadiamantopoulou Street 115 28 Ilisia Athens, Greece	Zarator	10mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Grieķija	WIN MEDICA Ltd 41 Papadiamantopoulou Street 115 28 Ilisia Athens, Greece	Zarator	20mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Grieķija	WIN MEDICA Ltd 41 Papadiamantopoulou Street 115 28 Ilisia Athens, Greece	Zarator	40mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u> <u>EU/EEA</u>	<u>Reģistrācijas</u> <u>apliecības īpašnieks</u>	<u>Piešķirtais</u> <u>nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Grieķija	Pfizer Hellas A. E. 243, Messoghion Ave., 154 51 Neo Psychiko, Athens, Greece	Edovin	10mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Grieķija	Pfizer Hellas A. E. 243, Messoghion Ave., 154 51 Neo Psychiko, Athens, Greece	Edovin	20mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Grieķija	Pfizer Hellas A. E. 243, Messoghion Ave., 154 51 Neo Psychiko, Athens, Greece	Edovin	40mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Ungārija	Pfizer KFT, 1123 Budapest, Alkotás u. 53. MOM Park "F" Ép., Hungary	Sortis	10mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Ungārija	Pfizer KFT, 1123 Budapest, Alkotás u. 53. MOM Park "F" Ép., Hungary	Sortis	20mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Ungārija	Pfizer KFT, 1123 Budapest, Alkotás u. 53. MOM Park "F" Ép., Hungary	Sortis	40mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u> <u>EU/EEA</u>	<u>Reģistrācijas</u> <u>apliecības īpašnieks</u>	<u>Piešķirtais</u> <u>nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Ungārija	Pfizer KFT, 1123 Budapest, Alkotás u. 53. MOM Park "F" Ép., Hungary	Sortis	80mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Ungārija	Pfizer KFT, 1123 Budapest, Alkotás u. 53. MOM Park "F" Ép., Hungary	Obradon	10mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Ungārija	Pfizer KFT, 1123 Budapest, Alkotás u. 53. MOM Park "F" Ép., Hungary	Obradon	20mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Ungārija	Pfizer KFT, 1123 Budapest, Alkotás u. 53. MOM Park "F" Ép., Hungary	Obradon	40mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Ungārija	Pfizer KFT, 1123 Budapest, Alkotás u. 53. MOM Park "F" Ép., Hungary	Obradon	80mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Islande	Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 BallerupDenmark	Zarator	10mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Islande	Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup, Denmark	Zarator	20mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u> <u>EU/EEA</u>	<u>Reģistrācijas</u> <u>apliecības īpašnieks</u>	<u>Piešķirtais</u> <u>nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Islande	Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup, Denmark	Zarator	40mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Islande	Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup, Denmark	Zarator	80mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Īrija	Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Pottery Road, Dun Laoghaire, Co Dublin Ireland	Lipitor	10mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Īrija	Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Pottery Road, Dun Laoghaire, Co Dublin Ireland	Lipitor	20mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Īrija	Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Pottery Road, Dun Laoghaire, Co Dublin Ireland	Lipitor	40mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Īrija	Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Pottery Road, Dun Laoghaire, Co Dublin Ireland	Lipitor	80mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100 Latina - Italy	Xarator	10mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100 Latina - Italy	Xarator	20mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u> <u>EU/EEA</u>	<u>Reģistrācijas</u> <u>apliecības īpašnieks</u>	<u>Piešķirtais</u> <u>nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Itālija	Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100 Latina - Italy	Xarator	40mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100 Latina - Italy	Xarator	80mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	Bioindustria Farmaceutici S.r.l Via Isonzo, 71 04100 Latina - Italy	Lipitor	10mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	Bioindustria Farmaceutici S.r.l. Via Isonzo, 71 04100 Latina - Italy	Lipitor	20mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	Bioindustria Farmaceutici S.r.l. Via Isonzo, 71 04100 Latina - Italy	Lipitor	40mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	Bioindustria Farmaceutici S.r.l. Via Isonzo, 71 04100 Latina - Italy	Lipitor	80mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100 Latina - Italy	Torvast	10mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100 Latina - Italy	Torvast	20mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100 Latina - Italy	Torvast	40mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u> <u>EU/EEA</u>	<u>Reģistrācijas</u> <u>apliecības īpašnieks</u>	<u>Piešķirtais</u> <u>nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Itālija	Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100 Latina - Italy	Torvast	80mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	Laboratori Guidotti S.p.A. Via Livornese, 897 - La Vettola 56010 Pisa - Italy	Totalip	10mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	Laboratori Guidotti S.p.A. Via Livornese, 897 - La Vettola 56010 Pisa - Italy	Totalip	20mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	Laboratori Guidotti S.p.A. Via Livornese, 897 - La Vettola 56010 Pisa - Italy	Totalip	40mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	Laboratori Guidotti S.p.A. Via Livornese, 897 - La Vettola 56010 Pisa - Italy	Totalip	80mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Latvija	Pfizer Limited, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, United Kingdom	Sortis	10mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Latvija	Pfizer Limited, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, United Kingdom	Sortis	20mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u> <u>EU/EEA</u>	<u>Reģistrācijas</u> <u>apliecības īpašnieks</u>	<u>Piešķirtais</u> <u>nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Latvija	Pfizer Limited, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, United Kingdom	Sortis	40mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Latvija	Pfizer Limited, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT 13 9NJ, United Kingdom	Sortis	80mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Lietuva	Pfizer Limited, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	Sortis	10mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Lietuva	Pfizer Limited, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	Sortis	20mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Lietuva	Pfizer Limited, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	Sortis	40mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Lietuva	Pfizer Limited, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	Sortis	80mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Luksemburga	Pfizer SA Boulevard de la Plaine 17 B-1050 Brussels, Belgium	Lipitor	10mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u> <u>EU/EEA</u>	<u>Reģistrācijas</u> <u>apliecības īpašnieks</u>	<u>Piešķirtais</u> <u>nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Luksemburga	Pfizer SA Boulevard de la Plaine 17 B-1050 Brussels, Belgium	Lipitor	20mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Luksemburga	Pfizer SA Boulevard de la Plaine 17 B-1050 Brussels, Belgium	Lipitor	40mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Luksemburga	Pfizer SA Boulevard de la Plaine 17 B-1050 Brussels, Belgium	Lipitor	80mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Malta	Pfizer Hellas S.A. 243, Messoghion Ave., 154 51 Neo Psychiko, Athens, Greece	Lipitor	10mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Malta	Pfizer Hellas S.A. 243, Messoghion Ave., 154 51 Neo Psychiko, Athens, Greece	Lipitor	20mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Malta	Pfizer Hellas S.A. 243, Messoghion Ave., 154 51 Neo Psychiko, Athens, Greece	Lipitor	40mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u> <u>EU/EEA</u>	<u>Reģistrācijas</u> <u>apliecības īpašnieks</u>	<u>Piešķirtais</u> <u>nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Malta	Pfizer Hellas S.A. 243, Messoghion Ave., 154 51 Neo Psychiko, Athens, Greece	Lipitor	80mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Nīderlande	Pfizer bv Rivium Westlaan 142 2909 LD Capelle a/d IJssel The Netherlands	Lipitor	10mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Nīderlande	Pfizer bv Rivium Westlaan 142 2909 LD Capelle a/d IJssel The Netherlands	Lipitor	20mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Nīderlande	Pfizer bv Rivium Westlaan 142 2909 LD Capelle a/d IJssel The Netherlands	Lipitor	40mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Nīderlande	Pfizer bv Rivium Westlaan 142 2909 LD Capelle a/d IJssel The Netherlands	Lipitor	80mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Norvēģija	Pfizer AS Pb. 3 1324 Lysaker Norway	Lipitor	10mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Norvēģija	Pfizer AS Pb. 3 1324 Lysaker Norway	Lipitor	20mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u> <u>EU/EEA</u>	<u>Reģistrācijas</u> <u>apliecības īpašnieks</u>	<u>Piešķirtais</u> <u>nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Norvēģija	Pfizer AS Pb. 3 1324 Lysaker Norway	Lipitor	40mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Norvēģija	Pfizer AS Pb. 3 1324 Lysaker Norway	Lipitor	80mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Polija	Parke-Davis GmbH, Pfizerstrasse 1, 76 139 Karlsruhe, Germany	Sortis 10	10mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Polija	Parke-Davis GmbH, Pfizerstrasse 1, 76 139 Karlsruhe, Germany	Sortis 20	20mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Polija	Parke-Davis GmbH, Pfizerstrasse 1, 76 139 Karlsruhe, Germany	Sortis 40	40mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Polija	Pfizer Polska Sp.z o.o. ul. Rzymowskiego 28 02-697 Warszawa Poland	Sortis 80	80 mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Portugāle	Laboratorios Pfizer, Lda., Lagoas Park, Edificio 10, 2740-271 Porto Salvo, Portugal	Zarator	10mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Portugāle	Laboratorios Pfizer, Lda., Lagoas Park, Edificio 10, 2740-271 Porto Salvo, Portugal	Zarator	20mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u> <u>EU/EEA</u>	<u>Reģistrācijas</u> <u>apliecības īpašnieks</u>	<u>Piešķirtais</u> <u>nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Portugāle	Laboratorios Pfizer, Lda., Lagoas Park, Edificio 10, 2740-271 Porto Salvo, Portugal	Zarator	40mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Portugāle	Laboratorios Pfizer, Lda., Lagoas Park, Edificio 10, 2740-271 Porto Salvo, Portugal	Zarator	80 mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Portugāle	Parke-Davis - Produtos Farmaceuticos, Lda., Lagoas Park, Edificio 10, 2740-271 Porto Salvo, Portugal	Atorvastatina Parke- Davis	10mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Portugāle	Parke-Davis - Produtos Farmaceuticos, Lda., Lagoas Park, Edificio 10, 2740-271 Porto Salvo, Portugal	Atorvastatina Parke- Davis	20mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Portugāle	Parke-Davis - Produtos Farmaceuticos, Lda., Lagoas Park, Edificio 10, 2740-271 Porto Salvo, Portugal	Atorvastatina Parke- Davis	40mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Portugāle	Parke-Davis - Produtos Farmaceuticos, Lda., Lagoas Park, Edificio 10, 2740-271 Porto Salvo, Portugal	Atorvastatina Parke- Davis	80 mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u> <u>EU/EEA</u>	<u>Reģistrācijas</u> <u>apliecības īpašnieks</u>	<u>Piešķirtais</u> <u>nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Portugāle	Farmogene - Produtos Farmacêuticos, Lda, Lagoas Park, Edifício 10, 2740-271 Porto Salvo, Portugal	Texzor	10mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Portugāle	Farmogene - Produtos Farmacêuticos, Lda, Lagoas Park, Edifício 10, 2740-271 Porto Salvo, Portugal	Texzor	20mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Portugāle	Farmogene - Produtos Farmacêuticos, Lda, Lagoas Park, Edifício 10, 2740-271 Porto Salvo, Portugal	Texzor	40mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Portugāle	Farmogene - Produtos Farmacêuticos, Lda., Lagoas Park, Edifício 10, 2740-271 Porto Salvo, Portugal	Texzor	80 mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Rumānija	Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	Sortis	10mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Rumānija	Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	Sortis	20mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u> <u>EU/EEA</u>	<u>Reģistrācijas</u> <u>apliecības īpašnieks</u>	<u>Piešķirtais</u> <u>nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Rumānija	Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	Sortis	40mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Rumānija	Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	Sortis	80 mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Slovākijas Republika	Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	Sortis	10mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Slovākijas Republika	Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	Sortis	20mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Slovākijas Republika	Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	Sortis	40mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u> <u>EU/EEA</u>	<u>Reģistrācijas</u> <u>apliecības īpašnieks</u>	<u>Piešķirtais</u> <u>nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Slovākijas Republika	Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	Sortis	80 mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Slovēnija	Pfizer Luxembourg SARL, 51, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg	Sortis 10 mg filmsko obložene tablete	10mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Slovēnija	Pfizer Luxembourg SARL, 51, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg	Sortis 20 mg filmsko obložene tablete	20mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Slovēnija	Pfizer Luxembourg SARL, 51, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg	Sortis 40 mg filmsko obložene tablete	40mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Slovēnija	Pfizer Luxembourg SARL, 51, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg	Sortis 80 mg filmsko obložene tablete	80 mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Spānija	Parke Davis. S.L. Avda. de Europa 20B Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, (Madrid) Spain	Zarator	10mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u> <u>EU/EEA</u>	<u>Reģistrācijas</u> <u>apliecības īpašnieks</u>	<u>Piešķirtais</u> <u>nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Spānija	Parke Davis. S.L. Avda. de Europa 20B Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, (Madrid) Spain	Zarator	20mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Spānija	Parke Davis. S.L. Avda. de Europa 20B Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, (Madrid) Spain	Zarator	40mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Spānija	Parke Davis. S.L. Avda. de Europa 20B Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, (Madrid) Spain	Zarator	80 mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Spānija	Pfizer, S.A. Avda. de Europa 20B Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, (Madrid) Spain	Cardyl	10mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u> <u>EU/EEA</u>	<u>Reģistrācijas</u> <u>apliecības īpašnieks</u>	<u>Piešķirtais</u> <u>nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Spānija	Pfizer, S.A. Avda. de Europa 20B Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, (Madrid) Spain	Cardyl	20mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Spānija	Pfizer, S.A. Avda. de Europa 20B Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, (Madrid) Spain	Cardyl	40mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Spānija	Pfizer, S.A. Avda. de Europa 20B Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, (Madrid) Spain	Cardyl	80 mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Spānija	Nostrum Farma, S.A., Avda. de Europa 20B Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, (Madrid) Spain	Atorvastatina Nostrum	10mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u> <u>EU/EEA</u>	<u>Reģistrācijas</u> <u>apliecības īpašnieks</u>	<u>Piešķirtais</u> <u>nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Spānija	Nostrum Farma, S.A., Avda. de Europa 20B Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, (Madrid) Spain	Atorvastatina Nostrum	20mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Spānija	Nostrum Farma, S.A., Avda. de Europa 20B Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, (Madrid) Spain	Atorvastatina Nostrum	40mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Spānija	Nostrum Farma, S.A., Avda. de Europa 20B Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, (Madrid) Spain	Atorvastatina Nostrum	80 mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Spānija	PHARMACIA GRUPO PFIZER, S.L. Avda. de Europa 20B Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, (Madrid) Spain	Atorvastatina Pharmacia	10mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u> <u>EU/EEA</u>	<u>Reģistrācijas</u> <u>apliecības īpašnieks</u>	<u>Piešķirtais</u> <u>nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Spānija	PHARMACIA GRUPO PFIZER, S.L. .Avda. de Europa 20B Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, (Madrid) Spain	Atorvastatina Pharmacia	20mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Spānija	PHARMACIA GRUPO PFIZER, S.L. Avda. de Europa 20B Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, (Madrid) Spain	Atorvastatina Pharmacia	40mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Spānija	PHARMACIA GRUPO PFIZER, S.L. Avda. de Europa 20B Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, (Madrid) Spain	Atorvastatina Pharmacia	80 mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Spānija	Almirall S.A. General Mitre, 151 08022 - Barcelona Spain	Prevencor	10mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Spānija	Almirall S.A. General Mitre, 151 08022 - Barcelona Spain	Prevencor	20mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u> <u>EU/EEA</u>	<u>Reģistrācijas</u> <u>apliecības īpašnieks</u>	<u>Piešķirtais</u> <u>nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Spānija	Almirall S.A. General Mitre, 151 08022 - Barcelona Spain	Prevencor	40mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Spānija	Almirall S.A. General Mitre, 151 08022 - Barcelona Spain	Prevencor	80 mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Zviedrija	Pfizer AB 191 90 Sollentuna Sweden	Lipitor	10mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Zviedrija	Pfizer AB 191 90 Sollentuna Sweden	Lipitor	20mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Zviedrija	Pfizer AB 191 90 Sollentuna Sweden	Lipitor	40mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Zviedrija	Pfizer AB 191 90 Sollentuna Sweden	Lipitor	80 mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Lielbritānija	Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Pottery Road, Dun Laoghaire, Co Dublin Ireland	Lipitor	10mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Lielbritānija	Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Pottery Road, Dun Laoghaire, Co Dublin Ireland	Lipitor	20mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u> <u>EU/EEA</u>	<u>Reģistrācijas</u> <u>apliecības īpašnieks</u>	<u>Piešķirtais</u> <u>nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Lielbritānija	Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Pottery Road, Dun Laoghaire, Co Dublin Ireland	Lipitor	40mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Lielbritānija	Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Pottery Road, Dun Laoghaire, Co Dublin Ireland	Lipitor	80 mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai

PIELIKUMS II

LABOJUMI ZĀĻU APRAKSTĀ UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJĀ

Šie zāļu apraksta, marķējuma un lietošanas instrukcijas labojumi ir spēkā esoši pēc EK lēmuma.

Pēc EK lēmuma dalībvalstu nacionālās aģentūras atjaunos produktu informāciju pēc nepieciešamības.

LABOJUMI, KAS JĀIEKĻAUJ ATTIECĪGOS ZĀĻU APRAKSTA APAKŠPUNKTOS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

[Skatīt pielikumu I - aizpilda nacionāli]

{PIEŠĶIRTAIS NOSAUKUMS} **5 mg košļājamās tabletes**

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra **košļājamā tablete** satur **5 mg** atorvastatīna (atorvastatinum) kalcija trihidrāta veidā.

Palīgvielas:

Katra {PIEŠĶIRTAIS NOSAUKUMS} **5 mg košļājamā tablete** satur **0,625 mg aspartāma**.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3. ZĀĻU FORMA

Košļājamās tabletes

Baltas vai gandrīz baltas, apaļas košļājamās tabletes ar rozā vai purpursārtiem plankumiem, kam vienā pusē iespiests “5” un otrā pusē “Pfizer”, 5,6 mm diametrā.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1 Terapeitiskās indikācijas

Hiperholesterinēmija

{PIEŠĶIRTAIS NOSAUKUMS} indicēts kā piedeva diētai, lai pazeminātu pārāk augstu kopējā holesterīna, ZBL holesterīna, apolipoproteīna B un triglicerīdu līmeni plazmā ~~pacientiem~~ **pieaugušiem, pusaudžiem un bērniem no 10 gadu vecuma** ar primāro hiperholesterinēmiju, tostarp pārmantoto hiperholesterinēmiju (heterozigoto formu) un kombinēto (jaukto) hiperlipidēmiju (atbilst II a un II b tipam pēc Fredriksona klasifikācijas) tad, ja diēta un citi nemedikamentozās ārstēšanas pasākumi nav pietiekami iedarbīgi.

{PIEŠĶIRTAIS NOSAUKUMS} indicēts kopējā holesterīna un ZBL holesterīna līmeņa pazemināšanai **pieaugušiem** ar pārmantotās hiperholesterinēmijas homozigoto formu ~~pacientiem~~ vai nu kā papildu līdzekli citai lipīdus pazeminošai terapijai (piem., ZBL aferzei), vai arī tad, ja šāda veida ārstēšanas metodes nav pieejamas.

Kardiovaskulārās slimības profilakse

Kardiovaskulāru notikumu profilaksei pacientiem ar augstu pirmreizēja kardiovaskulāra notikuma risku (skatīt apakšpunktu 5.1) papildus pārējo riska faktoru korekcijai.

4.2 Devas un lietošanas veids

{Aizpilda nacionāli}.

Lietošana bērniem

~~Bērnu ārstēšanu drīkst veikt tikai speciālists.~~

Lietošanas pieredze pediatrijā ir ierobežota, jo aptver nelielu skaitu pacientu (vecumā no 4 līdz 17 gadiem) ar tādām smagām dislipidēmijām kā homozigoti pārmantotā hiperholesterinēmija.

Ieteicamā sākumdeva šīs grupas pacientiem ir 10 mg atorvastatīna dienā. Devu var palielināt līdz 80 mg dienā, vadoties pēc reakcijas uz terapiju un zāļu panesības. Lietošanas drošuma pētījumi šai populācijā nav veikti.

Hiperholesterinēmija:

Bērnu ārstēšanu drīkst veikt tikai speciālists, kuram ir pieredze bērnu hiperlipidēmijas ārstēšanā, un pacientiem regulāri jānovērtē stāvokļa uzlabošanās.

Pacientiem vecumā virs 10 gadiem ieteicamā sākuma deva ir 10 mg dienā, ko var palielināt līdz 20 mg dienā. Devas palielināšana jāveic atbilstoši pediatrisko pacientu individuālai atbildes reakcijai un panesamībai. Zāļu drošības informācija pediatriskiem pacientiem, kuri ārstēti ar devām virs 20 mg, kas atbilst 0,5 mg/kg, ir ierobežota.

Lietošanas pieredze bērniem vecumā no 6 līdz 10 gadiem ir ierobežota (skatīt apakšpunktu 5.1). Atorvastatīns nav indicēts lietošanai bērniem līdz 10 gadu vecumam.

{PIEŠĶIRTAIS NOSAUKUMS} tabletes var sakošļāt vai norīt veselas, uzdzerot ūdeni. Tās var lietot jebkurā laikā, gan ēšanas laikā gan starp ēdienreizēm.

4.3 Kontrindikācijas

{Aizpilda nacionāli}.

4.4 Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

{Aizpilda nacionāli}.

Lietošana bērniem

Ietekme uz drošu bērna attīstību nav noteikta (skatīt apakšpunktu 4.8).

{PIEŠĶIRTAIS NOSAUKUMS} košļājamās tabletes satur aspartāmu, kas ir fenilalanīna avots. Var būt kaitīgs cilvēkiem ar fenilketonūriju.

4.5 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

{Aizpilda nacionāli}.

Pediatriskā populācija

Mijiedarbības pētījumi veikti tikai pieaugušiem. Mijiedarbību apjoms pediatriskā populācijā nav zināms. Iepriekš minētā zāļu mijiedarbība pieaugušiem un apakšpunktā 4.4 minētie brīdinājumi jāņem vērā arī pediatriskai populācijai.

4.6 Grūtniecība un zīdīšana

{Aizpilda nacionāli}.

4.7 Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

{Aizpilda nacionāli}.

4.8 Nevēlamās blakusparādības

{Aizpilda nacionāli}.

Pediatriskā populācija

Klīnisko pētījumu datubāze satur drošības datus par 249 pediatriskiem pacientiem, kuri saņēma atorvastatīnu. Starp tiem 7 pacienti bija vecumā līdz 6 gadiem, 14 pacienti bija vecumā no 6 līdz 9 gadiem, un 228 pacienti bija vecumā no 10 līdz 17 gadiem.

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži: galvassāpes

Kuņģa- zarnu trakta traucējumi

Bieži: sāpes vēderā

Izmeklējumi

Bieži: alanīnaminotransferāzes līmeņa paaugstināšanās, kreatinīna fosfokināzes līmeņa paaugstināšanās asinīs.

Balstoties uz pieejamiem datiem, paredzamais blakusparādību biežums, veids un nopietnība bērniem ir tāds pats kā pieaugušiem. Pašlaik ir ierobežota pieredze par zāļu drošību ilgtermiņa lietošanā pediatriskā populācijā.

4.9 Pārdozēšana

{Aizpilda nacionāli}.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1 Farmakodinamiskās īpašības

{Aizpilda nacionāli}.

Pediatriskā populācija

Pārmantotās hiperholesterinēmijas heterozigotā forma pediatriskiem pacientiem vecumā no 6 līdz 17 gadiem

Tika veikts 8 nedēļu atklāts pētījums bērniem un pusaudžiem ar ģenētiski apstiprinātu pārmantoto hiperholesterinēmijas heterozigoto formu un sākuma stāvokli ZBL holesterīns ≥ 4 mmol/L, lai izvērtētu atorvastatīna farmakokinētiku, farmakodinamiku, drošību un panesamību. Kopumā pētījumā tika iesaistīti 39 bērni un pusaudži vecumā no 6 līdz 17 gadiem. A grupā bija iekļauti 15 bērni vecumā no 6 līdz 12 gadiem un Tanner I stadijā. B grupā bija iekļauti 24 bērni vecumā no 10 līdz 17 gadiem un $\geq$ Tanner II stadijā.

Atorvastatīna sākuma deva A grupā bija 5 mg košļājamā tablete dienā un B grupā 10 mg tablete dienā. Atorvastatīna devu tika atļauts dubultot, ja 4. nedēļā subjekts nerasniedza mērķa rezultātu ZBL holesterīns $< 3,35$ mmol/L un ja atorvastatīna panesamība bija laba.

Pēc 2 nedēļām ZBL holesterīna, kopējā holesterīna, ļoti zema blīvuma lipoproteīnu holesterīna un apolipoproteīna B vidējie rādītāji samazinājās visiem subjektiem. Subjektiem, kuri saņēma dubultu devu, papildus samazinājums tika novērots jau 2 nedēļas pēc devas palielinājuma, salīdzinot ar sākuma novērtējumu. Procentuāli vidējie lipīdu samazināšanās rādītāji bija līdzīgi abās grupās, neskatoties uz to, vai subjektiem tika saglabāta sākuma deva, vai arī tā tika dubultota. 8.nedēļā vidējās procentuālās izmaiņas, salīdzinot ar sākuma stāvokli ZBL holesterīnam un kopējam holesterīnam bija aptuveni 40 % un 30 %.

Pārmantotās hiperholesterinēmijas heterozigotā forma pediatriem vecumā no 10 līdz 17 gadiem

Pēc atklātā pētījuma tika veikts dubultmaskēts, placebo kontrolēts pētījums, kurā tika iekļauti 187 zēni un meitenes pēc menstruāciju sākšanās vecumā no 10 līdz 17 gadiem (vidējais vecums 14,1 gads) ar pārmantotu hiperholesterinēmijas heterozigoto formu vai smagu hiperholesterinēmiju, un kuri uz 26 nedēļām tika randomizēti atorvastatīna grupā (n=140) vai placebo grupā (n=47), bet pēc tam 26 nedēļas visi saņēma atorvastatīnu. Atorvastatīna deva bija 10 mg vienu reizi dienā pirmajās 4 nedēļās un pēc tam tika palielināta līdz 20 mg, ja ZBL holesterīna līmenis bija >3,36 mmol/L. Atorvastatīns ievērojami samazināja kopējā holesterīna, ZBL holesterīna, triglicerīdu un apolipoproteīna B līmeni plazmā 26 nedēļu ilgās dubultmaskētās fāzes laikā. 26 nedēļu ilgās dubultmaskētās fāzes laikā vidējais sasniegtais ZBL holesterīna līmenis atorvastatīna grupā bija 3,38 mmol/l (amplitūda: 1,81- 6,26 mmol/l, salīdzinot ar 5,91 mmol/l (amplitūda: 3,93-9,96 mmol/l) placebo grupā. Papildus pediatriem pētījumi, salīdzinot atorvastatīna un kolestipola iedarbību 10 līdz 18 gadus veciem pacientiem ar hiperholesterinēmiju, parādīja, ka atorvastatīns (N=25) izraisīja ievērojamu ZBL holesterīna līmeņa samazināšanos 26. nedēļā (p<0,05), salīdzinājumā ar kolestipolu (N=31).

Individuālas ārstēšanas (*Compassionate use*) pētījumā pacientiem ar smagu hiperholesterinēmiju (tai skaitā hiperholesterinēmijas homozigoto formu) tika iekļauti 46 ar atorvastatīnu ārstēti pediatriem pacienti, un devas tika titrētas atbilstoši atbildes reakcijai (daži subjekti saņēma 80 mg dienā). Pētījums ilga 3 gadus: ZBL holesterīna līmenis tika pazemināts par 36%.

Nav izvērtēta atorvastatīna lietošanas ilgtermiņa ietekme uz bērniem ar mērķi samazināt saslimstību un mirstību pieauguša cilvēka dzīves laikā.

Eiropas zāļu aģentūra neizvirza prasību iesniegt atorvastatīna pētījuma rezultātus bērniem vecumā no 0 līdz 6 gadiem ar hiperholesterinēmijas heterozigoto formu un bērniem vecumā no 0 līdz 18 gadiem ar hiperholesterinēmijas homozigoto formu, kombinētu hiperholesterinēmiju, primāru hiperholesterinēmiju un kardiovaskulāro notikumu novēršanai (skatīt apakšpunktu 4.2 par lietošanu bērniem).

5.2 Farmakokinētiskās īpašības

{Aizpilda nacionāli}.

Īpašas pacientu grupas

{Aizpilda nacionāli}.

- Bērni: 8 nedēļu atklātā pētījumā 6-17 gadus veci pediatriem pacienti ar pārmantotu hiperholesterinēmijas heterozigoto formu un sākuma stāvokli ZBL holesterīns ≥ 4 mmol/L tika ārstēti ar 5 mg vai 10 mg košļājamām tabletēm vai 10 mg vai 20 mg apvalkotām tabletēm attiecīgi Tanner I grupā un Tanner $\geq$ II grupā. Ķermeņa svars bija vienīgais nozīmīgais atorvastatīna populācijas farmakokinētikas izmaiņu veids. Novērotais atorvastatīna orālais klīrenss ir līdzīgs kā pieaugušiem, nosakot alometriski pēc ķermeņa svara. Tika novērots konsekvents ZBL holesterīna un kopējā holesterīna līmeņa samazinājums pēc atorvastatīna un o-hidroksiatorvastatīna ekspozīcijas.
- {Aizpilda nacionāli}.

5.3 Preklīniskie dati par drošību

{Aizpilda nacionāli}.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1 Palīgvielu saraksts

Kalcija karbonāts
Mikrokristāliskā celuloze
Nātrija kroskarmeloze
Polisorbāts 80
Magnija stearāts
Hidroksipropilceluloze
Preželatinizēta ciete
Mannitols (E421)
Aspartāms (E951)
Sukraloze (E955)
Vīnogu aromātviela

6.2 Nesaderība

{Aizpilda nacionāli}.

6.3 Uzglabāšanas laiks

24 mēneši

6.4 Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

{Aizpilda nacionāli}.

6.5 Iepakojuma veids un saturs

Blisteru iepakojumi, kas satur 30 košļājamās tabletes.

Blistera viena puse sastāv no poliamīda/ alumīnija folijas/ polivinilhlorīda, un otra puse veidota no alumīnija folijas/ vinila/ akrila karstā sakausējuma apvalka.

Visi iepakojumam lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6 Norādījumi par sagatavošanu lietošanai un iznīcināšanu

{Aizpilda nacionāli}.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

[Aizpilda nacionāli]

[Skatīt pielikumu I - aizpilda nacionāli]

{Nosaukums un adrese}

<{tel}>

<{fakss}>

<{e-pasts}>

8. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

[Aizpilda nacionāli]

9. REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

[Aizpilda nacionāli]

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

**LABOJUMI, KAS JĀIEKĻAUJ ATTIECĪGAJOS MARKĒJUMA TEKSTA
APAKŠPUNKTOS**

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA**{KARTONA KASTĪTE}****1. ZĀĻU NOSAUKUMS**

{PIEŠĶIRTAIS NOSAUKUMS} 5 mg košļājamās tabletes
Atorvastatinum

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

1 košļājamā tablete satur 5 mg atorvastatīna (kalcija trihidrāta veidā).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur aspartāmu. Papildu informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

30 košļājamās tabletes

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

[Aizpilda nacionāli]

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

[Aizpilda nacionāli]

{Nosaukums un adrese}

<{tel}>

<{fakss}>

<{e-pasts}>

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

[Aizpilda nacionāli]

13. SĒRIJAS NUMURS<, PLAZMAS FONDA UN PRODUKTA KODS>

Sērija

14. IZSNEGŠANAS KĀRTĪBA

[Aizpilda nacionāli]

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

{PIEŠKIRTAIS NOSAUKUMS} 5 mg košļājamās tabletes

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA

{Blisters}

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

{PIEŠĶIRTAIS NOSAUKUMS} 5 mg košļājamās tabletes
Atorvastatinum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

[Aizpilda nacionāli]
{Nosaukums}

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

4. SĒRIJAS NUMURS<, PLAZMAS FONDA UN PRODUKTA KODS>

Sēr.

5. CITA

**LABOJUMI, KAS JĀIEKĻAUJ ATTIECĪGOS LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS
APAKŠPUNKTOS**

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

(PIEŠĶIRTAIS NOSAUKUMS) 5 mg košļājamās tabletes

Atorvastatinum

[Skatīt pielikumu I - aizpilda nacionāli]

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
- Šīs zāles ir parakstītas Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgi simptomi.
- Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu, izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā var uzzināt:

1. Kas ir {PIEŠĶIRTAIS NOSAUKUMS} un kādam nolūkam to lieto
2. Pirms {PIEŠĶIRTAIS NOSAUKUMS} lietošanas
3. Kā lietot {PIEŠĶIRTAIS NOSAUKUMS}
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt {PIEŠĶIRTAIS NOSAUKUMS}
6. Sīkāka informācija

1. KAS IR {PIEŠĶIRTAIS NOSAUKUMS} UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

{Aizpilda nacionāli}.

2. PIRMS {PIEŠĶIRTAIS NOSAUKUMS} LIETOŠANAS

{Aizpilda nacionāli}.

Svarīga informācija par kādu no {PIEŠĶIRTAIS NOSAUKUMS} sastāvdaļām

~~Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.~~

Satur fenilalanīna avotu. Var būt kaitīgs cilvēkiem ar fenilketonūriju.

3. KĀ LIETOT {PIEŠĶIRTAIS NOSAUKUMS}

Parastā {PIEŠĶIRTAIS NOSAUKUMS} sākuma deva **pieaugušiem un bērniem no 10 gadu vecuma** ir 10 mg reizi dienā. Ārsts devu var palielināt, līdz tiek sasniegta Jums piemērotā deva. Devas pielāgošanu veic ar 4 nedēļu vai vēl garākiem intervāliem. Maksimālā {PIEŠĶIRTAIS NOSAUKUMS} deva ir 80 mg reizi dienā **pieaugušiem un 20 mg reizi dienā bērniem.**

{PIEŠĶIRTAIS NOSAUKUMS} tabletes **var sakošļāt vai** norīt veselas, uzdzerot ūdeni. Tās var lietot jebkurā laikā, gan ēšanas laikā gan starp ēdienreizēm. Tomēr mēģiniet lietot tableti vienā un tai pašā laikā.

{Aizpilda nacionāli}.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

{Aizpilda nacionāli}.

5. KĀ UZGLABĀT {PIEŠĶIRTAIS NOSAUKUMS}

{Aizpilda nacionāli}.

Nelietojiet {PIEŠĶIRTAIS NOSAUKUMS}, ja beidzies uz **blistera** un kastītes norādītais derīguma termiņš. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

{Aizpilda nacionāli}.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko {PIEŠĶIRTAIS NOSAUKUMS} satur

{PIEŠĶIRTAIS NOSAUKUMS} aktīvā viela ir atorvastatīns. Katra tablete satur 5 mg atorvastatīna (atorvastatīna kalcija trihidrāta formā).

{PIEŠĶIRTAIS NOSAUKUMS} tabletes satur arī citas sastāvdaļas. Tablešu sastāvā ir: **kalcija karbonāts, mikrokristāliskā celuloze, nātrija kroskarmeloze, polisorbāts 80, hidroksipropilceluloze, preželatinizēta ciete, mannitols, aspartāms, sukraloze, vīnogu aromātviela un magnija stearāts.**

{PIEŠĶIRTAIS NOSAUKUMS} ārējais izskats un iepakojums

{PIEŠĶIRTAIS NOSAUKUMS} 5 mg košļājamās tabletes ir baltas vai gandrīz baltas, apaļas, ar rozā vai purpursārtiem plankumiem. Tabletēm vienā pusē iespiests “5” un otrā pusē “Pfizer”.

{PIEŠĶIRTAIS NOSAUKUMS} ir pieejams blisterpaciņās pa 30 košļājamām tabletēm.

Šīs zāles ir pieejamas kā košļājamās tabletes pa 5 mg, 10 mg, 20g un 40 mg un apvalkotās tabletes pa 10 mg, 20 mg, 40 mg un 80 mg.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

{Nosaukums un adrese}

<{tel}>

<{fakss}>

<{e-pasts}>

[Skatīt pielikumu I – aizpilda nacionāli]

Šis medicīniskais produkts Eiropas ekonomiskās zonas (EEA) dalībvalstīs ir reģistrēts ar šādiem nosaukumiem:

{Aizpilda nacionāli}.

Šī lietošanas instrukcija akceptēta

[Aizpilda nacionāli]

PIELIKUMS III
REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NOSACĪJUMI

Nacionālās zāļu agentūras nodrošinās, ka Reģistrācijas apliecības īpašnieks izpilda sekojošus nosacījumus:

- Nacionāli iesniegt Sortis un saistīto nosaukumu Riskvadības plānu (vai tā labojumus), ņemot vērā pediatriskos datus un CHMP ieteikumus. Riskvadības plānam jāiekļauj pašlaik notiekošais pētījums A2581173 (3 gadu pētījums par zāļu drošību un papildu pētījums par atorvastatīna efektivitāti bērnu un pusaudžu vecumā no (6 līdz 18 gadiem) ar pārmantotas hiperholesterinēmijas heterozigoto formu ārstēšanā).
- Atsākt Sortis un saistīto nosaukumu PADZ iesniegšanas ciklu sekojoši:
 - PADZ ik pēc 6 mēnešiem, kamēr tiek iegūta 2 pilnu gadu pieredze pediatriskā lietošanā ES
 - PADZ reizi gadā turpmāko 2 gadu laikā
 - Turpmākā iesniegšana ik pēc 3 gadiemPADZ jākoncentrē uz lietošanu pediatriskā populācijā.