

30 September 2019¹
EMA/PRAC/501710/2019
Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC)

Formulazzjoni gdida tal-kliem tal-informazzjoni dwar prodott – Siltiet mir-rakkomandazzjonijiet tal-PRAC dwar is-sinjali

Adottata fil-PRAC ta' bejn it-2 u I-5 ta' Settembru 2019

Il-kliem tal-informazzjoni dwar il-prodott f'dan id-dokument huwa estratt mid-dokument bit-titlu 'Rakkomandazzjonijiet tal-PRAC dwar is-sinjali' li fih it-test shiħ tar-rakkomandazzjonijiet tal-PRAC għall-aġġornament tal-informazzjoni dwar il-prodott, kif ukoll xi gwida ġenerali dwar il-ġestjoni tas-sinjali. Jista' jinstab hawnhekk (bl-Ingliz biss).

It-test il-ġdid li għandu jiżdied mal-informazzjoni dwar il-prodott huwa sottolineat. It-test attwali li għandu jitħassar huwa maqtugħi.

1. Ibrutinib - Puplesija iskemika (EPITT nru 19369)

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott

4.4. Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Aċċidenti cerebrovaskulari

Ġew irappurtati kažijiet ta' aċċident cerebrovaskulari, attakk iskemiku temporanju u puplesja iskemika inkluž fatalitajiet bl-użu ta' ibrutinib, ma' jew mingħajr fibrillazzjoni atrijali konkomitanti u/jew ipertensioni. Il-latenza mill-bidu tat-trattament b'ibrutinib mal-bidu ta' kundizzjonijiet vaskulari nervużi centrali iskemiċi kienet fil-biċċa l-kbira tal-kažijiet wara diversi xħur (aktar minn xahar fi 78 % u aktar minn 6 xħur f'44 % tal-kažijiet) li enfasizzat il-ħtieġa għal monitoraġġ regolari tal-pazjenti (jekk jogħġibok ara sezzjoni 4.4 L-arritmija kardijaka u l-Ipertensioni u sezzjoni 4.8).

4.8. Effetti mhux mixtieqa

Lista f'tabella ta' reazzjonijiet avversi

¹ Intended publication date. The actual publication date can be checked on the webpage dedicated to [PRAC recommendations on safety signals](#).



Disturbi fis-sistema nervuža

Mhux komuni: aċċident cerebrovaskulari, attakk iskemiku temporanju, puplesija iskemika

Fuljett ta' tagħrif

2. X'għandek tkun taf qabel ma tieħu IMBRUVICA

Twissijiet u prekawzjonijiet

Għid lit-tabib tiegħek immedjatamente jekk tinnota jew xi ħadd ieħor jinnota fik: tnemnim jew dgħufija f'daqqa fid-dirġħajn u fir-riglejn (specjalment fuq naħha waħda tal-ċisem), konfużjoni f'daqqa, diffikultà biex titkellem jew tifhem id-diskors, telf tal-vista, diffikultà biex timxi, telf ta' bilanċ jew nuqqas ta' koordinazzjoni, uġiġi ta' ras sever f'daqqa mingħajr l-ebda kawża magħrufa. Dawn jistgħu jkunu sinjalji u sintomi ta' puplesija.

4. Effetti sekondarji possibbli

Għid lil tabib mill-ewwel jekk tinnota xi wieħed mill-effetti sekondarji li ġejjin:

Mhux komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 100):

episodju temporanju ta' disfuzjoni newroloġika kkawżata minn telf ta' fluss tad-demm, puplesija.

2. Ibuprofen – Pustuloži esantematika ġeneralizzata akuta (AGEP) (EPITT nru 19409)

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott

1. Għal monoterapija ta' ibuprofen jew ibuprofen f'kombinazzjonijiet bl-esklużjoni ta' kombinazzjonijiet ma' pseudoephedrine

4.4. Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Reazzjonijiet severi tal-ġilda

Reazzjonijiet serji tal-ġilda, uħud minnhom fatali, inkluži dermatite esfoljattiva, sindrome ta' Stevens-Johnson, u nekroliżi epidermali tossika ġew irrapprtati f'każijiet rari f'assocjazzjoni mal-użu ta' NSAIDs (ara sezzjoni 4.8). Il-pazjenti jidhru li huma fl-ogħla riskju ta' dawn ir-reazzjonijiet fil-bidu tat-terapija, bil-bidu tar-reazzjoni li fil-maġġoranza tal-każijiet isseħħi fl-ewwel xahar tat-trattament.

Ġiet irrapprtata pustuloži esantematika ġeneralizzata akuta (AGEP) b'rabta ma' prodotti li fihom ibuprofen. Ibuprofen għandu jitwaqqaf, mal-ewwel dehra ta' sinjalji u sintomi ta' reazzjonijiet severi tal-ġilda, bħal raxx tal-ġilda, leżjonijiet mukuži, jew kwalunkwe sinjal ieħor ta' sensitività eċċessiva.

4.8. Effetti mhux mixtieqa

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta' taħt il-ġilda

Mhux magħruf: Pustuloži esantematika ġeneralizzata akuta (AGEP)

2. Għall-kombinazzjonijiet ta' ibuprofen u pseudoephedrine

4.4. Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Reazzjonijiet severi tal-ġilda

Reazzjonijiet severi tal-ġilda bħal pustuloži esantematika ġeneralizzata akuta (AGEP) jistgħu jseħħu b'ibuprofen u prodotti li jkun fihom pseudoephedrine. [...]

4.8. Effetti mhux mixtieqa¹

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta' taħt il-ġilda

Mhux magħruf: Pustuloži esantematika ġeneralizzata akuta (AGEP)

Fuljett ta' tagħrif²

2. X'għandek tkun taf qabel ma tuża <isem il-prodott>

Twissijiet u prekawzjonijiet - Oqghod attent ħafna bi <isem il-prodott>

Reazzjonijiet tal-ġilda²

Ġew irrapportati reazzjonijiet serji tal-ġilda b'rabta ma' trattament bi <isem il-prodott>. Għandek tieqaf tieħu <isem il-prodott> u tfittex attenzjoni medika immedjatamente, jekk tiżviluppa xi raxx tal-ġilda, leżjonijiet tal-membrani mukużi, infafet jew sinjal oħra ta' allergija minħabba li dan jista' jkun l-ewwel sinjal ta' reazzjoni serja ħafna tal-ġilda. Ara sezzjoni 4.

4. Effetti sekondarji possibbli

Frekwenza "Mhux magħruf"

Raxx aħmar bil-qoxra miflurx b'boċċi taħt il-ġilda u nfafet principally lokalizzat fuq it-tinjiet tal-ġilda, il-parti tal-ġisem miż-żaqq 'il fuq u estremitajiet ta' fuq akkumpanjat minn deni fil-bidu tat-trattament (pustuloži esantematika ġeneralizzata akuta). Ieqaf uža <isem il-prodott> jekk tiżviluppa dawn is-sintomi u fittexx attenzjoni medika immedjatamente. Ara wkoll sezzjoni 2.

Noti f'qiegħ il-paġna:

1 Jekk I-ADR AGEP digħà eżistenti fis-sezzjoni 4.8 hija elenkata spesifikament għal pseudoephedrine biss.

2 It-test li ġej għandu jissostitwixxi kull informazzjoni attwali dwar reazzjonijiet serji tal-ġilda fis-sezzjoni Twissijiet u prekawzjonijiet.

3. Inhibituri tal-kotrasportatur 2 ta' sodium-glucose (SGLT2)²

- Informazzjoni ġdida dwar l-assocjazzjoni magħrufa bejn l-inhibituri ta' SGLT2 u l-ketoacidozi dijabetika f'pazjenti kirurġiċi (EPITT nru 19355)

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott

4.4. Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Ketoacidozi dijabetika

[...]

It-trattament għandu jiġi interrott f'pazjenti li jiddaħħlu l-isptar għal proċeduri maġġuri tal-kirurġija jew mard mediku akut serju. Huwa rakkommandat il-monitoraġġ tal-ketones f'dawn il-pazjenti. Il-kejl tal-livelli tal-ketone tad-demm huwa ppreferut mill-awrina. Fiż-żewġ każijiet, kTrattament bi <isem il-prodott> jista' jerġa' jinbeda meta l-valuri tal-ketone jkunu normali u l-kundizzjoni tal-pazjent tiġi stabbilizzata.

4. Teriflunomide – Psorjaži (EPITT nru 19366)

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott

4.4. Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Reazzjonijiet tal-ġilda

[...]

Matul l-użu ta' teriflunomide, ġew irrapprtati bidu qedid ta' psorjaži (inkluż psorjaži pustulari) u aggravar ta' psorjaži preeżistenti. It-twaqqif tat-trattament u l-bidu ta' proċedura aċċellerata ta' eliminazzjoni jistgħu jiġi kkunsidrati meta titqies il-marda tal-pazjent u l-istorja medika.

4.8. Effetti mhux mixtieqa

Lista f'tabella ta' reazzjonijiet avversi

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta' taħt il-ġilda

Frekwenza, mhux magħruf: Psorjaži (inkluż psorjaži pustulari)^b

b: ara sejjoni 4.4

Fuljett ta' tagħrif

4. Effetti sekondarji possibbli

Mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima tal-frekwenza mid-data disponibbli)

[...]

- Psorjaži

² Canagliflozin; canagliflozin, metformin; dapagliflozin; dapagliflozin, metformin; empagliflozin; empagliflozin, metformin; empagliflozin, linagliptin; ertugliflozin, metformin; ertugliflozin, sitagliptin; saxagliptin, dapagliflozin