

EMA/527379/2013
EMEA/H/C/001159

Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku

Copalia HCT

amlodipina / valsartan / idroklorotijażide

Dan id-dokument huwa sommarju tar-rapport pubbliku Ewropew ta' valutazzjoni (EPAR) għal Copalia HCT. Dan jispjega kif il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem (CHMP) ivvaluta l-mediċina sabiex wasal għall-opinjoni favorevoli tiegħu li tingħata awtorizzazzjoni għat-taqegħid fis-suq u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu dwar il-kondizzjonijiet ta' użu għal Copalia HCT.

X'inhu Copalia HCT?

Copalia HCT huwa mediċina li fiha t-tliet sustanzi attivi, l-amlodipina, il-valsartan u l-idroklorotijażide. Jiġi bħala pilloli li jkun fihom l-amlodipina, il-valsartan u l-idroklorotijażide fl-ammonti li ġejjin: 5/160/12.5 mg, 10/160/12.5 mg, 5/160/25 mg; 10/160/25 mg u 10/320/25 mg.

Għal xiex jintuża Copalia HCT?

Copalia HCT jintuża għall-kura tal-ipertensjoni essenżjali (pressjoni għolja tad-demm) f'adulti li l-pressjoni tad-demm tagħhom hija digħi kkontrollata adegwatament b'kombinazzjoni tal-amlodipina, il-valsartan u l-idroklorotijażide. 'Essenżjali' tfisser li l-ipertensjoni ma jkollhiex kawża evidenti.

Il-mediċina tista' tinkiseb biss b'rċetta ta' tabib.

Kif jintuża Copalia HCT?

Copalia HCT jittieħed oralment bħala pillola waħda darba kuljum, fl-istess ħin tal-jum u preferibbilment filgħodu. Id-doża li trid tintuża ta' Copalia HCT hija l-istess bħad-doži tat-tliet sustanzi attivi individwali li l-pazjent kien qed jieħu qabel. Id-doża ta' kuljum ta' Copalia HCT ma għandhiex taqbeż l-10 mg amlodipina, 320 mg valsartan u 25 mg idroklorotijażide.



Kif jaħdem Copalia HCT?

It-tliet sustanzi attivi f'Copalia HCT huma mediċini antiipertensivi li diġà qegħdin jintużaw fl-Unjoni Ewropea (UE).

L-amlodipina "timblokka l-kanali tal-kalċju". Din timblokka l-kanali specjali preżenti fuq il-wiċċ taċ-ċelluli magħrufa bħala kanali tal-kalċju, li minnhom normalment il-joni tal-kalċju jidħlu fiċ-ċelluli. Meta l-joni tal-kalċju jidħlu fiċ-ċelluli tal-muskoli tal-ħitan tal-vini u tal-arterji, dan jikkawża kontrazzjoni. Bit-tnaqqis tal-fluss tal-kalċju fiċ-ċelluli, l-amlodipina timpedixxi l-kontrazzjoni taċ-ċelluli b'hekk dan jgħin biex il-vini u l-arterji jirrilassaw u jitwessgħu, u għalhekk tonqos il-pressjoni tad-demm.

Il-valsartan hu 'antagonist tar-riċetturi tal-anġjotensina II', li tfisser li jimblokka l-azzjoni tal-ormon fil-ġisem imsejjah l-anġjotensina II. L-anġjotensina II huwa vażokostrittur qawwi (sustanza li traqqaq l-arterji u l-vini). Billi jimblokka r-riċetturi li magħhom l-anġjotensina II teħel normalment, il-valsartan iwaqqaf l-ormon milli jkollu effett, b'hekk jippermetti l-arterji u l-vini jitwessgħu u tonqos il-pressjoni tad-demm.

L-idroklorotijażide hija dijuretika. Din taħdem billi żžid il-produzzjoni tal-awrina, u b'hekk jitnaqqas l-ammont ta' fluwidi fid-demm u titbaxxa l-pressjoni tad-demm.

Il-kombinazzjoni tat-tliet sustanzi attivi flimkien għandha effett ta' żieda, billi tnaqqas il-pressjoni tad-demm aktar milli kieku jittieħdu l-mediċini waħedhom. Bit-tnaqqis tal-pressjoni tad-demm, jitnaqqsu r-riskji assoċjati ma' pressjoni għolja tad-demm, bħall-puplesija.

Kif ġie studjat Copalia HCT?

Peress li l-kombinazzjoni tat-tliet sustanzi attivi flimkien ilha tintużha għal numru ta' snin, il-kumpanija pprezentat studji li juru li l-pillola li fiha t-tliet sustanzi kollha tiġi assorbita fil-ġisem bl-istess mod bħalma jiġu assorbiti t-tliet pilloli separati.

Barra minn hekk, sar studju ewljeni f'2,271 pazjent b'ipertensjoni minn moderata għal gravi bl-ogħla konċentrazzjoni ta' Copalia HCT (320 mg valsartan, 10 mg amlodipina u 25 mg idroklorotijażide). Għal tmien ġimġħat il-pazjenti ngħataw jew Copalia HCT jew waħda mit-tliet kombinazzjonijiet li kien fihom tnejn biss mis-sustanzi attivi. Il-kejl ewljeni tal-effiċċja kien il-bidla medja fil-pressjoni tad-demm.

X'benefiċċju wera Copalia HCT matul l-istudji?

Il-kura bl-ogħla konċentrazzjoni ta' Copalia HCT Kienet iktar effettiva minn kombinazzjonijiet li kien fihom kwalunkwe tnejn mis-sustanzi attivi fil-kura tal-ipertensjoni. It-tnaqqis medju fil-pressjoni tad-demm kien madwar 39.7/24.7 mmHg f'pazjenti li kien fuq Copalia HCT meta mqabbel ma' 32/19.7 mmHg, 33.5/21.5 mmHg u 31.5/19.5 mmHg f'pazjenti li kien qegħdin jieħdu valsartan/idroklorotijażide, valsartan/amlodipina u idroklorotijażide/amlodipina rispettivament.

X'inhu r-riskju assoċjat ma' Copalia HCT?

L-effetti sekondarji l-aktar komuni b'Copalia HCT (li deħru f'madwar pazjent 1 u 10 pazjenti f'100) huma ipokaljemija (livelli baxxi ta' potassju fid-demm), sturdament, uġiġi ta' ras, ipotensjoni (pressjoni tad-demm baxxa), dispepsija (qrusa tal-istonku), pollakjurja (frekwenza anormali tal-awrina), għejja u edema (żamma tal-fluwidi). Għal-lista sħiha tal-effetti sekondarji kollha rrappurtati b'Copalia HCT, ara l-fuljett ta' tagħrif.

Copalia HCT ma għandux jintużha f'nies li jistgħu jkunu ipersensittivi (allerġiċi) għas-sustanzi attivi, għal sulfonamidi oħra, għal derivattivi diidropiridiniċi jew għal kwalunkwe ingredjent ieħor f'Copalia HCT. Ma għandux jintużha lanqas minn nisa li jkollhom aktar minn tliet xħur tqala. Ma għandux jintużha lanqas

f'pazjenti li għandhom problemi fil-fwied jew biljari (bħas-suffejra), problemi serji fil-kliewi, anurija (kondizzjoni li biha pazjent ma jkunx jista' jagħmel l-awrina) jew f'pazjenti għaddejjin minn dijalizi (teknika tat-tisfija tad-demm). Fl-aħħar nett, Copalia HCT ma jistax jintuża f'pazjenti b'ipokalemija (livelli baxxi ta' potassju fid-demm), iponatremija (livelli baxxi ta' sodju fid-demm) u iperkalċemija (livelli għoljin tal-kalċju fid-demm) li ma jirrispondux għall-kura u f'pazjenti b'iperuriċemija (livelli għoljin ta' aċtu uriku fid-demm) li tikkawża s-sintomi.

Copalia HCT ma għandux jintuża wkoll flimkien ma' medicini li fihom l-aliskiren (użati wkoll fil-kura tal-ipertensjoni essenzjali) f'pazjenti bid-dijabete tat-tip 2 jew f'pazjenti li jbatu minn insuffiċjenza moderata jew gravi fil-kliewi.

Għaliex ġie approvat Copalia HCT?

Is-CHMP innota li l-pazjenti li kienu digħà qeqħdin jieħdu t-tliet sustanzi attivi jkollhom probabbiltà ikbar li jmorru tajjeb fil-kura tagħhom jekk jingħataw Copalia HCT li jiġbor it-tliet sustanzi f'pillola waħda. L-istudju ewlieni wera l-benefiċċju tal-ogħla konċentrazzoni ta' Copalia HCT biex titbaxxa l-pressjoni tad-demm. Għad-doži kollha, Copalia HCT issodisfa wkoll ir-rekwiżiti sabiex juri li kien komparabbi mal-kombinazzjonijiet tas-sustanzi attivi individwali meħuda separatament. Għaldaqstant is-CHMP id-deċċeda li l-benefiċċji ta' Copalia HCT huma akbar mir-riskji tiegħu u rrakkomanda li jingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

Aktar tagħrif dwar Copalia HCT

Il-Kummissjoni Ewropea tat-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għal Copalia HCT valida fl-Unjoni Ewropea kollha fl-4 ta' Novembru 2009.

L-EPAR shiħ għal Copalia HCT jinsab fis-sit elettroniku tal-Aġenzija ema.europa.eu/Find_medicine/Human_medicines/European_public_assessment_reports. Għal aktar informazzjoni rigward il-kura b'Copalia HCT, aqra l-fuljett ta' tagħrif (parti wkoll mill-EPAR) jew ikkuntattja lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f'09-2013.