



EMA/583034/2023
EMEA/H/C/006084

Skyclarys (*omaveloxolone*)

Ħarsa ġenerali lejn Skyclarys u għalfejn huwa awtorizzat fl-UE

X'inhu Skyclarys u għal xiex jintuża?

Skyclarys huwa mediciċina li tintuża f'pazjenti li għandhom 16-il sena u aktar biex tittratta l-atassja ta' Friedreich, marda ereditarja li tikkawża ħsara fis-sistema nervuża, li tirriżulta f'diffikultajiet fil-koordinazzjoni, il-bilanc u l-moviment, l-għeja, id-diffikultà biex titkellem, kif ukoll żieda fir-riskju ta' kardjomijopatija (ħsara lill-muskolu tal-qalb) u d-dijabete.

L-atassja ta' Friedreich hija rari, u Skyclarys ġie denominat bħala "mediciċina orfni" (mediciċina li tintuża f'mard rari) fis-27 ta' Ĝunju 2018. Aktar informazzjoni dwar id-denominazzjoni orfni tinstab fuq is-[sit web](#) tal-EMA.

Skyclarys fih is-sustanza attiva omaveloxolone.

Kif jintuża Skyclarys?

Skyclarys jista' jinkiseb biss b'rīċetta ta' tabib "specjali", li jfisser li jintuża taħt kundizzjonijiet aktar stretti min-normal. Il-mediciċina għandha tinbeda u tiġi sorveljata biss minn tabib b'esperjenza fit-trattament ta' pazjenti bl-atassja ta' Friedreich.

Il-mediciċina tiġi bħala kapsuli li għandhom jittieħdu mill-ħalq darba kuljum. Jista' jkun hemm bżonn li d-doża titnaqqas jekk il-pazjent ikun qed jieħu mediciċini oħra msejħha "inhibituri ta' CYP3A" li jistgħu jinterferixxu mal-mod kif Skyclarys jitkisser fil-ġisem.

Għal iktar informazzjoni dwar l-użu ta' Skyclarys, ara l-fuljett ta' tagħrif jew ikkuntattja lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

Kif jaħdem Skyclarys?

Mhuwiex mifhum b'mod sħiħ kif taħdem is-sustanza attiva fi Skyclarys, l-omaveloxolone. Madankollu, intwera li jattiva l-perkors Nrf2, li jgħin liċ-ċelloli jirreagixxu għall-istress ossidattiv (kundizzjoni li tista' sseħħi meta jkun hemm wisq radikali ħielsa fil-ġisem u mhux biżżejjed antiossidanti biex jeħilsu minnhom, li tista' twassal għal ħsara fiċ-ċelloli u fit-tessuti). Il-livelli u l-attività ta' Nrf2 jidhru li jitnaqqsu f'pazjenti bl-atassja ta' Friedreich.



X'inhuma I-benefiċċji ta' Skyclarys li ħarġu mill-istudji?

Fi studju ewljeni li involva 103 pazjenti bl-atassja ta' Friedreich ta' bejn is-16-il sena u l-40 sena, Skyclarys kien aktar effettiv minn plaċebo (trattament fint) biex inaqwas l-indeboliment fiziċċu wara 48 ġimġha ta' trattament.

L-iskala ta' klassifikazzjoni tal-atassja ta' Friedreich (mFARS) modifikata, li tikkonsisti f'serje ta' valutazzjonijiet ta' eżaminazzjoni fiziċċa, intużat biex tivvaluta s-severità tas-sintomi newroloġiči (li jkollhom x'jaqsmu man-nervituri jew mas-sistema nervuża) tal-atassja ta' Friedreich. Jekk il-puntegħ mFARS jonqos, dan ifisser li jkun hemm tnaqqis fl-indeboliment fiziċċu.

Pes cavus huwa deformità fis-sieq ħafna drabi meqjusa bħala kumplikazzjoni tal-atassja ta' Friedreich. Peress li ma hemm l-ebda metodu standardizzat għall-klassifikazzjoni tas-severità tal-pes cavus u minħabba l-impatt possibbli tal-kundizzjoni fuq il-puntegħ mFARS, il-pazjenti b'pes cavus ma kinux inkluži fl-analiżi primarja.

Fi 82 pazjent mingħajr pes cavus, dawk li nghataw Skyclarys kellhom tnaqqis ta' madwar 1.6 fil-puntegħ mFARS tagħhom meta mqabbel ma' żieda ta' madwar 0.9 f'dawk li nghataw plaċebo.

L-istudju evalwa wkoll l-impatt tat-trattament fuq il-puntegħ FA-ADL tal-pazjenti, miżura li tintużha biex jiġi vvalutat kemm in-nies b'atassja ta' Friedreich jistgħu jwettqu attivitajiet ta' għajxien ta' kuljum, bħall-ilbies, l-għawm, u l-ikel, b'puntegħi oħla li jindikaw livelli oħla ta' diżabilità. Mit-82 pazjent mingħajr pes cavus, dawk li nghataw Skyclarys kellhom tnaqqis ta' madwar 0.2 fil-puntegħ FA-ADL tagħhom meta mqabbha ma' żieda ta' madwar 1.1 f'dawk li nghataw il-plaċebo.

X'inhuma r-riskji assoċċjati ma' Skyclarys?

Għal-lista shiħa tal-effetti sekondarji u r-restrizzjonijiet bi Skyclarys, ara l-fuljett ta' tagħrif.

L-effetti sekondarji l-aktar komuni bi Skyclarys (li jistgħu jaftid u aktar minn persuna 1 minn kull 10) jinkludu żieda fil-livelli tal-enzimi tal-fwied (magħrufa bħala alanine transaminase u aspartate aminotransferase), uġiġi ta' ras, tnaqqis fil-piż, thossok ma tiflaħx, rimettar, dijarea, thossok għajjen, uġiġi fil-ħalq u fil-gerżuma, uġiġi fid-dahar, spażmi fil-muskoli, influwenza u tnaqqis fl-apptit.

Għaliex Skyclarys ġie awtorizzat fl-UE?

Fiż-żmien tal-approvazzjoni, kien hemm ħtieġa medika sinifikanti mhux issodisfata għall-pazjenti bl-atassja ta' Friedreich peress li ma kien hemm l-ebda mediciċina oħra awtorizzata għat-trattament tal-marda. Intwera li Skyclarys huwa ta' beneficiċju għall-pazjenti bl-atassja ta' Friedreich. Għalkemm kien hemm incertezzi assoċċjati mal-istudju ewljeni, bħan-numru żgħir ta' pazjenti, l-esklużjoni ta' pazjenti b'forom severi tal-marda (dawk b'mard tal-qalb u dijabete avvanzati) u kumplikazzjonijiet bħal pes cavus (kif definit fl-istudju), l-Aġenzija kkunsidrat li l-benefiċċji li dehru applikaw ukoll għal dawn il-pazjenti. B'mod generali, il-profil tas-sigurtà ta' Skyclarys tqies maniġġabbli minħabba li l-effetti sekondarji fl-istudju ewljeni kienu ġeneralment ħief sa moderati fis-severità u fil-biċċa l-kbira ġew riżolti fi żmien xahrejn.

Għaldaqstant, l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ddeċidiet li l-benefiċċji ta' Skyclarys huma akbar mir-riskji tiegħu u li jista' jiġi awtorizzat għall-użu fl-UE.

X'miżuri qegħdin jittieħdu biex jiġi żgurat l-użu sigur u effettiv ta' Skyclarys?

Fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott u fil-fuljett ta' tagħrif ġew inkluži r-rakkmandazzjonijiet u l-prekawzjonijiet li għandhom ikunu segwiti mill-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħha u mill-pazjenti għall-użu sigur u effettiv ta' Skyclarys.

Bħal fil-każ tal-mediċini kollha, id-data dwar l-użu ta' Skyclarys hija ssorveljata kontinwament. L-effetti sekondarji ssuspettati rrapportati bi Skyclarys huma evalwati bir-reqqa u kull azzjoni meħtieġa hi meħuda biex tipproteġi lill-pazjenti.

Informazzjoni oħra dwar Skyclarys

Aktar informazzjoni dwar Skyclarys tinstab fis-sit web tal-Aġenzija:
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/skyclarys.