



EMA/426703/2023
EMEA/H/C/005910

Vanflyta (*quizartinib*)

Ħarsa ġenerali lejn Vanflyta u għalfejn huwa awtorizzat fl-UE

X'inhu Vanflyta u għal xiex jintuża?

Vanflyta huwa mediciċina kontra l-kanċer li tintuża biex tittratta adulti li jkunu għadhom kif ġew dijanjostikati b'lewkimja akuta tal-mijelojde (AML), kanċer taċ-ċelloli bojod tad-demm. Jingħata biss lil dawk il-pazjenti li ċ-ċelloli tal-kanċer tagħhom ikollhom bidla partikolari (mutazzjoni) magħrufa bħala ITD fil-ġene għal proteina msejħha FLT3.

Vanflyta jintuża flimkien ma' cytarabine u anthracycline (mediciċini oħra kontra l-kanċer, imsejħa wkoll kimoterapija) waqt l-induzzjoni (bidu tat-trattament). Wara l-induzzjoni jintuża flimkien ma' cytarabine waħdu (konsolidazzjoni). Imbagħad jintuża waħdu bħala terapija ta' manteniment.

Vanflyta fih is-sustanza attiva quizartinib.

Kif jintuża Vanflyta?

Vanflyta jista' jinkiseb biss b'rċetta ta' tabib u t-trattament għandu jinbeda minn tabib b'esperjenza fl-użu ta' trattamenti tal-kanċer.

Qabel jieħu Vanflyta, il-pazjent għandu jkollu test biex jikkonferma li ċ-ċelloli tal-kanċer tiegħu għandhom il-mutazzjoni ITD fil-ġene *FLT3* (pożittiva għal ITD-*FLT3*).

Vanflyta jiġi bħala pilloli li għandhom jittieħdu mill-ħalq. Jittieħed darba kuljum għal ġimxha tiegħi matul kull ċiklu ta' kimoterapija ta' 4 ġimgħat. Wara li titlesta l-kimoterapija, Vanflyta jittieħed darba kuljum waħdu bħala trattament ta' manteniment. It-trattament jista' jkompli għal massimu ta' 36 ċiklu li jdumu 4 ġimgħat kull wieħed.

Għal iktar informazzjoni dwar l-użu ta' Vanflyta, ara l-fuljett ta' tagħrif jew ikkuntattja lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Kif jaħdem Vanflyta?

Is-sustanza attiva f'Vanflyta, il-quizartinib, timblokkka l-azzjoni ta' enzimi magħrufin bħala tyrosine kinase, b'mod partikolari tyrosine kinase msejħha *FLT3* li normalment tikkontrolla t-tkabbir u d-diviżjoni taċ-ċelloli bojod tad-demm. F'pazjenti li għandhom mutazzjoni *FLT3*, l-enzima *FLT3* hija attiva żżejjed u tistimula t-tkabbir ta' wisq ċelloli bojod tad-demm. Billi timblokkka l-*FLT3*, il-quizartinib hija mistennija li twaqqaf it-tkabbir ta' ċelloli bojod tad-demm u b'hekk tnaqqas l-iżvilupp tal-kanċer.

Official address Domenico Scarlattilaan 6 • 1083 HS Amsterdam • The Netherlands

Address for visits and deliveries Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question Go to www.ema.europa.eu/contact **Telephone** +31 (0)88 781 6000

An agency of the European Union



X'inhuma I-benefiċċji ta' Vanflyta li ħarġu mill-istudji?

Studju ewlioni li involva 539 pazjenti li kienu għadhom kif ġew dijanostikati bl-AML qabbel Vanflyta ma' plaċebo (trattament fint). Il-pazjenti ngħataw Vanflyta jew plaċebo flimkien ma' kimoterapija. Dawk li l-kanċer tagħhom irrisponda għat-ġaqqa komplex it-trattament tagħhom mingħajr kimoterapija jew kellhom trapjant taċ-ċelloli staminali tad-demm qabel komplex it-trattament tagħhom. Wara tliet snin ta' trattament, 50 % tal-pazjenti li ngħataw Vanflyta kienu għadhom ħajjin meta mqabbla ma' 41 % ta' dawk li rċevew plaċebo.

X'inhuma r-riskji assoċjati ma' Vanflyta?

Għal-lista shiħa tal-effetti sekondarji u r-restrizzjonijiet b'Vanflyta, ara l-fuljett ta' tagħrif.

L-effetti sekondarji l-aktar komuni b'Vanflyta (li jistgħu jaffettaw aktar minn persuna 1 minn kull 5) jinkludu livelli oghla ta' enzima fid-demm imsejha alanine aminotransferase, livelli mnaqqsas ta' pjastrini tad-demm, livelli mnaqqsas ta' emoglobin (il-proteina fiċ-ċelloli ħomor tad-demm li ġġorr l-ossiġenu madwar il-ġisem), dijarea, nawżja (tħossock ma tiflaħx), uġigħ addominali (fiż-żaqqa), uġigħ ta' ras, rimettar u livelli mnaqqsas ta' newtropili (tip ta' ċellola bajda tad-demm).

L-effett sekondarju serju l-aktar komuni b'Vanflyta (li jista' jaffettwa sa persuna 1 minn kull 10) huwa newtropenja (livelli baxxi ta' newtropili). Effetti sekondarji serji komuni oħra (li jistgħu jaffettaw sa persuna 1 minn kull 10) jinkludu infezzjonijiet fungali u infezzjonijiet tal-herpes.

L-effetti sekondarji serji l-aktar komuni b'Vanflyta (li jistgħu jaffettaw sa persuna 1 minn kull 10) li wasslu għal tnaqqis jew interruzzjoni tad-doża jinkludu newtropenja, tromboċitopenja (livelli baxxi ta' pjastrini tad-demm) u intervall QT imtawwal (attività elettrika anormali tal-qalb li taffettwa r-ritmu tagħha).

Vanflyta m'għandux jintuża minn pazjenti li qed ireddgħu jew li għandhom sindrome QT konġenitali fit-tul (attività elettrika anormali tal-qalb ikkawżata minn difett fil-ġene).

Għaliex Vanflyta ġie awtorizzat fl-UE?

Meta jintuża flimkien mal-kimoterapija, Vanflyta ntwera li jtawwal il-ħajja ta' persuni li għadhom kif ġew dijanostikati b'AML pozittiva għall-ITD-FLT3. Għalkemm xi wħud mill-effetti sekondarji tal-mediċina jistgħu jekk kien hemm fis-seħħi miżuri adegwati biex jiġi ġegħixxu jew jimminimizzaw ir-riskji b'Vanflyta.

Għaldaqstant, l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ddeċidiet li l-benefiċċji ta' Vanflyta huma akbar mir-riskji tiegħu u li jista' jiġi awtorizzat għall-użu fl-UE.

X'miżuri qiegħdin jittieħdu biex jiġi żgurat l-użu sigur u effettiv ta' Vanflyta?

Il-kumpanija li tqiegħed Vanflyta fis-suq se tipprovd i-materjal edukattiv għall-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħha u għall-pazjenti dwar kif jimminimizzaw ir-riskju ta' intervall QT imtawwal u jirrikonox Xu sinjal u sintomi ta' dan l-effett sekondarju.

Fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott u fil-fuljett ta' tagħrif ġew inkluži wkoll ir-rakkomandazzjonijiet u l-prekawzjonijiet li għandhom ikunu segwiti mill-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħha u mill-pazjenti għall-użu sigur u effettiv ta' Vanflyta.

Bħal fil-każ tal-mediċini kollha, id-data dwar l-użu ta' Vanflyta hija ssorveljata kontinwament. L-effetti sekondarji ssuspettati rrapportati b'Vanflyta huma evalwati bir-reqqa u kull azzjoni meħtieġa hi meħħuda biex tipprotegi lill-pazjenti.

Informazzjoni oħra dwar Vanflyta

Aktar informazzjoni dwar Vanflyta tinstab fis-sit web tal-Aġenzija:
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/vanflyta.