



30 September 2024¹
EMA/PRAC/433198/2024
Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC)

Formulazzjoni gdida tal-kliem tal-informazzjoni dwar prodott – Siltiet mir-rakkomandazzjonijiet tal-PRAC dwar is-sinjali

Adottata fil-PRAC ta' bejn it-2 u I-5 ta' Settembru 2024

Il-formulazzjoni tal-kliem tal-informazzjoni dwar prodott f'dan id-dokument hija estratta mid-dokument intitolat "Rakkomandazzjonijiet tal-PRAC dwar is-sinjali" li fiit it-test shiħi tar-rakkomandazzjonijiet tal-PRAC għall-aġġornament tal-informazzjoni dwar il-prodott, kif ukoll xi gwida ġenerali dwar il-ġestjoni tas-sinjali. Tista' tinstab fuq il-paċċa web għar-[rakkomandazzjonijiet tal-PRAC dwar is-sinjali ta' sikurezza](#) (bl-Ingliz biss).

It-test il-ġdid li għandu jiżdied mal-informazzjoni dwar il-prodott huwa sottolinjat. It-test attwali li għandu jitħassar huwa maqtugħi.

1. Medroxyprogesterone acetate (MPA) – Meningioma (EPITT nru 20030)

Meta tiġi kkunsidrata l-formulazzjoni li digà teżisti f'xi prodotti awtorizzati fuq livell nazzjonali, it-test jista' jeħtieg li jiġi adattat mid-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-taqegħid fis-suq għal prodotti individuali.

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Prodotti li fihom MPA b'indikazzjonijiet mhux onkoloġiči (il-formulazzjonijiet injettabbli kollha u l-formulazzjonijiet orali ta' ≥ 100 mg):

Meningioma jew storja ta' meningioma.

Prodotti li fihom MPA li fihom kemm indikazzjonijiet mhux onkoloġiči kif ukoll dawk onkoloġiči (il-formulazzjonijiet injettabbli kollha u l-formulazzjonijiet orali ta' ≥ 100 mg):

Meningioma jew storja ta' meningioma (għal indikazzjonijiet mhux onkoloġiči).

¹ Expected publication date. The actual publication date can be checked on the webpage dedicated to [PRAC recommendations on safety signals](#).



4.4 Twissijiet specjali u prekawzjonijiet għall-użu

Prodotti li fihom MPA b'indikazzjonijiet mhux onkoloġiči (il-formulazzjonijiet injettabbi kollha u l-formulazzjonijiet orali ta' ≥ 100 mg):

Meningioma

Ġew irrapportati kažijiet ta' meningioma (kažijiet singoli u multipli) f'pazjenti ttrattati b'medroxyprogesterone acetate għal żmien twil (diversi snin). Il-pazjenti ttrattati b'medroxyprogesterone acetate għandhom jiġu mmonitorjati għal sinjali u sintomi ta' meningioma f'konformità mal-prattika klinika. Jekk pazjent jiġi dijanostikat b'meningioma, il-medroxyprogesterone acetate għandu jitwaqqaf, bħala mizura ta' prekawzjoni. F'xi kažijiet, ġie osservat tiċkin tal-meningioma wara li twaqqaf it-trattament b'medroxyprogesterone acetate.

Prodotti li fihom MPA għal indikazzjonijiet onkoloġiči (il-formulazzjonijiet injettabbi kollha u l-formulazzjonijiet orali ta' ≥ 100 mg):

Meningioma

Ġew irrapportati kažijiet ta' meningioma (kažijiet singoli u multipli) f'pazjenti ttrattati b'medroxyprogesterone acetate għal żmien twil (diversi snin). Il-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati għal sinjali u sintomi ta' meningioma skont il-prattika klinika. Jekk pazjent jiġi dijanostikat b'meningioma, il-ħtieġa għal aktar trattament b'medroxyprogesterone acetate għandha tiġi kkunsidrata bir-reqqa fuq bażi ta' kaž b'każ filwaqt li jitqiesu l-benefiċċji u r-riskji individwali. F'xi kažijiet, ġie osservat tiċkin tal-meningioma wara li twaqqaf it-trattament b'medroxyprogesterone acetate.

Prodotti li fihom MPA li għandhom indikazzjonijiet kemm mhux onkoloġiči kif ukoll onkoloġiči (il-formulazzjonijiet injettabbi kollha u l-formulazzjonijiet orali ta' ≥ 100 mg):

Meningioma

Ġew irrapportati kažijiet ta' meningioma (kažijiet singoli u multipli) f'pazjenti ttrattati b'medroxyprogesterone acetate għal żmien twil (diversi snin). Il-pazjenti ttrattati b'medroxyprogesterone acetate għandhom jiġu mmonitorjati għal sinjali u sintomi ta' meningioma f'konformità mal-prattika klinika.

F'xi kažijiet, ġie osservat tiċkin tal-meningioma wara li twaqqaf it-trattament b'medroxyprogesterone acetate. Jekk pazjent ittrattat għal indikazzjoni mhux onkoloġika jiġi dijanostikat b'meningioma, il-medroxyprogesterone acetate għandu jitwaqqaf, bħala mizura ta' prekawzjoni.

Jekk pazjent ittrattat għal indikazzjoni onkoloġika jiġi dijanostikat b'meningioma, il-ħtieġa għal aktar trattament b'medroxyprogesterone acetate għandha tiġi kkunsidrata bir-reqqa fuq bażi ta' kaž b'każ filwaqt li jitqiesu l-benefiċċji u r-riskji individwali.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Prodotti li fihom MPA għall-formulazzjonijiet injettabbi kollha u l-formulazzjonijiet orali ta' ≥ 100 mg:

SOC Neoplażmi beninni, malinni u dawk mhux spċifikati: meningioma, frekwenza "mhux magħruf".

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Prodotti li fihom MPA għall-formulazzjonijiet injettabbi kollha u l-formulazzjonijiet orali ta' $\geq 100 \text{ mg}$:

Abbaži tar-riżultati minn studju epidemjoloġiku Franciż ta' kontroll fuq kažijiet, qjet osservata assoċjazzjoni bejn il-medroxyprogesterone acetate u l-meningioma. Dan l-istudju kien ibbażat fuq data mis-sistema Nazzjonali Franciż tad-data dwar is-saħħha (SNDS – Système National des Données de Santé) u inkluda popolazzjoni ta' 18,061 mara li kienet saritilhom kirurġija intrakranjali għal menigioma u 90,305 nisa mingħajr menigioma. L-esponenti għal medroxyprogesterone acetate 150 mg/3ml injettabbi tgħabbet bejn in-nisa li kienet saritilhom kirurġija intrakranjali għall-menigioma u n-nisa mingħajr menigioma. L-analiziet urew riskju eċċessiv ta' menigioma bl-użu ta' medroxyprogesterone acetate 150 mg/3 ml (9/18 061 (0.05 %) v 11/90 305 (0.01 %), JEW 5.55 (95 % CI 2.27 sa 13.56)). Dan ir-riskju eċċessiv jidher li huwa xprunat primarjament minn użu fit-tul (≥ 3 snin) ta' medroxyprogesterone acetate.

Fuljett ta' tagħrif

2. X'għandek tkun taf qabel ma tieħu <isem il-prodott>

Prodotti li fihom MPA b'indikazzjonijiet mhux onkoloġiči (il-formulazzjonijiet injettabbi kollha u l-formulazzjonijiet orali ta' $\geq 100 \text{ mg}$):

Tużax <isem il-prodott>

Jekk qħandek menigioma jew qatt ġejt dijanostikat(a) b'menigioma (tumur normalment beninn tas-saff tat-tessut ta' madwar il-moħħ u s-sinsla tad-dahar).

Għid lit-tabib tiegħek jekk xi waħda mill-kondizzjonijiet li ġejjin tapplika għalik.

Subsezzjoni "twissijiet u prekawzjonijiet"

Meningioma

L-użu ta' medroxyprogesterone acetate kien marbut mal-iżvilupp ta' tumur normalment beninn tat-tessut ta' madwar il-moħħ u s-sinsla tad-dahar (menigioma). Ir-riskju jiżdied b'mod speċjali meta tużah qħal tul ta' żmien itwal (diversi snin). Jekk inti ġejt dijanostikat(a) b'menigioma, it- tabib tiegħek se jwaqqaf it-trattament tiegħek b'<isem il-prodott> (ara sejjoni "Tihux..."). Jekk tinnota xi sintomi bħal bidliet fil-vista (eż. tara doppju jew sturdamenti), telf ta' smiġħ jew żarżir fil-widnejn, telf tax-xamm, uqiġi ta' ras li jaġgrava maż-żmien, telf tal-memorja, aċċessjonijiet, dqħufija f'dirgħajk jew-friġlejk, qħandek tgħid lit-tabib tiegħek minnufih.

Prodotti li fihom MPA b'indikazzjonijiet onkoloġiči (il-formulazzjonijiet injettabbi kollha u l-formulazzjonijiet orali ta' $\geq 100 \text{ mg}$):

Subsezzjoni "twissijiet u prekawzjonijiet"

Meningioma

L-użu ta' medroxyprogesterone acetate kien marbut mal-iżvilupp ta' tumur normalment beninn tat-tessut ta' madwar il-moħħ u s-sinsla tad-dahar (menigioma). Ir-riskju jiżdied b'mod speċjali meta tużah qħal tul ta' żmien itwal (diversi snin). Jekk inti ġejt dijanostikat(a) b'menigioma, it- tabib tiegħek se jerġa' jikkunsidra t-trattament tiegħek b'<isem il-prodott>. Jekk tinnota xi sintomi bħal bidliet fil-vista (eż. tara doppju jew sturdamenti), telf ta' smiġħ jew żarżir fil-widnejn, telf tax-xamm,

uġiqħ ta' ras li jaqgrava maż-żmien, telf tal-memorja, aċċessjonijiet, dgħufija f'dirgħajk jew f'rīglejk, għandek tqħid lit-tabib tiegħek minnufih.

Prodotti li fihom MPA li għandhom indikazzjonijiet kemm mhux onkologiċi kif ukoll onkologiċi (il-formulazzjonijiet injettabbi kollha u l-formulazzjonijiet orali ta' ≥ 100 mg):

Tużax <isem il-prodott>

Jekk għandek menigioma jew qatt ġejt dijanostikat(a) b'menigioma (tumur normalment beninn tat-tessut ta' madwar il-moħħ u s-sinsla tad-dahar) sakemm ma tużax <isem il-prodott> għall-kanċer.

Għid lit-tabib tiegħek jekk xi waħda mill-kondizzjonijiet li ġejjin tapplika għalik.

Subsezzjoni "Twissijiet u prekawzjonijiet"

Meningioma

L-użu ta' medroxyprogesterone acetate kien marbut mal-izvilupp ta' tumur normalment beninn tat-tessut ta' madwar il-moħħ u s-sinsla tad-dahar (menigioma). Ir-riskju jiżdied b'mod speċjali meta tużah għal tul ta' żmien itwal (diversi snin). Jekk inti ġejt dianostikat(a) b'menigioma, it-tabib tiegħek se jerġa' jikkunsidra t-trattament tiegħek b'<isem il-prodott>. Jekk tinnota xi sintomi bħal bidliet fil-vista (eż. tara doppju jew sturdamenti), telf ta' smiġħ jew żarżir fil-widnejn, telf tax-xamm, uġiġħ ta' ras li jaqgrava maż-żmien, telf tal-memorja, aċċessjonijiet, dgħufija f'dirgħajk jew f'rīglejk, għandek tkellem lit-tabib tiegħek minnufih.

4. Effetti sekondarji possibbli

Prodotti li fihom MPA għall-formulazzjonijiet injettabbi kollha u l-formulazzjonijiet orali ta' ≥ 100 mg

Tumur normalment beninn tat-tessut ta' madwar il-moħħ u s-sinsla tad-dahar (menigioma) bi-frekwenza mhux magħrufa (ara sejjoni 2 "Twissijiet u prekawzjonijiet").