

ANNESS I

SOMMARJU TAL-KARATTERISTIČI TAL-PRODOTT

1. ISEM IL-PRODOTT MEDICINALI

Cinacalcet Mylan 30 mg pilloli miksijsa b'rita.
Cinacalcet Mylan 60 mg pilloli miksijsa b'rita.
Cinacalcet Mylan 90 mg pilloli miksijsa b'rita.

2. GHAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Cinacalcet Mylan 30 mg pilloli miksijsa b'rita

Kull pillola miksijsa b'rita fiha 30 mg ta' cinacalcet (bħala hydrochloride).

Cinacalcet Mylan 60 mg pilloli miksijsa b'rita

Kull pillola miksijsa b'rita fiha 60 mg ta' cinacalcet (bħala hydrochloride).

Cinacalcet Mylan 90 mg pilloli miksijsa b'rita

Kull pillola miksijsa b'rita fiha 90 mg ta' cinacalcet (bħala hydrochloride).

Għal-lista kompluta ta' eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GHAMLA FARMAČEWTIKA

Pillola miksijsa b'rita.

Cinacalcet Mylan 30 mg pilloli miksijsa b'rita

Pillola miksijsa b'rita b'daqi ta' 10.0 mm x 6.4 mm, ta' lewn aħdar, ovali u bikonvessa, b'tarf imżeržaq, imnaqqxa b'M fuq naħha waħda tal-pillola u CI30 fuq in-naħha l-oħra.

Cinacalcet Mylan 60 mg pilloli miksijsa b'rita

Pillola miksijsa b'rita b'daqi ta' 12.5 mm x 8.0 mm, ta' lewn aħdar, ovali u bikonvessa, b'tarf imżeržaq, imnaqqxa b'M fuq naħha waħda tal-pillola u CI60 fuq in-naħha l-oħra.

Cinacalcet Mylan 90 mg pilloli miksijsa b'rita

Pillola miksijsa b'rita b'daqi ta' 14.3 mm x 9.0 mm, ta' lewn aħdar, ovali u bikonvessa, b'tarf imżeržaq, imnaqqxa b'M fuq naħha waħda tal-pillola u CI90 fuq in-naħha l-oħra.

4. TAGħrif KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Iperparatirojdiżmu sekondarju

Adulti

Kura ta' iperparatirojdiżmu sekondarju (HPT) f'pazjenti adulti b'marda renali tal-aħħar stadju (ESRD) fuq terapija ta' manutenzjoni b'djalisi.

Popolazzjoni pedjatrika

Kura ta' iperparatirojdiżmu sekondarju (HPT - *hyperparathyroidism*) fi tfal ta' età minn 3 snin 'il fuq b'marda tal-kliewi tal-aħħar stadju (ESRD - *end stage renal disease*) fuq terapija ta' manteniment b'djalisi li l-HPT sekondarju tagħhom ma jkunx ikkontrollat b'mod adegwat b'terapija ta' kura standard (ara sezzjoni 4.4).

Cinacalcet Mylan jista' jintuża bħala parti minn kors terapewtiku li jinkludi binders ta' fosfat u/jew sterols ta' Vitamina D, kif xieraq (ara sezzjoni 5.1).

Karcinoma tal-paratiroyde u iperparatiroydizmu primarju fl-adulti

Tnaqqis ta' iperkalćimija f' pazjenti adulti b':

- karcinoma fil-paratiroyde.
- HPT primarja fejn paratiroydektomija għandha tkun indikata fuq il-baži tal-livelli tal-kalċju fis-serum (kif definit mil-linji gwida ta' kura rilevanti), iżda fejn paratiroydektomija mhux klinikament xierqa jew hija kontraindikata.

4.2 Pożoġija u metodu ta' kif għandu jingħata

Pożoġija

Iperparatiroydizmu sekondarju:

Adulti u anzjani (> 65 sena)

Id-doża rrakkmandata tal-bidu għall-adulti hija ta' 30 mg darba kuljum. Cinacalcet għandu jiġi ttitrat kull ġimaginej sa 4 ġimghat sa doża massima ta' 180 mg darba kuljum biex tintlaħaq il-mira tal-ormon tal-paratiroyde (PTH) f' pazjenti bid-dijalisi li hija bejn 150-300 pg/ml (15.9-31.8 pmol/l) fl-analiżi ta' PTH intatt (iPTH). Il-livelli ta' PTH għandhom jitkejjlu tal-inqas 12-il siegħa wara li jingħata cinacalcet. Għandha ssir referenza għal-linji gwida ta' kura kurrenti.

PTH għandu jitkejjel minn ġimgha sa 4 ġimghat wara l-bidu tal-kura jew aġġustament fid-doża ta' cinacalcet. PTH għandu jitkejjel bejn wieħed u ieħor kull xahar sa 3 xħur waqt il-manutenzjoni. Il-PTH intatt (iPTH) jew il-PTH bijo-intatt (biPTH) jistgħu jintużaw biex jitkejlu l-livelli ta' PTH; kura b'cinacalcet ma tibdilx ir-relazzjoni bejn iPTH u biPTH.

Aġġustament tad-doża bbażat fuq livelli ta' kalċju fis-serum

Kalċju ikkoreġut fis-serum għandu jitkejjel u jiġi mmonitorjat u għandu jkun fil-limitu l-baxx tal-firxa normali jew 'il fuq minn dan il-limitu qabel ma tingħata l-ewwel doża ta' cinacalcet (ara sezzjoni 4.4). Il-firxa normali tal-kalċju tista' tvarja skont il-metodi wżati mil-laboratorju lokali tiegħek.

Waqt it-titrazzjoni tad-doża, il-livelli tal-kalċju fis-serum għandhom jiġu ssorveljati ta' spiss, u fi żmien ġimgha mill-bidu tal-kura jew minn meta jkun sar aġġustament fid-doża ta' cinacalcet. Ladarba id-doża ta' manutenzjoni tkun ġiet stabilita, il-kalċju fis-serum għandu jitkejjel bejn wieħed u ieħor kull xahar. F'każ li l-livelli ta' kalċju kkoreġut fis-serum jonqsu taħt 8.4 mg/dL (2.1 mmol/L) u/jew is-ħeħlu sintomi ta' ipokalćimija huwa rakkmandat l-immaniġġjar li jmiss:

Livell ta' kalċju kkoreġut fis-Serum jew sintomi kliniči ta' ipokalćimija	Rakkmandazzjonijiet
<8.4 mg/dL (2.1 mmol/L) u>7.5 mg/dL (1.9 mmol/L), jew fil-preżenza ta' sintomi kliniči ta' ipokalćimija	Phosphate binders li fihom il-kalċju, sterols tal-vitamina D u/jew aġġustament tal-konċentrazzjonijiet tal-kalċju fil-fluwidu tad-dijalisi jistgħu jintużaw biex jgħollu l-kalċju fis-serum skont il-ġudizzju kliniku.
<8.4 mg/dL (2.1 mmol/L) u>7.5 mg/dL (1.9 mmol/L) jew sintomi persistenti ta' ipokalćimija minkejja tentattivi biex jiżdied il-kalċju fid-demm	Naqqas jew waqqaf id-doża ta' cinacalcet.
≤7.5 mg/dL (1.9 mmol/L) jew sintomi persistenti ta' ipokalćimija u l-Vitamina D ma tistgħax tiż-żid	Waqqaf l-ġhoti ta' cinacalcet sakemm il-livelli tal-kalċju fis-serum jilħqu 8.0 mg/dL (2.0 mmol/L) u/jew is-sintomi ta' ipokalćimija jgħaddu. It-kura għandu jerġa' jinbeda mill-ġdid bl-użu tad-doża aktar baxxa li jmiss ta' cinacalcet.

Popolazzjoni pedjatrika

Il-kalċju kkoreġut fis-serum għandu jkun fil-firxa ta' fuq jew 'il fuq mill-intervall ta' referenza spċifikat għall-età qabel ma tingħata l-ewwel doža ta' cinacalcet, u għandu jiġi mmonitorjat mill-qrib (ara sezzjoni 4.4). Il-firxa normali tal-kalċju tvarja skont il-metodi użati mil-laboratorju lokali tiegħek u l-età tat-tifel/tifla/pazjent.

Id-doža tal-bidu rakkomanda għal tfal b'età ta' ≥ 3 snin sa < 18-il sena hija ≤ 0.20 mg/kg darba kuljum abbażi tal-piż niexef tal-pazjent (ara tabella 1).

Id-doža tista' tiżdied biex tinkiseb firxa mixtieqa ta' iPTH fil-mira. Id-doža għandha tiżdied b'mod sekwenzjali permezz ta' livelli ta' doži disponibbli (ara tabella 1) mhux aktar frekwenti minn kull 4 ġimħat. Id-doža tista' tiżdied sa doža massima ta' 2.5 mg/kg/jum, biex ma taqbixx doža totali ta' kuljum ta' 180 mg.

Tabella 1. Doža ta' kuljum ta' Cinacalcet Mylan f'pazjenti pedjatriċi

Piż niexef tal-pazjent (kg)	Doža tal-bidu (mg)	Livelli ta' doži sekwenzjali disponibbli (mg)
10 sa < 12.5	1	1, 2.5, 5, 7.5, 10 u 15
≥ 12.5 sa < 25	2.5	2.5, 5, 7.5, 10, 15, u 30
≥ 25 sa < 36	5	5, 10, 15, 30, u 60
≥ 36 sa < 50		5, 10, 15, 30, 60, u 90
≥ 50 sa < 75	10	10, 15, 30, 60, 90, u 120
≥ 75	15	15, 30, 60, 90, 120, u 180

Tfal li jeħtieġu doži ta' inqas minn 30 mg jew li ma jistgħux jibilgħu l-pilloli għandhom jużaw għamliet farmaċewtiċi aktar xierqa ta' cinacalcet.

Aġġustament tad-doža abbażi tal-livelli ta' PTH

Il-livelli ta' PTH għandhom jiġu stmati mill-inqas 12-il siegħa wara d-dožaġġ ta' cinacalcet u l-iPTH għandu jitkejjel ġimħa sa 4 ġimħat wara l-bidu jew wara aġġustament tad-doža ta' cinacalcet.

Id-doža għandha tiġi aġġustata abbażi tal-iPTH kif muri hawn taħt:

- Jekk l-iPTH huwa < 150 pg/mL (15.9 pmol/L) u ≥ 100 pg/mL (10.6 pmol/L), naqqas id-doža ta' cinacalcet għad-doža aktar baxxa li jmiss.
- Jekk l-iPTH huwa < 100 pg/mL (10.6 pmol/L), waqqaf it-kura b'cinacalcet, erga' ibda cinacalcet mill-ġdid bid-doža aktar baxxa li jmiss hekk kif l-iPTH ikun > 150 pg/mL (15.9 pmol/L). Jekk it-kura b'cinacalcet jitwaqqaf għal aktar minn 14-il ġurnata, erga' ibda bid-doža rakkomanda tal-bidu.

Aġġustament tad-doža abbażat tal-livelli ta' kalċju fis-serum

Il-kalċju fis-serum għandu jitkejjel fi żmien ġimħa wara l-bidu jew wara aġġustament tad-doža ta' cinacalcet.

Ladarba d-doža ta' manteniment tkun ġiet stabbilita, huwa rakkomandat kejl ta' kull ġimħa tal-kalċju fis-serum. Il-livelli tal-kalċju fis-serum f'pazjenti pedjatriċi għandhom jinżammu fil-firxa normali.

Jekk il-livelli tal-kalċju fis-serum jonqsu taħt il-firxa normali jew iseħħu sintomi ta' ipokalċimija, għandhom jittieħdu l-passi xierqa ta' aġġustament tad-doža kif muri fit-tabella 2 hawn taħt:

Tabella 2. Aġġustament tad-doža f'pazjenti pedjatriċi ta' età minn ≥ 3 sa < 18-il sena

Valur ta' kalċju kkoreġut fis-Serum jew sintomi klinici ta' ipokalċimija	Rakkomandazzjonijiet ta' dožaġġ
Il-kalċju kkoreġut fis-serum huwa fil-limitu l-baxx tan-normal spċifikat għall-età jew taħtu jew	Waqqaf it-kura b'cinacalcet.* Agħti supplimenti tal-kalċju, phosphate binders

jekk iseħħu sintomi ta' ipokalċimija, irrispettivament mil-livell tal-kalċju.	li fihom il-kalċju u/jew sterols tal-vitamina D, kif indikat klinikament.
Il-kalċju totali kkoreġut fis-serum huwa 'l fuq mil-limitu l-baxx tan-normal speċifikat għall-età, u	Ibda mill-ġdid bid-doża aktar baxxa li jmiss. Jekk it-kura b'cinacalcet jitwaqqaf għal aktar minn 14-il ġurnata, erga' ibda bid-doża rakkomandata tal-bidu.
Is-sintomi ta' ipokalċimija għaddew.	Jekk il-pazjent kien qed jirċievi l-aktar doża baxxa (1 mg/jum) qabel il-waqfien, ibda mill-ġdid bl-istess doża (1 mg/jum).

*Jekk id-doża tkun twaqqfet, il-kalċju kkoreġut fis-serum għandu jitkejjel fi żmien 5 sa 7 ijiem

Is-sigurtà u l-effikaċja ta' Cinacalcet Mylan fit-tfal ta' età inqas minn 3 snin għat-kura ta' iperparatirojdiżmu sekondarju għadhom ma ġewx determinati. *Data* disponibbli hija insufficjenti.

Bidla minn etelcalcetide għal Cinacalcet Mylan

Il-bidla minn etelcalcetide għal Cinacalcet Mylan u l-perjodu xieraq biex jitneħħha mill-ġisem ma ġietx studjata f'pazjenti. F'pazjenti li waqqfu l-etelcalcetide, Cinacalcet Mylan m'għandux jinbeda sakemm ikunu tlestell mill-inqas tliet sessionijiet ta' emodjalisi sussegwenti, f'liema mument għandu jitkejjel il-kalċju fis-serum. Kun cert li l-livelli tal-kalċju fis-serum ikunu fil-firxa normali qabel ma jinbeda Cinacalcet Mylana (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.8).

Karċinoma tal-paratirojde u iperparatirojdiżmu primarju

Adulti u anzjani (> 65 sena)

Id-doża tal-bidu rrakkomandata ta' Cinacalcet Mylan għall-adulti hija ta' 30 mg darbtejn kuljum. Id-doża ta' cinacalcet għandha tiġi ttitrata kull ġimħa mill-ġimħat permeżżeż ta' doži sekwenzjali ta' 30 mg darbtejn kuljum, 60 mg darbtejn kuljum, 90 mg darbtejn kuljum, u 90 mg tlieta jew erba' darbiet kuljum, kif neċċessarju biex titnaqqas il-konċetrazzjoni ta' kalċju fis-serum sa jew inqas mil-limitu ta' fuq tan-normal. Id-doża massima wżata fil-provi klinċi kienet ta' 90 mg erba' darbiet kuljum.

Il-kalċju fis-serum għandu jitkejjel fi żmien ġimħa mill-bidu jew minn meta jkun sar aġġustament fid-doża ta' cinacalcet. Ladarba jiġu stabbiliti l-livelli tad-doża ta' manutenzjoni, il-kalċju fis-serum għandu jitkejjel kull xaharejn sa 3 xhur. Wara titrazzjoni sad-doża massima ta' cinacalcet, il-kalċju fis-serum għandu jiġi ssorveljat perjodikament; jekk ma jinżamx tnaqqis klinikment rilevanti tal-kalċju fis-serum, għandu jiġi kkunsidrat twaqqif għal kollox tat-terapija b'cinacalcet (ara sezzjoni 5.1).

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta' cinacalcet fit-tfal għat-kura ta' karċinoma tal-paratirojde u iperparatirojdiżmu primarju għadhom ma ġewx determinati s'issa. M'hemm l-ebda *data* disponibbli.

Indeboliment tal-fwied

Mhx meħtieġa bidla fid-doża tal-bidu. Cinacalcet għandu jintuża b'attenzjoni f'pazjenti b'indeboliment tal-fwied moderat sa sever u l-kura għandha tiġi ssorveljata mill-viċin waqt titrazzjoni tad-doża u waqt kura kontinwa (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.2).

Metodu ta' kif għandu jingħata

Għall-użu orali.

Il-pilloli għandhom jittieħdu sħaħ u m'għandhomx jintmagħdu, jitgħaffgu jew jinqas.

Huwa rrakkomandat li Cinacalcet Mylan jittieħed mal-ikel jew ffit wara ikla, peress li studji wrew li l-bijodisponibilità ta' cinacalcet tiżdied meta jittieħed mal-ikel (ara sezzjoni 5.2).

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieħed mill-eċċipjenti elenkti fis-sezzjoni 6.1.

Ipokalċimija (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.4).

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Kalċju fis-serum

Okkażżjonijiet ta' theddid għall-ħajja u riżultati fatali assoċjati ma' ipokalċimija kienu irraportati f'pazjenti adulti u pedjatriċi li ġew ittratati b'cinacalcet. Manifestazzjonijiet ta' ipokalċimija jistgħu jinkludu parasteżji, uġiġ fil-muskoli, bugħawwieg, tetnu u konvulżjonijiet. Tnaqqis ta' kalċju fis-serum jista' wkoll itawwal l-intervall QT, li jista' jwassal għal arritmija ventrikulari. Każijiet ta' titwil ta' QT u arritmija ventrikulari kienu rrappurtati f'pazjenti kkurati b'cinacalcet (ara sezzjoni 4.8). Kawtela hija rrakkommandata f'pazjenti b'fatturi ta' riskju oħra għal titwil ta' QT bħal pazjenti magħruf li għandhom sindrome kongenitali ta' QT twil jew pazjenti li qed jirċievu prodotti medicinali magħrufa li jikkawżaw titwil ta' QT.

Peress li cinacalcet ibaxxi l-kalċju fis-serum, il-pazjenti għandhom jiġu ssorveljati b'attenzjoni għall-każijiet ta' ipokalċimija (ara sezzjoni 4.2). Il-kalċju fid-demm għandu jiġi mkejjel fi żmien ġimgħa wara bidu jew aġġustament fid-doża ta' cinacalcet.

Adulti

Kura b'cinacalcet m'għandhiex tinbeda f'pazjenti b'kalċju fis-serum (ikkoreġut għall-albumina) taħt il-limitu l-aktar baxx tal-firxa normali.

F' pazjenti b' mard tal-kliewi kronika CKD li qed jirċievu d-dijalisi, li ngħataw cinacalcet bejn wieħed u ieħor 30% tal-pazjenti kellhom minn ta' l-inqas valur wieħed ta' kalċju fid-demm inqas minn 7.5 mg/dl (1.9 mmol/l)

Popolazzjoni pedjatrika

Cinacalcet Mylan għandu jinbeda biss għat-kura ta' HPT sekondarju fi tfal b'et ta' ≥ 3 snin b'ESRD fuq terapija ta' manteniment b'dijalisi, fejn l-HPT sekondarju ma jkunx ikkontrollat b'mod adegwaw b'terapija ta' kura standard, fejn il-kalċju fis-serum jkun fil-firxa ta' fuq jew 'il fuq mill-intervall ta' referenza spċifikat ghall-ekonomi.

Segwi mill-qrib il-livelli tal-kalċju fis-serum (ara sezzjoni 4.2) u l-konformità tal-pazjent waqt it-kura b'cinacalcet. Tibdiex cinacalcet u żżidx id-doża jekk ikun hemm suspett ta' nuqqas ta' konformità.

Qabel ma tibda cinacalcet u matul it-kura, ikkunsidra r-riskji u l-benefiċċi tat-kura u l-ħila tal-pazjent li jikkonforma mar-rakkomandazzjonijiet biex jimmonitorja u jimmaniġġa r-riskju ta' ipokalċimija.

Għarraf lill-pazjenti pedjatriċi u/jew lil dawk li jieħdu ħsiebhom dwar is-sintomi ta' ipokalċimija u dwar l-importanza li jiġi osservati l-istruzzjonijiet dwar il-monitoraġġ tal-kalċju fis-serum, u l-pożoloġija u metodu ta' kif għandu jingħata.

Pazjenti b'CKD mhux fuq id-dijalisi

Cinacalcet mhux indikat ghall-pazjenti b'CKD li mhux qed jirċievu d-dijalisi. Studji investigattivi wrew li pazjenti b'CKD li mhux qed jirċievu d-dijalisi li ngħataw cinacalcet għandhom riskju ogħla għal ipokalċimija (livelli ta' kalċju fis-serum < 8.4 mg/dl [2.1 mmol/l]) meta mqabbla ma' pazjenti b'CKD li qed jirċievu d-dijalisi u li ngħataw cinacalcet. Dan jista' jkun minħabba livelli ta' kalċju fil-linjal bażi aktar baxxi u/jew il-preżenza ta' fdal ta' funzjoni tal-kliewi.

Aċċessjonijiet

Każijiet ta' aċċessjonijiet kienu rrappurtati f'pazjenti trattati b'cinacalcet (ara sezzjoni 4.8). Il-limitu għall-aċċessjonijiet huwa mnaqqas permezz ta' tnaqqis sinifikanti fil-livelli ta' kalċju fis-serum.

Għalhekk, il-livelli tal-kalċju fis-serum għandhom jiġu mmonitorjati mill-qrib f'pazjenti li jkunu qed jircieu cinacalcet, b'mod partikolari f'pazjenti li għandhom storja ta' disturb ta' aċċessjoni.

Pressjoni baxxa u/jew insuffiċjenza tal-qalb li sejra għall-agħar

Każijiet ta' pressjoni baxxa u/jew insuffiċjenza tal-qalb li sejra għall-agħar, ġew irrappurtati f'pazjenti b'indeboliment fil-funzjoni tal-qalb, fejn relazzjoni kawżali ma' cinacalcet ma setgħetx tiġi eskużha kompletament u li setgħet tiġi kkawżata minn tnaqqis fil-livelli ta' kalċju fis-serum (ara sezzjoni 4.8).

Għoti flimkien ma' prodotti medicinali oħra

Aġħiżi cinacalcet b'attenżjoni f'pazjenti li jircieu xi prodotti medicinali oħra magħrufa li jbaxxu l-kalċju fis-serum. Immonitorja l-kalċju fis-serum mill-vičin (ara sezzjoni 4.5).

Pazjenti li jkunu qed jircieu cinacalcet m'għandhomx jingħataw etelcalcetide. Għoti fl-istess waqt jista' jwassal għal ipokalċimija severa.

Generali

Tista' tiżviluppa marda adinamika tal-għadam jekk il-livelli ta' PTH jinżammu kronikament taħt il-livell ta' madwar 1.5 drabi taħt il-limitu ta' fuq tan-normal b'analizi għal iPTH. Jekk il-livelli ta' PTH jonqsu taħt il-firxa mmirata rrakkomandata f'pazjenti kkurati b'cinacalcet, id-doża ta' cinacalcet u/jew ta' sterols ta' Vitamina D għandhom jiġu mnaqqsa jew it-terapija għandha titwaqqaf għal kollox.

Livelli ta' testosterone

Livelli ta' testosterone ta' spiss ikunu taħt il-firxa normali f'pazjenti b'mard renali tal-ahhar stadju. Fi studju kliniku ta' pazjenti adulti b'ESRD fuq id-dijalisi, il-livelli ta' testosterone hieles naqsu b'medjan ta' 31.3% fil-pazjenti kkurati b'cinacalcet u b'16.3% fil-pazjenti kkurati bil-plaċebo wara 6 xhur ta' kura. Estensjoni open-label ta' dan l-istudju ma wrietz aktar tnaqqis fil-konċentrazzjoni ta' testosterone hieles u fil-konċentrazzjoni ta' testosterone totali fuq perijodu ta' 3 snin f'pazjenti kkurati b'cinacalcet. Is-sinifikat kliniku ta' dan it-taqqis fit-testosterone fis-serum mhux magħruf.

Indeboliment tal-fwied

Minħabba l-potenzjal ta' livelli ta' cinacalaet fil-plažma darbtejn sa 4 darbiet oħla f'pazjenti b'indeboliment tal-fwied moderat sa sever (klassifikazzjoni Child-Pugh), cinacalcet għandu jintuża b'kawtela f'dawn il-pazjenti u l-kura għandha tiġi ssorveljata mill-vičin (ara sezzjonijiet 4.2 u 5.2).

4.5 Interazzjoni ma' prodotti medicinali oħra u forom oħra ta' interazzjoni

Prodotti medicinali magħrufa li jnaqqsu l-kalċju fis-serum

L-ghoti ta' prodotti medicinali oħra magħrufa li jnaqqsu l-kalċju fis-serum flimkien ma' cinacalcet jista' jwassal għal żieda fir-riskju ta' ipokalċimija (ara sezzjoni 4.4). Pazjenti li jkunu qed jircieu cinacalcet m'għandhomx jingħataw etelcalcetide (ara sezzjoni 4.4).

Effett ta' prodotti medicinali oħra fuq cinacalcet Cinacalcet huwa metabolizzat parzialment mill-enzima CYP3A4. L-ghoti flimkien ma' 200 mg ta' ketoconazole darbtejn kuljum, inibitur qawwi ta' CYP3A4, wassal għal žjeda ta' madwar darbtejn fil-livelli ta' cinacalcet. Jista' jkun hemm bżonn ta' aġġustament fid-doża ta' cinacalcet jekk pazjent li jkun qed jieħu cinacalcet jibda jew iwaqqaf terapija b'inibitura qawwi (eż. ketoconazole, itraconazole, telithromycin, voriconazole, ritonavir) jew induttur (eż. rifampicin) ta' din l-enzima.

Tagħrif *in vitro* jindika li cinacalcet huwa parzialment metabolizzat minn CYP1A2. It-tippiji jinduci CYP1A2; it-tnejħiha ta' cinacalcet instabet li kienet 36-38% oħla f'min ipejjep meta mqabbla ma' dawk li ma jpejpx. L-effett ta' inibitura ta' CYP1A2 (eż. fluvoxamine, ciprofloxacin) fuq il-livelli ta' cinacalcet fil-plažma ma ġiex studjat. Jista' jkun hemm bżonn ta' aġġustament fid-doża jekk pazjent jibda jew jieqaf ipejjep jew meta tinbeda jew titwaqqaf għal kollox kura fl-istess waqt b'inibitura qawwija ta' CYP1A2.

Calcium carbonate: L-ghoti flimkien ma' calcium carbonate (doża waħda ta' 1,500 mg) ma affettwax il-farmakokinetika ta' cinacalcet.

Sevelamer: L-ghoti flimkien ta' sevelamer (2,400 mg tliet darbiet kuljum) ma affettwax il-farmakokinetika ta' cinacalcet.

Pantoprazole: L-ghoti flimkien ta' pantoprazole (80 mg darba kuljum) ma affettwax il-farmakokinetika ta' cinacalcet.

Effett ta' cinacalcet fuq prodotti medicinali oħra Prodotti medicinali metabolizzati mill-enżima P450 2D6 (CYP2D6): Cinacalcet huwa inibitur qawwi ta' CYP2D6. Jista' jkun hemm bżonn ta' aġġustament fid-doża ta' prodotti medicinali ttirriti individwalment, li għandhom indiċi terapewtiku dejjaq u li huma metabolizzati pimarjament minn CYP2D6 (eż., flecainide, propafenone, metoprolol, desipramine, nortriptyline, clomipramine) meta dawn jingħataw flimkien ma' cinacalcet.

Desipramine: L-ghoti ta' 90 mg cinacalcet darba kuljum flimkien ma' 50 mg desipramine, antidepressant triċikliku metabolizzat primarjament minn CYP2D6, żied b'mod sinifikanti l-espozizzjoni għal desipramine bi 3.6 darbiet (90% CI 3.0, 4.4) f'metabolizzaturi estensivi ta' CYP2D6.

Dextromethorphan: F'metabolizzaturi estensivi ta' CYP2D6 doži multipli ta' 50 mg cinacalcet żiedu l-AUC ta' 30 mg dextromethorphan (metabolizzat primarjament minn CYP2D6) bi 11-il darba.

Warfarin: Doži mutlipli orali ta' cinacalcet ma affettwawx il-farmakokinetika jew il-farmakodinamika (kif imkejla mill-ħin prothrombin u l-fattur VII li jgħaqqa id-demm) ta' warfarin.

In-nuqqas ta' effett ta' cinacalcet fuq il-farmakokinetika ta' R- u S-warfarin u n-nuqqas ta' awto-induzzjoni wara dožaġġ multiplu f'pazjenti jindika li cinacalcet mhux induttur ta' CYP3A4, CYP1A2 jew CYP2C9 fil-bnedmin.

Midazolam: L-ghoti ta' cinacalcet (90 mg) flimkien ma' midazolam (2 mg) mogħti b'mod orali, substrat ta' CYP3A4 u CYP3A5, ma biddix il-farmakokinetika ta' midazolam. Din id-dejta tissuġġerixxi li cinacalcet ma jaffettwax il-farmakokinetika ta' dawk il-klassijiet ta' mediciċini li huma mmetabolizzati minn CYP3A4 u CYP3A5, bħal ġerti immunosopressanti, inkluż ciclosporin u tacrolimus.

4.6 Fertilità, tqala u treddiġħ

Tqala

M'hemmx tagħrif kliniku dwar l-użu ta' cinacalcet waqt it-tqala. Studji fuq il-bhejjem ma jurux effetti ta' hsara diretti fuq it-tqala, ħlas jew žvilupp wara t-twelid. Ma dehru l-ebda tossiċitajiet fl-embriju/fetu fi studji li saru b'firien u fnekk tqal bl-eċċeżżjoni ta' tnaqqis fil-piż tal-fetu b'doži assoċjati ma' tossiċitajiet fl-omm (ara sezzjoni 5.3). Cinacalcet Mylan għandu jintuża fit-tqala biss jekk il-benefiċċju potenziali jiġi stiġġiha.

Treddiġħ

Mhux magħruf jekk cinacalcet joħroġx fil-ħalib uman. Cinacalcet joħroġ fil-ħalib ta' firien li jreddgħu bi proporzjon fil-ħalib għall-plażma għoli. Wara valutazzjoni b'attenżjoni tal-benefiċċju u r-riskju, għandha tittieħed deciżjoni jekk jitwaqqafx it-treddiġħ jew jekk titwaqqafx il-kura b'Cinacalcet Mylan.

Fertilità

M'hemmx l-ebda dejta klinika dwar l-effett ta' cinacalcet fuq il-fertilità. Ma kienx hemm effetti fuq il-fertilità fi studji fuq l-annimali.

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u thaddem magni

Sturdament u aċċessjonijiet, li jista' jkollhom effett qawwi ħafna fuq il-ħila biex issuq u thaddem magni, ġew irrapportati minn pazjenti li kienu qed jieħdu cinacalcet (ara sezzjoni 4.4).

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta' sigurtà.

Iperparatirojdiżmu sekondarju, karċinoma tal-paratirojde, u iperparatirojdiżmu primarja

Ibbażata fuq dejta disponibbli minn pazjent li qed jirċievu cinacalcet f'studji kkontrollati b' placebo u studji b'id waħda l-aktar reazzjonijiet avversi rrappurtati b'mod komuni kien tqalligh u rimettar. Fil-maġgoranza tal-pazjenti t-tqalligh u r-rimettar kien hafna fis-severità u temporanji fin-natura. Twaqqif għal kollo tat-terapija minħabba l-effetti mhux mixtieqa kien il-biċċa l-kbira minħabba t-tqalligh u r-rimettar.

Lista f' forma tabulari tar-reazzjonijiet avversi

Reazzjonijiet avversi, kkunsidrati bħala tal-inqas possibilment attribwiti mal-kura b'cinacalcet f'studji ikk Kontrollati b' placebo u studji *single-arm* ibbażati fuq valutazzjoni tal-aqwa evidenza ta' kawżalitā u huma mniżżla hawn taħt skont il-konvenzjoni li ġejja: komuni ħafna ($\geq 1/10$); komuni ($\geq 1/100$ sa < $1/10$); mhux komuni ($\geq 1/1,000$ sa < $1/100$); rari ($\geq 1/10,000$ sa < $1/1,000$); rari ħafna (< $1/10,000$), mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli).

Inċidenza ta' reazzjonijiet avversi minn studji kliniči kkontrollati u esperjenza ta' wara t-tqegħid fis-suq :

Klassi ta' sistemi tal-organi	Komuni ħafna	Komuni	Mhux magħrufa
Disturbi fis sistema immuni		Reazzjonijiet ta' sensittivitā eċċessiva*	
Disturbi fil metabolizmu u n nutrizzjoni		Anoreksja Tnaqqis fl-apptit	
Disturbi fis sistema nervuża		Aċċessjonijiet [†] Sturdament Parasteżja Ugħiġi ta' ras	
Disturbi tal-qalb			Insuffiċjenza tal-qalb li tmur ghall-agħar* [†] Titwil tal-QT u arritmija ventrikulari sekondarja għal ipokalċeimja* [†]
Disturbi vaskularji		Pressjoni baxxa tad-demm	
Disturbi respiratorji, torasiċi u medjastinali		Infezzjoni respiratorja ta' fuq Dispneja Sogħla	
Disturbi gastro intestinali	Tqalligh Rimettar	Dispepsja Dijarea Ugħiġi addominali Ugħiġi addominali - naħha ta' fuq Stitikezza	
Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta' taħt il-ġilda		Raxx	
Disturbi muskolu skeletrali, tat tessut		Ugħiġi fil-muskoli Spażmi muskolarji	

konnnettiv u tal għadam		Ugħiġ fid-dahar	
Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta' mnejn jingħata		Astenja	
Investigazzjonijiet		Ipokalċimija [†] Iperkalimija Tnaqqis fil livelli ta' testosterone [†]	

* ara d-deskrizzjoni tat-taqṣima tar-reazzjonijiet avversi magħżula

[†] ara sezzjoni 4.4

Deskrizzjoni ta' reazzjonijiet avversi magħżula

Reazzjonijiet ta' sensittività eċċessiva

Reazzjonijiet ta' sensittività eċċessiva li jinkludu anġjoedema u urtikarja ġew identifikati waqt l-użu ta' wara t-tqegħid fis-suq ta' cinacalcet, Ma tistax tittieħed stima tal-frekwenzi ta' termini preferuti individwali li jinkludu anġjoedema u urtikarja mid-data disponibbli:

Ipotenjoni u/jew insuffiċjenza tal-qalb tmur ghall-agħar

Kien hemm rapporti ta' każijiet idjosinkratici ta' pressjoni baxxa u/jew insuffiċjenza tal-qalb li sejra ghall-agħar, f'pazjenti b'indeboliment fil-funzjoni tal-qalb li nghataw cinacalcet waqt is-sorveljanza tas-sigurtà ta' wara t-tqegħid fis-suq, il-freqwenza tagħhom ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli.

Titwil ta' QT u arritmija ventrikulari kkawżati minn ipokalċimija

Titwil ta' QT u arritmija ventrikulari kkawżati minn ipokalċimija kienu identifikati waqt l-użu ta' wara t-tqegħid fis-suq ta' cinacalcet, il-freqwenza tagħhom ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli. (ara sezzjoni 4.4)

Populazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà ta' cinacalcet għat-kura ta' HPT sekondarju f'pazjenti pedjatriċi b'ESRD li kienu qed jirċievu d-djalisi ġiet evalwata f'żewġ studji randomised u kkontrollati u fi studju wieħed bi grupp wieħed (ara sezzjoni 5.1). Fost l-individwi pedjatriċi kollha esposti għal cinacalcet fi studji kliniči, total ta' 19-il individwu (24.1%; 64.5 għal kull 100 sena ta' individwu) kellhom mill-inqas avvenimenti avvers wieħed ta' ipokalċimija. Riżultat fatali kien irrapprtatt f'pazjent pedjatriku fi prova klinika b'ipokalċimja severa (ara sezzjoni 4.4).

Cinacalcet Mylan għandu jintuża f'pazjenti pedjatriċi biss jekk il-benefiċċju potenzjali jiġġustifika r-riskju potenzjali.

Rappurtar ta' reazzjonijiet avversi suspettati

Rappurtar ta' reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott medicinali huwa importanti. Din tippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ tal- benefitċju / riskju tal-prodott medicinali. Professjonistil-kura tas-saħħa huma mitluba li jirrapprtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali elenkti fl-[Appendiċi V](#).

4.9 Doža eċċessiva

Doži ttitriti sa 300 mg darba kuljum ingħataw lill-pazjenti adulti li kienu qed jirċievu dijalisi mingħajr riżultat avvers. Doža ta' kuljum ta' 3.9 mg/kg ġiet preskritta lil pazjent pedjatriku li kien qed jirċievi d-djalisi fi studju kliniku b'uġiġ hafif fl-istonku, dardir u rimettar sussegwenti.

Doža eċċessiva ta' cinacalcet tista' twassal għal ipokalċimija. F'każ ta' doža eċċessiva, il-pazjenti għandhom jiġu ssorveljati għal sinjali u sintomi ta' ipokalċimija, u l-kura għandha tkun sintomatika u ta' appoġġ. Minħabba li cinacalcet jinrabat b'mod qawwi mal-proteini, l-emodijali mhix kura effettiva għal doža eċċessiva.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĢIČI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiči

Kategorija farmakoterapewtika: Omeostasi tal-kalċju, sustanzi anti paratirojde. Kodiċi ATC: H05BX01.

Mekkaniżmu ta' azzjoni

Ir-riċettur li jhoss il-kalċju fuq il-wiċċ taċ-ċellula maġġuri tal-glandola paratirojde huwa r-regolatur prinċipali tat-tnixxija ta' PTH. Cinacalcet huwa sustanza kalċjumimetika li jbaxxi direttament il-livelli ta' PTH billi jžid is-sensittivitā tar-riċettur li jhoss il-kalċju għall-kalċju extraċellulari. It-naqqis ta' PTH huwa assoċjat ma' tnaqqis fl-istess waqt fil-livelli tal-kalċju fis-serum.

Tnaqqis fil-livelli ta' PTH jikkorrela mal-konċetrazzjoni ta' cinacalcet.

Wara li jintlaħaq stat stabbli, il-konċentrazzjonijiet tal-kalċju fis-serum jibqgħu kostanti tul l-intervall ta' dožaġġ.

Iperparatirojdizmu Sekondarju

Adulti

Twettqu tliet studji kliniči ta' 6-xhur, double-blind u kkontrollati bil-plaċebo f'pazjenti b'ESRD b'HPT sekondarja mhux ikkontrollata, li kienu qed jirċievu d-dijalisi (n=1,136). Karatteristiċi demografiċi u tal-linja baži kienu rappreżentativi tal-popolazzjoni ta' pazjenti fuq dijalisi b'HPT sekondarja. Konċetrazzjonijiet medji fil-linja baži ta' iPTH tul it-tliet studji kienu 733 u 683 pg/ml (77.8 u 72.4 pmol/l) għall-gruppi ta' cinacalcet u plaċebo, rispettivament. 66% tal-pazjenti kienu qed jirċievu sterols ta' vitamina D fil-bidu tal-istudju, u > 90% kienu qed jirċievu binders tal-fosfat.

Tnaqqis sinifikanti f'iPTH, fil-prodott ta' kalċju-fosforu fis-serum (Ca x P), fil-kalċju, u fil-fosforu kien osservat fil-pazjenti kkurati b'cinacalcet meta mqabbla mal-pazjenti kkurati bil-plaċebo li kienu qed jirċievu kura standard, u r-riżultati kienu konsistenti tul it-tliet studji. F'kull wieħed mill-istudji, il-mira primarja (proporżjon ta' pazjenti b'iPTH ≤ 250 pg/ml (≤ 26.5 pmol/l)) intlahqet minn 41%, 46%, u 35% tal-pazjenti li rċevew cinacalcet, meta mqabbla ma' 4%, 7%, u 6% tal-pazjenti li rċevew il-plaċebo. Madwar 60% tal-pazjenti kkurati b'cinacalcet laħqu tnaqqis ta' $\geq 30\%$ fil-livelli ta' iPTH, u dan l-effett kien konsistenti tul il-firxa tal-livelli ta' iPTH fil-linja baži. It-naqqis medju ta' Ca x P, kalċju, u fosforu fis-serum kien ta' 14%, 7% u 8%, rispettivament.

Tnaqqis f'iPTH u f'Ca x P inżammu sa 12-il xahar ta' kura. Cinacalcet naqqas il-livelli ta' iPTH u ta' Ca x P, tal-kalċju u tal-fosforu indipendentament mill-livell fil-linja baži ta' iPTH jew il-livell ta' Ca x P, modalità ta' dijalisi (PD kontra HD), tul tad-dijalisi, u jekk ingħatawx sterols ta' vitamina D.

Tnaqqis f'PTH kien assoċjat ma' tnaqqis mhux sinifikanti fil-markaturi tal-metabolizmu tal-ġħadam (alkaline phosphatase specifiku għall-ġħadam, N-telopeptide, tibdil tal-ġħadam u fibrozi tal-ġħadam). F'analizi post-hoc ta' dejta miġbura minn studji kliniči ta' 6 xhur u 12-il xahar, l-istimi Kaplan-Meier ta' ksur tal-ġħadam u paratirojdektomija kienu inqas fil-grupp ta' cinacalcet meta mqabbla mal-grupp ta' kontroll.

Studji investigattivi fuq pazjenti b'CKD u HPT sekondarja li mhux qed jirċievu dijalisi ndikaw li cinacalcet naqqas il-livelli ta' PTH b'ammont simili għal dak f'pazjenti b'ESRD u HPT sekondarja li kienu qed jirċievu d-dijalisi. Iżda, l-effikaċċa, is-sigurtà, id-dozi ottimali u l-miri tal-kura ma ġewx stabilliti fil-kura ta' pazjenti b'indeboliment renali qabel id-dijalisi. Dawn l-istudji juru li pazjenti b'CKD li mhux qiegħdin fuq id-dijalisi li jingħataw cinacalcet għandhom riskju akbar ta' ipokalċimija meta mqabbla ma' pazjenti b'ESRD li qed jirċievu d-dijalisi li jingħataw cinacalcet, li jista' jkun minħabba livelli ta' kalċju fil-linja baži aktar baxxi u/jew il-preżenza ta' fdal ta' funzjoni tal-kliewi.

EVOLVE (EValuation Of Cinacalcet Therapy to Lower CardioVascular Events) kien studju kliniku randomized, double-blind biex jevalwa cinacalcet kontra plačebo għat-tnaqqis tar-riskju ta' mortalità mill-kawżi kollha u avvenimenti kardjovaskulari f'3883 pazjent b' HPT sekondarja u CKD li qed jirċievu dijalisi. L-istudju ma ssodisfax l-ġħan primarju tiegħu li juri tnaqqis fir-riskju ta' mortalità mill-kawżi kollha jew avvenimenti kardjovaskulari inkluž infart mijokardijaku, ammissjoni għall-isptar għal angħina instabbi, insuffiċjenza tal-qalb jew avveniment vaskulari periferali (HR 0.93; 95% CI: 0.85, 1.02; p = 0.112). Wara l-aġġustament ghall-karatteristiċi tal-linja bażi f'analizi sekondarja, l-HR għall-endpoint kompost primarju kien 0.88; 95% CI: 0.79, 0.97.

Popolazzjoni pedjatrika

L-effikaċja u s-sigurtà ta' cinacalcet għat-kura ta' HPT sekondarju f'pazjenti pedjatriċi b'ESRD li kienu qed jirċievu id-dijalisi ġew evalwati f'żewġ studji randomised u kkontrollati u fi studju wieħed bi grupp wieħed.

Studju 1 kien studju double-blind, ikkontrollat bil-plačebo li fih 43 pazjent ta' età minn 6 snin sa < 18 il sena kienu randomised biex jirċievu cinacalcet (n = 22) jew plačebo (n = 21). L-istudju kien jikkonsisti minn perjodu ta' titrazzjoni tad-doża ta' 24 ġimħa segwit minn fażi ta' valutazzjoni tal-effikaċja ta' 6 ġimħat (EAP - efficacy assessment phase), u estensjoni open-label ta' 30 ġimħa. L-età medja fil-linja bażi kienet ta' 13-il sena (firxa 6 sa 18-il sena). Il-maġgoranza tal-pazjenti (91%) kienu qed jużaw sterols tal-vitamina D fil-linja bażi. Il-konċentrazzjonijiet medji (SD) ta' iPTH fil-linja bażi kienu 757.1 (440.1) pg/mL għall-grupp ta' cinacalcet u 795.8 (537.9) pg/mL għall-grupp tal-plačebo. Il-konċentrazzjonijiet medji (SD) ta' kalċju totali kkoreġut fis-serum fil-linja bażi kienu 9.9 (0.5) mg/dL għall-grupp ta' cinacalcet u 9.9 (0.6) mg/dL għall-grupp tal-plačebo. Id-doża medja massima ta' kuljum ta' cinacalcet kienet ta' 1.0 mg/kg/jum.

Il-persentaġġ ta' pazjenti li kisbu l-punt finali primarju (tnejt tnaqqis ta' ≥ 30% fl-iPTH medju fil-plažma mil-linja bażi matul l-EAP; ġimħat 25 sa 30) kien ta' 55% fil-grupp ta' cinacalcet u 19.0% fil-grupp tal-plačebo (p = 0.02). Il-livelli medji tal-kalċju fis-serum matul l-EAP kienu fil-firxa normali għall-grupp ta' kura ta' cinacalcet. Dan l-istudju ntemm kmieni minħabba fatalità b'ipokalċemija severa fil-grupp ta' cinacalcet (ara sezzjoni 4.8).

Studju 2 kien studju open-label li fih 55 pazjent ta' età minn 6 sa < 18-il sena (medja ta' 13-il sena) kienu randomised biex jirċievu flimkien ma' kura standard (SOC - standard of care, n = 27) jew SOC waħdu (n = 28). Il-maġgoranza tal-pazjenti (75%) kienu qed jużaw sterols tal-vitamina D fil-linja bażi. Il-konċentrazzjonijiet medji (SD) ta' iPTH fil-linja bażi kienu 946 (635) pg/mL għall-grupp ta' cinacalcet + SOC u 1228 (732) pg/mL għall-grupp ta' SOC. Il-konċentrazzjonijiet medji (SD) ta' kalċju totali kkoreġut fis-serum fil-linja bażi kienu 9.8 (0.6) mg/dL għall-grupp ta' cinacalcet + SOC u 9.8 (0.6) mg/dL għall-grupp ta' SOC. 25 individwu rċivew mill-inqas doża waħda ta' cinacalcet u d-doża massima medja ta' kuljum ta' cinacalcet kienet ta' 0.55 mg/kg/jum. L-istudju ma ssodisfax il-punt finali primarju tiegħu (tnejt tnaqqis ta' ≥ 30% mil-linja bażi fl-iPTH medju fil-plažma matul l-EAP; ġimħat 17 sa 20). Tnejt tnaqqis ta' ≥ 30% mil-linja bażi fl-iPTH medju fil-plažma matul l-EAP intlaħaq minn 22% tal-pazjenti fil-grupp ta' cinacalcet + SOC u 32% tal-pazjenti fil-grupp ta' SOC.

Studju 3 kien studju dwar is-sigurtà ta' 26 ġimħa, open-label, bi grupp wieħed f'pazjenti ta' età minn 8 xhur sa < 6 snin (età medja ta' 3 snin). Pazjenti li kienu qed jirċievu prodotti mediciinali konkomitanti magħrufa li jtaw lu l-intervall QT ikkoreġut ġew eskluzi mill-istudju. Il-piż medju nieħej fil-linja bażi kien ta' 12-il kg. Id-doża tal-bidu ta' cinacalcet kienet ta' 0.20 mg/kg. Il-maġgoranza tal-pazjenti (89%) kienu qed jużaw sterols tal-vitamina D fil-linja bażi.

Sbatax-il pazjent irċevew mill-inqas doża waħda ta' cinacalcet u 11 komplew mill-inqas 12-il ġimħa ta' kura. L-ebda pazjent ma kellu kalċju kkoreġut fis-serum ta' < 8.4 mg/dL (2.1 mmol/L) għall-etajet ta' 2-5 snin. Il-konċentrazzjonijiet ta' iPTH mil-linja bażi ġew imnaqqsa b' ≥ 30% f'71% (12 minn 17) tal-pazjenti fl-istudju.

Karċinoma tal-paratirojde u iperparatirojdiżmu primarju

Fi studju wieħed, 46 pazjent adult (29 b'karċinoma tal-paratirojde u 17 b'HPT primarja u b'iperkalċemija severa (li kienu fallew jew li kellhom kontra-indikazzjoni għall-paratirojdek tomija)

irċevew cinacalcet sa 3 snin (medja ta' 328 ġurnata għall-pazjenti b'karċinoma tal-paratirojde u medja ta' 347 ġurnata għall-pazjenti b'HPT primarja). Cinacalcet ingħata f'firxa ta' doži minn 30 mg darbtejn kuljum sa 90 mg erba' darbiet kuljum. Il-mira pimarja tal-istudju kienet tnaqqis tal-kalċju fis-serum ta' ≥ 1 mg/dL (≥ 0.25 mmol/l). F'pazjenti b'karċinoma tal-paratirojde, il-medja tal-kalċju fis-serum naqset minn 14.1 mg/dl għal 12.4 mg/dl (3.5 mmol/l għal 3.1 mmol/l), filwaqt li f'pazjenti b'HPT primarja, l-livelli ta' kalċju fis-serum naqsu minn 12.7 mg/dl għal 10.4 mg/dl (3.2 mmol/l għal 2.6 mmol/l). Tmntax (18) minn 29 pazjent (62%) b'karċinoma tal-paratirojde u 15 minn 17-il individwu (88%) b'HPT primarja laħqu tnaqqis tal-kalċju fis-serum ta' ≥ 1 mg/dl (≥ 0.25 mmol/l).

Fi studju kkontrollat bi plaċebo ta' 28 ġimġha, 67 pazjent adult b'HPT primarja li ssodisfaw il-kriterji għal paratirojdettomija abbażi ta' calcium fis-serum totali kkoreġut (> 11.3 mg/dl (2.82 mmol/l) iżda ≤ 12.5 mg/dl (3.12 mmol/l), iżda li ma setgħux jagħmlu paratirojdettomija kienu inkluži. Cinacalcet inbeda f'doża ta' 30 mg darbtejn kuljum u ġie ttitrat biex tinżamm konċentrazzjoni totali korretta ta' calcium fis-serum fil-medda normali. Perċentwali oghla b'mod sinifikanti ta' pazjenti kkurati b'cinacalcet laħqu total medju kkoreġut ta' konċentrazzjoni ta' calcium fis-serum ta' ≤ 10.3 mg/dl (2.57 mmol/l) u tnaqqis ta' ≥ 1 mg/dl (0.25 mmol/l) mil-linja bażi medja kkoreġuta ta' konċentrazzjoni totali ta' calcium fis-serum, meta mqabbla mal-pazjenti kkurati bil-plaċebo (75.8% kontra 0% u 84.8% kontra 5.9% rispettivament).

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Wara għoti orali ta' cinacalcet, il-konċentrazzjoni massima fil-plažma ta' cinacalcet tintlaħaq f'madwar sagħtejn sa 6 sigħat.

Ibbażat fuq paragun ta' bejn l-istudji, il-bijodisponibilità assoluta ta' cinacalcet f'pazjenti sajma kienet stmati li hi madwar 20-25%. Għoti ta' cinacalcet mal-ikel wassal għal żieda ta' madwar 50 – 80% fil-bijodisponibilità ta' cinacalcet. Iż-żiediet fil-konċentrazzjoni ta' cinacalcet fil-plažma huma simili, ikun kemm ikun il-kontenut ta' xaham fl-ikel.

F'doži oghla minn 200 mg, l-assorbiment kien saturat probabbilment minħabba solubilità baxxa.

Distribuzzjoni

Il-volum ta' distribuzzjoni huwa għoli (madwar 1,000 litru), u dan jindika distribuzzjoni estensiva. Madwar 97% ta' cinacalcet huwa marbut mal-proteini tal-plažma u ftit li xejn jiġi distribwit fiċ-ċelluli l-homor tad-demm.

Wara l-assorbiment, il-konċentrazzjonijiet ta' cinacalcet jonqsu b'mod bifażiku b'*half-life* tal-bidu ta' madwar 6 sigħat u *half-life* terminali ta' 30 sa 40 siegħa. Livelli ta' cinacalcet fi stat fiss jintlaħqu fi żmien 7 ijiem b'akkumulazzjoni minima. Il-farmakokinetika ta' cinacalcet ma tinbidilx maż-żmien.

Bijotrasformazzjoni

Cinacalcet jiġi metabolizzat minn bosta enzimi, primarjament CYP3A4 u CYP1A2 (il-kontribuzzjoni ta' CYP1A2 għadha ma ġietx ikkaratterizzata klinikament). Il-metaboliti prinċipali fiċ-ċirkulazzjoni huma inattivi.

Ibbażat fuq dejta *in vitro*, cinacalcet huwa inibitur qawwi ta' CYP2D6, iżda f'konċentrazzjonijiet mil-huqa klinikament, la huwa inibitura ta' enzimi ta' CYP oħra, inkluż CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, u CYP3A4, u lanqas induttur ta' CYP1A2, CYP2C19 u CYP3A4.

Eliminazzjoni

Wara għoti ta' doža radjutikketjata ta' 75 mg lill-voluntiera f'saħħithom, cinacalcet kien metabolizzat malajr u estensivament permezz ta' ossidazzjoni segwit minn konjugazzjoni. Tnejħiha renali tal-metaboliti kienet ir-rotta primarja għall-eliminazzjoni tar-radjuattività. Madwar 80% tad-doža kienet ir-kuprata fl-awrina u 15% fl-ippurgar.

Linearità/nuqqas ta' linearità

L-AUC u C_{max} ta' cinacalcet jiżdiedu, bejn wieħed u ieħor b'mod lineari fuq il-firxa ta' doži ta' 30 sa 180 mg darba kuljum.

Relazzjoni(jiet) farmakokinetiči/farmakodinamiċi

Ftit wara d-dožagg, PTH jibda jonqos sa l-aktar livell baxx f'madwar sagħatejn sa 6 sifha wara d-doža, li jikkorrispondi ma' C_{max} ta' cinacalcet. Minn hemm 'l quddiem, kif il-livelli ta' cinacalcet jibdew jonqsu, il-livelli ta' PTH jiżdiedu sa 12-il siegha wara d-doža, u wara s-soppressjoni ta' PTH tibqa' bejn wieħed u ieħor kostanti sal-aħħar tal-intervall ta' dožagg ta' darba kuljum. Il-livelli ta' PTH fil-provi kliniči b'cinacalcet tkejjlu fl-aħħar tal-intervall ta' dožagg.

Popolazzjonijiet Specjali

Anzjani

M'hemmx differenzi klinikament rilevanti fil-farmakokinetika ta' cinacalcet minħabba l-età.

Insuffiċjenza tal-Kliewi

Il-profil farmakokinetiku ta' cinacalcet f'pazjenti b'insuffiċjenza tal-kliewi ħafifa, moderata u severa, u dawk fuq emodijalisi jew dijalisi tal-peritoneu huwa komparabbi ma' dak f'voluntiera b'saħħithom.

Insuffiċjenza tal-Fwied

Indeboliment ħafif tal-fwied ma affettwax il-farmakokinetika ta' cinacalcet b'mod notevoli. Meta mqabbla ma' individwi b'funzjoni normali tal-fwied, l-AUC medja ta' cinacalcet kienet madwar darbejn ogħla f'individwi b'indeboliment moderat u madwar 4-darbiet ogħla f'individwi b'indeboliment sever. F'pazjenti b'indeboliment moderat u sever tal-fwied, il-half-life medja ta' cinacalcet hija mtawwla bi 33% u 70% rispettivament. Ir-rabta ta' cinacalet mal-proteini mhix affettwata minn funzjoni tal-fwied indebolita. Minħabba li d-doži huma ttitrati għal kull individwu ibbażat fuq parametri ta' siġurtà u effikaċja, mhux neċċesarju aktar aġġustament fid-doża għall-individwi b'indeboliment tal-fwied (are sezzjonijiet 4.2 u 4.4).

Sess

Tneħħija ta' cinacalcet tista' tkun inqas fin-nisa milli fl-irġiel. Minħabba li d-doži huma ttitrati għal kull indiwiu, mhux neċċesarju aktar aġġustament fid-doża bbażat fuq is-sess.

Popolazzjoni Pedjatrika

Il-farmakokinetika ta' cinacalcet għiet studjata f'pazjenti pedjatriċi b'ESRD li jircieu d-dijalisi ta' età minn 3 snin sa 17-il sena. Wara doži orali singoli u multipli ta' cinacalcet darba kuljum, il-konċentrazzjonijiet ta' cinacalcet fil-plażma (valuri ta' C_{max} u AUC wara normalizzazzjoni bid-doża u l-piż) kienu simili għal dawk osservati f'pazjenti adulti.

Saret analiżi tal-farmakokinetika tal-popolazzjoni biex jiġu evalwati l-effetti tal-karatteristiċi demografiċi. Din l-analiżi ma wrriet l-ebda impatt sinifikanti tal-età, sess, razza, erja tas-superficje tal-ġisem u piż-żisem fuq il-farmakokinetika ta' cinacalcet.

Tipjip

It-tneħħija ta' cinacalcet hija ogħla f'min ipejjep milli f'min ma jpejjip, probabbilment minħabba induzzjoni ta' metabolizmu medjat minn CYP1A2. Jekk pazjent jieqaf jew jibda jpejjep, il-livelli ta' cinacalcet fil-plażma jistgħu jinbidlu u jista' jkun neċċesarju aġġustament fid-doża.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Cinacalcet ma kienx teratoġeniku fil-fniek meta nghata f'doża li fuq baži tal-AUC kienet 0.4 drabi id-doža massima tal-kura ta' HPT sekondarja fil-bniedem (180 mg kuljum). Fuq baži tal-AUC, id-doža mhux teratoġenika fil-firien kienet 4.4 darbiet id-doža massima għal HPT sekondarja. Ma kienx hemm effetti fuq il-fertility fl-irġiel jew n-nisa f'espōzżizzjonijiet sa 4 darbiet id-doža umana ta' 180 mg/kuljum (margini ta' siġurtà fil-popolazzjoni żgħira ta' pazjenti mogħtija id-doža klinika massima ta' 360 mg kuljum tkun madwar nofs dawk mogħtija hawn fuq).

F'firien tqal, fl-oghla doža kien hemm tnaqqis žgħar fil-piż tal-ġisem u fl-ammont ta' ikel meħud. Tnaqqis fil-piż tal-feti deher fil-firien f'doži fejn l-ommijiet kellhom ipokalċimija severa. Cinacalcet intwera li jaqsam il-barriera tal-plaċenta fil-fniek.

Cinacalcet ma wera l-ebda potenzjal ġenotossiku jew karċinoġeniku. Il-marġini ta' siġurtà minn studji tossikologiċi huma żgħar minħabba ipokalċimija li tillimita d-doža osservata f'mudelli ta' annimali. Katarretti u opaċitajiet fil-lenti kienu osservati fl-istudji ta' tossikoloġija u karċenogeniċità fil-firien b'doža ripetuta, iżda ma kienu osservati fil-klieb jew xadini jew fi studji klinici fejn il-formazzjoni tal-katarretti kienet issorveljata. Katarretti huma magħrufa li jseħħu fil-firien minħabba ipokalċimija.

Fi studji *in vitro*, valuri ta' IC₅₀ għat-trasportatur ta' serotonin u tal-kanali K_{ATP} instabu li kienu 7 u 12 -il darba ikbar rispettivament mill-EC₅₀ tar-riċettur li jħoss il-kalċju, miġbura taħt l-istess kundizzjonijiet sperimentalni. Ir-rilevanza klinika mhux magħrufa, iżda, il-potenzjal għal cinacalcet biex jaħdem fuq dawn il-miri sekondarji ma jistax jiġi eskluż kompletament.

Fi studji dwar l-effett tossiku fi klieb frieħ, kienu osservati roghda sekondarja għal tnaqqis tal-kalċju fis-serum, emesi, tnaqqis fil-piż tal-ġisem u żieda fil-piż tal-ġisem, tnaqqis fil-massa ta' ċelluli ħomor, tnaqqis ħafif fil-parametri ta' densitometrija tal-ghadam, twessiġħ riversibbli tal-growth plates tal-ghadaml it-twıl, u bidliet limfojdi istologiči (ristretti ghall-kavità toraċika u attribwiti ghall-emesi kronika). Dawn l-effetti kollha kienu ossevati b'espontenit sistemiku, fuq bażi ta' AUC, bejn wieħed u iehor ekwivalenti ghall-esponiment f'pazjenti bid-doža massima għal HPT sekondarju.

6. TAGHRIF FARMAČEWTIKU

6.1 Lista ta' eċċipjenti

Qalba tal-pillola:

Cellulose, microcrystalline
Silica, colloidal anhydrous
Povidone
Crospovidone (tip A)
Magnesium stearate

Kisja b'rita:

Hypromellose
Titanium dioxide (E171)
Triacetin
Indigo carmine aluminium lake (E132)
Iron oxide yellow (E172)

6.2 Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Din il-mediċina m'għandhiex bżonn ħażna speċjali.

6.5 In-natura tal-kontenit u ta' dak li hemm go fih

Cinacalcet Mylan 30 mg, 60 mg u 90 mg pilloli miksijsa b'rita

Folji tal-PVC / PVdC / Alu ta '28 pillola miksijsa b'rita u folji perforati ta' doža ta 'unità ta' 28 x 1, 30 x 1 u 84 x 1 pilloli.

Cinacalcet Mylan 30 mg pilloli miksijsa b'rita

Flixkun HDPE b'ghatu ta 'ghatu bil-kamin tal-polypropylene (PP) b'inforra li tissigilla bl-induzzjoni li fiha 100 pillola miksijsa b'rita.

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

Kull fdal tal-prodott medicinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa' wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitkolu l-ligħiġiet lokali

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Mylan Pharmaceuticals Limited
Damastown Industrial Park,
Mulhuddart, Dublin 15,
DUBLIN
L-Irlanda

8. NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/1/15/1054/001
EU/1/15/1054/002
EU/1/15/1054/003
EU/1/15/1054/004
EU/1/15/1054/005
EU/1/15/1054/006
EU/1/15/1054/007
EU/1/15/1054/008
EU/1/15/1054/009
EU/1/15/1054/010
EU/1/15/1054/011
EU/1/15/1054/012
EU/1/15/1054/013
EU/1/15/1054/014

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĞDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 19 Novembru 2015
Data tal-ahħar tiġid: 24 ta' Settembru 2020

10. DATA TA' REVIŽJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediciñali tinsab fuq is-sit elettroniku ta l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini <http://www.ema.europa.eu>.

ANNESS II

- A. MANIFATTUR(I) RESPONSABBLI GHALL-HRUġ TAL-LOTT**
- B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD IL-PROVVISTA U L-UŽU**
- C. KONDIZZJONIJIET U REKWIŻITI OHRA TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**
- D. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FIR-RIGWARD TAL-UŽU SIGUR U EFFIKAČI TAL-PRODOTT MEDIĆINALI**

A. MANIFATTUR(I) RESPONSABBLI GHALL-HRUĞ TAL-LOTT

Isem u indirizz tal-manifattur(i) responsabbi għall-hruġ tal-lott.

Mylan Hungary Kft
H-2900 Komárom, Mylan utca 1
L-Vengrija

McDermott Laboratories Limited li jagħmlu l-kummerċ bħala Gerard Laboratories
35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13
L-Irlanda

Mylan Germany GmbH
Zweigniederlassung Bad Homburg v. d. Hoehe, Benzstrasse 1
Bad Homburg v. d. Hoehe
Hessen, 61352,
Germany

Fuq il-fuljett ta' tagħrif tal-prodott medicinali għandu jkun hemm l-isem u l-indirizz tal-manifattur responsabbi għall-hruġ tal-lott konċernat.

B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD IL-PROVVISTA U L-UŻU

Prodott medicinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

C. KONDIZZJONIJIET U REKWIŻITI OHRA TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

- Rapporti Perjodiċi Aġġornati dwar is-Sigurtà (PSARs)**

Ir-rekwiżiti tar-PSARs għal dan il-prodott medicinali huma mniżzla fil-lista tad-dati ta' referenza tal-Unjoni (lista EURD) prevista skont l-Artikolu 107c(7) tad-Direttiva 2001/83/KE u kwalunke aġġornament sussegwenti ppubblikati fuq il-portal elettroniku Ewropew tal-medicini.

D. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FIR-RIGWARD TAL-UŻU SIGUR U EFFIKAĊI TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

- Pjan tal-ġestjoni tar-riskju (RMP)**

L- detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għandu jwettaq l-attivitajiet u l-interventi meħtieġa ta' farmakovigilanza dettaljati fl-RMP maqbûl ippreżentat fil-Modulu 1.8.2 tal-awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u kwalunkwe aġġornament sussegwenti maqbûl tal-RMP.

RMP aġġornat għandu jiġi ppreżentat:

- Meta l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini titlob din l-informazzjoni;
- Kull meta s-sistema tal-ġestjoni tar-riskju tiġi modifikata specjalment minħabba li tasal informazzjoni ġidha li tista' twassal għal bidla sinifikanti fil-profil bejn il-benefiċċjuu r-riskju jew minħabba li jintlaħaq għan importanti (farmakovigilanza jew minimizzazzjoni tar-riskji).

ANNESS III
TIKKETTAR U FULJETT TA' TAGHRIF

A. TIKKETTAR

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**KARTUNA TA' 'BARRA GHAL (BLISTERS)****1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĆINALI**

Cinacalcet Mylan 30 mg pilloli miksija b'rita
cinacalcet

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b'rita fiha 30 mg ta' cinacalcet (bħala hydrochloride).

3. LISTA TA' EĊċIPJENTI**4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT**

Pilloli miksija b'rita

28 pillola miksija b'rita
28 x 1 pillola miksija b'rita
30 x 1 pillola miksija b'rita
84 x 1 pillola miksija b'rita

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Użu orali.

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEċJALI LI L-PRODOTT MEDIĆINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhix u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEċJALI OHRA, JEKK MEHTIEĞA**8. DATA TA' SKADENZA**

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĆJALI DWAR KIF GHANDU JINHAŽEN**10. PREKAWZJONIJIET SPEĆJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĆINALI MHUX UŽATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĆINALI, JEKK HEMM BŻONN****11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

Mylan Pharmaceuticals Limited
Damastown Industrial Park,
Mulhuddart, Dublin 15,
DUBLIN
L-Irlanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/1/15/1054/001 (28 pillola)
EU/1/15/1054/003 (28 x 1 pillola)
EU/1/15/1054/004 (30 x 1 pillola)
EU/1/15/1054/011 (84 x 1 pillola)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĢENERALI TA' KIF JINGHATA**15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŽU****16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE**

Cinacalcet Mylan 30 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:
SN:

NN:

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĆINALI

Cinacalcet Mylan 30 mg pilloli miksija b'rita
cinacalcet

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Mylan Pharmaceuticals Limited

3. DATA TA' SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OHRAJN

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**KARTUNA TA' BARRA GHALL-FLIXKUN****1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĆINALI**

Cinacalcet Mylan 30 mg pilloli miksija b'rita
cinacalcet

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull pillola miksija b'rita fiha 30 mg ta' cinacalcet (bħala hydrochloride).

3. LISTA TA' ECĆIPJENTI**4. GHAMLA FARMAČEWTIKA U KONTENUT**

Pilloli miksija b'rita

100 pillola miksija b'rita

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Użu orali.

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEċJALI LI L-PRODOTT MEDIĆINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEċJALI OHRA, JEKK MEHTIEĞA**8. DATA TA' SKADENZA**

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEċJALI TA' KIF JINHAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĆJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĆINALI MHUX UŽATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĆINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Mylan Pharmaceuticals Limited
Damastown Industrial Park,
Mulhuddart, Dublin 15,
DUBLIN
L-Irlanda

12. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/1/15/1054/014

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĢENERALI TA' KIF JINGHATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŽU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Cinacalcet Mylan 30 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluž.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC
SN
NN

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT**TIKKETTA - FLIXKUN****1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĆINALI**

Cinacalcet Mylan 30 mg pilloli miksija b'rita
cinacalcet

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull pillola miksija b'rita fiha 30 mg ta' cinacalcet (bħala hydrochloride).

3. LISTA TA' ECĆIPJENTI**4. GHAMLA FARMAĆEWTIKA U KONTENUT**

Pilloli miksija b'rita

100 pillola miksija b'rita

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Użu orali.

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEċJALI LI L-PRODOTT MEDIĆINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEċJALI OHRA, JEKK MEHTIEĞA**8. DATA TA' SKADENZA**

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEċJALI TA' KIF JINHAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĆJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĆINALI MHUX UŽATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĆINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Mylan Pharmaceuticals Limited
Damastown Industrial Park,
Mulhuddart, Dublin 15,
DUBLIN
L-Irlanda

12. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/1/15/1054/014

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĢENERALI TA' KIF JINGHATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŽU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT IMMEDJAT**Flixkun TIKKETTA bil-Kaxxa Blu -MESS MINN KARTUNA TA 'BARRA****1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĆINALI**

Cinacalcet Mylan 30 mg pilloli miksija b'rita
cinacalcet

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b'rita fiha 30 mg ta' cinacalcet (bħala hydrochloride).

3. LISTA TA' EĆCIPJENTI**4. GHAMLA FARMAČEWTIKA U KONTENUT**

Pilloli miksija b'rita

100 pillola miksija b'rita

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Użu orali.

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEċJALI LI L-PRODOTT MEDIĆINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEċJALI OHRA, JEKK MEHTIEĞA**8. DATA TA' SKADENZA**

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEċJALI DWAR KIF GHANDU JINHAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĆJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĆINALI MHUX UŽATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĆINALI, JEKK HEMM BŽONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGLID FIS-SUQ

Mylan Pharmaceuticals Limited
Damastown Industrial Park,
Mulhuddart, Dublin 15,
DUBLIN
L-Irlanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGLID FIS-SUQ

EU/1/15/1054/002

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĢENERALI TA' KIF JINGHATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŽU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Cinacalcet Mylan 30 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:
SN:
NN:

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**KARTUNA TA' BARRA GHALL-FOLJI****1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĆINALI**

Cinacalcet Mylan 60 mg pilloli miksija b'rita
cinacalcet

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b'rita fiha 60 mg ta' cinacalcet (bħala hydrochloride).

3. LISTA TA' EĊċIPJENTI**4. GHAMLA FARMAČEWTIKA U KONTENUT**

Pilloli miksija b'rita

28 Pillola miksija b'rita
28 x 1 Pillola miksija b'rita
30 x 1 Pillola miksija b'rita
84 x 1 Pillola miksija b'rita

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Użu orali.

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEċJALI LI L-PRODOTT MEDIĆINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEċJALI OHRA, JEKK MEHTIEĞA**8. DATA TA' SKADENZA**

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĆJALI DWAR KIF GHANDU JINHAŽEN**10. PREKAWZJONIJIET SPEĆJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĆINALI MHUX UŽATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĆINALI, JEKK HEMM BŻONN****11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

Mylan Pharmaceuticals Limited
Damastown Industrial Park,
Mulhuddart, Dublin 15,
DUBLIN
L-Irlanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/1/15/1054/005 (28 pillola)
EU/1/15/1054/006 (28 x 1 pillola)
EU/1/15/1054/007 (30 x 1 pillola)
EU/1/15/1054/012 (84 x 1 pillola)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĜENERALI TA' KIF JINGHATA**15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŽU****16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE**

Cinacalcet Mylan 60 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluž.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:
SN:

NN:

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI

Cinacalcet Mylan 60 mg pilloli miksija b'rita
cinacalcet

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEKGHD FIS-SUQ

Mylan Pharmaceuticals Limited

3. DATA TA' SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OHRAJN

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**KARTUNA TA' BARRA GHALL-FOLJI****1. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI**

Cinacalcet Mylan 90 mg pilloli miksija b'rita
cinacalcet

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b'rita fiha 90 mg ta' cinacalcet (bħala hydrochloride).

3. LISTA TA' EĆCIPJENTI**4. GHAMLA FARMAČEWTIKA U KONTENUT**

Pilloli miksija b'rita

28 Pillola miksija b'rita

28 x 1 Pillola miksija b'rita

30 x 1 Pillola miksija b'rita

84 x 1 Pillola miksija b'rita

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Użu orali.

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEċJALI LI L-PRODOTT MEDICINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhix u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEċJALI OHRA, JEKK MEHTIEĞA**8. DATA TA' SKADENZA**

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEċJALI DWAR KIF GHANDU JINHAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĆJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDICINALI MHUX UŽATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDICINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGLID FIS-SUQ

Mylan Pharmaceuticals Limited
Damastown Industrial Park,
Mulhuddart, Dublin 15,
DUBLIN
L-Irlanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGLID FIS-SUQ

EU/1/15/1054/008 (28 pillola)

EU/1/15/1054/009 (28 x 1 pillola)

EU/1/15/1054/010 (30 x 1 pillola)

EU/1/15/1054/013 (84 x 1 pillola)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĜENERALI TA' KIF JINGHATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŽU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Cinacalcet Mylan 90 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI

Cinacalcet Mylan 90 mg pilloli miksija b'rita
cinacalcet

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEKGHD FIS-SUQ

Mylan Pharmaceuticals Limited

3. DATA TA' SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OHRAJN

B. FULJETT TA' TAGHRIF

Fuljett ta' tagħrif: Informazzjoni għall-pazjent

Cinacalcet Mylan 30 mg pilloli miksija b'rita

Cinacalcet Mylan 60 mg pilloli miksija b'rita

Cinacalcet Mylan 90 mg pilloli miksija b'rita

cinacalcet

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tieħu din il-mediċina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terga' taqrab.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar jew l-infermier tiegħek.
- Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek biss. M'għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista' tagħmlilhom il-ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sinjal ta' mard bħal tiegħek.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib, lill-ispiżjar jew l-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li m'huxiex elenkat f'dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F'dan il-fuljett

1. X'inhu Cinacalcet Mylan u għalxiex jintuża
2. X'għandek tkun taf qabel ma tieħu Cinacalcet Mylan
3. Kif għandek tieħu Cinacalcet Mylan
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif taħżeen Cinacalcet Mylan
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1. X'inhu Cinacalcet Mylan u għalxiex jintuża

Cinacalcet Mylan fih is-sustanza attiva cinacalcet, li taħdem billi tikkontrolla l-livelli tal-ormon paratirojde (PTH), calcium u phosphorous fil-ġisem tiegħek. Jintuża biex jikkura problemi ta' organi magħrufa bħala glandoli paratirojdi. Il-paratirojdi huma erba' glandoli żgħar fl-ġħonq, ħdejn il-glandola tat-tirojde li jipproċu l-ormon tal-paratirojde (PTH).

Cinacalcet Mylan jintuża fl-adulti:

- għall-kura ta' iperparatirojdiżmu sekondarju f'adulti b'mard serju tal-kliewi li jeħtieġu dijalisi biex inaddfu d-demm tagħhom.
- biex inaqqas livelli għolja ta' kalċju fid-demm (iperkalċimija) f'pazjenti adulti b'kanċer tal-paratirojde.
- biex inaqqas livelli għoljin ta' calcium fid-demm (iperkalċemija) f'pazjenti adulti b'ipperparatirojdiżmu primarju meta t-neħħija tal-glandola paratirojde ma tkunx possibbli.

Cinacalcet Mylan jintuża fi tfal ta' età minn 3 snin sa inqas minn 18-il sena:

- biex jittratta iperparatirojdiżmu sekondarju f'pazjenti b'mard serju tal-kliewi li jeħtieġu d-dijalisi biex inaddfu d-demm tagħhom minn prodotti ta' skart, li l-kondizzjoni tagħhom ma tkunx ikkontrollata bi kurai oħra.

F'ipperparatirojdiżmu primarju u sekondarju jiġi magħmul wisq PHT mill-glandoli paratirojdi.

“Primarju” jfisser li l-ipperparatirojdiżmu mhux ikkawżat minn xi kundizzjoni oħra u “sekondarju” jfisser li l-ipperparatirojdiżmu huwa kkawżat minn kundizzjoni oħra, eż., mard tal-kliewi. Kemm ipperparatirojdiżmu primarju kif ukoll dak sekondarju jista' jikkawża t-telf ta' kalċju mill-ġħadam, li jista' jwassal għall-uġġi fl-ġħadam u ksur, problemi bil-kanali tad-demm u tal-qalb, ġebel fil-kliewi, mard mentali u koma.

2. X'għandek tkun taf qabel ma tieħu Cinacalcet Mylan

Tieħux Cinacalcet Mylan

- Jekk inti allergiku għal cinacalcet jew għal xi sustanza oħra ta' din il-mediċina (elenkati fis-sezzjoni 6).
- jekk għandek livelli baxxi ta' kalċju fid-demm tiegħek. It-tabib tiegħek se jimmonitorja l-livelli tal-kalċju fid-demm tiegħek.

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib, l-ispiżjar jew l-infermier tiegħek qabel tieħu Cinacalcet Mylan.

Qabel ma tibda tieħu Cinacalcet Mylan, għid lit-tabib tiegħek jekk għandek jew jekk qatt kellek:

- aċċessjonijiet (attakk epilettiku jew konvulżjonijiet). Ir-riskju li jkollok aċċessjonijiet huwa akbar jekk ga kellek dan qabel;
- problemi tal-fwied;
- insuffiċjenza tal-qalb.

Cinacalcet Mylan inaqqas il-livelli tal-kalċju. Avvenimenti ta' theddid għall-ħajja u riżultati fatali assoċjati ma' livell baxx ta' kalċju (ipokalċimija) ġew irrapportati f'adulti u tfal kkurati b'cinacalcet.

Jekk jogħġbok għid lit-tabib tiegħek jekk ikollok esperjenza ta' xi wieħed minn dawn li ġejjin li jistgħu jkunu sinjali ta' livelli baxxi ta' kalċju: spażmi, kontrazzjonijiet jew bugħawwieg fil-muskoli tiegħek, jew tnemnim jew tingiż fis-swaba' ta' idejk, fis-swaba' ta' saqajk jew madwar ħalqek jew aċċessjonijiet, konfużjoni jew telf ta' koxjenza waqt li tkun qed tiġi ttrattat b'Cinacalcet Mylan.

Livelli ta' kalċju baxxi jista' jkollhom effett fuq ir-ritmu tal-qalb tiegħek. Għid lit-tabib tiegħek jekk ikollok taħbi tal-qalb aktar mgħażżeġ jew qawwi mis-soltu, jekk għandek problemi fir-ritmu tal-qalb, jew jekk tieħu mediċini magħrufa li jikkawżaw problemi fir-ritmu tal-qalb, waqt li qed tieħu Cinacalcet Mylan.

Għal aktar informazzjoni ara sezzjoni 4.

Waqt kura b'Cinacalcet Mylan, għid lit-tabib tiegħek:

- jekk tibda jew tieqaf tpejjep, għax dan jista' jaffettwa il-mod kif jaħdem Cinacalcet Mylan.

Tfal uadoloxxenti

Tfal taħt l-ettà ta' 18-il sena b'kancer fil-paratirojde jew iperparatirojdiżmu primarju m'għandhomx jieħdu Cinacalcet Mylan.

Jekk qed tiġi ttrattat għal iperparatirojdiżmu sekondarju, it-tabib tiegħek għandu jimmonitorja l-livelli tal-kalċju tiegħek qabel ma tibda t-kura b'Cinacalcet Mylan u waqt it-kura b'Cinacalcet Mylan. Għandek tgħarrraf lit-tabib tiegħek jekk ikollok xi sinjali ta' livelli baxxi ta' kalċju kif deskrirt hawn fuq.

Huwa importanti li tieħu d-doża tiegħek ta' Cinacalcet Mylan kif rakkommandat mit-tabib tiegħek.

Nota:

Għal tfal li jeħtiegu doži aktar baxxi minn 30 mg, jew li ma jistgħux jibilgħu l-pilloli, jistgħu jkunu disponibbli qawwiet/ghamliet farmaċewtici oħrajn ta' cinacalcet.

Mediċini oħra u Cinacalcet Mylan

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qiegħed tieħu, hadt dan l-ahħar jew tista' tieħu xi mediċini oħra speċjalment etelcalcetide jew xi mediċini oħra li jbaxxu l-livelli tal-kalċju fid-demm tiegħek.

M'għandekx tirċievi Cinacalcet Mylan flimkien ma' etelcalcetide.

Għid lit-tabib tiegħek jekk qiegħed tieħu l-mediċini li ġejjin:

Mediċini bħal dawn jistgħu jaffettwaw il-mod kif jaħdem Cinacalcet Mylan:

- mediċini wżati għall-kura ta' infezzjonijiet tal-ġilda u infezzjonijiet ikkawżati minn fungu (ketoconazole, itraconazole u voriconazole);
- mediċini wżati għall-kura ta' infezzjonijiet ikkawżati mill-batterja (telithromycin, rifampicin u ciprofloxacin);
- mediċina wżata għall-kura ta' infezzjoni tal-HIV u AIDS (ritanovir);
- mediċina wżata għall-kura tad-depressjoni (fluvoxamine).

Cinacalcet Mylan jista' jaffettwa kif jaħdmu mediċini bħal dawn li ġejjin:

- mediċini wżati għall-kura tad-depressjoni (amitriptyline, desipramine, nortriptyline u clomipramine);
- mediċina wżata biex ittaffi s-sogħla (dextromethorphan);
- mediċini wżati għall-kura ta' tibdil fir-rata tal-qalb (flecainide u propafenone);
- mediċina wżata għall-kura ta' pressjoni għolja tad-demm (metoprolol);

Cinacalcet Mylan ma' ikel u xorb

Cinacalcet Mylan għandu jittieħed mal-ikel jew eżatt wara l-ikel.

Tqala, treddiġi u fertilità

Jekk inti tqila jew qed tredda', taħseb li tista tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir tat-tabib jew tal-ispiżjar tiegħek qabel tieħu din il-mediċina.

Cinacalcet ma ġiex ittestjat f'nis ta' tqal. F'każ ta' tqala, it-tabib tiegħek jista' jiddeċidi li jimmodifika il-kura tiegħek, minħabba li cinacalcet tista' tagħmel ħsara lit-tarbija li għadha ma twelditx.

Mhux magħruf jekk cinacalcet jitneħħiex fil-ħalib uman. It-tabib tiegħek se jiddiskuti miegħek jekk għandekx twaqqaq it-treddiġi jew il-kura b'Cinacalcet Mylan.

Sewqan u thaddim ta' magni

Ĝew irrapprtati każżejjiet ta' sturdament u aċċessjonijiet minn pazjenti li kienu qed jieħdu cinacalcet. Jekk ikollok esperienza ta' dawn l-effetti sekondarji, issuqx u thaddimx magni.

3. Kif għandek tieħu Cinacalcet Mylan

Dejjem għandek tieħu din il-mediċina skont il-parir eżatt tat-tabib jew l-ispiżjar tiegħek. Iċċekkja mat-tabib jew mal-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju. It-tabib tiegħek ser jghidlik kemm għandek tieħu Cinacalcet Mylan.

Cinacalcet Mylan għandu jittieħed mill-ħalq, mal-ikel jew ffit wara l-ikel. Il-pilloli għandhom jittieħdu shah u m'għandhomx jintmagħdu, jitfarrku jew jinqasmu.

It-tabib tiegħek se jieħu kampjuni tad-demm regolari waqt il-kura biex jissorvelja l-progress tiegħek u ser jaġġusta id-doża tiegħek skont il-bżonn

Jekk qed tiġi kkurat għall-iperparatirojdiżmu sekondarju

Id-doża rakkomanda tal-bidu ta' Cinacalcet Mylan fl-adulti hija 30 mg (pillola waħda) darba kuljum.

Id-doża rakkomanda tal-bidu ta' Cinacalcet Mylan għal tfal ta' età minn 3 snin sa inqas minn 18-il sena ma tkunx aktar minn 0.20 mg/kg ta' piż tal-ġisem kuljum.

Jekk qed tiġi kkurat għall-kanċer fil-paratirojde jew għall-iperparatirojdiżmu primarju

Id-doża rakkomanda tal-bidu ta' Cinacalcet Mylan fl-adulti hija 30 mg (pillola waħda) darbejn kuljum.

Jekk tieħu Cinacalcet Mylan aktar milli suppost

Jekk tieħu aktar Cinacalcet Mylan milli suppost, għandek tkellem lit-tabib tiegħek minnufih. Sinjali possibbli ta' doża eċċessiva jinkludu tnemnim jew tingiż madwar il-ħalq, uġiġi jew bugħawwieg fil-muskoli u aċċessjonijiet.

Jekk tinsa tieħu Cinacalcet Mylan

M'għandekx tieħu doża doppja biex tpatti għal kull doża li tkun insejt tieħu.

Jekk insejt doża ta' Cinacalcet Mylan, għandek tieħu d-doża li jmiss bħas-soltu.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' din il-mediciċina, staqsi lit-tabib, lill-ispiżjar jew l-infermier tiegħek.

4. Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediciċina oħra, din il-mediciċina tista' tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f'kulħadd.

Jekk jogħġibok għid lit-tabib tiegħek minnufih:

- Jekk jibda jkollok tnemnim jew tingiż madwar il-ħalq, uġiġi jew bugħawwieg fil-muskoli u aċċessjonijiet. Dawn jistgħu jkunu sinjali li l-livelli tal-kalċju tiegħek huma baxxi wisq (ipokalċimija).
- Jekk ikollok nefha tal-wiċċ, xufftejn, ħalq, ilsien jew gerżuma li tista' tikkawża diffikultà biex tibla' jew biex tieħu n-nifs (angjoedima).

Effetti sekondarji oħrajn possibbli:

Komuni ġafna: jistgħu jaffettwaw aktar minn persuna waħda minn kull 10 persuni

- tqalligh u rimettar, dawn l-effetti sekondarji normalment huma īnfieħ u ma jdumux ġafna.

Komuni: jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 10 persuni

- sturdament
- sensazzjoni ta' tnemnim jew tingiż (parasteżja)
- telf (anoreksja) jew tnaqqis ta' l-apptit
- uġiġi fil-muskoli (majalgħa)
- debbulizza (astenja)
- raxx
- tnaqqis fil-livelli ta' testosterone
- livell għoli ta' postassju fid-demm (iperkalimja)
- reazzjonijiet allergiči (sensittività eċċessiva)
- uġiġi ta' ras
- aċċessjonijiet (konvulżjonijiet jew fits)
- pressjoni baxxa tad-demm (ipotensjoni)
- infezzjoni respiratorja ta' fuq
- diffikulta fin-nifs (dispnea)
- sogħla
- indigestjoni (dispepsja)
- dijarea
- uġiġi abdominali, uġiġi abdominali - naħha ta' fuq
- stitikezza
- spazmi muskolarji
- uġiġi fid-dahar

- livell baxx ta' kalċju fid-demm (ipokalċimija)

Mhux magħruf: il-frekwenza ma tistax tiġi stmata mid-dejta disponibbli

- Horriqija (urtikarja)
- Nefha fil-wiċċ, xufftejn, ħalq, ilsien jew grizmejn li tista' tikkawża diffikultà biex tibla jew biex tiehu n-nifs (angjoedima)
- Taħbit tal-qalb aktar mgħaggel jew qawwi mis-soltu li jista' jkun assoċjat ma' livelli baxxi ta' kalċju fid-demm tiegħek (titwil ta' QT u arritmija ventrikulari kkawżati minn ipokalċimija).

Wara li ħadu Cinacalcet Mylan numru żgħir ħafna ta' pazjenti b'insuffiċjenza tal-qalb kellhom irkadar tal-kundizzjoni tagħhomu/jew pressjoni baxxa (ipotensjoni).

Rapurtar ta' effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib, lill-ispiżjar jew l-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Tista' ukoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali imsemmija f' [Appendici V](#). Billi tirrapporta l-effetti sekondarji inti tista' tgħin tipprovd aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta' din il-mediċina.

5. Kif taħżeen Cinacalcet Mylan

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħhaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta' meta tiskadi li tidher fuq il-folja, kartuna u l-flixkun wara EXP. Id-data ta' meta tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta' dak ix-xahar.

Din il-mediċina m'għandhiex bżonn ħażna specċiali.

Tarmix mediċini mal-ilma tad-drañaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif għandek tarmi mediċini li m'għaddekk tuža. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X'fihi Cinacalcet Mylan

Is-sustanza attiva hi cinacalcet. Kull pillola mikṣija b'rita fiha 30 mg, 60 mg jew 90 mg ta' cinacalcet (bħala hydrochloride).

Is-sustanzi l-oħra huma cellulose, microcrystalline; silica, colloidal anhydrous; povidone; crospovidone; magnesium stearate.

Il-kisja tal-pillola fiha hypromellose, titanium dioxide (E171), triacetin, indigo carmine (E132), iron oxide yellow (E172).

Kif jidher Cinacalcet Mylan u l-kontenut tal-pakkett

Cinacalcet Mylan 30 mg pilloli mikṣija b'rita huma 10.0 mm x 6.4 mm, pilloli ħodor, ovali, biconvex, bit-tarf immarkat immarkati b'M fuq naħha tal-pillola u CI30, fuq in-naħha l-oħra.

Cinacalcet Mylan 60 mg pilloli mikṣijin b'rita huma 12.5 mm x 8.0 mm, pilloli ħodor, ovali, biconvex, bit-tarf imħaffef immarkati b'M fuq naħha tal-pillola u CI60, fuq in-naħha l-oħra.

Cinacalcet Mylan ta' 90 mg pilloli mikṣija b'rita huma 14.3 mm x 9.0 mm, pilloli ħodor, ovali, biconvex, bit-tarf immarkat immarkati b'M fuq naħha tal-pillola u CI30, CI60 jew CI90 fuq in-naħha l-oħra.

Cinacalcet Mylan 30 mg, 60 mg, 90 mg pilloli mikṣija b'rita huma disponibbli f'pakketti bil-folji ta' 28 pillola u pakketti bil-folji perforati b'doża tal-unità ta' 28 x 1, 30 x 1 u 84 x 1 pillola.

Cinacalcet Mylan 30 mg pilloli miksija b'rita huma disponibbli fi fliexken tal-plastik ta' 100 pillola.

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq

Mylan Pharmaceuticals Limited
Damastown Industrial Park,
Mulhuddart, Dublin 15,
DUBLIN
L-Irlanda

Manifatturi

Mylan Hungary Kft
H-2900 Komárom, Mylan utca 1
L-Ungaria

McDermott Laboratories Limited li jagħmlu l-kummerċ bħala Gerard Laboratories
35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13
L-Irlanda

Mylan Germany GmbH
Zweigniederlassung Bad Homburg v. d. Hoehe, Benzstrasse 1
Bad Homburg v. d. Hoehe
Hessen, 61352,
Germany

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġibok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Dtentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq.

België/Belgique/Belgien

Viatris
Tél/Tel: + 32 (0)2 658 61 00

България

Майлан ЕООД
Tel: +359 2 44 55 400

Česká republika

Viatris CZ s.r.o.
Tel: + 420 222 004 400

Danmark

Viatris ApS
Tlf: +45 28 11 69 32

Deutschland

Viatris Healthcare GmbH
Tel: +49 800 0700 800

Eesti

Viatris OÜ

Lietuva

Viatris UAB
Tel: + 370 5 205 1288

Luxembourg/Luxemburg

Viatris
Tél/Tel: + 32 (0)2 658 61 00
(Belgique/Belgien)

Magyarország

Viatris Healthcare Kft.
Tel.: + 36 1 465 2100

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd
Tel: + 356 21 22 01 74

Nederland

Mylan BV
Tel: +31 (0)20 426 3300

Norge

Viatris AS

Tel: + 372 6363 052

Ελλάδα

Viatris Hellas Ltd

Tηλ: +30 2100 100 002

España

Viatris Pharmaceuticals, S.L.

Tel: + 34 900 102 712

France

Viatris Santé

Tél: + 33 4 37 25 75 00

Hrvatska

Viatris Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 23 50 599

Ireland

Viatris Limited

Tel: +353 1 8711600

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Italia

Viatris Italia S.r.l.

Tel: + 39 02 612 46921

Κύπρος

GPA Pharmaceuticals Ltd

Tηλ: +357 22863100

Latvija

Viatris SIA

Tel: +371 676 055 80

Tlf: + 47 66 75 33 00

Österreich

Viatris Austria GmbH

Tel: +43 1 86390

Polska

Viatris Healthcare Sp. z.o.o.

Tel.: +48 22 546 64 00

Portugal

Mylan, Lda.

Tel: + 351 214 127 200

România

BGP Products SRL

Tel: +40 372 579 000

Slovenija

Viatris d.o.o.

Tel: + 386 1 23 63 180

Slovenská republika

Viatris Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 32 199 100

Suomi/Finland

Viatris Oy

Puh/Tel: +358 20 720 9555

Sverige

Viatris AB

Tel: + 46 (0)8 630 19 00

United Kingdom (Northern Ireland)

Mylan IRE Healthcare Limited

Tel: +353 18711600

Dan il-fuljett kien approvat l-ahhar f'

Sorsi oħra ta' informazzjoni

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini: <http://www.ema.europa.eu>