

ANNEX I

SOMMARJU TAL-KARATTERISTIČI TAL-PRODOTT

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Fiasp 100 unità/mL FlexTouch soluzzjoni għall-injezzjoni f' pinna mimlija għal-lest
Fiasp 100 unità/mL Penfill soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ
Fiasp 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni f' kunjett
Fiasp 100 unità/mL PumpCart soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ

2. GHAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Millilitru ta' soluzzjoni fih 100 unità ta' insulina aspart*(ekwivalenti għal 3.5 mg).

Fiasp 100 unità/mL FlexTouch soluzzjoni għall-injezzjoni f' pinna mimlija għal-lest

Kull pinna mimlija għal-lest fiha 300 unità ta' insulina aspart f' soluzzjoni ta' 3 mL.

Fiasp 100 unità/mL Penfill soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ

Kull skartoċċ fih 300 unità ta' insulina aspart f' soluzzjoni ta' 3 mL.

Fiasp 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni f' kunjett

Kull kunjett fih 1,000 unità ta' insulina aspart f' soluzzjoni ta' 10 mL.

Fiasp 100 unità/mL PumpCart soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ

Kull skartoċċ fih 160 unità ta' insulina aspart f' soluzzjoni ta' 1.6 mL.

*Insulina aspart hi magħmula permezz tat-teknoloġija tad-DNA rikombinanti f' *Saccharomyces cerevisiae*.

Għal-lista sħiħa ta' eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Fiasp 100 unità/mL FlexTouch soluzzjoni għall-injezzjoni f' pinna mimlija għal-lest

Soluzzjoni għall-injezzjoni. (FlexTouch).

Fiasp 100 unità/mL Penfill soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ

Soluzzjoni għall-injezzjoni. (Penfill).

Fiasp 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni f' kunjett

Soluzzjoni għall-injezzjoni.

Fiasp 100 unità/mL PumpCart soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ

Soluzzjoni għall-injezzjoni. (PumpCart).

Soluzzjoni ċara, bla kulur u akweja.

4. TAGHRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Għall-kura tad-dijabete mellitus fl-adulti, fl-adolexxenti u fit-tfal minn sena 'l fuq.

4.2 Pożoloġija u metodu ta' kif għandu jinghata

Pożoloġija

Fiasp hu insulina li tittiehed f'hin l-ikel għall-ghoti minn taht il-ġilda sa 2 minuti qabel il-bidu tal-ikla (0-2 minuti), bl-għażla li jinghata sa 20 minuta wara li tibda l-ikla (ara sezzjoni 5.1).

Id-dożaġġ b'Fiasp huwa partikulari għal kull individwu u jiġi determinat skont il-ħtiġijiet tal-pazjent. Fiasp mogħti permezz ta' injezzjoni taht il-ġilda għandu jintuża flimkien ma' insulina li taġixxi b'mod intermedju jew fit-tul, mogħtija mill-inqas darba kuljum. F'skeda ta' trattament bażali – bolus madwar 50 % ta' din il-ħtieġa tista' tiġi pprovduta minn Fiasp u l-bqija permezz ta' insulina li taġixxi b'mod intermedju jew fit-tul

Il-ħtieġa individwali totali ta' kuljum tal-insulina fl-adulti, fl-adolexxenti u fit-tfal tista' tvarja u hija normalment bejn 0.5 u unità 1/kg/jum.

Sabiex jinkiseb l-aħjar kontroll glicemiku possibbli, huwa rrakkomandat il-monitoraġġ tal-glukosju fid-demm u l-aġġustament tad-doża tal-insulina.

Jista' jkun hemm bżonn ta' aġġustament fid-doża jekk il-pazjenti jżidu l-attività fiżika tagħhom, jibdlu d-dieta normali tagħhom jew waqt xi mard li jkun hemm fl-istess żmien. Il-livelli tal-glukosju fid-demm għandhom jiġu mmonitorjati b'mod adegwat taht dawn il-kundizzjonijiet.

It-tul tal-azzjoni jvarja skont id-doża, is-sit tal-injezzjoni, il-fluss tad-demm, it-temperatura u l-livell tal-attività fiżika.

Pazjenti fuq kura bażilari-bolus li jinsew jieħdu d-doża fil-hin tal-ikel huma avżati biex jimmonitorjaw il-livell ta' glukosju fid-demm tagħhom biex jiddeċiedu jekk tkunx meħtieġa doża tal-insulina. Il-pazjenti għandhom ikomplu bl-iskeda normali tad-dożaġġ tagħhom fl-ikla li jmiss.

Il-qawwa tal-analogi tal-insulina, inkluż Fiasp hi espressa f'unitajiet. Unità waħda ta' Fiasp tikkorrispondi għal unità internazzjonali waħda ta' insulina umana jew unità waħda ta' analogi oħrajn tal-insulina li jaġixxu malajr.

Wiehed għandu jikkunsidra l-bidu bikri t'azzjoni meta tinkiteb riċetta għal Fiasp (ara sezzjoni 5.1).

Bidu

Pazjenti b'dijabete mellitus ta' tip 1

Id-doża tal-bidu rakkomandata f'pazjenti b'dijabete mellitus ta' tip 1 li qatt ma ħadu insulina hija ta' madwar 50% tad-doża totali tal-insulina ta' kuljum u għandha tinqasam bejn l-iklet skont id-daqs u l-kompożizzjoni tal-iklet. Il-bqija tad-doża totali tal-insulina ta' kuljum għandha tinghata bħala insulina li taġixxi b'mod intermedju jew fit-tul. Bħala regola ġenerali, 0.2 sa 0.4 unitajiet ta' insulina għal kull kilogramma ta' piż tal-ġisem, jistgħu jintużaw biex tiġi kkalkulata d-doża inizjali totali ta' insulina ta' kuljum f'pazjenti b'dijabete mellitus ta' tip 1 li qatt ma ħadu insulina.

Pazjenti b'dijabete mellitus ta' tip 2

Id-doża tal-bidu ssuġġerita hija ta' 4 unitajiet f'ikla waħda jew aktar minn ikla waħda. In-numru ta' injezzjonijiet u t-titrazzjoni sussegwenti jiddependu fuq il-mira glicemika individwali u d-daqs u l-kompożizzjoni tal-iklet.

Aġġustamenti tad-doża jstgħu jiġu kkunsidrati ta' kuljum skont il-glukosju fil-plażma mkejjejl mill-pazjent innifsu (SMPG) fil-jum(jiem) preċedenti skont Tabella 1.

- Id-doża ta' qabel il-kolazzjon għandha tiġi aġġustata skont l-SMPG ta' qabel l-ikla ta' nofsinhar fil-jum ta' qabel
- Id-doża ta' qabel l-ikla ta' nofsinhar għandha tiġi aġġustata skont l-SMPG ta' qabel iċ-ċena ta' filgħaxija fil-jum ta' qabel
- Id-doża ta' qabel iċ-ċena ta' filgħaxija għandha tiġi aġġustata skont l-SMPG fil-hin-tal-irqad fil-jum ta' qabel

Tabella 1 Aġġustament fid-doża

SMPG (ara hawn fuq)		Aġġustament fid-doża
mmol/L	mg/dL	Unità
<4	<71	-1
4-6	71-108	L-ebda aġġustament
>6	>108	+1

Popolazzjonijiet speċjali

Pazjenti anzjani (≥65 sena)

Ġew determinati s-sigurtà u l-effikaċja ta' Fiasp f'pazjenti anzjani b'età minn 65 sa 75 sena. Monitoraġġ mill-qrib tal-glukosju hu rakkomandat u d-doża tal-insulina għandha tiġi aġġustata fuq bażi individwali (ara sezzjoni 5.1 u 5.2). L-esperjenza terapewtika f'pazjenti ta' ≥75 sena hija limitata.

Indeboliment renali

L-indeboliment renali jista' jnaqqas il-ħtiġijiet tal-pazjent għall-insulina. F'pazjenti b'indeboliment renali, il-monitoraġġ tal-glukosju għandu jsir b'mod aktar intensiv u d-doża għandha tiġi aġġustata fuq bażi individwali (ara sezzjoni 5.2).

Indeboliment epatiku

L-indeboliment epatiku jista' jnaqqas il-ħtiġijiet tal-pazjent għall-insulina. F'pazjenti b'indeboliment epatiku, il-monitoraġġ tal-glukosju għandu jsir b'mod aktar intensiv u d-doża għandha tiġi aġġustata fuq bażi individwali (ara sezzjoni 5.2).

Popolazzjoni pedjatrika

Fiasp jista' jintuża fl-adolexxenti u fit-tfal mill-età ta' sena (ara sezzjoni 5.1). M'hemm ebda esperjenza klinika fl-użu ta' Fiasp fit-tfal taħt is-sentejn.

Hu rakkomandat li Fiasp jingħata qabel l-ikla (0-2 minuti), bil-flessibilità li jingħata sa 20 minuta mill-bidu tal-ikla f'sitwazzjonijiet fejn m'hemmx ċertezza dwar meta se tittiehed l-ikla.

It-trasferiment minn prodotti mediċinali oħrajn ta' insulina

Huwa rakkomandat li jsir monitoraġġ mill-qrib tal-glukosju waqt it-trasferiment minn insulini oħrajn li jittiehdu fil-hin tal-ikel u fl-ewwel ġimghat wara li jsir it-trasferiment. Il-bidla minn insulina oħra li tittiehed fil-hin tal-ikel tista' ssir fuq bażi ta' unità għal unità. It-trasferiment ta' pazjent minn tip, marka jew manifattur ieħor ta' insulina għal Fiasp irid isir taħt superviżjoni medika u jista' jirriżulta fil-ħtieġa ta' bidla fid-doża.

Id-doži u l-hin tal-għoti ta' prodotti mediċinali tal-insulina li jintużaw fl-istess żmien u li jaġixxu b'mod intermedju jew fit-tul jew kura oħra antidijabetika li qed tittiehed flimkien, jista' jkollhom bżonn ta' aġġustament.

Metodu ta' kif għandu jingħata

Injezzjoni taħt il-ġilda

Fiasp hu rakkomandat li jingħata taħt il-ġilda permezz ta' injezzjoni fiż-żaqq jew fin-naħa ta' fuq tad-driegħ (ara sezzjoni 5.2). Dejjem għandha ssir rotazzjoni tas-siti tal-injezzjoni fl-istess zona sabiex jitnaqqas ir-riskju ta' lipodistrofija u ta' amilojdoži tal-ġilda (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.8).

Fiasp 100 unità/mL FlexTouch soluzzjoni għall-injezzjoni f'pinna mimlija għal-lest

Il-pinna mimlija għal-lest (FlexTouch) tforni 1-80 unità f'żidiet ta' unità 1.

FlexTouch tiġi b'fuljett ta' tagħrif b'istruzzjonijiet dettaljati għall-użu li għandhom jiġu segwiti. Għal istruzzjonijiet dwar l-għoti, ara "Istruzzjonijiet għall-Użu" fl-aħħar tal-fuljett ta' tagħrif.

Il-pinna mimlija għal-lest hija tajba biss għall-injezzjonijiet minn taħt il-ġilda. Jekk ikun hemm bżonn ta' tehid permezz ta' siringa jew ta' injezzjoni minn ġol-vini għandu jintuża kunjett. Jekk ikun hemm bżonn ta' tehid permezz ta' pompa tal-infużjoni għandu jintuża kunjett jew skartoċ PumpCart.

Fiasp 100 unità/mL Penfill soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċ

L-għoti permezz ta' pinna tal-insulina li terġa' tintuża

Jekk ikun hemm bżonn ta' tehid permezz ta' siringa jew ta' injezzjoni minn ġol-vini għandu jintuża kunjett. Jekk ikun hemm bżonn ta' tehid permezz ta' pompa tal-infużjoni għandu jintuża kunjett jew skartoċ PumpCart (ara sezzjoni 6.6).

Fiasp 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni f'kunjett

L-għoti permezz ta' siringa

Il-kunjett għandu jintuża ma' siringi tal-insulina bl-iskala korrispondenti ta' unità (unitajiet-100 jew 100 unità/mL).

Infużjoni kontinwa tal-insulina minn taħt il-ġilda (CSII)

Fiasp soluzzjoni għall-injezzjoni f'kunjett jista' jintuża għal CSII f'pompi xierqa għall-infużjoni tal-insulina u se tkopri kemm il-ħtieġa tal-insulina bolus (madwar 50 %) u kemm l-insulina bażali. Jista' jingħata skont l-istruzzjonijiet ipprovduti mill-manifattur tal-pompa, preferibbilment fiż-żaqq. Meta jintuża ma' pompa tal-infużjoni tal-insulina, m'għandux jiġi dilwit jew imhallat ma' kwalunkwe prodotti mediċinali oħrajn tal-insulina.

Pazjenti li jużaw CSII għandhom jingħataw istruzzjonijiet dwar l-użu tal-pompa u li jużaw ir-reċipjent u t-tubi l-korretti għall-pompa (ara sezzjoni 6.6). Is-sett tal-infużjoni (tubi u kannula) għandu jinbidel skont l-istruzzjonijiet li hemm fl-informazzjoni dwar il-prodott mogħtija mas-sett tal-infużjoni.

Pazjenti li jieħdu Fiasp permezz ta' CSII jridu jiġu mħarrġa biex jieħdu l-insulina permezz ta' injezzjoni u jkollhom terapija alternattiva tal-insulina disponibbli f'każ li l-pompa ma taħdimx.

Fiasp 100 unità/mL PumpCart soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċ

L-għoti permezz ta' CSII

L-iskartoċ (PumpCart) huwa għall-użu biss ma' sistema ta' pompa tal-infużjoni għall-insulina magħmula biex tintuża ma' dan l-iskartoċ (ara sezzjoni 6.6).

Fiasp ikopri l-ħtieġa kemm ta' insulin bolus (madwar 50%) u kemm ta' insulin bażali. Jista' jingħata skont kif hemm fl-istruzzjonijiet ipprovduti mill-manifattur tal-pompa, preferibbilment fl-addome. Fl-istess reġjun, is-sit tal-infużjoni għandu jinbidel sabiex tnaqqas ir-riskju ta' lipodistrofija.

Pazjenti li qed jużaw CSII għandhom jiġu mghallma fl-użu tal-pompa u l-użu korrett tal-pajpijiet tal-pompa (ara sezzjoni 6.6). Is-sett tal-infużjoni (pajpijiet u kannula) għandhom jinbiddu skont kif hemm fl-istruzzjonijiet tal-informazzjoni tal-prodott li jiġi mas-sett tal-infużjoni.

Pazjenti li qed jingħataw Fiasp permezz ta' CSII għandhom jiġi mħarrġa fl-għoti tal-insulina permezz ta' injezzjoni u li jkollhom terapija alternattiva ta' insulin f'każ li jkun hemm xi ħsara fil-pompa.

L-iskartoċ (PumpCart) huwa tajjeb biss għal CSII f'sistemi ta' pompi li huma tajbin għall-infużjoni tal-insulina. Jekk ikun hemm bżonn ta' għoti permezz ta' siringa jew ta' injezzjoni minn ġol-vini għandu jintuża kunjett.

Użu għal ġol-vini

Fiasp 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni f'kunjett

Jekk ikun meħtieġ, Fiasp jista' jingħata minn ġol-vini minn professjonisti tal-kura tas-saħħa.

Għall-użu minn ġol-vini, għandu jintuża f'koncentrazzjonijiet minn 0.5 unità/mL għal 1.0 unità/mL ta' insulina aspart f'sistemi tal-infużjoni – bl-użu ta' boroż tal-infużjoni tal-polypropylene.

Fiasp m'għandux jithallat ma kwalunkwe insulina oħra jew prodott mediċinali ieħor hlied daww imsemmija f' sezzjoni 6.6. Għal istruzzjonijiet dwar id-dilwizzjoni tal-prodott mediċinali qabel l-ghoti, ara sezzjoni 6.6

Il-monitoraġġ tal-glukosju fid-demm hu meħtieġ waqt l-infużjoni tal-insulina. Wieħed għandu joqgħod attent li jaċċerta ruħu li l-insulina tiġi injettata għol-borża tal-infużjoni u mhux sempliċiment fl-*entry port*.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe sustanza mhux attiva elenkata fis-sezzjoni 6.1.

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Tracċabilità

Sabiex titjib it-tracċabilità ta' prodotti mediċinali bijoloġiċi, l-isem u n-numru tal-lott tal-prodott li gie mogħti għandhom jitnizzlu b' mod ċar.

Ipoġlicemija

Li taqbeż ikla jew li tagħmel eżerċizzju fiżiku qawwi mhux ippjanat, jista' jwassal għall-ipoġlicemija.

L-ipoġlicemija tista' sseħħ jekk id-doża tal-insulina tkun għolja wisq meta mqabbla mal-ħtieġa għall-insulina (ara sezzjonijiet 4.8 u 4.9).

Pazjenti, li l-kontroll tal-glukosju fid-demm tagħhom jitjieb bil-kbir, eż. permezz ta' terapija bl-insulina intensifikata, jista' jkollhom bidla fis-sintomi normali tagħhom ta' twissija ta' ipoġlicemija, u għandhom jingħataw parir kif xieraq. Is-sintomi normali ta' twissija jistgħu jisparixxu f' pazjenti li ilhom bid-dijabete għal żmien twil.

Il-ħin li fiha sseħħ l-ipoġlicemija normalment jirrifletti l-profil tal-ħin-azzjoni tal-formulazzjoni tal-insulina mogħtija. L-ipoġlicemija tista' sseħħ aktar kmieni wara injezzjoni/infużjoni meta mqabbla ma' insulini oħrajn li jingħataw fil-ħin tal-ikel billi Fiasp jibda jaħdem aktar kmieni (ara sezzjoni 5.1).

Billi Fiasp għandu jingħata sa 2 minuti qabel il-bidu tal-ikel, bl-għażla li jingħata sa 20 minuta wara li tibda l-ikel, il-ħin sakemm jibda jaħdem għandu jiġi kkunsidrat meta tingħata riċetta lil pazjenti b' mard jew kura li tingħata fl-istess żmien, fejn dewmien fl-assorbiment tal-ikel jista' jkun mistenni.

Popolazzjoni pedjatrika

Hu rakkomandat li jkun hemm monitoraġġ mill-qrib tal-livelli tal-glukosju fid-demm jekk dan il-prodott mediċinali jittiehed wara li tkun bdejt l-aħħar ikla tal-gurnata, sabiex tevita l-ipoġlicemija ta' bil-lejl.

Iperglicemija u ketoacidożi dijabetika

L-użu ta' dozi mhux adegwati jew it-twaqqif tal-kura, speċjalment f' pazjenti li jeħtieġu l-insulina, jista' jwassal għal iperglicemija u ketoacidożi dijabetika, kundizzjonijiet li jistgħu jkunu fatali.

Infużjoni kontinwa tal-insulina minn taħt il-ġilda (CSII)

Ħsara fil-pompa jew fis-sett tal-infużjoni tista' twassal biex l-iperglicemija u l-ketożi jseħħu aktar malajr. L-identifikazzjoni immedjata u l-korrezzjoni tal-kawża tal-iperglicemija jew tal-ketożi hi meħtieġa. Jista' jkun hemm il-ħtieġa ta' użu temporanju ta' terapija b' injezzjoni taħt il-ġilda.

L-użu ħażin tal-PumpCart

L-iskartoċċ (PumpCart) huwa għall-użu biss ma' sistema ta' pompa tal-infużjoni għall-insulina magħmula biex tintuża ma' dan l-iskartoċċ. M'għandux jintuża ma' xi apparat ieħor li mhuwiex magħmul għall-iskartoċċ, għax dan jista' jwassal għal doża mhux korretta ta' insulin bil-konsegwenza li jkun hemm iper jew ipoglicemija (ara sezzjoni 6.6).

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta' taħt il-ġilda

Il-pazjenti għandhom jingħataw istruzzjonijiet biex iwettqu rotazzjoni kontinwa tas-sit tal-injezzjoni biex jitnaqqas ir-riskju ta' żvilupp ta' lipodistrofija u ta' amilojdoži tal-ġilda. Hemm riskju potenzjali ta' assorbiment imdewwem tal-insulina u kontroll glicemiku aggravat wara l-injezzjonijiet tal-insulina f' siti b' dawn ir-reazzjonijiet. Bidla f' daqqa fis-sit tal-injezzjoni f' parti mhux affettwata għet irrappurtata li tirriżulta f' ipoglicemija. Huwa rakkomandat monitoraġġ tal-glukożju fid-demem wara l-bidla fis-sit tal-injezzjoni minn parti affettwata għal parti mhux affettwata, u jista' jiġi kkunsidrat l-aġġustament tad-doża tal-prodotti mediċinali antidijabetiċi.

zjoni f' parti mhux affettwata għet irrappurtata li tirriżulta f' ipoglicemija. Huwa rakkomandat monitoraġġ tal-glukożju fid-demem wara l-bidla fis-sit tal-injezzjoni minn parti affettwata għal parti mhux affettwata, u jista' jiġi kkunsidrat l-aġġustament tad-doża tal-prodotti mediċinali antidijabetiċi.

It-trasferiment minn prodotti mediċinali oħra tal-insulina

It-trasferiment ta' pazjent minn xi tip jew marka oħra tal-insulina għandu jsir taħt superviżjoni medika stretta. Tibdiliet fil-qawwa, marka (manifattur), tip, l-orijini (animal, insulina umana jew analogu tal-insulina umana), u/jew il-metodu tal-manifattura (rikombinanti mid-DNA kontra l-insulina li tiġi mill-animali) jistgħu jirriżultaw fi bżonn għal tibdil fid-doża. Pazjenti li nqalbu għal Fiasp minn tip ieħor ta' insulina jista' jkollhom bżonn ta' tibdil fid-doża minn dik li kienu jużaw bil-prodotti mediċinali tas-soltu tagħhom tal-insulina.

Mard li jseħħ fl-istess żmien

Mard li jseħħ fl-istess żmien, speċjalment infezzjonijiet u kundizzjonijiet ta' deni, normalment iżid il-ħtieġa tal-pazjent għall-insulina. Kardjopatija, mard li jseħħ fl-istess żmien fil-kliwi, fil-fwied jew mard li jaffettwa l-glandola adrenali, pitwitarja jew tat-tirojde jista' jirrikjedi tibdil fid-doża tal-insulina.

It-teħid flimkien ta' pioglitazone u prodotti mediċinali tal-insulina

Ġew irrappurtati każijiet ta' insuffiċjenza kardijaka kongestiva meta pioglitazone intuża flimkien mal-insulina, speċjalment f' pazjenti li għandhom fatturi ta' riskju għall-iżvilupp ta' insuffiċjenza kardijaka kongestiva. Wieħed għandu jżomm dan f' moħħu jekk tiġi kkunsidrata l-kura fejn pioglitazone jingħata flimkien ma' prodotti mediċinali tal-insulina. Jekk jintużaw flimkien, il-pazjenti għandhom jiġu osservati għal sinjali u sintomi ta' insuffiċjenza kardijaka kongestiva, zieda fil-piż u edima. Pioglitazone għandu jitwaqqaf jekk jehżienu s-sintomi kardijaċi.

Meta tibda tuża l-insulina u l-intensifikazzjoni tal-kontroll tal-glukożju

L-intensifikazzjoni jew it-titjib ta' malajr fil-kontroll tal-glukożju għet assoċjat ma' disturb rifrazzjonali oftalmologiku temporanju u reversibbli, aggravament ta' retinopatija dijabetika, newropatija periferali akuta bl-uġiġħ u edima periferali. Madankollu, kontroll glicemiku fit-tul inaqqas ir-riskju ta' retinopatija dijabetika u newropatija.

Antikorpi kontra l-insulina

L-ġhoti tal-insulina tista' tikkawża l-formazzjoni ta' antikorpi kontra l-insulina. F'każijiet rari, minhabba l-preżenza ta' dawn l-antikorpi kontra l-insulina, jista' jkun hemm bżonn ta' aġġustament fid-doża tal-insulina sabiex tiġi kkorreguta tendenza ta' iperglicemija jew ipoglicemija.

Kif tevita taħlit aċċidentali/żbalji fil-medikazzjoni

Il-pazjenti għandhom jingħataw istruzzjonijiet biex dejjem jiċċekkjaw it-tikketta tal-insulina qabel kull injezzjoni biex jevitaw taħlit aċċidentali bejn dan il-prodott mediċinali u prodotti mediċinali oħrajn tal-insulina.

Il-pazjenti għandhom jivverifikaw b' mod viżwali l-unitajiet tad-doża qabel l-għoti. Għalhekk, il-kundizzjoni meħtieġa biex il-pazjent ikun jista' jinjetta lilu nnifso hija li jkun jaf jaqra l-iskala tad-doża. Pazjenti li huma għomja jew li għandhom vista batuta, huma mitluba biex dejjem isaqsu għall-assistenza minn persuna oħra li għandha vista tajba u li hija mharrġa fl-għoti tal-insulina.

Ivvjaġġar bejn żoni differenti ta' hin

Qabel ma jivvjaġġa bejn żoni differenti ta' hin, il-pazjent għandu jfittex il-parir tat-tabib.

Eċċipjenti

Dan il-prodott mediċinali fih anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f'kull doża, jiġifieri tista' tghid essenzjalment 'hieles mis-sodium'.

4.5 Interazzjoni ma' prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta' interazzjoni

Numru ta' prodotti mediċinali huma magħrufa li jinteraġixxu mal-metabolizmu tal-glukosju.

Dawn is-sustanzi li ġejjin jistgħu jnaqqsu l-htieġa tal-pazjent għall-insulina:
Antidijabetiċi orali, inibituri ta' monoamine oxidase (MAOIs), imblokkaturi tar-riċetturi beta, inibituri tal-enzima li tibdel angiotensin (ACE), salicylates, steroidi anaboliċi, sulphonamides u agonist tar-riċettur GLP-1.

Dawn is-sustanzi li ġejjin jistgħu jżidu l-htieġa tal-pazjent għall-insulina:
Kontraċettivi li jittiehdu mill-halq, thiazides, glukokortikoidi, ormoni tat-tirojde, simpatomimetici, l-ormon tat-tkabbir u danazol.

Sustanzi li jimblukaw ir-riċetturi beta jistgħu jaħbu s-sintomi ta' ipoglicemija.

Octreotide/lanreotide jistgħu jew iżidu jew inaqqsu l-htieġa tal-insulina.

L-alkoħol jista' jżid jew inaqqas l-effett ipoglicemiku tal-insulina.

4.6 Fertilità, tqala u treddiġh

Tqala

Fiasp jista' jintuża fit-tqala.

Informazzjoni minn żewġ studji kliniċi magħmula b' mod arbitrarju u kkontrollati li saru b'insulina aspart (322 + 27 tqala esposti) ma turi ebda effett avvers ta' insulina aspart fuq it-tqala jew fuq is-saħħa tal-fetu/tarbija tat-twelid meta mqabbla mal-insulina umana li tinħall.

Kontroll intensifikat tal-glukosju fid-demmi u l-monitoraġġ ta' nisa tqal bid-dijabete (dijabete ta' tip 1, dijabete ta' tip 2 jew dijabete ta' waqt it-tqala) huma rakkomandati matul it-tqala kollha u meta dawn in-nisa jkunu qegħdin jippjanaw li jinqabdu tqal. Il-htigijiet tal-insulina normalment jonqsu fl-ewwel trimestru u sussegwentement jiżdiedu matul it-tieni u t-tielet trimestri. Wara l-hlas, il-htigijiet tal-insulina normalment jergħu lura malajr għal-livelli ta' qabel it-tqala.

Treddiġh

M'hemmx restrizzjonijiet għall-kura b'Fiasp waqt it-treddiġh. It-trattament bl-insulina ta' ommijiet li qed irediġu ma tipprezentax riskju għat-tarbija. Minkejja dan, id-doża tista' teħtieġ li tiġi agġustata.

Fertilità

Studji dwar ir-riproduzzjoni fl-annimali ma żvelaw ebda differenza bejn insulina aspart u l-insulina umana fir-rigward tal-fertilità.

4.7 Effetti fuq il-hila biex issuq u thaddem magni

Il-hila tal-pazjent li jikkoncentra u jirreagixxi tista' titnaqqas minhabba l-ipoglicemija. Dan jista' johlqo riskju f' sitwazzjonijiet meta dawn il-ħiliet huma ta' importanza speċjali (eż. waqt li tkun qed issuq karozza jew thaddem xi magni).

Il-pazjenti għandhom jingħataw parir biex jieħdu prekawzzjonijiet biex jevitaw l-ipoglicemija waqt is-sewqan. Dan hu partikolarment importanti f' dawk li ma jhossux jew ma jhossux biżżejjed is-sinjali ta' twissija ta' ipoglicemija, jew li għandhom episodji spissi ta' ipoglicemija. Wiehed għandu jikkunsidra jekk issuq jew le f' dawn iċ-ċirkustanzi.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta' sigurtà

Waqt il-kura, l-ipoglicemija hija r-reazzjoni avversa li giet irrapportata b' mod l-aktar frekwenti (ara sezzjoni 'Deskrizzjoni ta' reazzjonijiet avversi partikulari' hawn taħt).

Lista ta' reazzjonijiet avversi f' forma tabulari

Ir-reazzjonijiet avversi mniżżla hawn taħt (Tabella 2) huma bbażati fuq tagħrif minn 6 provi konfermatorji terapewtiċi li tlestew u li saru fl-adulti. Il-kategoriji ta' frekwenzi ġew stabbiliti skont il-konvenzjoni li ġejja: Komuni hafna ($\geq 1/10$); komuni ($\geq 1/100$ sa $< 1/10$); mhux komuni ($\geq 1/1,000$ sa $< 1/100$); rari ($\geq 1/10,000$ sa $< 1/1,000$); rari hafna ($< 1/10,000$) u mhux magħruf (ma tistax tittiehed stima mid-data disponibbli).

Tabella 2 Reazzjonijiet avversi minn provi kliniċi

Sistema tal-klassifika tal-organi MedDRA	Komuni hafna	Komuni	Mhux komuni	Mhux magħruf
Disturbi fis-sistema immuni			Sensittività eċċessiva	Reazzjonijiet anafilattiċi
Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni	Ipoglicemija			
Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta' taħt il-ġilda		Reazzjonijiet allergiċi tal-ġilda	Lipodistrofija	Amilojdoži tal-ġilda [†]
Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta' mnejn jingħata		Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni/infużjoni		

[†] ADR minn sorsi wara li l-prodott tqiegħed fis-suq.

Deskrizzjoni ta' reazzjonijiet avversi partikulari

Reazzjonijiet allergiċi

Manifestazzjonijiet allergiċi tal-ġilda rrapportati b' Fiasp (1.8% vs 1.5% għall-komparatur) jinkludu ekżema, raxx, raxx bil-ħakk, urtikarja u dermatite.

Bi Fiasp, reazzjonijiet ta' sensittività eċċessiva ġeneralizzata (li jidhru bħala raxx tal-ġilda ġeneralizzat u edima tal-wiċċ) kienu rrapportati b' mod mhux komuni (0.2% vs 0.3% għall-komparatur).

Ipoglicemija

L-ipoglicemija tista' ssehh jekk id-doża tal-insulina tkun għolja wisq meta mqabbla mal-htieġa tal-insulina. Ipoglicemija severa tista' twassal għal telfien mis-sensi u/jew aċċessjonijiet u tista' twassal għal tnaqqis temporanju jew permanenti fil-funzjoni tal-moħħ jew saħansitra għall-mewt. Is-soltu, is-sintomi tal-ipoglicemija jseħħu f'daqqa. Dawn jistgħu jinkludu għaraq kiesaħ, ġilda pallida u kiesha, telqa, nervi jew tregħid, ansjetà, għeja jew debbulizza mhux tas-soltu, konfużjoni, diffikultà biex tikkonċentra, theddil, hafna ġuħ li ma jkunx normali, tibdil fil-vista, uġiġħ ta' ras, dardir u palpitazzjoni (ara sezzjoni 4.4 u 5.1). L-ipoglicemija tista' ssehh aktar kmieni wara injezzjoni/infużjoni ta' Fiasp meta mqabbel ma' insulini oħra li jittieħdu fil-ħin tal-ikel minħabba li jibda jaħdem aktar kmieni.

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta' taħt il-ġilda

Lipodistrofija (li tinkludi lipoipetrofija, lipoatrofija) u amilojdoži tal-ġilda jistgħu jseħħu fis-sit tal-injezzjoni u jdewmu l-assorbiment tal-insulina lokali. Lipodistrofija għet irrapportata fis-sit tal-injezzjoni/infużjoni f'pazjenti kkurati b'Fiasp (0.5% vs 0.2% fil-komparatur). Rotazzjoni kontinwa tas-sit tal-injezzjoni f'dik iż-żona fejn tingħata l-injezzjoni tista' tgħin sabiex tnaqqas jew tippreveni dawn ir-reazzjonijiet.

Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni/infużjoni

Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni (li jinkludu raxx, ħmura, infjammazzjoni, uġiġħ u tbenġil) ġew irrapportati f'pazjenti kkurati b'Fiasp (1.3% vs 1.0% fil-komparatur). F'pazjenti li qed jużaw CSII (N=261): Reazzjonijiet fis-sit tal-infużjoni (li jinkludu ħmura, infjammazzjoni, irritazzjoni, uġiġħ, tbenġil u ħakk) ġew irrapportati f'pazjenti kkurati b'Fiasp (10.0% vs 8.3% fil-komparatur). Dawn ir-reazzjonijiet normalment ikunu ħfief u temporanji u s-soltu jisparixxu matul it-tkomplija tal-kura.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ġew investigati f'prova terapewtika konfermatorja fit-tfal bid-dijabete mellitus ta' tip 1 ta' età minn sentejn sa inqas minn 18-il sena. Fil-prova, 519-il pazjent ġew ittrattati b'Fiasp. In ġenerali, il-frekwenza, it-tip u s-severità tar-reazzjonijiet avversi ma jindikawx li hemm xi differenzi minn dak li deher fil-popolazzjoni adulta. Lipodistrofija (inkluż lipoipetrofija, lipoatrofija) fis-sit tal-injezzjoni għet irrapportata aktar spiss f'din il-prova b'pazjenti pedjatriki meta mqabbla ma' provi fl-adulti (ara aktar 'il fuq). Fil-popolazzjoni pedjatrika l-lipodistrofija għet irrapportata b'frekwenza ta' 2.1% għal Fiasp vs. 1.6% għal NovoRapid.

Popolazzjonijiet speċjali oħra

Skont riżultati minn studji kliniċi b'insulina aspart in ġenerali, m'hemmx indikazzjoni li hemm xi differenza fil-frekwenza, fit-tip u fis-severità tar-reazzjonijiet avversi osservati f'pazjenti anzjani u f'pazjenti b'indeboliment renali jew epatiku minn dawk li deher fil-popolazzjoni ġenerali. Il-profil ta' sigurtà f'pazjenti anzjani hafna (≥ 75 sena) jew f'pazjenti b'indeboliment renali jew epatiku moderat sa sever, hu limitat. Fiasp ingħata lil pazjenti anzjani għall-investigazzjoni ta' proprjetajiet farmakokinetiċi (ara sezzjoni 5.2).

Rappurtar ta' reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrapportati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrapportaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali imniżżla f' [Appendiċi V](#).

4.9 Doża eċċessiva

Doża eċċessiva speċifika għall-insulina ma tistax tiġi definita; madankollu, l-ipoglicemija tista' tiżviluppa fuq firxa ta' stadji sekwenzjali jekk pazjent jingħata doża b'iktar insulina minn dik meħtieġa:

- Episodji ipoglikemiċi ħfief jistgħu jiġu kkurati bl-għoti mill-ħalq ta' glukosju jew prodotti oħrajn li fihom iz-zokkor. Għalhekk huwa rakkomandat li l-pazjent dijabetiku dejjem iżomm fuqu prodotti li jkun fihom il-glukosju.
- Episodji ipoglikemiċi severi, meta l-pazjent ma jkunx jista' jikkura lilu nnifsu, jistgħu jiġu kkurati bi glucagon (0.5 sa 1 mg) mogħti ġol-muskoli jew taħt il-ġilda minn persuna mharrġa, jew bil-glukosju li jingħata ġol-vini minn professjonist fil-kura tas-saħħa. Il-glukosju għandu jingħata ġol-vina jekk il-pazjent ma jirrispondix għal glucagon fi żmien 10 sa 15-il minuta. Meta jerġa' jiġi f'sensih, l-għoti ta' karboidrati mill-ħalq huwa rakkomandat għall-pazjent sabiex tkun evitata rikaduta.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Mediċini użati fid-dijabete, insulini u analogi għall-injezzjoni li jaġixxu malajr Kodiċi ATC: A10AB05.

Mekkaniżmu ta' azzjoni

Fiasp hu formulazzjoni ta' insulina aspart li taġixxi malajr. L-attività primarja ta' Fiasp hija r-regolazzjoni tal-metaboliżmu tal-glukosju. L-insulini, inkluż insulina aspart, is-sustanza attiva fi Fiasp, jeżerċitaw l-azzjoni speċifika tagħhom billi jintrabtu mar-riċetturi tal-insulina. L-insulina marbuta mar-riċetturi tbaxxi l-glukosju fid-demm billi tiffaċilita l-assorbiment ċellulari tal-glukosju ġol-muskoli skeletali u fit-tessut xaħmi u billi tinibixxi l-produzzjoni tal-glukosju mill-fwied. L-insulina tinibixxi l-lipolisi fit-tessut xaħmi, tinibixxi l-proteolizi u ttejjeb is-sintesi tal-proteina.

Effetti farmakodinamiċi

Fiasp hu formulazzjoni ta' insulina aspart li tittiehed fil-ħin tal-ikel, fejn iż-żieda ta' nicotinamide (vitamina B₃) tirriżulta f'assorbiment inizjali aktar mgħaġġel tal-insulina meta mqabbel ma' NovoRapid.

Il-bidu tal-azzjoni kien 5 minuti aktar kmieni, u l-ħin sar-rata massima tal-infużjoni tal-glukosju kien ta' 11-il minuta aktar kmieni b'Fiasp milli b'NovoRapid. L-effett massimu tat-tnaqqis fil-livell tal-glukosju ta' Fiasp seħħ bejn 1 u 3 sigħat wara l-injezzjoni. L-effett tat-tnaqqis fil-livell tal-glukosju matul l-ewwel 30 minuta ($AUC_{GIR, 0-30 \text{ min}}$) kien ta' 51 mg/kg bi Fiasp u 29 mg b'NovoRapid (proporzjoni Fiasp/NovoRapid : 1.74 [1.47;2.10]_{95% CI}). L-effett totali tat-tnaqqis fil-livell tal-glukosju u l-effett massimu tat-tnaqqis fil-livell tal-glukosju (GIR_{max}) kienu komparabbli bejn Fiasp u NovoRapid. L-effett totali u massimu tat-tnaqqis fil-livell tal-glukosju ta' Fiasp jżied b'mod lineari hekk kif tiżdied id-doża fil-limiti tad-doża terapewtika.

Fiasp jibda jaħdem aktar malajr meta mqabbel ma' NovoRapid (ara sezzjoni 5.2), li sussegwentement iwassal għal żieda kmieni fl-effett ta' tnaqqis fil-glukosju. Din għandha tittiehed f'kunsiderazzjoni meta wiehed jikteb riċetta għal Fiasp.

It-tul ta' azzjoni kien iqsar għal Fiasp meta mqabbel ma' dak ta' NovoRapid, u jdum 3-5 sigħat.

Il-varjabilità minn jum għal jum bejn il-pazjenti nfushom fl-effett tat-tnaqqis tal-livell tal-glukosju kienet baxxa għal Fiasp, kemm għall-effett tat-tnaqqis tal-livell tal-glukosju bikri ($AUC_{GIR, 0-1h}$, CV~26%), totali ($AUC_{GIR, 0-12h}$, CV~18%) kif ukoll massimu (GIR_{max} , CV~19%).

Effikaċja klinika u sigurtà

Fiasp ġie studjat f' 2,068 pazjent adult bid-dijabete mellitus ta' tip 1 (1,143 pazjent) u d-dijabete mellitus ta' tip 2 (925 pazjent) fi 3 provi li saru b' mod arbitrarju dwar l-effikaċja u s-sigurtà (18-26 ġimgha ta' kura). Barra minn hekk, Fiasp ġie studjat 777 suġġett pedjatriku bid-dijabete ta' tip 1 f' prova magħmula b' mod arbitrarju dwar l-effikaċja u s-sigurtà (26 ġimgha ta' kura). Ebda tifel jew tifla taht is-sentejn ma ġie magħżul b' mod arbitrarju biex jiehu parti f' din il-prova.

Pazjenti b' dijabete mellitus ta' tip 1

L-effett tal-kura ta' Fiasp biex jinkiseb il-kontroll glicemiku ġie evalwat meta ngħata fil-ħin tal-ikel jew wara l-ikel. Fiasp mogħti fil-ħin tal-ikel ma kienx inferjuri għal NovoRapid biex inaqqs HBA_{1c}, u t-titjib f' HBA_{1c} kien statistikament sinifikanti favur Fiasp. Fiasp mogħti wara l-ikel kiseb tnaqqis simili ta' HBA_{1c} bħal NovoRapid mogħti fil-ħin tal-ikel (Tabella 3).

Tabella 3 Rizultati minn studju kliniku bażilari-bolus li dam 26 ġimgha f' pazjenti b' dijabete ta' tip 1

	Fiasp mogħti fil-ħin tal-ikel + insulin detemir	Fiasp mogħti wara l-ikel + insulin detemir	NovoRapid mogħti fil-ħin tal-ikel + insulin detemir
N	381	382	380
HbA_{1c} (%)			
Linja bażi → Tmiem tal-istudju	7.6 → 7.3	7.6 → 7.5	7.6 → 7.4
Bidla aġġustata mil-linja bażi	-0.32	-0.13	-0.17
<i>Differenza stmata fil-kura</i>	<i>-0.15 [-0.23;-0.07]^{CE}</i>	<i>0.04 [-0.04;0.12]^D</i>	
HbA_{1c} (mmol/mol)			
Linja bażi → Tmiem tal-istudju	59.7 → 56.4	59.9 → 58.6	59.3 → 57.6
Bidla aġġustata mil-linja bażi	-3.46	-1.37	-1.84
<i>Differenza stmata fil-kura</i>	<i>-1.62 [-2.50;-0.73]^{CE}</i>	<i>0.47 [-0.41;1.36]^D</i>	
Żieda tal-glukosju sagħtejn wara l-ikel (mmol/L)^A			
Linja bażi → Tmiem tal-istudju	6.1 → 5.9	6.1 → 6.7	6.2 → 6.6
Bidla aġġustata mil-linja bażi	-0.29	0.67	0.38
<i>Differenza stmata fil-kura</i>	<i>-0.67 [-1.29;-0.04]^{CE}</i>	<i>0.30 [-0.34;0.93]^D</i>	
Żieda tal-glukosju siegħa wara l-ikel (mmol/L)^A			
Linja bażi → Tmiem tal-istudju	5.4 → 4.7	5.4 → 6.6	5.7 → 5.9
Bidla aġġustata mil-linja bażi	-0.84	1.27	0.34
<i>Differenza stmata fil-kura</i>	<i>-1.18 [-1.65;-0.71]^{CE}</i>	<i>0.93 [0.46;1.40]^D</i>	
Piż tal-ġisem (kg)			
Linja bażi → Tmiem tal-istudju	78.6 → 79.2	80.5 → 81.2	80.2 → 80.7
Bidla aġġustata mil-linja bażi	0.67	0.70	0.55
<i>Differenza stmata fil-kura</i>	<i>0.12 [-0.30;0.55]^C</i>	<i>0.16 [-0.27;0.58]^D</i>	
Rata osservata ta' ipoglicemija^B kkonfermata severa jew BG għal kull sena ta' espożizzjoni tal-pazjenti (perċentwali ta' pazjenti)			
	59.0 (92.7)	54.4 (95.0)	58.7 (97.4)
<i>Proporzjon ta' rata stmata</i>	<i>1.01 [0.88;1.15]^C</i>	<i>0.92 [0.81;1.06]^D</i>	

Linja bażi, il-valuri fit-tmiem tal-istudju huma bbażati fuq il-medja tal-valuri disponibbli li kienu osservati l-aħħar. L-intervall ta' kunfidenza ta' 95% hu ddikjarat f' '[]'

^A Test tal-ikla

^B Ipoglicemija severa (episodju li jeħtieġ għajjnuna ta' persuna oħra) jew ipoglicemija kkonfermata mill-glukosju fid-dem (BG) definita bħala episodji kkonfermati minn glukosju fil-plażma ta' <3.1 mmol/L, irrispettivament mis-sintomi

^C Id-differenza hi għal Fiasp mogħti fil-ħin tal-ikel – NovoRapid mogħti fil-ħin tal-ikel

^D Id-differenza hi għal Fiasp mogħti wara l-ħin tal-ikel – NovoRapid mogħti fil-ħin tal-ikel

^E Statistikament sinifikanti favur Fiasp fil-ħin tal-ikel

33.3% tal-pazjenti kkurati b'Fiasp fil-ħin tal-ikel laħqu mira ta' HBA_{1c} ta' <7% meta mqabbla ma' 23.3% tal-pazjenti kkurati b'Fiasp wara l-ikel, u 28.2% tal-pazjenti kkurati b'NovoRapid fil-ħin tal-ikel. Il-probabbilitajiet stmati tal-kisba ta' HBA_{1c} ta' <7% kienu akbar b'mod statistikament sinifikanti b'Fiasp mogħti fil-ħin tal-ikel milli b'NovoRapid mogħti fil-ħin tal-ikel (proprzjoni ta' probabbiltà: 1.47 [1.02; 2.13]_{95% CI}). Ma ntweriet l-ebda differenza statistikament sinifikanti bejn Fiasp mogħti wara l-ikel u NovoRapid mogħti fil-ħin tal-ikel.

Iż-żieda fil-glukosju wara siegħa u sagħtejn minn ikla kienet sinifikament inqas bi Fiasp mogħti fil-ħin tal-ikel meta mqabbel ma' NovoRapid mogħti fil-ħin tal-ikel. Iż-żieda fil-glukosju wara siegħa minn ikla kienet oghla bi Fiasp mogħti wara l-ikel u iż-żieda tal-glukosju wara sagħtejn minn ikla kienet simili għal NovoRapid mogħti fil-ħin tal-ikel (Tabella 3).

Il-medjan tad-doża totali tal-insulina mogħtija bħala bolus fit-tmien tal-istudju kien simili għal Fiasp mogħti fil-ħin tal-ikel, Fiasp mogħti wara l-ikel u NovoRapid mogħti fil-ħin tal-ikel (bidla mil-linja bażi sat-tmiem tal-istudju: Fiasp mogħti fil-ħin tal-ikel: 0.33→0.39 unità/kg/jum; Fiasp mogħti wara l-ikel: 0.35→0.39 unità/kg/jum; u NovoRapid mogħti fil-ħin tal-ikel: 0.36→0.38 unità/kg/jum). Bidliet fil-medjan tad-doża totali ta' insulina bażilari mil-linja bażi sat-tmiem tal-istudju kienu komparabbli għal Fiasp mogħti fil-ħin tal-ikel (0.41→0.39 unità/kg/jum), Fiasp mogħti wara l-ikel (0.43→0.42 unità/kg/jum) u NovoRapid mogħti fil-ħin tal-ikel (0.43→0.43 unità/kg/jum).

Pazjenti b'dijabete mellitus ta' tip 2

It-tnaqqis fl-HBA_{1c} mil-linja bażi sat-tmiem tal-istudju kien ikkonfermat li mhuwiex inferjuri għal dak miksub b'NovoRapid (Tabella 4).

Tabella 4 Riżultati minn studju kliniku bażilari-bolus li dam 26 ġimgha f'pazjenti b'dijabete ta' tip 2

	Fiasp + insulin glargine	NovoRapid + insulin glargine
N	345	344
HbA_{1c} (%)		
Linja bażi→ Tmiem tal-istudju	8.0 → 6.6	7.9 → 6.6
Bidla aġġustata mil-linja bażi	-1.38	-1.36
<i>Differenza stmata fil-kura</i>	<i>-0.02 [-0.15;0.10]</i>	
HbA_{1c} (mmol/mol)		
Linja bażi→ Tmiem tal-istudju	63.5 → 49.0	62.7 → 48.6
Bidla aġġustata mil-linja bażi	-15.10	-14.86
<i>Differenza stmata fil-kura</i>	<i>-0.24 [-1.60;1.11]</i>	
Żieda tal-glukosju sagħtejn wara l-ikel (mmol/L)^A		
Linja bażi→ Tmiem tal-istudju	7.6 → 4.6	7.3 → 4.9
Bidla aġġustata mil-linja bażi	-3.24	-2.87
<i>Differenza stmata fil-kura</i>	<i>-0.36 [-0.81;0.08]</i>	
Żieda tal-glukosju siegħa wara l-ikel (mmol/L)^A		
Linja bażi→ Tmiem tal-istudju	6.0 → 4.1	5.9 → 4.6
Bidla aġġustata mil-linja bażi	-2.14	-1.55
<i>Differenza stmata fil-kura</i>	<i>-0.59 [-1.09;-0.09]^C</i>	
Piż tal-ġisem (kg)		
Linja bażi→ Tmiem tal-istudju	89.0 → 91.6	88.3 → 90.8
Bidla aġġustata mil-linja bażi	2.68	2.67

Rata osservata ta' ipoglicemija^B**kkonfermata severa jew BG ghal****kull sena ta' espożizzjoni tal-****pazjenti (perċentwali ta' pazjenti)**

17.9 (76.8)

16.6 (73.3)

Proporzjon ta' rata stmata

1.09 [0.88;1.36]

Linja bażi, il-valuri fit-tmiem tal-istudju huma bbażati fuq il-medja tal-valuri disponibbli li kienu osservati l-aħħar. L-intervall ta' kunfidenza ta' 95% hu ddikjarat f' '[]'

^A Test tal-ikla

^B Ipoglicemija severa (episodju li jehtieg ġhajnuna ta' persuna oħra) jew ipoglicemija ikkonfermata ta' glukosju fid-dem (BG) definita bhala episodji kkonfermati minn glukosju fil-plażma ta' <3.1 mmol/L, irrispettivament mis-sintomi

^C Statistikament sinifikanti favur Fiasp

Id-dożaġġ wara l-ikel ma ġiex investigat f' pazjenti b' dijabete mellitus ta' tip 2.

74.8% tal-pazjenti kkurati b' Fiasp laħqu mira ta' HBA_{1c} ta' <7% meta mqabbla ma' 75.9% tal-pazjenti kkurati b' NovoRapid. Ma kien hemm l-ebda differenza statistikament sinifikanti bejn Fiasp u NovoRapid fil-probabbilitajiet stmati li jinkiseb HBA_{1c} <7%.

Il-medjan tad-doża totali tal-insulina mogħtija bhala bolus fit-tmien tal-istudju kien simili għal Fiasp u NovoRapid (bidla mil-linja bażi sat-tmiem tal-istudju: Fiasp: 0.21→0.49 unità/kg/jum; u NovoRapid: 0.21→0.51 unità/kg/jum). Bidliet fil-medjan tad-doża totali ta' insulina bażilari mil-linja bażi sat-tmiem tal-istudju kienu komparabbli għal Fiasp (0.56→0.53 unità/kg/jum) u NovoRapid (0.52→0.48 unità/kg/jum).

Anzjani

Fit-tliet provi kliniċi kkontrollati, 192 minn 1,219 (16%) ta' pazjenti b' dijabete mellitus ta' tip 1 jew b' dijabete mellitus ta' tip 2, ikkurati b' Fiasp, kellhom ≥65 sena, u 24 minn 1,219 (2%) kellhom ≥75 sena. B' mod globali, ma ġew osservati l-ebda differenzi fis-sigurtà u l-effikaċja bejn pazjenti anzjani u pazjenti li kienu iżgħar.

Infużjoni kontinwa tal-insulina minn taħt il-ġilda (CSII)

Studju kkontrollat b' mod attiv, double-blind, b' grupp parallel, li dam 6 ġimgħat, li fih il-partecipanti ntgħażlu b' mod każwali (2:1) evalwa l-kompatibilità ta' Fiasp u NovoRapid mogħtija permezz tas-sistema CSII f' pazjenti adulti b' dijabete ta' tip 1. Ma kien hemm l-ebda episodji kkonfermati mikroskopikament ta' okklużjonijiet tas-sett tal-infużjoni la fil-grupp ta' Fiasp (N=25) u lanqas f' dak ta' NovoRapid (N=12). Kien hemm żewġ pazjenti mill-grupp ta' Fiasp li rrapportaw żewġ reazzjonijiet fis-sit tal-infużjoni li żviluppaw mill-kura.

Fi studju cross-over li dam ġimgħtejn, Fiasp wera effett akbar tat-tnaqqis tal-livell tal-glukosju wara l-ikel wara test tal-ikla standardizzati fir-rigward ta' rispons tal-glukosju wara siegħa u saġħtejn minn ikla (differenza fil-kura: -0.50 mmol/L [-1.07; 0.07]_{95% CI} u -0.99 mmol/L [-1.95; -0.03]_{95% CI}), rispettivament meta mqabbla ma' NovoRapid fi sfond ta' CSII.

Popolazzjoni pedjatrika

L-effikaċja u s-sigurtà ta' Fiasp ġew studjati f' prova klinika kkontrollata b' mod attiva u magħmula b' mod arbitrarju 1:1:1 fit-tfal u fl-adolesxenti bid-dijabete mellitus ta' tip 1, ta' età minn sena sa 18-il sena, għal perjodu ta' 26 ġimgħa (N=777). F' din il-prova, ġew mqabbla, l-effikaċja u s-sigurtà ta' Fiasp mogħti fil-ħin tal-ikel (0-2 minuti qabel l-ikel) jew wara l-ikel (20 minuta wara li tkun bdiet l-ikel) u NovoRapid mogħti fil-ħin tal-ikel, it-tnejn li huma użati flimkien ma' insulin degludec. Il-pazjenti fil-fergħa ta' Fiasp meħud fil-ħin tal-ikel kienu jinkludu 16-it-tifel u tifla ta' età minn sentejn sa 5 snin, 100 tifel u tifla ta' età minn 6 sa 11-il sena u 144 adolesxent ta' età minn 12 sa 17-il sena. Il-pazjenti fil-fergħa ta' Fiasp meħud wara l-ikel kienu jinkludu 16-it-tifel u tifla ta' età minn

sentejn sa 5 snin, 100 tifel u tifla ta' età minn 6 sa 11-il sena u 143 adolexxent ta' età minn 12 sa 17-il sena.

Fiasp mogħti fil-ħin tal-ikel wera superjorità fil-kontroll glicemiku meta mqabbel ma' NovaRapid mogħti fil-ħin tal-ikel fir-rigward ta' tiddil fl-HbA_{1c} (ETD: -0.17% [-0.30; -0.03]_{95% CI}). Fiasp mogħti wara l-ikel wera non-inferjorità fil-kontroll glicemiku meta mqabbel ma' NovoRapid mogħti fil-ħin tal-ikel (ETD: 0.13% [-0.01; 0.26]_{95% CI}).

Fiasp mogħti fil-ħin tal-ikel wera titjib statistikament sinifikanti fiż-żieda medja ta' glukozju siegħa wara l-ikel fit-tliet ikliet principali kollha meta mqabbel ma' NovoRapid (imkejjejl permezz ta' SMPG). Għal Fiasp mogħti wara l-ikel dan il-paragun iffavorixxa NovaRapid mogħti fil-ħin tal-ikel. Ma giet osservata ebda żieda b' mod ġenerali fir-riskju ta' ipoglicemija severa jew ikkonfermata skont il-livell tal-glukozju fid-demem meta mqabbel ma' NovoRapid.

L-effetti osservati u l-profilu ta' sigurtà kienu simili bejn il-gruppi kollha ta' età.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Fiasp hu formulazzjoni ta' insulina aspart li tittiehed fil-ħin tal-ikel fejn iż-żieda ta' nicotinamide (vitamina B₃) tirriżulta f' assorbiment inizjali aktar mgħaġġel tal-insulina. L-insulina dehret fiċ-ċirkolazzjoni madwar 4 minuti wara l-għoti (Figura 1). L-ewwel dehra kienet darbtejn aktar mgħaġġla (li jikkorrispondi għal 5 minuti qabel), il-ħin għal 50% tal-koncentrazzjoni massima kien ta' 9 minuti iqsar b' Fiasp meta mqabbel ma' NovoRapid, b'erba' darbiet aktar insulina disponibbli matul l-ewwel 15-il minuta u d-doppju tal-insulina disponibbli matul l-ewwel 30 minuta.




Figura 1 Medja tal-profil tal-insulina f'pazjenti b'dijabete ta' tip 1 wara injezzjoni taht il-ġilda

L-espożizzjoni totali tal-insulina kienet komparabbli bejn Fiasp u NovoRapid. Il-medja tas-C_{max} għal doża ta' 0.2 unitajiet/kg tal-piż tal-ġisem hi ta' 298 pmol/L u komparabbli għal NovoRapid.

L-espożizzjoni totali u l-koncentrazzjoni massima tal-insulina jiżjedu proporzjonalment maż-żieda fid-doża ta' Fiasp mogħti minn taht il-ġilda fil-limiti tad-doża terapewtika.

Il-bijodisponibilità assoluta ta' insulina aspart wara l-għoti taht il-ġilda ta' Fiasp fiż-żaq, fid-deltoid u fil-koxxa kienet ta' madwar 80%.

Wara l-ghoti ta' Fiasp, id-dehra b' mod rapida tiegħu tinzamm irrispettivament mis-sit tal-injezzjoni. Il-hin sal-koncentrazzjoni massima u l-espożizzjoni totali ta' insulina aspart kienu kollha komparabbli bejn iż-żaqq, in-naħa ta' fuq tad-driegħ u l-koxxa. L-espożizzjoni bikrija tal-insulina u l-koncentrazzjoni massima kienu komparabbli għar-regjuni taż-żaqq u n-naħa ta' fuq tad-driegħ, iżda aktar baxxi għall-koxxa.

Infużjoni kontinwa tal-insulina minn taħt il-ġilda (CSII)

Il-bidu tal-espożizzjoni fi sfond ta' CSII (hin biex tintlaħaq il-koncentrazzjoni massima) kien ta' 26 minuta iqsar b' Fiasp meta mqabbel ma' NovoRapid, u dan irriżulta f' madwar tliet darbiet aktar insulina disponibbli matul l-ewwel 30 minuta (Figura 2).




Figura 2 Medja tal-profil tal-insulina f'pazjenti b'diabetu ta' tip 1 fi sfond ta' CSII (0-5 sigħat) ikkoreguta għal infużjoni ta' insulina bazilari

Distribuzzjoni

Insulina aspart għandha affinità baxxa ta' rabta mal-proteini fil-plażma (<10%), li hija simili għal dak osservat b'insulina umana regolari.

Il-volum tad-distribuzzjoni (V_d) wara l-ghoti ġol-vini kien ta' 0.22 L/kg (eż., 15.4 L għal individwu li jiżen 70 kg) li jikkorrispondi għall-volum ta' fluwidu ekstracellulari fil-ġisem.

Bijotrasformazzjoni

Id-degradazzjoni ta' insulina aspart hija simili għal dik tal-insulina umana; il-metaboliti kollha li jiffurmaw huma inattivi.

Eliminazzjoni

Il-half-life wara l-ghoti taħt il-ġilda ta' Fiasp hi ta' 57 minuta u hi komparabbli ma' NovoRapid.

Wara l-ghoti ta' Fiasp ġol-vini, it-tneħħija kienet mgħagħla (1 L/h/kg), u l-half-life tal-eliminazzjoni kienet ta' 10 minuti.

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani

F'pazjenti anzjani b'dijabete ta' tip 1, Fiasp wera bidu aktar kmieni ta' espożizzjoni u espożizzjoni bikrija oġhla tal-insulina filwaqt li żamm espożizzjoni totali simili u konċentrazzjoni massima simili meta mqabbel ma' NovoRapid.

Espożizzjoni totali ta' insulina aspart u konċentrazzjoni massima wara l-għoti ta' Fiasp kienu 30% oġhla f'individwi anzjani meta mqabbla ma' individwi adulti iżgħar.

Sess

L-effett tas-sess fuq il-farmakokinetika ta' Fiasp ġie eżaminat f' analiżi tal-provi kollha tal-provi farmakokinetiċi. Fiasp wera bidu ta' espożizzjoni iktar kmieni komparabbli u espożizzjoni bikrija oġhla tal-insulina filwaqt li żamm espożizzjoni totali simili u konċentrazzjoni massima simili meta mqabbel ma' NovoRapid, kemm għal pazjenti nisa kif ukoll għal pazjenti rġiel b'dijabete ta' tip 1.

L-espożizzjoni bikrija u massima tal-insulina ta' Fiasp kienet komparabbli għal pazjenti nisa u rġiel b'dijabete ta' tip 1. Madankollu, l-espożizzjoni totali tal-insulina kienet akbar f' pazjenti nisa meta mqabbla ma' pazjenti rġiel b'dijabete ta' tip 1.

Obezità

Ir-rata ta' assorbiment inizjali kienet aktar bil-mod biż-żieda fil-BMI, filwaqt li l-espożizzjoni totali kienet simili bejn il-livelli differenti ta' BMI. Meta mqabbla ma' NovoRapid, l-influenza tal-BMI fuq l-assorbiment kienet inqas qawwija għal Fiasp, u dan wassal għal espożizzjoni inizjali relattivament oġhla.

Razza u etniċità

L-effett tar-razza u l-etniċità (Suwed kontra Bojod u Ispaniċi kontra persuni mhux Ispaniċi) fuq l-espożizzjoni totali tal-insulina ta' Fiasp kienet ibbażata fuq ir-riżultati minn analiżi farmakokinetika tal-popolazzjoni f'pazjenti b'dijabete ta' tip 1. Għal Fiasp, ma nstabet l-ebda differenza fl-espożizzjoni bejn il-gruppi razzjali u l-gruppi etniċi investigati.

Indeboliment epatiku

Studju farmakokinetiku b' doża waħda ta' insulina aspart ġie magħmul b'NovoRapid f' 24 suġġett b'funzjoni epatika li tvarja minn normali għal indeboliment sever. F'pazjenti b'indeboliment epatiku, ir-rata ta' assorbiment naqset u kienet aktar varjabbli.

Indeboliment renali

Studju farmakokinetiku b' doża waħda ta' insulina aspart ġie magħmul b'NovoRapid f' 18-il suġġett b'funzjoni renali li tvarja minn normali għal indeboliment sever. Il-valuri tat-tneħħija tal-kreatinina deħru li ma kellhom ebda effett fuq l-AUC, $is-C_{max}$, $is-CL/F$ u $t-T_{max}$ ta' insulina aspart. L-informazzjoni kienet limitata f'pazjenti b'indeboliment renali moderat u sever. Ma ġewx investigati pazjenti b'insuffiċjenza renali li jkollhom bżonn kura bid-dijaliżi.

Popolazzjoni pedjatrika

Fit-tfal (6-11-il sena) u l-adoloxxenti (12-18-il sena) Fiasp wera bidu aktar kmieni ta' espożizzjoni u espożizzjoni bikrija oġhla tal-insulina filwaqt li żamm espożizzjoni totali simili u konċentrazzjoni massima simili meta mqabbel ma' NovoRapid.

Il-bidu u l-espożizzjoni bikrija tal-insulina ta' Fiasp kienu simili fit-tfal u l-adoloxxenti għal dak fl-adulti. L-espożizzjoni totali ta' Fiasp kienet aktar baxxa fit-tfal u l-adoloxxenti meta mqabbla mal-adulti meta ngħataw doża ta' 0.2 unitajiet/kg ta' piż tal-ġisem, filwaqt li l-konċentrazzjoni massima ta' insulina aspart fis-serum kienet simili bejn il-gruppi ta' etajiet.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta' sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni u effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva wara l-espożizzjoni għal insulina aspart, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin. F' testijiet *in vitro*, li jinkludu r-rabta mas-siti tar-riċetturi tal-insulina u ta' IGF-1 u l-effetti fuq it-tkabbir taċ-ċelloli, l-insulina aspart għab ruħu b'mod li jixbah hafna l-insulina umana. L-istudji juru wkoll li d-dissoċjazzjoni tar-rabta ta' insulina aspart mar-riċettur tal-insulina hija ekwivalenti għal dik tal-insulina umana.

6. TAGHRIF FARMACEWTIKU

6.1 Lista ta' eċċipjenti

Phenol
Metacresol
Glycerol
Zinc acetate
Disodium phosphate dihydrate
Arginine hydrochloride
Nicotinamide (vitamin B₃)
Hydrochloric acid (għall-aġġustament tal-pH)
Sodium hydroxide (għall-aġġustament tal-pH)
Ilma għall-injezzjonijiet

6.2 Inkompatibbiltajiet

Dan il-prodott mediċinali m'għandux jiġi dilwit jew imħallat ma' kwalunkwe prodotti mediċinali oħra hliet fluwidi tal-infużjoni kif deskritt f' sezzjoni 6.6.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

30 xahar.

Fiasp 100 unità/mL FlexTouch soluzzjoni għall-injezzjoni f' pinna mimlija għal-lest

Meta jinfetaħ għall-ewwel darba jew meta jinżamm bħala sper, il-prodott mediċinali jista' jinħażen għal massimu ta' 4 ġimgħat. Tahżinx f' temperatura 'l fuq minn 30°C. Jista' jinħażen fi frigg (2°C - 8°C). Tagħmlux fil-friza. Żomm l-għatu tal-pinna f' postu sabiex tilqa' mid-dawl.

Fiasp 100 unità/mL Penfill soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ

Meta jinfetaħ għall-ewwel darba jew meta jinżamm bħala sper, il-prodott mediċinali jista' jinħażen għal massimu ta' 4 ġimgħat. Tahżinx f' temperatura 'l fuq minn 30°C. Tagħmlux fil-frigg. Tagħmlux fil-friza. Jekk iskartoċċ jingarr bħala sper u ma jintużax, l-iskartoċċ għandu jinżamm fil-kartuna ta' barra sabiex tilqa' mid-dawl.

Fiasp 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni f' kunjett

Meta jinfetaħ għall-ewwel darba, il-prodott mediċinali jista' jinħażen għal massimu ta' 4 ġimgħat (inkluż il-hin fir-riċipjent tal-pompa, ara sezzjoni 6.6). Tahżinx f' temperatura 'l fuq minn 30°C. Jista' jinħażen fi frigg (2°C - 8°C). Tagħmlux fil-friza. Żomm il-kunjett fil-kartuna ta' barra sabiex tilqa' mid-dawl.

Fiasp 100 unità/mL PumpCart soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ

Meta jinfetaħ għall-ewwel darba jew meta jinżamm bħala sper, il-prodott mediċinali jista' jinħażen għal massimu ta' ġimgħatejn taħt 30°C. Wara dan il-perjodu, jista' jinżamm sa 7 ijiem taħt 37°C f' sistema ta' pompa għall-infużjoni tal-insulina magħmula biex tintuża ma' dan l-iskartoċċ (ara

sezzjoni 6.6). Tagħmlux fil-frigġ. Tagħmlux fil-friża. Jekk iskartoċċ jingarr bhala sper u ma jintużax, l-iskartoċċ għandu jinżamm fil-kartuna ta' barra sabiex tilqa' mid-dawl.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Fiasp 100 unità/mL FlexTouch soluzzjoni għall-injezzjoni f' pinna mimlija għal-lest

Aħżen fi frigġ (2°C – 8°C). Tagħmlux fil-friża. Żommu 'l bogħod mill-element li jiffriża. Żomm l-għatu tal-pinna f' postu sabiex tilqa' mid-dawl.

Fiasp 100 unità/mL Penfill soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ

Aħżen fi frigġ (2°C – 8°C). Tagħmlux fil-friża. Żommu 'l bogħod mill-element li jiffriża. Żomm l-iskartoċċ fil-kartuna ta' barra sabiex tilqa' mid-dawl.

Fiasp 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni f' kunjett

Aħżen fi frigġ (2°C – 8°C). Tagħmlux fil-friża. Żommu 'l bogħod mill-element li jiffriża. Żomm il-kunjett fil-kartuna ta' barra sabiex tilqa' mid-dawl.

Fiasp 100 unità/mL PumpCart soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ

Aħżen fi frigġ (2°C – 8°C). Tagħmlux fil-friża. Żommu 'l bogħod mill-element li jiffriża. Żomm l-iskartoċċ fil-kartuna ta' barra sabiex tilqa' mid-dawl.

Għal kondizzjonijiet ta' ħażna wara l-ewwel ftuħ tal-prodott mediċinali jew meta jingarr bhala sper, ara sezzjoni 6.3.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta' dak li hemm ġo fih

Fiasp 100 unità/mL FlexTouch soluzzjoni għall-injezzjoni f' pinna mimlija għal-lest

Skartoċċ (ħġieġ ta' tip 1) bi plangier (halobutyl) u tapp (halobutyl/polyisoprene) f' pinna mimlija għal-lest, b'ħafna doži, li tintrema wara li tintuża, magħmula mill-polypropylene, polyoxymethylene, polycarbonate u acrylonitrile butadiene styrene.

Kull pinna mimlija għal-lest fiha 3 mL ta' soluzzjoni.

Daqsijiet tal-pakkett ta' pinna 1 mimlija għal-lest (bil-labar jew mingħajr), 5 pinen mimlija għal-lest (mingħajr labar), u pakkett multiplu li fih 10 (2 pakketti ta' 5) pinen mimlija għal-lest (mingħajr labar).

Fiasp 100 unità/mL Penfill soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ

Skartoċċ (ħġieġ ta' tip 1) bi plangier (halobutyl) u tapp (halobutyl/polyisoprene) f' kartuna.

Kull skartoċċ fih 3 mL ta' soluzzjoni.

Daqsijiet tal-pakketti ta' 5 jew 10 skrataċ.

Fiasp 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni f' kunjett

Kunjett (ħġieġ ta' tip 1) magħluq b' diska tal-lastku tal-halobutyl/polyisoprene u b' għatu tal-plastik protettiv sabiex jinkiseb kontenitur li ma jkunx jista' jiġi mbaġħbas f' kaxxa tal-kartun.

Kull kunjett fih 10 mL ta' soluzzjoni.

Daqsijiet tal-pakkett ta' 1 kunjett, 5 kunjetti u pakkett multiplu li fih 5 (5 pakketti ta' 1) kunjetti.

Fiasp 100 unità/mL PumpCart soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ

Skartoċċ (ħġieġ ta' tip 1) bi plangier (halobutyl) u għatu tal-lastku (halobutyl/polyisoprene) f' kartuna.

Kull skartoċċ fih 1.6 mL ta' soluzzjoni.

Daqsijiet tal-pakketti ta' 5 skrataċ u pakkett multiplu li fih 25 (5 pakketti ta' 5) skartoċċ.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi u għal immaniġġar ieħor

Fiasp m'għandux jintuża jekk is-soluzzjoni ma tidhirx ċara u bla kulur.

Fiasp li gie ffrizat m'għandux jintuża.

Fiasp 100 unità/mL FlexTouch soluzzjoni għall-injezzjoni f' pinna mimlija għal-lest

Il-pinna mimlija għal-lest (FlexTouch) hija magħmula biex tintuża ma' labar tal-injezzjoni żviluppata skont l-istandard ISO għal-labra ta' pinna ta' tul bejn 4 mm sa 8 mm u geġg bejn 30G u 32G għall-użu biss ta' injezzjoni minn taħt il-ġilda.

Il-labar u l-pinen mimlija għal-lest m'għandhomx jiġu mislufa mingħand jew lil haddieħor. L-iskartoċċ m'għandux jerga' jimtela mill-ġdid.

Il-pazjent għandu jarmi l-labra wara kull injezzjoni.

Fiasp 100 unità/mL Penfill soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ

L-iskartoċċ (Penfill) huwa magħmul biex jintuża ma' pinen għall-insulina Novo Nordisk li jistgħu jerggħu jintużaw u labar tal-injezzjoni żviluppata skont l-istandard ISO għal-labra ta' pinna ta' tul bejn 4 mm sa 8 mm u geġg bejn 30G u 32G għall-użu biss ta' injezzjoni minn taħt il-ġilda.

Il-labar u l-iskrataċ m'għandhomx jiġu mislufa mingħand jew lil haddieħor. L-iskartoċċ m'għandux jerga' jimtela mill-ġdid.

Il-pazjent għandu jarmi l-labra wara kull injezzjoni.

Fiasp 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni f'kunjett

Il-labar u s-siringi m'għandhomx jiġu mislufa mingħand jew lil haddieħor.

Il-pazjent għandu jarmi l-labra wara kull injezzjoni.

L-ġhoti permezz ta' CSII

Meta Fiasp jingibed minn kunjett, jista' jintuża f'pompa tal-infuzjoni (CSII) għal massimu ta' 6 ijiem, kif deskritt f'sezzjoni 4.2 u fil-fuljett ta' tagħrif. Tubi li għandhom il-materjal tas-superfiċje intern magħmul mill-polyethylene jew polyolefin ġew evalwati u nstabu li huma kompatibbli mal-użu tal-pompa.

L-użu minn ġol-vini

Ġie muri li Fiasp huwa stabbli f'temperatura tal-kamra għal 24 siegħa fil-fluwidi għall-infuzjoni bħal soluzzjoni għall-injezzjoni ta' sodium chloride 9 mg/mL (0.9%) jew soluzzjoni għall-injezzjoni ta' 5% glukosju.

Għall-użu minn ġol-vini, għandu jintuża f'koncentrazzjonijiet minn 0.5 unitajiet/mL sa unità 1/mL ta' insulin aspart f'sistemi tal-infuzjoni – bl-użu ta' boroż tal-infuzjoni tal-polypropylene.

Fiasp 100 unità/mL PumpCart soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ

L-iskartoċċ m'għandux jiġu misluf jew jerga' jimtela mill-ġdid.

L-iskartoċċ (PumpCart) huwa għall-użu biss mas-sistemi tal-pompi għall-infuzjoni tal-insulina li ġejjin; il-pompi tal-insulina Accu-Chek Insight u YpsoPump. Il-materjali tas-superfiċje ta' ġewwa tal-pajpijiet huma magħmula mill-polyethylene jew polyolefin li ġew evalwati u nstabu li huma kompatibbli għall-użu ma' pompa.

Rimi

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa' wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-ligġiet lokali.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd
Id-Danimarka

8. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/1/16/1160/001
EU/1/16/1160/002
EU/1/16/1160/003
EU/1/16/1160/004
EU/1/16/1160/005
EU/1/16/1160/006
EU/1/16/1160/007
EU/1/16/1160/008
EU/1/16/1160/009
EU/1/16/1160/010
EU/1/16/1160/011
EU/1/16/1160/012
EU/1/16/1160/013

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 09 Jannar 2017
Data tal-aħħar tiġdid:

10. DATA TA' REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini <http://www.ema.europa.eu>.

ANNEX II

- A. MANIFATTUR TAS-SUSTANZA BIJOLOĠIKA ATTIVA U
MANIFATTUR RESPONSABBLI GHALL-HRUĠ TAL-
LOTT**
- B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD
IL-PROVVISTA U L-UŻU**
- C. KONDIZZJONIJIET U REKWIŻITI OHRA TAL-
AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**
- D. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FIR-
RIGWARD TAL-UŻU SIGUR U EFFETTIV TAL-PRODOTT
MEDIĊINALI**

A. MANIFATTUR TAS-SUSTANZA BIJOĠIKA ATTIVA U MANIFATTUR RESPONSABBLI GHALL-HRUĠ TAL-LOTT

Isem u indirizz tal-manifattur tas-sustanza bijoloġika attiva

Novo Nordisk A/S
Hallas Alle
4400 Kalundborg
Id-Danimarka

Isem u indirizz tal-manifattur responsabbli għall-hruġ tal-lott

Novo Nordisk A/S
Novo Alle 1
2880 Bagsværd
Id-Danimarka

B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD IL-PROVVISTA U L-UŻU

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

C. KONDIZZJONIJIET U REKWIŻITI OHRA TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

• **Rapporti Perjodiċi Aġġornati dwar is-Sigurtà (PSURs)**

Ir-rekwiżiti biex jiġu pprezentati PSURs għal dan il-prodott mediċinali huma mnizzla fil-lista tad-dati ta' referenza tal-Unjoni (lista EURD) prevista skont l-Artikolu 107c(7) tad-Direttiva 2001/83/KE u kwalunkwe aġġornament sussegwenti ppubblikat fuq il-portal elettroniku Ewropew tal-mediċini.

D. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FIR-RIGWARD TAL-UŻU SIGUR U EFFIKAĊI TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

• **Pjan tal-ġestjoni tar-riskju (RMP)**

Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqeghid fis-suq (MAH) għandu jwettaq l-attivitajiet u l-interventi meħtieġa ta' farmakoviġilanza dettaljati fl-RMP maqbul ipprezentat fil-Modulu 1.8.2 tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq u kwalunkwe aġġornament sussegwenti maqbul tal-RMP.

RMP aġġornat għandu jiġi pprezentat:

- Meta l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini titlob din l-informazzjoni;
- Kull meta s-sistema tal-ġestjoni tar-riskju tiġi modifikata speċjalment minhabba li tasal informazzjoni ġdida li tista' twassal għal bidla sinifikanti fil-profil bejn il-benefiċċju u r-riskju jew minhabba li jintlaħaq għan importanti (farmakoviġilanza jew minimizzazzjoni tar-riskji).

ANNEX III

TIKKETTAR U FULJETT TA' TAGHRIF

A. TIKKETTAR

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KARTUNA TA' BARRA (Pinna mimlija għal-lest (FlexTouch))

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Fiasp 100 unità/mL FlexTouch soluzzjoni għall-injezzjoni f'pinna mimlija għal-lest insulina aspart

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull pinna mimlija għal-lest fiha 300 unità ta' insulina aspart f' soluzzjoni ta' 3 mL
Millilitru ta' soluzzjoni fih 100 unità ta' insulina aspart (ekwivalenti għal 3.5 mg)

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

phenol, metacresol, glycerol, zinc acetate, disodium phosphate dihydrate, arginine hydrochloride, nicotinamide (vitamin B₃), hydrochloric acid/sodium hydroxide (għall-aġġustament tal-pH) u ilma għall-injezzjonijiet. Ara l-fuljett għal aktar informazzjoni.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

1 x 3 mL

1 x 3 mL + 7 labar NovoFine Plus

1 x 3 mL + 7 labar NovoFine

1 x 3 mL + 7 labar NovoTwist

5 x 3 mL

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Il-labar mhumiex inkluzi

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu

Għall-użu taħt il-ġilda

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

Uża biss soluzzjoni ċara u bla kulur

Għall-użu ta' pazjent wiehed biss

Maħsuba biex tintuża ma' labar għall-injezzjoni b'tul bejn 4 mm sa 8 mm u gejj bejn 30G u 32G

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

Waqt l-użu: Uża fi żmien 4 ġimgħat

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Qabel ma jinfetaħ: Aħżen fi frigġ. Tagħmlux fil-friza

Waqt l-użu: Jista' jinħażen fi frigġ. Aħżen f'temperatura taħt 30°C. Tagħmlux fil-friza. Żomm l-ġhatu tal-pinna f'postu sabiex tilqa' mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-labra wara kull injezzjoni

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Id-Danimarka

12. NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/1/16/1160/001 pinna 1 ta' 3 mL

EU/1/16/1160/002 pinna 1 ta' 3 mL u 7 labar NovoFine Plus

EU/1/16/1160/003 pinna 1 ta' 3 mL u 7 labar NovoFine

EU/1/16/1160/004 pinna 1 ta' 3 mL u 7 labar NovoTwist

EU/1/16/1160/005 5 pinen ta' 3 mL

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA**15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU****16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE**

Fiasp

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluz

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGHAR EWLENIN
TIKKETTA TAL-PINNA (Pinna mimlija għal-lest (FlexTouch))

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GHANDU JINGHATA

Fiasp 100 unità/mL FlexTouch soluzzjoni għall-injezzjoni
insulina aspart
SC

2. METODU TA' KIF GHANDU JINGHATA

Għall-użu minn taħt il-ġilda

3. DATA TA' SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

3 mL

6. OHRAJN

Novo Nordisk A/S

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KARTUNA TA' BARRA GHAL PAKKETT MULTIPLU (Pinna mimlija għal-lest (FlexTouch)-bil-kaxxa blu)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Fiasp 100 unità/mL FlexTouch soluzzjoni għall-injezzjoni f' pinna mimlija għal-lest insulina aspart

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull pinna mimlija għal-lest fiha 300 unità ta' insulina aspart f' soluzzjoni ta' 3 mL Millilitru ta' soluzzjoni fih 100 unità ta' insulina aspart (ekwivalenti għal 3.5 mg)

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

phenol, metacresol, glycerol, zinc acetate, disodium phosphate dihydrate, arginine hydrochloride, nicotinamide (vitamin B₃), hydrochloric acid/sodium hydroxide (għall-aġġustament tal-pH) u ilma għall-injezzjonijiet. Ara l-fuljett għal aktar informazzjoni.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

Pakkett multiplu: 10 (2 pakketti ta' 5 x 3 mL)

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Il-labar mhumiex inklużi
Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu
Għall-użu taħt il-ġilda

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

Uża biss soluzzjoni ċara u bla kulur
Għall-użu ta' pazjent wiehed biss
Maħsuba biex tintuża ma' labar għall-injezzjoni b'tul bejn 4 mm sa 8 mm u geġ bejn 30G u 32G

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

Waqt l-użu: Uża fi żmien 4 ġimghat

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Qabel ma jinfetaħ: Ahżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friza

Waqt l-użu: Jista' jinħażen fi friġġ. Ahżen f'temperatura taħt 30°C. Tagħmlux fil-friza. Żomm l-ġhatu tal-pinna f'postu sabiex tilqa' mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-labra wara kull injezzjoni

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd
Id-Danimarka

12. NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/1/16/1160/006 10 pinen ta' 3 mL

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Fiasp

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:
NN:

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' ĠEWWA

KARTUNA GHAL PAKKETT MULTIPLU (Pinna mimlija għal-lest (FlexTouch) – minghajr il-kaxxa blu)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Fiasp 100 unità/mL FlexTouch soluzzjoni għall-injezzjoni f' pinna mimlija għal-lest insulina aspart

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull pinna mimlija għal-lest fiha 300 unità ta' insulina aspart f' soluzzjoni ta' 3 mL Millilitru ta' soluzzjoni fih 100 unità ta' insulina aspart (ekwivalenti għal 3.5 mg)

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

phenol, metacresol, glycerol, zinc acetate, disodium phosphate dihydrate, arginine hydrochloride, nicotinamide (vitamin B₃), hydrochloric acid/sodium hydroxide (għall-aġġustament tal-pH) u ilma għall-injezzjonijiet. Ara l-fuljett għal aktar informazzjoni.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

5 x 3 mL. Komponent ta' pakkett multiplu, ma jistax jinbiegħ b' mod separat

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Il-labar mhumiex inklużi
Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu
Għall-użu taħt il-ġilda

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

Uża biss soluzzjoni ċara u bla kulur
Għall-użu ta' pazjent wiehed biss
Maħsuba biex tintuża ma' labar għall-injezzjoni b'tul bejn 4 mm sa 8 mm u geġ bejn 30G u 32G

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

Waqt l-użu: Uża fi żmien 4 ġimghat

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Qabel ma jinfetaħ: Ahżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża

Waqt l-użu: Jista' jinħażen fi friġġ. Ahżen f' temperatura taħt 30°C. Tagħmlux fil-friża. Żomm l-ġhatu tal-pinna f' postu sabiex tilqa' mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-labra wara kull injezzjoni

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd
Id-Danimarka

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/1/16/1160/006 10 pinen ta' 3 mL

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Fiasp

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**KARTUNA TA' BARRA (Skartoċċ (Penfill))****1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI**

Fiasp 100 unità/mL Penfill soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ insulina aspart

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull skartoċċ fih 300 unità ta' insulina aspart f' soluzzjoni ta' 3 mL
Millilitru ta' soluzzjoni fih 100 unità ta' insulina aspart (ekwivalenti għal 3.5 mg)

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

phenol, metacresol, glycerol, zinc acetate, disodium phosphate dihydrate, arginine hydrochloride, nicotinamide (vitamin B₃), hydrochloric acid/sodium hydroxide (għall-aġġustament tal-pH) u ilma għall-injezzjonijiet. Ara l-fuljett għal aktar informazzjoni.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

5 x 3 mL
10 x 3 mL

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu
Għall-użu taħt il-ġilda
Intenzjonat għall-użu ma' pinen Novo Nordisk li jistgħu jerggħu jintużaw

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

Uża biss soluzzjoni ċara u bla kulur
Għall-użu ta' pazjent wiehed biss

8. DATA TA' SKADENZA

JIS
Waqt l-użu: Uża fi żmien 4 ġimgħat

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Qabel ma jinfetaħ: Aħżen fi frigg. Tagħmlux fil-friza
Waqt l-użu: Tagħmlux fil-frigg. Aħżen f' temperatura taħt 30°C. Tagħmlux fil-friza. Żomm l-iskartoċċ fil-kartuna ta' barra sabiex tilqa' mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-labra wara kull injezzjoni

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd
Id-Danimarka

12. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/1/16/1160/010 5 skrataċ ta' 3 mL
EU/1/16/1160/011 10 skrataċ ta' 3 mL

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Fiasp

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluz

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:
NN:

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGHAR EWLENIN

TIKKETTA (Skartoċċ (Penfill))

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GHANDU JINGHATA

Fiasp 100 unità/mL Penfill soluzzjoni għall-injezzjoni
insulina aspart
SC

2. METODU TA' KIF GHANDU JINGHATA

Għall-użu minn taht il-ġilda

3. DATA TA' SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

3 mL

6. OHRAJN

Novo Nordisk A/S

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KARTUNA TA' BARRA (KUNJETT)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Fiasp 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni f'kunjett
insulina aspart

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull kunjett fih 1,000 unità ta' insulina aspart f' soluzzjoni ta' 10 mL
Millilitru ta' soluzzjoni fih 100 unità ta' insulina aspart (ekwivalenti għal 3.5 mg)

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

phenol, metacresol, glycerol, zinc acetate, disodium phosphate dihydrate, arginine hydrochloride, nicotinamide (vitamin B₃), hydrochloric acid/sodium hydroxide (għall-aġġustament tal-pH) u ilma għall-injezzjonijiet. Ara l-fuljett għal aktar informazzjoni.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

1 x 10 mL

5 x 10 mL

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu
Għall-użu taħt il-ġilda jew għal ġol-vini

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

Uża biss soluzzjoni ċara u bla kulur

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

Waqt l-użu: Uża fi żmien 4 ġimgħat (inkluż il-ħin fir-riċipjent tal-pompa)

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Qabel ma jinfetaħ: Aħżen fi frigġ. Tagħmlux fil-friza
Waqt l-użu: Jista' jinħażen fi frigġ. Aħżen f' temperatura taħt 30°C. Tagħmlux fil-friza. Żomm il-kunjett fil-kartuna ta' barra sabiex tilqa' mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-labra wara kull injezzjoni

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGHID FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd
Id-Danimarka

12. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/1/16/1160/007 kunjett 1 ta' 10 mL
EU/1/16/1160/008 5 kunjetti ta' 10 mL

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Fiasp

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:
SN:
NN:

**TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGHAR EWLENIN
TIKKETTA (KUNJETT)**

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GHANDU JINGHATA

Fiasp 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni
insulina aspart
SC, IV

2. METODU TA' KIF GHANDU JINGHATA

Użu għal taht il-ġilda, użu għal ġol-vini

3. DATA TA' SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

10 mL

6. OHRAJN

Novo Nordisk A/S

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

IT-TIKKETTA TA' BARRA MGEŻWRA FUQ IL-PAKKETTI MULTIPLI (KUNJETT – bil-kaxxa blu)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Fiasp 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni f'kunjett
insulina aspart

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull kunjett fih 1,000 unità ta' insulina aspart f' soluzzjoni ta' 10 mL
Millilitru ta' soluzzjoni fih 100 unità ta' insulina aspart (ekwivalenti għal 3.5 mg)

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

phenol, metacresol, glycerol, zinc acetate, disodium phosphate dihydrate, arginine hydrochloride, nicotinamide (vitamin B₃), hydrochloric acid/sodium hydroxide (għall-aġġustament tal-pH) u ilma għall-injezzjonijiet. Ara l-fuljett għal aktar informazzjoni.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

Pakkett multiplu: 5 (5 pakketti ta' 1 x 10 mL) kunjetti

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu
Għall-użu taħt il-ġilda jew għal ġol-vini

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

Uża biss soluzzjoni ċara u bla kulur

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

Waqt l-użu: Uża fi żmien 4 ġimgħat (inkluż il-ħin fir-riċipjent tal-pompa)

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Qabel ma jinfetaħ: Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friza
Waqt l-użu: Jista' jinħażen fi friġġ. Aħżen f' temperatura taħt 30°C. Tagħmlux fil-friza. Żomm il-kunjett fil-kartuna ta' barra sabiex tilqa' mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-labra wara kull injezzjoni

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGHID FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd
Id-Danimarka

12. NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/1/16/1160/009 5 kunjetti ta' 10 mL

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Fiasp

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluz

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:
SN:
NN:

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' ĠEWWA

KARTUNA GHAL PAKKETT MULTIPLU (KUNJETT – minghajr il-kaxxa blu)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Fiasp 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni f'kunjett
insulina aspart

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull kunjett fih 1,000 unità ta' insulina aspart f' soluzzjoni ta' 10 mL
Millilitru ta' soluzzjoni fih 100 unità ta' insulina aspart (ekwivalenti għal 3.5 mg)

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

phenol, metacresol, glycerol, zinc acetate, disodium phosphate dihydrate, arginine hydrochloride, nicotinamide (vitamin B₃), hydrochloric acid/sodium hydroxide (għall-aġġustament tal-pH) u ilma għall-injezzjonijiet. Ara l-fuljett għal aktar informazzjoni.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

1 x 10 mL.

Komponent ta' pakkett multiplu, ma jistax jinbiegħ b' mod separat

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu
Għall-użu taħt il-ġilda jew għal ġol-vini

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

Uża biss soluzzjoni ċara u bla kulur

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

Waqt l-użu: Uża fi żmien 4 ġimgħat (inkluż il-ħin fir-riċipjent tal-pompa)

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Qabel ma jinfetaħ: Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friza

Waqt l-użu: Jista' jinħażen fi friġġ. Aħżen f' temperatura taħt 30°C. Tagħmlux fil-friza. Żomm il-kunjett fil-kartuna ta' barra sabiex tilqa' mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-labra wara kull injezzjoni

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGHID FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd
Id-Danimarka

12. NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/1/16/1160/009 5 kunjetti ta' 10 mL

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Fiasp

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KARTUNA TA' BARRA (Skartoċċ (PumpCart))

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Fiasp 100 unità/mL PumpCart soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ insulina aspart

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull skartoċċ fih 160 unità ta' insulina aspart f' soluzzjoni ta' 1.6 mL
Millilitru ta' soluzzjoni fih 100 unità ta' insulina aspart (ekwivalenti għal 3.5 mg)

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

phenol, metacresol, glycerol, zinc acetate, disodium phosphate dihydrate, arginine hydrochloride, nicotinamide (vitamin B₃), hydrochloric acid/sodium hydroxide (għall-aġġustament tal-pH) u ilma għall-injezzjonijiet. Ara l-fuljett għal aktar informazzjoni.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

5 x 1.6 mL

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu
Għall-użu taħt il-ġilda

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlahaqx mit-tfal

7. TWISSIJET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

Uża biss soluzzjoni ċara u bla kulur
Għall-użu ta' pazjent wieħed biss
Għall-użu biss ma' pompi magħmula għal PumpCart

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

Waqt l-użu fil-pompa: Uża fi żmien 7 ijiem

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Qabel ma jinfetaħ: Aħżen fi friġġ.

Meta jingarr bhala sper: Jista' jinżamm sa ġimagħtejn taħt 30°C.

Waqt l-użu: Tagħmlux fil-friġġ. Aħżen f' temperatura taħt 37°C.

Tagħmlux fil-friza.

Żomm l-iskartoċċ 'il bogħod mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd
Id-Danimarka

12. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/1/16/1160/012 5 skrataċ ta' 1.6 mL

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Fiasp

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:
SN:
NN:

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGHAR EWLENIN

TIKKETTA (Skartoċċ (PumpCart))

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GHANDU JINGHATA

Fiasp 100 unità/mL PumpCart soluzzjoni għall-injezzjoni
insulina aspart
SC

2. METODU TA' KIF GHANDU JINGHATA

Użu għal taht il-ġilda

3. DATA TA' SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

1.6 mL

6. OHRAJN

Novo Nordisk A/S

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

IT-TIKKETTA TA' BARRA MGEŻWRA FUQ IL-PAKKETTI MULTIPLI (Skartoċċ (PumpCart) – bil-kaxxa blu)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Fiasp 100 unità/mL PumpCart soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ insulina aspart

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull skartoċċ fih 160 unità ta' insulina aspart f' soluzzjoni ta' 1.6 mL
Millilitru ta' soluzzjoni fih 100 unità ta' insulina aspart (ekwivalenti għal 3.5 mg)

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

phenol, metacresol, glycerol, zinc acetate, disodium phosphate dihydrate, arginine hydrochloride, nicotinamide (vitamin B₃), hydrochloric acid/sodium hydroxide (għall-aġġustament tal-pH) u ilma għall-injezzjonijiet. Ara l-fuljett għal aktar informazzjoni.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni
PumpCart

Pakkett multiplu: 25 (5 pakketti ta' 5)

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu
Għall-użu taht il-ġilda

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

Uża biss soluzzjoni ċara u bla kulur
Għall-użu ta' pazjent wiehed biss
Għall-użu biss ma' pompi magħmula għal PumpCart

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

Waqt l-użu fil-pompa: Uża fi żmien 7 ijiem

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Qabel ma jinfetaħ: Aħžen fi friġġ.

Meta jingarr bhala sper: Jista' jinżamm sa ġimagħtejn taħt 30°C.

Waqt l-użu: Tagħmlux fil-friġġ. Aħžen f' temperatura taħt 37°C.

Tagħmlux fil-friza.

Żomm l-iskartoċċ 'il bogħod mid-dawl

10. PREKAWZZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Id-Danimarka

12. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/1/16/1160/013 25 (5 pakketti ta' 5) skartoċċ

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Fiasp

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluz

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:
SN:
NN:

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KARTUNA TA' ĠEWWA GHAL PAKKETT MULTIPLU (Skartoċċ (PumpCart)-minghajr il-kaxxa blu)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Fiasp 100 unità/mL PumpCart soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ insulina aspart

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull skartoċċ fih 160 unità ta' insulina aspart f' soluzzjoni ta' 1.6 mL
Millilitru ta' soluzzjoni fih 100 unità ta' insulina aspart (ekwivalenti għal 3.5 mg)

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

phenol, metacresol, glycerol, zinc acetate, disodium phosphate dihydrate, arginine hydrochloride, nicotinamide (vitamin B₃), hydrochloric acid/sodium hydroxide (għall-aġġustament tal-pH) u ilma għall-injezzjonijiet. Ara l-fuljett għal aktar informazzjoni.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

5 x 1.6 mL. Parti minn pakkett multiplu, ma jistax jinbigh b' mod separat.

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu
Għall-użu taħt il-ġilda

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

Uża biss soluzzjoni ċara u bla kulur
Għall-użu ta' pazjent wieħed biss
Għall-użu biss ma' pompi magħmula għal PumpCart

8. DATA TA' SKADENZA

JIS
Waqt l-użu fil-pompa: Uża fi żmien 7 ijiem

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Qabel ma jinfetaħ: Aħżen fi frigg.

Meta jingarr bhala sper: Jista' jinżamm sa ġimagħtejn taħt 30°C.

Waqt l-użu: Tagħmlux fil-frigg. Aħżen f'temperatura taħt 37°C.

Tagħmlux fil-friza.

Żomm l-iskartoċċ 'il bogħod mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Id-Danimarka

12. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/1/16/1160/013 25 (5 pakketti ta' 5) skartoċċ

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Fiasp

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

B. FULJETT TA' TAGHRIF

Fuljett ta' taghrif: Informazzjoni għall-pazjent

Fiasp 100 unità/mL FlexTouch soluzzjoni għall-injezzjoni f'pinna mimlija għal-lest insulina aspart

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-medicina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib, lill-ispizjar jew lill-infermier tiegħek.
- Din il-medicina għet mogħtija lilek biss. M'għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista' tagħmlilhom il-ħsara anke jekk għandhom l-istess sinjali ta' mard bħal tiegħek.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib, lill-ispizjar jew lill-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi effetti sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F'dan il-fuljett

1. X'inhu Fiasp u għalxiex jintuża
2. X'għandek tkun taf qabel ma tuża Fiasp
3. Kif għandek tuża Fiasp
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif taħžen Fiasp
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1. X'inhu Fiasp u għalxiex jintuża

Fiasp hu insulina li tittiehed fil-ħin tal-ikel u li jaħdem malajr biex ibaxxi z-zokkor fid-demm. Fiasp hu soluzzjoni għall-injezzjoni li fih insulina aspart u li jintuża għall-kura tad-dijabete mellitus fl-adulti, fl-adolessenti u fit-tfal minn sena 'l fuq. Id-dijabete hija marda fejn il-ġisem tiegħek ma jaġħmilx biżżejjed insulina biex jikkontrolla l-livell taz-zokkor fid-demm. Kura b'Fiasp tgħin biex tippreveni komplikazzjonijiet mid-dijabete tiegħek.

Fiasp għandu jiġi injettat sa 2 minuti qabel il-bidu tal-ikla, bl-għażla li jiġi injettat sa 20 minuta wara li tibda l-ikla.

Din il-medicina jkollha l-effett massimu tagħha bejn siegħa u 3 sigħat wara l-injezzjoni, u l-effett idum għal 3 sa 5 sigħat.

Din il-medicina għandha normalment tintuża flimkien ma' preparazzjonijiet oħrajn tal-insulina li jaġixxu b'effett intermedju jew li jaġixxu fit-tul.

2. X'għandek tkun taf qabel ma tuża Fiasp

Tużax Fiasp

- jekk inti allergiku għall-insulina aspart jew għal xi sustanza oħra ta' din il-medicina (imnizzla fis-sezzjoni 6).

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib, lill-ispizjar jew lill-infermier tiegħek qabel tuża Fiasp. Fuq kollox oqgħod attent għal dawn li ġejjin:

- Livell baxx ta' zokkor fid-demm (ipoglicemija) – Jekk il-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek ikun baxx wisq, segwi l-gwida ta' kif għandek tagħmel meta jkollok livell baxx ta' zokkor fid-demm f'sezzjoni 4 'Effetti sekondarji possibbli'. Fiasp jibda jibaxxi z-zokkor fid-demm aktar malajr meta mqabbel ma' insulini oħrajn li jittieħdu fil-ħin tal-ikel. Jekk isseħħ l-ipoglicemija, inti jista' jkollok din il-kundizzjoni aktar malajr wara injezzjoni b'Fiasp.
- Livell għoli ta' zokkor fid-demm (iperglicemija) – Jekk il-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek ikun għoli wisq, segwi l-gwida ta' kif għandek tagħmel meta jkollok livell għoli ta' zokkor fid-demm f'sezzjoni 4 'Effetti sekondarji possibbli'.

- Meta tbiddel minn prodotti mediċinali oħra tal-insulina – It-tabib tiegħek jista' jkollu bżonn jagħtik xi parir dwar id-doża tal-insulina tiegħek.
- Jekk it-trattament tiegħek bl-insulina qed jiġi mogħti flimkien ma' pioglitazone (mediċina orali kontra d-dijabete użata fit-trattament tad-dijabete mellitus tip 2) – . Għid lit-tabib tiegħek mill-aktar fis jekk ikollok xi sinjali ta' insuffiċjenza tal-qalb bħal qtugħ ta' nifs mhux tas-soltu jew zieda ta' malajr fil-piż jew xi neġha lokalizzata minħabba żamma ta' fluwidi (edima).
- Disturbi fl-għajnejn – Id-disturb fl-għajnejn minħabba d-dijabete bħal retinopatija diabetika jista' b'mod temporanju jmur għall-agħar jekk it-titjib fil-kontroll taz-zokkor fid-demm isir b'rata mgħagħla.
- Uġiġh minħabba ħsara fin-nervituri – Jekk il-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek jitjeb b'rata mgħagħla ħafna, jista' jkollok uġiġh relatat man-nervituri, li normalment ikun temporanju.
- Neġha madwar il-gogi tiegħek – Meta tibda tuża l-mediċina tiegħek għall-ewwel darba, gismek jista' jżomm aktar ilma milli suppost. Dan jikkawża neġha madwar l-għekiesi tiegħek u gogi oħrajn. Dan normalment ma jdumx għal tul ta' żmien.
- Aċċerta ruħek li qed/a tuża t-tip it-tajjeb t'insulina – dejjem iċċekkja t-tiketta tal-insulina qabel kull injezzjoni sabiex tevita t-taħlit b'mod aċċidentali bejn prodotti tal-insulina.
- It-trattament bl-insulina jista' jikkawża l-gisem jipproduċi antikorpi għall-insulina (sustanza li taħdem kontra l-insulina). Madankollu, f'każijiet rari ħafna, din se tikkawża xi tibdil fid-doża tiegħek tal-insulina.

Jekk għandek vista batuta, jekk jogħġbok ara sezzjoni 3 'Kif għandek tuża Fiasp'.

Xi kundizzjonijiet u attivitajiet jistgħu jaffettwaw kemm għandek bżonn insulina. Kellem lit-tabib tiegħek:

- jekk għandek problemi tal-kliewi jew tal-fwied, jew tal-glandola adrenali, pitwitarja jew tat-tirojde.
- jekk qed tagħmel iktar eżerċizzju mis-soltu jew jekk trid tibdel id-dieta normali tiegħek, għax dan jista' jkollu effett fuq il-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek.
- jekk inti marid, kompli hu l-insulina tiegħek u kellem lit-tabib tiegħek.
- Jekk se ssiefer, l-ivvjaġġar bejn żoni differenti ta' ħin jista' jaffettwa l-htiġijiet tiegħek tal-insulina u l-ħin meta tiegħu l-injezzjonijiet.

Huwa rrakkomandat ħafna li meta jkun qed jintuża Fiasp, jitniżżel l-isem u n-numru tal-lott ta' kull pakkett sabiex wiehed ikun jaf liema lott ikun intuża.

Bidliet fil-ġilda fis-sit tal-injezzjoni

Is-sit tal-injezzjoni għandu jinbidel kull darba sabiex jgħin biex jiġu evitati bidliet fit-tessut xaħmi ta' taħt il-ġilda, bħal li tiħxien il-ġilda, tiċkien il-ġilda jew boċċi taħt il-ġilda. L-insulina tista' ma taħdimx tajjeb ħafna jekk tinjetta f'żona bil-boċċi, li ċkienet jew li ħxienet (ara sezzjoni 3 'Kif għandek tuża Fiasp'). Għid lit-tabib tiegħek jekk tinduna b'xi bidliet fil-ġilda fis-sit tal-injezzjoni. Għid lit-tabib tiegħek jekk bħalissa qed tinjetta f'dawn iż-żoni affettwati qabel ma tibda tinjetta f'parti differenti. It-tabib tiegħek jista' jgħidlek biex tiċċekkja aktar mill-qrib iż-zokkor fid-demm tiegħek, u biex taggusta d-doża tal-insulina jew tal-medikazzjonijiet antidijabetiċi l-oħra tiegħek.

Tfal u adolexxenti

Din il-mediċina mhix irrakkomandata għall-użu fit-tfal taħt l-età ta' sena.

Mediċini oħra u Fiasp

Għid lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek jekk qed tiegħu, haadt dan l-aħħar jew tista' tiegħu xi mediċini oħra. Xi mediċini jaffettwaw il-livell ta' zokkor fid-demm tiegħek – dan jista' jfisser li d-doża tal-insulina tiegħek trid tinbidel.

Hawn taħt hawn elenkati l-iktar mediċini komuni li jistgħu jaffettwaw il-kura tiegħek bl-insulina.

Il-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek jista' jaqa' (ipoglicemija) jekk tiegħu:

- mediċini oħra għall-kura tad-dijabete (orali jew li jistgħu jiġu injettati)
- antibijotiċi ta' sulphonamide (użati għat-trattament ta' infezzjonijiet)

- steroidi anabolici (bħal testosterone)
- imblokkaturi tar-riċetturi beta (użati fil-trattament tal-pressjoni għolja fid-demm jew l-angina)
- salicylates (użati biex itaffu l-uġiġ u jnaqqsu d-deni)
- inibituri ta' monoamine oxidase (MAOI) (użati għat-trattament tad-dipressjoni)
- inibituri tal-enzima li tikkonverti angiotensin (ACE) (għal xi problemi tal-qalb jew ta' pressjoni għolja fid-demm).

Il-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek jista' jogħla (iperglicemija) jekk tieħu:

- danazol (medicina li taħdem fl-ovulazzjoni)
- kontraċettivi li jittieħdu mill-ħalq (pilloli li jikkontrollaw biex ma tinqabadx tqila)
- ormoni tat-tirojde (għal problemi fil-glandola tat-tirojde)
- ormon tat-tkabbir (għal deficijenza ta' ormon tat-tkabbir)
- glukokortikoidi (bħal 'cortisone' għall-infjammazzjoni)
- simpatomimetici (bħal epinephrine (adrenaline), salbutamol jew terbutaline għall-ażżma)
- thiazides (għall-pressjoni għolja fid-demm jew jekk il-ġisem tiegħek ikun qed iżomm ilma żżejjed (żamma ta' ilma)).

Octreotide u lanreotide – użati għat-trattament ta' kundizzjoni rari fejn ikun hemm ammont eċċessiv ta' ormon ta' tkabbir (akromegalija). Dawn jistgħu kemm iżidulek kif ukoll inaqqsu le l-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek.

Jekk xi waħda minn dawn t'hawn fuq tapplika għalik (jew jekk m'intix ċert), kellek lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

Fiasp mal-alkohol

Jekk tixrob l-alkohol, il-ħtieġa tiegħek għall-insulina tista' tinbidel hekk kif il-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek jista' jitla' jew jinżel. Għalhekk għandek timmonitorja l-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek aktar ta' spiss mis-soltu.

Tqala u treddigh

Jekk inti tqila, taħseb li tista tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir tat-tabib tiegħek qabel tieħu din il-medicina. Din il-medicina tista' tintuża waqt it-tqala; madankollu jista' jkun hemm il-bżonn li tinbidel id-doża tal-insulina tiegħek waqt it-tqala u wara l-ħlas. Hafna drabi l-ammont t'insulina li għandek bżonn waqt l-ewwel tliet xhur ta' tqala jonqos u jizdied għall-kumpliment tas-sitt xhur. Il-kontroll bil-għaqal tad-dijabete tiegħek hu meħtieġ waqt it-tqala. Il-prevenzjoni ta' livell baxx ta' zokkor fid-demm (ipoglicemija) hu partikularment importanti għas-saħħa tat-tarbija tiegħek. Wara li jkollok it-tarbija, il-probabbiltà hi li l-ħtiġijiet tiegħek tal-insulina jergħu jirritornaw għal kemm kellek bżonn qabel it-tqala.

M'hemm ebda restrizzjonijiet għat-trattament b'Fiasp waqt it-treddigh.

Sewqan u thaddim ta' magni

Jekk il-livell ta' zokkor fid-demm tiegħek ikun baxx dan jista' jaffettwa l-ħila li ssuq jew tuża kwalunkwe għodod jew magni. Jekk il-livell ta' zokkor fid-demm tiegħek ikun baxx, il-koncentrazzjoni u l-abbiltà tiegħek biex tirreagixxi jistgħu jiġu affettwati. Dan jista' jkun perikoluż għalik u għal haddieħor. Staqsi lit-tabib tiegħek jekk tistax issuq jekk:

- ta' spiss ikollok livell baxx ta' zokkor fid-demm
- issibha diffiċli biex tinduna li għandek livell baxx ta' zokkor fid-demm.

Tagħrif importanti dwar xi ingredjenti fi Fiasp

Din il-medicina fiha anqas minn mmol 1 ta' sodium (23 mg) f'kull doża, jiġifieri tista' tghid essenzjalment 'ħielsa mis-sodium'.

3. Kif għandek tuża Fiasp

Dejjem għandek tuża din il-medicina skont il-parir eżatt tat-tabib tiegħek. Iċċekkja mat-tabib jew mal-ispizjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

Jekk inti persuna għamja jew għandek vista batuta u ma tistax taqra l-kontatur tad-doża fuq il-pinna, tużax din il-pinna mingħajr għajjnuna. Fittex għajjnuna mingħand persuna li għandha vista tajba u li hija mharrġa fl-użu tal-pinna mimlija għal-lest FlexTouch.

Il-pinna mimlija għal-lest tipprovdi doża ta' 1-80 unità f' injezzjoni waħda f' židiet ta' 1 unità.

Meta għandek tuża Fiasp

Fiasp hu insulina li tittiehed fil-ħin tal-ikel.

Adulti: Fiasp għandu jiġi injettat eżatt qabel (0-2 minuti) il-bidu tal-ikla, bl-għażla li jiġi injettat sa 20 minuta wara li tibda l-ikla.

Tfal: Fiasp għandu jiġi injettat eżatt qabel (0-2 minuti) il-bidu tal-ikla, bil-possibbiltà li jiġi injettat sa 20 minuta wara li tinbada l-ikla f' sitwazzjonijiet fejn m'hemmx ċertezza dwar meta t-tifel/tifla se jiekol. F'dawn is-sitwazzjonijiet saqsi lit-tabib tiegħek għall-parir.

Din il-medicina jkollha l-effett massimu tagħha bejn siegħa u 3 siegħat wara l-injezzjoni, u l-effett idum għal 3 sa 5 siegħat.

Id-doża ta' Fiasp

Doża għad-dijabete ta' tip 1 u ta' tip 2

It-tabib tiegħek se jiddeċiedi miegħek:

- l-ammont ta' Fiasp li se jkollok bżonn ma' kull ikla
- meta tiċċekkja l-livell ta' zokkor fid-demmm tiegħek u jekk ikollokx bżonn ta' doża oghla jew iktar baxxa.

Jekk tkun tixtieq tibdel id-dieta tas-soltu tiegħek, l-ewwel iċċekkja mat-tabib, mal-ispizjar jew mal-infermier tiegħek, għax bidla fid-dieta tas-soltu tiegħek tista' tibdel il-bżonn tiegħek għall-insulina.

Meta tuża medicini oħrajn, staqsi lit-tabib tiegħek jekk il-kura tiegħek għandhiex bżonn tiġi aġġustata.

Aġġustament fid-doża għad-dijabete ta' tip 2

Id-doża ta' kuljum għandha tkun ibbażata fuq il-livell taz-zokkor fid-demmm tiegħek fil-ħin tal-ikel u fil-ħin tal-irqad tal-ġurnata preċedenti.

- Qabel il-kolazzjon – id-doża għandha tiġi aġġustata skont il-livell taz-zokkor fid-demmm qabel l-ikla ta' nofsinhar tal-ġurnata preċedenti
- Qabel l-ikla ta' nofsinhar – id-doża għandha tiġi aġġustata skont il-livell taz-zokkor fid-demmm qabel iċ-ċena ta' filgħaxija tal-ġurnata preċedenti
- Qabel iċ-ċena ta' filgħaxija – id-doża għandha tiġi aġġustata skont il-livell taz-zokkor fid-demmm fil-ħin tal-irqad tal-ġurnata preċedenti

Tabella 1 Aġġustament fid-doża		
Zokkor fid-demmm fil-ħin tal-ikel jew fil-ħin tal-irqad		Aġġustament fid-doża
mmol/L	mg/dL	
inqas minn 4	inqas minn 71	Naqqas id-doża b'unità 1
4-6	71-108	L-ebda aġġustament fid-doża
iktar minn 6	iktar minn 108	Żid id-doża b'unità 1

Użu f' pazjenti anzjani (65 sena jew aktar)

Din il-medicina tista' tintuża f' pazjenti anzjani. Kellem lit-tabib tiegħek dwar tibdil fid-doża tiegħek.

Jekk għandek problemi tal-kliewi jew tal-fwied

Jekk għandek problemi tal-kliewi jew tal-fwied, jista' jkollok bżonn tiċċekkja l-livell ta' zokkor fid-demmm tiegħek b' mod aktar regolari. Kellem lit-tabib tiegħek dwar tibdil fid-doża tiegħek.

Kif tinjetta Fiasp

Din il-medicina hija tajba biss għall-injezzjoni taħt il-ġilda (injezzjoni subkutanja).

Qabel ma tuża Fiasp għall-ewwel darba, it-tabib jew l-infermier tiegħek se jurik kif tuża l-pinna mimlija għal-lest. Kellem lit-tabib tiegħek jekk għandek bżonn tinjetta l-insulina tiegħek b'mod ieħor.

Fejn għandek tagħmel l-injezzjoni

- L-aħjar postijiet fejn tinjetta huma n-naħa ta' quddiem ta' qaddek (iż-żaqq) jew in-naħa ta' fuq ta' dirgħajk.
- Tinjettax ġo vina jew ġo muskolu.
- Ibdel il-post fiż-żona fejn tinjetta kuljum biex tnaqqas ir-riskju li tiżviluppa bidliet taħt il-ġilda (ara sezzjoni 4).

Tużax Fiasp

- jekk il-pinna tkun bil-ħsara jew ma tkunx inhażnet kif suppost (ara sezzjoni 5 'Kif taħzen Fiasp').
- jekk l-insulina ma tidherx ċara (eż. tidher imċajpra) u bla kulur.

Istruzzjonijiet dettaljati dwar kif għandek tuża il-pinna FlexTouch tiegħek jinsabu fuq in-naħa l-oħra ta' dan il-fuljett.

Jekk tuża Fiasp aktar milli suppost

Jekk tuża żżejjed insulina, il-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek jista' jitbaxxa żżejjed (ipoglicemija); ara l-parir f' sezzjoni 4 taħt 'Livell baxx ta' zokkor fid-demm'.

Jekk tinsa tuża Fiasp

Jekk tinsa tuża l-insulina tiegħek, iz-zokkor fid-demm tiegħek jista' jogħla wisq (iperglicemija). Ara sezzjoni 4 taħt 'Livell għoli ta' zokkor fid-demm'.

Tliet passi sempliċi li jistgħu jgħinu sabiex jiġi evitat livell baxx jew għoli ta' zokkor fid-demm huma:

- Dejjem żomm pinna żejda fil-każ li tiflew il-pinna tiegħek jew jiġrilha l-ħsara.
- Dejjem żomm xi haġa fuqek li turi li għandek id-dijabete.
- Dejjem żomm fuqek prodotti li jkun fihom iz-zokkor. Ara sezzjoni 4 taħt 'X' għandek tagħmel jekk ikollok livell baxx ta' zokkor fid-demm'.

Jekk tieqaf tuża Fiasp

Tiqafx tuża l-insulina tiegħek mingħajr ma l-ewwel titkellem mat-tabib tiegħek. Jekk tieqaf tuża l-insulina tiegħek, dan jista' jwassal għal livell għoli ħafna ta' zokkor fid-demm (iperglicemija severa) u ketoacidożi (kundizzjoni fejn ikun hemm wisq aċtu fid-demm, li hu potenzjalment ta' periklu għall-ħajja). Ara s-sintomi u l-pariri f' sezzjoni 4 taħt 'Livell għoli ta' zokkor fid-demm'.

4. Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull medicina oħra, din il-medicina tista' tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f'kulhadd.

Livell baxx ta' zokkor fid-demm (ipoglicemija) huwa komuni ħafna b'kura bl-insulina (jista' jaffettwa aktar minn persuna 1 minn kull 10). Jista' jkun serju ħafna. Jekk il-livell taz-zokkor fid-demm jinżel wisq, inti tista' tintilew minn sensik. Ipoglicemija serja tista' tikkawża ħsara fil-moħħ u tista' tkun ta' periklu għall-ħajja. Jekk għandek sintomi ta' livell baxx ta' zokkor fid-demm, hu passi **minnufih** biex iżżid il-livell taz-zokkor fid-demm. Ara l-parir taħt 'Livell baxx ta' zokkor fid-demm' aktar 'l isfel.

Jekk ikollok reazzjoni allergjika serja (inkluż xokk anafilattiku) għall-insulina jew għal xi wiehed mis-sustanzi fi Fiasp (kemm dan iseħħ ta' spiss mhuwiex magħruf), ieqaf uża din il-medicina u għamel kuntatt minnufih mas-servizz tal-emergenza medika.

Is-sinjali ta' reazzjoni allergjika serja jistgħu jinkludu:

- reazzjonijiet lokali (eż., raxx, ħmura u ħakk) li jinfirxu għal partijiet oħra ta' gismek
- f'daqqa waħda ma tħossokx tajjeb u tibda tegħreq
- tibda tiddardar (rimettar)
- ikollok diffikultà biex tieħu n-nifs
- ikollok taħbit tal-qalb mgħaġġel jew tħossok stordut.

Reazzjonijiet allergiċi bħal raxx tal-gilda ġeneralizzat u nefha fil-wiċċ jistgħu jseħħu. Dawn mhumiex komuni u jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 100. Fittex tabib jekk is-sintomi jmorru għall-aġħar jew ma tarax titjib wara xi ftit ġimghat.

Bidliet fil-gilda fis-sit tal-injezzjoni: Jekk tinjetta insulina fl-istess post, it-tessut xaħmi jista' jew jiċkien (lipoatrofija) jew jiħxien (lipoipertrofija) (dawn mhumiex komuni u jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 100). Boċċi taħt il-gilda jistgħu jiġu kkawżati wkoll minn akkumulazzjoni ta' proteina msejha amilojdi (amilojdozi tal-gilda; il-frekwenza ta' kemm din is-seħħ mhijiex magħrufa). L-insulina tista' ma taħdimx tajjeb ħafna jekk tinjetta f'żona bil-boċċi, li ċkienet jew li ħxienet. Ibdel is-sit tal-injezzjoni ma' kull injezzjoni biex tgħin fil-prevenzjoni ta' dawn il-bidliet fil-gilda.

Effetti sekondarji oħra jinkludu:

Komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 10)

Reazzjoni fis-sit mnejn jingħata: Reazzjonijiet lokali jistgħu jseħħu fil-post fejn tinjetta lilek innifsek. Is-sinjali jistgħu jinkludu: raxx, ħmura, infjammazzjoni, tbenġil, irritazzjoni, uġiġħ u ħakk.

Normalment dawn ir-reazzjonijiet imorru wara ftit jiem.

Reazzjonijiet tal-gilda: Sinjali ta' allergija fuq il-gilda bħal ekzema, raxx, ħakk, urtikarja u dermatite jistgħu jseħħu.

Effetti ġenerali mit-trattament bl-insulina inkluż Fiasp

- **Livell baxx ta' zokkor fid-demm (ipoglicemija)** (komuni ħafna)

Livell baxx ta' zokkor fid-demm jista' jseħħ jekk inti:

Tixrob l-alkohol; tinjetta żżejjed insulina; tagħmel aktar eżerċizzju mis-soltu; tiekol ftit wisq jew taqbez xi ikla.

Sinjali ta' twissija ta' livell baxx ta' zokkor fid-demm – dawn jistgħu jiġu f'daqqa:

Uġiġħ ta' ras, diskors ma jiftiehemx, taħbit tal-qalb mgħaġġel, għaraq kiesaħ, gilda kiesha u pallida, tħossok imdardar, tħossok bil-ġuħ ħafna, roġħda jew tħossok nervuż jew inkwetat, tħoss għeja, dgħufija jew ikollok ngħas mhux tas-soltu, tħossok konfuż, diffikultà biex tikkonċentra tibdil temporanju fil-vista.

X'għandek tagħmel jekk ikollok livell baxx ta' zokkor fid-demm

- Jekk inti konxju, ikkura minnufih il-livell baxx ta' zokkor fid-demm permezz ta' 15-20 g ta' karboidrat li jaġixxi b'mod mgħaġġel; kul pilloli tal-glukosju jew ikla oħra ħafifa b'ħafna zokkor, bħal meraq tal-frott, helu jew biskuttini (dejjem gorr miegħek pilloli tal-glukosju jew ikla ħafifa b'ħafna zokkor, għal li jista' jkun).
- Huwa rrakkomandat li terġa' tiċċekkja l-livelli taz-zokkor fid-demm tiegħek wara 15-20 minuta u terġa' tieħu l-kura jekk il-livelli taz-zokkor fid-demm tiegħek għadhom inqas minn 4 mmol/L.
- Stenna sakemm is-sinjali ta' livell baxx ta' zokkor fid-demm ma jibqgħux jidhru jew meta l-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek ikun ġie lura għan-normal. Imbagħad kompli hu l-kura bl-insulina tiegħek bħas-soltu.

X'għandhom ikunu jafu persuni oħrajn jekk iħossok ħazin

Għid lill-persuni kollha li tqatta' ż-żmien magħhom li għandek id-dijabete. Għidilhom x'jista' jigrri meta l-livell ta' zokkor fid-demmm tiegħek jitbaxxa żżejjed, inkluż ir-riskju li jista' jtik hass hażin.

Għidilhom li jekk iħossok hażin, huma jridu:

- idawruk fuq ġenbek biex tevita li tifga
- iġibu għajjnuna medika minnufih
- **ma jtukx** l-ebda ikel jew xorb, għax tista' tifga.

Meta tintilef minn sensik tista' tirkupra aktar malajr b'injezzjoni ta' glucagon. Dan jista' jingħata biss minn xi hadd li jaf jużah.

- Jekk tingħata glucagon, se jkollok bżonn tieħu z-zokkor jew xi haġa hafifa b'hafna zokkor malli tiġi f'sensik.
- Jekk ma tirispondix għall-kura b'injezzjoni ta' glucagon, se jkollok bżonn tiġi kkurat fi sptar.

Jekk livell baxx hafna ta' zokkor ma jiġix ikkurat, maż-żmien jista' jikkawża ħsara fil-moħħ. Dan jista' jdum għal ftit żmien jew idum hafna. Jista' wkoll jikkawża l-mewt.

Kellem lit-tabib tiegħek jekk:

- il-livell taz-zokkor fid-demmm tiegħek tbaxxa tant li ħassek hażin
- ingħatajt injezzjoni ta' glucagon
- kellek livell baxx iżżejjed ta' zokkor fid-demmm għal ftit drabi dan l-aħħar.

Dan hu għax id-dożaġġ jew il-ħin ta' meta tieħu l-injezzjonijiet tal-insulina, l-ikel jew l-eżerċizzju, jista' jkollhom bżonn jinbidlu.

- ***Livell għoli ta' zokkor fid-demmm (iperglicemija)***

Livell għoli ta' zokkor fid-demmm jista' jseħħ jekk inti:

Tiekol aktar jew tagħmel inqas eżerċizzju mis-soltu; tixrob l-alkoħol; ikollok infezzjoni jew deni; ma tużax insulina biżżejjed; tieħu inqas insulina milli għandek bżonn ripetutament; tinsa tieħu l-insulina jew tieqaf tieħu l-insulina.

Sinjali ta' twissija ta' livell għoli ta' zokkor fid-demmm – dawn normalment jidhru gradwalment:

Ħmura fil-wieċ, ġilda xotta, thossok bi nġhas jew għajjen, ħalq xott, riħa ta' frott (acetone) fil-ħalq, tagħmel l-awrina aktar ta' spiss, thossok bil-għatx, titlef l-aptit, thossok imqalla' (dardir jew rimettar). Dawn jistgħu jkunu sinjali ta' kundizzjoni gravi hafna msejha ketoacidożi. Din hi akkumulazzjoni ta' aċtu fid-demmm għax il-ġisem ikun qed ikisser ix-xaham minflok iz-zokkor. Jekk ma tikkurahiex, din tista' twassal għal koma dijabetika u eventwalment mewt.

X'għandek tagħmel jekk ikollok livell għoli ta' zokkor fid-demmm

- Ittestja l-livell taz-zokkor fid-demmm tiegħek.
- Agħti doża ta' korrezzjoni tal-insulina jekk ġejt mġhallem kif għandek tagħmel dan.
- Ittestja l-awrina tiegħek għal ketones.
- Jekk għandek il-ketones, fittex għajjnuna medika immedjatament.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib, lill-ispizjar jew lill-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Tista' wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali imniżżla f'[Appendiċi V](#). Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista' tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta' din il-medicina.

5. Kif taħzen Fiasp

Żomm din il-medicina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-medicina wara d-data ta' meta tiskadi li tidher fuq it-tikketta u l-kartuna wara 'JIS'. Id-data ta' meta tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta' dak ix-xahar.

Qabel ma jinfetaħ għall-ewwel darba

Aħżen fi frigg (2°C –8°C). Tagħmlux fil-friza. Żommu 'l bogħod mill-element li jiffriża. Żomm l-ghatu tal-pinna f' postu sabiex tilqa' mid-dawl.

Wara li jinfetaħ għall-ewwel darba jew meta jingarr bhala sper

Tista' ġgħorr il-pinna mimlija għal-lest (FlexTouch) tiegħek miegħek u żzommha fit-temperatura tal-kamra (mhux aktar minn 30°C) jew fi frigg (2°C – 8°C) sa perjodu ta' 4 ġimgħat. Dejjem żomm l-ghatu fuq il-pinna meta ma tkunx qed tużaha sabiex tilqa' mid-dawl.

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranagġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispizjar tiegħek dwar kif għandek tarmi mediċini li m' għadexx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X'fih Fiasp

- Is-sustanza attiva hi insulina aspart. Millilitru ta' soluzzjoni fih 100 unità ta' insulina aspart. Kull pinna mimlija għal-lest fiha 300 unità ta' insulina aspart f' soluzzjoni ta' 3 mL.
- Is-sustanzi l-oħra huma phenol, metacresol, glycerol, zinc acetate, disodium phosphate dihydrate, arginine hydrochloride, nicotinamide (vitamin B₃), hydrochloric acid (għall-aġġustament tal-pH), sodium hydroxide (għall-aġġustament tal-pH) (ara t-tmiem ta' sezzjoni 2 taħt 'Tagħrif importanti dwar xi ingredjenti fi Fiasp') u l-ilma għall-injezzjonijiet.

Kif jidher Fiasp u l-kontenut tal-pakkett

Fiasp hu pprezentat bhala soluzzjoni ċara, bla kulur u akweja għall-injezzjoni f' pinna mimlija għal-lest.

Daqsijiet tal-pakketti ta' 1, 5 jew pakkett multiplu bi 2 x 5 pinen mimlija għal-lest ta' 3 mL. Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkun fis-suq.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq u l-Manifattur

Novo Nordisk A/S,
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd, Id-Danimarka

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f'

Sorsi oħra ta' informazzjoni

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini: <http://www.ema.europa.eu>.

Istruzzjonijiet dwar kif tuża Fiasp FlexTouch

Jekk joghgbok aqra sew dawn l-istruzzjonijiet li ġejjin qabel ma tuża l-pinna mimlija għal-lest FlexTouch tiegħek. Jekk ma ssegwix sew l-istruzzjonijiet, tista' tiehu ftit wisq jew żżejjed ta' insulina, li jista' jwassal għal livell ta' zokkor fid-demmm għoli jew baxx.

Tużax il-pinna minghajr taħriġ kif support mit-tabib jew mill-infermier tiegħek. Ibda billi tiċċekkja l-pinna tiegħek biex **tiżgura li fiha Fiasp 100 unità/mL**, imbagħad haress lejha l-istampi hawn taħt biex issir familjari mal-partijiet differenti tal-pinna u l-labra tiegħek.


Jekk inti persuna għamja jew għandek vista batuta u ma tistax taqra l-kontatur tad-doża fuq il-pinna, tużax din il-pinna minghajr għajnuna. Ikseb għajnuna mingħand persuna b' vista tajba u li tkun imharrġa biex tuża l-pinna mimlija għal-lest tiegħek FlexTouch.

Il-pinna tiegħek hi pinna tal-insulina mimlija għal-lest li tħallik tisselezzjona d-doża u fiha 300 unità ta' insulina. Tista' tagħzel **massimu ta' 80 unità f'kull doża, f'żidiet ta' unità 1**. Il-pinna tiegħek hi maħsuba biex tintuża ma' labar għall-injezzjoni li jintużaw darba biss u li jintremew wara li jintużaw b'tul ta' bejn 4 mm u 8 mm u gejj bejn 30G u 32G. Il-labar mhumiex inklużi f'dan il-pakkett.

Tagħrif importanti


Oqgħod attent hafna għal dawn in-noti għax huma importanti għall-użu korrett tal-pinna.

**Fiasp pinna mimlija ghal-lest u labra
(eżempju)
(FlexTouch)**




1 Ipprepara l-pinna tieghek b'labra ġdida


- **Iċċekkja l-isem u l-qawwa fuq it-tikketta** tal-pinna tieghek, biex taċċerta ruhek li jkun fiha Fiasp 100 unità/mL. Dan hu importanti b'mod speċjali jekk tiegħu aktar minn tip wiehed ta' insulina. Jekk tiegħu tip żbaljat ta' insulina, il-livell ta' zokkor fid-demm tieghek jista' jogħla wisq jew jitbaxxa wisq.
- **Nehhi l-ghatu tal-pinna.**



- **Iċċekkja li l-insulina fil-pinna tieghek tkun ċara u bla kulur.** Hares minn ġot-tieqa tal-insulina. Jekk l-insulina tidher imċajpra, tużax il-pinna.




- **Hu labra ġdida u aqta' s-siġill protettiv.**




Kun ċert li twaħħal il-labra b'mod korrett

- Imbotta l-labra **dritt** fuq il-pinna.
- Dawwar sakemm tkun **issikkata**.



Il-labra hija mġhottija b'żewġ ghotjin. Trid tneħhi ż-żewġ ghotjin. Jekk tinsa tneħhi ż-żewġ ghotjin, **m'intix** se tinjetta ebda insulina.


- **Nehhi l-ghatu ta' barra tal-labra u zommu għal wara.** Se jkollok bżonnu wara l-injezzjoni, biex tneħhi l-labra minn mal-pinna bla periklu.



- **Nehhi l-ghatu ta' ġewwa tal-labra u armih.** Jekk tipprova terġa' tpoġġih f' postu, tista' tniggeż jew twegġa' lilek innifsek aċċidentalment bil-labra.

Qatra insulina tista' tidher fil-ponta tal-labra. Dan hu normali, iżda xorta waħda trid tiċċekkja l-fluss tal-insulina.

Twaħhalx labra ġdida mal-pinna tiegħek sakemm tkun lest biex tieħu l-injezzjoni tiegħek.



- ⚠ **Dejjem uża labra ġdida għal kull injezzjoni.**
Dan inaqqas ir-riskju ta' kontaminazzjoni, infezzjoni, nixxija ta' insulina, labar imblukkati u dożaġġ mhux preċiż.
- ⚠ **Qatt m'għandek tuża labra mghawġa jew bil-ħsara.**

2 Iċċekkja l-fluss tal-insulina

- **Dejjem iċċekkja l-fluss tal-insulina qabel ma tibda.**
Dan jgħinek biex tiżgura li tieħu d-doża shiħa tiegħek tal-insulina.
- Dawwar is-selettur tad-doża biex **tagħzel 2 unitajiet. Kun ċert li l-kontatur tad-doża juri 2.**



- Żomm il-pinna bil-labra tippona 'l fuq.
Taptap in-naħa ta' fuq tal-pinna bil-mod għal ftit drabi biex jekk ikun hemm xi bżieġaq tal-arja dawn jitilgħu fuq nett.



- **Aghfas u zomm il-buttuna tal-injezzjoni** magħfusa 'l ġewwa sakemm il-kontatur tad-doża jerġa' lura fuq iż-0.

Iż-0 irid ikun bi dritt l-indikatur tad-doża.
Qatra ta' insulina għandha tidher fit-tarf tal-labra.



Buzzieqa żgħira tal-arja tista' tibqa' fit-tarf tal-labra, iżda mhux se tiġi injettata.

Jekk ma tidher l-ebda qatra, irrepeti passi 2A sa 2C għal massimu ta' 6 darbiet. Jekk il-qatra xorta tibqa' ma tidhirx, ibdel il-labra u rrepeti passi 2A sa 2C għal darba oħra.

Jekk il-qatra tal-insulina xorta tibqa' ma titfaċċax, armi l-pinna u uża waħda ġdida.

⚠ Dejjem aċċerta ruhek li tidher qatra fit-tarf tal-labra qabel ma tinjetta. B'hekk tiżgura li l-fluss tal-insulina jkun kif suppost.

Jekk ma tidher l-ebda qatra, l-ebda insulina mhi se tiġi injettata, anki jekk il-kontatur tad-doża jista' jiċċaqlaq. Dan jista' jindika li hemm xi labra imblukkata jew bil-ħsara.

⚠ Dejjem iċċekkja l-fluss qabel ma tinjetta. Jekk ma tiċċekkjax il-fluss, tista' tieħu ftit wisq ta' insulina jew lanqas qatra ta' insulina. Dan jista' jwassal li jkollok livell għoli ta' zokkor fid-demm.

3 Aghżel id-doża tiegħek

- **Aċċerta ruhek li l-kontatur tad-doża juri 0 qabel ma tibda.**
Iż-0 jrid jiġi bi dritt mal-indikatur tad-doża.
- **Dawwar is-selettur tad-doża biex tagħzel id-doża li tehtieg,** skont l-istruzzjonijiet tat-tabib jew tal-infermier tiegħek.

Jekk tagħzel doża hażina, tista' ddawwar is-selettur tad-doża 'l quddiem jew lura biex tagħzel id-doża korretta.

Il-pinna tista' tagħzel sa massimu ta' 80 unità.



Is-selettur tad-doża jibdel in-numru ta' unitajiet. Il-kontatur tad-doża u l-indikatur tad-doża biss se juru kemm unitajiet tkun għazilt għal kull doża.

Tista' tagħzel sa 80 unità għal kull doża. Meta l-pinna tiegħek ikun fiha inqas minn 80 unità, il-kontatur tad-doża jieqaf fuq in-numru ta' unitajiet li jkun fadal.

A Qabel ma tinjetta l-insulina, dejjem uża l-kontatur tad-doża u l-indikatur tad-doża biex tara kemm tkun għazilt unitajiet.


Tghoddx il-klikks tal-pinna biex tissettja d-doża. Jekk tagħzel u tinjetta d-doża żbaljata, il-livell ta' zokkor fid-demm tiegħek jista' jogħla wisq jew jitbaxxa wisq.

Tużax l-iskala tal-insulina, għax din turi biss bejn wiehed u ieħor kemm ikun fadal insulina fil-pinna tiegħek.


Is-selettur tad-doża jagħmel hsejjes differenti meta tkun qed iddawru l-quddiem, lura jew tkun dawwart iżjed mill-unitajiet li fadal.

4 Injetta d-doża tiegħek


- **Dahhal il-labra fil-ġilda** kif ġejt muri mit-tabib jew mill-infermier tiegħek.
- **Aċċerta ruhek li tkun tista' tara l-kontatur tad-doża.**
Tmissx il-kontatur tad-doża b' subghajk. Dan jista' jinterrompi l-injezzjoni.



- **Aghfas u żomm 'l isfel il-buttuna tal-injezzjoni . Hares hekk kif il-kontatur tad-doża jirritorna fuq iż-0.** Iż-0 irid ikun bi dritt l-indikatur tad-doża. Tista' mbagħad tisma' jew thoss klikk.
- **Kompli aghfas il-buttuna tal-injezzjoni waqt li żżomm il-labra fil-ġilda tiegħek.**




- **Ghodd bil-mod sa 6 waqt li żżomm il-buttuna tal-injezzjoni magħfusa.**
- Jekk il-labra titneħħa qabel, tista' tara nixxieġha ta' insulina ħierġa mill-ponta tal-labra. Jekk dan iseħħ, id-doża sħiħa ma tkunx inghatat, u għandek tiċċekkja l-livell ta' zokkor fid-demm tiegħek aktar spiss.



- **Nehhi l-labra minn ġol-ġilda.** Tista' mbagħad thalli l-buttuna tal-injezzjoni.

Jekk jidher xi demm fejn tkun tajt l-injezzjoni, aghfas bil-mod fuq il-ġilda għal ftit minuti biex twaqqaf il-hruġ tad-demm. Togħrokk dik iż-żona.



Tista' tara qatra insulina fil-ponta tal-labra wara li tinjetta. Dan hu normali u ma jaffettwax id-doża tiegħek.

- ⚠ **Dejjem haress lejn il-kontatur tad-doża biex tkun taf kemm unitajiet se tinjetta.** Żomm il-buttuna tal-injezzjoni 'l isfel sakemm il-kontatur tad-doża juri 0. Jekk il-kontatur tad-doża ma jergax lura fuq iż-0, id-doża shiħa ma tkunx ingħatat, li jista' jirriżulta f'livell għoli ta' zokkor fid-demm.

Kif tagħraf labra mblukkata jew bil-ħsara?

- Jekk ma jidherx iż-0 fil-kontatur tad-doża wara li tagħfas il-buttuna tal-injezzjoni kontinwament, jista' jkun li tkun użajt labra mblukkata jew bil-ħsara.
- F'dan il-każ – inti **ma tkun irčivejt l-ebda** medicina – anki jekk il-kontatur tad-doża jkun mexxa mid-doża originali li tkun għażilt.

X'tagħmel b'labra mblukkata?

Nehhi l-labra kif spjegat f' sezzjoni 5 u rrepeti l-passi kollha billi tibda minn sezzjoni 1: Ipprepara l-pinna tiegħek b'labra ġdida. Aċċerta ruħek li tagħzel id-doża shiħa li teħtieġ.

Qatt m'għandek tmiss il-kontatur tad-doża meta tinjetta.


Dan jista' jinterrompi l-injezzjoni.

5 Wara l-injezzjoni


Dejjem armi l-labra wara kull injezzjoni

Dan inaqqas ir-riskju ta' kontaminazzjoni, infezzjoni, nixxiġa ta' insulina, labar imblukkati u dożaġġ mhux preċiż. Jekk il-labra tkun imblukkata, inti **m'int se tinjetta** l-ebda insulina.


- Fuq wiċċ ċatt **dahhal it-tarf tal-labra ġol-ġhatu ta' barra tal-labra** mingħajr ma tmiss il-labra jew l-ġhatu ta' barra tal-labra.



- Ġaladarba l-labra tkun mgħottija, **imbotta bil-mod l-ġhatu ta' barra tal-labra biex tagħlqu kompletament.**
- **Holl il-labra** u armiha kif infurmawk it-tabib, l-infermier, l-ispizjar jew l-awtoritajiet lokali tiegħek.



- Wara kull użu, **poġġi l-għatu fuq il-pinna** tiegħek sabiex tipproteġi l-insulina mid-dawl.



Meta l-pinna tkun vojta, armiha **mingħajr** ma jkollha labra mwaħħla, kif infurmawk it-tabib, l-infermier, l-ispiżjar jew l-awtoritajiet lokali tiegħek.

- ⚠ **Qatt m'għandek tipprova tpoġġi l-għatu ta' ġewwa tal-labra lura fuq il-labra.** Tista' tniggeż jew twegġa' lilek innifsek bil-labra.
- ⚠ **Dejjem neħhi l-labra mill-pinna wara kull injezzjoni** u aħżen il-pinna tiegħek mingħajr mal-labra tkun imwaħħla. Dan inaqqas ir-riskju ta' kontaminazzjoni, infezzjoni, nixxija ta' insulina, labar imblukkati u dożaġġ mhux preċiż.

6 Kemm fadal insulina?

- L-iskala tal-insulina turik **bejn wiehed u iehor** kemm ikun fadal insulina fil-pinna tiegħek.



- **Biex tara eżatt kemm fadal insulina**, uża l-kontatur tad-doża:
Dawwar is-selettur tad-doża sakemm il-**kontatur tad-doża jieqaf**.
Jekk juri 80, ikun fadal **mill-inqas 80** unità fil-pinna tiegħek.
Jekk juri **inqas minn 80**, in-numru muri jkun in-numru ta' unitajiet li jkun fadal fil-pinna tiegħek.



- Dawwar is-selettur tad-doża lura sakemm il-kontatur tad-doża juri 0.
- Jekk ikollok bżonn ta' iktar unitajiet ta' insulina mill-unitajiet li jkun fadal, tista' taqşam id-doża tiegħek bejn żewġ pinen.

⚠ **Oqghod attent hafna biex tikkalkula b'mod korrett jekk qed/a taqsam id-doża tiegħek.** Jekk ikollok xi dubju, hu d-doża sfiha billi tuża pinna ġdida. Jekk qsamt id-doża hażin, int se tinjetta ftit wisq jew iżżejjed insulina, li jista' jwassal għal livell għoli jew baxx ta' zokkor fid-demmm.

⚠ Informazzjoni importanti addizzjonali

- **Dejjem zomm il-pinna tiegħek fuqek.**
- **Dejjem zomm fuqek pinna żejda u labar ġodda, f'każ li tinfexx il-pinna jew il-pinna tkun bil-ħsara.**
- Dejjem zomm il-pinna u l-labar **fejn ma jidhrux u fejn ma jistghux jintlahqu minn persuni oħrajn**, speċjalment tfal.
- **Qatt m'għandek taqsam** il-pinna jew il-labar tiegħek ma' persuni oħrajn. Dan jista' jwassal li tinfettaw lil xulxin.
- **Qatt m'għandek taqsam** il-pinna tiegħek ma' persuni oħrajn. Il-medicina tiegħek tista' tkun ta' ħsara għalihom.
- Persuni li jieħdu ħsieb il-pazjent iridu **joqogħdu attenti hafna kif jimmaniġġjaw il-labar użati** – biex inaqqsu r-riskju li jwegġġu bil-labar u jinfettaw lilhom infushom.

Kif tiehu ħsieb il-pinna tiegħek

- Hu ħsieb il-pinna tiegħek. L-immaniġġjar bil-goff jew l-użu mhux kif suppost jista' jikkawża dożaġġ li ma jkunx preċiż, li jista' jwassal għal livell għoli jew baxx ta' zokkor fid-demmm.
- **Thallix il-pinna f'karozza** jew f'post ieħor fejn tista' tishon hafna jew tiksah hafna.
- **Thallix il-pinna tiegħek tiġi esposta għal trab, ħmieġ jew likwidu.**
- **Taħsilx, tghaddasx jew tillubrikax il-pinna tiegħek.** Jekk ikun hemm bżonn, naddafha b'deterġent hafif fuq biċċa drapp niedja.
- **Twaqqax il-pinna tiegħek** jew thabbatha ma' superficji ibsin. Jekk twaqqagħha jew tissuspetta problema, waħhal labra ġdida u ċċekkja l-fluss tal-insulina qabel ma tinjetta.
- **Tippruvax timla mill-ġdid il-pinna tiegħek.** Ġaladarba tkun vojta, trid tintrema.
- **Tippruvax issewwi l-pinna tiegħek** jew iżżarmaha.

Fuljett ta' taghrif: Informazzjoni għall-pazjent

Fiasp 100 unità/mL Penfill soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ insulina aspart

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-medicina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib, lill-ispizjar jew lill-infermier tiegħek.
- Din il-medicina għet mogħtija lilek biss. M'għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista' tagħmlilhom il-ħsara anke jekk għandhom l-istess sinjali ta' mard bħal tiegħek.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib, lill-ispizjar jew lill-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi effetti sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F'dan il-fuljett

1. X'inhu Fiasp u għalxiex jintuża
2. X'għandek tkun taf qabel ma tuża Fiasp
3. Kif għandek tuża Fiasp
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif taħžen Fiasp
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1. X'inhu Fiasp u għalxiex jintuża

Fiasp hu insulina li tittiehed fil-ħin tal-ikel u li jaħdem malajr biex ibaxxi z-zokkor fid-demm. Fiasp hu soluzzjoni għall-injezzjoni li fih insulina aspart u li jintuża għall-kura tad-dijabete mellitus fl-adulti, fl-adolesxenti u tfal minn sena 'l fuq. Id-dijabete hija marda fejn il-ġisem tiegħek ma jaġħmilx biżżejjed insulina biex jikkontrolla l-livell taz-zokkor fid-demm. Kura b'Fiasp tgħin biex tippreveni komplikazzjonijiet mid-dijabete tiegħek.

Fiasp għandu jiġi injettat sa 2 minuti qabel il-bidu tal-ikla, bl-għażla li jiġi injettat sa 20 minuta wara li tibda l-ikla.

Din il-medicina jkollha l-effett massimu tagħha bejn siegħa u 3 sigħat wara l-injezzjoni, u l-effett idum għal 3 sa 5 sigħat.

Din il-medicina għandha normalment tintuża flimkien ma' preparazzjonijiet oħrajn ta' insulina li jaġixxu b'effett intermedju jew li jaġixxu fit-tul.

2. X'għandek tkun taf qabel ma tuża Fiasp

Tużax Fiasp

- jekk inti allergiku għall-insulina aspart jew għal xi sustanza oħra ta' din il-medicina (imnizzla fis-sezzjoni 6).

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib, lill-ispizjar jew lill-infermier tiegħek qabel tuża Fiasp. Fuq kollox oqgħod attent għal dawn li ġejjin:

- Livell baxx ta' zokkor fid-demm (ipoglicemija) – Jekk il-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek ikun baxx wisq, segwi l-gwida ta' kif għandek tagħmel meta jkollok livell baxx ta' zokkor fid-demm f'sezzjoni 4 'Effetti sekondarji possibbli'. Fiasp jibda jibaxxi z-zokkor fid-demm aktar malajr meta mqabbel ma' insulini oħrajn li jittieħdu fil-ħin tal-ikel. Jekk isseħħ l-ipoglicemija, inti jista' jkollok din il-kundizzjoni aktar malajr wara injezzjoni b'Fiasp.
- Livell għoli ta' zokkor fid-demm (iperglicemija) – Jekk il-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek ikun għoli wisq, segwi l-gwida ta' kif għandek tagħmel meta jkollok livell għoli ta' zokkor fid-demm f'sezzjoni 4 'Effetti sekondarji possibbli'.

- Meta tbiddel minn prodotti mediċinali oħra tal-insulina – It-tabib tiegħek jista' jkollu bżonn jagħtik xi parir dwar id-doża tal-insulina tiegħek.
- Jekk it-trattament tiegħek bl-insulina qed jiġi mogħti flimkien ma' pioglitazone (mediċina orali kontra d-dijabete użata fit-trattament tad-dijabete mellitus tip 2) – . Għid lit-tabib tiegħek mill-aktar fis jekk ikollok xi sinjali ta' insuffiċjenza tal-qalb bħal qtugħ ta' nifs mhux tas-soltu jew zieda ta' malajr fil-piż jew xi nefha lokalizzata minhabba żamma ta' fluwidi (edima).
- Disturbi fl-għajnejn – Id-disturb fl-għajnejn minhabba d-dijabete bħal retinopatija dijabetika jista' b'mod temporanju jmur għall-agħar jekk it-titjib fil-kontroll taz-zokkor fid-demm isir b'rata mgħagħla.
- Uġiġh minhabba ħsara fin-nervituri – Jekk il-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek jitjieb b'rata mgħagħla ħafna, jista' jkollok uġiġh relatat man-nervituri, li normalment ikun temporanju.
- Nefha madwar il-gogi tiegħek – Meta tibda tuża l-mediċina tiegħek għall-ewwel darba, gismek jista' jżomm aktar ilma milli suppost. Dan jikkawża nefha madwar l-għekiesi tiegħek u gogi oħrajn. Dan normalment ma jdumx għal tul ta' żmien.
- Aċċerta ruħek li qed/a tuża t-tip it-tajjeb t'insulina – dejjem iċċekkja t-tiketka tal-insulina qabel kull injezzjoni sabiex tevita t-taħlit b'mod aċċidentali bejn prodotti tal-insulina.
- It-trattament bl-insulina jista' jikkawża l-gisem jipproduċi antikorpi għall-insulina (sustanza li taħdem kontra l-insulina). Madankollu, f'każijiet rari ħafna, din se tikkawża xi tibdil fid-doża tiegħek tal-insulina.

Jekk għandek vista batuta, jekk jogħġbok ara sezzjoni 3 'Kif għandek tuża Fiasp'.

Xi kundizzjonijiet u attivitajiet jistgħu jaffettwaw kemm għandek bżonn insulina. Kellem lit-tabib tiegħek:

- jekk għandek problemi tal-kliewi jew tal-fwied, jew tal-glandola adrenali, pitwitarja jew tat-tirojde.
- jekk qed tagħmel iktar eżerċizzju mis-soltu jew jekk trid tibdel id-dieta normali tiegħek, għax dan jista' jista' jkollu effett fuq il-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek.
- jekk inti marid, kompli hu l-insulina tiegħek u kellem lit-tabib tiegħek.
- Jekk se ssiefer, l-ivvjaġġar bejn żoni differenti ta' hin jista' jaffettwa l-htiġijiet tiegħek tal-insulina u l-hin meta tiegħu l-injezzjonijiet.

Huwa rakkomandat ħafna li meta jkun qed jintuża Fiasp, jitniżżel l-isem u n-numru tal-lott ta' kull pakkett sabiex wiehed ikun jaf liema lott ikun intuża.

Bidliet fil-ġilda fis-sit tal-injezzjoni

Is-sit tal-injezzjoni għandu jinbidel kull darba sabiex jgħin biex jiġu evitati bidliet fit-tessut xaħmi ta' taħt il-ġilda, bħal li tiħxien il-ġilda, tiċkien il-ġilda jew boċċi taħt il-ġilda. L-insulina tista' ma taħdimx tajjeb ħafna jekk tinjetta f'żona bil-boċċi, li ċkienet jew li ħxienet (ara sezzjoni 3 'Kif għandek tuża Fiasp'). Għid lit-tabib tiegħek jekk tinduna b'xi bidliet fil-ġilda fis-sit tal-injezzjoni. Għid lit-tabib tiegħek jekk bħalissa qed tinjetta f'dawn iż-żoni affettwati qabel ma tibda tinjetta f'parti differenti. It-tabib tiegħek jista' jgħidlek biex tiċċekkja aktar mill-qrib iz-zokkor fid-demm tiegħek, u biex taggusta d-doża tal-insulina jew tal-medikazzjonijiet antidijabetiċi l-oħra tiegħek.

Tfal u adolexxenti

Din il-mediċina mhix irrakkomandata għall-użu fit-tfal taħt l-età ta' sena.

Mediċini oħra u Fiasp

Għid lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek jekk qed tiegħu, haadt dan l-aħħar jew tista' tiegħu xi mediċini oħra. Xi mediċini jaffettwaw il-livell ta' zokkor fid-demm tiegħek – dan jista' jfisser li d-doża tal-insulina tiegħek trid tinbidel.

Hawn taħt hawn elenkati l-iktar mediċini komuni li jistgħu jaffettwaw il-kura tiegħek bl-insulina.

Il-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek jista' jaqa' (ipoglicemija) jekk tiegħu:

- mediċini oħra għall-kura tad-dijabete (orali jew li jistgħu jiġu injettati)
- antibijotiċi ta' sulphonamides (użati għat-trattament ta' infezzjonijiet)

- steroidi anabolici (bħal testosterone)
- imblokkaturi tar-riċetturi beta (użati fil-trattament tal-pressjoni għolja fid-demmm jew l-anġina)
- salicylates (użati biex itaffu l-uġiġħ u jnaqqsu d-deni)
- inibituri ta' monoamine oxidase (MAOI) (użati għat-trattament tad-dipressjoni)
- inibituri tal-enzima li tikkonverti angiotensin (ACE) (għal xi problemi tal-qalb jew ta' pressjoni għolja fid-demmm).

Il-livell taz-zokkor fid-demmm tiegħek jista' jogħla (iperglicemija) jekk tieħu:

- danazol (medicina li taħdem fl-ovulazzjoni)
- kontraċettivi li jittieħdu mill-ħalq (pilloli li jikkontrollaw biex ma tinqabadx tqila)
- ormoni tat-tirojde (għal problemi fil-glandola tat-tirojde)
- ormon tat-tkabbir (għal defiċjenza ta' ormon tat-tkabbir)
- glukokortikoidi (bħal 'cortisone' għall-infjammazzjoni)
- simpatomimetici (bħal epinephrine (adrenaline), salbutamol jew terbutaline għall-ażżma)
- thiazides (għall-pressjoni għolja fid-demmm jew jekk il-ġisem tiegħek ikun qed iżomm ilma żżejjed (żamma ta' ilma)).

Octreotide u lanreotide – użati għat-trattament ta' kundizzjoni rari fejn ikun hemm ammont eċċessiv ta' ormon ta' tkabbir (akromegalija). Dawn jistgħu kemm iżidulek kif ukoll inaqqsu lew il-livell taz-zokkor fid-demmm tiegħek.

Jekk xi waħda minn dawn t'hawn fuq tapplika għalik (jew jekk m'intix ċert), kellek lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

Fiasp mal-alkohol

Jekk tixrob l-alkohol, il-ħtieġa tiegħek għall-insulina tista' tinbidel hekk kif il-livell taz-zokkor fid-demmm tiegħek jista' jitla' jew jinżel. Għalhekk għandek timmonitorja l-livell taz-zokkor fid-demmm tiegħek aktar ta' spiss mis-soltu.

Tqala u treddiġħ

Jekk inti tqila, taħseb li tista tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir tat-tabib tiegħek qabel tieħu din il-medicina. Din il-medicina tista' tintuża waqt it-tqala; madankollu jista' jkun hemm il-bżonn li tinbidel id-doża tal-insulina tiegħek waqt it-tqala u wara l-ħlas. Ħafna drabi l-ammont t'insulina li għandek bżonn waqt l-ewwel tliet xhur ta' tqala jonqos u jizdied għall-kumpliment tas-sitt xhur. Il-kontroll bil-għaqal tad-dijabete tiegħek hu meħtieġ waqt it-tqala. Il-prevenzjoni ta' livell baxx ta' zokkor fid-demmm (ipoglicemija) hu partikularment importanti għas-saħħa tat-tarbija tiegħek. Wara li jkollok it-tarbija, il-probabbiltà hi li l-ħtiġijiet tiegħek tal-insulina jergħu jirritornaw għal kemm kellek bżonn qabel it-tqala.

M'hemm ebda restrizzjonijiet għat-trattament b'Fiasp waqt it-treddiġħ.

Sewqan u thaddim ta' magni

Jekk il-livell ta' zokkor fid-demmm tiegħek ikun baxx dan jista' jaffettwa l-ħila li ssuq jew tuża kwalunkwe għodod jew magni. Jekk il-livell ta' zokkor fid-demmm tiegħek ikun baxx, il-koncentrazzjoni u l-abbiltà tiegħek biex tirreagixxi jistgħu jiġu affettwati. Dan jista' jkun perikoluż għalik u għal haddieħor. Staqsi lit-tabib tiegħek jekk tistax issuq jekk:

- ta' spiss ikollok livell baxx ta' zokkor fid-demmm
- issibha diffiċli biex tinduna li għandek livell baxx ta' zokkor fid-demmm.

Tagħrif importanti dwar xi ingredjenti fi Fiasp

Din il-medicina fiha anqas minn mmol 1 ta' sodium (23 mg) f'kull doża, jiġifieri tista' tghid essenzjalment 'ħielsa mis-sodium'.

3. Kif għandek tuża Fiasp

Dejjem għandek tuża din il-medicina skont il-parir eżatt tat-tabib tiegħek. Iċċekkja mat-tabib jew mal-ispizjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

Jekk inti persuna għamja jew għandek vista batuta u ma tistax taqra l-kontatur tad-doża fuq il-pinna, tużax dan il-prodott medicinali tal-insulina minghajr għajnuna. Fittex għajnuna minghand persuna li għandha vista tajba u li hija mharrġa fl-użu tal-pinna.

Meta għandek tuża Fiasp

Fiasp hu insulina li tittiehed fil-ħin tal-ikel.

Adulti: Fiasp għandu jiġi injettat eżatt qabel (0-2 minuti) il-bidu tal-ikla, bl-għażla li jiġi injettat sa 20 minuta wara li tibda l-ikla.

Tfal: Fiasp għandu jiġi injettat eżatt qabel (0-2 minuti) il-bidu tal-ikla, bil-possibiltà li jiġi injettat sa 20 minuta wara li tinbeda l-ikla f' sitwazzjonijiet fejn m'hemmx ċertezza dwar meta t-tifel/tifla se jiekol. F'dawn is-sitwazzjonijiet saqsi lit-tabib tiegħek għall-parir.

Din il-medicina jkollha l-effett massimu tagħha bejn siegħa u 3 sigħat wara l-injezzjoni, u l-effett idum għal 3 sa 5 sigħat.

Id-doża ta' Fiasp

Doża għad-dijabete ta' tip 1 u ta' tip 2

It-tabib tiegħek se jiddeċiedi miegħek:

- l-ammont ta' Fiasp li se jkollok bżonn ma' kull ikla
- meta tiċċekkja l-livell ta' zokkor fid-demm tiegħek u jekk ikollokx bżonn ta' doża oghla jew iktar baxxa.

Jekk tkun tixtieq tibdel id-dieta tas-soltu tiegħek, l-ewwel iċċekkja mat-tabib, mal-ispizjar jew mal-infermier tiegħek, għax bidla fid-dieta tas-soltu tiegħek tista' tibdel il-bżonn tiegħek għall-insulina.

Meta tuża medicini oħrajn, staqsi lit-tabib tiegħek jekk il-kura tiegħek għandhiex bżonn tiġi aġġustata.

Aġġustament fid-doża għad-dijabete ta' tip 2

Id-doża ta' kuljum għandha tkun ibbażata fuq il-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek fil-ħin tal-ikel u fil-ħin tal-irqad tal-ġurnata preċedenti.

- Qabel il-kolazzjon – id-doża għandha tiġi aġġustata skont il-livell taz-zokkor fid-demm qabel l-ikla ta' nofsinhar tal-ġurnata preċedenti
- Qabel l-ikla ta' nofsinhar – id-doża għandha tiġi aġġustata skont il-livell taz-zokkor fid-demm qabel iċ-ċena ta' filgħaxija tal-ġurnata preċedenti
- Qabel iċ-ċena ta' filgħaxija – id-doża għandha tiġi aġġustata skont il-livell taz-zokkor fid-demm fil-ħin tal-irqad tal-ġurnata preċedenti

Tabella 1 Aġġustament fid-doża		
Zokkor fid-demm fil-ħin tal-ikel jew fil-ħin tal-irqad		Aġġustament fid-doża
mmol/L	mg/dL	
inqas minn 4	inqas minn 71	Naqqas id-doża b'unità 1
4-6	71-108	L-ebda aġġustament fid-doża
iktar minn 6	iktar minn 108	Żid id-doża b'unità 1

Użu f'pazjenti anzjani (65 sena jew aktar)

Din il-medicina tista' tintuża f'pazjenti anzjani. Kellem lit-tabib tiegħek dwar tibdil fid-doża tiegħek.

Jekk għandek problemi tal-kliewi jew tal-fwied

Jekk għandek problemi tal-kliewi jew tal-fwied, jista' jkollok bżonn tiċċekkja l-livell ta' zokkor fid-demm tiegħek b'mod aktar regolari. Kellem lit-tabib tiegħek dwar tibdil fid-doża tiegħek.

Kif tinjetta Fiasp

Din il-medicina hija tajba biss għall-injezzjoni taht il-gilda (injezzjoni subkutanja) minn pinna għall-insulina Novo Nordisk li tista' terga' tintuza.

Qabel ma tuza Fiasp għall-ewwel darba, it-tabib jew l-infermier tiegħek se jurik kif tuzah. Kellem lit-tabib tiegħek jekk għandek bżonn tinjetta l-insulina tiegħek b'mod ieħor.

Fejn għandek tagħmel l-injezzjoni

- L-aħjar postijiet fejn tinjetta huma n-naħa ta' quddiem ta' qaddek (iż-zaqq) jew in-naħa ta' fuq ta' dirgħajk.
- Tinjettax go vina jew go muskolu.
- Ibdel il-post fiż-zona fejn tinjetta kuljum biex tnaqqas ir-riskju li tiżviluppa bidliet taht il-gilda (ara sezzjoni 4).

Tużax Fiasp

- jekk l-iskartoċċ jew il-pinna li tista' terga' tintuza li tkun qed tuza jkollha l-ħsara. Ħudu lura minghand min xtrajtu. Ara l-manwal tal-pinna tiegħek li tista' terga' tintuza għal istruzzjonijiet addizzjonali.
- jekk l-iskartoċċ ma jkunx inħażen kif suppost (ara sezzjoni 5 'Kif taħzen Fiasp').
- jekk l-insulina ma tidhirx ċara (eż. tidher imċajpra) u bla kulur.

Kif tinjetta Fiasp

- Aqra l-manwal li jiġi mal-pinna tiegħek li tista' terga' tintuza.
- Iċċekkja l-isem u l-qawwa fuq it-tikketta tal-iskartoċċ (Penfill) biex taċċerta ruhek li hi Fiasp.
- Dejjem uza labra ġdida għal kull injezzjoni biex tevita l-kontaminazzjoni.
- M'għandekx taqsam il-labar ma' oħrajn.

Jekk tuza Fiasp aktar milli suppost

Jekk tuza żżejjed insulina, il-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek jista' jitbaxxa żżejjed (ipoglicemija); ara l-parir f' sezzjoni 4 taht 'Livell baxx ta' zokkor fid-demm'.

Jekk tinsa tuza Fiasp

Jekk tinsa tuza l-insulina tiegħek, iz-zokkor fid-demm tiegħek jista' jogħla wisq (iperglicemija). Ara sezzjoni 4 taht 'Livell għoli ta' zokkor fid-demm'.

Tliet passi sempliċi li jistgħu jgħinu sabiex jiġi evitat livell baxx jew għoli ta' zokkor fid-demm huma:

- Dejjem żomm skrataċ żejda ta' Fiasp fuqek.
- Dejjem żomm xi haġa fuqek li turi li għandek id-dijabete.
- Dejjem żomm fuqek prodotti li jkun fihom iz-zokkor. Ara sezzjoni 4 taht 'X' għandek tagħmel jekk ikollok livell baxx ta' zokkor fid-demm'.

Jekk tieqaf tuza Fiasp

Tiqafx tuza l-insulina tiegħek mingħajr ma l-ewwel titkellem mat-tabib tiegħek. Jekk tieqaf tuza l-insulina tiegħek, dan jista' jwassal għal livell għoli ħafna ta' zokkor fid-demm (iperglicemija severa) u ketoacidozi (kundizzjoni fejn ikun hemm wisq aċtu fid-demm, li hu potenzjalment ta' periklu għall-ħajja). Ara s-sintomi u l-pariri f' sezzjoni 4 taht 'Livell għoli ta' zokkor fid-demm'.

4. Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull medicina oħra, din il-medicina tista' tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f' kulhadd.

Livell baxx ta' zokkor fid-demm (ipoglicemija) huwa komuni ħafna b'kura bl-insulina (jista' jaffettwa aktar minn persuna 1 minn kull 10). Jista' jkun serju ħafna. Jekk il-livell taz-zokkor fid-demm jinzel wisq, inti tista' tintilef minn sensik. Ipoglicemija serja tista' tikkawża ħsara fil-moħħ u tista' tkun ta' periklu għall-ħajja. Jekk għandek sintomi ta' livell baxx ta' zokkor fid-demm, hu passi

minnufih biex iżżid il-livell taz-zokkor fid-demm. Ara l-parir taht 'Livell baxx ta' zokkor fid-demm' aktar 'l isfel.

Jekk ikollok reazzjoni allergika serja (inkluż xokk anafilattiku) għall-insulina jew għal xi wiehed mis-sustanzi fi Fiasp (kemm dan isehh ta' spiss mhuwiex magħruf), ieqaf uża din il-medicina u għamel kuntatt minnufih mas-servizz tal-emergenza medika.

Is-sinjali ta' reazzjoni allergika serja jistgħu jinkludu:

- reazzjonijiet lokali (eż., raxx, ħmura u ħakk) li jinfirxu għal partijiet oħra ta' gismek
- f'daqqa waħda ma thossokx tajjeb u tibda tegħreq
- tibda tiddardar (rimettar)
- ikollok diffikultà biex tiehu n-nifs
- ikollok tahbit tal-qalb mghaġġel jew thossok stordut.

Reazzjonijiet allergiċi bħal raxx tal-ġilda generalizzat u nefha fil-wiċċ jistgħu jsehhu. Dawn mhumiex komuni u jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 100. Fittex tabib jekk is-sintomi jmorru għall-aġħar jew ma tarax titjib wara xi ftit ġimghat.

Bidliet fil-ġilda fis-sit tal-injezzjoni: Jekk tinjetta insulina fl-istess post, it-tessut xaħmi jista' jew jiċkien (lipoatrofija) jew jiħkien (lipoipertrofija) (dawn mhumiex komuni u jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 100). Boċċi taht il-ġilda jistgħu jiġu kkawżati wkoll minn akkumulazzjoni ta' proteina msejja amilojdi (amilojdozi tal-ġilda; il-frekwenza ta' kemm din is-sehh mhijiex magħrufa). L-insulina tista' ma taħdimx tajjeb ħafna jekk tinjetta f'żona bil-boċċi, li ċkienet jew li ħkienet. Ibdel is-sit tal-injezzjoni ma' kull injezzjoni biex tgħin fil-prevenzjoni ta' dawn il-bidliet fil-ġilda.

Effetti sekondarji oħra jinkludu:

Komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 10)

Reazzjoni fis-sit mnejn jingħata: Reazzjonijiet lokali jistgħu jsehhu fil-post fejn tinjetta lilek innifsek.

Is-sinjali jistgħu jinkludu: raxx, ħmura, infjammazzjoni, tbenġil, irritazzjoni, uġiġh u ħakk.

Normalment dawn ir-reazzjonijiet imorru wara ftit jiem.

Reazzjonijiet tal-ġilda: Sinjali ta' allergija fuq il-ġilda bħal ekżema, raxx, ħakk, urtikarja u dermatite jistgħu jsehhu.

Effetti ġenerali mit-trattament bl-insulina inkluż Fiasp

- **Livell baxx ta' zokkor fid-demm (ipoglicemija)** (komuni ħafna)

Livell baxx ta' zokkor fid-demm jista' jsehħ jekk inti:

Tixrob l-alkohol; tinjetta zżejjed insulina; tagħmel aktar eżerċizzju mis-soltu; tiekol ftit wisq jew taqbeż xi ikla.

Sinjali ta' twissija ta' livell baxx ta' zokkor fid-demm – dawn jistgħu jiġu f'daqqa:

Uġiġh ta' ras, diskors ma jiftiehemx, tahbit tal-qalb mghaġġel, għaraq kiesaħ, ġilda kiesha u pallida, thossok imdardar, thossok bil-ġuħ ħafna, roġħda jew thossok nervuż jew inkwetat, thoss għeja, dgħufija jew ikollok ngħas mhux tas-soltu, thossok konfuż, diffikultà biex tikkoncentra tibdil temporanju fil-vista.

X'għandek tagħmel jekk ikollok livell baxx ta' zokkor fid-demm

- Jekk inti konxju, ikkura minnufih il-livell baxx ta' zokkor fid-demm permezz ta' 15-20 g ta' karboidrat li jaġixxi b'mod mghaġġel; kul pilloli tal-glukosju jew ikla oħra ħafifa b'ħafna zokkor, bħal meraq tal-frott, helu jew biskuttini (dejjem gorr miegħek pilloli tal-glukosju jew ikla ħafifa b'ħafna zokkor, għal li jista' jkun).
- Huwa rrakkomandat li terġa' tiċċekkja l-livelli taz-zokkor fid-demm tiegħek wara 15-20 minuta u terġa' tiehu l-kura jekk il-livelli taz-zokkor fid-demm tiegħek għadhom inqas minn 4 mmol/L.
- Stenna sakemm is-sinjali ta' livell baxx ta' zokkor fid-demm ma jibqgħux jidhru jew meta l-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek ikun ġie lura għan-normal. Imbagħad kompli hu l-kura bl-insulina tiegħek bħas-soltu.

X'għandhom ikunu jafu persuni ohrajn jekk iħossok ħażin

Għid lill-persuni kollha li tqatta' ż-żmien magħhom li għandek id-dijabete. Għidilhom x'jista' jigi meta l-livell ta' zokkor fid-demm tiegħek jitbaxxa żżejjed, inkluż ir-riskju li jista' jtik hass ħażin.

Għidilhom li jekk iħossok ħażin, huma jridu:

- idawruk fuq ġenbek biex tevita li tifga
- iġibu għajjnuna medika minnufih
- **ma jtukx** l-ebda ikel jew xorb, għax tista' tifga.

Meta tintilef minn sensik tista' tirkupra aktar malajr b'injezzjoni ta' glucagon. Dan jista' jingħata biss minn xi hadd li jaf jużah.

- Jekk tingħata glucagon, se jkollok bżonn tieħu z-zokkor jew xi ħaġa ħafifa b'ħafna zokkor malli tiġi f'sensik.
- Jekk ma tirispondix għall-kura b'injezzjoni ta' glucagon, se jkollok bżonn tiġi kkurat fi sptar.

Jekk livell baxx ħafna ta' zokkor ma jiġix ikkurat, maż-żmien jista' jikkawża ħsara fil-moħħ. Dan jista' jidm għal ftit żmien jew idum ħafna. Jista' wkoll jikkawża l-mewt.

Kellem lit-tabib tiegħek jekk:

- il-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek tbaxxa tant li ħassek ħażin
- ingħatajt injezzjoni ta' glucagon
- kellek livell baxx iżżejjed ta' zokkor fid-demm għal ftit drabi dan l-aħħar.

Dan hu għax id-dożaġġ jew il-ħin ta' meta tieħu l-injezzjonijiet tal-insulina, l-ikel jew l-eżerċizzju, jista' jkollhom bżonn jinbidlu.

- ***Livell għoli ta' zokkor fid-demm (iperglicemija)***

Livell għoli ta' zokkor fid-demm jista' jseħħ jekk inti:

Tiekol aktar jew tagħmel inqas eżerċizzju mis-soltu; tixrob l-alkoħol; ikollok infezzjoni jew deni; ma tużax insulina biżżejjed; tieħu inqas insulina milli għandek bżonn ripetutament; tinsa tieħu l-insulina jew tieqaf tieħu l-insulina.

Sinjali ta' twissija ta' livell għoli ta' zokkor fid-demm – dawn normalment jidhru gradwalment:

Ħmura fil-wieċ, ġilda xotta, thossok bi nġhas jew għajjen, ħalq xott, riħa ta' frott (acetone) fil-ħalq, tagħmel l-awrina aktar ta' spiss, thossok bil-għatx, titlef l-aptit, thossok imqalla' (dardir jew rimettar). Dawn jistgħu jkunu sinjali ta' kundizzjoni gravi ħafna msejha ketoacidożi. Din hi akkumulazzjoni ta' aċtu fid-demm għax il-ġisem ikun qed ikisser ix-xaħam minflok iz-zokkor. Jekk ma tikkurahix, din tista' twassal għal koma dijabetika u eventwalment mewt.

X'għandek tagħmel jekk ikollok livell għoli ta' zokkor fid-demm

- Ittestja l-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek.
- Agħti doża ta' korrezzjoni tal-insulina jekk ġejt mgħallem kif għandek tagħmel dan.
- Ittestja l-awrina tiegħek għal ketones.
- Jekk għandek il-ketones, fittex għajjnuna medika immedjatament.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib, lill-ispizjar jew lill-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Tista' wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali imniżżla f'[Appendiċi V](#). Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista' tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta' din il-medicina.

5. Kif taħzen Fiasp

Żomm din il-medicina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta' meta tiskadi li tidher fuq it-tikketta u l-kartuna wara 'JIS'. Id-data ta' meta tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta' dak ix-xahar.

Qabel ma jinfetaħ għall-ewwel darba

Ahżen fi friġġ ($2^{\circ}\text{C} - 8^{\circ}\text{C}$). Tagħmlux fil-friża. Żommu 'l bogħod mill-element li jiffriża. Żomm l-iskartoċċ fil-kartuna ta' barra sabiex tilqa' mid-dawl.

Wara li jinfetaħ għall-ewwel darba jew meta jingarr bhala sper

Tagħmlux fil-friġġ. Tista' ġgħorr l-iskartoċċ (Penfill) miegħek u żzommu fit-temperatura tal-kamra (mhux aktar minn 30°C) sa perjodu ta' 4 ġimgħat. Dejjem żomm l-iskartoċċ fil-kartuna ta' barra sabiex tilqa' mid-dawl.

Armi l-labra wara kull injezzjoni.

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranagġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispizjar tiegħek dwar kif għandek tarmi mediċini li m'għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X'fih Fiasp

- Is-sustanza attiva hi insulina aspart. Millilitru ta' soluzzjoni fih 100 unità ta' insulina aspart. Kull skartoċċ fih 300 unità ta' insulina aspart f' soluzzjoni ta' 3 mL.
- Is-sustanzi l-oħra huma phenol, metacresol, glycerol, zinc acetate, disodium phosphate dihydrate, arginine hydrochloride, nicotinamide (vitamin B₃), hydrochloric acid (għall-aġġustament tal-pH), sodium hydroxide (għall-aġġustament tal-pH) (ara t-tmiem ta' sezzjoni 2 taħt 'Tagħrif importanti dwar xi ingredjenti fi Fiasp') u l-ilma għall-injezzjonijiet.

Kif jidher Fiasp u l-kontenut tal-pakkett

Fiasp hu ppreżentat bhala soluzzjoni ċara, bla kulur u akweja għall-injezzjoni fi skartoċċ.

Daqsijiet tal-pakketti ta' 5 u 10 skrataċ ta' 3 mL. Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq u l-Manifattur

Novo Nordisk A/S,
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd, Id-Danimarka

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f'

Sorsi oħra ta' informazzjoni

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini: <http://www.ema.europa.eu>.

Fuljett ta' taghrif: Informazzjoni għall-pazjent

Fiasp 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni f'kunjett insulina aspart

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-medicina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib, lill-ispizjar jew lill-infermier tiegħek.
- Din il-medicina għet mogħtija lilek biss. M'għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista' tagħmlilhom il-ħsara anke jekk għandhom l-istess sinjali ta' mard bħal tiegħek.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib, lill-ispizjar jew lill-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi effetti sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F'dan il-fuljett

1. X'inhu Fiasp u għalxiex jintuża
2. X'għandek tkun taf qabel ma tuża Fiasp
3. Kif għandek tuża Fiasp
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif taħžen Fiasp
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1. X'inhu Fiasp u għalxiex jintuża

Fiasp hu insulina li tittiehed fil-ħin tal-ikel u li jaħdem malajr biex ibaxxi z-zokkor fid-demm. Fiasp hu soluzzjoni għall-injezzjoni li fih insulina aspart u li jintuża għall-kura tad-dijabete mellitus fl-adulti, fl-adolesxenti u tfal minn sena '1 fuq. Id-dijabete hija marda fejn il-ġisem tiegħek ma jaġmilkx biżżejjed insulina biex jikkontrolla l-livell taz-zokkor fid-demm. Kura b'Fiasp tgħin biex tippreveni komplikazzjonijiet mid-dijabete tiegħek.

Fiasp għandu jiġi injettat sa 2 minuti qabel il-bidu tal-ikla, bl-għażla li jiġi injettat sa 20 minuta wara li tibda l-ikla.

Din il-medicina jkollha l-effett massimu tagħha bejn siegħa u 3 sigħat wara l-injezzjoni, u l-effett idum għal 3 sa 5 sigħat.

Din il-medicina għandha normalment tintuża flimkien ma' preparazzjonijiet oħrajn ta' insulina li jaġixxu b'effett intermedju jew li jaġixxu fit-tul.

Din il-medicina tista' tintuża wkoll għall-infuzjoni kontinwa f'sistema ta' pompa.

2. X'għandek tkun taf qabel ma tuża Fiasp

Tużax Fiasp

- jekk inti allergiku għall-insulina aspart jew għal xi sustanza oħra ta' din il-medicina (imniżżla fis-sezzjoni 6).

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib, lill-ispizjar jew lill-infermier tiegħek qabel tuża Fiasp. Fuq kollox oqgħod attent għal dawn li ġejjin:

- Livell baxx ta' zokkor fid-demm (ipoglicemija) – Jekk il-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek ikun baxx wisq, segwi l-gwida ta' kif għandek tagħmel meta jkollok livell baxx ta' zokkor fid-demm f'sezzjoni 4 'Effetti sekondarji possibbli'. Fiasp jibda jbaxxi z-zokkor fid-demm aktar malajr meta mqabbel ma' insulini oħrajn li jittiehdu fil-ħin tal-ikel. Jekk isseħħ l-ipoglicemija, inti jista' jkollok din il-kundizzjoni aktar malajr wara injezzjoni b'Fiasp.
- Livell għoli ta' zokkor fid-demm (iperglicemija) – Jekk il-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek ikun għoli wisq, segwi l-gwida ta' kif għandek tagħmel meta jkollok livell għoli ta' zokkor fid-demm f'sezzjoni 4 'Effetti sekondarji possibbli'.

- Meta tbiddel minn prodotti mediċinali oħra tal-insulina – It-tabib tiegħek jista' jkollu bżonn jagħtik xi parir dwar id-doża tal-insulina tiegħek.
- Jekk it-trattament tiegħek bl-insulina qed jiġi mogħti flimkien ma' pioglitazone (mediċina orali kontra d-dijabete użata fit-trattament tad-dijabete mellitus tip 2) – . Għid lit-tabib tiegħek mill-aktar fis jekk ikollok xi sinjali ta' insuffiċjenza tal-qalb bħal qtugħ ta' nifs mhux tas-soltu jew zieda ta' malajr fil-piż jew xi neħha lokalizzata minhabba żamma ta' fluwidi (edima).
- Disturbi fl-għajnejn – Id-disturb fl-għajnejn minhabba d-dijabete bħal retinopatija diabetika jista' b'mod temporanju jmur għall-aġar jekk it-titjib fil-kontroll taz-zokkor fid-demm isir b'rata mgħaġġla.
- Uġiġh minhabba ħsara fin-nervituri – Jekk il-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek jitjeb b'rata mgħaġġla ħafna, jista' jkollok uġiġh relatat man-nervituri, li normalment ikun temporanju.
- Neħha madwar il-ġogi tiegħek – Meta tibda tuża l-mediċina tiegħek għall-ewwel darba, ġismek jista' jżomm aktar ilma milli suppost. Dan jikkawża neħha madwar l-għekiesi tiegħek u ġogi oħrajn. Dan normalment ma jdumx għal tul ta' żmien.
- Aċċerta ruħek li qed/a tuża t-tip it-tajjeb t'insulina – dejjem iċċekkja t-tiketka tal-insulina qabel kull injezzjoni sabiex tevita t-taħlit b'mod aċċidentali bejn prodotti tal-insulina.
- It-trattament bl-insulina jista' jikkawża l-ġisem jipproduċi antikorpi għall-insulina (sustanza li taħdem kontra l-insulina). Madankollu, f'każijiet rari ħafna, din se tikkawża xi tibdil fid-doża tiegħek tal-insulina.

Jekk għandek vista batuta, jekk jogħġbok ara sezzjoni 3 'Kif għandek tuża Fiasp'.

Xi kundizzjonijiet u attivitajiet jistgħu jaffettwaw kemm għandek bżonn insulina. Kellem lit-tabib tiegħek:

- jekk għandek problemi tal-kliwi jew tal-fwied, jew tal-glandola adrenali, pitwitarja jew tat-tirojde.
- jekk qed tagħmel iktar eżerċizzju mis-soltu jew jekk trid tibdel id-dieta normali tiegħek, għax dan jista' jkollu effett fuq il-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek.
- jekk inti marid, kompli hu l-insulina tiegħek u kellem lit-tabib tiegħek.
- Jekk se ssiefer, l-ivvjaġġar bejn żoni differenti ta' ħin jista' jaffettwa l-ħtiġijiet tiegħek tal-insulina u l-ħin meta tiegħu l-injezzjonijiet.

Huwa rrakkomandat ħafna li meta jkun qed jintuża Fiasp, jitniżżel l-isem u n-numru tal-lott ta' kull pakkett sabiex wiehed ikun jaf liema lott ikun intuża.

Bidliet fil-ġilda fis-sit tal-injezzjoni

Is-sit tal-injezzjoni għandu jinbidel kull darba sabiex jgħin biex jiġu evitati bidliet fit-tessut xahmi ta' taħt il-ġilda, bħal li tihxien il-ġilda, tiċkien il-ġilda jew boċċi taħt il-ġilda. L-insulina tista' ma taħdimx tajjeb ħafna jekk tinjetta f'żona bil-boċċi, li ċkienet jew li ħxienet (ara sezzjoni 3 'Kif għandek tuża Fiasp'). Għid lit-tabib tiegħek jekk tinduna b'xi bidliet fil-ġilda fis-sit tal-injezzjoni. Għid lit-tabib tiegħek jekk bħalissa qed tinjetta f'dawn iż-żoni affettwati qabel ma tibda tinjetta f'parti differenti. It-tabib tiegħek jista' jgħidlek biex tiċċekkja aktar mill-qrib iż-zokkor fid-demm tiegħek, u biex taggusta d-doża tal-insulina jew tal-medikazzjonijiet antidijabetiċi l-oħra tiegħek.

Tfal u adolexxenti

Din il-mediċina mhix irrakkomandata għall-użu fit-tfal taħt l-età ta' sena.

Mediċini oħra u Fiasp

Għid lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek jekk qed tiegħu, ħadt dan l-aħħar jew tista' tiegħu xi mediċini oħra. Xi mediċini jaffettwaw il-livell ta' zokkor fid-demm tiegħek – dan jista' jfisser li d-doża tal-insulina tiegħek trid tinbidel.

Hawn taħt hawn elenkati l-iktar mediċini komuni li jistgħu jaffettwaw il-kura tiegħek bl-insulina.

Il-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek jista' jaqa' (ipoglicemija) jekk tiegħu:

- mediċini oħra għall-kura tad-dijabete (orali jew li jistgħu jiġu injettati)

- antibijotiċi ta' sulphonamides (użati għat-trattament ta' infezzjonijiet)
- steroidi anaboliċi (bħal testosterone)
- imblokkaturi tar-riċetturi beta (użati fil-trattament tal-pessjoni għolja fid-demmm jew l-angina)
- salicylates (użati biex itaffu l-uġiġh u jnaqqsu d-deni)
- inibituri ta' monoamine oxidase (MAOI) (użati għat-trattament tad-dipressjoni)
- inibituri tal-enzima li tikkonverti angiotensin (ACE) (għal xi problemi tal-qalb jew ta' pressjoni għolja fid-demmm).

Il-livell taz-zokkor fid-demmm tiegħek jista' jogħla (iperqliċemija) jekk tieħu:

- danazol (medicina li taħdem fl-ovulazzjoni)
- kontraċettivi li jittieħdu mill-ħalq (pilloli li jikkontrollaw biex ma tinqabadx tqila)
- ormoni tat-tirojde (għal problemi fil-glandola tat-tirojde)
- ormon tat-tkabbir (għal defiċjenza ta' ormon tat-tkabbir)
- glukokortikoidi (bħal 'cortisone' għall-infjammazzjoni)
- simpatomimetiki (bħal epinephrine (adrenaline), salbutamol jew terbutaline għall-ażżma)
- thiazides (għall-pessjoni għolja fid-demmm jew jekk il-ġisem tiegħek ikun qed iżomm ilma żżejjed (żamma ta' ilma)).

Octreotide u lanreotide – użati għat-trattament ta' kundizzjoni rari fejn ikun hemm ammont eċċessiv ta' ormon ta' tkabbir (akromegalija). Dawn jistgħu kemm iżidulek kif ukoll inaqqsu le l-livell taz-zokkor fid-demmm tiegħek.

Jekk xi waħda minn dawn t'hawn fuq tapplika għalik (jew jekk m'intix ċert), kellek lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

Fiasp mal-alkohol

Jekk tixrob l-alkohol, il-ħtieġa tiegħek għall-insulina tista' tinbidel hekk kif il-livell taz-zokkor fid-demmm tiegħek jista' jitla' jew jinzel. Għalhekk għandek timmonitorja l-livell taz-zokkor fid-demmm tiegħek aktar ta' spiss mis-soltu.

Tqala u treddiġh

Jekk inti tqila, taħseb li tista tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir tat-tabib tiegħek qabel tieħu din il-medicina. Din il-medicina tista' tintuża waqt it-tqala; madankollu jista' jkun hemm il-bżonn li tinbidel id-doża tal-insulina tiegħek waqt it-tqala u wara l-ħlas. Hafna drabi l-ammont t'insulina li għandek bżonn waqt l-ewwel tliet xhur ta' tqala jonqos u jizdied għall-kumpliment tas-sitt xhur. Il-kontroll bil-għaqal tad-dijabete tiegħek hu meħtieġ waqt it-tqala. Il-prevenzjoni ta' livell baxx ta' zokkor fid-demmm (ipogliċemija) hu partikularment importanti għas-saħħa tat-tarbija tiegħek. Wara li jkollok it-tarbija, il-probabbiltà hi li l-ħtiġijiet tiegħek tal-insulina jergħu jirritornaw għal kemm kellek bżonn qabel it-tqala.

M'hemm ebda restrizzjonijiet għat-trattament b'Fiasp waqt it-treddiġh.

Sewqan u thaddim ta' magni

Jekk il-livell ta' zokkor fid-demmm tiegħek ikun baxx dan jista' jaffettwa l-ħila li ssuq jew tuża kwalunkwe għodod jew magni. Jekk il-livell ta' zokkor fid-demmm tiegħek ikun baxx, il-konċentrazzjoni u l-abbiltà tiegħek biex tirreagixxi jistgħu jiġu affettwati. Dan jista' jkun perikoluż għalik u għal haddieħor. Staqsi lit-tabib tiegħek jekk tistax issuq jekk:

- ta' spiss ikollok livell baxx ta' zokkor fid-demmm
- issibha diffiċli biex tinduna li għandek livell baxx ta' zokkor fid-demmm.

Tagħrif importanti dwar xi ingredjenti fi Fiasp

Din il-medicina fiha anqas minn mmol 1 ta' sodium (23 mg) f'kull doża, jiġifieri tista' tghid essenzjalment 'ħiensa mis-sodium'.

3. Kif għandek tuża Fiasp

Dejjem għandek tuża din il-medicina skont il-parir eżatt tat-tabib tiegħek. Iċċekkja mat-tabib jew mal-ispizjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

Meta għandek tuża Fiasp

Fiasp hu insulina li tittiehed fil-hin tal-ikel.

Adulti: Fiasp għandu jiġi injettat eżatt qabel (0-2 minuti) il-bidu tal-ikla, bl-għażla li jiġi injettat sa 20 minuta wara li tibda l-ikla.

Tfal: Fiasp għandu jiġi injettat eżatt qabel (0-2 minuti) il-bidu tal-ikla, bil-possibbiltà li jiġi injettat sa 20 minuta wara li tinbeda l-ikla f' sitwazzjonijiet fejn m'hemm x certezza dwar meta t-tifel/tifla se jiekol. F'dawn is-sitwazzjonijiet saqsi lit-tabib tiegħek għall-parir.

Din il-medicina jkollha l-effett massimu tagħha bejn siegħa u 3 siegħat wara l-injezzjoni, u l-effett idum għal 3 sa 5 siegħat.

Id-doża ta' Fiasp

Doża għad-dijabete ta' tip 1 u ta' tip 2

It-tabib tiegħek se jiddeċiedi miegħek:

- l-ammont ta' Fiasp li se jkollok bżonn ma' kull ikla
- meta tiċċekkja l-livell ta' zokkor fid-demem tiegħek u jekk ikollokx bżonn ta' doża oghla jew iktar baxxa.

Jekk tkun tixtieq tibdel id-dieta tas-soltu tiegħek, l-ewwel iċċekkja mat-tabib, mal-ispizjar jew mal-infermier tiegħek, għax bidla fid-dieta tas-soltu tiegħek tista' tibdel il-bżonn tiegħek għall-insulina.

Meta tuża medicini oħrajn, staqsi lit-tabib tiegħek jekk il-kura tiegħek għandhiex bżonn tiġi aġġustata.

Aġġustament fid-doża għad-dijabete ta' tip 2

Id-doża ta' kuljum għandha tkun ibbażata fuq il-livell taz-zokkor fid-demem tiegħek fil-hin tal-ikel u fil-hin tal-irqad tal-ġurnata preċedenti.

- Qabel il-kolazzjon – id-doża għandha tiġi aġġustata skont il-livell taz-zokkor fid-demem qabel l-ikla ta' nofsinhar tal-ġurnata preċedenti
- Qabel l-ikla ta' nofsinhar – id-doża għandha tiġi aġġustata skont il-livell taz-zokkor fid-demem qabel iċ-ċena ta' filgħaxija tal-ġurnata preċedenti
- Qabel iċ-ċena ta' filgħaxija – id-doża għandha tiġi aġġustata skont il-livell taz-zokkor fid-demem fil-hin tal-irqad tal-ġurnata preċedenti

Tabella 1 Aġġustament fid-doża		
Zokkor fid-demem fil-hin tal-ikel jew fil-hin tal-irqad		Aġġustament fid-doża
mmol/L	mg/dL	
inqas minn 4	inqas minn 71	Naqqas id-doża b'unità 1
4-6	71-108	L-ebda aġġustament fid-doża
iktar minn 6	iktar minn 108	Żid id-doża b'unità 1

Użu f' pazjenti anzjani (65 sena jew aktar)

Din il-medicina tista' tintuża f' pazjenti anzjani. Kellem lit-tabib tiegħek dwar tibdil fid-doża tiegħek.

Jekk għandek problemi tal-kliewi jew tal-fwied

Jekk għandek problemi tal-kliewi jew tal-fwied, jista' jkollok bżonn tiċċekkja l-livell ta' zokkor fid-demem tiegħek b' mod aktar regolari. Kellem lit-tabib tiegħek dwar tibdil fid-doża tiegħek.

Kif tinjetta Fiasp

Din il-medicina hija għall-injezzjoni taħt il-ġilda (injezzjoni subkutanja) jew għal infużjoni kontinwa fil-pompi. It-teħid permezz ta' pompa tkun teħtieġ istruzzjoni komprensiva mill-professjonist fil-kura tas-saħħa tiegħek.

Fejn ghandek tagħmel l-injezzjoni

- L-aħjar postijiet fejn tinjetta huma n-naħa ta' quddiem ta' qaddek (iż-żaq) jew in-naħa ta' fuq ta' dirgħajk.
- Tinjettax ġo vina jew ġo muskolu.
- Ibdel il-post fiż-żona fejn tinjetta kuljum biex tnaqqas ir-riskju li tiżviluppa bidlet taht il-ġilda (ara sezzjoni 4).

Tużax Fiasp

- Jekk l-għatu protettiv fuq il-kunjett huwa laxx jew nieqes. Il-kunjett għandu għatu protettiv tal-plastik sabiex ma jkunx jista' jsir tbaġħ bil-kontenitur. Jekk il-kunjett ma jkunx f'kundizzjoni perfetta meta tirčevih, roddu lura lil min ipprovdihulek.
- jekk il-kunjett ma ġiex maħżun tajjeb (ara sezzjoni 5 'Kif taħžen Fiasp').
- jekk l-insulina ma tidhirx ċara (eż. tidher imċajpra) u bla kulur.

Kif tinjetta Fiasp

Qabel ma tuża Fiasp għall-ewwel darba, it-tabib jew l-infermier tiegħek se jurik kif tużah.

- 1 Iċċekkja l-isem u l-qawwa fuq it-tikketta tal-kunjett biex taċċerta ruhek li hu Fiasp.
- 2 Nehhi l-għatu protettiv minn fuq il-kunjett.
- 3 Dejjem uża labra u siringa ġdida għal kull injezzjoni biex tippreveni l-kontaminazzjoni. M'għandekx taqsam il-labar u s-siringi ma oħrajn.
- 4 Iġbed ġos-siringa l-istess ammont ta' arja daqs id-doża tal-insulina li tkun se tinjetta. Injetta l-arja fil-kunjett.
- 5 Aqleb il-kunjett u s-siringa ta' taht fuq u iġbed id-doża korretta tal-insulina fis-siringa. Ohroġ il-labra 'l barra mill-kunjett. Nehhi l-arja minn ġos-siringa u ċċekkja li d-doża hija korretta.
- 6 Injetta l-insulina taht il-ġilda. Uża t-teknika tal-injezzjoni li kien tak parir biex tuża t-tabib jew l-infermier tiegħek.
- 7 Armi l-labra wara kull injezzjoni.

Għall-użu f'sistema ta' pompa għall-infuzjoni

Segwi l-istruzzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet mit-tabib tiegħek rigward l-użu ta' Fiasp f'pompa. Qabel l-użu ta' Fiasp f'sistema ta' pompa, għandek tkun irčivejt istruzzjoni komprensiva fuq l-użu u tagħrif dwar kwalunkwe azzjoni li għandha tittiehed f'każ ta' mard, livell għoli jew baxx ta' zokkor fid-demem jew hsara fis-sistema tal-pompa. Jekk tuża Fiasp minn kunjett ġo sistema ta' pompa għall-infuzjoni dan jista' jintuża għal massimu ta' 6 ijiem.

Kif timla l-pompa

- Fiasp qatt m'għandu jiġi dilwit jew jithallat ma' kwalunkwe insulina oħra.
- Qabel iddaħhal il-labra, uzu sapun u ilma biex tnaddaf idejk, kif ukoll dik il-parti tal-ġilda fejn tkun se ddaħhal il-labra, sabiex tevita infezzjonijiet fil-post fejn tinghata l-infuzjoni.
- Meta timla reċipjent ġdid, thallix bzieżaq kbar tal-arja, fis-siringa jew fit-tubi.
- Tibdil fis-sett tal-infuzjoni (tubi u labra), għandu isir skont l-istruzzjonijiet fit-tagħrif dwar il-prodott provdut mas-sett tal-infuzjoni.

Biex tiehu l-benefiċċju tal-infuzjoni tal-insulina, u tiskopri jekk hemm xi hsara fil-pompa tal-insulina, hu rakkomandat li tiċċekkja l-livell taz-zokkor fid-demem tiegħek regolarment.

X'taġħmel f'każ ta' hsara fis-sistema tal-pompa

Dejjem għandu jkollok metodu alternattiv disponibbli biex tiehu l-insulina tiegħek li tista' tinghata bhaħha injezzjoni taht il-ġilda (pereżempju, injettur ta' pinna jew siringi) jekk għal li jista' jkun ikollha l-hsara s-sistema tal-pompa.

Jekk tuża Fiasp aktar milli suppost

Jekk tuża żżejjed insulina, il-livell taz-zokkor fid-demem tiegħek jista' jitbaxxa żżejjed (ipoglicemija); ara l-parir f'sezzjoni 4 taht 'Livell baxx ta' zokkor fid-demem'.

Jekk tinsa tuża Fiasp

Jekk tinsa tuża l-insulina tiegħek, iz-zokkor fid-demmm tiegħek jista' joghla wisq (iperglicemija). Ara sezzjoni 4 taht 'Livell għoli ta' zokkor fid-demmm'.

Tliet passi sempliċi li jistgħu jgħinu sabiex jiġi evitat livell baxx jew għoli ta' zokkor fid-demmm huma:

- Dejjem żomm fuqek siringi żejda u kunjett żejjed ta' Fiasp.
- Dejjem żomm xi haġa fuqek li turi li għandek id-dijabete.
- Dejjem żomm fuqek prodotti li jkun fihom iz-zokkor. Ara sezzjoni 4 taht 'X' għandek tagħmel jekk ikollok livell baxx ta' zokkor fid-demmm'.

Jekk tieqaf tuża Fiasp

Tiqafx tuża l-insulina tiegħek mingħajr ma l-ewwel titkellem mat-tabib tiegħek. Jekk tieqaf tuża l-insulina tiegħek, dan jista' jwassal għal livell għoli haġna ta' zokkor fid-demmm (iperglicemija severa) u ketoacidożi (kundizzjoni fejn ikun hemm wisq aċtu fid-demmm, li hu potenzjalment ta' periklu għall-ħajja). Ara s-sintomi u l-pariri f' sezzjoni 4 taht 'Livell għoli ta' zokkor fid-demmm'.

4. Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull medicina oħra, din il-medicina tista' tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f' kulhadd.

Livell baxx ta' zokkor fid-demmm (ipoglicemija) huwa komuni haġna b'kura bl-insulina (jista' jaffettwa aktar minn persuna 1 minn kull 10). Jista' jkun serju haġna. Jekk il-livell taz-zokkor fid-demmm jinżel wisq, inti tista' tintilef minn sensik. Ipoglicemija serja tista' tikkawża ħsara fil-moħħ u tista' tkun ta' periklu għall-ħajja. Jekk għandek sintomi ta' livell baxx ta' zokkor fid-demmm, hu passi **minnufih** biex iżżid il-livell taz-zokkor fid-demmm. Ara l-parir taht 'Livell baxx ta' zokkor fid-demmm' aktar 'l isfel.

Jekk ikollok reazzjoni allergika serja (inkluż xokk anafilattiku) għall-insulina jew għal xi wiehed mis-sustanzi fi Fiasp (kemm dan isehħ ta' spiss mhuwiex magħruf), ieqaf uża din il-medicina u għamel kuntatt minnufih mas-servizz tal-emergenza medika.

Is-sinjali ta' reazzjoni allergika serja jistgħu jinkludu:

- reazzjonijiet lokali (eż., raxx, ħmura u ħakk) li jinfixxu għal partijiet oħra ta' gismek
- f' daqqa waħda ma tħossokx tajjeb u tibda tegħreq
- tibda tiddardar (rimettar)
- ikollok diffikultà biex tieħu n-nifs
- ikollok taħbit tal-qalb mgħaġġel jew tħossok stordut.

Reazzjonijiet allergiċi bħal raxx tal-ġilda ġeneralizzat u nefħa fil-wiċċ jistgħu jsehħu. Dawn mhumiex komuni u jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 100. Fittex tabib jekk is-sintomi jmorru għall-aġħar jew ma tarax titjib wara xi ftit ġimghat.

Bidliet fil-ġilda fis-sit tal-injezzjoni: Jekk tinjetta insulina fl-istess post, it-tessut xaħmi jista' jew jiċkien (lipoatrofija) jew jiħkien (lipoipetrofija) (dawn mhumiex komuni u jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 100). Boċċi taht il-ġilda jistgħu jiġu kkawżati wkoll minn akkumulazzjoni ta' proteina msejħa amilojdi (amilojdozi tal-ġilda; il-frekwenza ta' kemm din is-seħħ mhijiex magħrufa). L-insulina tista' ma taħdimx tajjeb haġna jekk tinjetta f'żona bil-boċċi, li ċkienet jew li ħkienet. Ibdel is-sit tal-injezzjoni ma' kull injezzjoni biex tgħin fil-prevenzjoni ta' dawn il-bidliet fil-ġilda.

Effetti sekondarji oħra jinkludu:

Komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 10)

Reazzjoni fis-sit mnejn jingħata: Reazzjonijiet lokali jistgħu jsehħu fil-post fejn tinjetta lilek innifsek. Is-sinjali jistgħu jinkludu: raxx, ħmura, infjammazzjoni, tbenġil, irritazzjoni, ugiġħ u ħakk. Normalment dawn ir-reazzjonijiet imorru wara ftit jiem.

Reazzjonijiet tal-ġilda: Sinjali ta' allergija fuq il-ġilda bħal ekżema, raxx, ħakk, urtikarja u dermatite jistgħu jseħħu.

Effetti ġenerali mit-trattament bl-insulina inkluż Fiasp

- **Livell baxx ta' zokkor fid-demm (ipoglicemija)** (komuni ħafna)

Livell baxx ta' zokkor fid-demm jista' jseħħ jekk inti:

Tixrob l-alkoħol; tinjetta żżejjed insulina; tagħmel aktar eżerċizzju mis-soltu; tiekol ftit wisq jew taqbeż xi ikla.

Sinjali ta' twissija ta' livell baxx ta' zokkor fid-demm – dawn jistgħu jiġu f'daqqa:

Uġiġħ ta' ras, diskors ma jiftiehemx, taħbit tal-qalb mghaġġel, għaraq kiesaħ, ġilda kiesha u pallida, thossok imdardar, thossok bil-ġuħ ħafna, roġħda jew thossok nervuż jew inkwetat, thoss għeja, dgħufija jew ikollok ngħas mhux tas-soltu, thossok konfuż, diffikultà biex tikkonċentra tibdil temporanju fil-vista.

X'għandek tagħmel jekk ikollok livell baxx ta' zokkor fid-demm

- Jekk inti konxju, ikkura minnufih il-livell baxx ta' zokkor fid-demm permezz ta' 15-20 g ta' karboidrat li jaġixxi b'mod mghaġġel; kul pilloli tal-glukosju jew ikla oħra ħafifa b'ħafna zokkor, bħal meraq tal-frott, helu jew biskuttini (dejjem gorr miegħek pilloli tal-glukosju jew ikla ħafifa b'ħafna zokkor, għal li jista' jkun).
- Huwa rrakkomandat li terġa' tiċċekkja l-livelli taz-zokkor fid-demm tiegħek wara 15-20 minuta u terġa' tieħu l-kura jekk il-livelli taz-zokkor fid-demm tiegħek għadhom inqas minn 4 mmol/L.
- Stenna sakemm is-sinjali ta' livell baxx ta' zokkor fid-demm ma jibqgħux jidhru jew meta l-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek ikun ġie lura għan-normal. Imbagħad kompli hu l-kura bl-insulina tiegħek bħas-soltu.

X'għandhom ikunu jafu persuni oħrajn jekk iħossok ħażin

Għid lill-persuni kollha li tqatta' ż-żmien magħhom li għandek id-dijabete. Għidilhom x'jista' jiġri meta l-livell ta' zokkor fid-demm tiegħek jitbaxxa żżejjed, inkluż ir-riskju li jista' jtik ħass ħażin.

Għidilhom li jekk iħossok ħażin, huma jridu:

- idawruk fuq ġenbek biex tevita li tifga
- iġibu għajnuna medika minnufih
- **ma jtukx** l-ebda ikel jew xorb, għax tista' tifga.

Meta tintilef minn sensik tista' tirkupra aktar malajr b'injezzjoni ta' glucagon. Dan jista' jingħata biss minn xi hadd li jaf jużah.

- Jekk tingħata glucagon, se jkollok bżonn tieħu z-zokkor jew xi ħaġa ħafifa b'ħafna zokkor malli tiġi f'sensik.
- Jekk ma tirispondix għall-kura b'injezzjoni ta' glucagon, se jkollok bżonn tiġi kkurat fi sptar.

Jekk livell baxx ħafna ta' zokkor ma jiġix ikkurat, maż-żmien jista' jikkawża ħsara fil-moħħ. Dan jista' jdum għal ftit żmien jew idum ħafna. Jista' wkoll jikkawża l-mewt.

Kellem lit-tabib tiegħek jekk:

- il-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek tbaxxa tant li ħassek ħażin
- ingħatajt injezzjoni ta' glucagon
- kellek livell baxx iżżejjed ta' zokkor fid-demm għal ftit drabi dan l-aħħar.

Dan hu għax id-dożaġġ jew il-hin ta' meta tieħu l-injezzjonijiet tal-insulina, l-ikel jew l-eżerċizzju, jista' jkollhom bżonn jinbidlu.

- **Livell għoli ta' zokkor fid-demm (iperglicemija)**

Livell għoli ta' zokkor fid-demm jista' jseħħ jekk inti:

Tiekol aktar jew tagħmel inqas eżerċizzju mis-soltu; tixrob l-alkoħol; ikollok infezzjoni jew deni; ma tużax insulina biżżejjed; tieħu inqas insulina milli għandek bżonn ripetutament; tinsa tieħu l-insulina jew tieqaf tieħu l-insulina.

Sinjali ta' twissija ta' livell għoli ta' zokkor fid-demm – dawn normalment jidhru gradwalment: Hmura fil-wiċċ, ġilda xotta, thossok bi nġhas jew għajjen, ħalq xott, riġa ta' frott (acetone) fil-ħalq, tagħmel l-awrina aktar ta' spiss, thossok bil-għatx, titlef l-aptit, thossok imqalla' (dardir jew rimettar). Dawn jistgħu jkunu sinjali ta' kundizzjoni gravi ħafna msejja ketoacidożi. Din hi akkumulazzjoni ta' aċtu fid-demm għax il-ġisem ikun qed ikisser ix-xaħam minflok iz-zokkor. Jekk ma tikkurahiex, din tista' twassal għal koma dijabetika u eventwalment mewt.

X'għandek tagħmel jekk ikollok livell għoli ta' zokkor fid-demm

- Ittestja l-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek.
- Aġti doża ta' korrezzjoni tal-insulina jekk ġejt mġhallem kif għandek tagħmel dan.
- Ittestja l-awrina tiegħek għal ketones.
- Jekk għandek il-ketones, fittex għajnuna medika immedjatament.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellek lit-tabib, lill-ispizjar jew lill-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi effetti sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Tista' wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali imniżżla f' [Appendiċi V](#). Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista' tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta' din il-medicina.

5. Kif taħzen Fiasp

Żomm din il-medicina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-medicina wara d-data ta' meta tiskadi li tidher fuq it-tikketta u l-kartuna wara 'JIS'. Id-data ta' meta tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta' dak ix-xaħar.

Qabel ma jinfetaħ għall-ewwel darba

Aħžen fi friġġ ($2^{\circ}\text{C} - 8^{\circ}\text{C}$). Tagħmlux fil-friza. Żommu 'l bogħod mill-element li jiffriza. Żomm il-kunjett fil-kartuna sabiex tilqa' mid-dawl.

Wara li jinfetaħ għall-ewwel darba jew meta jingarr bhala sper

Tista' ġgħorr il-kunjett miegħek u żzommu f' temperatura tal-kamra (mhux aktar minn 30°C) jew fi friġġ ($2^{\circ}\text{C} - 8^{\circ}\text{C}$) sa perjodu ta' 4 ġimgħat (inkluż il-hin fir-riċipjent tal-pompa). Dejjem għandek iżżomm il-kunjett fil-kartuna sabiex tilqa' mid-dawl.

Tarmix medicini mal-ilma tad-dranagġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispizjar tiegħek dwar kif għandek tarmi medicini li m'għadexx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X'fih Fiasp

- Is-sustanza attiva hi insulina aspart. Millilitru ta' soluzzjoni fih 100 unità ta' insulina aspart. Kull kunjett fih 1,000 unità ta' insulina aspart f' soluzzjoni ta' 10 mL.
- Is-sustanzi l-oħra huma phenol, metacresol, glycerol, zinc acetate, disodium phosphate dihydrate, arginine hydrochloride, nicotinamide (vitamin B₃), hydrochloric acid (għall-aġġustament tal-pH), sodium hydroxide (għall-aġġustament tal-pH) (ara t-tmiem ta' sezzjoni 2 taħt 'Tagħrif importanti dwar xi ingredjenti fi Fiasp') u l-ilma għall-injezzjonijiet.

Kif jidher Fiasp u l-kontenut tal-pakkett

Fiasp hu ppreżentat bhala soluzzjoni ċara, bla kulur u akweja għall-injezzjoni f' kunjett.

Kull kunjett fih 10 mL ta' soluzzjoni.

Daqsijiet tal-pakkett ta' 1, 5 jew pakkett multiplu b'5 x (1 x 10 mL) kunjetti. Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq u l-Manifattur
Novo Nordisk A/S,
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd, Id-Danimarka

Dan il-fuljett kien rivedut l-ahhar f'

Sorsi oħra ta' informazzjoni

Informazzjoni dettaljata dwar din il-medicina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Medicini: <http://www.ema.europa.eu>.

Fuljett ta' taghrif: Informazzjoni għall-pazjent

Fiasp 100 unità/mL PumpCart soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ insulina aspart

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-medicina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib, lill-ispizjar jew lill-infermier tiegħek.
- Din il-medicina għet mogħtija lilek biss. M'għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista' tagħmlilhom il-ħsara anke jekk għandhom l-istess sinjali ta' mard bħal tiegħek.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib, lill-ispizjar jew lill-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi effetti sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F'dan il-fuljett

1. X'inhu Fiasp u għalxiex jintuża
2. X'għandek tkun taf qabel ma tuża Fiasp
3. Kif għandek tuża Fiasp
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif taħżen Fiasp
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1. X'inhu Fiasp u għalxiex jintuża

Fiasp hu insulina li jaħdem malajr biex ibaxxi z-zokkor fid-demm. Fiasp hu soluzzjoni għall-injezzjoni li fih insulina aspart u li jintuża għall-kura tad-dijabete mellitus fl-adulti, fl-adolesxenti u tfal minn sena 'l fuq. Id-dijabete hija marda fejn il-ġisem tiegħek ma jagħmilx biżżejjed insulina biex jikkontrolla l-livell taz-zokkor fid-demm. Kura b'Fiasp tgħin biex tippreveni komplikazzjonijiet mid-dijabete tiegħek.

Dwar PumpCart

L-iskartoċċ PumpCart jintuża ma' pompa tal-insulina magħmula għall-użu ma' dan l-iskartoċċ:

- Tajjeb biex jipprovdielek għall-ħtiġijiet kollha tiegħek ta' kuljum ta' insulina – kemm il-ħtiġijiet tal-insulina tiegħek tul il-ġurnata (bażali) u kemm ta' mal-ħin tal-ikel (bolus).
- Qabel ma tuża skartoċċ PumpCart fil-pompa, it-tabib jew l-infermier tiegħek iridu jkun tawk istruzzjonijiet dettalljati.

ħtiġijiet ta' insulina tul il-ġurnata (bażali):

Meta tuża Fiasp f'pompa, l-insulina tiegħek se tingħata b'mod kontinwu fil-ġisem tiegħek.

- Din tipprovdi għall-ħtiġijiet tiegħek tul il-ġurnata.
- Qabel ma tissettja jew tiddel ir-rata ta' tul il-ġurnata (bażali), aqra sew il-manwal tal-pompa (il-gwida għall-utent).
- Jekk twaqqaf il-pompa, kun af li l-effett tal-insulina se jonqos b'mod gradwali fuq medda ta' 3 sa 5 sigħat

ħtiġijiet ta' insulina waqt il-ħin tal-ikel (bolus) :

- Ħu l-insulina tiegħek ta' waqt il-ħin tal-ikel 2 minuti qabel tibda l-ikla, bl-għażla li teħodha sa 20 minuta wara li bdejt l-ikla (ara sezzjoni 3, Kif għandek tuża Fiasp).
- L-effett massimu jseħħ bejn 1 u 3 sigħat wara l-ġhota ta' waqt il-ħin tal-ikel.
- L-effett idum għal 3 sa 5 sigħat.

2. X'għandek tkun taf qabel ma tuża Fiasp

Tużax Fiasp

- jekk inti allergiku għall-insulina aspart jew għal xi sustanza oħra ta' din il-medicina (imniżżla fis-sezzjoni 6).

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib, lill-ispizjar jew lill-infermier tiegħek qabel tuża Fiasp. Fuq kollox oqghod attent għal dawn li ġejjin:

- Livell baxx ta' zokkor fid-demmm (ipoglicemija) – Jekk il-livell taz-zokkor fid-demmm tiegħek ikun baxx wisq, segwi l-gwida ta' kif għandek tagħmel meta jkollok livell baxx ta' zokkor fid-demmm f' sezzjoni 4 'Effetti sekondarji possibbli'. Fiasp jibda jbaxxi z-zokkor fid-demmm aktar malajr meta mqabbel ma' insulini oħrajn li jaħdmu malajr. Jekk issehħ l-ipoglicemija, inti jista' jkollok din il-kundizzjoni aktar malajr wara injezzjoni b'Fiasp.
- Livell għoli ta' zokkor fid-demmm (iperglicemija) – Jekk il-livell taz-zokkor fid-demmm tiegħek ikun għoli wisq, segwi l-gwida ta' kif għandek tagħmel meta jkollok livell għoli ta' zokkor fid-demmm f' sezzjoni 4 'Effetti sekondarji possibbli'.

Meta tbidel minn prodotti mediċinali oħra tal-insulina – It-tabib tiegħek jista' jkollu bżonn jagħtik xi parir dwar id-doża tal-insulina tiegħek.

- Jekk it-trattament tiegħek bl-insulina qed jiġi mogħti flimkien ma' pioglitazone (medicina orali kontra d-dijabete użata fit-trattament tad-dijabete mellitus tip 2) – . Għid lit-tabib tiegħek mill-aktar fis jekk ikollok xi sinjali ta' insufficjenza tal-qalb bħal qtugħ ta' nifs mhux tas-soltu jew zieda ta' malajr fil-piż jew xi nefha lokalizzata minhabba żamma ta' fluwidi (edima).
- Disturbi fl-għajnejn – Id-disturb fl-għajnejn minhabba d-dijabete bħal retinopatija diabetika jista' b'mod temporanju jmur għall-agħar jekk it-titjib fil-kontroll taz-zokkor fid-demmm isir b'rata mgħaġġla.
- Ugiġħ minhabba ħsara fin-nervituri – Jekk il-livell taz-zokkor fid-demmm tiegħek jitjieb b'rata mgħaġġla ħafna, jista' jkollok ugiġħ relatat man-nervituri, li normalment ikun temporanju.
- Nefha madwar il-ġogi tiegħek – Meta tibda tuża l-medicina tiegħek għall-ewwel darba, ġismek jista' jżomm aktar ilma milli suppost. Dan jikkawża nefha madwar l-għekiesi tiegħek u ġogi oħrajn. Dan normalment ma jdumx għal tul ta' żmien.
- Aċċerta ruħek li qed/a tuża t-tip it-tajjeb t'insulina – dejjem iċċekkja t-tiketta tal-insulina qabel kull injezzjoni sabiex tevita t-taħlit b'mod aċċidentali bejn prodotti tal-insulina.
- It-trattament bl-insulina jista' jikkawża l-ġisem jipproduċi antikorpi għall-insulina (sustanza li taħdem kontra l-insulina). Madankollu, f'każijiet rari ħafna, din se tikkawża xi tibdil fid-doża tiegħek tal-insulina.

Jekk għandek vista batuta, jekk jogħġbok ara sezzjoni 3 'Kif għandek tuża Fiasp'.

Xi kundizzjonijiet u attivitajiet jistgħu jaffettwaw kemm għandek bżonn insulina. Kellem lit-tabib tiegħek:

- jekk għandek problemi tal-kliewi jew tal-fwied, jew tal-glandola adrenali, pitwitarja jew tat-tirojde.
- jekk qed tagħmel iktar eżerċizzju mis-soltu jew jekk trid tiddel id-dieta normali tiegħek, għax dan jista' jkollu effett fuq il-livell taz-zokkor fid-demmm tiegħek.
- jekk inti marid, kompli hu l-insulina tiegħek u kellem lit-tabib tiegħek.
- Jekk se ssiefer, l-ivvjagġar bejn żoni differenti ta' hin jista' jaffettwa l-htigijiet tiegħek tal-insulina u l-hin meta tiehu l-injezzjonijiet.

Huwa rrakkomandat ħafna li meta jkun qed jintuża Fiasp, jitniżżel l-isem u n-numru tal-lott ta' kull pakkett sabiex wiehed ikun jaf liema lott ikun intuża.

Fiasp PumpCart huwa għall-użu biss ma' sistemi ta' pompi għall-infuzjoni tal-insulina li ġejjin; il-pompi tal-insulina Accu-Chek Insight u YpsoPump. M'għandux jintuża ma' xi pompi oħra, għax dawn jistgħu jagħtuk doża ħażina tal-insulina tiegħek u li jistgħu jwasslu għal livell għoli jew baxx ta' zokkor fid-demmm.

Bidliet fil-ġilda fis-sit tal-injezzjoni

Is-sit tal-injezzjoni għandu jinbidel kull darba sabiex jgħin biex jiġu evitati bidliet fit-tessut xaħmi ta' taħt il-ġilda, bħal li tiħxien il-ġilda, tiċkien il-ġilda jew boċċi taħt il-ġilda. L-insulina tista' ma taħdimx

tajjeb hafna jekk tinjetta f'zona bil-boċċi, li ċkienet jew li ħxienet (ara sezzjoni 3 'Kif għandek tuża Fiasp'). Għid lit-tabib tiegħek jekk tinduna b'xi bidliet fil-ġilda fis-sit tal-injezzjoni. Għid lit-tabib tiegħek jekk bħalissa qed tinjetta f'dawn iż-żoni affettwati qabel ma tibda tinjetta f'parti differenti. It-tabib tiegħek jista' jgħidlek biex tiċċekkja aktar mill-qrib iż-zokkor fid-demm tiegħek, u biex taġġusta d-doża tal-insulina jew tal-medikazzjonijiet antidijabetiċi l-oħra tiegħek.

Tfal u adolexxenti

Din il-medicina mhix irrakkomandata għall-użu fit-tfal taħt l-età ta' sena.

Mediċini oħra u Fiasp

Għid lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek jekk qed tiehu, ħadt dan l-aħħar jew tista' tiehu xi mediċini oħra. Xi mediċini jaffettwaw il-livell ta' zokkor fid-demm tiegħek – dan jista' jfisser li d-doża tal-insulina tiegħek trid tinbidel.

Hawn taħt hawn elenkati l-iktar mediċini komuni li jistgħu jaffettwaw il-kura tiegħek bl-insulina.

Il-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek jista' jaqa' (ipoglicemija) jekk tiehu:

- mediċini oħra għall-kura tad-dijabete (orali jew li jistgħu jiġu injettati)
- antibijotiċi ta' sulphonamides (użati għat-trattament ta' infezzjonijiet)
- steroidi anaboliċi (bħal testosterone)
- imblokkaturi tar-riċetturi beta (użati fil-trattament tal-pressjoni għolja fid-demm jew l-anġina)
- salicylates (użati biex itaffu l-uġiġh u jnaqqsu d-deni)
- inibituri ta' monoamine oxidase (MAOI) (użati għat-trattament tad-dipressjoni)
- inibituri tal-enzima li tikkonverti angiotensin (ACE) (għal xi problemi tal-qalb jew ta' pressjoni għolja fid-demm).

Il-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek jista' jogħla (iperglycemija) jekk tiehu:

- danazol (medicina li taħdem fl-ovulazzjoni)
- kontraċettivi li jittieħdu mill-ħalq (pilloli li jikkontrollaw biex ma tinqabadx tqila)
- ormoni tat-tirojde (għal problemi fil-glandola tat-tirojde)
- ormon tat-tkabbir (għal deficijenza ta' ormon tat-tkabbir)
- glukokortikoidi (bħal 'cortisone' għall-infjammazzjoni)
- simpatomimetici (bħal epinephrine (adrenaline), salbutamol jew terbutaline għall-ażżma)
- thiazides (għall-pessjoni għolja fid-demm jew jekk il-ġisem tiegħek ikun qed iżomm ilma żżejjed (żamma ta' ilma)).

Octreotide u lanreotide – użati għat-trattament ta' kundizzjoni rari fejn ikun hemm ammont eċċessiv ta' ormon ta' tkabbir (akromegalija). Dawn jistgħu kemm iżidulek kif ukoll inaqqsu le l-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek.

Jekk xi waħda minn dawn t'hawn fuq tapplika għalik (jew jekk m'intix ċert), kellek lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

Fiasp mal-alkohol

Jekk tixrob l-alkohol, il-ħtieġa tiegħek għall-insulina tista' tinbidel hekk kif il-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek jista' jitla' jew jinzel. Għalhekk għandek timmonitorja l-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek aktar ta' spiss mis-soltu.

Tqala u treddigh

Jekk inti tqila, taħseb li tista tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir tat-tabib tiegħek qabel tiehu din il-medicina. Din il-medicina tista' tintuża waqt it-tqala; madankollu jista' jkun hemm il-bżonn li tinbidel id-doża tal-insulina tiegħek waqt it-tqala u wara l-ħlas. Hafna drabi l-ammont t'insulina li għandek bżonn waqt l-ewwel tliet xhur ta' tqala jonqos u jizdied għall-kumpliment tas-sitt xhur. Il-kontroll bil-għaqal tad-dijabete tiegħek hu meħtieġ waqt it-tqala. Il-prevenzjoni ta' livell baxx ta' zokkor fid-demm (ipoglicemija) hu partikularment importanti għas-saħħa tat-tarbija tiegħek. Wara li jkollok it-tarbija, il-probabbiltà hi li l-ħtiġijiet tiegħek tal-insulina jerggħu jirritornaw għal kemm kellek bżonn qabel it-tqala.

M'hemm ebda restrizzjonijiet għat-trattament b'Fiasp waqt it-treddigh.

Sewqan u thaddim ta' magni

Jekk il-livell ta' zokkor fid-demmm tiegħek ikun baxx dan jista' jaffettwa l-ħila li ssuq jew tuża kwalunkwe għodod jew magni. Jekk il-livell ta' zokkor fid-demmm tiegħek ikun baxx, il-koncentrazzjoni u l-abbiltà tiegħek biex tirreagixxi jistgħu jiġu affettwati. Dan jista' jkun perikoluż għalik u għal haddieħor. Staqsi lit-tabib tiegħek jekk tistax issuq jekk:

- ta' spiss ikollok livell baxx ta' zokkor fid-demmm
- issibha diffiċli biex tinduna li għandek livell baxx ta' zokkor fid-demmm.

Tagħrif importanti dwar xi ingredjenti fi Fiasp

Din il-medicina fiha anqas minn mmol 1 ta' sodium (23 mg) f'kull doża, jiġifieri tista' tghid essenzjalment 'ħielsa mis-sodium'.

3. Kif għandek tuża Fiasp

Jekk inti persuna għanja jew għandek vista batuta u ma tistax taqra l-iskrin tal-pompa, tużax din il-pompa mingħajr għajnuna. Fittex għajnuna mingħand persuna li għandha vista tajba u li hija mharrġa fl-użu tal-pompa.

Doża u meta għandek tuża Fiasp

Dejjem uża l-insulina tiegħek u aġġusta d-doži ta' tul il-ġurnata (bażali) u ta' matul il-ħin tal-ikel (bolus) eżatt kif qallek it-tabib tiegħek. Iċċekkja mat-tabib, ners jew spizjar jekk m'intix ċert.

- Aġġusta l-insulina tiegħek ta' matul l-ikel (bolus) skont kif jiġik ir-riżultat tat-test taz-zokkor fid-demmm u l-ikel li tiekol.

Adulti

Id-doži ta' Fiasp waqt il-ħin tal-ikel għandhom jittieħdu eżatt qabel (0-2 minuti) il-bidu tal-ikla, bl-għażla li jittieħdu sa 20 minuta wara li tibda l-ikla.

Tfal

Id-doži ta' Fiasp waqt il-ħin tal-ikel għandhom jittieħdu eżatt qabel (0-2 minuti) il-bidu tal-ikla, bl-għażla li jittieħdu sa 20 minuta wara li tibda l-ikla f'sitwazzjonijiet, fejn m'hemmx ċertezza dwar meta t-tifel/tifla se jiekol. F'dawn is-sitwazzjonijiet saqsi lit-tabib tiegħek għall-parir.

Jekk trid tibdel id-dieta tiegħek tas-soltu, iċċekkja l-ewwel mat-tabib, ners jew spizjar għax bidla fid-dieta tista' tibdel il-ħtieġa tiegħek tal-insulina.

Meta tkun qed/a tuża medicini oħra, saqsi lit-tabib tiegħek jekk ikunx hemm bżonn ta' aġġustament fit-trattament tiegħek.

Użu f'pazjenti anzjani (65 sena jew aktar)

Din il-medicina tista' tintuża f'pazjenti anzjani. Kellem lit-tabib tiegħek dwar tibdil fid-doża tiegħek.

Jekk għandek problemi tal-kliewi jew tal-fwied

Jekk għandek problemi tal-kliewi jew tal-fwied, jista' jkollok bżonn tiċċekkja l-livell ta' zokkor fid-demmm tiegħek b'mod aktar regolari. Kellem lit-tabib tiegħek dwar tibdil fid-doża tiegħek.

Kif tinjetta Fiasp

Din il-medicina hija tajba biss għall-injezzjoni taħt il-ġilda (injezzjoni subkutanja). Uża biss pompa li hi magħmula biex tintuża ma' dan l-iskartoċċ.

- Qabel ma tuża l-iskartoċċ PumpCart fil-pompa, it-tabib jew in-ners tiegħek iridu jkun tawk istruzzjonijiet dettalljati.
- Kellem lit-tabib tiegħek jekk ikollok bżonn tinjetta l-insulina tiegħek permezz ta' metodu ieħor.

Fejn ghandek tagħmel l-injezzjoni

- Normalment se tinjetta l-insulina tiegħek fin-naħa ta' quddiem ta' qaddek (iż-żaqq). Madankollu, taħt ir-rakkomandazzjoni tat-tabib tiegħek, tista' tuża n-naħa ta' fuq ta' dirgħajk.
- Tinjettax ġo vina jew ġo muskolu.
- Meta tibdel is-sett ta' infużjoni (pajp u labra), kun ċert li tibdel fejn iddahhal il-labra. Dan jista' jnaqqas ir-riskju li tiżviluppa bidliet taħt il-ġilda (ara sezzjoni 4 'Effetti sekondarji possibbli').

Tużax Fiasp

- jekk l-iskartoċċ jew l-apparat li qed tuża li fih l-iskartoċċ twaqqa', jkollu l-ħsara jew tgħaffeg. Ħudu lura mingħand min xtrajtu.
- jekk l-iskartoċċ ma jkunx inħażen kif suppost (ara sezzjoni 5 'Kif taħzen Fiasp').
- jekk l-insulina ma tidhirx ċara (eż. tidher imċajpra) u bla kulur.

Istruzzjonijiet dettalljati dwar kif tuża l-PumpCart tiegħek huma pprovduti fuq in-naħa l-oħra ta' dan il-fuljett.

Kif tinjetta Fiasp

- Aqra u segwi l-manwal tal-pompa (gwiċa għall-utent) li jiġi mal-pompa tal-insulina tiegħek.
- Kun ċert li tuża sett ta' infużjoni (pajpijiet u labra) adattati għall-pompa tal-insulina tiegħek.
- Iċċekkja l-isem u l-qawwa fuq it-tikketta tal-iskartoċċ (PumpCart) biex taċċerta ruhek li hi Fiasp.
- M'għandekx taqsam ma' oħrajn is-sett ta' infużjoni (pajpijiet u labra) u l-iskartoċċ PumpCart .
- It-tibdil tas-sett tal-infużjoni (pajpijiet u labra) għandu jsir skont l-istruzzjonijiet fl-informazzjoni tal-prodott ipprovdut mas-sett tal-infużjoni.

X'għandek tagħmel jekk is-sistema tal-pompa ma taħdimx

Għandek dejjem ikollok metodu alternattiv ta' għoti tal-insulina fejn tkun tista' tinjetta minn taħt il-ġilda (per eżempju, injettur ta' pinna jew siringi) f'każ li s-sistema tal-pompa ma taħdimx.

Jekk tuża Fiasp aktar milli suppost

Jekk tuża żżejjed insulina, il-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek jista' jitbaxxa żżejjed (ipoglicemija); ara l-parir f'sezzjoni 4 taħt 'Livell baxx ta' zokkor fid-demm'.

Jekk tinsa tuża Fiasp

Jekk tinsa tuża l-insulina tiegħek, iz-zokkor fid-demm tiegħek jista' jogħla wisq (iperglicemija). Ara sezzjoni 4 taħt 'Livell għoli ta' zokkor fid-demm'.

Tliet passi sempliċi li jistgħu jgħinu sabiex jiġi evitat livell baxx jew għoli ta' zokkor fid-demm huma:

- Dejjem żomm skrataċ żejda ta' Fiasp fuqek.
- Dejjem żomm xi haġa fuqek li turi li għandek id-dijabete.
- Dejjem żomm fuqek prodotti li jkun fihom iz-zokkor. Ara sezzjoni 4 taħt 'X'għandek tagħmel jekk ikollok livell baxx ta' zokkor fid-demm'.

Jekk tieqaf tuża Fiasp

Tiqafx tuża l-insulina tiegħek mingħajr ma l-ewwel titkellem mat-tabib tiegħek. Jekk tieqaf tuża l-insulina tiegħek, dan jista' jwassal għal livell għoli ħafna ta' zokkor fid-demm (iperglicemija severa) u ketoacidożi (kundizzjoni fejn ikun hemm wisq aċtu fid-demm, li hu potenzjalment ta' periklu għall-ħajja). Ara s-sintomi u l-pariri f'sezzjoni 4 taħt 'Livell għoli ta' zokkor fid-demm'.

4. Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull medicina oħra, din il-medicina tista' tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f'kulhadd.

Livell baxx ta' zokkor fid-demm (ipoglicemija) huwa komuni hafna b'kura bl-insulina (jista' jaffettwa aktar minn persuna 1 minn kull 10). Jista' jkun serju hafna. Jekk il-livell taz-zokkor fid-demm jinzel wisq, inti tista' tintilef minn sensik. Ipoglicemija serja tista' tikkawza hsara fil-mohh u tista' tkun ta' periklu għall-hajja. Jekk għandek sintomi ta' livell baxx ta' zokkor fid-demm, hu passi **minnufih** biex iżżid il-livell taz-zokkor fid-demm. Ara l-parir taht 'Livell baxx ta' zokkor fid-demm' aktar 'l isfel.

Jekk ikollok reazzjoni allergika serja (inkluż xokk anafilattiku) għall-insulina jew għal xi wiehed mis-sustanzi fi Fiasp (kemm dan isehh ta' spiss mhuwiex magħruf), ieqaf uza din il-medicina u għamel kuntatt minnufih mas-servizz tal-emergenza medika.

Is-sinjali ta' reazzjoni allergika serja jistgħu jinkludu:

- reazzjonijiet lokali (eż., raxx, hmura u ħakk) li jinfirxu għal partijiet oħra ta' gismek
- f'daqqa waħda ma thossokx tajjeb u tibda tegħreq
- tibda tiddardar (rimettar)
- ikollok diffikultà biex tieħu n-nifs
- ikollok taħbit tal-qalb mgħaġġel jew thossok stordut.

Reazzjonijiet allergici bħal raxx tal-gilda generalizzat u nefha fil-wicc jistgħu jsehhu. Dawn mhumiex komuni u jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 100. Fittex tabib jekk is-sintomi jmorru għall-agħar jew ma tarax titjib wara xi ftit ġimgħat.

Bidliet fil-gilda fis-sit tal-injezzjoni: Jekk tinjetta insulina fl-istess post, it-tessut xaħmi jista' jew jiċkien (lipoatrofija) jew jihxien (lipoipetrofija) (dawn mhumiex komuni u jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 100). Boċci taht il-gilda jistgħu jiġu kkawzati wkoll minn akkumulazzjoni ta' proteina msejha amilojdi (amilojdozi tal-gilda; il-frekwenza ta' kemm din is-sehh mhijiex magħrufa). L-insulina tista' ma taħdimx tajjeb hafna jekk tinjetta f'zona bil-boċci, li ċkienet jew li ħxienet. Ibdel is-sit tal-injezzjoni ma' kull injezzjoni biex tgħin fil-prevenzjoni ta' dawn il-bidliet fil-gilda.

Effetti sekondarji oħra jinkludu:

Komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 10)

Reazzjoni fis-sit mnejn jingħata: Reazzjonijiet lokali jistgħu jsehhu fil-post fejn tinjetta lilek innifsek.

Is-sinjali jistgħu jinkludu: raxx, hmura, infjammazzjoni, tbenġil, irritazzjoni, ugiġh u ħakk.

Normalment dawn ir-reazzjonijiet imorru wara ftit jiem.

Reazzjonijiet tal-gilda: Sinjali ta' allergija fuq il-gilda bħal ekzema, raxx, ħakk, urtikarja u dermatite jistgħu jsehhu.

Effetti ġenerali mit-trattament bl-insulina inkluż Fiasp

- **Livell baxx ta' zokkor fid-demm (ipoglicemija)** (komuni hafna)

Livell baxx ta' zokkor fid-demm jista' jsehħ jekk inti:

Tixrob l-alkohol; tinjetta zżejjed insulina; tagħmel aktar eżercizzju mis-soltu; tiekol ftit wisq jew taqbeż xi ikla.

Sinjali ta' twissija ta' livell baxx ta' zokkor fid-demm – dawn jistgħu jiġu f'daqqa:

Ugiġh ta' ras, diskors ma jiftiehemx, taħbit tal-qalb mgħaġġel, għaraq kiesaħ, gilda kiesha u pallida, thossok imdardar, thossok bil-ġuħ hafna, rogħda jew thossok nervuż jew inkwetat, thoss għeja, dgħufija jew ikollok ngħas mhux tas-soltu, thossok konfuż, diffikultà biex tikkoncentra tibdil temporanju fil-vista.

X'għandek tagħmel jekk ikollok livell baxx ta' zokkor fid-demm

- Jekk inti konxju, ikkura minnufih il-livell baxx ta' zokkor fid-demm permezz ta' 15-20 g ta' karboidrat li jaġixxi b'mod mgħaġġel; kul pilloli tal-glukosju jew ikla oħra hafifa b'hafna zokkor, bħal meraq tal-frott, helu jew biskuttini (dejjem gorr mieghek pilloli tal-glukosju jew ikla hafifa b'hafna zokkor, għal li jista' jkun).

- Huwa rakkomandat li terġa' tiċċekkja l-livelli taz-zokkor fid-demm tiegħek wara 15-20 minuta u terġa' tieħu l-kura jekk il-livelli taz-zokkor fid-demm tiegħek għadhom inqas minn 4 mmol/L.
- Stenna sakemm is-sinjali ta' livell baxx ta' zokkor fid-demm ma jibqgħux jidhru jew meta l-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek ikun ġie lura għan-normal. Imbagħad kompli hu l-kura bl-insulina tiegħek bħas-soltu.

X'għandhom ikunu jafu persuni ohrajn jekk iħossok ħażin

Għid lill-persuni kollha li tqatta' ż-żmien magħhom li għandek id-dijabete. Għidilhom x'jista' jġri meta l-livell ta' zokkor fid-demm tiegħek jitbaxxa żżejjed, inkluż ir-riskju li jista' jtik ħass ħażin.

Għidilhom li jekk iħossok ħażin, huma jridu:

- idawruk fuq ġenbek biex tevita li tifga
- iġibu għajjnuna medika minnufih
- **ma jtukx** l-ebda ikel jew xorb, għax tista' tifga.

Meta tintilef minn sensik tista' tirkupra aktar malajr b'injezzjoni ta' glucagon. Dan jista' jingħata biss minn xi hadd li jaf jużah.

- Jekk tingħata glucagon, se jkollok bżonn tieħu z-zokkor jew xi haġa ħafifa b'ħafna zokkor malli tiġi f'sensik.
- Jekk ma tirrispondix għall-kura b'injezzjoni ta' glucagon, se jkollok bżonn tiġi kkurat fi sptar.

Jekk livell baxx ħafna ta' zokkor ma jġix ikkurat, maż-żmien jista' jikkawża ħsara fil-moħħ. Dan jista' jdum għal ftit żmien jew idum ħafna. Jista' wkoll jikkawża l-mewt.

Kellem lit-tabib tiegħek jekk:

- il-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek tbaxxa tant li ħassek ħażin
- ingħatajt injezzjoni ta' glucagon
- kellek livell baxx iżżejjed ta' zokkor fid-demm għal ftit drabi dan l-aħħar.

Dan hu għax id-dożagġ jew il-ħin ta' meta tieħu l-injezzjonijiet tal-insulina, l-ikel jew l-eżerċizzju, jista' jkollhom bżonn jinbidlu.

- ***Livell għoli ta' zokkor fid-demm (iperglicemija)***

Livell għoli ta' zokkor fid-demm jista' jseħh jekk inti:

Tiekol aktar jew tagħmel inqas eżerċizzju mis-soltu; tixrob l-alkoħol; ikollok infezzjoni jew deni; ma tużax insulina biżżejjed; tieħu inqas insulina milli għandek bżonn ripetutament; tinsa tieħu l-insulina jew tieqaf tieħu l-insulina.

Sinjali ta' twissija ta' livell għoli ta' zokkor fid-demm – dawn normalment jidhru gradwalment:

Ħmura fil-wieċ, ġilda xotta, thossok bi nġhas jew għajjen, ħalq xott, riħa ta' frott (acetone) fil-ħalq, tagħmel l-awrina aktar ta' spiss, thossok bil-għatx, titlef l-aptit, thossok imqalla' (dardir jew rimettar). Dawn jistgħu jkunu sinjali ta' kundizzjoni gravi ħafna msejha ketoacidożi. Din hi akkumulazzjoni ta' aċtu fid-demm għax il-ġisem ikun qed ikisser ix-xaham minflok iz-zokkor. Jekk ma tikkurahiex, din tista' twassal għal koma dijabetika u eventwalment mewt.

X'għandek tagħmel jekk ikollok livell għoli ta' zokkor fid-demm

- Ittestja l-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek.
- Agħti doża ta' korrezzjoni tal-insulina jekk ġejt mgħallem kif għandek tagħmel dan.
- Ittestja l-awrina tiegħek għal ketones.
- Jekk għandek il-ketones, fittex għajjnuna medika immedjatament.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib, lill-ispizjar jew lill-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi effetti sekondarji possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Tista' wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali imniżżla f' [Appendiċi V](#). Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista' tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta' din il-medicina.

5. Kif taħzen Fiasp

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta' meta tiskadi li tidher fuq it-tikketta u l-kartuna wara 'JIS'. Id-data ta' meta tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta' dak ix-xahar.

Qabel ma jinfetaħ għall-ewwel darba

Aħżen fi friġġ (2°C – 8°C). Tagħmlux fil-friża. Żommu 'l bogħod mill-element li jiffriża. Żomm l-iskartoċċ fil-kartuna ta' barra sabiex tilqa' mid-dawl.

Wara li jinfetaħ għall-ewwel darba jew meta jingarr bhala sper

- Tagħmlux fil-friġġ waqt l-użu
- Tista' żżomm l-iskartoċċ (PumpCart) tiegħek fit-temperatura tal-kamra (mhux aktar minn 30°C) sa perjodu ta' ġimagħtejn.
- Wara dan il-perjodu, jista' jintuża sa 7 ijiem taħt 37°C f'pompa magħmula għall-użu ma' dan l-iskartoċċ.
- Żomm l-iskartoċċ PumpCart fil-kartuna ta' barra sakemm jintuża sabiex tiprotegħih minn xi ħsara. Waqt l-użu dejjem żomm l-iskartoċċ 'il bogħod mid-dawl.

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispizjar tiegħek dwar kif għandek tarmi mediċini li m'għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X'fih Fiasp

- Is-sustanza attiva hi insulina aspart. Millilitru ta' soluzzjoni fih 100 unità ta' insulina aspart. Kull skartoċċ fih 160 unità ta' insulina aspart f'soluzzjoni ta' 1.6 mL.
- Is-sustanzi l-oħra huma phenol, metacresol, glycerol, zinc acetate, disodium phosphate dihydrate, arginine hydrochloride, nicotinamide (vitamin B₃), hydrochloric acid (għall-aġġustament tal-pH), sodium hydroxide (għall-aġġustament tal-pH) (ara t-tmiem ta' sezzjoni 2 taħt 'Tagħrif importanti dwar xi ingredjenti fi Fiasp') u l-ilma għall-injezzjonijiet.

Kif jidher Fiasp u l-kontenut tal-pakkett

Fiasp hu pprezentat bhala soluzzjoni ċara, bla kulur u akweja għall-injezzjoni fi skartoċċ.

Daqsijiet tal-pakketti ta' 5 jew pakkett multiplu b'25 (5 pakketti ta' 5) skartoċċ ta' 1.6 mL. Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u l-Manifattur

Novo Nordisk A/S,
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd, Id-Danimarka

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f'

Sorsi oħra ta' informazzjoni

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini: <http://www.ema.europa.eu>.

Istruzzjonijiet dwar kif għandek tuża l-iskartoċċ mimli għal-lest Fiasp PumpCart.


Fiasp PumpCart għandu jintuża biss ma' sistema ta' pompa għall-infużjoni tal-insulina magħmula biex tintuża ma' dan l-iskartoċċ, bħall-pompi tal-insulina Accu-Chek Insight u YpsoPump.

- Tużax ma' apparat ieħor li mhuwiex magħmul għall-iskartoċċ PumpCart.
- Dan għaliex jista' jirriżulta dożaġġ mhux korrett tal-insulina u li jista' jikkawża livell għoli ta' zokkor fid-demm (iperglicemija) jew livell baxx ta' zokkor fid-demm (ipoglicemija).

Jekk jogħġbok aqra sew dawn l-istruzzjonijiet qabel tuża l-iskartoċċ PumpCart tiegħek.

Jekk jogħġbok aqra wkoll il-manwal tal-pompa (gwiċċ għall-utent) li jiġi mal-pompa tal-insulina.

- L-iskartoċċ PumpCart huwa lest għall-użu direttament fil-pompa.
- L-iskartoċċ PumpCart fih 1.6 mL soluzzjoni ta' insulin aspart, ekwivalenti għal 160 unità.
- Qatt m'għandek tħallat ma' ebda prodott mediċinali ieħor.
- Terġax timla mill-ġdid l-iskartoċċ PumpCart. Ladarba jkun vojta, irid jintrema.
- Kun ċert li dejjem għandek skartoċċ PumpCart sper disponibbli.
- Tużax l-iskartoċċ PumpCart f'pinna tal-insulina, għax dan jista' jirriżulta f' dożaġġ li ma jkunx korrett.
- Waqt il-ħażna u l-użu, ipprotegi l-iskartoċċ PumpCart mid-dawl u s-sħana eċċessiva.
- Żomm l-iskartoċċ PumpCart fejn ma jistax jintlaħaq, speċjalment mit-tfal



1. Qabel ma ddaħħal skartoċċ PumpCart fil-pompa tiegħek

- Ġib l-iskartoċċ PumpCart għat-temperatura tal-kamra.
- Ohroġ l-iskartoċċ PumpCart minn ġol-kartun tagħha u minn ġol-folja.
- Iċċekkja t-tikketta biex tkun ċert li huwa skartoċċ Fiasp PumpCart.
- Iċċekkja d-data ta' skadenza- li qeda fuq it-tikketta u fuq il-kartuna.
- Dejjem iċċekkja li l-iskartoċċ PumpCart jidher kif għandu jkun (stampa A). **Tużahx** jekk tara xi ħsara jew qed jitlef xi likwidu jew jekk il-planger mexxa u tkun tista' tara l-qieġ tal-planger minn fuq il-fass abjad ta' tikketta. Dan jista' jkun minħabba xi telf ta' insulina mill-iskartoċċ. Fl-istampa A il-qieġ tal-planger ma jidherx minn wara l-fass abjad ta' tikketta kif għandu jkun. Jekk taħseb li l-iskartoċċ PumpCart għandu xi ħsara, ħudu lura minn għand min xtrajtu.

- Iċċekkja li l-insulina fl-iskartoċċ PumpCart hija ċara u mingħajr kulur. Jekk l-insulina tidher imċajpra, tużax l-iskartoċċ PumpCart. L-iskartoċċ jista' jkollu xi bżieċaq żgħar.

2. Meta ddaħħal skartoċċ Fiasp PumpCart ġdid fil-pompa tiegħek

- Segwi l-istruzzjonijiet fil-manwal għall-utent tal-pompa sabiex iddaħħal skartoċċ PumpCart ġdid fil-pompa tiegħek.
- Daħħal l-iskartoċċ PumpCart fil-kompartament tal-iskartoċċ fil-pompa. L-ewwel daħħal il-plaġer.
- Qabbad is-sett ta' infużjoni mal-iskartoċċ PumpCart billi twaħħal l-adapter fuq il-pompa tiegħek.
- Segwi l-istruzzjonijiet fil-manwal għall-utent tal-pompa sabiex tkompli tuża l-pompa tiegħek.

3. Biex tneħhi skartoċċ Fiasp PumpCart vojt mill-pompa tiegħek

- Segwi l-istruzzjonijiet fil-manwal għall-utent tal-pompa sabiex tneħhi skartoċċ PumpCart vojt mill-pompa tiegħek.
- Neħhi l-adapter tas-sett tal-infużjoni mill-iskartoċċ PumpCart vojt.
- Armi l-iskartoċċ PumpCart vojt u s-sett tal-infużjoni użat skont kif qallek it-tabib jew in-ners tiegħek.
- Segwi l-passi kif deskritti f' sezzjoni 1 u 2 sabiex tipprepara u ddaħħal skartoċċ PumpCart ġdid fil-pompa tiegħek.