

ANNESS I

SOMMARJU TAL-KARATTERISTIČI TAL-PRODOTT

1. ISEM IL-PRODOTT MEDICINALI

Lyumjev 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni f'kunjett
Lyumjev 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ
Lyumjev 100 unità/mL KwikPen soluzzjoni għall-injezzjoni f'pinna mimlija għal-lest
Lyumjev 100 unità/mL Junior KwikPen soluzzjoni għall-injezzjoni f'pinna mimlija għal-lest
Lyumjev 100 unità/mL Tempo Pen soluzzjoni għall-injezzjoni f'pinna mimlija għal-lest

2. GHAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull mL fih 100 unità ta' insulin lispro* (ekwivalenti għal 3.5 mg).

Lyumjev 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni f'kunjett

Kull kunjett fih 1000 unità ta' insulin lispro f'10 mL ta' soluzzjoni.

Lyumjev 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ

Kull skartoċċ fih 300 unità ta' insulin lispro fi 3 mL ta' soluzzjoni.

Lyumjev 100 unità/mL KwikPen soluzzjoni għall-injezzjoni f'pinna mimlija għal-lest

Lyumjev 100 unità/mL Tempo Pen soluzzjoni għall-injezzjoni f'pinna mimlija għal-lest

Kull pinna mimlija għal-lest fiha 300 unità ta' insulin lispro fi 3 mL ta' soluzzjoni.

Kull pinna mimlija għal-lest tagħti 1-60 unità f'passi ta' unità waħda f'injezzjoni waħda.

Lyumjev 100 unità/mL Junior KwikPen soluzzjoni għall-injezzjoni f'pinna mimlija għal-lest

Kull pinna mimlija għal-lest fiha 300 unità ta' insulin lispro fi 3 mL ta' soluzzjoni.

Kull Junior KwikPen tagħti 0.5 - 30 unità f'passi ta' 0.5 unità f'injezzjoni waħda.

*magħmul f'*E.coli* permezz ta' teknoloġija tat-tfassil tad-DNA.

Għal-lista shiħa ta' eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-injezzjoni.

Soluzzjoni akweja, ċara, u mingħajr kulur.

4. TAGHRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Trattament tad-dijabete mellitus fl-adulti, fl-adolesxenti u fit-tfal mill-età ta' sena u 'l fuq.

4.2 Pożoloġija u metodu ta' kif għandu jingħata

Pożoloġija

Lyumjev huwa insulina għall-injezzjoni taħt il-ġilda li jingħata f'hin l-ikel u għandu jingħata minn żero sa żewġ minuti qabel il-bidu tal-ikla, bl-għażla li jingħata sa 20 minuta wara li tkun bdiet l-ikla (ara sezzjoni 5.1).

Lyumjev 100 unità/mL huwa adattat għall-infużjoni kontinwa ta' insulina taħt il-ġilda (CSII, *continuous subcutaneous insulin infusion*) u jintuża kemm għall-htieġa ta' insulina bolus kif ukoll dik bażilari.

Id-doża inizjali għandha tikkunsidra t-tip ta' dijabete, il-piż tal-pazjent u l-livelli ta' glucose fid-demmm tagħhom.

Għandu jiġi kkunsidrat il-bidu bikri ta' azzjoni meta jiġi preskritt Lyumjev (ara sezzjoni 5.1). L-aġġustament kontinwu tad-doża ta' Lyumjev għandu jkun ibbażat fuq il-bżonnijiet metabolici tal-pazjent, ir-riżultati tal-monitoraġġ tal-glucose fid-demmm u l-mira tal-kontroll glicemiku. Jistgħu jkunu meħtieġa aġġustamenti fid-doża, meta taqleb minn insulina oħra, meta jkun hemm bidliet fl-attività fiżika, bidliet fil-prodotti mediċinali konkomitanti, bidliet fit-tehid tal-ikel (jiġifieri, ammont u tip ta' ikel, hin tal-ikel), bidliet fil-funzjoni tal-kliewi jew tal-fwied jew waqt mard akut biex jitnaqqas ir-riskju ta' ipoglicemija jew iperglicemija (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.5).

Meta taqleb minn prodott mediċinali ieħor ta' insulina li tingħata f'hin l-ikel

Jekk taqleb minn insulina oħra li tingħata f'hin l-ikel għal Lyumjev, il-bidla tista' ssir abbażi ta' unità għal unità. Il-qawwa tal-analogi tal-insulina, inkluż Lyumjev, hija espressa f'unitajiet. Unità waħda (1) ta' Lyumjev tikkorrispondi għal unità internazzjonali (IU, *international unit*) waħda ta' insulina umana jew unità waħda ta' analogi oħra tal-insulina li jahdmu malajr.

Doži maqbuża

Il-pazjenti li jinsew doża li tittiehed f'hin l-ikel għandhom jimmonitorjaw il-livell ta' glucose fid-demmm tagħhom biex jiddeċiedu jekk hijiex meħtieġa doża ta' insulina, u għandhom ikomplu bl-iskeda ta' dożaġġ tas-soltu tagħhom fl-ikla li jmiss.

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani

Is-sigurtà u l-effikaċja ta' Lyumjev ġew stabbiliti f'pazjenti anzjani b'età ta' 65 sa 75 sena. Huwa rakkomandat monitoraġġ tal-glucose mill-qrib u d-doża tal-insulina għandha tiġi aġġustata fuq bażi individwali (ara sezzjonijiet 4.8, 5.1 u 5.2). L-esperjenza terapewtika f'pazjenti b'età ta' ≥ 75 sena hija limitata.

Indeboliment tal-kliewi

Il-htieġa għall-insulina għandha mnejn tiġi mnaqqsa fil-preżenza ta' indeboliment tal-kliewi. F'pazjenti b'indeboliment tal-kliewi, il-monitoraġġ tal-glucose għandu jiġi intensifikat u d-doża għandha tiġi aġġustata fuq bażi individwali.

Indeboliment tal-fwied

Il-htieġa ta' insulina għandha mnejn tiġi mnaqqsa f'pazjenti b'indeboliment tal-fwied minhabba kapacià ta' glukoneogenezi mnaqqsa u tnaqqis fit-tkissir tal-insulina. F'pazjenti b'indeboliment tal-fwied, il-monitoraġġ tal-glucose għandu jiġi intensifikat u d-doża għandha tiġi aġġustata fuq bażi individwali.

Popolazzjoni pedjatrika

Lyumjev jista' jintuża fl-adolesxenti u fit-tfal mill-età ta' sena (ara sezzjoni 5.1). M'hemm ebda esperjenza klinika bl-użu ta' Lyumjev fit-tfal taħt l-età ta' 3 snin. Kif isir fl-adulti, id-dożaġġ għandu jiġi aġġustat fuq bażi individwali. Huwa rakkomandat li Lyumjev jingħata minn żero sa żewġ minuti

qabel ma tibda l-ikla, bil-possibbiltà li jinghata sa 20 minuta wara li tkun bdiet l-ikla meta jkun hemm il-bżonn.

Metodu ta' kif għandu jinghata

Il-pazjenti għandhom jiġu mharrġa fl-użu xieraq u t-teknika tal-injezzjoni qabel ma jibdew Lyumjev. Il-pazjenti għandhom jinghataw parir biex:

- Dejjem jiċċekkjaw it-tikketti tal-insulina qabel l-ġhoti.
- Jispezzjonaw Lyumjev viżwalment qabel l-użu u jarmuh jekk ikun hemm xi frak jew bidla fil-kulur. Siti ta' injezzjoni jew infużjoni għandhom dejjem jinbidlu fl-istess reġjun sabiex jitnaqqas ir-riskju ta' lipodistrofija u ta' amilojdożi tal-ġilda (ara sezzjoni 4.4 u 4.8).
- Iggorru metodu ta' ġhoti żejjed jew alternattiv f'każ li s-sistema tal-ġhoti tagħhom tinkiser.

Injezzjoni taht il-ġilda

Lyumjev għandu jiġi injettat taht il-ġilda fl-addome, fil-parti ta' fuq tad-driegħ, fil-koxxa jew fil-warrani (ara sezzjoni 5.2).

Ġeneralment Lyumjev għandu jintuża flimkien ma' insulina li taħdem għal żmien intermedju jew fit-tul. Għandu jintuża sit differenti għall-injezzjoni jekk tkun qed tinjetta insulina oħra fl-istess hin.

Meta tinjetta m'għandekx tidhol f'kanal tad-demem.

L-apparati għandhom jintremew jekk xi parti tidher miksura jew bil-ħsara.

Il-labra għandha tintrema wara kull injezzjoni.

Kunjetti Lyumjev

Jekk ikun meħtieġ ġhoti taht il-ġilda permezz ta' siringa, għandu jintuża kunjett.

Is-siringa għandu jkollha marki ta' 100 unità/mL.

Pazjenti li jużaw il-kunjetti m'għandhom qatt jaqsmu labar jew siringi.

Skrataċ Lyumjev

Lyumjev fi skrataċ huwa adattat biss għall-injezzjonijiet taht il-ġilda permezz ta' pinna Lilly li tista' terġa' tintuża.

Skrataċ Lyumjev m'għandhomx jintużaw ma' xi pinna oħra li tista' terġa' tintuża peress li l-preċiżjoni tad-dożaġġ ma ġiex stabbilit b'pinen oħra.

Għandhom jiġu segwiti l-istruzzjonijiet għal kull pinna individwali għat-tqegħid tal-iskartoċċ, it-twaħħil tal-labra u l-ġhoti tal-injezzjoni tal-insulina.

Sabiex tiġi evitata t-trasmissjoni possibbli ta' mard, kull skartoċċ għandu jintuża minn pazjent wieħed biss, anke jekk il-labra fuq l-apparat tal-ġhoti tinbidel.

Lyumjev KwikPens u Lyumjev Tempo Pen

Il-KwikPen, Junior KwikPen u Tempo Pen huma adattati biss għal injezzjonijiet taht il-ġilda.

Lyumjev KwikPens huma disponibbli f'żewġ konċentrazzjonijiet: Lyumjev 100 unità/mL KwikPen u Lyumjev 200 unità/mL KwikPen. Ara l-SmPC separat ta' Lyumjev 200 unità/mL KwikPen.

Il-KwikPen tagħti 1 - 60 unità f'passi ta' unità waħda f'injezzjoni waħda.

Lyumjev 100 unità/mL Junior KwikPen tagħti 0.5 - 30 unità f'passi ta' 0.5 unità f'injezzjoni waħda.

Il-Lyumjev 100 unità/mL Tempo Pen tagħti 1 - 60 unità f'passi ta' unità waħda f'injezzjoni waħda.

In-numru ta' unitajiet tal-insulina jintwera fit-tieqa tad-doża tal-pinna irrispettivament mill-konċentrazzjoni u m'għandhiex issir bidla fid-doża meta l-pazjent jiġi trasferit għal konċentrazzjoni ġdida jew għal pinna b'pass ta' doża differenti.

Lyumjev 100 unità/mL Junior KwikPen huwa adattat għal pazjenti li jistgħu jibbenefikaw minn aġġustamenti aktar preċiżi fid-doża tal-insulina.

Hemm il-possibbiltà li t-Tempo Pen tintuża bil-modju ta' trasferiment Tempo Smart Button (ara sezzjoni 6.6). Bħal kwalunkwe injezzjoni ta' insulina, meta qed jintużaw it-Tempo Pen, Tempo Smart Button u l-applikazzjoni ċellulari, il-pazjent għandu jiġi mġarraf biex jiċċekkja l-livelli taz-zokkor fid-demm tiegħu meta jkun qed jikkunsidra jew jagħmel deċiżjonijiet dwar xi injezzjoni oħra jekk ma jkunux ċert dwar kemm ġie injettat.

Għal istruzzjonijiet dettaljati, jekk jogħġbok irreferi għall-istruzzjonijiet għall-użu pprovduti mal-fuljett ta' tagħrif.

Sabiex tiġi evitata t-trasmissjoni possibbli ta' mard, kull pinna għandha tintuża minn pazjent wieħed biss, anke jekk il-labra tinbidel.

CSII (pompa tal-insulina)

Uża pompa addattata għall-infużjoni tal-insulina. Imla r-reċipjent tal-pompa minn kunjett ta' Lyumjev 100 unità/mL.

Pazjenti li jużaw pompa għandhom isegwu l-istruzzjonijiet ipprovduti mal-pompa u s-sett tal-infużjoni. Uża r-reċipjent u l-kateter korretti għall-pompa.

Meta timla r-reċipjent tal-pompa evita li tagħmillu l-ħsara billi tuża labra b'tul korrett għas-sistema tal-mili. Is-sett tal-infużjoni (pajp u kannula) għandu jinbidel skont l-istruzzjonijiet fl-informazzjoni tal-prodott fornuta flimkien mas-sett tal-infużjoni.

Funzjoni ħażina tal-pompa jew ostruzzjoni tas-sett tal-infużjoni jistgħu jwasslu għal żieda rapida fil-livelli tal-glucose (ara sezzjoni 4.4).

Użu għal ġol-vini

Jekk ikun meħtieġ għoti tal-injezzjoni ġol-vini Lyumjev 100 unità/mL huwa disponibbli f'kunjetti. Dan il-prodott mediċinali m'għandux jithallat ma' xi insulina oħra jew ma' prodotti mediċinali oħrajn hlief dawk imsemmija f'sezzjoni 6.6.

Għal istruzzjonijiet fuq id-dilwizzjoni tal-prodott mediċinali qabel jingħata, ara sezzjoni 6.6.

Għoti ġol-vini ta' Lyumjev 100 unità/mL għandu jsir taħt sorveljanza medika.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Ipoglicemija.

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe sustanza mhux attiva elenkata fis-sezzjoni 6.1.

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Traċċabilità

Sabiex tittejjeb it-traċċabilità tal-prodotti mediċinali bijoloġiċi, l-isem u n-numru tal-lott tal-prodott mediċinali amministrat għandhom jiġu rrekordjati b'mod ċar.

Ipoglicemija

L-ipoglicemija hija l-aktar reazzjoni avversa komuni ta' terapija bl-insulina (ara sezzjoni 4.8). Iż-żmien meta ssehh l-ipoglicemija generalment jirrifletti l-profil tal-azzjoni mal-ħin tal-formulazzjonijiet tal-insulina mogħtija. L-ipoglicemija tista' ssehh aktar kmieni wara injezzjoni/infużjoni meta mqabbla ma' insulini oħra li jingħataw f'ħin ikel minħabba bidu aktar kmieni tal-azzjoni ta' Lyumjev (ara sezzjoni 5.1).

L-ipoglicemija tista' ssehh f'daqqa u s-sintomi jistgħu jvarjaw f'kull individwu u jinbidlu maż-żmien fl-istess individwu. Ipoglicemija severa tista' tikkawża aċċessjonijiet, tista' twassal għal telf ta' koxjenza, tista' tkun ta' periklu għall-ħajja, jew tikkawża mewt. L-għarfien sintomatiku tal-ipoglicemija jista' jkun inqas ovvju f'pazjenti b'dijabete li ilha għal żmien twil.

Iperglicemija

L-użu ta' dozi mhux adegwati jew it-twaqqif tat-trattament, jistgħu jwasslu għal iperglicemija u ketoacidożi dijabatika; kundizzjonijiet li jistgħu jkunu letali.

Il-pazjenti għandhom jiġu edukati biex jagħrfu s-sinjali u s-sintomi ta' ketoacidożi u biex iġibu għajnnha immedjatament meta tiġi suspettata ketoacidożi.

Teknika ta' Injezzjoni

Il-pazjenti għandhom jingħataw istruzzjonijiet biex iwettqu rotazzjoni kontinwa tas-sit tal-injezzjoni biex jitnaqqas ir-riskju ta' żvilupp ta' lipodistrofija u ta' amilojdożi tal-ġilda. Hemm riskju potenzjali ta' assorbiment imdewwem tal-insulina u kontroll glicemiku aggravat wara l-injezzjonijiet tal-insulina f'siti b'dawn ir-reazzjonijiet. Bidla f'daqqa fis-sit tal-injezzjoni f'parti mhux affettwata għet irrappurtata li tirriżulta f'ipoglicemija. Huwa rakkomandat monitoraġġ tal-glukożju fid-demm wara l-bidla fis-sit tal-injezzjoni, u jista' jiġi kkunsidrat l-aġġustament tad-doża ta' medikazzjonijiet antidiabetiċi.

Ħtieġa ta' insulina u aġġustamenti fid-doża

Bidliet fl-insulina, fil-konċentrazzjoni tal-insulina, fil-manifattur, fit-tip, jew fil-metodu tal-ġħoti jistgħu jaffettwaw il-kontroll glicemiku u jippredisponu għall-ipoglicemija jew iperglicemija. Dawn il-bidliet għandhom isiru b'attenzjoni taħt sorveljanza medika mill-qrib u l-frekwenza tal-monitoraġġ tal-glucose għandha tiżdied. Għal pazjenti bid-dijabete tat-tip 2, jistgħu jkunu meħtieġa aġġustamenti fid-doża ta' trattament konkomitanti kontra d-dijabete (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.5).

F'pazjenti b'indeboliment tal-kliewi jew tal-fwied, il-monitoraġġ tal-glucose għandu jiġi intensifikat u d-doża għandha tiġi aġġustata fuq bażi individwali (ara sezzjoni 4.2).

Il-ħtieġa ta' insulina tista' jiżdied waqt mard jew disturbji emozzjonali.

Aġġustament fid-doża jista' jkun meħtieġ ukoll jekk il-pazjenti jkollhom żieda fl-attività fiżika jew bidla fid-dieta tas-soltu. Eżerċizzju immedjatament wara ikla jista' jżid ir-riskju ta' ipoglicemija.

Iperglicemija u ketoacidożi minħabba funzjoni hażina tal-apparat tal-pompa tal-insulina

Funzjoni hażina tal-pompa tal-insulina jew tas-sett tal-infużjoni tal-insulina tista' twassal b'mod rapidu għal iperglicemija u ketoacidożi. Hija meħtieġa identifikazzjoni u korrezzjoni fil-pront tal-kawża tal-iperghemija jew tal-ketozi. Jistgħu jkunu meħtieġa injezzjonijiet temporanji taħt il-ġilda ta' Lyumjev.

Thiazolidinediones (TZDs) użati flimkien mal-insulina

TZDs jistgħu jikkawżaw żamma ta' fluwidu relatata mad-doża, speċjalment meta jintużaw flimkien mal-insulina. Iż-żamma ta' fluwidu tista' twassal għal jew taggrava l-insuffiċjenza tal-qalb. Pazjenti ttrattati bl-insulina u TZD għandhom jiġu osservati għal sinjali u sintomi ta' insuffiċjenza tal-qalb. Jekk tiżviluppa insuffiċjenza tal-qalb, ikkunsidra it-twaqqif ta' TZD.

Sensittività eċċessiva u reazzjonijiet allergiċi

Allergija severa, ta' periklu għall-ħajja, ġeneralizzata, inkluża anafilassi, tista' sseħħ bi prodotti mediċinali tal-insulina, inkluż Lyumjev (ara sezzjoni 4.8). Jekk isehħu reazzjonijiet ta' sensittività eċċessiva, waqqaf Lyumjev.

Żbalji fl-ġhoti tal-medikazzjoni

Lyumjev m'għandux jintuża minn pazjenti b'indeboliment fil-vista mingħajr l-ġhajna ta' persuna mħarrġa.

Biex jiġu evitati żbalji fl-ġhoti tal-medikazzjoni bejn Lyumjev u insulini oħra, il-pazjenti jeħtieġu li dejjem jiċċekkjaw it-tikketta tal-insulina qabel kull injezzjoni.

Il-pazjenti dejjem għandhom jużaw labra ġdida għal kull injezzjoni biex jevitaw infezzjonijiet u labra imblukkata. F'każ ta' labra imblukkata din għandha tinbidel b'labra ġdida.

Tempo Pen

It-Tempo Pen fiha kalamita (ara sezzjoni 6.5) li tista' tfixx il-funzjonijiet ta' apparat mediku elettroniku li jkun ġie impjantat, bħal *pacemaker*. Il-kamp manjetiku jestendi għal madwar 1.5 cm.

Eċċipjenti

Dan il-prodott mediċinali fih anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f'kull doża, jiġifieri essenzjalment "hieles mis-sodium".

4.5 Interazzjoni ma' prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta' interazzjoni

Is-sustanzi li ġejjin jistgħu jnaqqsu l-ħtieġa tal-insulina: Prodotti mediċinali kontra d-dijabete (orali jew li jingħataw permezz ta' injezzjoni), *salicylates*, sulphonamides, ċerti anti-depressanti (inibituri ta' monoamine oxidase (MAOIs - *monoamine oxidase inhibitors*), inibituri selettivi tat-tehid mill-ġdid ta' serotonin), inibituri tal-enzima li tikkonverti l-angiotensin (ACE - *angiotensin converting enzyme*), sustanzi li jimblukkaw ir-riċetturi ta' angiotensin II, jew analogi ta' somatostatin.

Is-sustanzi li ġejjin jistgħu jżidu l-ħtieġa tal-insulina: kontraċettivi orali, kortikosteroidi, ormoni tat-tirojde, danazol, sustanzi simpatomimetici, diuretici, jew ormon tat-tkabbir.

L-alkohol jista' jżid jew inaqqas l-effett ta' Lyumjev li jibaxxi l-glucose fid-demm. Il-konsum ta' ammonti kbar ta' ethanol flimkien mal-użu tal-insulina jistgħu jwasslu għal ipoglicemija severa.

Imblokkaturi tar-riċetturi Beta jistgħu jnaqqsu s-sinjali u s-sintomi tal-ipoglicemija.

TZDs jistgħu jikkażaw żamma ta' fluwidu marbuta mad-doża, b'mod partikolari meta jintużaw flimkien mal-insulina, u jistgħu jġieghlu insuffiċjenza tal-qalb tmur għall-aġġar (ara sezzjoni 4.4).

4.6 Fertilità, tqala u treddigh

Tqala

Ammont kbir ta' data dwar nisa tqal (aktar minn 1 000 rizultat ta' tqala) juri li m'hemm l-ebda effett ta' formazzjoni difettuża jew effetti tossiċi fil-fetu/tarbija tat-twelid ta' insulin lispro. Lyumjev jista' jintuża' waqt it-tqala, jekk hemm bżonn kliniku għalih.

Huwa essenzjali li jinżamm kontroll tajjeb ta' pazjenta bid-dijabete (dipendenti mill-insulina jew ta' waqt it-tqala) ittrattata bl-insulina matul it-tqala. Il-htieġa tal-insulina ġeneralment tonqos matul l-ewwel trimestru u tiżdied matul it-tieni u t-tielet trimestri. Wara l-hlas, il-htieġa tal-insulina normalment tmur lura malajr għall-valuri ta' qabel it-tqala. Il-pazjenti bid-dijabete għandhom jinghataw parir biex jinfurmaw lit-tabib tagħhom jekk johorġu tqal jew jekk qed jippjanaw biex johorġu tqal. Monitoraġġ b'attenzjoni tal-kontroll tal-glucose huwa essenzjali f'pazjenti tqal bid-dijabete.

Treddigh

Lyumjev jista' jintuża' waqt it-treddigh. Pazjenti bid-dijabete li jkunu qed ireddegħu jista' jkollhom bżonn aġġustamenti fid-doża tal-insulina, fid-dieta jew fit-tnejn.

Fertilità

Fi studji fuq l-animali insulin lispro ma kkawżatx indeboliment fil-fertilità.

4.7 Effetti fuq il-hila biex issuq u thaddem magni

Il-hila tal-pazjent li jikkonċentra u jirreagixxi tista' tonqos minhabba l-ipoglicemija. Dan jista' jikkostitwixxi riskju f'sitwazzjonijiet fejn dawn il-kapaċitajiet huma ta' importanza speċjali (eż. sewqan ta' karożza jew użu ta' makkinarju).

Il-pazjenti għandhom jiġu avżati biex jieħdu prekawzzjonijiet biex jevitaw l-ipoglicemija waqt is-sewqan, dan huwa partikolarment importanti f'dawk il-pazjenti li jkollhom għarfien imnaqqas jew ma jgħarfux is-sinjali ta' twissija ta' ipoglicemija jew li jkollhom episodji frekwenti ta' ipoglicemija. F'dawn iċ-ċirkostanzi għandu jiġi kkunsidrat jekk is-sewqan hux xieraq.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

L-aktar reazzjonijiet avversi rrappurtati b'mod frekwenti waqt it-trattament huma l-ipoglicemija (komuni ħafna) u reazzjonijiet fis-sit tal-infużjoni f'pazjenti li qed jużaw is-sistema CSII (komuni ħafna) (ara sezzjonijiet 4.2, 4.4 u 4.9).

Ir-reazzjonijiet avversi relatati mill-provi kliniċi li ġejjin huma elenkati hawn taht bħala terminu ppreferut MedDRA skont il-klassi tas-sistemi u tal-organi u skont il-frekwenza bl-aktar frekwenti l-ewwel (komuni ħafna: $\geq 1/10$; komuni: $\geq 1/100$ sa $< 1/10$; mhux komuni: $\geq 1/1\,000$ sa $< 1/100$; rari: $\geq 1/10\,000$ sa $< 1/1\,000$; rari ħafna: $< 1/10\,000$) u mhux magħruf (ma tistax tittiehed stima mid-data disponibbli). F'kull grupp ta' frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma ppreżentati bl-aktar serji mniżżla l-ewwel.

Tabella 1. Reazzjonijiet avversi

Klassi tas-sistemi u tal-organi MedDRA	Komuni hafna	Komuni	Mhux komuni	Mhux maghruf
Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni	Ipoglicemija			
Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta' mnejn jinghata	Reazzjonijiet fis-sit tal-infużjoni ^a	Reazzjonijiet allergiċi ^b	Edima	
		Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni ^c		
Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta' taht il-ġilda			Lipodistrofija	Amiloidożi tal-ġilda
			Raxx	
			Ħakk	

^aIrrapportat f'PRONTO-Pump-2

^bAra sezzjoni 4.8 Deskrizzjoni ta' reazzjonijiet avversi magħżula

^cIrrapportat f'PRONTO-T1D, PRONTO-T2D u PRONTO-Peds

Deskrizzjoni ta' reazzjonijiet avversi magħżula

Ipoglicemija

L-ipoglicemija hija l-aktar reazzjoni avversa osservata b'mod komuni f'pazjenti li jużaw l-insulina. L-inċidenza ta' ipoglicemija severa fl-istudji kliniċi fl-adulti ta' fażi 3 li damu 26 ġimgħa kienet 5.5% f'pazjenti b'diabetes mellitus tat-tip 1 u 0.9 % f'pazjenti b'diabetes mellitus tat-tip 2 (ara t-tabelli 2 u 3). Fl-istudju PRONTO-Peds, ipoglicemija severa giet irrapportata f'0.7% tal-pazjenti pedjatriċi ttrattati b'Lyumjev.

Is-sintomi tal-ipoglicemija ġeneralment isehħu f'daqqa. Dawn jistgħu jinkludu nuqqas ta' attenzjoni, konfużjoni, palpitazzjonijiet, għaraq, rimettar, u uġiġħ ta' ras.

Matul l-istudji kollha ma kien hemm l-ebda differenzi klinikament sinifikanti fil-frekwenza tal-ipoglicemija bejn l-ġhoti ta' Lyumjev jew ta' komparatur (prodott mediċinali ieħor li fih l-insulin lispro). Fi studji fejn Lyumjev u l-komparatur ingħataw f'hinijiet differenti skont l-ikliet, ma kien hemm l-ebda differenza klinikament rilevanti fil-frekwenza tal-ipoglicemija.

L-ipoglicemija tista' ssehħ aktar kmieni wara injezzjoni/infużjoni ta' Lyumjev meta mqabbla ma' insulini oħra li jingħataw f'hin ikel minhabba l-bidu aktar kmieni tal-azzjoni.

Reazzjonijiet allergiċi

Allergija severa, ġeneralizzata, ta' periklu għall-ħajja, inkluża anafilassi, reazzjonijiet ġeneralizzati fil-ġilda, angjoedima, bronkospazmu, pressjoni baxxa u xokk tista' ssehħ bi kwalunkwe insulina, inkluż Lyumjev.

Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni/Infużjoni

Bħal b'terapija oħra bl-insulina, il-pazjenti jista' jkollhom raxx, ħmura, infjammazzjoni, uġiġħ, tbengi jew ħakk fis-sit tal-injezzjoni jew tal-infużjoni ta' Lyumjev.

Fl-istudji PRONTO-T1D u PRONTO-T2D (l-ġhoti ta' dożi multipli b'injezzjoni -multiple-dose injection [MDI] administration), reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni sehhew f'2.7% tal-pazjenti adulti ttrattati b'Lyumjev. Fil-parti l-kbira dawn ir-reazzjonijiet kienu ħfief u normalment jisparixxu mat-

tkompliġa tat-trattament. Mill-1 116 -il pazjent li rċevew Lyumjev, 1 ma kompliex it-trattament minhabba reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni ($< 0.1\%$).

Fl-istudju PRONTO-Peds, reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni sehhew f'6.2% tal-pazjenti pedjatriċi ttrattati b'Lyumjev. Dawn l-avvenimenti kienu hfief jew moderati. Mill-418 -il pazjent ittrattati b'Lyumjev, 2 waqfu t-trattament minhabba reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni ($< 0.5\%$).

Fl-istudju PRONTO-Pump-2, reazzjonijiet fis-sit tal-infużjoni kienu rrapportati f'38% tal-pazjenti ttrattati b'Lyumjev. Il-parti l-kbira ta' dawn ir-reazzjonijiet kienu hfief. Mill-215 -il pazjent ittrattati b'Lyumjev, 7 ma komplewx it-trattament minhabba reazzjonijiet fis-sit tal-infużjoni (3.3%).

Immunogeniċità

L-ġhoti tal-insulina jista' jikkawża l-formazzjoni ta' antikorpi għall-insulina. Il-preżenza ta' antikorpi kontra l-medicina ma kellhiex effett klinikament sinifikanti fuq il-farmakokinetika, l-effikaċja, jew is-sigurtà ta' Lyumjev.

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta' taht il-ġilda

Lipodistrofija u amilojdożi tal-ġilda jistgħu jsehhu fis-sit tal-injezzjoni u jdewmu l-assorbiment tal-insulina lokali. Rotazzjoni kontinwa tas-sit tal-injezzjoni f'din il-parti partikolari tal-injezzjoni tista' tghin sabiex jitnaqqas jew jiġi evitat ir-riskju li jiżviluppaw dawn ir-reazzjonijiet (ara sezzjoni 4.4).

Edima

Każijiet ta' edima ġew irrappurtati bit-terapija tal-insulina, partikolarment jekk il-kontroll metaboliku li qabel ma kienx adegwat jiġi mtejjeb permezz ta' terapija intensifikata ta' insulina.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ġew investigati f'prova ta' konferma tat-terapija f'tfal bid-dijabete tat-tip 1 b'etajiet minn 3 sa < 18 -il sena. Fil-prova, 418 -il pazjent ġew ittrattati b'Lyumjev. Il-frekwenza, it-tip u s-severità tar-reazzjonijiet avversi osservati fil-popolazzjoni pedjatrika huma konsistenti mal-profil ta' sigurtà f'pazjenti adulti.

Popolazzjonijiet speċjali oħra

Abbażi ta' riżultati minn provi kliniċi bl-insulin lispro b'mod ġenerali, il-frekwenza, it-tip u s-severità tar-reazzjonijiet avversi osservati f'pazjenti anzjani u f'pazjenti b'indeboliment tal-kliwi jew tal-fwied ma jindikaw l-ebda differenza mqabbel mal-esperjenza usa' fil-popolazzjoni ġenerali. L-informazzjoni dwar is-sigurtà f'pazjenti anzjani ħafna (≥ 75 sena) jew f'pazjenti b'indeboliment moderat sa sever tal-kliwi jew b'indeboliment tal-fwied hija limitata (ara sezzjoni 5.1).

Rappurtar ta' reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrapportati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professionisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrapportaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali imnizzla f'[Appendiċi V](#).

4.9 Doża eċċessiva

Doża eċċessiva tikkawża ipoglicemija b'sintomi li jakkumpanjawha li jinkludu nuqqas ta' attenzjoni, konfużjoni, palpitazzjonijiet, ġħaraq, rimettar, u uġiġħ ta' ras.

L-ipoglicemija tista' ssehh bħala riżultat ta' insulin lispro żejda meta mqabbla mal-konsum tal-ikel, hela ta' enerġija jew it-tnejn. Episodji hfief ta' ipoglicemija ġeneralment jistgħu jiġu ttrattati permezz

ta' glucose mill-halq. Episodji aktar severi b'koma, aċċessjoni, jew indeboliment newroloġiku jistgħu jiġu ttrattati permezz ta' glucagon jew glucose kkonċentrat ġol-vini. Jistgħu jkunu meħtieġa teħid sostnut ta' karboidrati u osservazzjoni peress li l-ipoglicemija tista' terġa' sseħħ mill-ġdid wara rkupru kliniku evidenti. Jistgħu jkunu meħtieġa aġġustamenti fid-doża tal-prodott mediċinali, fl-ammont, tip u hin tal-ikliet, jew fl-eżerċizzju.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Prodotti mediċinali użati fid-dijabete, insulini u analogi għall-injezzjoni, li jaġixxu malajr, Kodiċi ATC: A10AB04

Mekkaniżmu ta' azzjoni

L-attività primarja ta' Lyumjev hija r-regolazzjoni tal-metaboliżmu tal-glucose. L-insulini, inkluża l-insulin lispro, is-sustanza attiva f'Lyumjev, jeżerċitaw l-azzjoni speċifika tagħhom billi jintrabtu mar-riċetturi tal-insulina. L-insulina marbuta mar-riċetturi tbaxxi l-glucose fid-demm billi tistimula l-assorbiment periferali tal-glucose mill-muskoli skelettriċi u x-xaħam u billi tinibixxi l-produzzjoni tal-glucose mill-fwied. L-insulini jinibixxi l-lipolisi u l-proteolisi, u jtejbju s-sintesi tal-proteini.

Lyumjev huwa formulazzjoni ta' insulin lispro li fiha citrate u treprostinil. Citrate iżid il-permeabilità vaskulari lokali u treprostinil jinduċi vażodilatazzjoni lokali biex jinkiseb assorbiment aċċellerat tal-insulin lispro.


Effetti farmakodinamiċi

Azzjoni bikrija u ttardjata tal-insulina

Twettaq studju ta' *glucose clamp* fuq 40 pazjent bid-dijabete tat-tip 1 li ngħataw Lyumjev u Humalog taħt il-ġilda b'haġġa doża waħda ta' 15 unità. Ir-riżultati huma pprovduti fil-Figura 1. Lyumjev intwera li huwa potenti daqs Humalog abbażi ta' unità għal unità iżda l-effett tiegħu huwa aktar mgħaġġel b'tul ta' azzjoni iqsar.

- Il-bidu ta' azzjoni ta' Lyumjev kien 20 minuta wara d-doża, 1 l-il minuta aktar malajr minn Humalog.
- Matul l-ewwel 30 minuta wara d-doża, Lyumjev kellu effett ta' tnaqqis tal-glucose ta' 3 darbiet akbar meta mqabbel ma' Humalog.
- L-effett li jbaxxi l-glucose massimu ta' Lyumjev seħħ bejn siegħa u 3 siegħat wara l-injezzjoni.
- L-azzjoni ttardjata tal-insulina, minn 4 siegħat sat-tmiem tal-*glucose clamp*, kienet 54% inqas b'Lyumjev minn dak osservat bi Humalog.
- It-tul ta' azzjoni ta' Lyumjev kien ta' 5 siegħat, 44 minuta iqsar minn Humalog.
- Il-glucose totali infuż waqt il-*clamp* kien komparabbli bejn Lyumjev u Humalog.

Figura 1. Rata ta' infużjoni ta' glucose (GIR - *glucose infusion rate*) medja f'pazjenti b'dijabete tat-tip 1 wara injezzjoni taht il-ġilda ta' Lyumjev jew Humalog (doża ta' 15-il unità)



Bl-istess mod, azzjoni bikrija tal-insulina aktar mgħagħġla u azzjoni ttardjata tal-insulina mnaqqsa ġew osservati b'Lyumjev f'pazjenti bid-dijabete tat-tip 2.

L-effett totali u massimu ta' tnaqqis ta' glucose ta' Lyumjev żdied mad-doża fil-firxa tad-doża terapewtika. Il-bidu bikri ta' azzjoni u l-azzjoni totali tal-insulina kienu simili meta Lyumjev ingħata fl-addome, fil-parti ta' fuq tad-driegħ jew fil-koxxa.

Tnaqqis ta' Glucose wara l-Ikel (PPG - *Postprandial Glucose*)

Lyumjev naqqas il-PPG waqt ikla standardizzata li ngħatat għall-ittestjar fuq il-perjodu shiħ ta' 5 sigħat tal-ikla li ngħatat għall-ittestjar (bidla mill-erja taht il-kurva (AUC - *area under the curve*) ta' qabel l-ikla (0 – 5 sigħat)) meta mqabbel ma' Humalog.

- F'pazjenti bid-dijabete tat-tip 1, Lyumjev naqqas il-PPG matul il-perjodu ta' 5 sigħat tal-ikla li ngħatat għall-ittestjar bi 32% meta ngħata fil-bidu tal-ikla u bi 18% meta ngħata 20 minuta wara l-bidu tal-ikla mqabbel ma' Humalog.
- F'pazjenti bid-dijabete tat-tip 2, Lyumjev naqqas il-PPG matul il-perjodu ta' 5 sigħat tal-ikla li ngħatat għall-ittestjar bi 26% meta ngħata fil-bidu tal-ikla u b'24% meta ngħata 20 minuta wara l-bidu tal-ikla mqabbel ma' Humalog.

Paragun ta' Lyumjev 200 unità/mL u Lyumjev 100 unità/mL

It-tnaqqis massimu u totali tal-glucose kienu komparabbli għal Lyumjev 200 unità/mL jew Lyumjev 100 unità/mL. M'hemmx bżonn ta' bidla fid-doża jekk pazjent jinqaleb minn qawwa għal oħra.

Effikaċja klinika u sigurtà

L-effikaċja ta' Lyumjev ġiet evalwata fi 4 provi *randomised*, ikkontrollati b'mod attiv fl-adulti u f'prova waħda *randomised*, ikkontrollata b'mod attiv f'pazjenti pedjatriċi bid-dijabete tat-tip 1.

Dijabete tat-Tip 1 – Adulti

PRONTO-T1D kienet prova ta' 26 ġimgħa, ta' trattament sal-mira, li evalwat l-effikaċja ta' Lyumjev f'1 222 pazjent b'terapija multipla ta' injezzjoni ta' kuljum. Il-pazjenti ġew *randomised* għal Lyumjev *blinded* f'hin l-ikel, Humalog *blinded* f'hin l-ikel, jew Lyumjev *open-label* wara l-ikel,

kollha flimkien ma' insulina glargine jew insulina degludec. Lyumjev jew Humalog f'hin l-ikel ġew injettati 0 sa 2 minuti qabel l-ikla u Lyumjev wara l-ikel ġie injettat 20 minuta wara l-bidu tal-ikla.

Ir-riżultati tal-effikaċja huma pprovduti fit-Tabella 2 u fil-Figura 2.

37.4% tal-pazjenti ttrattati b'Lyumjev f'hin l-ikel, 33.6% tal-pazjenti ttrattati b'Humalog f'hin l-ikel u 25.6% tal-pazjenti ttrattati b'Lyumjev wara l-ikel laħqu HbA1c fil-mira ta' < 7%.

Dożi bażilari, bolus u totali tal-insulina kienu simili fost il-gruppi tal-istudju wara 26 ġimgha.

Wara l-perjodu ta' 26 ġimgha, iż-żewġ gruppi ta' trattament *blinded* komplew sa 52 ġimgha. HbA1c ma kienx differenti b'mod statistikament sinifikanti bejn it-trattamenti fil-punt finali ta' ġimgha 52.

Tabella 2 Riżultati minn prova klinika bażilari-bolus ta' 26 ġimgha f'pazjenti b'dijabete tat-tip 1

	Lyumjev f'hin l-ikel + insulina bażilari	Humalog f'hin l-ikel + insulina bażilari	Lyumjev wara l-ikel + insulina bażilari
Numru ta' individwi randomised (N)	451	442	329
HbA_{1c} (%)			
Linja bażi → ġimgha 26	7.34 → 7.21	7.33 → 7.29	7.36 → 7.42
Bidla mil-linja bażi	-0.13	-0.05	0.08
Differenza fit-trattament	-0.08 [-0.16, -0.00] ^C		0.13 [0.04, 0.22] ^D
HbA_{1c} (mmol/mol)			
Linja bażi → ġimgha 26	56.7 → 55.3	56.7 → 56.1	56.9 → 57.6
Bidla mil-linja bażi	-1.4	-0.6	0.8
Differenza fit-trattament	-0.8 [-1.7, 0.00] ^C		1.4 [0.5, 2.4] ^D
Bidliet fil-livell tal-glucose siegħa wara l-ikel (mg/dL)^A			
Linja bażi → ġimgha 26	77.3 → 46.4	71.5 → 74.3	76.3 → 87.5
Bidla mil-linja bażi	-28.6	-0.7	12.5
Differenza fit-trattament	-27.9 [-35.3, -20.6] ^{C,E}		13.2 [5.0, 21.4] ^D
Bidliet fil-livell tal-glucose siegħa wara l-ikel (mmol/L)^A			
Linja bażi → ġimgha 26	4.29 → 2.57	3.97 → 4.13	4.24 → 4.86
Bidla mil-linja bażi	-1.59	-0.04	0.70
Differenza fit-trattament	-1.55 [-1.96, -1.14] ^{C,E}		0.73 [0.28, 1.19] ^D
Bidliet fil-livell tal-glucose saġhtejn wara l-ikel (mg/dL)^A			
Linja bażi → ġimgha 26	112.7 → 72.7	101.6 → 103.9	108.0 → 97.2
Bidla mil-linja bażi	-34.7	-3.5	-10.2
Differenza fit-trattament	-31.2 [-41.1, -21.2] ^{C,E}		-6.7 [-17.6, 4.3] ^D
Bidliet fil-livell tal-glucose saġhtejn wara l-ikel (mmol/L)^A			
Linja bażi → ġimgha 26	6.26 → 4.04	5.64 → 5.77	5.99 → 5.40
Bidla mil-linja bażi	-1.93	-0.20	-0.56
Differenza fit-trattament	-1.73 [-2.28, -1.18] ^{C,E}		-0.37 [-0.98, -0.24] ^D
Piż tal-ġisem (Kg)			
Linja bażi → ġimgha 26	77.3 → 77.9	77.3 → 78.2	77.6 → 78.1
Bidla mil-linja bażi	0.6	0.8	0.7
Differenza fit-trattament	-0.2 [-0.6, 0.1] ^A		-0.1 [-0.5, 0.3] ^D
Ipoglicemija severa^B (% ta' pazjenti)	5.5%	5.7%	4.6%

Ġimgha 26 u bidla mill-valuri tal-linja bażi huma bbażati fuq il-medji ta' *least-squares* (medji aġġustati).

L-intervall ta' kunfidenza ta' 95% huwa ddikjarat f' [/].

^A Test ta' ikla.


^B Ipoglicemija severa hija definita bħala episodju li jehtieg assistenza ta' persuna oħra minhabba indeboliment newroloġiku tal-pazjent.

^C Id-differenza hija għal Lyumjev f'hin l-ikel – Humalog f'hin l-ikel.

^D Id-differenza hija għal Lyumjev wara l-ikel - Humalog f'hin l-ikel.

^E Statistikament sinifikanti favur Lyumjev f'hin l-ikel.

Figura 2. Mogħdija tal-hin għall-bidliet fil-livell tal-glucose fid-demm waqt test ta' tolleranza ta' ikla mħallta f'gimgha 26 f'pazjenti b'dijabete tat-tip 1



PPG = Glucose wara l-ikel

Lyumjev u Humalog mogħtija f'hin l-ikel

Lyumjev +20 = Lyumjev ġie injettat 20 minuta wara l-bidu tal-ikla

*p < 0.05 għal paragon f'pari ta' Lyumjev versus Humalog

^p < 0.05 għal paragon f'pari ta' Lyumjev +20 versus Humalog

#p < 0.05 għal paragon f'pari ta' Lyumjev +20 versus Lyumjev

Monitoraġġ kontinwu tal-glucose (CGM - Continuous glucose monitoring) f'Dijabete tat-Tip 1 – Adulti

Subsett ta' pazjenti (N = 269) ipparteċipa f'evalwazzjoni tal-profilu ta' glucose ambulatorju ta' 24 siegħa osservati permezz ta' CGM *blinded*. Fil-valutazzjoni ta' 26 ġimgha, il-pazjenti ttrattati b'Lyumjev f'hin l-ikel urew titjib statistikament sinifikanti fil-kontroll ta' PPG waqt il-valutazzjoni ta' CGM ta' bidliet fil-livell tal-glucose jew AUC li tizdied 0 - 2 sigħat, 0 - 3 sigħat, u 0 - 4 sigħat wara l-ikel meta mqabbla ma' pazjenti ittrattati b'Humalog. Pazjenti ttrattati Lyumjev f'hin l-ikel irrappurtaw hin itwal b'mod statistikament sinifikanti fil-firxa (6 am sa nofsillejl) b'603 minuti fil-firxa, (3.9 sa 10 mmol/L, 71 - 180 mg/dL), u 396 minuta fil-firxa (3.9 sa 7.8 mmol/L, 71 sa 140 mg/dL), 44 u 41 minuta itwal minn pazjenti b'Humalog rispettivament.

Dijabete tat-Tip 2 – Adulti

PRONTO-T2D kienet prova ta' 26 ġimgha, ta' trattament sal-mira, li evalwat l-effikaċja ta' Lyumjev f'673 pazjenti b'dijabete tat-tip 2 li kienu *randomised* għal Lyumjev *blinded* f'hin l-ikel jew għal Humalog *blinded* f'hin l-ikel, it-tnejn flimkien ma' insulina bażilari (insulina glargine jew insulina degludec) f'kors bażilari-bolus. Lyumjev f'hin l-ikel jew Humalog f'hin l-ikel ġew injettati 0 - 2 minuti qabel l-ikla. Ir-risultati tal-effikaċja huma pprovduti fit-Tabella 3 u fil-Figura 3.

58.2% tal-pazjenti ttrattati b'Lyumjev f'hin l-ikel, u 52.5% tal-pazjenti ttrattati b'Humalog f'hin l-ikel laħqu HbA1c fil-mira ta' < 7%.

Doži bażilari, bolus u totali tal-insulina kienu simili fost il-gruppi tal-istudju fi tmiem il-prova.

Tabella 3 Rizultati minn prova klinika bażilari-bolus ta' 26 ġimgha f'pazjenti b'dijabete tat-tip 2

	Lyumjev f'hin l-ikel + insulina baži	Humalog f'hin l-ikel + insulina bažilari
Numru ta' individwi <i>randomised</i> (N)	336	337
HbA_{1c} (%)		
Linja baži → ġimgħa 26	7.28→6.92	7.31→6.86
Bidla mil-linja baži	-0.38	-0.43
Differenza fit-trattament	0.06 [-0.05, 0.16]	
HbA_{1c} (mmol/mol)		
Linja baži → ġimgħa 26	56.0→52.1	56.4→51.5
Bidla mil-linja baži	-4.1	-4.7
Differenza fit-trattament	0.6 [-0.6, 1.8]	
Bidliet fil-livell tal-glucose siegħa wara l-ikel (mg/dL)^A		
Linja baži → ġimgħa 26	76.6→63.1	77.1→74.9
Bidla mil-linja baži	-13.8	-2.0
Differenza fit-trattament	-11.8 [-18.1, -5.5] ^C	
Bidliet fil-livell tal-glucose siegħa wara l-ikel (mmol/L)^A		
Linja baži → ġimgħa 26	4.25→3.50	4.28→4.16
Bidla mil-linja baži	-0.77	-0.11
Differenza fit-trattament	-0.66 [-1.01, -0.30] ^C	
Bidliet fil-livell tal-glucose saghtejn wara l-ikel (mg/dL)^A		
Linja baži → ġimgħa 26	99.3→80.4	99.6→97.8
Bidla mil-linja baži	-19.0	-1.6
Differenza fit-trattament	-17.4 [-25.3, -9.5] ^C	
Bidliet fil-livell tal-glucose saghtejn wara l-ikel (mmol/L)^A		
Linja baži → ġimgħa 26	5.51→4.47	5.53→5.43
Bidla mil-linja baži	-1.06	-0.09
Differenza fit-trattament	-0.96 [-1.41, -0.52] ^C	
Piż tal-ġisem (Kg)		
Linja baži → ġimgħa 26	89.8→91.3	90.0 →91.6
Bidla mil-linja baži	1.4	1.7
Differenza fit-trattament	-0.2 [-0.7, 0.3]	
Ipoglicemija severa (% ta' pazjenti)^B	0.9%	1.8%

Ġimgha 26 u bidla mill-valuri tal-linja bażi huma bbażati fuq il-medji ta' *least-squares* (medji aġġustati).


L-intervall ta' kunfidenza ta' 95% huwa ddikjarat f' [/]. Id-differenza hija għal Lyumjev f'hin l-ikel – Humalog f'hin l-ikel.

^A Test ta' ikla.

^B Ipoglicemija severa hija definita bħala episodju li jehtieg assistenza ta' persuna oħra minhabba indeboliment newroloġiku tal-pazjent.

^C Statistika sinifikanti favur Lyumjev f'hin l-ikel.

Figura 3. Moghdija tal-hin għall-bidliet fil-livell tal-glucose fid-demmm waqt test ta' tolleranza ta' ikla mħallta f'gimgha 26 f'pazjenti b'dijabete tat-tip 2



PPG = Glucose wara l-ikel

Lyumjev u Humalog moghtija f'hin l-ikel

Id-data hija LSM (SE), *p < 0.05

Dijabete tat-Tip 1 – Adulti. CSII

PRONTO-Pump kienet prova double-blind ta' 12-il gimgha (2 perjodi ta' 6 gimghat) b'disinn *cross over*, li evalwat il-kompatibilità u s-sigurtà ta' Lyumjev u Humalog ma' Sistema CSII esterna f'pazjenti li libsu apparat ta' monitoraġġ kontinwu tal-glucose matul l-istudju. Ma kien hemm l-ebda differenza statistikament sinifikanti fit-trattament fir-rata jew fl-inċidenza ta' fallimenti tas-sett tal-infużjoni (n = 49).

Fil-perjodu 1 tal-istudju *cross over*, Lyumjev kellu tnaqqis numerikament akbar fil-medja ta' HbA1c minn Humalog. It-tnaqqis ta' Lyumjev kien ta' -0.39% [- 4.23 mmol/mol] minn linja bażi ta' 6.97% [52.68 mmol/mol] u t-tnaqqis ta' Humalog kien ta' -0.25% [- 2.78 mmol/mol] minn linja bażi ta' 7.17% [54.89 mmol/mol]. Lyumjev kellu tul ta' hin medju itwal b'mod statistikament sinifikanti bi glucose fil-firxa mmirata ta' 71 – 140 mg/dL (3.9 sa 7.8 mmol/L) fi żmien siegħa u sagħtejn wara l-bidu tal-kolazzjon meta mqabbel ma' Humalog.

PRONTO-Pump-2 kienet prova ta' 16-il gimgha, *double-blind*, magħmula b'mod arbitrarju (1:1) li evalwat l-effikaċja ta' Lyumjev f'432 pazjent bid-dijabete tat-tip 1 li kienu qed jużaw infużjoni kontinwa t'insulina minn taħt il-gilda. B'mod arbitrarju, il-pazjenti ntgħażlu għal jew *blinded* Lyumjev (N = 215) jew *blinded* Humalog (N = 217). Boluses ta' Lyumjev jew Humalog fil-hin tal-ikel nbdew 0 sa 2 minuti qabel l-ikla.

F'gimgha 16, Lyumjev ma kienx inferjuri għal Humalog fit-tnaqqis ta' HbA1c. It-tnaqqis b' Lyumjev kien ta' -0.06% [- 0.7 mmol/mol] minn linja bażi ta' 7.56% [59.1 mmol/mol] u t-tnaqqis b' Humalog kien ta' -0.09% [- 1.0 mmol/mol] minn linja bażi ta' 7.54% [58.9 mmol/mol]. Id-differenza fit-trattament kienet ta' 0.02% [95% CI: - 0.06, 0.11] u 0.3 mmol/mol [95% CI: - 0.6, 1.2], rispettivament meta mqabbel ma' Humalog.

Wara ikla bħala test standardizzat, it-trattament b'Lyumjev wera tnaqqis statistikament sinifikanti fil-glukożju siegħa u sagħtejn wara l-ikel. Id-differenza fit-trattament kienet ta' - 1.34 mmol/L [95% CI: - 2.00, - 0.68] u -1.54 mmol/L [95% CI: - 2.37, - 0.72], rispettivament meta mqabbel ma' Humalog.

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani

Fiż-żewġ studji kliniċi ta' 26 ġimgħa (PRONTO-T1D u PRONTO-T2D), 187 minn 1,116-il pazjent (17%) ittrattati b'Lyumjev b'dijabete tat-tip 1 jew b'dijabete tat-tip 2 kellhom età ta' ≥ 65 sena u 18 minn 1,116 (2%) kellhom età ta' ≥ 75 sena. Ma ġew osservati l-ebda differenzi globali fis-sigurtà jew l-effettività bejn pazjenti anzjani u l-pazjenti iżgħar.

Popolazzjoni pedjatrika

PRONTO-Peds kien prova tat-tip trattament għal għan speċifiku, magħmul b'mod arbitrarju (2:2:1) u li dam 26 ġimgħa u li evalwa l-effikaċja ta' Lyumjev f'716 -il pazjent bid-dijabete tat-tip 1, b'etajiet minn 3 sa < 18 -il sena. B'mod arbitrarju l-pazjenti ntgħażlu għal jew Lyumjev fl-għama fil-hin tal-ikel (N = 280), Humalog fl-għama fil-hin tal-ikel (N = 298), jew Lyumjev *open-label* wara l-ikel (N = 138), kollha flimkien ma' insulina bażilari (insulin glargine, insulin degludec jew insulin detemir). Lyumjev jew Humalog fil-hin tal-ikel ġie injettat 0 sa 2 minuti qabel l-ikel u Lyumjev wara l-ikel ġie injettat fi żmien 20 minuta minn meta bdiet l-ikla.

Fil-linja bażi u fis-26 ġimgħa d-dożi tal-insulina kienu simili fil-gruppi kollha ta' trattament.

Tabella 4. Riżultati mill-prova ta' 26 ġimgħa PRONTO-Peds f'pazjenti pedjatriċi bid-dijabete tat-tip 1

	Lyumjev fil-Hin tal-ikel + insulina bażilari	Humalog fil-Hin tal-ikel + insulina bażilari	Lyumjev wara l-ikel + insulina bażilari
Numru ta' individwi magħżula b'mod arbitrarju (N)	280	298	138
HbA_{1c} (%) (medja)			
Linja bażi → ġimgħa 26	7.78 → 7.85	7.81 → 7.88	7.77 → 7.86
Bidla mil-linja bażi	0.06	0.09	0.07
Differenza fit-trattament	-0.02 [-0.17, 0.13] ^A		-0.02 [-0.20, 0.17] ^B
HbA_{1c} (mmol/mol)			
Linja bażi → ġimgħa 26	61.6 → 62.4	61.8 → 62.6	61.4 → 62.4
Bidla mil-linja bażi	0.71	0.94	0.77
Differenza fit-trattament	-0.23 [-1.84, 1.39] ^A		-0.17 [-2.15, 1.81] ^B

Il-valuri ta' Ġimgħa 26 u l-bidla mil-linja bażi huma bbażati fuq il-*least-squares means (adjusted means)*.

In-95% intervall ta' kunfidenza huwa muri f' '[]'.

^AId-differenza hija għal Lyumjev fil-hin tal-ikel – Humalog fil-hin tal-ikel.

^BId-differenza hija għal Lyumjev wara l-ikel – Humalog fil-hin tal-ikel.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

L-assorbiment ta' insulin lispro kien aktar mgħaġġel u t-tul ta' esponiment kien iqsar f'individwi f'saħħithom u pazjenti bid-dijabete wara l-injezzjoni ta' Lyumjev meta mqabbel ma' Humalog.

F'pazjenti b'dijabete tat-tip 1:

- L-insulin lispro dehret fiċ-ċirkolazzjoni wara bejn wiehied u iehor minuta wara l-injezzjoni ta' Lyumjev, li kien ħames minuti aktar malajr minn Humalog.
- Il-hin biex tintlaħaq 50% tal-koncentrazzjoni massima kien ta' 14-il minuta iqsar b'Lyumjev meta mqabbel ma' Humalog.

- Wara injezzjoni ta' Lyumjev, kien hemm seba' darbiet aktar insulin lispro fiċ-ċirkolazzjoni matul l-ewwel 15-il minuta meta mqabbel ma' Humalog u tliet darbiet aktar insulin lispro matul l-ewwel 30 minuta meta mqabbel ma' Humalog.
- Wara l-ghoti ta' Lyumjev il-hin sal-konċentrazzjoni massima tal-insulin lispro ntlahaq wara 57 minuta.
- Wara injezzjoni ta' Lyumjev kien hemm 41% inqas insulin lispro fiċ-ċirkolazzjoni 3 sigħat wara l-injezzjoni meta mqabbel ma' Humalog.
- It-tul ta' esponiment għall-insulin lispro għal Lyumjev kien 60 minuta iqsar meta mqabbel ma' Humalog.
- L-esponiment totali għall-insulin lispro (proporzjon u CI ta' 95% ta' 1.03 (0.973, 1.09)) u l-konċentrazzjoni massima (proporzjon u CI ta' 95% ta' 1.06 (0.97, 1.16)) kienu komparabbli bejn Lyumjev u Humalog.

F'pazjenti tat-tip 1, il-varjabilità (koeffiċjent ta' varjazzjoni % [CV%]- *coefficient of variation*) minn jum għal jum ta' Lyumjev kienet ta' 13% għall-esponiment totali tal-insulin lispro (AUC, 0 – 10 sigħat) u ta' 23% għall-konċentrazzjoni massima ta' insulin lispro (C_{max}). Il-bijodisponibilità assoluta ta' insulin lispro wara għoti taħt il-ġilda ta' Lyumjev fl-addome, fil-parti ta' fuq tad-driegħ u fil-koxxa kienet madwar 65%. L-assorbiment aċċellerat ta' insulin lispro jinżamm irrispettivament mis-sit tal-injezzjoni (addome, in-naħa ta' fuq tad-driegħ u l-koxxa). Ma hija disponibbli l-ebda *data* dwar esponiment wara injezzjoni fil-warrani.

Il-konċentrazzjoni massima u l-hin sal-konċentrazzjoni massima kienu komparabbli għaž-żoni tal-addome u tal-parti ta' fuq tad-driegħ; il-hin sal-konċentrazzjoni massima kien itwal u l-konċentrazzjoni massima kienet inqas għall-koxxa.

L-esponiment totali għall-insulin lispro u l-konċentrazzjoni massima tal-insulin lispro żdiedu b'mod proporzjonali ma' zieda fid-doži taħt il-ġilda ta' Lyumjev fil-firxa tad-doża minn 7 unitajiet sa 30 unità.

CSII

L-assorbiment tal-insulin lispro gie aċċellerat meta Lyumjev inghata permezz ta' CSII f'pazjenti b'dijabete tat-tip 1.

- Il-hin biex tintlahaq 50% tal-konċentrazzjoni massima kien ta' 14-il minuta, 9 minuti iqsar minn dak għal Humalog.
- Wara l-ghoti ta' Lyumjev, kienet disponibbli 1.5 darbiet aktar insulin lispro matul l-ewwel 30 minuta meta mqabbla ma' Humalog.

Paragun ta' Lyumjev 200 unità/mL u Lyumjev 100 unità/mL

Ir-riżultati ta' studju f'individwi f'saħħithom urew li Lyumjev 200 unità/mL huwa bijoekwivalenti għal Lyumjev 100 unità/mL wara l-ghoti ta' doża waħda ta' 15-il unità għall-erja taħt il-kurva tal-konċentrazzjoni tal-insulin lispro fis-serum u l-hin minn punt ta' żmien ta' żero sal-infinita u C_{max} . L-assorbiment aċċellerat tal-insulin lispro wara l-ghoti ta' 200 unità/mL kien simili għal dak osservat b'Lyumjev 100 unità/mL. M'hemmx bżonn ta' bidla fid-doża jekk pazjent jinqaleb minn qawwa għal oħra.

Distribuzzjoni

Il-medja ġeometrika (CV%) tal-volum ta' distribuzzjoni tal-insulin lispro (V_d - *volume of distribution*) kien ta' 34 L (30%) wara għoti ġol-vini ta' Lyumjev bħala injezzjoni bolus ta' doża ta' 15-il unità f'individwi f'saħħithom.

Eliminazzjoni

Il-medja ġeometrika (CV%) tat-tneħħija tal-insulin lispro kienet ta' 32 L/siegħa (22%) u l-half-life medjana tal-insulin lispro kienet ta' 44 minuta wara għoti ġol-vini ta' Lyumjev bħala injezzjoni bolus ta' doża ta' 15-il unità f'individwi f'saħħithom.

Popolazzjonijiet speċjali

L-età, is-sess, u r-razza ma affettwawx il-farmakokinetika u l-farmakodinamika ta' Lyumjev.

Popolazzjoni pedjatrika

Tfal (8 – 11 -il sena) u adolexxenti (12 – 17 -il sena) bid-dijabete tat-tip 1 fuq terapija ta' injezzjonijiet multipli ta' kuljum (MDI- *multiple daily injection*) u CSII ġew studjati f'metodu ta' *cross-over* sabiex tiġi evalwata l-farmakokinetika u l-farmakodinamika ta' insulin lispro wara doża ta' 0.2 unitajiet/kg ta' Lyumjev u Humalog.

Id-differenzi farmakokinetiċi bejn Lyumjev u Humalog kienu, b'mod ġenerali, simili fit-tfal u fl-adolexxenti bħal dawk osservati fl-adulti. Wara injezzjoni minn taħt il-ġilda, Lyumjev wera assorbiment aċċelerat bl-espożizzjoni bikrija ta' insulin lispro tkun oġġla fit-tfal (8 – 11 -il sena) u fl-adolexxenti (12 – 17 -il sena) waqt li nżammu b'mod simili l-espożizzjoni totali, il-konċentrazzjoni massima u ż-żmien għall-konċentrazzjoni massima meta mqabbla ma' Humalog. Wara infużjoni bolus minn taħt il-ġilda b'terapija CSII, kien hemm tendenza lejn assorbiment aċċelerat fit-tfal u fl-adolexxenti waqt li l-espożizzjoni totali, il-konċentrazzjoni massima u ż-żmien għall-konċentrazzjoni massima kienu simili meta mqabbla ma' Humalog.

Pazjenti b'indeboliment tal-kliewi u tal-fwied

Indeboliment tal-kliewi u tal-fwied mhux magħruf li għandu impatt fuq il-farmakokinetika tal-insulin lispro.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta' sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dozi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, riskju ta' kanċer, effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva u l-iżvilupp, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin wara esponiment għall-insulin lispro.

6. TAGHRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta' eċċipjenti

Glycerol
Magnesium chloride hexahydrate
Metacresol
Sodium citrate dihydrate
Trepstinil sodium
Zinc oxide
Ilma għall-injezzjonijiet
Hydrochloric acid u sodium hydroxide (għall-aġġustament tal-pH)

6.2 Inkompattibbiltajiet

Dan il-prodott mediċinali m'għandux jithallat ma' kwalunkwe insulina oħra jew ma' prodotti mediċinali oħrajn hliet dawg imsemmija f'sezzjoni 6.6.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Lyumjev 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ

Lyumjev 100 unità/mL KwikPen soluzzjoni għall-injezzjoni f'pinna mimlija għal-lest

Lyumjev 100 unità/mL Junior KwikPen soluzzjoni għall-injezzjoni f'pinna mimlija għal-lest

Lyumjev 100 unità/mL Tempo Pen soluzzjoni għall-injezzjoni f'pinna mimlija għal-lest

Qabel l-użu

3 snin

Wara l-ewwel użu

28 jum

Lyumjev 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni f'kunjett

Qabel l-użu

Sentejn

Wara l-ewwel użu

28 jum

Meta l-kunjett jiġi dilwit għal użu mill-vini

L-istabilità kimika u fiżika waqt l-użu ntweriet għal 14-il jum f'temperatura ta' 2 –8 °C u għal 20 siegħa f'temperatura ta' 20 – 25 °C meta jiġi protett mid-dawl. Mill-aspett mikrobijoloġiku, il-prodott mediċinali għandu jintuża immedjatament. Jekk ma jintużax immedjatament il-ħinijiet u l-kundizzjonijiet tal-ħażna qabel u waqt l-użu huma r-responsabbiltà ta' min ikun qed jużah u s-soltu ma jkunux aktar minn 24 siegħa f'temperatura ta' 2 - 8°C, hlief jekk ir-rikostituzzjoni/d-dilwizzjoni tkun saret f'kundizzjonijiet asemi kkontrollati u valutati (ara sezzjoni 6.6).

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Qabel l-użu

Aħżen fi frigġ (2 °C – 8 °C).

Tagħmlux fil-friza.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa' mid-dawl.

Wara l-ewwel użu

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 30 °C.

Tagħmlux fil-friza.

Lyumjev 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni f'kunjett

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa' mid-dawl.

Lyumjev 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ

Tagħmlux fil-frigġ.

Żomm l-għatu fuq il-pinna ladarba jiddaħħal l-iskartoċċ, sabiex tilqa' mid-dawl.

Lyumjev 100 unità/mL KwikPen soluzzjoni għall-injezzjoni f'pinna mimlija għal-lest

Lyumjev 100 unità/mL Junior KwikPen soluzzjoni għall-injezzjoni f'pinna mimlija għal-lest

Lyumjev 100 unità/mL Tempo Pen soluzzjoni għall-injezzjoni f'pinna mimlija għal-lest

Tagħmlux fil-frigġ.

Żomm l-għatu fuq il-pinna sabiex tilqa' mid-dawl.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta' dak li hemm ġo fih

Lyumjev 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni f'kunjett

Kunjetti tal-ħġieġ ċar Tip I, issiġillati b'tappijiet tal-halobutyl u b'siġilli tal-aluminju.

Kunjett ta' 10 mL: Pakketti ta' kunjett 1 jew 2 kunjetti jew 5 kunjetti (5 pakketti ta' wieħed).

Lyumjev 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ

Skrataċ tal-ħġieġ ċar Tip I, issiġillati permezz ta' disks li jinżammu f'posthom b'siġilli tal-aluminju u plangers tal-butyl jew halobutyl.

Skartoċċ ta' 3 mL: Pakketti ta' 2, 5 jew 10 skrataċ.

Lyumjev 100 unità/mL KwikPen soluzzjoni għall-injezzjoni f'pinna mimlija għal-lest

Skrataċ tal-ħġieġ ċar Tip I, issiġillati permezz ta' disks li jinżammu f'posthom b'siġilli tal-aluminju u plangers tal-halobutyl.

L-iskrataċ ta' 3 mL huma ssiġillati fi KwikPen injettur għamla ta' pinna li jintrema wara l-użu.

Il-prodott mediċinali huwa ppakkjat f'kartuna bajda b'faxxi blu skuri u xbieha ta' pinna. Il-KwikPen hija ta' lewn griż fil-kannella, il-pum tad-doża huwa blu bi ħnieq imqabbża mal-ġenb.

KwikPen ta' 3 mL: Pakketti ta' 2 pinen mimlijin għal-lest, 5 pinen mimlijin għal-lest jew pakkett multiplu ta' 10 pinen mimlijin għal-lest (2 pakketti ta' 5).

Lyumjev 100 unità/mL Junior KwikPen soluzzjoni għall-injezzjoni f'pinna mimlija għal-lest

Skrataċ tal-ħġieġ ċar Tip I, issiġillati permezz ta' disks li jinżammu f'posthom b'siġilli tal-aluminju u plangers tal-halobutyl.

L-iskrataċ ta' 3 mL huma ssiġillati f'Junior KwikPen injettur għamla ta' pinna li jintrema wara l-użu.

Il-prodott mediċinali huwa ppakkjat f'kartuna bajda b'faxxi lewn il-ħawħa, blu ċari u blu skuri u xbieha ta' pinna. Il-Junior KwikPen hija ta' lewn griż fil-kannella, il-pum tad-doża huwa lewn il-ħawħa bi ħnieq imqabbża fit-tarf u mal-ġenb.

Junior KwikPen ta' 3 mL: Pakketti ta' 2 pinen mimlijin għal-lest, 5 pinen mimlijin għal-lest jew pakkett multiplu ta' 10 pinen mimlijin għal-lest (2 pakketti ta' 5).

Lyumjev 100 unità/mL Tempo Pen soluzzjoni għall-injezzjoni f'pinna mimlija għal-lest

Skrataċ tal-ħġieġ ċar Tip I, issiġillati permezz ta' disks li jinżammu f'posthom b'siġilli tal-aluminju u plangers tal-halobutyl.

L-iskrataċ ta' 3 mL huma ssiġillati f'injettur Tempo Pen b'għamla ta' pinna li jintrema wara l-użu. It-Tempo Pen fiha kalamita (ara sezzjoni 4.4).

Il-prodott mediċinali huwa ppakkjat f'kartuna bajda bi strippi ta' faxex blu skuri u ħodor. It-Tempo Pen hija ta' lewn griż fil-kannella, il-pum tad-doża huwa blu bi ħnieq imqabbża madwar il-ġenb kollu.

Tempo Pen ta' 3 mL: Pakketti ta' 5 pinen mimlijin għal-lest jew pakkett multiplu ta' 10 (2 pakketti ta' 5) pinen mimlijin għal-lest.

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkun fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi u għal immaniġġar ieħor

Lyumjev irid jidher ċar u bla kulur. Huwa m'għandux jintuża jekk jidher imdardar, ikollu kulur, jew jekk jidher li fih xi frak jew ċapep.

Lyumjev ma jridx jintuża jekk ikun ġie ffrizat.

Għandha dejjem tehel labra ġdida qabel kull użu. Il-labar m'għandhomx jerggħu jintużaw mill-ġdid. Il-labar mhumiex inkluzi.

Lyumjev 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni f'kunjett

Użu għal ġol-vini

Il-kunjett ta' Lyumjev 100 unità/mL jista' jiġi dilwit għal konċentrazzjonijiet ta' 0.1 sa 1.0 unità/mL f'soluzzjoni għall-injezzjoni ta' 5% glucose jew f'soluzzjoni għall-injezzjoni ta' 9 mg/mL (0.9%) sodium chloride għal użu fil-vini. Intweriet kompatibilità f'boroż tal-ethylene-propylene copolymer u tal-polyolefin b'polyvinyl chloride.

Huwa rrakkomandat li s-sistema tiġi pprajmjata qabel tibda l-infużjoni lill-pazjent.

CSII

Il-kunjett Lyumjev 100 unità/mL jista' jintuża biex timla pompa għall-infużjoni kontinwa tal-insulina għal massimu ta' 9 ijiem. Pajps li fihom il-materjal tal-wiċċ ta' ġewwa jkun magħmul minn polyethylene jew polyolefin ġew evalwati u nstabu kompatibbli għall-użu mal-pompa.

Lyumjev 100 unità/mL Tempo Pen soluzzjoni għall-injezzjoni f'pinna mimlija għal-lest

It-Tempo Pen hija magħmula biex taħdem mat-Tempo Smart Button. It-Tempo Smart Button huwa prodott li wiehded jista' jagħzel biex iwahhal fuq il-pum tad-doża tat-Tempo Pen u jgħin biex jittrasmetti informazzjoni dwar id-doża ta' Lyumjev mit-Tempo Pen għal applikazzjoni ċellulari kompatibbli. It-Tempo Pen jinjetta insulina bi jew mingħajr it-Tempo Smart Button imwaħħal. Sabiex tittrasmetti dejta lejn l-applikazzjoni ċellulari, segwi l-istruzzjonijiet ipprovduti mat-Tempo Smart Button u l-istruzzjonijiet mal-applikazzjoni ċellulari.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa' wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-igijiet lokali.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Eli Lilly Nederland B.V.
Papendorpseweg 83
3528 BJ Utrecht
L-Olanda

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/1/20/1422/001
EU/1/20/1422/002
EU/1/20/1422/003
EU/1/20/1422/004
EU/1/20/1422/005

EU/1/20/1422/006
EU/1/20/1422/007
EU/1/20/1422/008
EU/1/20/1422/009
EU/1/20/1422/010
EU/1/20/1422/011
EU/1/20/1422/012
EU/1/20/1422/016
EU/1/20/1422/017

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 24 Marzu 2020

Data tal-aħħar tiġdid:

10. DATA TA' REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini <http://www.ema.europa.eu>

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Lyumjev 200 unità/mL KwikPen soluzzjoni għall-injezzjoni f'pinna mimlija għal-lest

2. GHAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull mL fih 200 unità ta' insulin lispro* (ekwivalenti għal 6.9 mg).

Kull pinna mimlija għal-lest fiha 600 unità ta' insulin lispro fi 3 mL ta' soluzzjoni.

Kull KwikPen tagħti 1-60 unità f'passi ta' unità waħda f'injezzjoni waħda.

* magħmul f'*E.coli* permezz ta' teknoloġija tat-tfassil tad-DNA.

Għal-lista sħiħa ta' eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-injezzjoni.

Soluzzjoni akweja, ċara, u mingħajr kulur.

4. TAGHRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Trattament tad-dijabete mellitus fl-adulti.

4.2 Pożoloġija u metodu ta' kif għandu jingħata

Pożoloġija

Lyumjev huwa insulina għall-injezzjoni taħt il-ġilda li jingħata f'hin l-ikel u għandu jingħata minn żero sa żewġ minuti qabel il-bidu tal-ikla, bl-għażla li jingħata sa 20 minuta wara li tkun bdiet l-ikla (ara sezzjoni 5.1).

Id-doża inizjali għandha tikkunsidra t-tip tad-dijabete, il-piż tal-pazjent u l-livelli ta' glucose fid-demm tagħhom.

Għandu jiġi kkunsidrat il-bidu bikri ta' azzjoni meta jiġi preskritt Lyumjev (ara sezzjoni 5.1). L-aġġustament kontinwu tad-doża ta' Lyumjev għandu jkun ibbażat fuq il-bżonnijiet metabolici tal-pazjent, ir-riżultati tal-monitoraġġ tal-glucose fid-demm u l-mira tal-kontroll glicemiku. Jistgħu jkunu meħtieġa aġġustamenti fid-doża, meta taqleb minn insulina oħra, meta jkun hemm bidliet fl-attività fiżika, bidliet fil-prodotti mediċinali konkometanti, bidliet fit-teħid tal-ikel (jiġifieri, ammont u tip ta' ikel, hin tal-ikel), bidliet fil-funzjoni tal-kliewi jew tal-fwied jew waqt mard akut biex jitnaqqas ir-riskju ta' ipoglicemija jew iperglicemija (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.5).

Meta taqleb minn prodott mediċinali ieħor ta' insulina li tingħata f'hin l-ikel

Jekk taqleb minn insulina oħra li tingħata f'hin l-ikel għal Lyumjev, il-bidla tista' ssir abbażi ta' unità għal unità. Il-qawwa tal-analogi tal-insulina, inkluż Lyumjev, hija espressa f'unitajiet. Unità waħda (1)

ta' Lyumjev tikkorrispondi għal unità internazzjonali (IU, *international unit*) waħda ta' insulina umana jew unità waħda ta' analogi oħra tal-insulina li jaħdmu malajr.

Doži maqbuża

Il-pazjenti li jinsew doża li tittiehed f'hin l-ikel għandhom jimmonitorjaw il-livell ta' glucose fid-demm tagħhom biex jiddeciedu jekk hijiex meħtieġa doża ta' insulina, u għandhom ikomplu bl-iskeda ta' dożaġġ tas-soltu tagħhom fl-ikla li jmiss.

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani

Is-sigurtà u l-effikaċja ta' Lyumjev ġew stabbiliti f'pazjenti anzjani b'età ta' 65 sa 75 sena. Huwa rakkomandat monitoraġġ tal-glucose mill-qrib u d-doża tal-insulina għandha tiġi aġġustata fuq bażi individwali (ara sezzjonijiet 4.8, 5.1 u 5.2). L-esperjenza terapewtika f'pazjenti b'età ta' ≥ 75 sena hija limitata.

Indeboliment tal-kliewi

Il-ħtieġa għall-insulina għandha mnejn tiġi mnaqqsa fil-preżenza ta' indeboliment tal-kliewi. F'pazjenti b'indeboliment tal-kliewi, il-monitoraġġ tal-glucose għandu jiġi intensifikat u d-doża għandha tiġi aġġustata fuq bażi individwali.

Indeboliment tal-fwied

Il-ħtieġa ta' insulina għandha mnejn tiġi mnaqqsa f'pazjenti b'indeboliment tal-fwied minhabba kapacià ta' glukoneoġenesi mnaqqsa u tnaqqis fit-tkissir tal-insulina. F'pazjenti b'indeboliment tal-fwied, il-monitoraġġ tal-glucose għandu jiġi intensifikat u d-doża għandha tiġi aġġustata fuq bażi individwali.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta' Lyumjev 200 unità/mL fi tfal u fl-adolesxenti b'età inqas minn 18-il sena ma ġewx determinati.

Metodu ta' kif għandu jingħata

Il-pazjenti għandhom jiġu mharrġa fl-użu xieraq u t-teknika tal-injezzjoni qabel ma jibdwu Lyumjev. Il-pazjenti għandhom jingħataw parir biex:

- Dejjem jiċċekkjaw it-tikketti tal-insulina qabel l-ġhoti.
- Jispezzjonaw Lyumjev viżwalment qabel l-użu u jarmuh jekk ikun hemm xi frak jew bidla fil-kulur.
- Is-siti tal-injezzjoni għandhom dejjem jinbidlu fl-istess reġjun sabiex jitnaqqas ir-riskju ta' lipodistrofija u ta' amilojdoži tal-ġilda (ara sezzjoni 4.4 u 4.8).
- Meta jinjettaw ikunu ċerti li ma daħlux f'xi kanal tad-demm.
- Jarmu l-labra wara kull injezzjoni.
- Jarmu l-apparat jekk xi parti tidher miksur jew bil-ħsara.
- Iggorru metodu ta' ġhoti żejjed jew alternattiv f'każ li s-sistema tal-ġhoti tagħhom tinkiser.

Lyumjev għandu jiġi injettat taħt il-ġilda fl-addome, fil-parti ta' fuq tad-driegħ, fil-koxxa jew fil-warrani (ara sezzjoni 5.2).

Ġeneralment Lyumjev għandu jintuża flimkien ma' insulina li taħdem għal żmien intermedju jew fit-tul. Għandu jintuża sit differenti għall-injezzjoni jekk tkun qed tinjetta insulina oħra fl-istess hin.

Lyumjev 200 unità/mL KwikPen huwa adattat biss għall-injezzjonijiet taħt il-ġilda.

Lyumjev 200 unità/mL m'għandux jingħata permezz ta' pompa għall-infużjoni kontinwa ta' insulina (CSII) taħt il-ġilda.

Lyumjev 200 unità/mL m'għandux jingħata ġol-vini.

Lyumjev huwa disponibbli f'żewġ konċentrazzjonijiet: Lyumjev 200 unità/mL KwikPen u Lyumjev 100 unità/mL KwikPen. Ara l-SmPC separat ta' Lyumjev 100 unità/mL KwikPen. Il-KwikPen tagħti 1 - 60 unità f'passi ta' unità waħda f'injezzjoni waħda. In-numru ta' unitajiet tal-insulina jintwera fit-tieqa tad-doża tal-pinna irrispettivament mill-konċentrazzjoni u m'għandhiex issir bidla fid-doża meta l-pazjent jiġi trasferit għal konċentrazzjoni ġdida jew għal pinna b'pass ta' doża differenti.

Għal istruzzjonijiet dettaljati, jekk jogħġbok irreferi għall-istruzzjonijiet għall-użu pprovduti mal-fuljett ta' tagħrif.

Sabiex tiġi evitata t-trasmissjoni possibbli ta' mard, kull pinna għandha tintuża minn pazjent wieħed biss, anke jekk il-labra tinbidel.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Ipoglicemija.

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe sustanza mhux attiva elenkata fis-sezzjoni 6.1.

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Traċċabilità

Sabiex tittejjeb it-traċċabilità tal-prodotti mediċinali bijoloġiċi, l-isem u n-numru tal-lott tal-prodott mediċinali amministrat għandhom jiġu rrekordjati b'mod ċar.

Ipoglicemija

L-ipoglicemija hija l-aktar reazzjoni avversa komuni ta' terapija bl-insulina (ara sezzjoni 4.8). Iż-żmien meta ssehh l-ipoglicemija ġeneralment jirrifletti l-profil tal-azzjoni mal-ħin tal-formulazzjonijiet tal-insulina mogħtija. L-ipoglicemija tista' ssehh aktar kmieni wara injezzjoni meta mqabbla ma' insulini oħra li jingħataw f'ħin ikel minhabba bidu aktar kmieni tal-azzjoni ta' Lyumjev (ara sezzjoni 5.1).

L-ipoglicemija tista' ssehh f'daqqa u s-sintomi jistgħu jvarjaw f'kull individwu u jinbidlu maż-żmien fl-istess individwu. Ipoglicemija severa tista' tikkawża aċċessjonijiet, tista' twassal għal telf ta' koxjenza, tista' tkun ta' periklu għall-ħajja, jew tikkawża mewt. L-għarfien sintomatiku tal-ipoglicemija jista' jkun inqas ovvju f'pazjenti b'dijabete li ilha għal żmien twil.

Iperglicemija

L-użu ta' dozi mhux adegwati jew it-twaqqif tat-trattament, speċjalment f'pazjenti li għandhom bżonn l-insulina, jistgħu jwasslu għal iperglicemija u ketoacidożi diabetika; kundizzjonijiet li jistgħu jkunu letali.

Il-pazjenti għandhom jiġu edukati biex jagħrfu s-sinjali u s-sintomi ta' ketoacidożi u biex iġibu għajnnu immedjament meta tiġi suspettata ketoacidożi.

Teknika ta' Injezzjoni

Il-pazjenti għandhom jingħataw istruzzjonijiet biex iwettqu rotazzjoni kontinwa tas-sit tal-injezzjoni biex jitnaqqas ir-riskju ta' żvilupp ta' lipodistrofija u ta' amilojdożi tal-ġilda. Hemm riskju potenzjali ta' assorbiment imdewwem tal-insulina u kontroll glicemiku aggravat wara l-injezzjonijiet tal-insulina f'siti b'dawn ir-reazzjonijiet. Bidla f'daqqa fis-sit tal-injezzjoni f'parti mhux affettwata giet irrappurtata li tirriżulta f'ipoglicemija. Huwa rakkomandat monitoraġġ tal-glukożju fid-demm wara l-

bidla fis-sit tal-injezzjoni, u jista' jiġi kkunsidrat l-aġġustament tad-doża ta' medikazzjonijiet antidiabetiċi.

Bidliet fil-ħtieġa ta' insulina u aġġustamenti fid-doża

Bidliet fil-insulina, fil-koncentrazzjoni tal-insulina, fil-manifattur, fit-tip, jew fil-metodu tal-ġħoti jistgħu jaffettwaw il-kontroll glicemiku u jippredisponu għall-ipoglicemija jew iperglicemija. Dawn il-bidliet għandhom isiru b'attenzjoni u taħt sorveljanza medika mill-qrib biss u l-frekwenza tal-monitoraġġ tal-glucose għandha tiżdied. Għal pazjenti bid-dijabete tat-tip 2, jistgħu jkunu meħtieġa aġġustamenti fid-doża ta' trattament konkomitanti kontra d-dijabete (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.5).

F'pazjenti b'indeboliment tal-kliewi jew tal-fwied, il-monitoraġġ tal-glucose għandu jiġi intensifikat u d-doża għandha tiġi aġġustata fuq bażi individwali (ara sezzjoni 4.2).

Il-ħtieġa ta' insulina tista' tiżdied waqt mard jew disturbi emozzjonali.

Aġġustament fid-doża jista' jkun meħtieġ ukoll jekk il-pazjenti jkollhom żieda fl-attività fiżika jew bidla fid-dieta tas-soltu. Eżerċizzju immedjatament wara iklja jista' jżid ir-riskju ta' ipoglicemija.

Thiazolidinediones (TZDs) użati flimkien mal-insulina

TZDs jistgħu jikkawżaw żamma ta' fluwidu relatata mad-doża, speċjalment meta jintużaw flimkien mal-insulina. Iż-żamma ta' fluwidu tista' twassal għal jew taggrava l-insuffiċjenza tal-qalb. Pazjenti ttrattati bl-insulina u TZD għandhom jiġu osservati għal sinjali u sintomi ta' insuffiċjenza tal-qalb. Jekk tiżviluppa insuffiċjenza tal-qalb, ikkunsidra it-twaqqif ta' TZD.

Sensittività eċċessiva u reazzjonijiet allergiċi

Allergija severa, ta' periklu għall-ħajja, ġeneralizzata, inkluża anafilassi, tista' sseħħ bi prodotti mediċinali tal-insulina, inkluż Lyumjev (ara sezzjoni 4.8). Jekk isehħu reazzjonijiet ta' sensittività eċċessiva, waqqaf Lyumjev.

Żbalji fl-ġħoti tal-medikazzjoni

Lyumjev m'għandux jintuża minn pazjenti b'indeboliment fil-vista mingħajr l-għajnuna ta' persuna mħarrġa.

Biex jiġu evitati żbalji fl-ġħoti tal-medikazzjoni bejn Lyumjev u insulini oħra, il-pazjenti jeħtieġu li dejjem jiċċekkjaw it-tikketta tal-insulina qabel kull injezzjoni.

Titrasferixxi insulina mill-Pinna Lyumjev 200 unità/mL għal siringa. Il-marki fuq is-siringa tal-insulina ma jkejlux id-doża b'mod korrett u dan jista' jwassal għal doża eċċessiva u ipoglicemija severa.

Il-pazjenti dejjem għandhom jużaw labra ġdida għal kull injezzjoni biex jevitaw infezzjonijiet u labra imblukkata. F'każ ta' labra imblukkata din għandha tinbidel b'labra ġdida.

Eċċipjenti

Dan il-prodott mediċinali fih anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f'kull doża, jiġifieri essenzjalment "ħieles mis-sodium".

4.5 Interazzjoni ma' prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta' interazzjoni

Is-sustanzi li ġejjin jistgħu jnaqqsu l-ħtieġa tal-insulina: Prodotti mediċinali kontra d-dijabete (orali jew li jingħataw permezz ta' injezzjoni), *salicylates*, *sulphonamides*, ċerti anti-depressanti (inibituri ta' monoamine oxidase (MAOIs - *monoamine oxidase inhibitors*), inibituri selettivi tat-tehid mill-ġdid ta'

serotonin), inibituri tal-enzima li tikkonverti l-angiotensin (ACE - *angiotensin converting enzyme*), sustanzi li jimblukkaw ir-riċetturi ta' angiotensin II, jew analogi ta' somatostatin.

Is-sustanzi li ġejjin jistgħu jżidu l-htieġa tal-insulina: kontraċettivi orali, kortikosteroidi, ormoni tat-tirojde, danazol, sustanzi simpatomimetici, diuretici, jew ormon tat-tkabbir.

L-alkohol jista' jżid jew inaqqas l-effett ta' Lyumjev li jbaxxi l-glucose fid-demm. Il-konsum ta' ammonti kbar ta' ethanol flimkien mal-użu tal-insulina jistgħu jwasslu għal ipoglicemija severa.

Imblokkaturi tar-riċetturi Beta jistgħu jnaqqsu s-sinjali u s-sintomi tal-ipoglicemija.

TZDs jistgħu jikkażaw żamma ta' fluwidu marbuta mad-doża, b'mod partikolari meta jintużaw flimkien mal-insulina, u jistgħu jġieghlu insuffiċjenza tal-qalb tmur għall-aġħar (ara sezzjoni 4.4).

4.6 Fertilità, tqala u treddigh

Tqala

Ammont kbir ta' *data* dwar nisa tqal (aktar minn 1 000 rizultat ta' tqala) juri li m'hemm l-ebda effett ta' formazzjoni difettuża jew effetti tossici fil-fetu/tarbija tat-twelid ta' insulin lispro. Lyumjev jista' jintuża' waqt it-tqala, jekk hemm bżonn kliniku għalih.

Huwa essenzjali li jinżamm kontroll tajjeb ta' pazjenta bid-dijabete (dipendenti mill-insulina jew ta' waqt it-tqala) ittrattata bl-insulina matul it-tqala. Il-htieġa tal-insulina generalment tonqos matul l-ewwel trimestru u tiżdied matul it-tieni u t-tielet trimestri. Wara l-hlas, il-htieġa tal-insulina normalment tmur lura malajr għall-valuri ta' qabel it-tqala. Il-pazjenti bid-dijabete għandhom jingħataw parir biex jinfurmaw lit-tabib tagħhom jekk joħorġu tqal jew jekk qed jippjanaw biex joħorġu tqal. Monitoraġġ b'attenzjoni tal-kontroll tal-glucose huwa essenzjali f'pazjenti tqal bid-dijabete.

Treddigh

Lyumjev jista' jintuża' waqt it-treddigh. Pazjenti bid-dijabete li jkunu qed iredgħu jista' jkollhom bżonn aġġustamenti fid-doża tal-insulina, fid-dieta jew fit-tnejn.

Fertilità

Fi studji fuq l-annimali insulin lispro ma kkawżatx indeboliment fil-fertilità.

4.7 Effetti fuq il-hila biex issuq u thaddem magni

Il-hila tal-pazjent li jikkonċentra u jirreaġixxi tista' tonqos minhabba l-ipoglicemija. Dan jista' jikkostitwixxi riskju f'sitwazzjonijiet fejn dawn il-kapaċitajiet huma ta' importanza speċjali (eż. sewqan ta' karozza jew użu ta' makkinarju).

Il-pazjenti għandhom jiġu avżati biex jieħdu prekawzjonijiet biex jevitaw l-ipoglicemija waqt is-sewqan, dan huwa partikolarment importanti f'dawk il-pazjenti li jkollhom għarfien imnaqqas jew ma jgħarfux is-sinjali ta' twissija ta' ipoglicemija jew li jkollhom episodji frekwenti ta' ipoglicemija. F'dawn iċ-ċirkostanzi għandu jiġi kkunsidrat jekk is-sewqan hux xieraq.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

L-aktar reazzjoni avversa rrapportata b'mod frekwenti waqt it-trattament hija l-ipoglicemija (komuni hafna)(ara sezzjonijiet 4.2, 4.4 u 4.9).

Ir-reazzjonijiet avversi relatati mill-provi kliniċi li ġejjin huma elenkati hawn taht bħala terminu ppreferut MedDRA skont il-klassi tas-sistemi u tal-organi u skont il-frekwenza bl-aktar frekwenti l-ewwel (komuni ħafna: $\geq 1/10$; komuni: $\geq 1/100$ sa $< 1/10$; mhux komuni: $\geq 1/1\,000$ sa $< 1/100$; rari: $\geq 1/10\,000$ sa $< 1/1\,000$; rari ħafna: $< 1/10\,000$) u mhux magħruf (ma tistax tittiehed stima mid-*data* disponibbli). F'kull grupp ta' frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma ppreżentati bl-aktar serji mniżżla l-ewwel.

Tabella 1. Reazzjonijiet avversi

Klassi tas-sistemi u tal-organi MedDRA	Komuni ħafna	Komuni	Mhux komuni	Mhux magħruf
Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni	Ipoglicemija			
Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta' mnejn jingħata		Reazzjonijiet allergiċi*	Edima	
		Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni		
Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta' taht il-ġilda			Lipodistrofija	Amiloidożi tal-ġilda
			Raxx	
			Ħakk	

*Ara sezzjoni 4.8 Deskrizzjoni ta' reazzjonijiet avversi magħżula

Deskrizzjoni ta' reazzjonijiet avversi magħżula

Ipoglicemija

L-ipoglicemija hija l-aktar reazzjoni avversa osservata b'mod komuni f'pazjenti li jużaw l-insulina. L-inċidenza ta' ipoglicemija severa fl-istudji kliniċi ta' fażi 3 li damu 26 ġimgħa kienet 5.5% f'pazjenti b'dijabete mellitus tat-tip 1 u 0.9% f'pazjenti b'dijabete tat-tip 2 (ara t-tabelli 2 u 3). Is-sintomi tal-ipoglicemija ġeneralment isehħu f'daqqa. Dawn jistgħu jinkludu nuqqas ta' attenzjoni, konfużjoni, palpitazzjonijiet, għaraq, rimettar, u uġiġħ ta' ras.

Matul l-istudji kollha ma kien hemm l-ebda differenzi klinikament sinifikanti fil-frekwenza tal-ipoglicemija bejn l-ġhoti ta' Lyumjev jew ta' komparatur (prodott mediċinali ieħor li fih l-insulin lispro). Fi studji fejn Lyumjev u l-komparatur ingħataw f'ħinijiet differenti skont l-ikliet, ma kien hemm l-ebda differenza klinikament rilevanti fil-frekwenza tal-ipoglicemija.

L-ipoglicemija tista' ssehħ aktar kmieni wara injezzjoni ta' Lyumjev meta mqabbla ma' insulini oħra li jingħataw f'ħin ikel minħabba l-bidu aktar kmieni tal-azzjoni.

Reazzjonijiet allergiċi

Allergija severa, ġeneralizzata, ta' periklu għall-ħajja, inkluża anafilassi, reazzjonijiet ġeneralizzati fil-ġilda, angjoedima, bronkospazmu, pressjoni baxxa u xokk tista' ssehħ bi kwalunkwe insulina, inkluż Lyumjev.

Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni

Bħal b'terapija oħra bl-insulina, il-pazjenti jista' jkollhom raxx, ħmura, infjammazzjoni, uġiġħ, tbengil jew ħakk fis-sit tal-injezzjoni ta' Lyumjev. Dawn ir-reazzjonijiet ġeneralment ikunu ħfief u ġeneralment jgħaddu waqt trattament kontinwu.

Immunogeniċità

L-ghoti tal-insulina jista' jikkawża l-formazzjoni ta' antikorpi għall-insulina. Il-preżenza ta' antikorpi kontra l-mediċina ma kellhiex effett klinikament sinifikanti fuq il-farmakokinetika, l-effikaċja, jew is-sigurtà ta' Lyumjev.

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta' taħt il-ġilda

Lipodistrofija u amilojdożi tal-ġilda jistgħu jseħħu fis-sit tal-injezzjoni u jdewmu l-assorbiment tal-insulina lokali. Rotazzjoni kontinwa tas-sit tal-injezzjoni f'din il-parti partikolari tal-injezzjoni tista' tgħin sabiex jitnaqqas jew jiġi evitat ir-riskju li jiżviluppaw dawn ir-reazzjonijiet (ara sezzjoni 4.4).

Edima

Każijiet ta' edima ġew irrappurtati bit-terapija tal-insulina, partikolarment jekk il-kontroll metaboliku li qabel ma kienx adegwat jiġi mtejjeb permezz ta' terapija intensifikata ta' insulina.

Popolazzjonijiet speċjali

Abbażi ta' riżultati minn provi kliniċi bl-insulin lispro b'mod ġenerali, il-frekwenza, it-tip u s-severità tar-reazzjonijiet avversi osservati f'pazjenti anzjani u f'pazjenti b'indeboliment tal-kliewi jew tal-fwied ma jindikaw l-ebda differenza mqabbel mal-esperjenza usa' fil-popolazzjoni ġenerali. L-informazzjoni dwar is-sigurtà f'pazjenti anzjani hafna (≥ 75 sena) jew f'pazjenti b'indeboliment moderat sa sever tal-kliewi jew b'indeboliment tal-fwied hija limitata (ara sezzjoni 5.1).

Rappurtar ta' reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali imniżżla f' [Appendiċi V](#).

4.9 Doża eċċessiva

Doża eċċessiva tikkawża ipoglicemija b'sintomi li jakkumpanjawha li jinkludu nuqqas ta' attenzjoni, konfużjoni, palpitazzjonijiet, għaraq, rimettar, u uġiġħ ta' ras.

L-ipoglicemija tista' sseħħ bħala riżultat ta' insulin lispro żejda meta mqabbla mal-konsum tal-ikel, hekk ta' enerġija jew it-tnejn. Episodji ħfief ta' ipoglicemija ġeneralment jistgħu jiġu ttrattati permezz ta' glucose mill-ħalq. Episodji aktar severi b'koma, aċċessjoni, jew indeboliment newroloġiku jistgħu jiġu ttrattati permezz ta' glucagon jew glucose kkonċentrat ġol-vini. Jistgħu jkunu meħtieġa teħid sostnut ta' karboidrati u osservazzjoni peress li l-ipoglicemija tista' terġa' sseħħ mill-ġdid wara rkupru kliniku evidenti. Jistgħu jkunu meħtieġa aġġustamenti fid-doża tal-prodott mediċinali, fl-ammont, tip u hin tal-ikliet, jew fl-eżerċizzju.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Prodotti mediċinali użati fid-dijabete, insulini u analogi għall-injezzjoni, li jaġixxu malajr, Kodiċi ATC: A10AB04

Mekkaniżmu ta' azzjoni

L-attività primarja ta' Lyumjev hija r-regolazzjoni tal-metaboliżmu tal-glucose. L-insulini, inkluża l-insulin lispro, is-sustanza attiva f'Lyumjev, jeżerċitaw l-azzjoni speċifika tagħhom billi jintrabtu mar-riċetturi tal-insulina. L-insulina marbuta mar-riċetturi tbaxxi l-glucose fid-demm billi tistimula l-assorbiment periferali tal-glucose mill-muskoli skeletriċi u x-xaħam u billi tinibixxi l-produzzjoni tal-glucose mill-fwied. L-insulini jinibixxu l-lipolisi u l-proteolisi, u jtejbju s-sintesi tal-proteini.

Lyumjev huwa formulazzjoni ta' insulin lispro li fiha citrate u treprostinil. Citrate iżid il-permeabilità vaskulari lokali u treprostinil jinduċi vażodilatazzjoni lokali biex jinkiseb assorbiment aċċellerat tal-insulin lispro.


Effetti farmakodinamiċi

Azzjoni bikrija u ttardjata tal-insulina

Twettaq studju ta' *glucose clamp* fuq 40 pazjent bid-dijabete tat-tip 1 li ngħataw Lyumjev u Humalog taħt il-ġilda b'ha doża waħda ta' 15 unità. Ir-riżultati huma pprovduti fil-Figura 1. Lyumjev intwera li huwa potenti daqs Humalog abbażi ta' unità għal unità iżda l-effett tiegħu huwa aktar mgħagġel b'tul ta' azzjoni iqsar.

- Il-bidu ta' azzjoni ta' Lyumjev kien 20 minuta wara d-doża, 11-il minuta aktar malajr minn Humalog.
- Matul l-ewwel 30 minuta wara d-doża, Lyumjev kellu effett ta' tnaqqis tal-glucose ta' 3 darbiet akbar meta mqabbel ma' Humalog.
- L-effett li jbaxxi l-glucose massimu ta' Lyumjev seħh bejn siegħa u 3 sigħat wara l-injezzjoni.
- L-azzjoni ttardjata tal-insulina, minn 4 sigħat sat-tmien tal-*glucose clamp*, kienet 54% inqas b'Lyumjev minn dak osservat bi Humalog.
- It-tul ta' azzjoni ta' Lyumjev kien ta' 5 sigħat, 44 minuta iqsar minn Humalog.
- Il-glucose totali infuż waqt il-*clamp* kien komparabbli bejn Lyumjev u Humalog.

Figura 1. Rata ta' infużjoni ta' glucose (GIR - *glucose infusion rate*) medja f'pazjenti b'dijabete tat-tip 1 wara injezzjoni taħt il-ġilda ta' Lyumjev jew Humalog (doża ta' 15-il unità)



Bl-istess mod, azzjoni bikrija tal-insulina aktar mgħagġla u azzjoni ttardjata tal-insulina mnaqqsa ġew osservati b'Lyumjev f'pazjenti bid-dijabete tat-tip 2.

L-effett totali u massimu ta' tnaqqis ta' glucose ta' Lyumjev żdied mad-doża fil-firxa tad-doża terapewtika. Il-bidu bikri ta' azzjoni u l-azzjoni totali tal-insulina kienu simili meta Lyumjev ingħata fl-addome, fil-parti ta' fuq tad-driegħ jew fil-koxxa.

Tnaqqis ta' Glucose wara l-Ikel (PPG - Postprandial Glucose)

Lyumjev naqqas il-PPG waqt ikla standardizzata li ngħatat għall-ittestjar fuq il-perjodu shiħ ta' 5 sigħat tal-ikla li ngħatat għall-ittestjar (bidla mill-erja taħt il-kurva (AUC-area under the curve) ta' qabel l-ikla (0-5sigħat)) meta mqabbel ma' Humalog.

- F'pazjenti bid-dijabete tat-tip 1, Lyumjev naqqas il-PPG matul il-perjodu ta' 5 sigħat tal-ikla li ngħatat għall-ittestjar bi 32% meta ngħata fil-bidu tal-ikla u bi 18% meta ngħata 20 minuta wara l-bidu tal-ikla mqabbel ma' Humalog.
- F'pazjenti bid-dijabete tat-tip 2, Lyumjev naqqas il-PPG matul il-perjodu ta' 5 sigħat tal-ikla li ngħatat għall-ittestjar bi 26% meta ngħata fil-bidu tal-ikla u b'24% meta ngħata 20 minuta wara l-bidu tal-ikla mqabbel ma' Humalog.

Paragun ta' Lyumjev 200 unità/mL u Lyumjev 100 unità/mL

It-tnaqqis massimu u totali tal-glucose kienu komparabbli għal Lyumjev 200 unità/mL jew Lyumjev 100 unità/mL. M'hemmx bżonn ta' bidla fid-doża jekk pazjent jinqaleb minn qawwa għal ohra.

Effikaċja klinika u sigurtà

L-effikaċja ta' Lyumjev giet evalwata fi 2 provi *randomised*, ikkontrollati b'mod attiv fl-adulti.

Dijabete tat-Tip 1 – Adulti

PRONTO-T1D kienet prova ta' 26 ġimgħa, ta' trattament sal-mira, li evalwat l-effikaċja ta' Lyumjev f'1 222 pazjent b'terapija multipla ta' injezzjoni ta' kuljum. Il-pazjenti ġew *randomised* għal Lyumjev *blinded* f'hin l-ikel, Humalog *blinded* f'hin l-ikel, jew Lyumjev *open-label* wara l-ikel, kollha flimkien ma' insulin glargine jew insulina degludec. Lyumjev jew Humalog f'hin l-ikel ġew injettati 0 sa 2 minuti qabel l-ikla u Lyumjev wara l-ikel ġie injettat 20 minuta wara l-bidu tal-ikla. Ir-riżultati tal-effikaċja huma pprovduti fit-Tabella 2 u fil-Figura 2.

37.4% tal-pazjenti ttrattati b'Lyumjev f'hin l-ikel, 33.6% tal-pazjenti ttrattati b'Humalog f'hin l-ikel u 25.6% tal-pazjenti ttrattati b'Lyumjev wara l-ikel laħqu HbA1c fil-mira ta' < 7%.

Doži bażilari, bolus u totali tal-insulina kienu simili fost il-gruppi tal-istudju wara 26 ġimgħa.

Wara l-perjodu ta' 26 ġimgħa, iż-żewġ gruppi ta' trattament *blinded* komplew sa 52 ġimgħa. HbA1c ma kienx differenti b'mod statistikament sinifikanti bejn it-trattamenti fil-punt finali ta' ġimgħa 52.

Tabella 2 Riżultati minn prova klinika bażilari-bolus ta' 26 ġimgha f'pazjenti b'dijabete tat-tip 1

	Lyumjev f'hin l-ikel + insulina bażilari	Humalog f'hin l-ikel + insulina bażilari	Lyumjev wara l-ikel + insulina bażilari
Numru ta' individwi <i>randomised</i> (N)	451	442	329
HbA_{1c} (%)			
Linja bażi → ġimgha 26	7.34 → 7.21	7.33 → 7.29	7.36 → 7.42
Bidla mil-linja bażi	-0.13	-0.05	0.08
Differenza fit-trattament	-0.08 [-0.16, -0.00] ^C		0.13 [0.04, 0.22] ^D
HbA_{1c} (mmol/mol)			
Linja bażi → ġimgha 26	56.7 → 55.3	56.7 → 56.1	56.9 → 57.6
Bidla mil-linja bażi	-1.4	-0.6	0.8
Differenza fit-trattament	-0.8 [-1.7, 0.00] ^C		1.4 [0.5, 2.4] ^D
Bidliet fil-livell tal-glucose siegħa wara l-ikel (mg/dL)^A			
Linja bażi → ġimgha 26	77.3 → 46.4	71.5 → 74.3	76.3 → 87.5
Bidla mil-linja bażi	-28.6	-0.7	12.5
Differenza fit-trattament	-27.9 [-35.3, -20.6] ^{C,E}		13.2 [5.0, 21.4] ^D
Bidliet fil-livell tal-glucose siegħa wara l-ikel (mmol/L)^A			
Linja bażi → ġimgha 26	4.29 → 2.57	3.97 → 4.13	4.24 → 4.86
Bidla mil-linja bażi	-1.59	-0.04	0.70
Differenza fit-trattament	-1.55 [-1.96, -1.14] ^{C,E}		0.73 [0.28, 1.19] ^D
Bidliet fil-livell tal-glucose sagħtejn wara l-ikel (mg/dL)^A			
Linja bażi → ġimgha 26	112.7 → 72.7	101.6 → 103.9	108.0 → 97.2
Bidla mil-linja bażi	-34.7	-3.5	-10.2
Differenza fit-trattament	-31.2 [-41.1, -21.2] ^{C,E}		-6.7 [-17.6, 4.3] ^D
Bidliet fil-livell tal-glucose sagħtejn wara l-ikel (mmol/L)^A			
Linja bażi → ġimgha 26	6.26 → 4.04	5.64 → 5.77	5.99 → 5.40
Bidla mil-linja bażi	-1.93	-0.20	-0.56
Differenza fit-trattament	-1.73 [-2.28, -1.18] ^{C,E}		-0.37 [-0.98, -0.24] ^D
Piż tal-ġisem (Kg)			
Linja bażi → ġimgha 26	77.3 → 77.9	77.3 → 78.2	77.6 → 78.1
Bidla mil-linja bażi	0.6	0.8	0.7
Differenza fit-trattament	-0.2 [-0.6, 0.1] ^A		-0.1 [-0.5, 0.3] ^D
Ipoglicemija severa^B (% ta' pazjenti)	5.5%	5.7%	4.6%

Ġimgha 26 u bidla mill-valuri tal-linja bażi huma bbażati fuq il-medji ta' *least-squares* (medji aġġustati).

L-intervall ta' kunfidenza ta' 95% huwa ddikjarat f' '[]'.

^A Test ta' ikla.


^B Ipoglicemija severa hija definita bħala episodju li jehtieg assistenza ta' persuna oħra minhabba indeboliment newroloġiku tal-pazjent.

^C Id-differenza hija għal Lyumjev f'hin l-ikel – Humalog f'hin l-ikel.

^D Id-differenza hija għal Lyumjev wara l-ikel - Humalog f'hin l-ikel.

^E Statistikament sinifikanti favur Lyumjev f'hin l-ikel.

Figura 2. Mogħdija tal-hin għall-bidliet fil-livell tal-glucose fid-demm waqt test ta' tolleranza ta' ikla mħallta f'gimgha 26 f'pazjenti b'dijabete tat-tip 1



PPG = Glucose wara l-ikel

Lyumjev u Humalog mogħtija f'hin l-ikel

Lyumjev +20 = Lyumjev ġie injettat 20 minuta wara l-bidu tal-ikla.

*p < 0.05 għal paragun f'pari ta' Lyumjev versus Humalog

^p < 0.05 għal paragun f'pari ta' Lyumjev +20 versus Humalog

#p < 0.05 għal paragun f'pari ta' Lyumjev +20 versus Lyumjev

Monitoraġġ kontinwu tal-glucose (CGM - Continuous glucose monitoring) f'Dijabete tat-Tip 1 – Adulti

Subsett ta' pazjenti (N = 269) ipparteċipa f'evalwazzjoni tal-profilu ta' glucose ambulatorju ta' 24 siegħa osservati permezz ta' CGM *blinded*. Fil-valutazzjoni ta' 26 ġimgha, il-pazjenti ttrattati b'Lyumjev f'hin l-ikel urew titjib statistikament sinifikanti fil-kontroll ta' PPG waqt il-valutazzjoni ta' CGM ta' bidliet fil-livell tal-glucose jew AUC li tizdied 0 - 2 sigħat, 0 - 3 sigħat, u 0 - 4 sigħat wara l-ikel meta mqabbla ma' pazjenti ittrattati b'Humalog. Pazjenti ttrattati Lyumjev f'hin l-ikel irrappurtaw hin itwal b'mod statistikament sinifikanti fil-firxa (6 am sa nofsillejl) b'603 minuti fil-firxa, (3.9 sa 10 mmol/L, 71 - 180 mg/dL), u 396 minuta fil-firxa (3.9 sa 7.8 mmol/L, 71 sa 140 mg/dL), 44 u 41 minuta itwal minn pazjenti b'Humalog rispettivament.

Dijabete tat-Tip 2 – Adulti

PRONTO-T2D kienet prova ta' 26 ġimgha, ta' trattament sal-mira, li evalwat l-effikaċja ta' Lyumjev f'673 pazjenti li kienu *randomised* għal Lyumjev *blinded* f'hin l-ikel jew għal Humalog *blinded* f'hin l-ikel, it-tnejn flimkien ma' insulina bażilari (insulina glargine jew insulina degludec) f'kors bażilari-bolus. Lyumjev f'hin l-ikel jew Humalog f'hin l-ikel ġew injettati 0 - 2 minuti qabel l-ikel. Ir-riżultati tal-effikaċja huma pprovduti fit-Tabella 3 u fil-Figura 3.

58.2% tal-pazjenti ttrattati b'Lyumjev f'hin l-ikel, u 52.5% tal-pazjenti ttrattati b'Humalog f'hin l-ikel laħqu HbA1c fil-mira ta' < 7%.

Doži bażilari, bolus u totali tal-insulina kienu simili fost il-gruppi tal-istudju fi tmiem il-prova.

Tabella 3 Rizultati minn prova klinika bażilari-bolus ta' 26 ġimgha f'pazjenti b'dijabete tat-tip 2

	Lyumjev f'hin l-ikel + insulina bażilari	Humalog f'hin l-ikel + insulina bażilari
Numru ta' individwi <i>randomised</i> (N)	336	337
HbA_{1c} (%)		
Linja bażi → ġimgħa 26	7.28→6.92	7.31→6.86
Bidla mil-linja bażi	-0.38	-0.43
Differenza fit-trattament	0.06 [-0.05, 0.16]	
HbA_{1c} (mmol/mol)		
Linja bażi → ġimgħa 26	56.0→52.1	56.4→51.5
Bidla mil-linja bażi	-4.1	-4.7
Differenza fit-trattament	0.6 [-0.6, 1.8]	
Bidliet fil-livell tal-glucose siegħa wara l-ikel (mg/dL)^A		
Linja bażi → ġimgħa 26	76.6→63.1	77.1→74.9
Bidla mil-linja bażi	-13.8	-2.0
Differenza fit-trattament	-11.8 [-18.1, -5.5] ^C	
Bidliet fil-livell tal-glucose siegħa wara l-ikel (mmol/L)^A		
Linja bażi → ġimgħa 26	4.25→3.50	4.28→4.16
Bidla mil-linja bażi	-0.77	-0.11
Differenza fit-trattament	-0.66 [-1.01, -0.30] ^C	
Bidliet fil-livell tal-glucose saghtejn wara l-ikel (mg/dL)^A		
Linja bażi → ġimgħa 26	99.3→80.4	99.6→97.8
Bidla mil-linja bażi	-19.0	-1.6
Differenza fit-trattament	-17.4 [-25.3, -9.5] ^C	
Bidliet fil-livell tal-glucose saghtejn wara l-ikel (mmol/L)^A		
Linja bażi → ġimgħa 26	5.51→4.47	5.53→5.43
Bidla mil-linja bażi	-1.06	-0.09
Differenza fit-trattament	-0.96 [-1.41, -0.52] ^C	
Piż tal-ġisem (Kg)		
Linja bażi → ġimgħa 26	89.8→91.3	90.0 →91.6
Bidla mil-linja bażi	1.4	1.7
Differenza fit-trattament	-0.2 [-0.7, 0.3]	
Ipoglicemija severa (% ta' pazjenti)^B	0.9%	1.8%

Ġimgha 26 u bidla mill-valuri tal-linja bażi huma bbażati fuq il-medji ta' *least-squares* (medji aġġustati).


L-intervall ta' kunfidenza ta' 95% huwa ddikjarat f' [/]. Id-differenza hija għal Lyumjev f'hin l-ikel – Humalog f'hin l-ikel.

^A Test ta' ikla.

^B Ipoglicemija severa hija definita bħala episodju li jehtieg assistenza ta' persuna oħra minhabba indeboliment newroloġiku tal-pazjent.

^C Statistika sinifikanti favur Lyumjev f'hin l-ikel.

Figura 3. Moghdija tal-hin għall-bidliet fil-livell tal-glucose fid-demm waqt test ta' tolleranza ta' ikla mhallta f'gimgha 26 f'pazjenti b'dijabete tat-tip 2



PPG = Glucose wara l-ikel

Lyumjev u Humalog moghtija f'hin l-ikel

Id-data hija LSM (SE), *p < 0.05

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani

Fiz-żewġ studji kliniċi ta' 26 gimgha (PRONTO-T1D u PRONTO-T2D), 187 minn 1 116-il pazjent (17%) ittrattati b'Lyumjev b'dijabete tat-tip 1 jew b'dijabete tat-tip 2 kellhom età ta' ≥ 65 sena u 18 minn 1 116 (2%) kellhom età ta' ≥ 75 sena. Ma ġew osservati l-ebda differenzi globali fis-sigurtà jew l-effettività bejn pazjenti anzjani u l-pazjenti iżgħar.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

L-assorbiment ta' insulin lispro kien aktar mgħaġġel u t-tul ta' esponiment kien iqsar f'individwi f'saħħithom u pazjenti bid-dijabete wara l-injezzjoni ta' Lyumjev meta mqabbel ma' Humalog. F'pazjenti b'dijabete tat-tip 1:

- L-insulin lispro dehret fiċ-ċirkolazzjoni wara bejn wiehied u iehor minuta wara l-injezzjoni ta' Lyumjev, li kien ħames minuti aktar malajr minn Humalog.
- Il-hin biex tintlaħaq 50% tal-konċentrazzjoni massima kien ta' 14-il minuta iqsar b'Lyumjev meta mqabbel ma' Humalog.
- Wara injezzjoni ta' Lyumjev, kien hemm seba' darbiet aktar insulin lispro fiċ-ċirkolazzjoni matul l-ewwel 15-il minuta meta mqabbel ma' Humalog u tliet darbiet aktar insulin lispro matul l-ewwel 30 minuta meta mqabbel ma' Humalog.
- Wara l-ghoti ta' Lyumjev il-hin sal-konċentrazzjoni massima tal-insulin lispro ntlaħaq wara 57 minuta.
- Wara injezzjoni ta' Lyumjev kien hemm 41% inqas insulin lispro fiċ-ċirkolazzjoni 3 sigħat wara l-injezzjoni meta mqabbel ma' Humalog.
- It-tul ta' esponiment għall-insulin lispro għal Lyumjev kien 60 minuta iqsar meta mqabbel ma' Humalog.

- L-esponiment totali għall-insulin lispro (proporzjon u CI ta' 95% ta' 1.03 (0.973, 1.09)) u l-konċentrazzjoni massima (proporzjon u CI ta' 95% ta' 1.06 (0.97, 1.16)) kienu komparabbli bejn Lyumjev u Humalog.

F'pazjenti tat-tip 1, il-varjabilità (koeffiċjent ta' varjazzjoni % [CV%] - *coefficient of variation*) minn jum għal jum ta' Lyumjev kienet ta' 13% għall-esponiment totali tal-insulin lispro (AUC, 0 – 10 sigħat) u ta' 23% għall-konċentrazzjoni massima ta' insulin lispro (C_{max}). Il-bijodisponibilità assoluta ta' insulin lispro wara għoti taħt il-ġilda ta' Lyumjev fl-addome, fil-parti ta' fuq tad-driegħ u fil-koxxa kienet madwar 65%. L-assorbiment aċċellerat ta' insulin lispro jinżamm irrispettivament mis-sit tal-injezzjoni (addome, in-naħa ta' fuq tad-driegħ u l-koxxa). Ma hija disponibbli l-ebda *data* dwar esponiment wara injezzjoni fil-warrani.

Il-konċentrazzjoni massima u l-ħin sal-konċentrazzjoni massima kienu komparabbli għaž-żoni tal-addome u tal-parti ta' fuq tad-driegħ; il-ħin sal-konċentrazzjoni massima kien itwal u l-konċentrazzjoni massima kienet inqas għall-koxxa.

L-esponiment totali għall-insulin lispro u l-konċentrazzjoni massima tal-insulin lispro żdiedu b'mod proporzjonali ma' zieda fid-doži taħt il-ġilda ta' Lyumjev fil-firxa tad-doża minn 7 unitajiet sa 30 unità.

Paragun ta' Lyumjev 200 unità/mL u Lyumjev 100 unità/mL

Ir-riżultati ta' studju f'individwi f'saħħithom urew li Lyumjev 200 unità/mL huwa bijoekwivalenti għal Lyumjev 100 unità/mL wara l-għoti ta' doża waħda ta' 15-il unità għall-erja taħt il-kurva tal-konċentrazzjoni tal-insulin lispro fis-serum u l-ħin minn punt ta' żmien ta' żero sal-infinita u C_{max} . L-assorbiment aċċellerat tal-insulin lispro wara l-għoti ta' 200 unità/mL kien simili għal dak osservat b'Lyumjev 100 unità/mL. M'hemmx bżonn ta' bidla fid-doża jekk pazjent jinqaleb minn qawwa għal oħra.

Distribuzzjoni

Il-medja ġeometrika (CV%) tal-volum ta' distribuzzjoni tal-insulin lispro (V_d - *volume of distribution*) kien ta' 34 L (30%) wara għoti ġol-vini ta' Lyumjev bħala injezzjoni bolus ta' doża ta' 15-il unità f'individwi f'saħħithom.

Eliminazzjoni

Il-medja ġeometrika (CV%) tat-tneħħija tal-insulin lispro kienet ta' 32 L/sieġha (22%) u l-*half-life* medjana tal-insulin lispro kienet ta' 44 minuta wara għoti ġol-vini ta' Lyumjev bħala injezzjoni bolus ta' doża ta' 15-il unità f'individwi f'saħħithom.

Popolazzjonijiet speċjali

F'individwi adulti l-età, is-sess, u r-razza ma affettwawx il-farmakokinetika u l-farmakodinamika ta' Lyumjev.

Popolazzjoni pedjatrika

Id-differenzi farmakokinetiċi bejn Lyumjev u Humalog kienu, b'mod ġenerali, simili fit-tfal u fl-adolexxenti bħal daww osservati fl-adulti. Wara injezzjoni minn taħt il-ġilda, Lyumjev wera assorbiment aċċellerat bl-espożizzjoni bikrija ta' insulin lispro tkun oghla fit-tfal (8 – 11 -il sena) u fl-adolexxenti (12 – 17 -il sena) waqt li nżammu b'mod simili l-espożizzjoni totali, il-konċentrazzjoni massima u l-żmien għall-konċentrazzjoni massima meta mqabbla ma' Humalog.

Pazjenti b'indeboliment tal-kliewi u tal-fwied

Indeboliment tal-kliewi u tal-fwied mhux magħruf li għandu impatt fuq il-farmakokinetika tal-insulin lispro.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta' sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, riskju ta' kancer, effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva u l-iżvilupp, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin wara esponiment għall-insulin lispro.

6. TAGHRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta' eċċipjenti

Glycerol
Magnesium chloride hexahydrate
Metacresol
Sodium citrate dihydrate
Trepstinil sodium
Zinc oxide
Ilma għall-injezzjonijiet
Hydrochloric acid u sodium hydroxide (għall-aġġustament tal-pH)

6.2 Inkompatibiltajiet

Dan il-prodott mediċinali m'għandux jithallat ma' kwalunkwe insulina oħra jew ma' prodotti mediċinali oħrajn.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Qabel l-użu

Sentejn

Wara l-ewwel użu

28 jum

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Qabel l-użu

Aħżen fi friġġ (2 °C – 8 °C).
Tagħmlux fil-friża.
Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa' mid-dawl.

Wara l-ewwel użu

Tagħmlux fil-friġġ.
Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 30 °C.
Tagħmlux fil-friża.
Żomm l-għatu fuq il-pinna sabiex tilqa' mid-dawl.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta' dak li hemm ġo fih

Skrataċ tal-ħġieġ ċar Tip I, issiġillati permezz ta' disks li jinżammu f' posthom b'siġilli tal-aluminju u plangers tal-halobutyl.

L-iskrataċ ta' 3 mL huma ssiġillati fi KwikPen injettur għamla ta' pinna li jintrema wara l-użu.

Il-prodott mediċinali huwa ppakkjat f'kartuna bajda b'faxxi blu skuri u faxxi ċċangjati blu skuri u blu ċari u xbieha ta' pinna. Fuq il-kartuna u t-tikketta l-qawwa tal-insulina hija mmarkata b'kaxxa bi sfond isfar biex tiġbed l-attenzjoni. Hemm tikketta safra ta' twissija fuq il-kontenitur tal-iskartoċċ "Uża biss f'din il-pinna, inkella tista' sseħħ doża eċċessiva severa". Il-KwikPen hija ta' lewn griż fil-kannella, il-pum tad-doża huwa griż fil-kannella bi ħnieq imqabbża mal-ġenb.

KwikPen ta' 3 mL: Pakketti ta' 2 pinen mimlijin għal-lest, 5 pinen mimlijin għal-lest jew pakkett multiplu ta' 10 pinen mimlijin għal-lest (2 pakketti ta' 5).

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkun fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi u għal immaniġġar ieħor

Lyumjev irid jidher ċar u bla kulur. Huwa m'għandux jintuża jekk jidher imdardar, ikollu kulur, jew jekk jidher li fih xi frak jew ċapep.

Lyumjev ma jridx jintuża jekk ikun ġie ffriżat.

Għandha dejjem tehel labra ġdida qabel kull użu. Il-labar m'għandhomx jerġġu jintużaw mill-ġdid. Il-labar mhumiex inkluzi.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa' wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Eli Lilly Nederland B.V.
Papendorpseweg 83
3528 BJ Utrecht
L-Olanda.

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/1/20/1422/013
EU/1/20/1422/014
EU/1/20/1422/015

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 24 Marzu 2020
Data tal-aħħar tiġdid:

10. DATA TA' REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini <http://www.ema.europa.eu>

ANNESS II

- A. MANIFATTUR(I) TAS-SUSTANZA BIJOLOĠIKA ATTIVA U
MANIFATTUR RESPONSABBLI GHALL-HRUĠ TAL-LOTT**
- B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD IL-
PROVVISTA U L-UŻU**
- C. KONDIZZJONIJIET U REKWIŻITI OHRA TAL-AWTORIZZAZZJONI
GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**
- D. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FIR-RIGWARD TAL-
UŻU SIGUR U EFFETTIV TAL-PRODOTT MEDICINALI**

A. MANIFATTUR(I) TAS-SUSTANZA BIJOLOĠIKA ATTIVA U MANIFATTUR RESPONSABBLI GHALL-HRUĠ TAL-LOTT

Isem u indirizz tal-manifatturi tas-sustanza bijoloġika attiva

Eli Lilly and Company
Indianapolis
Indiana
46285
L-Istati Uniti tal-Amerika

Lilly del Caribe, Inc.,
12.3 KM 65th Infantry Road
Carolina
00985
Puerto Rico

Isem u indirizz tal-manifattur responsabbli għall-ħruġ tal-lott

Lilly France
Rue du Colonel Lilly
67640 Fegersheim
Franza

B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD IL-PROVVISTA U L-UŻU

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

C. KONDIZZJONIJIET U REKWIŻITI OHRA TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

• **Rapporti perjodiċi aġġornati dwar is-sigurtà (PSURs)**

Ir-rekwiżiti biex jiġu ppreżentati PSURs għal dan il-prodott mediċinali huma mnizzla fil-lista tad-dati ta' referenza tal-Unjoni (lista EURD) prevista skont l-Artikolu 107c(7) tad-Direttiva 2001/83/KE u kwalunkwe aġġornament sussegwenti ppubblikat fuq il-portal elettroniku Ewropew tal-mediċini.

D. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FIR-RIGWARD TAL-UŻU SIGUR U EFFIKAĊI TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

• **Pjan tal-ġestjoni tar-riskju (RMP)**

Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqeghid fis-suq (MAH) għandu jwettaq l-attivitajiet u l-interventi meħtieġa ta' farmakoviġilanza dettaljati fl-RMP maqbul ippreżentat fil-Modulu 1.8.2 tal-awtorizzazzjoni għat-tqeghid fis-suq u kwalunkwe aġġornament sussegwenti maqbul tal-RMP.

RMP aġġornat għandu jiġi ppreżentat:

- Meta l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini titlob din l-informazzjoni;
- Kull meta s-sistema tal-ġestjoni tar-riskju tiġi modifikata speċjalment minhabba li tasal informazzjoni ġdida li tista' twassal għal bidla sinifikanti fil-profil bejn il-benefiċċju u r-riskju jew minhabba li jintlaħaq għan importanti (farmakoviġilanza jew minimizzazzjoni tar-riskji).

ANNESS III
TIKKETTAR U FULJETT TA' TAGHRIF

A. TIKKETTAR

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**KARTUNA TA' BARRA – Kunjett****1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI**

Lyumjev 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni f'kunjett
insulin lispro

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull mL ta' soluzzjoni fih 100 unità ta' insulin lispro (ekwivalenti għal 3.5 mg).

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: glycerol, magnesium chloride hexahydrate, sodium citrate dihydrate, treprostinil sodium, zinc oxide, metacresol, sodium hydroxide, hydrochloric acid, ilma għall-injezzjonijiet.

Ara l-fuljett għal aktar informazzjoni.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

Kunjett wieħed ta' 10 mL
2 kunjetti ta' 10 mL

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' taghrif qabel l-użu.
Użu għal taħt il-ġilda u ġol-vini

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**8. DATA TA' SKADENZA**

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Tagħmlux fil-frیża.

Ahžen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa' mid-dawl.

Qabel l-użu: Ahžen fi frigġ.

Wara l-ewwel użu: Tahżinx f'temperatura 'l fuq minn 30 °C. Armi wara 28 ġurnata.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Eli Lilly Nederland B.V.
Papendorpseweg 83,
3528 BJ Utrecht
L-Olanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/1/20/1422/001 kunjett 1
EU/1/20/1422/002 2 kunjetti

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Lyumjev 100 unità/mL

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC
SN
NN

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**KARTUNA TA' BARRA (bil-kaxxa l-blu) pakkett multiplu – Kunjett****1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI**

Lyumjev 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni f'kunjett
insulin lispro

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull mL ta' soluzzjoni fih 100 unità ta' insulin lispro (ekwivalenti għal 3.5 mg).

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: glycerol, magnesium chloride hexahydrate, sodium citrate dihydrate, treprostinil sodium, zinc oxide, metacresol, sodium hydroxide, hydrochloric acid, ilma għall-injezzjonijiet.

Ara l-fuljett għal aktar informazzjoni.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

Pakkett multiplu: 5 (5 pakketti ta' 1) kunjetti ta' 10 mL.

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' taghrif qabel l-użu.
Użu għal taht il-ġilda u ġol-vini

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlahaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**8. DATA TA' SKADENZA**

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Tagħmlux fil-friza.
Aħžen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa' mid-dawl.

Qabel l-użu: Ahżen fi friġġ.

Wara l-ewwel użu: Tahżinx f'temperatura 'l fuq minn 30 °C. Armi wara 28 ġurnata.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Eli Lilly Nederland B.V.
Papendorpseweg 83,
3528 BJ Utrecht
L-Olanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/1/20/1422/003

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Lyumjev 100 unità/mL

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC
SN
NN

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**KARTUNA INTERMEDJA (minghajr kaxxa blu) komponent ta' pakkett multiplu – Kunjett****1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI**

Lyumjev 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni f'kunjett
insulin lispro

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull mL ta' soluzzjoni fih 100 unità ta' insulin lispro (ekwivalenti għal 3.5 mg).

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: glycerol, magnesium chloride hexahydrate, sodium citrate dihydrate, treprostinil sodium, zinc oxide, metacresol, sodium hydroxide, hydrochloric acid, ilma għall-injezzjonijiet.

Ara l-fuljett għal aktar informazzjoni.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

Kunjett wiehed ta' 10 mL. Komponent ta' pakkett multiplu, ma jistax jinbiegħ separatament.

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' taghrif qabel l-użu.
Użu għal taht il-ġilda u ġol-vini

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlahaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**8. DATA TA' SKADENZA**

JIS

9. KONDIZZJONIJET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Tagħmlux fil-friza.
Aħžen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa' mid-dawl.

Qabel l-użu: Ahżen fi friġġ.

Wara l-ewwel użu: Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 30 °C. Armi wara 28 ġurnata.

10. PREKAWZZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ
--

Eli Lilly Nederland B.V.
Papendorpseweg 83,
3528 BJ Utrecht
L-Olanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ
--

EU/1/20/1422/003

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Lyumjev 100 unità/mL

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGHAR EWLENIN

KITBA FUQ IT-TIKKETTA - Kunjett

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GHANDU JINGHATA

Lyumjev 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni
insulin lispro
Użu għal taħt il-ġilda u ġol-vini

2. METODU TA' KIF GHANDU JINGHATA

3. DATA TA' SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

10 mL

6. OHRAJN

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**KARTUNA TA' BARRA – Skrataċ****1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI**

Lyumjev 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ
insulin lispro

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull mL ta' soluzzjoni fih 100 unità ta' insulin lispro (ekwivalenti għal 3.5 mg).

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: glycerol, magnesium chloride hexahydrate, sodium citrate dihydrate, treprostinil sodium, zinc oxide, metacresol, sodium hydroxide, hydrochloric acid, ilma għall-injezzjonijiet.

Ara l-fuljett għal aktar informazzjoni.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

2 skrataċ ta' 3 mL

5 skrataċ ta' 3 mL

10 skrataċ ta' 3 mL

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Uża dawn l-iskrataċ biss ma' pinna Lilly ta' 3 mL.

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-gilda

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**8. DATA TA' SKADENZA**

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Qabel l-użu:

Ahžen fi frigġ.

Tagħmlux fil-friza.

Ahžen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa' mid-dawl.

Wara l-ewwel użu:

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 30 °C.

Tagħmlux fil-frigġ jew fil-friza.

Erga' poġġi l-ġhat fuq il-pinna wara l-użu sabiex tilqa' mid-dawl.

Armi wara 28 ġurnata.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83,

3528 BJ Utrecht

L-Olanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/1/20/1422/004 2 skrataċ

EU/1/20/1422/005 5 skrataċ

EU/1/20/1422/006 10 skrataċ

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Lyumjev100 unità/mL

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC
SN
NN

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGHAR EWLENIN

KITBA FUQ IT-TIKKETTA - Skrataċ

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GHANDU JINGHATA

Lyumjev 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ
insulin lispro
Użu għal taht il-ġilda

2. METODU TA' KIF GHANDU JINGHATA

3. DATA TA' SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

3 mL

6. OHRAJN

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**KARTUNA TA' BARRA – KwikPen.****1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI**

Lyumjev 100 unità/mL KwikPen soluzzjoni għall-injezzjoni f'pinna mimlija għal-lest insulin lispro

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull mL ta' soluzzjoni fih 100 unità ta' insulin lispro (ekwivalenti għal 3.5 mg).

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: glycerol, magnesium chloride hexahydrate, sodium citrate dihydrate, treprostinil sodium, zinc oxide, metacresol, sodium hydroxide, hydrochloric acid, ilma għall-injezzjonijiet.

Ara l-fuljett għal aktar informazzjoni.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

2 pinen ta' 3 mL

5 pinen ta' 3 mL

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' taghrif qabel l-użu.

Użu għal taht il-ġilda

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**8. DATA TA' SKADENZA**

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Qabel l-użu:

Ahžen fi frigġ.

Tagħmlux fil-friza.

Ahžen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa' mid-dawl.

Wara l-ewwel użu:

Taħzinx f'temperatura 'l fuq minn 30 °C.

Tagħmlux fil-frigġ jew fil-friza.

Erga' poġġi l-għatu fuq il-pinna wara l-użu sabiex tilqa' mid-dawl.

Armi wara 28 ġurnata.

10. PREKAWZZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83,

3528 BJ Utrecht

L-Olanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/1/20/1422/007 2 pinen

EU/1/20/1422/008 5 pinen

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Lyumjev 100 unità/mL KwikPen

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC
SN
NN

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**KARTUNA TA' BARRA (b'kaxxa blu) pakkett multiplu – KwikPen****1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI**

Lyumjev 100 unità/mL KwikPen soluzzjoni għall-injezzjoni f'pinna mimlija għal-lest insulin lispro

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull mL ta' soluzzjoni fih 100 unità ta' insulin lispro (ekwivalenti għal 3.5 mg).

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: glycerol, magnesium chloride hexahydrate, sodium citrate dihydrate, treprostinil sodium, zinc oxide, metacresol, sodium hydroxide, hydrochloric acid, ilma għall-injezzjonijiet.

Ara l-fuljett għal aktar informazzjoni.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

Pakkett multiplu: 10 (2 pakketti ta' 5) pinen ta' 3 mL.

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' taghrif qabel l-użu.
Użu għal taht il-ġilda

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlahaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**8. DATA TA' SKADENZA**

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Qabel l-użu:
Aħžen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.
Ahżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa' mid-dawl.

Wara l-ewwel użu:
Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 30 °C.
Tagħmlux fil-frigġ jew fil-friża.
Erga' poġġi l-għatu fuq il-pinna wara l-użu sabiex tilqa' mid-dawl.
Armi wara 28 ġurnata.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Eli Lilly Nederland B.V.
Papendorpseweg 83,
3528 BJ Utrecht
L-Olanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/1/20/1422/009

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Lyumjev 100 unità/mL KwikPen

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC
SN
NN

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**KARTUNA INTERMEDJA (minghajr kaxxa blu) komponent ta' pakkett multiplu – KwikPen****1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI**

Lyumjev 100 unità/mL KwikPen soluzzjoni għall-injezzjoni f'pinna mimlija għal-lest insulin lispro

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull mL ta' soluzzjoni fih 100 unità ta' insulin lispro (ekwivalenti għal 3.5 mg).

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: glycerol, magnesium chloride hexahydrate, sodium citrate dihydrate, treprostinil sodium, zinc oxide, metacresol, sodium hydroxide, hydrochloric acid, ilma għall-injezzjonijiet.

Ara l-fuljett għal aktar informazzjoni.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni.

5 pinen ta' 3 mL. Komponent ta' pakkett multiplu, ma jistax jinbiegħ separatament.

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' taghrif qabel l-użu.
Użu għal taht il-ġilda

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlahaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**8. DATA TA' SKADENZA**

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Qabel l-użu:
Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.
Ahżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa' mid-dawl.

Wara l-ewwel użu:
Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 30 °C.
Tagħmlux fil-frigġ jew fil-friża.
Erga' poġġi l-għatu fuq il-pinna wara l-użu sabiex tilqa' mid-dawl.
Armi wara 28 ġurnata.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Eli Lilly Nederland B.V.
Papendorpseweg 83,
3528 BJ Utrecht
L-Olanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/1/20/1422/009

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Lyumjev 100 unità/mL KwikPen

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGHAR EWLENIN

KITBA FUQ IT-TIKKETTA - KwikPen

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GHANDU JINGHATA

Lyumjev 100 unità/mL KwikPen soluzzjoni għall-injezzjoni
insulin lispro
Użu għal taħt il-ġilda

2. METODU TA' KIF GHANDU JINGHATA

3. DATA TA' SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

3 mL

6. OHRAJN

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**KARTUNA TA' BARRA – Junior KwikPen****1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI**

Lyumjev 100 unità/mL Junior KwikPen soluzzjoni għall-injezzjoni f'pinna mimlija għal-lest insulin lispro

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull mL ta' soluzzjoni fih 100 unità ta' insulin lispro (ekwivalenti għal 3.5 mg).

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: glycerol, magnesium chloride hexahydrate, sodium citrate dihydrate, treprostinil sodium, zinc oxide, metacresol, sodium hydroxide, hydrochloric acid, ilma għall-injezzjonijiet.

Ara l-fuljett għal aktar informazzjoni.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

2 pinen ta' 3 mL.

5 pinen ta' 3 mL.

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-gilda

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

Il-pinna tagħti 0.5 - 30 unità f'passi ta' 0.5 unità.

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Qabel l-użu:

Ahžen fi frigġ.

Tagħmlux fil-friza.

Ahžen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa' mid-dawl.

Wara l-ewwel użu:

Taħzinx f'temperatura 'l fuq minn 30 °C.

Tagħmlux fil-frigġ jew fil-friza.

Erga' poġġi l-ġhatu fuq il-pinna wara l-użu sabiex tilqa' mid-dawl.

Armi wara 28 ġurnata.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83,

3528 BJ Utrecht

L-Olanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/1/20/1422/010 2 pinen

EU/1/20/1422/011 5 pinen

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Lyumjev 100 unità/mL Junior KwikPen

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - <i>DATA LI TINQARA MILL</i>-BNIEDEM
--

PC
SN
NN

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**KARTUNA TA' BARRA (b'kaxxa blu) pakkett multiplu – Junior KwikPen****1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI**

Lyumjev 100 unità/mL Junior KwikPen soluzzjoni għall-injezzjoni f'pinna mimlija għal-lest insulin lispro

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull mL ta' soluzzjoni fih 100 unità ta' insulin lispro (ekwivalenti għal 3.5 mg).

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: glycerol, magnesium chloride hexahydrate, sodium citrate dihydrate, treprostinil sodium, zinc oxide, metacresol, sodium hydroxide, hydrochloric acid, ilma għall-injezzjonijiet.

Ara l-fuljett għal aktar informazzjoni.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

Pakkett multiplu: 10 (2 pakketti ta' 5) pinen ta' 3 mL.

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' taghrif qabel l-użu.
Użu għal taht il-ġilda

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlahaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

Il-pinna tagħti 0.5 - 30 unità f'passi ta' 0.5 unità.

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Qabel l-użu:

Ahžen fi frigġ.

Tagħmlux fil-friza.

Ahžen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa' mid-dawl.

Wara l-ewwel użu:

Taħzinx f'temperatura 'l fuq minn 30 °C.

Tagħmlux fil-frigġ jew fil-friza.

Erga' poġġi l-ġhatu fuq il-pinna wara l-użu sabiex tilqa' mid-dawl.

Armi wara 28 ġurnata.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83,

3528 BJ Utrecht

L-Olanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/1/20/1422/012

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Lyumjev 100 unità/mL Junior KwikPen

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - <i>DATA LI Tinqara mill-bniedem</i>
--

PC
SN
NN

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KARTUNA INTERMEDJA (minghajr kaxxa blu) komponent ta' pakkett multiplu – Junior KwikPen

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Lyumjev 100 unità/mL Junior KwikPen soluzzjoni għall-injezzjoni f'pinna mimlija għal-lest insulin lispro

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull mL ta' soluzzjoni fih 100 unità ta' insulin lispro (ekwivalenti għal 3.5 mg).

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: glycerol, magnesium chloride hexahydrate, sodium citrate dihydrate, treprostinil sodium, zinc oxide, metacresol, sodium hydroxide, hydrochloric acid, ilma għall-injezzjonijiet.

Ara l-fuljett għal aktar informazzjoni.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni.

5 pinen ta' 3 mL. Komponent ta' pakkett multiplu, ma jistax jinbiegħ separatament.

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.
Użu għal taħt il-gilda

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

Il-pinna tagħti 0.5 - 30 unità f'passi ta' 0.5 unità.

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Qabel l-użu:

Ahžen fi frigġ.

Tagħmlux fil-friza.

Ahžen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa' mid-dawl.

Wara l-ewwel użu:

Taħzinx f'temperatura 'l fuq minn 30 °C.

Tagħmlux fil-frigġ jew fil-friza.

Erga' poġġi l-ġhatu fuq il-pinna wara l-użu sabiex tilqa' mid-dawl.

Armi wara 28 ġurnata.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83,

3528 BJ Utrecht

L-Olanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/1/20/1422/012

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Lyumjev 100 unità/mL Junior KwikPen

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGHAR EWLENIN

KITBA FUQ IT-TIKKETTA - Junior KwikPen

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GHANDU JINGHATA

Lyumjev 100 unità/mL Junior KwikPen soluzzjoni għall-injezzjoni
insulin lispro
Użu għal taħt il-ġilda

2. METODU TA' KIF GHANDU JINGHATA

3. DATA TA' SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

3 mL

6. OHRAJN

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**KARTUNA TA' BARRA – Tempo Pen. Pakkett ta' 5.****1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI**

Lyumjev 100 unità/mL Tempo Pen soluzzjoni għall-injezzjoni f'pinna mimlija għal-lest
insulin lispro

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull mL ta' soluzzjoni fih 100 unità ta' insulin lispro (ekwivalenti għal 3.5 mg).

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: glycerol, magnesium chloride hexahydrate, sodium citrate dihydrate, treprostinil sodium, zinc oxide, metacresol, sodium hydroxide, hydrochloric acid, ilma għall-injezzjonijiet.

Ara l-fuljett għal aktar informazzjoni.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

5 pinen ta' 3 mL

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.
Użu għal taħt il-ġilda

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**8. DATA TA' SKADENZA**

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Qabel l-użu:

Ahžen fi frigġ.

Tagħmlux fil-friza.

Ahžen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa' mid-dawl.

Wara l-ewwel użu:

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 30 °C.

Tagħmlux fil-frigġ jew fil-friza.

Erga' poġġi l-ġhatu fuq il-pinna wara l-użu sabiex tilqa' mid-dawl.

Armi wara 28 ġurnata.

10. PREKAWZZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83,

3528 BJ Utrecht

L-Olanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/1/20/1422/016

5 pinen

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Lyumjev 100 unità/mL Tempo Pen

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - <i>DATA LI TINQARA MILL</i>-BNIEDEM
--

PC
SN
NN

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**KARTUNA TA' BARRA (bil-kaxxa l-blu) pakkett multiplu– Tempo Pen****1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI**

Lyumjev 100 unità/mL Tempo Pen soluzzjoni għall-injezzjoni f'pinna mimlija għal-lest insulin lispro

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull mL ta' soluzzjoni fih 100 unità ta' insulin lispro (ekwivalenti għal 3.5 mg).

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: glycerol, magnesium chloride hexahydrate, sodium citrate dihydrate, treprostinil sodium, zinc oxide, metacresol, sodium hydroxide, hydrochloric acid, ilma għall-injezzjonijiet.

Ara l-fuljett għal aktar informazzjoni.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

Pakkett multiplu: 10 (2 pakketti ta' 5) pinen ta' 3 mL.

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' taghrif qabel l-użu.
Użu għal taht il-ġilda

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlahaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**8. DATA TA' SKADENZA**

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Qabel l-użu:

Ahžen fi frigġ.
Tagħmlux fil-friża.
Ahžen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa' mid-dawl.

Wara l-ewwel użu:
Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 30 °C.
Tagħmlux fil-frigġ jew fil-friża.
Erga' poġġi l-ġhat fuq il-pinna wara l-użu sabiex tilqa' mid-dawl.
Armi wara 28 ġurnata.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Eli Lilly Nederland B.V.
Papendorpseweg 83,
3528 BJ Utrecht
L-Olanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/1/20/1422/017

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Lyumjev 100 unità/mL Tempo Pen

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - <i>DATA LI TINQARA MILL</i>-BNIEDEM
--

PC
SN
NN

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**KARTUNA INTERMEDJA (minghajr il-kaxxa blu) parti minn pakkett multiplu – Tempo Pen.****1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI**

Lyumjev 100 unità/mL Tempo Pen soluzzjoni għall-injezzjoni f'pinna mimlija għal-lest insulin lispro

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull mL ta' soluzzjoni fih 100 unità ta' insulin lispro (ekwivalenti għal 3.5 mg).

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: glycerol, magnesium chloride hexahydrate, sodium citrate dihydrate, treprostinil sodium, zinc oxide, metacresol, sodium hydroxide, hydrochloric acid, ilma għall-injezzjonijiet.

Ara l-fuljett għal aktar informazzjoni.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

5 pinen ta' 3 mL. Parti minn pakkett multiplu, ma jistax jinbigħ b'mod separat.

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' taghrif qabel l-użu.
Użu għal taht il-ġilda

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlahaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**8. DATA TA' SKADENZA**

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Qabel l-użu:

Ahžen fi frigġ.
Tagħmlux fil-friża.
Ahžen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa' mid-dawl.

Wara l-ewwel użu:
Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 30 °C.
Tagħmlux fil-frigġ jew fil-friża.
Erga' poġġi l-ġhatu fuq il-pinna wara l-użu sabiex tilqa' mid-dawl.
Armi wara 28 ġurnata.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Eli Lilly Nederland B.V.
Papendorpseweg 83,
3528 BJ Utrecht
L-Olanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/1/20/1422/017

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Lyumjev 100 unità/mL Tempo Pen

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGHAR EWLENIN

KITBA FUQ IT-TIKKETTA – Tempo Pen

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GHANDU JINGHATA

Lyumjev 100 unità/mL injezzjoni Tempo Peni
insulin lispro
Użu għal taħt il-ġilda

2. METODU TA' KIF GHANDU JINGHATA

3. DATA TA' SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

3 mL

6. OHRAJN

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**KARTUNA TA' BARRA - KwikPen.****1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI**

Lyumjev 200 unità/mL KwikPen soluzzjoni għall-injezzjoni f'pinna mimlija għal-lest insulin lispro

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull mL ta' soluzzjoni fih 200 unità ta' insulin lispro (ekwivalenti għal 6.9 mg).

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: glycerol, magnesium chloride hexahydrate, sodium citrate dihydrate, treprostinil sodium, zinc oxide, metacresol, sodium hydroxide, hydrochloric acid, ilma għall-injezzjonijiet.

Ara l-fuljett għal aktar informazzjoni.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

2 pinen ta' 3 mL.

5 pinen ta' 3 mL.

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' taghrif qabel l-użu.

Użu għal taht il-gilda

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

Uża biss f'din il-pinna, inkella tista' sseħħ doża eċċessiva severa.

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Qabel l-użu:

Ahžen fi frigġ.

Tagħmlux fil-friza.

Ahžen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa' mid-dawl.

Wara l-ewwel użu:

Taħzinx f'temperatura 'l fuq minn 30 °C.

Tagħmlux fil-frigġ jew fil-friza.

Erga' poġġi l-ġhatu fuq il-pinna wara l-użu sabiex tilqa' mid-dawl.

Armi wara 28 ġurnata.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83,

3528 BJ Utrecht

L-Olanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/1/20/1422/013 2 pinen

EU/1/20/1422/014 5 pinen

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Lyumjev 200 unità/mL KwikPen

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - <i>DATA LI TINQARA MILL</i>-BNIEDEM
--

PC
SN
NN

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**KARTUNA TA' BARRA (b'kaxxa blu) pakkett multiplu – KwikPen****1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI**

Lyumjev 200 unità/mL KwikPen soluzzjoni għall-injezzjoni f'pinna mimlija għal-lest insulin lispro

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull mL ta' soluzzjoni fih 200 unità ta' insulin lispro (ekwivalenti għal 6.9 mg).

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: glycerol, magnesium chloride hexahydrate, sodium citrate dihydrate, treprostinil sodium, zinc oxide, metacresol, sodium hydroxide, hydrochloric acid, ilma għall-injezzjonijiet.

Ara l-fuljett għal aktar informazzjoni.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

Pakkett multiplu: 10 (2 pakketti ta' 5) pinen ta' 3 mL.

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-gilda

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

Uża biss f'din il-pinna, inkella tista' sseħħ doża eċċessiva severa.

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Qabel l-użu:

Ahžen fi frigġ.

Tagħmlux fil-frیža.

Ahžen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa' mid-dawl.

Wara l-ewwel użu:

Taħzinx f'temperatura 'l fuq minn 30 °C.

Tagħmlux fil-frigġ jew fil-frیža.

Erga' poġġi l-ġhatu fuq il-pinna wara l-użu sabiex tilqa' mid-dawl.

Armi wara 28 ġurnata.

10. PREKAWZZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83,

3528 BJ Utrecht

L-Olanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/1/20/1422/015

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Lyumjev 200 unità/mL KwikPen

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - <i>DATA LI TINQARA MILL</i>-BNIEDEM
--

PC
SN
NN

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**KARTUNA INTERMEDJA (minghajr kaxxa blu) komponent ta' pakkett multiplu – KwikPen****1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI**

Lyumjev 200 unità/mL KwikPen soluzzjoni għall-injezzjoni f'pinna mimlija għal-lest insulin lispro

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull mL ta' soluzzjoni fih 200 unità ta' insulin lispro (ekwivalenti għal 6.9 mg).

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: glycerol, magnesium chloride hexahydrate, sodium citrate dihydrate, treprostinil sodium, zinc oxide, metacresol, sodium hydroxide, hydrochloric acid, ilma għall-injezzjonijiet.

Ara l-fuljett għal aktar informazzjoni.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

5 pinen ta' 3 mL. Komponent ta' pakkett multiplu, ma jistax jinbiegħ separatament.

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' taghrif qabel l-użu.
Użu għal taht il-gilda

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlahaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

Uża biss f'din il-pinna, inkella tista' sseħħ doża eċċessiva severa.

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Qabel l-użu:

Ahžen fi frigġ.

Tagħmlux fil-friza.

Ahžen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa' mid-dawl.

Wara l-ewwel użu:

Taħzinx f'temperatura 'l fuq minn 30 °C.

Tagħmlux fil-frigġ jew fil-friza.

Erga' poġġi l-ġhatu fuq il-pinna wara l-użu sabiex tilqa' mid-dawl.

Armi wara 28 ġurnata.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83,

3528 BJ Utrecht

L-Olanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/1/20/1422/015

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Lyumjev 200 unità/mL KwikPen

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGHAR EWLENIN

KITBA FUQ IT-TIKKETTA - KwikPen

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GHANDU JINGHATA

Lyumjev 200 unità/mL KwikPen soluzzjoni għall-injezzjoni
insulin lispro
Użu għal taħt il-ġilda

2. METODU TA' KIF GHANDU JINGHATA

3. DATA TA' SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

3 mL

6. OHRAJN

Uża biss f'din il-pinna, inkella tista' sseħħ doża eċċessiva severa.

B. FULJETT TA' TAGHRIF

Fuljett ta' taghrif: Informazzjoni għall-utent

Lyumjev 100 unità/ml, soluzzjoni għall-injezzjoni f'kunjett insulin lispro

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-medicina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib, lill-infermier jew lill-ispizjar tiegħek.
- Din il-medicina għet mogħtija lilek biss. M'għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista' tagħmlilhom il-ħsara, anke jekk għandhom l-istess sinjali ta' mard bħal tiegħek.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib, lill-infermier jew lill-ispizjar tiegħek. Dan jinkludi xi effetti sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F'dan il-fuljett

1. X'inhu Lyumjev u għalxiex jintuża
2. X'għandek tkun taf qabel ma tuża Lyumjev
3. Kif għandek tuża Lyumjev
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif taħžen Lyumjev
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1. X'inhu Lyumjev u għalxiex jintuża

Lyumjev 100 unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni f'kunjett fih is-sustanza attiva insulin lispro. Lyumjev jintuża għat-trattament tad-dijabete mellitus fl-adulti, fl-adolesxenti u fit-tfal mill-età ta' sena u 'l fuq. Huwa insulina ta' mal-ikel li taħdem aktar malajr minn medicini oħra li fihom insulin lispro. Lyumjev fih sustanzi li jagħġlu l-assorbiment ta' insulin lispro għal ġol-ġisem.

Id-dijabete hija kondizzjoni li fiha l-ġisem tiegħek ma jagħmilx biżżejjed insulina jew ma jużax l-insulina b'mod effettiv, li jwassal għal effetti bħal livelli għoljin ta' zokkor fid-demm. Lyumjev huwa medicina ta' insulina li jintuża fit-trattament tad-dijabete u b'hekk jikkontrolla z-zokkor fid-demm. Trattament effettiv tad-dijabete, b'kontroll tajjeb taz-zokkor fid-demm, jevita kumplikazzjonijiet fuq tul ta' żmien mid-dijabete tiegħek.

It-trattament b'Lyumjev jgħin biex jikkontrolla z-zokkor fid-demm fuq żmien twil u jevita kumplikazzjonijiet mid-dijabete tiegħek. Lyumjev jkollu l-effett massimu tiegħu minn 1 sa 3 sigħat wara l-injezzjoni u l-effett idum sa 5 sigħat. Inti għandek tuża Lyumjev fil-bidu tal-ikla, jew sa 20 minuta wara li tkun bdejt tiekol.

It-tabib tiegħek jista' jgħidlek biex tuża Lyumjev kif ukoll insulina li taħdem fit-tul jew b'mod intermedju. Tbidilx l-insulina tiegħek sakemm ma jgħidlekx it-tabib tiegħek.

2. X'għandek tkun taf qabel ma tuża Lyumjev

TUŻAX Lyumjev

- jekk taħseb li z-zokkor fid-demm tiegħek nieżel (**ipoglicemija**). Iktar 'il quddiem, dan il-fuljett se jgħidlek kif titratta zokkor baxx fid-demm (ara sezzjoni 3 taht "Jekk tuża Lyumjev aktar milli suppost").
- jekk inti **allergiku/a** għal insulin lispro jew għal xi sustanza oħra ta' din il-medicina (imniżżla fis-sezzjoni 6).

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib, lill-ispizjar jew lill-infermier tiegħek qabel tuża Lyumjev.

Jekk inti ma tistax tara tajjeb inti se jkollok b'zonn l-ghajnuna ta' xi hadd li jkun imharreg biex jaghti injezzjonijiet.

- **Zokkor baxx fid-demmm (ipoglicemija).**

Zokkor baxx fid-demmm jista' jkun serju u ipoglicemija li ma tigix trattata tista' anke twassal għall-mewt.

Lyumjev jibda jnaqqas iz-zokkor fid-demmm aktar malajr minn xi wħud mill-insulini ta' mal-ikel. Jekk issehh ipoglicemija, din tista' tigrilek qabel wara injezzjoni ta' Lyumjev. Jekk ikollok ipoglicemija ta' spiss jew ikollok diffikultà biex tagħrafha, jekk jogħġbok iddiskuti dan mat-tabib jew mal-infermier tiegħek. Jekk il-livelli taz-zokkor fid-demmm tiegħek huma kkontrollati tajjeb bit-terapija tal-insulina tiegħek ta' bħalissa jew wara żmien twil ta' dijabete, jista' jkun li inti ma thossx is-sintomi ta' twissija meta z-zokkor fid-demmm tiegħek ikun qed jitbaxxa wisq. Sinjali ta' twissija huma elenkati aktar tard f'dan il-fuljett. Għas-sintomi jekk jogħġbok ara "Probemi komuni tad-dijabete".

Inti għandek taħseb sewwa dwar meta għandek tiekol, kemm tagħmel eżerċizzju u kemm tagħmlu ta' spiss. Għandek ukoll tosserva mill-qrib il-livelli taz-zokkor fid-demmm tiegħek billi tittestja z-zokkor fid-demmm tiegħek iktar ta' spiss.

Meta tagħmel bidliet fit-tipi ta' insulina li inti tuża dan jista' jikkawża z-zokkor fid-demmm tiegħek jogħla jew jinżel wisq.

Jista' jkun meħtieġ li żżid il-frekwenza tal-ittestjar taz-zokkor fid-demmm jekk inti qieghed/a f'riskju ta' zokkor baxx fid-demmm. It-tabib tiegħek jista' jkun jeħtieġ jibdillek id-dożi tal-medicini l-oħra tiegħek tad-dijabete.

- **Zokkor għoli fid-demmm (iperglicemija).**

It-twaqqif tal-insulina jew li ma tihux biżżejjed insulina jista' jwassal għal zokkor għoli fid-demmm (iperglicemija) u ketoacidożi tad-dijabete, kondizzjonijiet serji li possibilmint jistghu jwasslu anke għall-mewt. Għas-sintomi jekk jogħġbok ara "Problemi komuni tad-dijabete".

- Jekk inti qed tuża pompa tal-insulina u din tieqaf taħdem se jkollok b'zonn issolvi l-problema immedjatament minhabba li dan jista' jwassal għal zokkor għoli fid-demmm. Jekk tieqaf taħdem il-pompa jista' jkollok b'zonn tiehu injezzjoni ta' Lyumjev billi tuża pinna jew siringa tal-insulina.
- Jekk it-trattament tal-insulina tiegħek jkun qed jingħata flimkien ma' wiehed mill-klassi ta' medicini tad-dijabete msejha thiazolidinediones jew glitazones, bħal ma huwa pioglitazone, għid lit-tabib tiegħek mill-aktar fis jekk ikollok sinjali ta' insufficjenza tal-qalb bħal qtugħ ta' nifs mhux tas-soltu jew żieda malajr fil-piż jew nefha lokalizzata ikkawżata minn żamma ta' fluwidu (edima).
- Jekk għandek reazzjoni allergika serja għall-insulina jew għal kwalunkwe sustanza ta' Lyumjev, ieqaf uża din il-medicina u kkuntattja s-servizzi ta' emergenza medika minnufih.
- Dejjem għandek tiċċekkja l-pakkett u t-tikketta għall-isem u t-tip ta' insulina meta inti ggħibha mill-ispizzerija. Aċċerta ruhek li ggħib il-Lyumjev li t-tabib qellek biex tuża.
- Żomm il-kartuna, jew żomm nota tan-numru tal-lott ta' fuq il-kartuna. Jekk ikollok effett sekondarju inti mbaġħad tkun tista' tipprovi dak in-numru meta inti tirrapporta l-effett sekondarju, ara "rappurtar ta' effetti sekondarji".
- Dejjem uża labra għdida għal kull injezzjoni biex tevita infezzjonijiet jew labar misduda. Jekk labra tistadd ibdilha ma' labra għdida.

- **Bidliet fil-ġilda fis-sit tal-injezzjoni.**

Is-sit tal-injezzjoni għandu jinbidel kull darba biex jiġu evitati bidliet fil-ġilda bħal boċċi taħt il-ġilda. L-insulina tista' ma taħdimx tajjeb hafna jekk tinjetta f'żona bil-boċċi (ara "Kif għandek tuża Lyumjev"). Ikkuntattja lit-tabib tiegħek jekk bħalissa qed tinjetta f'żona bil-boċċi qabel ma tibda tinjetta f'parti differenti. It-tabib tiegħek jista' jgħidlek biex tiċċekkja aktar mill-qrib iz-zokkor fid-demmm tiegħek, u biex taggħusta d-doża tal-insulina jew tal-medikazzjonijiet antidijabetiċi l-oħra tiegħek.

Tfal u adolexxenti

Din il-medicina mhix irrakkomandata għall-użu fit-tfal taht l-età ta' sena.

Mediċini ohra u Lyumjev

Għid lit-tabib, lill-infremier jew lill-ispizjar tiegħek jekk qed tieħu, hadt dan l-aħħar jew tista' tieħu xi mediċini ohra. Xi mediċini jaffettwaw iz-zokkor fid-demm tiegħek – dan jista' jfisser li d-doża tal-insulina tiegħek għandha tinbidel.

Il-livelli taz-zokkor fid-demm tiegħek jistgħu jinżlu (ipoglicemija) jekk inti tieħu:

- mediċini ohra għad-dijabete (mill-ħalq u li jiġu injettati)
- antibijotiċi sulphonamide (għall-infezzjonijiet)
- acetylsalicylic acid (għall-uġiġħ u deni ħafif u biex jiġi evitat tghaqid tad-demm)
- xi antidepressanti (inibituri ta' monoamine oxidase jew inibituri selettivi tal-assorbiment mill-ġdid tas-serotonin)
- xi inibituri tal-enzima li tikkonverti angiotensin (ACE, angiotensin converting enzyme) (per eżempju captopril, enalapril) (għal xi problemi tal-qalb jew pressjoni għolja)
- imblokkaturi tar-riċetturi ta' angiotensin II (għall-pressjoni għolja jew problemi tal-qalb)
- analogi ta' somatostatin (bħal octreotide, li jintużaw biex jitrattaw kondizzjoni rari li tinvolvi ormon żejjed ta' tkabbir)

Il-livelli taz-zokkor fid-demm tiegħek jistgħu jogħlew (iperglicemija) jekk inti tieħu:

- danazol (għall-endometrijozi)
- il-pillola kontraċettiva (pilloli għall-kontroll tat-tqala)
- terapija ta' sostituzzjoni tal-ormoni tat-tirojde (għal problemi tat-tirojde)
- ormon tat-tkabbir tal-bniedem (għal defiċjenza tal-ormon tat-tkabbir)
- diuretiki (għal pressjoni għolja jew jekk qed jingemgħa l-ilma fil-ġisem tiegħek)
- sustanzi simpatomimetiki (għal reazzjonijiet allergiċi serji jew jintużaw f'xi mediċini għall-irjihat)
- kortikosteroidi (biex jitrattaw l-ażma jew kondizzjonijiet awtoimmuni)

Imblokkaturi tar-riċetturi beta (jintużaw għall-pressjoni għolja, aritmija jew angina) jagħmluha aktar diffiċli biex wiehed jagħraf is-sintomi ta' twissija ta' zokkor baxx fid-demm.

Lyumjev mal-alkohol

Il-livelli taz-zokkor tiegħek jistgħu jew jogħlew jew jinżlu jekk inti tixrob l-alkohol. Għalhekk l-ammont ta' insulina meħtieġa jista' jinbidel. Għalhekk inti għandek timmonitorja l-livell ta' zokkor fid-demm tiegħek aktar ta' spiss mis-soltu.

Tqala u treddigh

Jekk inti tqila jew qed tredda', taħseb li tista' tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir tat-tabib, tal-infremier jew tal-ispizjar tiegħek qabel tieħu din il-medicina. L-ammont ta' insulina li inti tkun teħtieġ is-soltu jonqos matul l-ewwel 3 xhur tat-tqala u jiżdied għas-6 xhur li jkun għad fadal. Wara li inti jkollok it-tarbija l-bżonnijiet tiegħek tal-insulina x'aktarx jirritornaw għal dak li kont teħtieġ qabel it-tqala.

M'hemm l-ebda restrizzjonijiet fuq it-trattament b'Lyumjev matul it-treddigh. Jekk inti qed tredda', jista' jkollok bżonn tbiddel it-teħid tal-insulina jew id-dieta.

Sewqan u thaddim ta' magni

Il-hila biex tikkonċentra u tirreagixxi tista' tonqos jekk inti jkollok ipoglicemija. Jekk jogħġbok zomm quddiem għajnejk din il-problema possibbli fis-sitwazzjonijiet kollha fejn inti tista' tpoġġi lilek innifsek jew oħrajn f'riskju (eż. issuq karozza jew thaddem magni). Inti għandek tikkuntattja lit-tabib tiegħek dwar is-sewqan jekk inti għandek:

- episodji frekwenti ta' ipoglicemija

- sinjali ta' twissija mnaqqsa jew assenti meta jkollok ipoglicemija

Lyumjev fih sodium

Din il-medicina fiha anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f'kull doża, li tista' tghid hija essenzjalment 'minghajr sodium'.

3. Kif ghandek tuża Lyumjev

Dejjem ghandek tuża din il-medicina kif deskritt f'dan il-fuljett jew skont il-parir eżatt tat-tabib, tal-ispizjar jew tal-infermier tiegħek. Iċċekkja magħhom jekk ikollok xi dubju.

Huma se jkunu qalulek kemm eżatt ghandek tuża Lyumjev, meta ghandek tużah, u kemm-il darba ghandek tużah. Se jghidulek ukoll kemm ta' spiss ghandek tmur għall-vista l-klinika tad-dijabete.

Inti ghandek dejjem iżżomm insulina żejda u apparat ieħor tal-injezzjoni f'każ li tiġi bżonnhom.

Jekk inti għami jew ghandek problemi bil-vista inti se jkollok bżonn għajjnuna minghand haddieħor biex itik l-injezzjonijiet.

It-tabib tiegħek jista' jghidlek tuża Lyumjev kif ukoll insulina li taħdem aktar fit-tul jew b'mod intermedju. Injetthom b'mod separat. Lyumjev m'għandux jithallat ma' xi insulina oħra.

Meta ghandek tinjetta Lyumjev

Lyumjev huwa insulina ta' mal-ikel. Inti ghandek tuża Lyumjev eżatt malli tibda tiekol, jew minuta jew tnejn qabel l-ikla; inti ghandek ukoll l-għażla li tinjetta sa 20 minuta wara li tkun bdejt l-ikla.

Kemm ghandek tuża insulina

It-tabib se jaħdimlek id-doża abbażi taz-zokkor fid-demm tiegħek u l-piż tal-ġisem u se jispjegalek:

- Kemm ghandek bżonn Lyumjev f'kull ikla.
- Kif u meta ghandek tiċċekkja l-livell ta' zokkor fid-demm tiegħek.
- Kif ghandek tibdel id-doża tal-insulina skont il-livelli taz-zokkor fid-demm tiegħek.
- X'ghandek tagħmel jekk tibdel id-dieta tiegħek, jew jekk tibdel kemm tagħmel eżerċizzju, jekk tkun ma tiflaħx jew jekk tkun qed tuża medicini oħra.
- Jekk tibdel it-tip ta' insulina li inti tuża, jista' jkun li inti jkollok tuża aktar jew anqas minn qabel. Dan jista' jkun biss għall-ewwel injezzjoni jew tista' tkun bidla bil-mod il-mod fuq diversi ġimgħat jew xhur.

Tużax Lyumjev

- Jekk ma jidhirx qisu ilma. Lyumjev għandu jkun ċar, bla kulur u ma jkollu l-ebda frak fih. Iċċekkja kull darba li tinjetta lilek innifsek.
- Jekk Lyumjev ma nħażinx kif suppost (ara sezzjoni 5 "Kif taħzen Lyumjev").
- Jekk it-tapp tal-plastik tal-kunjett ikun fih ħsara tużahx.

Fejn ghandek tinjetta Lyumjev

- Injetta Lyumjev taħt il-ġilda (injezzjoni taħt il-ġilda).
- Tinjettax lilek innifsek direttament go vina. It-tabib tiegħek biss jista' jagħti Lyumjev billi juża injezzjoni fil-vini. Huwa jagħmel dan biss f'sitwazzjonijiet speċjali bħal ma huma operazzjonijiet jew jekk inti tkun ma tiflaħx u jkollok il-livelli taz-zokkor fid-demm tiegħek għoljin wisq.
- Aċċerta ruħek li tinjetta mill-inqas 1 mill-aħħar injezzjoni u li inti 'tibdel' il-postijiet li tinjetta fihom (in-naħa ta' fuq tad-driegħ, il-koxxa, il-warrani jew iż-żaqq), kif ġejt mgħalliem.
- Jekk ikollok bżonn tinjetta insulina oħra fl-istess hin ma' Lyumjev, uża post differenti għall-injezzjoni.

Kif ghandek tinjetta Lyumjev minn kunjett

- L-ewwel ahsel idejk.
- Qabel taghti injezzjoni, naddaf il-ġilda kif ġejt mgħallem. Naddaf it-tapp tal-gomma fuq il-kunjett, iżda tneħħix it-tapp.
- Uża siringa u labra ġodda u sterili biex ittaqqab it-tapp tal-gomma u tiġbed l-ammont ta' Lyumjev li trid. It-tabib, l-infermier jew il-klinika se jgħidulek kif ghandek tagħmel dan.
Issellifx il-labar jew is-siringi tiegħek.
- Injetta taht il-ġilda, kif ġejt mgħallem/ma. Wara l-injezzjoni tiegħek, halli l-labra fil-ġilda għal hames sekondi biex taċċerta ruhek li tkun hadt id-doża kollha.

L-użu ta' Lyumjev f'pompa tal-insulina

- Ċerti pompi tal-infuzjoni tal-insulina biss jistgħu jintużaw biex jagħtu infużjoni ta' Lyumjev.
- Segwi b'attenzjoni l-istruzzjonijiet mogħtija mal-pompa tal-infużjoni tiegħek.
- Aċċerta ruhek li tuża r-reċipjent u l-kateter tajbin għall-pompa tiegħek. Huwa importanti li tuża t-tul it-tajjeb tal-labra fis-sistema ta' mili biex tevita ħsara lill-pompa.
- Ibdel is-sett tal-infużjoni (il-pajp irqiq u l-labra) skont l-istruzzjonijiet mogħtija mas-sett tal-infużjoni.
- Jekk isehħu livelli baxxi ripetuti jew severi ta' zokkor fid-demm, għid lit-tabib jew lill-infermier tiegħek.
- Ħsara fil-pompa jew sadda fis-sett tal-infużjoni jista' jwassal biex il-livelli taz-zokkor jogħlew f'daqqa. Jekk taħseb li Lyumjev mhux qed jgħaddi, segwi l-istruzzjonijiet tal-pompa u jekk ikun xieraq, avża lit-tabib jew lill-infermier tiegħek.
- Inti jista' jkollok bżonn injezzjoni ta' Lyumjev jekk il-pompa tiegħek ma taħdimx kif suppost.

Wara l-injezzjoni

Jekk m'intix ċert/a kemm injettajt għandek tiċċekkja l-livelli taz-zokkor fid-demm tiegħek qabel ma tiddeċiedi jekk għandekx bżonn injezzjoni oħra.

Jekk tuża Lyumjev aktar milli suppost

Jekk inti tinjetta wisq Lyumjev, jew m'intix ċert/a kemm injettajt, jista' jsehh livell baxx ta' zokkor fid-demm. Iċċekkja z-zokkor fid-demm tiegħek.

Jekk iz-zokkor fid-demm tiegħek ikun baxx (ipoglicemija) u inti tista' titratta lilek innifsek, hu pilloli tal-glukożju, zokkor jew xarba biz-zokkor. Imbagħad kul frott, gallettini, jew sandwich, skont kif ikun tak parir it-tabib jew l-infermier tiegħek u strieh ftit. B'hekk hafna drabi jirnexxilek tirkupra miz-zokkor baxx fid-demm jew doża eċċessiva hafifa ta' insulina. Erga' ċċekkja z-zokkor fid-demm tiegħek wara 15-20 min sakemm iz-zokkor fid-demm jistabilizza.

Jekk inti ma tistax titratta lilek innifsek (ipoglicemija severa) minhabba li thossok wisq stordut/a, dgħajjef/fa, konfuż/a, għandek diffikultà biex titkellem, tintilef minn sensik jew ittik aċċessjoni inti tista' tkun tehtieg tiġi ttrattat/a bil-glukagon. Dan jista' jingħata minn xi hadd li jkun jaf jużah. Hu l-glukożju jew iz-zokkor wara l-glukagon. Jekk il-glukagon ma jaħdimx, inti se jkollok tmur l-isptar jew iċċempel is-servizzi tal-emergenza. Staqsi lit-tabib tiegħek biex jgħidlek dwar il-glukagon.

Għid lil kull min tqatta' ħin miegħu/magħha li inti għandek id-dijabete. Għidilhom x'jista' jiġri jekk iz-zokkor fid-demm tiegħek jitbaxxa wisq, inkluż ir-riskju li tintilef minn sensik.

Avżhom li jekk tintilef minn sensik, huma għandhom idawruk fuq ġenbek biex tevita li tifga, iġibu għajjnuna medika minnufih u biex ma jagħuk l-ebda ikel jew xorb minhabba li tista' tifga.

Jekk tinsa tuża Lyumjev

Jekkk tinsa tuża l-insulina tiegħek jew jekk tuża anqas milli suppost, jew m'intix ċert/a kemm injettajt, iz-zokkor fid-demm tiegħek jista' jkun għoli wisq (iperglicemija). Iċċekkja l-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek biex tiddeċiedi hemmx bżonn doża tal-insulina. Kompli bl-iskeda tal-ġoti tad-doża tas-soltu waqt l-ikel li jmiss.

Jekk tiegaf tuża Lyumjev

Twaqqafx jew tibdilx l-insulina tieghek hlief jekk jghidlek tagħmel dan it-tabib tieghek. Jekk inti tuża inqas Lyumjev milli suppost, jista' jsehh livell għoli ta' zokkor fid-demm.

Jekk iz-zokkor għoli fid-demm (iperglicemija) ma jiġix trattat jista' jkun serju ħafna u jikkawża uġiġħ ta' ras, nawsja, rimettar, uġiġħ fl-addome, deidratazzjoni, telf ta' koxjenza, koma jew anke mewt (ara sezzjoni 4).

Tliet affarijiet sempliċi biex tevita ipoglicemija jew iperglicemija huma:

- Dejjem żomm siringi żejda u kunjett żejjed ta' Lyumjev.
- Dejjem żomm xi haġa fuqek biex turi li inti dijabetiku/a.
- Dejjem żomm iz-zokkor fuqek.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' din il-medicina, staqsi lit-tabib, lill-ispizjar jew lill-infermier tieghek.

4. Effetti sekondarji possibbli

Bhal kull medicina oħra, din il-medicina tista' tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f'kulhadd.

Zokkor baxx fid-demm (ipoglicemija) huwa komuni ħafna bit-trattament tal-insulina (jista' jaffettwa aktar minn persuna 1 minn kull 10). Hija tista' tkun serja ħafna. Jekk il-livell taz-zokkor fid-demm tieghek jinżel wisq inti tista' tintilef minn sensik. Ipoglicemija serja tista' tikkawża ħsara fil-moħħ u tista' tkun ta' periklu għall-ħajja. Jekk inti għandek sintomi ta' zokkor baxx fid-demm, hu azzjoni **immedjatment** biex iżżid il-livell taz-zokkor fid-demm tieghek. Ara sezzjoni 3 taht 'Jekk tuża aktar Lyumjev milli suppost'.

Reazzjonijiet allergiċi huma komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 10). Huma jistgħu jkunu severi u jistgħu jinkludu s-sintomi li ġejjin:

- raxx u ħakk mal-ġisem kollu
- tinżel il-persjoni
- diffikultà biex tiehu n-nifs
- qalb thabbat tgħaġġel
- tharhir
- ħruġ ta' għaraq

Jekk ikollok reazzjoni allergika serja (inkluz attakk anafilattiku) għall-insulina jew għal kwalunkwe sustanza f'Lyumjev, ieqaf uża din il-medicina u kkuntattja s-servizzi mediċi tal-emergenza minnufih.

Effetti sekondarji oħra jinkludu:

Komuni ħafna (jistgħu jaffettwaw aktar minn persuna 1 minn kull 10)

Reazzjonijiet fil-post tal-infużjoni. Xi persuni jkollhom ħmura, uġiġħ, nefha jew ħakk madwar il-post tal-infużjoni tal-insulina. Jekk inti jkollok reazzjonijiet fil-post tal-infużjoni, għid lit-tabib tieghek.

Komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 10)

Reazzjonijiet fil-post tal-injezzjoni. Xi persuni jkollhom ħmura, uġiġħ, nefha jew ħakk madwar il-post tal-injezzjoni tal-insulina. Dan is-soltu jgħaddi fi ftit minuti sa ftit ġimgħat mingħajr ma tkun tehtieg twaqqaf Lyumjev. Jekk inti jkollok reazzjonijiet fil-post tal-injezzjoni, għid lit-tabib tieghek.

Mhux komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 100)

Bidliet fil-ġilda fis-sit tal-injezzjoni: Jekk tinjetta insulina wisq ta' spiss fl-istess post, it-tessut xahmi jista' jew jiċkien (lipoatrofija) jew jiħxien (lipoipertrofija). Boċċi taht il-ġilda jistgħu jiġu kkawżati wkoll minn akkumulazzjoni ta' proteina msejha amilojdi (amilojdozi tal-ġilda). L-insulina tista' ma taħdimx tajjeb ħafna jekk tinjetta f'żona bil-boċċi. Ibdel is-sit tal-injezzjoni ma' kull injezzjoni biex tgħin fil-prevenzjoni ta' dawn il-bidliet fil-ġilda.

Effetti sekundarji ohra li jistghu jsehhu

Nefha fid-dirghajn jew fl-ghekiesi minhabba zamma ta' fluwidi (edima), b'mod partikolari fil-bidu tat-terapija bl-insulina jew matul bidla fil-medicini tad-dijabete tieghek.

Rappurtar tal-effetti sekundarji

Jekk ikollok xi effett sekundarju, kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tieghek. Dan jinkludi xi effetti sekundarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Tista' wkoll tirrapporta effetti sekundarji direttament permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali mnizzla f'[Appendici V](#). Billi tirrapporta l-effetti sekundarji tista' tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta' din il-medicina.

Problemi komuni tad-dijabete

Zokkor baxx fid-demm

Zokkor baxx fid-demm (ipoglicemija) tfisser li m'hemmx biżżejjed zokkor fid-demm. Dan jista' jiġi kkawżat jekk:

- inti tiegħu wisq Lyumjev jew insulina oħra;
- inti taqbez ikliet jew iddum ma tiekol jew tibdel id-dieta tieghek;
- inti tagħmel eżerċizzju jew tagħmel xogħol iebs eżatt qabel jew wara ikla;
- inti għandek infezzjoni jew mard (speċjalment dijarea jew rimettar);
- hemm bidla fil-bżonn tal-insulina tieghek per eżempju jekk titlef il-piż; jew inti għandek problemi bil-kliwi jew bil-fwied li jmorru għall-agħar

Ara s-sezzjoni 'Jekk tuża Lyumjev aktar milli suppost.'

L-ewwel sintomi ta' zokkor baxx fid-demm is-soltu jiġu malajr u jinkludu dan li ġej:

- gheja
- qalb tħabbat b'mod mgħaġġel
- nervi jew roġħda
- tħossok imdardar
- uġiġħ ta' ras
- għaraq kiesaħ

Jekk m'intix kunfidenti li tagħraf is-sintomi ta' twissija tieghek, evita sitwazzjonijiet bħal issuq karozza, li fihom inti jew persuni oħra jitpoġġew f'periklu minhabba ipoglicemija.

Zokkor għoli fid-demm (iperglicemija) u ketoacidożi tad-dijabete

Iperglicemija (wisq zokkor fid-demm) tfisser li l-livelli tal-glucose fil-ġisem tieghek huma għoljin wisq. Iperglicemija tista' tiġi minhabba:

- li inti ma tihux l-insulina tieghek;
- tuża inqas insulina minn kemm jehtieg il-ġisem tieghek;
- żbilanċ bejn l-ammont ta' karboidrati li tiekol u l-ammont ta' insulina li tiegħu; jew
- deni, infezzjoni jew stress emozzjonali.

Is-sintomi bikrija ta' iperglicemija huma:

- tkun bil-għatx ħafna
- uġiġħ ta' ras
- tħossok bi nġhas
- tagħmel awrina aktar spiss

L-iperglicemija tista' twassal għall-ketoacidożi tad-dijabete. L-ewwel sintomi jiġu bil-mod fuq perjodu ta' ħafna sigħat jew jiem. Sintomi addizzjonali jinkludu li ġejjin:

- nawsja u/jew rimettar
- uġiġħ fl-addome
- polz mgħaġġel
- tiegħu nifs fil-fond

- ammonti moderati jew kbar ta' ketoni fl-awrina. Il-ketoni jigu magħmula meta l-ġisem tiegħek jaħraq ix-xaħam għall-enerġija minflok il-glucose.

Jekk għandek kwalunkwe minn dawn is-sintomi u zokkor għoli **gib għajnnu medika minnufih**. Ara s-sezzjoni 'Jekk tinsa' tuża Lyumjev'.

Mard

Jekk inti ma tiflaħx, speċjalment jekk qed thossok imdardar jew qed tirremetti, l-ammont ta' insulina li inti għandek b'żonn jista' jinbidel. **Anke meta inti ma tkunx qed tiekol b'mod normali, inti xorta jkollok b'żonn l-insulina.** Ittestja l-awrina jew id-demm, segwi 'r-regoli ta' meta tkun ma tiflaħx', u għid lit-tabib tiegħek.

5. Kif taħżen Lyumjev

Żomm din il-medicina fejn ma' tintlaħaqx u ma tidhirx mit-tfal.

Tużax din il-medicina wara d-data ta' meta tiskadi li tidher fuq it-tikketta u l-kartuna. Id-data ta' meta tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta' dak ix-xaħar.

Tagħmlux fil-friza.

Żomm fil-kartuna ta' barra sabiex tilqa' mid-dawl.

Qabel l-ewwel użu

Aħżen fi friġġ (2 °C – 8 °C).

Wara l-ewwel użu

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 30 °C.

Armi wara 28 jum **anke jekk ikun għad fadal xi soluzzjoni.**

Tarmix medicini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif għandek tarmi medicini li m'għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X'fih Lyumjev 100 unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni f'kunjett

- Is-sustanza attiva hija insulin lispro. Kull ml ta' soluzzjoni fih 100 unità ta' insulin lispro. Kunjett wieħed fih 1 000 unità ta' insulin lispro f'10 ml ta' soluzzjoni.
- Is-sustanzi l-oħra huma metacresol, glycerol, magnesium chloride hexahydrate, sodium citrate dihydrate, treprostinal sodium, zinc oxide, ilma għall-injezzjonijiet. Sodium hydroxide jew hydrochloric acid setgħu intużaw biex jaġġustaw il-pH (ara t-tmiem ta' sezzjoni 2 taħt 'Lyumjev fih sodium').

Kif jidher Lyumjev u l-kontenut tal-pakkett

Lyumjev 100 unità/ml, soluzzjoni għall-injezzjoni hija soluzzjoni ċara, bla kulur, akweja f'kunjett. Kull kunjett fih 1 000 unità (10 millilitri).

Daqs tal-pakkett ta' 1, 2 jew pakkett multiplu ta' 5 × kunjett 1.

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkun fis-suq.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83

3528 BJ Utrecht

L-Olanda.

Manifattur

Lilly France
Rue du Colonel Lilly
67640 Fegersheim
Franza

Għal kull tagħrif dwar din il-medicina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.
Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Lietuva
Tel: +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България
Тел.: + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.
Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.
Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.
Tel.: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S
Tlf.: +45 45 26 6000

Malta

Charles de Giorgio Ltd.
Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH
Tel: + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.
Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Eli Lilly Nederland B.V.
Tel: +372 6817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S.
Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges. m.b.H.
Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Dista S.A.
Tel: + 34-91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.
Tel: +48 22 440 33 00

France

Lilly France
Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda
Tel.: + 351-21-4126600

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.
Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L.
Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited
Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.
Tel: +386 (0) 1 580 00 10

Ísland

Icepharma hf.
Sími: + 354 540 8000

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia s.r.o.
Tel: + 421 220 663 111

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.
Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab
Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Phadisco Ltd
Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB
Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

Eli Lilly (Suisse) S.A Pārstāvniecība Latvijā
Tel: +371 67364000

Dan il-fuljett kien rivedut l-ahhar f'**Sorsi ohra ta' informazzjoni**

Informazzjoni dettaljata dwar din il-medicina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Medicini: <https://www.ema.europa.eu>.

It-tagħrif li jmiss qed jingħata biss għall-professjonisti tal-kura tas-saħħa:

Lyumjev 100 unità /mL huwa disponibbli f'kunjetta jekk ikun meħtieġ l-ghoti ta' injezzjoni fil-vina.

Għal użu ġol-vini, Lyumjev għandu jiġi dilwit għal konċentrazzjonijiet ta' 0.1 sa 1.0 unità/mL f'soluzzjoni għall-injezzjoni ta' 5% glucose jew f'soluzzjoni għall-injezzjoni ta' 9 mg/mL (0.9%) sodium chloride. Huwa rakkomandat li s-sistema tiġi ppumpjata qabel tibda l-infużjoni lill-pazjent. Intweriet kumpatibilità f'boroż tal-ethylene-propylene copolymer u tal-polyolefin b'polyvinyl chloride.

Stabilità kimika u fiżika waqt l-użu intweriet għal 14-il jum f'temperatura ta' 2 –8 °C u 20 siegħa f'temperatura ta' 20 – 25 °C meta jiġi protett mid-dawl. Mill-aspett mikrobijologiku, il-prodott medikinali għandu jintuża immedjatament. Jekk ma jintużax immedjatament il-hinijiet u l-kundizzjonijiet tal-ħażna qabel u waqt l-użu huma r-responsabbiltà ta' min ikun qed jużah u s-soltu ma jkunux aktar minn 24 siegħa f'temperatura ta' 2 – 8°C, hlief jekk id-dilwizzjoni tkun saret f'kundizzjonijiet asemi kkontrollati u valutati.

Fuljett ta' taghrif: Informazzjoni għall-utent

Lyumjev 100 unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ insulin lispro

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-medicina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib, lill-infermier jew lill-ispizjar tiegħek.
- Din il-medicina giet mogħtija lilek biss. M'għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista' tagħmlilhom il-ħsara, anke jekk għandhom l-istess sinjali ta' mard bħal tiegħek.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib, lill-infermier jew lill-ispizjar tiegħek. Dan jinkludi xi effetti sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F'dan il-fuljett

1. X'inhum Lyumjev u għalxiex jintuża
2. X'għandek tkun taf qabel ma tuża Lyumjev
3. Kif għandek tuża Lyumjev
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif taħżen Lyumjev
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1. X'inhum Lyumjev u għalxiex jintuża

Lyumjev 100 unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ fih is-sustanza attiva insulin lispro. Lyumjev jintuża għat-trattament tad-dijabete mellitus fl-adulti, fl-adolesxenti u fit-tfal mill-età ta' sena u 'l fuq. Huwa insulina ta' mal-ikel li taħdem aktar malajr minn medicini oħra li fihom insulin lispro. Lyumjev fih sustanzi li jagħgħu l-assorbiment ta' insulin lispro għal ġol-ġisem.

Id-dijabete hija kondizzjoni li fiha l-ġisem tiegħek ma jagħmilx biżżejjed insulina jew ma jużax l-insulina b'mod effettiv, li jwassal għal effetti bħal livelli għoljin ta' zokkor fid-demm. Lyumjev huwa medicina ta' insulina li jintuża fit-trattament tad-dijabete u b'hekk jikkontrolla z-zokkor fid-demm. Trattament effettiv tad-dijabete, b'kontroll tajjeb taz-zokkor fid-demm, jevita kumplikazzjonijiet fuq tul ta' żmien mid-dijabete tiegħek.

It-trattament b'Lyumjev jgħin biex jikkontrolla z-zokkor fid-demm fuq żmien twil u jevita kumplikazzjonijiet mid-dijabete tiegħek. Lyumjev jkollu l-effett massimu tiegħu minn 1 sa 3 sigħat wara l-injezzjoni u l-effett idum sa 5 sigħat. Inti għandek tuża Lyumjev fil-bidu tal-ikla, jew sa 20 minuta wara li tkun bdejt tiekol.

It-tabib tiegħek jista' jgħidlek biex tuża Lyumjev kif ukoll insulina li taħdem fit-tul jew b'mod intermedju. Tbiddilx l-insulina tiegħek sakemm ma jgħidlekx it-tabib tiegħek.

2. X'għandek tkun taf qabel ma tuża Lyumjev

TUŻAX Lyumjev

- jekk taħseb li z-zokkor fid-demm tiegħek nieżel (**ipoglicemija**). Iktar 'il quddiem, dan il-fuljett se jgħidlek kif titratta zokkor baxx fid-demm (ara sezzjoni 3 taħt "Jekk tuża Lyumjev aktar milli suppost").
- jekk inti **allergiku/a** għal insulin lispro jew għal xi sustanza oħra ta' din il-medicina (imnizzla fis-sezzjoni 6).

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib, lill-ispizjar jew lill-infermier tiegħek qabel tuża Lyumjev.

Jekk inti ma tistax tara tajjeb inti se jkollok bżonn l-ghajnuna ta' xi hadd li jkun imharreg biex jaghti injezzjonijiet.

- **Zokkor baxx fid-demmm (ipoglicemija).**

Zokkor baxx fid-demmm jista' jkun serju u ipoglicemija li ma tigix trattata tista' anke twassal għall-mewt.

Lyumjev jibda jnaqqas iz-zokkor fid-demmm aktar malajr minn xi wħud mill-insulini ta' mal-ikel. Jekk isseħħ ipoglicemija, din tista' tigrilek qabel wara injezzjoni ta' Lyumjev. Jekk ikollok ipoglicemija ta' spiss jew ikollok diffikultà biex tagħrafha, jekk jogħġbok iddiskuti dan mat-tabib jew mal-infermier tiegħek. Jekk il-livelli taz-zokkor fid-demmm tiegħek huma kkontrollati tajjeb bit-terapija tal-insulina tiegħek ta' bħalissa jew wara żmien twil ta' dijabete, jista' jkun li inti ma thossx is-sintomi ta' twissija meta z-zokkor fid-demmm tiegħek ikun qed jitbaxxa wisq. Sinjali ta' twissija huma elenkati aktar tard f'dan il-fuljett. Għas-sintomi jekk jogħġbok ara "Probemi komuni tad-dijabete".

Inti għandek taħseb sewwa dwar meta għandek tiekol, kemm tagħmel eżerċizzju u kemm tagħmlu ta' spiss. Għandek ukoll tosserva mill-qrib il-livelli taz-zokkor fid-demmm tiegħek billi tittestja z-zokkor fid-demmm tiegħek iktar ta' spiss.

Meta tagħmel bidliet fit-tipi ta' insulina li inti tuża dan jista' jikkawża z-zokkor fid-demmm tiegħek jogħla jew jinżel wisq.

Jista' jkun meħtieġ li żżid il-frekwenza tal-ittestjar taz-zokkor fid-demmm jekk inti qieghed/a f'riskju ta' zokkor baxx fid-demmm. It-tabib tiegħek jista' jkun jeħtieġ jibdillek id-doži tal-medicini l-oħra tiegħek tad-dijabete.

- **Zokkor għoli fid-demmm (iperglicemija).**

It-twaqqif tal-insulina jew li ma tihux biżżejjed insulina jista' jwassal għal zokkor għoli fid-demmm (iperglicemija) u ketoacidoži tad-dijabete, kondizzjonijiet serji li possibilmment jistghu jwasslu anke għall-mewt. Għas-sintomi jekk jogħġbok ara "Problemi komuni tad-dijabete".

- Jekk it-trattament tal-insulina tiegħek jkun qed jingħata flimkien ma' wiehed mill-klassi ta' medicini tad-dijabete msejha thiazolidinediones jew glitazones, bħal ma huwa pioglitazone, għid lit-tabib tiegħek mill-aktar fis jekk ikollok sinjali ta' insufficjenza tal-qalb bħal qtugħ ta' nifs mhux tas-soltu jew żieda malajr fil-piż jew nefha lokalizzata ikkawżata minn żamma ta' fluwidu (edima).
- Jekk għandek reazzjoni allergika serja għall-insulina jew għal kwalunkwe sustanza ta' Lyumjev, ieqaf uża din il-medicina u kkuntattja s-servizzi ta' emergenza medika minnufih.
- Dejjem għandek tiċċekkja l-pakkett u t-tikketta għall-isem u t-tip ta' insulina meta inti ggibha mill-ispizierija. Aċċerta ruhek li ggib il-Lyumjev li t-tabib qellek biex tuża.
- Żomm il-kartuna, jew żomm nota tan-numru tal-lott ta' fuq il-kartuna. Jekk ikollok effett sekondarju inti mbagħad tkun tista' tipprovi dak in-numru meta inti tirrapporta l-effett sekondarju, ara "rappurtar ta' effetti sekondarji".
- Dejjem uża labra għdida għal kull injezzjoni biex tevita infezzjonijiet jew labar misduda. Jekk labra tistadd ibdilha ma' labra għdida.

- **Bidliet fil-ġilda fis-sit tal-injezzjoni.**

Is-sit tal-injezzjoni għandu jinbidel kull darba biex jiġu evitati bidliet fil-ġilda bħal boċċi taħt il-ġilda. L-insulina tista' ma taħdimx tajjeb hafna jekk tinjetta f'żona bil-boċċi (ara "Kif għandek tuża Lyumjev"). Ikkuntattja lit-tabib tiegħek jekk bħalissa qed tinjetta f'żona bil-boċċi qabel ma tibda tinjetta f'parti differenti. It-tabib tiegħek jista' jgħidlek biex tiċċekkja aktar mill-qrib iz-zokkor fid-demmm tiegħek, u biex taggusta d-doża tal-insulina jew tal-medikazzjonijiet antidijabetiċi l-oħra tiegħek.

Tfal u adolexxenti

Din il-medicina mhix irrakkomandata għall-użu fit-tfal taħt l-età ta' sena.

Mediċini ohra u Lyumjev

Għid lit-tabib, lill-infermier jew lill-ispizjar tiegħek jekk qed tieħu, hadt dan l-aħħar jew tista' tieħu xi mediċini ohra. Xi mediċini jaffettwaw iz-zokkor fid-demm tiegħek – dan jista' jfisser li d-doża tal-insulina tiegħek għandha tinbidel.

Il-livelli taz-zokkor fid-demm tiegħek jistgħu jinżlu (ipoglicemija) jekk inti tieħu:

- mediċini ohra għad-dijabete (mill-ħalq u li jiġu injettati)
- antibijotiċi sulphonamide (għall-infezzjonijiet)
- acetylsalicylic acid (għall-uġiħ u deni hafif u biex jiġi evitat tghaqid tad-demm)
- xi antidepressanti (inibituri ta' monoamine oxidase jew inibituri selettivi tal-assorbiment mill-ġdid tas-serotonin)
- xi inibituri tal-enzima li tikkonverti angiotensin (ACE, angiotensin converting enzyme) (per eżempju captopril, enalapril) (għal xi problemi tal-qalb jew pressjoni għolja)
- imblokkaturi tar-riċetturi ta' angiotensin II (għall-pressjoni għolja jew problemi tal-qalb)
- analogi ta' somatostatin (bħal octreotide, li jintużaw biex jitrattaw kondizzjoni rari li tinvolvi ormon żejjed ta' tkabbir)

Il-livelli taz-zokkor fid-demm tiegħek jistgħu jogħlew (iperglicemija) jekk inti tieħu:

- danazol (għall-endometrijozi)
- il-pillola kontraċettiva (pilloli għall-kontroll tat-tqala)
- terapija ta' sostituzzjoni tal-ormoni tat-tirojde (għal problemi tat-tirojde)
- ormon tat-tkabbir tal-bniedem (għal defiċjenza tal-ormon tat-tkabbir)
- dijuretiċi (għal pressjoni għolja jew jekk qed jingemgħa l-ilma fil-ġisem tiegħek)
- sustanzi simpatomimetici (għal reazzjonijiet allergici serji jew jintużaw f'xi mediċini għall-irjihat)
- kortikosteroidi (biex jitrattaw l-ażma jew kondizzjonijiet awtoimmuni)

Imblokkaturi tar-riċetturi beta (jintużaw għall-pressjoni għolja, aritmija jew angina) jagħmluha aktar diffiċli biex wieħed jagħraf is-sintomi ta' twissija ta' zokkor baxx fid-demm.

Lyumjev mal-alkohol

Il-livelli taz-zokkor tiegħek jistgħu jew jogħlew jew jinżlu jekk inti tixrob l-alkohol. Għalhekk l-ammont ta' insulina meħtieġa jista' jinbidel. Għalhekk inti għandek timmonitorja l-livell ta' zokkor fid-demm tiegħek aktar ta' spiss mis-soltu.

Tqala u treddigh

Jekk inti tqila jew qed tredda', taħseb li tista' tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir tat-tabib, tal-infermier jew tal-ispizjar tiegħek qabel tieħu din il-mediċina. L-ammont ta' insulina li inti tkun teħtieġ is-soltu jonqos matul l-ewwel 3 xhur tat-tqala u jiżdied għas-6 xhur li jkun għad fadal. Wara li inti jkollok it-tarbija l-bżonnijiet tiegħek tal-insulina x'aktarx jirritornaw għal dak li kont teħtieġ qabel it-tqala.

M'hemm l-ebda restrizzjonijiet fuq it-trattament b'Lyumjev matul it-treddigh. Jekk inti qed tredda', jista' jkollok bżonn tbiddel it-teħid tal-insulina jew id-dieta.

Sewqan u thaddim ta' magni

Il-hila biex tikkoncentra u tirreagixxi tista' tonqos jekk inti jkollok ipoglicemija. Jekk jogħġbok żomm quddiem għajnejk din il-problema possibbli fis-sitwazzjonijiet kollha fejn inti tista' tpoġġi lilek innifsek jew oħrajn f'riskju (eż. issuq karozza jew thaddem magni). Inti għandek tikkuntattja lit-tabib tiegħek dwar is-sewqan jekk inti għandek:

- episodji frekwenti ta' ipoglicemija
- sinjali ta' twissija mnaqqsa jew assenti meta jkollok ipoglicemija

Lyumjev fih sodium

Din il-medicina fiha anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f'kull doża, li tista' tghid hija essenzialment 'mingħajr sodium'.

3 Kif ghandek tuża Lyumjev

Dejjem għandek tuża din il-medicina kif deskritt f'dan il-fuljett jew skont il-parir eżatt tat-tabib, tal-ispiżjar jew tal-infermier tiegħek. Iċċekkja magħhom jekk ikollok xi dubju.

Huma se jkunu qalulek kemm eżatt għandek tuża Lyumjev, meta għandek tużah, u kemm-il darba għandek tużah. Se jgħidulek ukoll kemm ta' spiss għandek tmur għall-vista l-klinika tad-dijabete.

Biex tevita t-trasmissjoni possibbli ta' mard, kull skartoċċ għandu jintuża minnek biss, anke jekk il-labra tal-pinna tinbidel.

Inti għandek dejjem iżżomm insulina żejda u apparat ieħor tal-injezzjoni f'każ li tiġi bżonnhom.

Jekk inti għami jew għandek problemi bil-vista inti se jkollok bżonn għajjnuna mingħand haddieħor biex itik l-injezzjonijiet.

It-tabib tiegħek jista' jgħidlek tuża Lyumjev kif ukoll insulina li taħdem aktar fit-tul jew b'mod intermedju. Injetthom b'mod separat. Lyumjev m'għandux jithallat ma' xi insulina oħra.

Meta għandek tinjetta Lyumjev

Lyumjev huwa insulina ta' mal-ikel. Inti għandek tuża Lyumjev eżatt malli tibda tiekol, jew minuta jew tnejn qabel l-ikla; inti għandek ukoll l-għażla li tinjetta sa 20 minuta wara li tkun bdejt l-ikla.

Kemm għandek tuża insulina

It-tabib se jaħdimlek id-doża abbażi taz-zokkor fid-demmm tiegħek u l-piż tal-ġisem u se jispjegalek:

- Kemm għandek bżonn Lyumjev f'kull ikla.
- Kif u meta għandek tiċċekkja l-livell ta' zokkor fid-demmm tiegħek.
- Kif għandek tibdel id-doża tal-insulina skont il-livelli taz-zokkor fid-demmm tiegħek.
- X'għandek tagħmel jekk tibdel id-dieta tiegħek, jew jekk tibdel kemm tagħmel eżerċizzju, jekk tkun ma tiflaħx jew jekk tkun qed tuża medicini oħra.
- Jekk tibdel it-tip ta' insulina li inti tuża, jista' jkun li inti jkollok tuża aktar jew anqas minn qabel. Dan jista' jkun biss għall-ewwel injezzjoni jew tista' tkun bidla bil-mod il-mod fuq diversi ġimgħat jew xhur.

Tużax Lyumjev

- Jekk ma jidhirx qisu ilma. Lyumjev għandu jkun ċar, bla kulur u ma jkollu l-ebda frak fih. Iċċekkja kull darba li tinjetta lilek innifsek.
- Jekk Lyumjev ma nħażinx kif suppost (ara sezzjoni 5 "Kif taħzen Lyumjev").
- Jekk l-iskartoċċ ikun fih kwalunkwe ħsara, tużahx.

Kif tlesti l-pinna għall-użu

- L-ewwel aħsel idejk. Iddisinfetta r-rita tal-gomma tal-iskartoċċ.
- **Għandek tuża biss skrataċ ta' Lyumjev fil-pinen tal-insulia Lilly. Jekk jogħġbok aċċerta ruhek li jissemmew l-iskrataċ Lyumjev jew Lilly fil-fuljett ta' mal-pinna. L-iskartoċċ ta' 3 ml joqgħod biss fil-pinna ta' 3 ml.**
- Segwi l-istruzzjonijiet li jiġu mal-pinna. Qiegħed l-iskartoċċ ġol-pinna.
- Uża labra ġdida. (Il-labar mhumix inklużi).
- Ippompja kull darba. Il-pinna għandha tiġi ppumpjata sakemm tara l-insulina fit-tarf tal-labra qabel kull injezzjoni biex taċċerta ruhek li l-pinna lesta biex tagħti d-doża. Jekk ma tippumpjahiex, inti tista' tiehu d-doża l-ħażina.

Meta taghti injezzjoni ta' Lyumjev

- Qabel ma taghti l-injezzjoni, naddaf il-ġilda tiegħek.
- Injetta taht il-ġilda, kif ġejt mgħallem mit-tabib jew mill-infermier tiegħek.
- Wara l-injezzjoni tiegħek, halli l-labra fil-ġilda għal 5 sekondi biex tkun żgur li tirċievi d-doża kollha. Aċċerta ruħek li tinjetta mill-inqas 1 mill-aħħar injezzjoni u li inti 'tibdel' il-postijiet li tinjetta fihom (in-naħa ta' fuq tad-driegħ, il-koxxa, il-warrani jew jew iż-żaqq).
- Jekk m'għandekx biżżejjed insulina fil-pinna biex tiehu d-doża kollha tiegħek, hu nota ta' kemm għad trid tiehu. Ippompja pinna ġdida u injetta d-doża li jkun għad jonqos.
- Jekk għandek bżonn tinjetta insulina oħra fl-istess waqt ma' Lyumjev, uża post differenti għall-injezzjoni.
- Tinjettax direttament go vina.

Wara li tinjetta

- Eżatt kif tkun ħadt l-injezzjoni, neħhi l-labra mill-pinna billi tuża l-għatu ta' barra tal-labra. Din iżomm Lyumjev sterili u tevita li jqattar. Hija twaqqaf ukoll l-arja milli terġa' tmur lura fil-pinna u tevita li l-labra tistadd. **Issellifx il-labar tiegħek. Issellifx il-pinna tiegħek.** Poġġi l-għatu lura fuq il-pinna tiegħek. Halli l-iskartoċċ fil-pinna.
- Jekk m'intix ċert/a kemm injettajt għandek tiċċekkja l-livelli taz-zokkor fid-demm tiegħek qabel ma tiddeċiedi jekk għandekx bżonn injezzjoni oħra.

Aktar injezzjonijiet

- Kull darba li inti tippjana li taghti injezzjoni uża labra ġdida. Qabel kull injezzjoni, ippompja l-pinna biex tneħhi kwalunkwe bżieġaq kbar tal-arja.
- Ladarba l-iskartoċċ jiżvojt, terġax tużah.

Jekk tuża Lyumjev aktar milli suppost

Jekk inti tinjetta wisq Lyumjev, jew m'intix ċert/a kemm injettajt, jista' jsehh livell baxx ta' zokkor fid-demm. Iċċekkja z-zokkor fid-demm tiegħek.

Jekk iz-zokkor fid-demm tiegħek jkun baxx (ipoglicemija) u inti tista' titratta lilek innifsek, hu pilloli tal-glukożju, zokkor jew xarba biz-zokkor. Imbagħad kul frott, gallettini, jew sandwich, skont kif ikun tak parir it-tabib jew l-infermier tiegħek u strieh f'it. B'hekk hafna drabi jirnexxilek tirkupra miz-zokkor baxx fid-demm jew doża eċċessiva hafifa ta' insulina. Erga' ċċekkja z-zokkor fid-demm tiegħek wara 15-20 min sakemm iz-zokkor fid-demm jistabilizza.

Jekk inti ma tistax titratta lilek innifsek (ipoglicemija severa) minhabba li tħossok wisq stordut/a, dgħajfef/fa, konfuż/a, għandek diffikultà biex titkellem, tintilef minn sensik jew ittik aċċessjoni inti tista' tkun tehtieg tigi trattat/a bil-glukagon. Dan jista' jingħata minn xi hadd li jkun jaf jużah. Hu l-glukożju jew iz-zokkor wara l-glukagon. Jekk il-glukagon ma jaħdimx, inti se jkollok tmur l-isptar jew iċċempel is-servizzi tal-emergenza. Staqsi lit-tabib tiegħek biex jgħidlek dwar il-glukagon.

Għid lil kull min tqatta' hin miegħu/magħha li inti għandek id-dijabete. Għidilhom x'jista' jigri jekk iz-zokkor fid-demm tiegħek jitbaxxa wisq, inkluz ir-riskju li tintilef minn sensik.

Avżhom li jekk tintilef minn sensik,

huma għandhom idawruk fuq ġenbek biex tevita li tifga, igibu għajnuna medika minnufih u biex ma jagħuk l-ebda ikel jew xorb minhabba li tista' tifga.

Jekk tinsa tuża Lyumjev

Jekkk tinsa tuża l-insulina tiegħek jew jekk inti tuża anqas milli suppost, jew m'intix ċert/a kemm injettajt, iz-zokkor fid-demm tiegħek jista' jkun għoli wisq (iperglicemija). Iċċekkja l-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek biex tiddeċiedi hemmx bżonn doża tal-insulina. Komplil bl-iskeda tal-għoti tad-doża tas-soltu waqt l-ikla li jmiss.

Jekk tieqaf tuża Lyumjev

Twaqqafx u tibdilx l-insulina tiegħek hlief jekk jgħidlek tagħmel dan it-tabib tiegħek. Jekk inti tuża inqas Lyumjev milli suppost, jista' jsehh livell għoli ta' zokkor fid-demm.

Jekk iz-zokkor għoli fid-demmm (iperglicemija) ma jigix trattat jista' jkun serju ħafna u jikkawża uġiġħ ta' ras, nawsja, rimettar, uġiġħ fl-addome, deidratazzjoni, telf ta' koxjenza, koma jew anke mewt (ara sezzjoni 4).

Tliet affarijiet sempliċi biex tevita ipoglicemija jew iperglicemija huma:

- Dejjem żomm pinna u skrataċ żejda, f'każ li inti titlef il-pinna jew l-iskrataċ jew jigrilhom il-ħsara.
- Dejjem żomm xi ħaġa fuqek biex turi li inti dijabetiku/a.
- Dejjem żomm iz-zokkor fuqek.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' din il-medicina, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

4. Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull medicina oħra, din il-medicina tista' tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f'kulhadd.

Zokkor baxx fid-demmm (ipoglicemija) huwa komuni ħafna bit-trattament tal-insulina (jista' jaffettwa aktar minn persuna 1 minn kull 10). Hija tista' tkun serja ħafna. Jekk il-livell taz-zokkor fid-demmm tiegħek jinżel wisq inti tista' tintilef minn sensik. Ipoglicemija serja tista' tikkawża ħsara fil-moħħ u tista' tkun ta' periklu għall-ħajja. Jekk inti għandek sintomi ta' zokkor baxx fid-demmm, hu azzjoni **immedjatment** biex iżżid il-livell taz-zokkor fid-demmm tiegħek. Ara sezzjoni 3 taħt 'Jekk tuża aktar Lyumjev milli suppost'.

Reazzjonijiet allergiċi huma komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 10). Huma jistgħu jkunu severi u jistgħu jinkludu s-sintomi li ġejjin:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| • raxx u ħakk mal-ġisem kollu | • tinżel il-pessjoni |
| • diffikultà biex tiehu n-nifs | • qalb tħabbat tgħaġġel |
| • tħarhir | • ħruġ ta' għaraq |

Jekk ikollok reazzjoni allergika serja (inkluż attakk anafilattiku) għall-insulina jew għal kwalunkwe sustanza f'Lyumjev, ieqaf uża din il-medicina u kkuntattja s-servizzi mediċi tal-emergenza minnufih.

Effetti sekondarji oħra jinkludu

Komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 10)

Reazzjonijiet fil-post tal-injezzjoni. Xi persuni jkollhom ħmura, uġiġħ, nefħa jew ħakk madwar il-post tal-injezzjoni tal-insulina. Dan is-soltu jgħaddi fi ftit minuti sa ftit ġimgħat mingħajr ma tkun teħtieġ twaqqaf Lyumjev. Jekk inti jkollok reazzjonijiet fil-post tal-injezzjoni, għid lit-tabib tiegħek.

Mhux komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 100)

Bidliet fil-ġilda fis-sit tal-injezzjoni: Jekk tinjetta insulina wisq ta' spiss fl-istess post, it-tessut xaħmi jista' jew jiċkien (lipoatrofija) jew jiħxien (lipoipertrofija). Boċċi taħt il-ġilda jistgħu jiġu kkawżati wkoll minn akkumulazzjoni ta' proteina msejha amilojdi (amilojdozi tal-ġilda). L-insulina tista' ma taħdimx tajjeb ħafna jekk tinjetta f'żona bil-boċċi. Ibdel is-sit tal-injezzjoni ma' kull injezzjoni biex tgħin fil-prevenzjoni ta' dawn il-bidliet fil-ġilda.

Effetti sekondarji oħra li jistgħu jseħħu

Nefħa fid-dirgħajn jew fl-għekiesi minħabba żamma tal-fluwidu (edima), b'mod partikolari fil-bidu tat-terapija bl-insulina jew matul bidla fil-medicini tad-dijabete tiegħek.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li mhux elenkat f'din il-fuljett. Tista' wkoll tirrapporta effetti sekondarji

direttament permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali mniżżla f' [Appendiċi V](#). Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista' tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta' din il-medicina.

Problemi komuni tad-dijabete

Zokkor baxx fid-demm

Zokkor baxx fid-demm (ipoglicemija) ifisser li m'hemmx biżżejjed zokkor fid-demm. Dan jista' jiġi kkawżat jekk:

- inti tiegħu wisq Lyumjev jew insulina oħra;
- inti taqbeż ikliet jew iddum ma tiekol jew tibdel id-dieta tiegħek;
- inti tagħmel eżerċizzju jew tagħmel xogħol iebes eżatt qabel jew wara ikla;
- inti għandek infezzjoni jew mard (speċjalment dijarea jew rimettar);
- hemm bidla fil-bżonn tal-insulina tiegħek per eżempju jekk titlef il-piż; jew
- inti għandek problemi bil-kliewi jew bil-fwied li jmorru għall-aġġustament.

Ara s-sezzjoni 'Jekk tuża Lyumjev aktar milli suppost.'

L-ewwel sintomi ta' zokkor baxx fid-demm is-soltu jiġu malajr u jinkludu dan li ġej:

- għeja
- qalb tħabbat b'mod mgħaġġel
- nervi jew roġha
- tħossok imdardar
- uġiġħ ta' ras
- għaraq kiesaħ

Jekk m'intix kunfidenti li tagħraf is-sintomi ta' twissija tiegħek, evita sitwazzjonijiet bħal issuq karozza, li fihom inti jew persuni oħra jitpoġġew f'periklu minhabba ipoglicemija.

Zokkor għoli fid-demm (iperglicemija) u ketoacidożi tad-dijabete

Iperglicemija (wisq zokkor fid-demm) tfisser li l-livelli tal-glucose fil-gisem tiegħek huma għoljin wisq. Iperglicemija tista' tiġi minhabba:

- li inti ma tihux l-insulina tiegħek;
- tuża inqas insulina minn kemm jehtieg il-gisem tiegħek;
- żbilanċ bejn l-ammont ta' karboidrati li tiekol u l-ammont ta' insulina li tiegħu; jew
- deni, infezzjoni jew stress emozzjonali.

Is-sintomi bikrija ta' iperglicemija huma:

- tkun bil-għatx ħafna
- uġiġħ ta' ras
- tħossok bi ngħas
- tagħmel awrina aktar spiss

L-iperglicemija tista' twassal għall-ketoacidożi tad-dijabete. L-ewwel sintomi jiġu bil-mod fuq perjodu ta' ħafna sigħat jew jiem. Sintomi addizzjonali jinkludu li ġejjin:

- nawwsja u/jew rimettar
- uġiġħ fl-addome
- polz mgħaġġel
- tiegħu nifs fil-fond
- ammonti moderati jew kbar ta' ketoni fl-awrina. Il-ketoni jiġu magħmula meta l-gisem tiegħek jahraq ix-xaħam għall-enerġija minflok il-glucose.

Jekk għandek kwalunkwe minn dawn is-sintomi u zokkor għoli **ġib għajjnuna medika minnufih**.

Ara s-sezzjoni 'Jekk tinsa' tuża Lyumjev'.

Mard

Jekk inti ma tiffлах, speċjalment jekk qed tħossok imdardar jew qed tirremetti, l-ammont ta' insulina li inti għandek bżonn jista' jinbidel. **Anke meta inti ma tkunx qed tiekol b'mod normali, inti xorta jkollok bżonn l-insulina.** Ittestja l-awrina jew id-demm, segwi 'r-regoli ta' meta tkun ma tiffлах', u għid lit-tabib tiegħek.

5. Kif taħžen Lyumjev

Żomm din il-mediċina fejn ma' tintlaħaqx u ma tidhirx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta' meta tiskadi li tidher fuq it-tikketta u l-kartuna. Id-data ta' meta tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta' dak ix-xahar.

Qabel l-ewwel użu

Aħžen fi frigġ (2 °C – 8 °C).

Tagħmlux fil-friża.

Żomm fil-kartuna ta' barra sabiex tilqa' mid-dawl.

Wara l-ewwel użu (wara li l-iskartoċċ jiddaħhal fil-pinna)

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 30 °C.

Tagħmlux fil-friża.

Tagħmlux fil-frigġ.

Il-pinna bl-iskartoċċ fiha m'għandhiex tinħażen bil-labra mwahħla.

Żomm l-għatu tal-pinna fuq il-pinna biex tipproteġi mid-dawl.

Armiha wara 28 jum **anke jekk ikun għad fadal fiha xi soluzzjoni.**

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranagġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif għandek tarmi mediċini li m'għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X'fih Lyumjev 100 unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ

- Is-sustanza attiva hija insulin lispro. Kull ml soluzzjoni fih 100 unità ta' insulin lispro. Skartoċċ wieħed fih 300 unità ta' insulin lispro f'soluzzjoni ta' 3 ml.
- Is-sustanzi l-oħra huma metacresol, glycerol, magnesium chloride hexahydrate, sodium citrate dihydrate, treprostinil sodium, zinc oxide, ilma għall-injezzjonijiet. Sodium hydroxide jew hydrochloric acid setgħu intużaw biex jaġġustaw il-pH (ara t-tmiem ta' sezzjoni 2 taħt 'Lyumjev fih sodium').

Kif jidher Lyumjev u l-kontenut tal-pakkett

Lyumjev 100 unità/ml, soluzzjoni għall-injezzjoni hija soluzzjoni ċara, bla kulur, akweja fi skartoċċ. Kull skartoċċ fih 300 unità (3 millilitri).

Daqsijiet tal-pakkett ta' 2, 5 jew 10 skrataċ.

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkun fuq is-suq.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83

3528 BJ Utrecht

L-Olanda.

Manifattur

Lilly France
Rue du Colonel Lilly
67640 Fegersheim
Franza.

Għal kull tagħrif dwar din il-medicina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq:

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.
Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Lietuva
Tel: +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България
Тел.: + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.
Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.
Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.
Tel.: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S
Tlf.: +45 45 26 6000

Malta

Charles de Giorgio Ltd.
Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH
Tel: + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.
Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Eli Lilly Nederland B.V.
Tel: +372 6817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S.
Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges. m.b.H.
Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Dista S.A.
Tel: + 34-91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 440 33 00

France

Lilly France
Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda
Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.
Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L.
Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited
Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.
Tel: +386 (0) 1 580 00 10

Ísland

Icepharma hf.
Sími: + 354 540 8000

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia s.r.o.
Tel: + 421 220 663 111

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.
Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab
Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Phadisco Ltd
Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB
Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

Eli Lilly (Suisse) S.A Pārstāvniecība Latvijā
Tel: +371 67364000

Dan il-fuljett kien rivedut l-ahhar f'**Sorsi ohra ta' informazzjoni**

Informazzjoni dettaljata dwar din il-medicina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Medicini: <https://www.ema.europa.eu>.

Fuljett ta' taghrif: Informazzjoni għall-utent

Lyumjev 100 unità/ml KwikPen soluzzjoni għall-injezzjoni f'pinna mimlija għal-lest insulin lispro

Kull KwikPen tagħti minn unità 1 sa 60 unità f'passi ta' unità 1 f'injezzjoni wahda.

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-medicina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok b'żonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib, lill-infermier jew lill-ispizjar tiegħek.
- Din il-medicina għet mogħtija lilek biss. M'għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista' tagħmlilhom il-ħsara, anke jekk għandhom l-istess sinjali ta' mard bħal tiegħek.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib, lill-infermier jew lill-ispizjar tiegħek. Dan jinkludi xi effetti sekondarji possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F'dan il-fuljett

1. X'inhu Lyumjev KwikPen u għalxiex jintuża
2. X'għandek tkun taf qabel ma tuża Lyumjev KwikPen
3. Kif għandek tuża Lyumjev KwikPen
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif taħžen Lyumjev KwikPen
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1. X'inhu Lyumjev KwikPen u għalxiex jintuża

Lyumjev 100 unità/ml KwikPen soluzzjoni għall-injezzjoni f'pinna mimlija għal-lest fih is-sustanza attiva insulin lispro. Lyumjev jintuża għat-trattament tad-dijabete mellitus fl-adulti, fl-adolesxenti u fit-tfal mill-età ta' sena u 'l fuq. Huwa insulina ta' mal-ikel li taħdem aktar malajr minn medicini oħra li fihom insulin lispro. Lyumjev fih sustanzi li jagħgħlu l-assorbiment ta' insulin lispro għal għol-ġisem.

Id-dijabete hija kondizzjoni li fiha l-ġisem tiegħek ma jagħmilx biżżejjed insulina jew ma jużax l-insulina b'mod effettiv, li jwassal għal effetti bħal livelli għoljin ta' zokkor fid-demm. Lyumjev huwa medicina ta' insulina li jintuża fit-trattament tad-dijabete u b'hekk jikkontrolla z-zokkor fid-demm. Trattament effettiv tad-dijabete, b'kontroll tajjeb taz-zokkor fid-demm, jevita kumplikazzjonijiet fuq tul ta' żmien mid-dijabete tiegħek.

It-trattament b'Lyumjev jgħin biex jikkontrolla z-zokkor fid-demm fuq żmien twil u jevita kumplikazzjonijiet mid-dijabete tiegħek. Lyumjev jkollu l-effett massimu tiegħu minn 1 sa 3 sigħat wara l-injezzjoni u l-effett idum sa 5 sigħat. Inti għandek tuża Lyumjev fil-bidu tal-ikla, jew sa 20 minuta wara li tkun bdejt tiekol.

It-tabib tiegħek jista' jgħidlek biex tuża Lyumjev kif ukoll insulina li taħdem fit-tul jew b'mod intermedju. Tbidilx l-insulina tiegħek sakemm ma jgħidlekx it-tabib tiegħek.

Lyumjev 100 unità/ml KwikPen hija pinna mimlija għal-lest li tintrema wara li tintuża li fiha 3 ml (300 unità, 100 unità/ml) ta' insulin lispro. KwikPen wahda fiha ħafna doži ta' insulina. Il-KwikPen iżżid unità wahda kull darba. **In-numru ta' unitajiet jidher fit-tieqa tad-doża, dejjem iċċekkja dan qabel l-injezzjoni tiegħek.** Inti tista' tagħti minn unità 1 sa 60 unità f'injezzjoni wahda. **Jekk id-doża tiegħek hija aktar minn 60 unità, inti se jkollok b'żonn tagħti lilek innifsek aktar minn injezzjoni wahda.**

2. X'ghandek tkun taf qabel ma tuża Lyumjev KwikPen

TUŻAX Lyumjev KwikPen

- jekk taħseb li z-zokkor fid-demm tiegħek nieżel (**ipoglicemija**). Iktar 'il quddiem, dan il-fuljett se jgħidlek kif titratta zokkor baxx fid-demm (ara sezzjoni 3 taht “Jekk tuża Lyumjev aktar milli suppost”).
- jekk inti **allergiku/a** għal insulin lispro jew għal xi sustanza oħra ta' din il-medicina (imnizzla fis-sezzjoni 6).

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek qabel tuża Lyumjev.

Jekk inti ma tistax tara tajjeb inti se jkollok bżonn l-għajnuna ta' xi hadd li jkun imharreg biex jagħti injezzjonijiet.

- **Zokkor baxx fid-demm** (ipoglicemija).

Zokkor baxx fid-demm jista' jkun serju u ipoglicemija li ma tiġix trattata tista' anke twassal għall-mewt.

Lyumjev jibda jnaqqas iz-zokkor fid-demm aktar malajr minn xi wħud mill-insulini ta' mal-ikel. Jekk issehh ipoglicemija, din tista' tiġrilek qabel wara injezzjoni ta' Lyumjev. Jekk ikollok ipoglicemija ta' spiss jew ikollok diffikultà biex tagħrafha, jekk jogħgbok iddiskuti dan mat-tabib jew mal-infermier tiegħek. Jekk il-livelli taz-zokkor fid-demm tiegħek huma kkontrollati tajjeb bit-terapija tal-insulina tiegħek ta' bħalissa jew wara żmien twil ta' dijabete, jista' jkun li inti ma tħossx is-sintomi ta' twissija meta z-zokkor fid-demm tiegħek ikun qed jitbaxxa wisq. Sinjali ta' twissija huma elenkati aktar tard f'dan il-fuljett. Għas-sintomi jekk jogħgbok ara “Probemi komuni tad-dijabete”.

Inti għandek taħseb sewwa dwar meta għandek tiekol, kemm tagħmel eżerċizzju u kemm tagħmlu ta' spiss. Għandek ukoll tosserva mill-qrib il-livelli taz-zokkor fid-demm tiegħek billi tittestja z-zokkor fid-demm tiegħek iktar ta' spiss.

Meta tagħmel bidliet fit-tipi ta' insulina li inti tuża dan jista' jikkawża z-zokkor fid-demm tiegħek jogħla jew jinżel wisq.

Jista' jkun meħtieġ li żżid il-frekwenza tal-ittestjar taz-zokkor fid-demm jekk inti qiegħed/a f'riskju ta' zokkor baxx fid-demm. It-tabib tiegħek jista' jkun jeħtieġ jibdillek id-dożi tal-medicini l-oħra tiegħek tad-dijabete.

- **Zokkor għoli fid-demm** (iperglicemija).

It-twaqqif tal-insulina jew li ma tiħux biżżejjed insulina jista' jwassal għal zokkor għoli fid-demm (iperglicemija) u ketoacidożi tad-dijabete, kondizzjonijiet serji li possibilmint jistgħu jwasslu anke għall-mewt. Għas-sintomi jekk jogħgbok ara “Problemi komuni tad-dijabete”.

- Jekk it-trattament tal-insulina tiegħek jkun qed jingħata flimkien ma' wiehed mill-klassi ta' medicini tad-dijabete msejha thiazolidinediones jew glitazones, bħal ma huwa pioglitazone, għid lit-tabib tiegħek mill-aktar fis jekk ikollok sinjali ta' insufficjenza tal-qalb bħal qtugħ ta' nifs mhux tas-soltu jew żieda malajr fil-piż jew nefha lokalizzata ikkawżata minn żamma ta' fluwidu (edima).
- Jekk għandek reazzjoni allergika serja għall-insulina jew għal kwalunkwe sustanza ta' Lyumjev, ieqaf uża din il-medicina u kkuntattja s-servizzi ta' emerġenza medika minnufih.
- Dejjem għandek tiċċekkja l-pakkett u t-tikketta għall-isem u t-tip ta' insulina meta inti għibha mill-ispiżerija. Aċċerta ruhek li għib il-Lyumjev li t-tabib qellek biex tuża.
- Żomm il-kartuna, jew żomm nota tan-numru tal-lott ta' fuq il-kartuna. Jekk ikollok effett sekondarju inti mbagħad tkun tista' tipprovi dak in-numru meta inti tirrapporta l-effett sekondarju, ara “rappurtar ta' effetti sekondarji”.
- Dejjem uża labra għdida għal kull injezzjoni biex tevita infezzjonijiet jew labar misduda. Jekk labra tistadd ibdilha ma' labra għdida.

- **Bidliet fil-ġilda fis-sit tal-injezzjoni.**

Is-sit tal-injezzjoni għandu jinbidel kull darba biex jiġu evitati bidliet fil-ġilda bħal boċċi taħt il-ġilda. L-insulina tista' ma taħdimx tajjeb hekk jekk tinjetta f'żona bil-boċċi (ara "Kif għandek tuża Lyumjev KwikPen"). Ikkuntattja lit-tabib tiegħek jekk bħalissa qed tinjetta f'żona bil-boċċi qabel ma tibda tinjetta f'parti differenti. It-tabib tiegħek jista' jgħidlek biex tiċċekkja aktar mill-qrib iz-zokkor fid-demm tiegħek, u biex taġġusta d-doża tal-insulina jew tal-medikazzjonijiet antidijabetiċi l-oħra tiegħek.

Tfal u adolexxenti

Din il-medicina mhix irrakkomandata għall-użu fit-tfal taħt l-età ta' sena.

Medicini oħra u Lyumjev

Għid lit-tabib, lill-infermier jew lill-ispizjar tiegħek jekk qed tiehu, haadt dan l-aħħar jew tista' tiehu xi medicini oħra. Xi medicini jaffettwaw iz-zokkor fid-demm tiegħek – dan jista' jfisser li d-doża tal-insulina tiegħek għandha tinbidel.

Il-livelli taz-zokkor fid-demm tiegħek jistgħu jinżlu (ipoglicemija) jekk inti tiehu:

- medicini oħra għad-dijabete (mill-ħalq u li jiġu injettati)
- antibijotiċi sulphonamide (għall-infezzjonijiet)
- acetylsalicylic acid (għall-uġiġħ u deni ħafif u biex jiġi evitat tgħaqid tad-demm)
- xi antidepressanti (inibituri ta' monoamine oxidase jew inibituri selettivi tal-assorbiment mill-ġdid tas-serotonin)
- xi inibituri tal-enzima li tikkonverti angiotensin (ACE, angiotensin converting enzyme) (per eżempju captopril, enalapril) (għal xi problemi tal-qalb jew pressjoni għolja)
- imblokkaturi tar-riċetturi ta' angiotensin II (għall-pressjoni għolja jew problemi tal-qalb)
- analogi ta' somatostatin (bħal octreotide, li jintużaw biex jitrattaw kondizzjoni rari li tinvolvi ormon żejjed ta' tkabbir)

Il-livelli taz-zokkor fid-demm tiegħek jistgħu jogħlew (iperglicemija) jekk inti tiehu:

- danazol (għall-endometrijozi)
- il-pillola kontraċettiva (pilloli għall-kontroll tat-tqala)
- terapija ta' sostituzzjoni tal-ormoni tat-tirojde (għal problemi tat-tirojde)
- ormon tat-tkabbir tal-bniedem (għal defiċjenza tal-ormon tat-tkabbir)
- dijuretiċi (għal pressjoni għolja jew jekk qed jingemgħa l-ilma fil-ġisem tiegħek)
- sustanzi simpatomimetici (għal reazzjonijiet allergici serji jew jintużaw f'xi medicini għall-irjihat)
- kortikosteroidi (biex jitrattaw l-ażma jew kondizzjonijiet awtoimmuni)

Imblokkaturi tar-riċetturi beta (jintużaw għall-pressjoni għolja, aritmija jew angina) jagħmluha aktar diffiċli biex wiehed jagħraf is-sintomi ta' twissija ta' zokkor baxx fid-demm.

Lyumjev mal-alkohol

Il-livelli taz-zokkor tiegħek jistgħu jew jogħlew jew jinżlu jekk inti tixrob l-alkohol. Għalhekk l-ammont ta' insulina meħtieġa jista' jinbidel. Għalhekk inti għandek timmonitorja l-livell ta' zokkor fid-demm tiegħek aktar ta' spiss mis-soltu.

Tqala u treddiġħ

Jekk inti tqila jew qed tredda', taħseb li tista' tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir tat-tabib, tal-infermier jew tal-ispizjar tiegħek qabel tiehu din il-medicina. L-ammont ta' insulina li inti tkun teħtieġ is-soltu jonqos matul l-ewwel 3 xhur tat-tqala u jiżdied għas-6 xhur li jkun għad fadal. Wara li inti jkollok it-tarbija l-bżonnijiet tiegħek tal-insulina x'aktarx jirritornaw għal dak li kont teħtieġ qabel it-tqala.

M'hemm l-ebda restrizzjonijiet fuq it-trattament b'Lyumjev matul it-treddigh. Jekk inti qed tredda', jista' jkollok b'zonn tbiddel it-tehid tal-insulina jew id-dieta.

Sewqan u thaddim ta' magni

Il-hila biex tikkoncentra u tirreagixxi tista' tonqos jekk inti jkollok ipoglicemija. Jekk jogħġbok zomm quddiem għajnejk din il-problema possibbli fis-sitwazzjonijiet kollha fejn inti tista' tpoġġi lilek innifsek jew oħrajn f'riskju (eż. issuq karożza jew thaddem magni). Inti għandek tikkuntattja lit-tabib tiegħek dwar is-sewqan jekk inti għandek:

- episodji frekwenti ta' ipoglicemija
- sinjali ta' twissija mnaqqa jew assenti meta jkollok ipoglicemija

Lyumjev KwikPen fih sodium

Din il-medicina fiha anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f'kull doża, li tista' tghid hija essenzjalment 'mingħajr sodium'.

3. Kif għandek tuża Lyumjev KwikPen

Dejjem għandek tuża din il-medicina kif deskritt f'dan il-fuljett jew skont il-parir eżatt tat-tabib, tal-ispiżjar jew tal-infermier tiegħek. Iċċekkja magħhom jekk ikollok xi dubju.

Huma se jkunu qalulek kemm eżatt għandek tuża Lyumjev, meta għandek tużah, u kemm-il darba għandek tużah. Se jgħidulek ukoll kemm ta' spiss għandek tmur għall-vista l-klinika tad-dijabete.

Biex tevita t-trasmissjoni possibbli ta' mard, kull pinna għandha tintuża minnek biss, anke jekk il-labra tinbidel.

Inti għandek dejjem iżżomm insulina żejda u apparat ieħor tal-injezzjoni f'każ li tiġi b'zonnhom.

Jekk inti għami jew għandek problemi bil-vista inti se jkollok b'zonn għajnuna mingħand haddieħor biex itik l-injezzjonijiet.

It-tabib tiegħek jista' jgħidlek tuża Lyumjev kif ukoll insulina li taħdem aktar fit-tul jew b'mod intermedju. Injetthom b'mod separat. Lyumjev m'għandux jithallat ma' xi insulina oħra.

Meta għandek tinjetta Lyumjev

Lyumjev huwa insulina ta' mal-ikel. Inti għandek tuża Lyumjev eżatt malli tibda tiekol, jew minuta jew tnejn qabel l-ikla; inti għandek ukoll l-għażla li tinjetta sa 20 minuta wara li tkun bdejt l-ikla.

Kemm għandek tuża insulina

It-tabib se jaħdimlek id-doża abbażi taz-zokkor fid-demm tiegħek u l-piż tal-gisem u se jispjegalek:

- Kemm għandek b'zonn Lyumjev f'kull ikla.
- Kif u meta għandek tiċċekkja l-livell ta' zokkor fid-demm tiegħek.
- Kif għandek tibdel id-doża tal-insulina skont il-livelli taz-zokkor fid-demm tiegħek.
- X'għandek tagħmel jekk tibdel id-dieta tiegħek, jew jekk tibdel kemm tagħmel eżerċizzju, jekk tkun ma tiflaħx jew jekk tkun qed tuża medicini oħra.
- Jekk tibdel it-tip ta' insulina li inti tuża, jista' jkun li inti jkollok tuża aktar jew anqas minn qabel. Dan jista' jkun biss għall-ewwel injezzjoni jew tista' tkun bidla bil-mod il-mod fuq diversi gimġat jew xhur.

Tużax Lyumjev

- Jekk ma jidhirx qisu ilma. Lyumjev għandu jkun ċar, bla kulur u ma jkollu l-ebda frak fih. Iċċekkja kull darba li tinjetta lilek innifsek.
- Jekk Lyumjev ma nħażinx kif suppost (ara sezzjoni 5 "Kif taħzen Lyumjev").
- Jekk il-pinna jkun fiha kwalunkwe ħsara, tużahiex.

Kif tlesti l-KwikPen għall-użu (Jekk jogħġbok ara l-istruzzjonijiet dwar l-użu)

- L-ewwel aħsel idejk.
- Aqra l-istruzzjonijiet dwar kif tuża il-pinna tal-insulina mimlija għal-lest. Jekk jogħġbok segwi l-istruzzjonijiet b'attenzjoni. Hawn għandek ftit affarijiet biex ifakkruk.
- Uża labra ġdida. (Il-labar mhux inkluzi).
- Ippompja l-KwikPen kull darba qabel ma tużaha. B'hekk tiċċekkja li l-insulina tohroġ barra u tneħhi l-bżieġaq tal-arja mill-KwikPen tiegħek. Jista' jagħti l-każ li xorta jkun għad hemm ftit bżieġaq tal-arja żgħar fil-pinna. Bżieġaq żgħar tal-arja huma normali u mhumiex se jaffettwaw id-doża tiegħek.
- In-numru ta' unitajiet jintwera fit-tieqa tad-doża, dejjem iċċekkjhomm qabel l-injezzjoni tiegħek.

Meta tagħti injezzjoni ta' Lyumjev

- Qabel ma tagħti l-injezzjoni, naddaf il-ġilda tiegħek.
- Injetta taht il-ġilda, kif ġejt mghallem mit-tabib jew mill-infermier tiegħek.
- Wara l-injezzjoni tiegħek, halli l-labra fil-ġilda għal 5 sekondi biex tkun żgur li tirċievi d-doża kollha. Aċċerta ruħek li tinjetta mill-inqas 1 mill-aħħar injezzjoni u li inti 'tibdel' il-postijiet li tinjetta fihom (in-naħa ta' fuq tad-driegħ, il-koxxa, il-warrani jew jew iż-żaqq).
- Jekk m'għandekx biżżejjed insulina fil-pinna biex tiegħu d-doża kollha tiegħek, hu nota ta' kemm għad trid tiegħu. Ippompja pinna ġdida u injetta d-doża li jkun għad jonqos.
- Jekk għandek bżonn tinjetta insulina oħra fl-istess waqt ma' Lyumjev, uża post differenti għall-injezzjoni.
- Tinjettax direttament go vina.

Wara li tinjetta

- Eżatt kif tkun ħadt l-injezzjoni, holl il-labra mill-KwikPen billi tuża l-għatu ta' barra tal-labra. Din iżomm l-insulina sterili u żżommha milli tqattar. Hija twaqqaf ukoll l-arja milli terġa' tidhol lura fil-pinna u il-labra milli tistadd. **Issellifx il-labar tiegħek. Issellifx il-pinna tiegħek.** Poġġi l-għatu lura fuq il-pinna tiegħek.
- Jekk m'intix ċert/a kemm injettajt għandek tiċċekkja l-livelli taz-zokkor fid-demm tiegħek qabel ma tiddeċiedi jekk għandekx bżonn injezzjoni oħra.

Aktar injezzjonijiet

- Kull darba li inti tuża KwikPen inti għandek tuża labra ġdida. Qabel kull injezzjoni, kwalunkwe bżieġaq tal-arja. Inti tista' tara kemm fadal insulina billi żomm il-KwikPen bil-labra thares 'il fuq.
- Ladarba l-KwikPen tiżvojta, terġax tużaha.

Jekk tuża Lyumjev aktar milli suppost

Jekk inti tinjetta wisq Lyumjev, jew m'intix ċert/a kemm injettajt, jista' jseħh livell baxx ta' zokkor fid-demm. Iċċekkja z-zokkor fid-demm tiegħek.

Jekk iz-zokkor fid-demm tiegħek jkun baxx (ipoglicemija) u inti tista' titratta lilek innifsek, hu pilloli tal-glukożju, zokkor jew xarba biz-zokkor. Imbagħad kul frott, gallettini, jew sandwich, skont kif ikun tak parir it-tabib jew l-infermier tiegħek u strieh ftit. B'hekk hafna drabi jirnexxilek tirkupra miz-zokkor baxx fid-demm jew doża eċċessiva hafifa ta' insulina. Erga' ċċekkja z-zokkor fid-demm tiegħek wara 15-20 min sakemm iz-zokkor fid-demm jistabilizza.

Jekk inti ma tistax titratta lilek innifsek (ipoglicemija severa) minhabba li thossok wisq stordut/a, dgħajfef/fa, konfuż/a, għandek diffikultà biex titkellem, tintilef minn sensik jew ittik aċċessjoni inti tista' tkun teħtieġ tigi trattat/a bil-glukagon. Dan jista' jingħata minn xi hadd li jkun jaf jużah. Hu l-glukożju jew iz-zokkor wara l-glukagon. Jekk il-glukagon ma jaħdimx, inti se jkollok tmur l-isptar jew iċċempel is-servizzi tal-emergenza. Staqsi lit-tabib tiegħek biex jgħidlek dwar il-glukagon.

Għid lil kull min tqatta' hin miegħu/magħha li inti għandek id-dijabete. Għidilhom x'jista' jigri jekk iz-zokkor fid-demm tiegħek jitbaxxa wisq, inkluz ir-riskju li tintilef minn sensik.

Avżhom li jekk tintilef minn sensik, huma għandhom idawruk fuq ġenbek biex tevita li tifga, iġibu għajnnu medika minnufih u biex ma jagħuk l-ebda ikel jew xorb minhabba li tista' tifga.

Jekk tinsa tuża Lyumjev

Jekkk tinsa tuża l-insulina tiegħek jew jekk inti tuża anqas milli suppost, jew m'intix ċert/a kemm injettajt, iz-zokkor fid-demm tiegħek jista' jkun għoli wisq (iperglicemija). Iċċekkja l-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek biex tiddeċiedi hemmx bżonn doża tal-insulina. Komplil bl-iskeda tal-għoti tad-doża tas-soltu waqt l-ikel li jmiss.

Jekk tieqaf tuża Lyumjev

Twaqqafx jew tibdilx l-insulina tiegħek hlief jekk jgħidlek tagħmel dan it-tabib tiegħek. Jekk inti tuża inqas Lyumjev milli suppost, jista' jsehh livell għoli ta' zokkor fid-demm.

Jekk iz-zokkor għoli fid-demm (iperglicemija) ma jiġix trattat jista' jkun serju ħafna u jikkawża uġiħ ta' ras, nawsja, rimettar, uġiħ fl-addome, deidratazzjoni, telf ta' koxjenza, koma jew anke mewt (ara sezzjoni 4).

Tliet affarijiet sempliċi biex tevita ipoglicemija jew iperglicemija huma:

- Dejjem żomm pinna żejda, f'każ li inti tiflel il-KwikPen jew jiġrilha l-ħsara.
- Dejjem żomm xi haġa fuqek biex turi li inti dijabetiku/a.
- Dejjem żomm iz-zokkor fuqek.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' din il-medicina, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

4. Effetti sekondarji possibbli

Bhal kull medicina oħra, din il-medicina tista' tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f'kulhadd.

Zokkor baxx fid-demm (ipoglicemija) huwa komuni ħafna bit-trattament tal-insulina (jista' jaffettwa aktar minn persuna 1 minn kull 10). Hija tista' tkun serja ħafna. Jekk il-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek jinżel wisq inti tista' tintilef minn sensik. Ipoglicemija serja tista' tikkawża ħsara fil-moħħ u tista' tkun ta' periklu għall-ħajja. Jekk inti għandek sintomi ta' zokkor baxx fid-demm, hu azzjoni **immedjatment** biex iżżid il-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek. Ara sezzjoni 3 taht 'Jekk tuża aktar Lyumjev milli suppost'.

Reazzjonijiet allergiċi huma komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 10). Huma jistgħu jkunu severi u jistgħu jinkludu s-sintomi li ġejjin:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| • raxx u ħakk mal-ġisem kollu | • tinżel il-persjoni |
| • diffikultà biex tiehu n-nifs | • qalb tħabbat tgħaġġel |
| • tħarhir | • ħruġ ta' għaraq |

Jekk ikollok reazzjoni allergika serja (inkluż attakk anafilattiku) għall-insulina jew għal kwalunkwe sustanza f'Lyumjev, ieqaf uża din il-medicina u kkuntatta s-servizzi mediċi tal-emergenza minnufih.

Effetti sekondarji oħra jinkludu

Komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 10)

Reazzjonijiet fil-post tal-injezzjoni. Xi persuni jkollhom ħmura, uġiħ, nefħa jew ħakk madwar il-post tal-injezzjoni tal-insulina. Dan is-soltu jgħaddi fi ftit minuti sa ftit ġimghat mingħajr ma tkun teħtieġ twaqqaf Lyumjev. Jekk inti jkollok reazzjonijiet fil-post tal-injezzjoni, għid lit-tabib tiegħek.

Mhux komuni (jistghu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 100)

Bidliet fil-ġilda fis-sit tal-injezzjoni: Jekk tinjetta insulina wisq ta' spiss fl-istess post, it-tessut xahmi jista' jew jiċkien (lipoatrofija) jew jihxien (lipoipertrofija). Boċċi taht il-ġilda jistghu jiġu kkawżati wkoll minn akkumulazzjoni ta' proteina msejha amilojdi (amilojdozi tal-ġilda). L-insulina tista' ma tahdimx tajjeb ħafna jekk tinjetta f'żona bil-boċċi. Ibdel is-sit tal-injezzjoni ma' kull injezzjoni biex tgħin fil-prevenzjoni ta' dawn il-bidliet fil-ġilda.

Effetti sekondarji oħra li jistghu jseħhu

Nefha fid-dirġajn jew fl-għekiesi minħabba żamma tal-fluwidu (edima), b'mod partikolari fil-bidu tat-terapija bl-insulina jew matul bidla fil-medicini tad-dijabete tiegħek.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellek lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek. Dan jinkludi xi effetti sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Tista' wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali mniżżla f'[Appendiċi V](#). Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista' tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta' din il-medicina.

Problemi komuni tad-dijabete

Zokkor baxx fid-demm

Zokkor baxx fid-demm (ipoglicemija) ifisser li m'hemmx biżżejjed zokkor fid-demm. Dan jista' jiġi kkawżat jekk:

- inti tiegħu wisq Lyumjev jew insulina oħra;
- inti taqbez ikliet jew iddum ma tiekol jew tibdel id-dieta tiegħek;
- inti tagħmel eżerċizzju jew tagħmel xogħol iebs eżatt qabel jew wara ikla;
- inti għandek infezzjoni jew mard (speċjalment dijarea jew rimettar);
- hemm bidla fil-bżonn tal-insulina tiegħek per eżempju jekk titlef il-piż; jew
- inti għandek problemi bil-kliewi jew bil-fwied li jmorru għall-aġġar.

Ara s-sezzjoni 'Jekk tuża Lyumjev aktar milli suppost.'

L-ewwel sintomi ta' zokkor baxx fid-demm is-soltu jiġu malajr u jinkludu dan li ġej:

- gheja
- qalb tħabbat b'mod mgħaġġel
- nervi jew roġħda
- tħossok imdardar
- uġiġħ ta' ras
- għaraq kiesaħ

Jekk m'intix kunfidenti li tagħraf is-sintomi ta' twissija tiegħek, evita sitwazzjonijiet bħal issuq karozza, li fihom inti jew persuni oħra jitpoġġew f'periklu minħabba ipoglicemija.

Zokkor għoli fid-demm (iperglicemija) u ketoacidozi tad-dijabete

Iperglicemija (wisq zokkor fid-demm) tfisser li li l-livelli tal-glucose fil-ġisem tiegħek huma għoljin wisq. Iperglicemija tista' tiġi minħabba:

- li inti ma tihux l-insulina tiegħek;
- tuża inqas insulina minn kemm jehtieg il-ġisem tiegħek;
- żbilanċ bejn l-ammont ta' karboidrati li tiekol u l-ammont ta' insulina li tiegħu; jew
- deni, infezzjoni jew stress emozzjonali.

Is-sintomi bikrija ta' iperglicemija huma:

- tkun bil-għatx ħafna
- uġiġħ ta' ras
- tħossok bi nġhas
- tagħmel awrina aktar spiss

L-iperglicemija tista' twassal għall-ketoacidożi tad-dijabete. L-ewwel sintomi jiġu bil-mod fuq perjodu ta' hafna sigħat jew jiem. Sintomi addizzjonali jinkludu li ġejjin:

- nawsja u/jew rimettar
- uġiġh fl-addome
- polz mghaġġel
- tieħu nifs fil-fond
- ammonti moderati jew kbar ta' ketoni fl-awrina. Il-ketoni jiġu magħmula meta l-ġisem tiegħek jahraq ix-xaħam għall-enerġija minflok il-glucose.

Jekk għandek kwalunkwe minn dawn is-sintomi u zokkor għoli **ġib għajnuna medika minnufih**. Ara s-sezzjoni 'Jekk tinsa' tuża Lyumjev'.

Mard

Jekk inti ma tiflaħx, speċjalment jekk qed thossok imdardar jew qed tirremetti, l-ammont ta' insulina li inti għandek bżonn jista' jinbidel. **Anke meta inti ma tkunx qed tiekol b'mod normali, inti xorta jkollok bżonn l-insulina.** Ittestja l-awrina jew id-demm, segwi 'r-regoli ta' meta tkun ma tiflaħx', u għid lit-tabib tiegħek.

5. Kif taħžen Lyumjev KwikPen

Żomm din il-medicina fejn ma' tintlaħaqx u ma tidhirx mit-tfal.

Tużax din il-medicina wara d-data ta' meta tiskadi li tidher fuq it-tikketta u l-kartuna. Id-data ta' meta tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta' dak ix-xaħar.

Qabel l-ewwel użu

Ahžen fi frigġ (2 °C – 8 °C).

Tagħmlux fil-friża.

Żomm fil-kartuna ta' barra sabiex tilqa' mid-dawl.

Wara l-ewwel użu

Taħzinx f'temperatura 'l fuq minn 30 °C.

Tagħmlux fil-friża.

Tagħmlux fil-frigġ.

Il-KwikPen m'għandhiex tinhažen bil-labra mwahħla. Żomm l-għatu fuq il-pinna sabiex tilqa' mid-dawl.

Armiha wara 28 jum **anke jekk ikun għad fadal fiha xi soluzzjoni.**

Tarmix medicini mal-ilma tad-dranagġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif għandek tarmi medicini li m'għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X'fiha Lyumjev 100 unità/ml KwikPen soluzzjoni għall-injezzjoni

- Is-sustanza attiva hija insulin lispro. Kull ml soluzzjoni fiha 100 unità ta' insulin lispro. KwikPen waħda fiha 300 unità ta' insulin lispro f'soluzzjoni ta' 3 ml.
- Is-sustanzi l-oħra huma metacresol, glycerol, magnesium chloride hexahydrate, sodium citrate dihydrate, treprostini sodium, zinc oxide, ilma għall-injezzjonijiet. Sodium hydroxide jew hydrochloric acid setgħu intużaw biex jaġġustaw il-pH (ara t-tmiem ta' sezzjoni 2 taħt 'Lyumjev KwikPen fih sodium').

Kif jidher Lyumjev KwikPen u l-kontenut tal-pakkett

Lyumjev KwikPen soluzzjoni għall-injezzjoni hija soluzzjoni ċara, bla kulur, akweja f'pinna mimlija għal-lest. Kull pinna mimlija għal-lest fiha 300 unità (3 millilitri).

Daqsijiet tal-pakkett ta' 2, 5 jew pakkett b'hafna ta' 2 x 5 pinen mimlija għal-lest.

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkun fis-suq.

Il-Lyumjev KwikPen hija griża bil-kannella (taupe). Il-buttuna tad-doża hija blu bi ħnieq imqabbża mal-ġenb. It-tikketta hija blu u bajda.

Kull Lyumjev KwikPen tagħti minn unità 1 sa 60 unità f'żidiet ta' unità 1 f'injezzjoni waħda.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83

3528 BJ Utrecht

L-Olanda.

Manifattur

Lilly France

Rue du Colonel Lilly

67640 Fegersheim

Franza.

Għal kull tagħrif dwar din il-medicina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq:

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Lietuva

Tel: +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

Тел.: + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel.: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf.: +45 45 26 6000

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH

Tel: + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: +372 6817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S.

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges. m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Dista S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 440 33 00

France

Lilly France

Portugal

Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.
Tel: +385 1 2350 999

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited
Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Ísland

Icepharma hf.
Sími: + 354 540 8000

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.
Tel: + 39- 055 42571

Κύπρος

Phadisco Ltd
Τηλ: +357 22 715000

Latvija

Eli Lilly (Suisse) S.A Pārstāvniecība Latvijā
Tel: +371 67364000

Tel: + 351-21-4126600

România

Eli Lilly România S.R.L.
Tel: + 40 21 4023000

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.
Tel: +386 (0) 1 580 00 10

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia s.r.o.
Tel: + 421 220 663 111

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab
Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Sverige

Eli Lilly Sweden AB
Tel: + 46-(0) 8 7378800

Dan il-fuljett kien rivedut l-ahhar f'

Sorsi ohra ta' informazzjoni

Informazzjoni dettaljata dwar din il-medicina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Medicini: <https://www.ema.europa.eu>.

Instruzzjonijiet dwar l-Użu

Lyumjev 100 unità/mL KwikPen soluzzjoni għall-injezzjoni f'pinna mimlija għal-lest insulin lispro



JEKK JOGHĠBOK AQRA DAWN L-ISTRUZZJONIJIET QABEL L-UŻU

Aqra l-istruzzjonijiet dwar l-użu qabel tibda tiegħu Lyumjev u kull darba li inti għib Lyumjev KwikPen għdida. Jista' jkun hemm informazzjoni għdida. Din l-informazzjoni ma tiħux post li inti titkellem mal-professjonist tiegħek fil-qasam tal-kura tas-saħħa dwar il-kundizzjoni medika tiegħek jew it-trattament tiegħek.


Issellifx il-Lyumjev KwikPen lil persuni ohra, anke jekk tkun inbidlet il-labra. Tergax tuża labar użati jew issellef il-labar tiegħek lil persuni ohra. Inti tista' tagħtiom infezzjoni serja jew inti tista' tiegħu infezzjoni serja mingħandhom.

Lyumjev 100 unità/mL KwikPen ("Pinna") hija pinna mimlija għal-lest li tintrema wara li tintuża li fiha 3 mL (300 unità, 100 unità/mL) ta' soluzzjoni ta' insulin lispro għall-injezzjoni.

- Il-professjonist fil-qasam tal-kura tas-saħħa tiegħek se jgħidlek kemm-il unità għandek tagħti bħala d-doża tiegħek u kif għandek tinjetta d-doża tal-insulina ordnata lilek.
- Inti tista' tagħti lilek innifsek aktar minn doża waħda mill-Pinna.
- Kull dawra tal-buttuna tagħti unità 1 ta' insulina. Inti tista' tagħti minn unità 1 sa 60 unità f'injezzjoni waħda.
- Jekk id-doża tiegħek hija aktar minn 60 unità, inti se jkollok bżonn tagħti lilek innifsek aktar minn injezzjoni waħda. Dejjem għandek tiċċekkja n-numru fit-tieqa tad-doża biex taċċerta ruħek li inti tkun dawwart id-doża t-tajba.
- Il-planger jiċċaqlaq ftit biss ma' kull injezzjoni u jista' jkun li inti ma tinnutax li jiċċaqlaq. Il-planger jilhaq it-tarf tal-iskartoċċ biss meta inti tkun użajt it-300 unità kollha li fiha l-Pinna.


Persuni li huma għomja jew għandhom problemi bil-vista m'għandhomx jużaw il-Pinna mingħajr l-għajnuna ta' persuna mharrġa fl-użu tal-Pinna.

Partijiet ta' Lyumjev KwikPen



Partijiet tal-Labra tal-Pinna (Il-Labar Mhumiex Inkluzi)

Buttuna tad-Doża



Kif tagħraf il-Lyumjev KwikPen tiegħek

- Kulur tal-pinna: Griż bil-Kannella (Taupe)
- Buttuna tad-doża: Blu, b'sinjali mqabbża mal-ġenb
- Tikketta: Blu u bajda




Affarijiet meħtieġa biex tagħti l-injezzjoni tiegħek

- Lyumjev KwikPen
- Labar kumpatibbli mal-KwikPen (huma rrakkomandati l-labar BD [Becton, Dickinson and Company] tal-Pinna)
- Imselha jew garża

Kif tipprepara l-Pinna tiegħek

- Aħsel idejk bis-sapun u l-ilma.
- Iċċekkja l-Pinna biex taċċerta ruhek li inti tkun qed tieħu t-tip ta' insulina it-tajba. Dan huwa importanti b'mod speċjali jekk inti tuża aktar minn tip wieħed ta' insulina.
- **Tużax** il-Pinna tiegħek wara d-data ta' meta tiskadi li hemm stampata fuq it-tikketta jew għal aktar minn 28 gurnata wara li inti tibda tuża l-Pinna għall-ewwel darba.
- Dejjem uża **labra ġdida** għal kull injezzjoni biex tevita infezzjonijiet u labar misdudin.



Pass 1: • Iġbed l-għatu tal-Pinna dritt 'il barra. – Tnehhix it-tikketta tal-Pinna. • Imsaħ is-sigill tal-gomma bl-imselha.	
Pass 2: • Iċċekkja l-likwidu fil-Pinna. • Lyumjev għandu jidher ċar u bla kulur. Tużahx jekk ikun imdardar, ikkulurit, jew ikun fih frak jew ċapep.	


Pass 3: - Aghżel labra ġdida. - Iġbed it-tikketta tal-karti minn mal-protezzjoni ta' barra tal-labra.	
Pass 4: Imbotta l-labra li għadha bl-għatu dritt fuq il-Pinna u dawwar il-labra sakemm tissikka.	
Pass 5: - Aqla' l-protezzjoni ta' barra tal-labra billi tiġbidha. Tarmihix. - Aqla' l-protezzjoni ta' ġewwa tal-labra billi tiġbidha u armiha.	

Kif tippompja l-pinna

Ippompja qabel kull injezzjoni.




- Tippompja l-Pinna tiegħek ifisser li tneħhi l-arja mil-labra u mill-iskartoċ li tista' tingabar matul l-użu normali tal-pinna u jiġi aċċertat li l-Pinna tiegħek tkun qegħda taħdem sew.
- Jekk inti **ma tippompjax** qabel kull injezzjoni, inti tista' tirċievi wisq jew ftit wisq insulina.

Pass 6: Biex tippompja l-Pinna tiegħek aghżel 2 unitajiet.	
Pass 7: Żomm il-Pinna tiegħek bil-labra thares 'il fuq. Tektek bil-mod il-kontenitur tal-iskartoċ biex tiġbor il-bżieġaq tal-arja n-naħa ta' fuq.	
Pass 8: Kompli żomm il-Pinna bil-labra thares 'il fuq. Dawwar il-buttuna tad-doża sakemm tieqaf u jidher "0" fit-tieqa tad-doża. Żomm il-buttuna tad-doża 'l ġewwa u ghodd sal-5 bil-mod. Inti għandek tara l-insulina fit-tarf tal-labra.	

– Jekk inti ma tarax insulina, irrepeti l-passi 6 sa 8 tal-ippumpjar, iżda mhux għal aktar minn 4 darbiet. – Jekk tibqa' ma tarax insulina, biddel il-labra u rrepeti l-passi 6 sa 8 tal-ippumpjar. Bżiežaq żgħar tal-arja huma normali u mhumiex se jaffettwaw id-doża tiegħek.	
--	---

Kif tagħzel id-doża tiegħek



- Tista' tagħti minn unità waħda sa 60 unità f'injezzjoni waħda.
- Jekk id-doża tiegħek hija iżjed minn 60 unità, inti jkollok bżonn tagħti iżjed minn injezzjoni waħda.
 - Jekk għandek bżonn l-ghajnuna sabiex tiddeċiedi kif għandek taqşam id-doża tiegħek, staqsi lill-professionist tiegħek tal-kura tas-saħħa.
 - Għandek tuża labra ġdida għal kull injezzjoni u tirrepeti l-passi tal-ippumpjar.


Pass 9: • Dawwar il-buttuna tad-doża biex tagħzel in-numru ta' unitajiet li inti tehtieg tinjetta. L-indikatur tad-doża għandu jiġi bi dritt id-doża tiegħek. – Il-Pinna ddawwar unità waħda kull darba. – Il-buttuna tad-doża tagħmel klikk meta ddawwarha. – Iddawwarx id-doża tiegħek billi tgħodd in-numru ta' klikks. Tista' ddawwar id-doża l-ħażina. Dan jista' jwassal biex inti tieħu wisq insulina jew ma tihux biżżejjed insulina. – Id-doża tista' tiġi kkoreġuta billi ddawwar il-buttuna fi kwalunkwe direzzjoni sakemm id-doża korretta tiġi bi dritt l-indikatur tad-doża. – In-numri biż-żewġ huma stampati fuq il-wiċċ li jdur. L-eżempju fuq il-lemin juri 12-il unità. – In-numri bil-fard, wara n-numru 1, qed jintwerew bħala linji shaħ bejn in-numri. L-eżempju fuq in-naħa tal-lemin qed juri 25 unità. • Dejjem iċċekkja in-numru fit-tieqa tad-doża biex taċċerta ruhek li inti dawwart id-doża t-tajba.	  Eżempju: 12-il unità murija fit-tieqa tad-doża  Eżempju: 25 unità murija fit-tieqa tad-doża
--	---

- Il-Pinna ma thallikx iddawwar aktar min-numru ta' unitajiet li jkun għad-fadal fil-Pinna.
- Jekk għandek bżonn tinjetta aktar min-numru ta' unitajiet li għad fadal fil-Pinna, inti tista' jew:
 - tinjetta l-ammont li jkun għad fadal fil-Pinna mbagħad tuża Pinna ġdida biex tagħti l-bqija tad-doża tiegħek,
- **jew**
 - iġġib Pinna ġdida u tinjetta d-doża kollha.
- Huwa normali li tara ammont żgħir ta' insulina li tibqa' fil-Pinna u li inti ma tkunx tista' tinjetta.



Kif tagħti l-injezzjoni tiegħek

- Injetta l-insulina tiegħek kif uriek il-professionist tiegħek tal-kura tas-saħħa.
- Ibdel il-post tal-injezzjoni tiegħek għal kull injezzjoni.
- **Tippruvax** tibdel id-doża tiegħek waqt li tkun qed tinjetta.

Pass 10: • Aghżel il-post tal-injezzjoni tiegħek. Lyumjev jiġi injezzjoni taħt il-ġilda fiż-żona tal-istonku, fil-warrani, fin-naħa ta' fuq tar-rigħel jew fin-naħa ta' fuq tad-driegħ. • Imsaħ il-ġilda tiegħek b'imselha, u halli l-ġilda tiegħek tinxfef qabel tinjetta d-doża.	
Pass 11: • Dahhal il-labra fil-ġilda tiegħek. • Aghfas il-buttuna tad-doża kollha kemm hi 'l ġewwa. • Kompli żomm il-buttuna tad-doża magħfusa 'l ġewwa u bil-mod għodd sal-5 qabel ma toħroġ il-labra. Tippruvax tinjetta l-insulina tiegħek billi ddawwar il-buttuna tad-doża. M'intix se tirċievi l-insulina billi ddawwar il-buttuna tad-doża.	 


Pass 12: • Iġbed il-labra 'l barra minn ġol-ġilda tiegħek. – Qatra insulina fit-tarf tal-labra hija normali. Hija mhijiex se taffettwalek id-doża. • Iċċekkja n-numru fit-tieqa tad-doża. – Jekk tara “0” fit-tieqa tad-doża, inti tkun irċivejt l-ammont kollu li tkun dawwart. – Jekk ma tarax “0” fit-tieqa tad-doża, inti ma tkunx irċivejt id-doża kollha tiegħek. Trerġax iddawwar. Dahhal il-labra fil-ġilda u spiċċa l-injezzjoni. – Jekk xorta taħseb li inti ma rċivejtx l-ammont kollu li inti dawwart għall-injezzjoni tiegħek, terġax tibda mill-bidu u tirrepetix dik l-injezzjoni. Immonitorja l-glukożju fid-demm kif spjegat mill-professionist tiegħek tal-kura tas-saħħa. – Jekk is-soltu inti jkollok bżonn tagħti 2 injezzjonijiet għad-doża shiħa tiegħek, kun ċert/a li tagħti t-tieni injezzjoni. Il-planger jiċċaqlaq ffit biss ma' kull injezzjoni u jista' jkun li inti ma tinnutax li jiċċaqlaq. Jekk tara d-demm wara li inti tkun ġbidt il-labra 'l barra minn ġol-ġilda tiegħek, aghfas il-post tal-injezzjoni b'mod ħafif b'biċċa garża jew imselha. Togħhorokx iż-żona.	
--	---

Wara l-injezzjoni tiegħek

Pass 13: • B'attenzjoni poġġi lura l-protezzjoni ta' barra tal-labra.	
Pass 14: • Holl il-labra mġhottija u armiha kif deskritt hawn taht (ara s-sezzjoni “Kif tarmi l-Pinen u l-labar”). • Tahżinx il-Pinna bil-labra mwahhla magħha biex tevita li tqattar, li l-labra tistadd, u li tidhol l-arja fil-Pinna.	

Pass 15:

- Poġġi lura l-għatu tal-Pinna billi tpoġġi l-klipp tal-pinna bi dritt l-idikatur tad-doża u timbotta dritt 'il ġewwa.

**Kif tarmi l-Pinen u l-labar**

- Poġġi l-labar użati f'kontenitur għal oġġetti li jaqtgħu jew bil-ponta jew f'kontenitur ta' plastik iebes b'għatu sikur. **Tarmix** il-labar direttament fl-iskart domestiku tiegħek.
- **Tirriċiklax** il-kontenitur għal oġġetti li jaqtgħu jew bil-ponta meta jimtela.
- Staqsi lill-professjonist tiegħek tal-kura tas-saħħa dwar l-għażliet biex tarmi kif suppost il-Pinna u l-kontenitur għal oġġetti li jaqtgħu jew bil-ponta.
- L-istruzzjonijiet dwar l-immaniġġjar tal-labar mhumiex maħsuba li jiehdu post ir-regoli lokali, tal-professjonisti tal-kura tas-saħħa jew istituzzjonali.

Kif tagħraf u ssolvi xi problemi fil-Pinna

- Jekk ma tkunx tista' tneħhi l-għatu tal-Pinna, dawwar bil-mod l-għatu 'l quddiem u lura, imbagħad iġbdu dritt 'il barra.
- Jekk il-buttuna tad-doża hija iebsa biex tagħfasha:
 - li tagħfas il-buttuna tad-doża aktar bil-mod se jagħmilha aktar faċli biex tinjetta.
 - il-labra tiegħek tista' tkun misduda. Poġġi labra ġdida u ppompja l-Pinna.
 - inti jista' jkollok trab, ikel jew likwidu ġol-Pinna. Armi l-Pinna u ġib Pinna ġdida.

Jekk għandek xi mistoqsijiet jew problemi bil-KwikPen tiegħek, ikkuntattja l-professjonist tiegħek tal-kura tas-saħħa għall-għajjnuna jew ikkuntattja r-rappreżentant lokali ta' Lilly

Data ta' Reviżjoni tad-Dokument:

Fuljett ta' taghrif: Informazzjoni għall-utent

Lyumjev 100 unità/ml Junior KwikPen soluzzjoni għall-injezzjoni f'pinna mimlija għal-lest insulin lispro

Kull Junior KwikPen tagħti 0.5 sa 30 unità f'passi ta' 0.5 unità f'injezzjoni waħda.

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-medicina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok b'zonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib, lill-infermier jew lill-ispiżjar tiegħek.
- Din il-medicina għet mogħtija lilek biss. M'għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista' tagħmlilhom il-ħsara, anke jekk għandhom l-istess sinjali ta' mard bħal tiegħek.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib, lill-infermier jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effetti sekondarji possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F'dan il-fuljett

1. X'inhum Lyumjev Junior KwikPen u għalxiex jintuża
2. X'għandek tkun taf qabel ma tuża Lyumjev Junior KwikPen
3. Kif għandek tuża Lyumjev Junior KwikPen
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif taħżen Lyumjev Junior KwikPen
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1. X'inhum Lyumjev KwikPen u għalxiex jintuża

Lyumjev 100 unità/ml Junior KwikPen soluzzjoni għall-injezzjoni f'pinna mimlija għal-lest fih is-sustanza attiva insulin lispro. Lyumjev jintuża għat-trattament tad-dijabete mellitus fl-adulti, fl-adolesxenti u fit-tfal mill-età ta' sena u 'l fuq. Huwa insulina ta' mal-ikel li taħdem aktar malajr minn medicini oħra li fihom insulin lispro. Lyumjev fih sustanzi li jagħġlu l-assorbiment ta' insulin lispro għal ġol-ġisem.

Id-dijabete hija kondizzjoni li fiha l-ġisem tiegħek ma jagħmilx biżżejjed insulina jew ma jużax l-insulina b'mod effettiv, li jwassal għal effetti bħal livelli għoljin ta' zokkor fid-demm. Lyumjev huwa medicina ta' insulina li jintuża fit-trattament tad-dijabete u b'hekk jikkontrolla z-zokkor fid-demm. Trattament effettiv tad-dijabete, b'kontroll tajjeb taz-zokkor fid-demm, jevita kumplikazzjonijiet fuq tul ta' żmien mid-dijabete tiegħek.

It-trattament b'Lyumjev jgħin biex jikkontrolla z-zokkor fid-demm fuq żmien twil u jevita kumplikazzjonijiet mid-dijabete tiegħek. Lyumjev jkollu l-effett massimu tiegħu minn 1 sa 3 sigħat wara l-injezzjoni u l-effett idum sa 5 sigħat. Inti għandek tuża Lyumjev fil-bidu tal-ikla, jew sa 20 minuta wara li tkun bdejt tiekol.

It-tabib tiegħek jista' jgħidlek biex tuża Lyumjev kif ukoll insulina li taħdem fit-tul jew b'mod intermedju. Tbidilx l-insulina tiegħek sakemm ma jgħidlekx it-tabib tiegħek.

Lyumjev 100 unità/ml Junior KwikPen hija pinna mimlija għal-lest li tintrema wara li tintuża li fiha 3 ml (300 unità, 100 unità/ml) ta' insulin lispro. KwikPen waħda fiha hafna doži ta' insulina. Il-KwikPen izzid nofs unità (0.5 unità) kull darba. **In-numru ta' unitajiet jidher fit-tieqa tad-doża, dejjem iċċekkja dan qabel l-injezzjoni tiegħek.** Inti tista' tagħti minn 0.5 unità sa 30 unità f'injezzjoni waħda. **Jekk id-doża tiegħek hija aktar minn 30 unità, inti se jkollok b'zonn tagħti lilek innifsek aktar minn injezzjoni waħda.**

2. X'ghandek tkun taf qabel ma tuża Lyumjev Junior KwikPen

TUŻAX Lyumjev Junior KwikPen

- jekk taħseb li z-zokkor fid-demmm tiegħek nieżel (**ipoglicemija**). Iktar 'il quddiem, dan il-fuljett se jgħidlek kif titratta zokkor baxx fid-demmm (ara sezzjoni 3 taht “Jekk tuża Lyumjev aktar milli suppost”).
- jekk inti **allergiku/a** għal insulin lispro jew għal xi sustanza oħra ta' din il-medicina (imnizzla fis-sezzjoni 6).

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek qabel tuża Lyumjev.

Jekk inti ma tistax tara tajjeb inti se jkollok bżonn l-għajnuna ta' xi hadd li jkun imharreg biex jagħti injezzjonijiet.

- **Zokkor baxx fid-demmm (ipoglicemija).**

Zokkor baxx fid-demmm jista' jkun serju u ipoglicemija li ma tiġix trattata tista' anke twassal għall-mewt.

Lyumjev jibda jnaqqas iz-zokkor fid-demmm aktar malajr minn xi wħud mill-insulini ta' mal-ikel. Jekk issehh ipoglicemija, din tista' tiġrilek qabel wara injezzjoni ta' Lyumjev. Jekk ikollok ipoglicemija ta' spiss jew ikollok diffikultà biex tagħrafha, jekk jogħgbok iddiskuti dan mat-tabib jew mal-infermier tiegħek. Jekk il-livelli taz-zokkor fid-demmm tiegħek huma kkontrollati tajjeb bit-terapija tal-insulina tiegħek ta' bħalissa jew wara żmien twil ta' dijabete, jista' jkun li inti ma tħossx is-sintomi ta' twissija meta z-zokkor fid-demmm tiegħek ikun qed jitbaxxa wisq. Sinjali ta' twissija huma elenkati aktar tard f'dan il-fuljett. Għas-sintomi jekk jogħgbok ara “Probemi komuni tad-dijabete”.

Inti għandek taħseb sewwa dwar meta għandek tiekol, kemm tagħmel eżerċizzju u kemm tagħmlu ta' spiss. Għandek ukoll tosserva mill-qrib il-livelli taz-zokkor fid-demmm tiegħek billi tittestja z-zokkor fid-demmm tiegħek iktar ta' spiss.

Meta tagħmel bidliet fit-tipi ta' insulina li inti tuża dan jista' jikkawża z-zokkor fid-demmm tiegħek jogħla jew jinżel wisq.

Jista' jkun meħtieġ li żżid il-frekwenza tal-ittestjar taz-zokkor fid-demmm jekk inti qiegħed/a f'riskju ta' zokkor baxx fid-demmm. It-tabib tiegħek jista' jkun jeħtieġ jibdillek id-dożi tal-medicini l-oħra tiegħek tad-dijabete.

- **Zokkor għoli fid-demmm (iperglicemija).**

It-twaqqif tal-insulina jew li ma tiħux biżżejjed insulina jista' jwassal għal zokkor għoli fid-demmm (iperglicemija) u ketoacidożi tad-dijabete, kondizzjonijiet serji li possibilmint jistgħu jwasslu anke għall-mewt. Għas-sintomi jekk jogħgbok ara “Problemi komuni tad-dijabete”.

- Jekk it-trattament tal-insulina tiegħek jkun qed jingħata flimkien ma' wiehed mill-klassi ta' medicini tad-dijabete msejha thiazolidinediones jew glitazones, bħal ma huwa pioglitazone, għid lit-tabib tiegħek mill-aktar fis jekk ikollok sinjali ta' insufficjenza tal-qalb bħal qtugħ ta' nifs mhux tas-soltu jew żieda malajr fil-piż jew nefha lokalizzata ikkawżata minn żamma ta' fluwidu (edima).
- Jekk għandek reazzjoni allergika serja għall-insulina jew għal kwalunkwe sustanza ta' Lyumjev, ieqaf uża din il-medicina u kkuntattja s-servizzi ta' emerġenza medika minnufih.
- Dejjem għandek tiċċekkja l-pakkett u t-tikketta għall-isem u t-tip ta' insulina meta inti għibha mill-ispiżerija. Aċċerta ruhek li għib il-Lyumjev li t-tabib qellek biex tuża.
- Żomm il-kartuna, jew żomm nota tan-numru tal-lott ta' fuq il-kartuna. Jekk ikollok effett sekondarju inti mbaġħad tkun tista' tipprovi dak in-numru meta inti tirrapporta l-effett sekondarju, ara “rappurtar ta' effetti sekondarji”.
- Dejjem uża labra għdida għal kull injezzjoni biex tevita infezzjonijiet jew labar misduda. Jekk labra tistadd ibdilha ma' labra għdida.

- **Bidliet fil-ġilda fis-sit tal-injezzjoni.**

Is-sit tal-injezzjoni għandu jinbidel kull darba biex jiġu evitati bidliet fil-ġilda bħal boċċi taħt il-ġilda. L-insulina tista' ma taħdimx tajjeb ħafna jekk tinjetta f'żona bil-boċċi (ara "Kif għandek tuża Lyumjev Junior KwikPen"). Ikkuntattja lit-tabib tiegħek jekk bħalissa qed tinjetta f'żona bil-boċċi qabel ma tibda tinjetta f'parti differenti. It-tabib tiegħek jista' jgħidlek biex tiċċekkja aktar mill-qrib iz-zokkor fid-demm tiegħek, u biex taġġusta d-doża tal-insulina jew tal-medikazzjonijiet antidijabetiċi l-oħra tiegħek.

Tfal u adolexxenti

Din il-medicina mhix irrakkomandata għall-użu fit-tfal taħt l-età ta' sena.

Medicini oħra u Lyumjev

Għid lit-tabib, lill-infermier jew lill-ispizjar tiegħek jekk qed tiehu, haadt dan l-aħħar jew tista' tiehu xi medicini oħra. Xi medicini jaffettwaw iz-zokkor fid-demm tiegħek – dan jista' jfisser li d-doża tal-insulina tiegħek għandha tinbidel.

Il-livelli taz-zokkor fid-demm tiegħek jistgħu jinżlu (ipoglicemija) jekk inti tiehu:

- medicini oħra għad-dijabete (mill-ħalq u li jiġu injettati)
- antibijotiċi sulphonamide (għall-infezzjonijiet)
- acetylsalicylic acid (għall-uġiġħ u deni ħafif u biex jiġi evitat tgħaqid tad-demm)
- xi antidepressanti (inibituri ta' monoamine oxidase jew inibituri selettivi tal-assorbiment mill-ġdid tas-serotonin)
- xi inibituri tal-enzima li tikkonverti angiotensin (ACE, angiotensin converting enzyme) (per eżempju captopril, enalapril) (għal pressjoni għolja jew problemi tal-qalb)
- imblokkaturi tar-riċetturi ta' angiotensin II (għall-pressjoni għolja)
- analogi ta' somatostatin (bħal octreotide, li jintużaw biex jitrattaw kondizzjoni rari li tinvolvi ormon żejjed ta' tkabbir)

Il-livelli taz-zokkor fid-demm tiegħek jistgħu jogħlew (iperglicemija) jekk inti tiehu:

- danazol (għall-endometrijozi)
- il-pillola kontraċettiva (pilloli għall-kontroll tat-tqala)
- terapija ta' sostituzzjoni tal-ormoni tat-tirojde (għal problemi tat-tirojde)
- ormon tat-tkabbir tal-bniedem (għal defiċjenza tal-ormon tat-tkabbir)
- dijuretiċi (għal pressjoni għolja jew jekk qed jingemgħa l-ilma fil-ġisem tiegħek)
- sustanzi simpatomimetici (għal reazzjonijiet allergici serji jew jintużaw f'xi medicini għall-irjihat)
- kortikosteroidi (biex jitrattaw l-ażma jew kondizzjonijiet awtoimmuni)

Imblokkaturi tar-riċetturi beta (jintużaw għall-pressjoni għolja, aritmija jew angina) jagħmluha aktar diffiċli biex wiehed jagħraf is-sintomi ta' twissija ta' zokkor baxx fid-demm.

Lyumjev mal-alkohol

Il-livelli taz-zokkor tiegħek jistgħu jew jogħlew jew jinżlu jekk inti tixrob l-alkohol. Għalhekk l-ammont ta' insulina meħtieġa jista' jinbidel. Għalhekk inti għandek timmonitorja l-livell ta' zokkor fid-demm tiegħek aktar ta' spiss mis-soltu.

Tqala u treddiġħ

Jekk inti tqila jew qed tredda', taħseb li tista' tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir tat-tabib, tal-infermier jew tal-ispizjar tiegħek qabel tiehu din il-medicina. L-ammont ta' insulina li inti tkun teħtieġ is-soltu jonqos matul l-ewwel 3 xhur tat-tqala u jiżdied għas-6 xhur li jkun għad fadal. Wara li inti jkollok it-tarbija l-bżonnijiet tiegħek tal-insulina x'aktarx jirritornaw għal dak li kont teħtieġ qabel it-tqala.

M'hemm l-ebda restrizzjonijiet fuq it-trattament b'Lyumjev matul it-treddigh. Jekk inti qed tredda', jista' jkollok b'zonn tbiddel it-tehid tal-insulina jew id-dieta.

Sewqan u thaddim ta' magni

Il-hila biex tikkoncentra u tirreagixxi tista' tonqos jekk inti jkollok ipoglicemija. Jekk jogħġbok zomm quddiem għajnejk din il-problema possibbli fis-sitwazzjonijiet kollha fejn inti tista' tpoġġi lilek innifsek jew oħrajn f'riskju (eż. issuq karożza jew thaddem magni). Inti għandek tikkuntattja lit-tabib tiegħek dwar is-sewqan jekk inti għandek:

- episodji frekwenti ta' ipoglicemija
- sinjali ta' twissija mnaqqsa jew assenti meta jkollok ipoglicemija

Lyumjev Junior KwikPen fih sodium

Din il-medicina fiha anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f'kull doża, li tista' tghid hija essenzjalment 'mingħajr sodium'.

3. Kif għandek tuża Lyumjev Junior KwikPen

Dejjem għandek tuża din il-medicina kif deskritt f'dan il-fuljett jew skont il-parir eżatt tat-tabib, tal-ispiżjar jew tal-infermier tiegħek. Iċċekkja magħhom jekk ikollok xi dubju.

Huma se jkunu qalulek kemm eżatt għandek tuża Lyumjev, meta għandek tużah, u kemm-il darba għandek tużah. Se jgħidulek ukoll kemm ta' spiss għandek tmur għall-vista l-klinika tad-dijabete.

Biex tevita t-trasmissjoni possibbli ta' mard, kull pinna għandha tintuża minnek biss, anke jekk il-labra tinbidel.

Inti għandek dejjem iżżomm insulina żejda u apparat ieħor tal-injezzjoni f'każ li tiġi b'zonnhom.

Jekk inti għami jew għandek problemi bil-vista inti se jkollok b'zonn għajnuna mingħand haddieħor biex itik l-injezzjonijiet. It-tabib tiegħek jista' jgħidlek tuża Lyumjev kif ukoll insulina li taħdem aktar fit-tul jew b'mod intermedju. Injetthom b'mod separat. Lyumjev m'għandux jithallat ma' xi insulina oħra.

Meta għandek tinjetta Lyumjev

Lyumjev huwa insulina ta' mal-ikel. Inti għandek tuża Lyumjev eżatt malli tibda tiekol, jew minuta jew tnejn qabel l-ikla; inti għandek ukoll l-għażla li tinjetta sa 20 minuta wara li tkun bdejt l-ikla.

Kemm għandek tuża insulina

It-tabib se jaħdimlek id-doża abbażi taz-zokkor fid-demmi tiegħek u l-piż tal-ġisem u se jispjegalek:

- Kemm għandek b'zonn Lyumjev f'kull ikla.
- Kif u meta għandek tiċċekkja l-livell ta' zokkor fid-demmi tiegħek.
- Kif għandek tibdel id-doża tal-insulina skont il-livelli taz-zokkor fid-demmi tiegħek.
- X'għandek tagħmel jekk tibdel id-dieta tiegħek, jew jekk tibdel kemm tagħmel eżerċizzju, jekk tkun ma tiflaħx jew jekk tkun qed tuża medicini oħra.
- Jekk tibdel it-tip ta' insulina li inti tuża, jista' jkun li inti jkollok tuża aktar jew anqas minn qabel. Dan jista' jkun biss għall-ewwel injezzjoni jew tista' tkun bidla bil-mod il-mod fuq diversi ġimgħat jew xhur.

Tużax Lyumjev

- Jekk ma jidhirx qisu ilma. Lyumjev għandu jkun ċar, bla kulur u ma jkollu l-ebda frak fih. Iċċekkja kull darba li tinjetta lilek innifsek.
- Jekk Lyumjev ma nħażinx kif suppost (ara sezzjoni 5 "Kif taħzen Lyumjev").
- Jekk il-pinna jkun fiha kwalunkwe ħsara, tużahiex.

Kif tlesti l-Lyumjev Junior KwikPen għall-użu (Jekk jogħġbok ara l-istruzzjonijiet dwar l-użu)

- L-ewwel aħsel idejk.
- Aqra l-istruzzjonijiet dwar kif tuża il-pinna tal-insulina mimlija għal-lest. Jekk jogħġbok segwi l-istruzzjonijiet b'attenzjoni. Hawn għandek ftit affarijiet biex ifakkruk.
- Uża labra ġdida. (Il-labar mhux inkluzi).
- Ippompja l-Lyumjev Junior KwikPen kull darba qabel ma tużaha. B'hekk tiċċekkja li l-insulina toħroġ barra u tneħhi l-bżieġaq tal-arja mill-Lyumjev Junior KwikPen tiegħek. Jista' jagħti l-każ li xorta jkun għad hemm ftit bżieġaq tal-arja żgħar fil-pinna. Bżieġaq żgħar tal-arja huma normali u mhumiex se jaffettwaw id-doża tiegħek.
- In-numru ta' unitajiet jintwera fit-tieqa tad-doża, dejjem iċċekkjhomm qabel l-injezzjoni tiegħek.

Meta tagħti injezzjoni ta' Lyumjev

- Qabel ma tagħti l-injezzjoni, naddaf il-ġilda tiegħek.
- Injetta taħt il-ġilda, kif ġejt mgħallem mit-tabib jew mill-infermier tiegħek.
- Wara l-injezzjoni tiegħek, halli l-labra fil-ġilda għal 5 sekondi biex tkun żgur li tirċievi id-doża kollha. Aċċerta ruħek li tinjetta mill-inqas 1 mill-aħħar injezzjoni u li inti 'tibdel' il-postijiet li tinjetta fihom (in-naħa ta' fuq tad-driegħ, il-koxxa, il-warrani jew jew iż-żaqq).
- Jekk m'għandekx biżżejjed insulina fil-pinna biex tiegħu d-doża kollha tiegħek, hu nota ta' kemm għad trid tiegħu. Ippompja pinna ġdida u injetta d-doża li jkun għad jonqos.
- Jekk għandek bżonn tinjetta insulina oħra fl-istess waqt ma' Lyumjev, uża post differenti għall-injezzjoni.
- Tinjetta direttament go vina.

Wara li tinjetta

- Eżatt kif tkun ħadt l-injezzjoni, holl il-labra mill-Lyumjev Junior Kwikpen billi tuża l-ġhatu ta' barra tal-labra. Din iżomm l-insulina sterili u żżommha milli tqattar. Hija twaqqaf ukoll l-arja milli terġa' tidhol lura fil-pinna u il-labra milli tistadd. **Issellifx il-labar tiegħek. Issellifx il-pinna tiegħek.** Poġġi l-ġhatu lura fuq il-pinna tiegħek.
- Jekk m'intix ċert/a kemm injettajt għandek tiċċekkja l-livelli taz-zokkor fid-demmi tiegħek qabel ma tiddeċiedi jekk għandekx bżonn injezzjoni oħra.

Aktar injezzjonijiet

- Kull darba li inti tuża Lyumjev Junior KwikPen inti għandek tuża labra ġdida. Qabel kull injezzjoni, kwalunkwe bżieġaq tal-arja. Inti tista' tara kemm fadal insulina billi żomm il-Lyumjev Junior KwikPen bil-labra thares 'il fuq.
- Ladarba l-Lyumjev Junior KwikPen tiżvojt, terġax tużaha.

Jekk tuża Lyumjev aktar milli suppost

Jekk inti tinjetta wisq Lyumjev, jew m'intix ċert/a kemm injettajt, jista' jsehh livell baxx ta' zokkor fid-demmi. Iċċekkja z-zokkor fid-demmi tiegħek.

Jekk iz-zokkor fid-demmi tiegħek jkun baxx (ipoglicemija) u inti tista' titratta lilek innifsek, hu pilloli tal-glukożju, zokkor jew xarba biz-zokkor. Imbagħad kul frott, gallettini, jew sandwich, skont kif ikun tak parir it-tabib jew l-infermier tiegħek u strieh ftit. B'hekk hafna drabi jirnexxilek tirkupra miz-zokkor baxx fid-demmi jew doża eċċessiva hafifa ta' insulina. Erga' ċċekkja z-zokkor fid-demmi tiegħek wara 15-20 min sakemm iz-zokkor fid-demmi jistabilizza.

Jekk inti ma tistax titratta lilek innifsek (ipoglicemija severa) minhabba li thossok wisq stordut/a, dgħajfef/fa, konfuż/a, għandek diffikultà biex titkellem, tintilef minn sensik jew ittik aċċessjoni inti tista' tkun teħtieġ tigi trattat/a bil-glukagon. Dan jista' jingħata minn xi hadd li jkun jaf jużah. Hu l-glukożju jew iz-zokkor wara l-glukagon. Jekk il-glukagon ma jaħdimx, inti se jkollok tmur l-isptar jew iċċempel is-servizzi tal-emergenza. Staqsi lit-tabib tiegħek biex jgħidlek dwar il-glukagon.

Għid lil kull min tqatta' hin miegħu/magħha li inti għandek id-dijabete. Għidilhom x'jista' jigri jekk iz-zokkor fid-demmi tiegħek jidbaxxa wisq, inkluz ir-riskju li tintilef minn sensik.

Avżhom li jekk tintilef minn sensik, huma għandhom idawruk fuq ġenbek biex tevita li tifga, iġibu għajnnu medika minnufih u biex ma jagħuk l-ebda ikel jew xorb minhabba li tista' tifga.

Jekk tinsa tuża Lyumjev

Jekk tinsa tuża l-insulina tiegħek jew jekk inti tuża anqas milli suppost, jew m'intix ċert/a kemm injettajt, iz-zokkor fid-demm tiegħek jista' jkun għoli wisq (iperglicemija). Iċċekkja l-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek biex tiddeċiedi hemmx bżonn doża tal-insulina. Komplil bl-iskeda tal-għoti tad-doża tas-soltu waqt l-ikla li jmiss.

Jekk tieqaf tuża Lyumjev

Twaqqafx jew tibdilx l-insulina tiegħek hlief jekk jgħidlek tagħmel dan it-tabib tiegħek. Jekk inti tuża inqas Lyumjev milli suppost, jista' jsehh livell għoli ta' zokkor fid-demm.

Jekk iz-zokkor għoli fid-demm (iperglicemija) ma jiġix trattat jista' jkun serju ħafna u jikkawża uġiħ ta' ras, nawsja, rimettar, uġiħ fl-addome, deidratazzjoni, telf ta' koxjenza, koma jew anke mewt (ara sezzjoni 4).

Tliet affarijiet sempliċi biex tevita ipoglicemija jew iperglicemija huma:

- Dejjem żomm pinna żejda, f'każ li inti titlef il-Lyumjev Junior KwikPen jew jiġrilha l-ħsara.
- Dejjem żomm xi haġa fuqek biex turi li inti dijabetiku/a.
- Dejjem żomm iz-zokkor fuqek.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' din il-medicina, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

4. Effetti sekondarji possibbli

Bhal kull medicina oħra, din il-medicina tista' tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f'kulhadd.

Zokkor baxx fid-demm (ipoglicemija) huwa komuni ħafna bit-trattament tal-insulina (jista' jaffettwa aktar minn persuna 1 minn kull 10). Hija tista' tkun serja ħafna. Jekk il-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek jinżel wisq inti tista' tintilef minn sensik. Ipoglicemija serja tista' tikkawża ħsara fil-moħħ u tista' tkun ta' periklu għall-ħajja. Jekk inti għandek sintomi ta' zokkor baxx fid-demm, hu azzjoni **immedjatment** biex iżżid il-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek. Ara sezzjoni 3 taht 'Jekk tuża aktar Lyumjev milli suppost'.

Reazzjonijiet allergiċi huma komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 10). Huma jistgħu jkunu severi u jistgħu jinkludu s-sintomi li ġejjin:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| • raxx u ħakk mal-ġisem kollu | • tinżel il-persjoni |
| • diffikultà biex tiehu n-nifs | • qalb tħabbat tgħaġġel |
| • tħarhir | • ħruġ ta' għaraq |

Jekk ikollok reazzjoni allergika serja (inkluż attakk anafilattiku) għall-insulina jew għal kwalunkwe sustanza f'Lyumjev, ieqaf uża din il-medicina u kkuntatta s-servizzi mediċi tal-emergenza minnufih.

Effetti sekondarji oħra jinkludu

Komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 10)

Reazzjonijiet fil-post tal-injezzjoni. Xi persuni jkollhom ħmura, uġiħ, nefħa jew ħakk madwar il-post tal-injezzjoni tal-insulina. Dan is-soltu jgħaddi fi ftit minuti sa ftit ġimghat mingħajr ma tkun teħtieġ twaqqaf Lyumjev. Jekk inti jkollok reazzjonijiet fil-post tal-injezzjoni, għid lit-tabib tiegħek.

Mhux komuni (jistghu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 100)

Bidliet fil-ġilda fis-sit tal-injezzjoni: Jekk tinjetta insulina wisq ta' spiss fl-istess post, it-tessut xahmi jista' jew jiċkien (lipoatrofija) jew jihxien (lipoipertrofija). Boċċi taht il-ġilda jistghu jiġu kkawżati wkoll minn akkumulazzjoni ta' proteina msejha amilojdi (amilojdozi tal-ġilda). L-insulina tista' ma tahdimx tajjeb hafna jekk tinjetta f'żona bil-boċċi. Ibdel is-sit tal-injezzjoni ma' kull injezzjoni biex tgħin fil-prevenzjoni ta' dawn il-bidliet fil-ġilda.

Effetti sekondarji oħra li jistghu jsehhu

Nefha fid-dirgħajn jew fl-għekiesi minhabba żamma tal-fluwidu (edima), b'mod partikolari fil-bidu tat-terapija bl-insulina jew matul bidla fil-medicini tad-dijabete tiegħek.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Tista' wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali mniżżla f'[Appendiċi V](#). Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista' tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta' din il-medicina.

Problemi komuni tad-dijabete

Zokkor baxx fid-demm

Zokkor baxx fid-demm (ipoglicemija) ifisser li m'hemmx biżżejjed zokkor fid-demm. Dan jista' jiġi kkawżat jekk:

- inti tiegħu wisq Lyumjev jew insulina oħra;
- inti taqbez ikliet jew iddum ma tiekol jew tibdel id-dieta tiegħek;
- inti tagħmel eżerċizzju jew tagħmel xogħol iebs eżatt qabel jew wara ikla;
- inti għandek infezzjoni jew mard (speċjalment dijarea jew rimettar);
- hemm bidla fil-bżonn tal-insulina tiegħek per eżempju jekk titlef il-piż; jew inti għandek problemi bil-kliewi jew bil-fwied li jmorru għall-aġar.

Ara s-sezzjoni 'Jekk tuża Lyumjev aktar milli suppost.'

L-ewwel sintomi ta' zokkor baxx fid-demm is-soltu jiġu malajr u jinkludu dan li ġej:

- gheja
- qalb tħabbat b'mod mgħaġġel
- nervi jew roġħda
- tħossok imdardar
- uġiġħ ta' ras
- għaraq kiesaħ

Jekk m'intix kunfidenti li tagħraf is-sintomi ta' twissija tiegħek, evita sitwazzjonijiet bħal issuq karozza, li fihom inti jew persuni oħra jitpogġew f'periklu minhabba ipoglicemija.

Zokkor għoli fid-demm (iperglicemija) u ketoacidozi tad-dijabete

Iperglicemija (wisq zokkor fid-demm) tfisser li l-livelli tal-glucose fil-ġisem tiegħek huma għoljin wisq. Iperglicemija tista' tiġi minhabba:

- li inti ma tihux l-insulina tiegħek;
- tuża inqas insulina minn kemm jehtieg il-ġisem tiegħek;
- żbilanċ bejn l-ammont ta' karboidrati li tiekol u l-ammont ta' insulina li tiegħu; jew
- deni, infezzjoni jew stress emozzjonali.

Is-sintomi bikrija ta' iperglicemija huma:

- tkun bil-għatx hafna
- uġiġħ ta' ras
- tħossok bi ngħas
- tagħmel awrina aktar spiss

L-iperglicemija tista' twassal għall-ketoacidożi tad-dijabete. L-ewwel sintomi jiġu bil-mod fuq perjodu ta' hafna sigħat jew jiem. Sintomi addizzjonali jinkludu li ġejjin:

- nawsja u/jew rimettar
- uġiġh fl-addome
- polz mghaġġel
- tieħu nifs fil-fond
- ammonti moderati jew kbar ta' ketoni fl-awrina. Il-ketoni jiġu magħmula meta l-ġisem tiegħek jahraq ix-xaħam għall-enerġija minflok il-glucose.

Jekk għandek kwalunkwe minn dawn is-sintomi u zokkor għoli **ġib għajnnu medika minnufih**. Ara s-sezzjoni 'Jekk tinsa' tuża Lyumjev'.

Mard

Jekk inti ma tiflaħx, speċjalment jekk qed thossok imdardar jew qed tirremetti, l-ammont ta' insulina li inti għandek bżonn jista' jinbidel. **Anke meta inti ma tkunx qed tiekol b'mod normali, inti xorta jkollok bżonn l-insulina.** Ittestja l-awrina jew id-dem, segwi 'r-regoli ta' meta tkun ma tiflaħx', u għid lit-tabib tiegħek.

5. Kif taħžen Lyumjev Junior KwikPen

Żomm din il-medicina fejn ma' tintlaħaqx u ma tidhirx mit-tfal.

Tużax din il-medicina wara d-data ta' meta tiskadi li tidher fuq it-tikketta u l-kartuna. Id-data ta' meta tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta' dak ix-xaħar.

Qabel l-ewwel użu

Ahžen fi friġġ (2 °C – 8 °C).

Tagħmlux fil-friża.

Żomm fil-kartuna ta' barra sabiex tilqa' mid-dawl.

Wara l-ewwel użu

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 30 °C.

Tagħmlux fil-friża.

Tagħmlux fil-friġġ.

Il-Lyumjev Junior KwikPen m'għandhiex tinhažen bil-labra mwahħla. Żomm l-għatu tal-pinna fuq il-pinna sabiex tilqa' mid-dawl.

Armiha wara 28 jum **anke jekk ikun għad fadal fiha xi soluzzjoni.**

Tarmix medicini mal-ilma tad-dranagġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispizjar tiegħek dwar kif għandek tarmi medicini li m'għadekx tuża. Dawn il-mizuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X'fih Lyumjev 100 unità/ml Junior KwikPen soluzzjoni għall-injezzjoni

- Is-sustanza attiva hija insulin lispro. Kull ml soluzzjoni fiha 100 unità ta' insulin lispro. Lyumjev Junior KwikPen waħda fiha 300 unità ta' insulin lispro f' soluzzjoni ta' 3 ml.
- Is-sustanzi l-oħra huma metacresol, glycerol, magnesium chloride hexahydrate, sodium citrate dihydrate, treprostini sodium, zinc oxide, ilma għall-injezzjonijiet. Sodium hydroxide jew hydrochloric acid setgħu intużaw biex jaġġustaw il-pH (ara t-tmiem ta' sezzjoni 2 taħt 'Lyumjev Junior KwikPen fih sodium').

Kif jidher Lyumjev 100 unità/ml Junior KwikPen u l-kontenut tal-pakkett

Lyumjev 100 unità/ml Junior KwikPen soluzzjoni għall-injezzjoni hija soluzzjoni ċara, bla kulur, akweja f'pinna mimlija għal-lest.

Kull pinna mimlija għal-lest fiha 300 unità (3 millilitri).

Daqsijiet tal-pakkett ta' 2, 5 jew pakkett b'hafna ta' 2 x 5 pinen mimlija għal-lest.

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkun fis-suq.

Il-Lyumjev Junior KwikPen hija griża bil-kannella (taupe). Il-buttuna tad-doża hija *peach* bi ħnieq mqabbża fit-tarf u mal-ġenb. It-tikketta hija bajda b'biċċa solida *peach*, u faxxa ta' kulur *peach*, blu ċar u blu skur.

Kull Lyumjev KwikPen tagħti minn 0.5 unità sa 30 unità f'zidiet ta' 0.5 unità f'injezzjoni waħda.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83

3528 BJ Utrecht

L-Olanda.

Manifattur

Lilly France

Rue du Colonel Lilly

67640 Fegersheim

Franza.

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq:

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Lietuva

Tel: +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

Тел.: + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel.: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf.: +45 45 26 6000

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH

Tel: + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: +372 6817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S.

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges. m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Dista S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 440 33 00

France

Lilly France

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Ísland

Icepharma hf.

Sími: + 354 540 8000

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39- 055 42571

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Latvija

Eli Lilly (Suisse) S.A Pārstāvniecība Latvijā

Tel: +371 67364000

Portugal

Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351-21-4126600

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0) 1 580 00 10

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 220 663 111

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Dan il-fuljett kien rivedut l-ahhar f'**Sorsi ohra ta' informazzjoni**

Informazzjoni dettaljata dwar din il-medicina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Medicini: <https://www.ema.europa.eu>.

Instruzzjonijiet dwar l-Użu

Lyumjev 100 unità/mL Junior KwikPen soluzzjoni għall-injezzjoni f'pinna mimlija għal-lest insulin lispro



JEKK JOGHĠBOK AQRA DAWN L-ISTRUZZJONIJIET QABEL L-UŻU

Aqra l-istruzzjonijiet dwar l-użu qabel tibda tiegħu Lyumjev u kull darba li inti għib Lyumjev Junior KwikPen għdida. Jista' jkun hemm informazzjoni għdida. Din l-informazzjoni ma tihux post li inti titkellem mal-professionist tiegħek fil-qasam tal-kura tas-saħħa dwar il-kundizzjoni medika tiegħek jew it-trattament tiegħek.


Issellifx il-Lyumjev Junior KwikPen lil persuni ohra, anke jekk tkun inbidlet il-labra. Terġax tuża labar użati jew issellef il-labar tiegħek lil persuni ohra. Inti tista' tagħtihom infezzjoni serja jew inti tista' tiegħu infezzjoni serja minghandhom.

Lyumjev 100 unità/mL Junior KwikPen ("Pinna") hija pinna mimlija għal-lest li tintrema wara li tintuża li fiha 3 mL (300 unità, 100 unità/mL) ta' soluzzjoni ta' insulin lispro għall-injezzjoni.

- Il-professionist fil-qasam tal-kura tas-saħħa tiegħek se jgħidlek kemm-il unità għandek tagħti bħala d-doża tiegħek u kif għandek tinjetta d-doża tal-insulina ordnata lilek.
- Inti tista' tagħti lilek innifsek aktar minn doża waħda mill-Pinna.
- Kull dawra tal-buttuna tagħti nofs unità (0.5 unità) ta' insulina. Inti tista' tagħti minn nofs unità (0.5 unità) sa 30 unità f'injezzjoni waħda.
- Jekk id-doża tiegħek hija aktar minn 30 unità, inti se jkollok bżonn tagħti lilek innifsek aktar minn injezzjoni waħda. Dejjem għandek tiċċekkja n-numru fit-tieqa tad-doża biex taċċerta ruħek li inti tkun dawwart id-doża t-tajba.
- Il-plaġer jiċċaqlaq f'tit biss ma' kull injezzjoni u jista' jkun li inti ma tinnutax li jiċċaqlaq. Il-plaġer jilhaq it-tarf tal-iskartoċċ biss meta inti tkun użajt it-300 unità kollha li fiha l-Pinna.


Persuni li huma għomja jew għandhom problemi bil-vista m'għandhomx jużaw il-Pinna minghajr l-għajnuna ta' persuna mharrġa fl-użu tal-Pinna.

Partijiet ta' Lyumjev Junior KwikPen



**Partijiet tal-Labra tal-Pinna
(Il-Labar Mhumiex Inkluzi)**

Buttuna tad-Doża



Kif tagħraf il-Lyumjev Junior KwikPen tiegħek

- Kulur tal-pinna: Griż bil-Kannella (Taupe)
- Buttuna tad-doża: *Peach*, b'sinjali mqabbża fit-tarf u mal-ġenb
- Tikketta: Bajda b'biċċa solida *peach*, u faxxa ta' kulur *peach*, blu ċar u blu skur.




Affarijiet meħtieġa biex tagħti l-injezzjoni tiegħek

- Lyumjev Junior KwikPen
- Labra kumpatibbli mal-KwikPen (huma rrakkomandati l-labar tal-Pinna BD [Becton, Dickinson and Company])
- Imselha jew garża

Kif tipprepara l-Pinna tiegħek

- Aħsel idejk bis-sapun u l-ilma.
- Iċċekkja l-pinna biex taċċerta ruħek li inti tkun qed tiehu t-tip ta' insulina it-tajba. Dan huwa importanti b'mod speċjali jekk inti tuża aktar minn tip wieħed ta' insulina.
- **Tużax** il-Pinna tiegħek wara d-data ta' meta tiskadi li hemm stampata fuq it-tikketta label jew għal aktar minn 28 wara li inti tibda tuża l-Pinna għall-ewwel darba.
- Dejjem uża **labra ġdida** għal kull injezzjoni biex tevita infezzjonijiet u labar misdudin.


Pass 1: • Iġbed l-għatu tal-Pinna dritt 'il barra. – Tnehhix it-tikketta tal-Pinna. • Imsaħ is-sigill tal-gomma bl-imselha.	
Pass 2: • Iċċekkja l-likwidu fil-Pinna. • Lyumjev għandu jidher ċar u bla kulur. Tużahx jekk ikun imdardar, ikkulurit, jew ikun fih fraq jew ċapep.	


Pass 3: - Aghżel labra ġdida. - Iġbed it-tikketta tal-karti minn mal-protezzjoni ta' barra tal-labra.	
Pass 4: Imbotta l-labra li għadha bl-għatu dritt fuq il-Pinna u dawwar il-labra sakemm tissikka.	
Pass 5: - Aqla' l-protezzjoni ta' barra tal-labra billi tiġbidha. Tarmihex. - Aqla' l-protezzjoni ta' ġewwa tal-labra billi tiġbidha u armiha.	

Kif tippompja l-pinna

Ippompja qabel kull injezzjoni.

- Tippompja l-Pinna tiegħek ifisser li tneħhi l-arja mil-labra u mill-iskartoċċ li tista' tingabar matul l-użu normali tal-pinna u jiġi aċċertat li l-Pinna tiegħek tkun qegħda taħdem sew.
- Jekk inti **ma tippompjax** qabel kull injezzjoni, inti tista' tirċievi wisq jew ftit wisq insulina.

Pass 6: Biex tippompja l-Pinna tiegħek aghżel 2 unitajiet.	
Pass 7: Żomm il-Pinna tiegħek bil-labra thares 'il fuq. Tektek bil-mod il-kontenitur tal-iskartoċċ biex tiġbor il-bżiežaq tal-arja n-naħa ta' fuq.	
Pass 8: Kompli żomm il-Pinna bil-labra thares 'il fuq. Dawwar il-buttuna tad-doża sakemm tieqaf u jidher "0" fit-tieqa tad-doża. Żomm il-buttuna tad-doża 'l ġewwa u ghodd sal-5 bil-mod. Inti għandek tara l-insulina fit-tarf tal-labra.	



– Jekk inti ma tarax insulina, irrepeti l-passi 6 sa 8 tal-ippumpjar, iżda mhux għal aktar minn 4 darbiet. – Jekk tibqa' ma tarax insulina, biddel il-labra u rrepeti l-passi 6 sa 8 tal-ippumpjar. Bżiežaq żgħar tal-arja huma normali u mhumiex se jaffettwaw id-doża tiegħek.	
--	--

Kif tagħzel id-doża tiegħek


- Tista' tagħti minn nofs unità (0.5 unità) sa 30 unità f'injezzjoni waħda.
- Jekk id-doża tiegħek hija iżjed minn 30 unità, inti jkollok bżonn tagħti iżjed minn injezzjoni waħda.
 - Jekk għandek bżonn l-għajjnuna sabiex tiddeċiedi kif għandek taqşam id-doża tiegħek, staqsi lill-professjonist tiegħek tal-kura tas-saħħa.
 - Għandek tuża labra ġdida għal kull injezzjoni u tirrepeti l-passi tal-ippumpjar.
 - Jekk is-soltu jkollok bżonn aktar minn 30 unità, staqsi lill-professjonist fil-qasam tal-kura tas-saħħa jekk Lyumjev KwikPen differenti tkunx aħjar għalik.

Pass 9:

- Dawwar il-buttuna tad-doża biex tagħzel in-numru ta' unitajiet li inti teħtieġ tinjetta. L-indikatur tad-doża għandu jiġi bi dritt id-doża tiegħek.
 - Il-Pinna ddawwar nofs unità (0.5 unità) kull darba.
 - Il-buttuna tad-doża tagħmel klikk meta ddawwarha.
 - **Iddawwarx** id-doża tiegħek billi tghodd in-numru ta' klikks. Tista' ddawwar id-doża l-ħażina. Dan jista' jwassal biex inti tiehu wisq insulina jew ma tihux biżżejjed insulina.
 - Id-doża tista' tiġi kkoreġuta billi ddawwar il-buttuna fi kwalunkwe direzzjoni sakemm id-doża korretta tiġi bi dritt l-indikatur tad-doża.
 - In-numri **ta' unità shiha** huma stampati fuq il-wiċċ li jdur. L-eżempju fuq il-lemin juri 4 unitajiet.
 - In-numrita' **nofs unità** qed jintwerew bħala linji bejn in-numri tal-unitajiet shah. L-eżempju fuq in-naħa tal-lemin qed juri 10.5 unità.
- **Dejjem iċċekkja in-numru fit-tieqa tad-doża biex taċċerta ruħek li inti dawwart id-doża t-tajba.**



Eżempju: 4 unitajiet unitajiet qed jintwerew fit-tieqa tad-doża





Eżempju: 10 ½ (10.5) unitajiet qed jintwerew fit-tieqa tad-doża

- Il-Pinna ma tħallikx iddawwar aktar min-numru ta' unitajiet li jkun għad-fadal fil-Pinna.
 - Jekk għandek bżonn tinjetta aktar min-numru ta' unitajiet li għad fadal fil-Pinna, inti tista' jew:
 - tinjetta l-ammont li jkun għad fadal fil-Pinna mbagħad tuża Pinna ġdida biex tagħti l-bqija tad-doża tiegħek,
- jew**
- iġġib Pinna ġdida u tinjetta d-doża kollha.
- Huwa normali li tara ammont żgħir ta' insulina li tibqa' fil-Pinna u li inti ma tkunx tista' tinjetta.

Kif tagħti l-injezzjoni tiegħek

- Injetta l-insulina tiegħek kif uriek il-professionist tiegħek tal-kura tas-saħħa.
- Ibdel il-post tal-injezzjoni tiegħek għal kull injezzjoni.
- **Tippruvax** tibdel id-doża tiegħek waqt li tkun qed tinjetta.


Pass 10: - Aghżel il-post tal-injezzjoni tiegħek. Lyumjev jiġi injettat taħt il-ġilda fiż-żona tal-istonku, fil-warrani, fin-naħa ta' fuq tar-rigħel jew fin-naħa ta' fuq tad-driegħ. - Imsaħ il-ġilda tiegħek b'imselha, u halli l-ġilda tiegħek tinxef qabel tinjetta d-doża.	
Pass 11: - Dahhal il-labra fil-ġilda tiegħek. - Aghfas il-buttuna tad-doża kollha kemm hi 'l ġewwa. - Kompli żomm il-buttuna tad-doża magħfusa 'l ġewwa u bil-mod għodd sal-5 qabel ma toħroġ il-labra.  Tippruvax tinjetta l-insulina tiegħek billi ddawwar il-buttuna tad-doża. M'intix se tircievi l-insulina billi ddawwar il-buttuna tad-doża.	

Pass 12:




- Iġbed il-labra 'l barra minn ġol-ġilda tiegħek.
 - Qatra insulina fit-tarf tal-labra hija normali. Hija mhijiex se taffettwalek id-doża.
- Iċċekkja n-numru fit-tieqa tad-doża.
 - Jekk tara “0” fit-tieqa tad-doża, inti tkun irċivejt l-ammont kollu li tkun dawwart.
 - Jekk ma tarax “0” fit-tieqa tad-doża, inti ma tkunx irċivejt id-doża kollha tiegħek. **Trerġax** iddawwar. Dahhal il-labra fil-ġilda u spiċċa l-injezzjoni.
 - Jekk **xorta** taħseb li inti ma rċivejtx l-ammont kollu li inti dawwart għall-injezzjoni tiegħek, **terġax tibda mill-bidu u tirrepetix dik l-injezzjoni**. Immonitorja l-glukożju fid-demm kif spjegat mill-professionist tiegħek tal-kura tas-saħħa.
 - Jekk is-soltu inti jkollok bżonn tagħti 2 injezzjonijiet għad-doża sħiħa tiegħek, kun ċert/a li tagħti t-tieni injezzjoni.

Il-planger jiċċaqlaq ffit biss ma' kull injezzjoni u jista' jkun li inti ma tinnutax li jiċċaqlaq.

Jekk tara d-demm wara li inti tkun ġbidt il-labra 'l barra minn ġol-ġilda tiegħek, aghfas il-post tal-injezzjoni b'mod ħafif b'biċċa garża jew imselha. **Togħorokx** iż-żona.



Wara l-injezzjoni tieghek

Pass 13: B'attenzjoni poġġi lura l-protezzjoni ta' barra tal-labra.	
Pass 14: - Holl il-labra mġhottija u armiha kif deskritt hawn taht (ara s-sezzjoni “Kif tarmi l-Pinen u l-labar”). Tahżinx il-Pinna bil-labra mwahhla magħha biex tevita li tqattar, li l-labra tistadd, u li tidhol l-arja fil-Pinna.	
Pass 15: Poġġi lura l-ġhatu tal-Pinna billi tpoġġi l-klipp tal-pinna bi dritt l-idikatur tad-doża u timbotta dritt 'il ġewwa	

Kif tarmi l-Pinen u l-labar

- Poġġi l-labar użati f'kontenitur għal oġġetti li jaqtgħu jew bil-ponta jew f'kontenitur ta' plastik iebes b'ġhatu sikur. **Tarmix** il-labar direttament fl-iskart domestiku tieghek.
- Tirriċiklax** il-kontenitur għal oġġetti li jaqtgħu jew bil-ponta meta jimtela.
- Staqs lill-professjonist tieghek tal-kura tas-saħħa dwar l-għażliet biex tarmi kif suppost il-Pinna u l-kontenitur għal oġġetti li jaqtgħu jew bil-ponta.
- L-istruzzjonijiet dwar l-immaniġġjar tal-labar mhumiex mahsuba li jiehdu post ir-regoli lokali, tal-professjonisti tal-kura tas-saħħa jew istituzzjonali.

Kif tagħraf u ssolvi xi problemi fil-Pinna

- Jekk ma tkunx tista' tneħhi l-ġhatu tal-Pinna, dawwar bil-mod l-ġhatu 'l quddiem u lura, imbagħad iġbdu dritt 'il barra.
- Jekk il-buttuna tad-doża hija iebsa biex tagħfasha:
 - li tagħfas il-buttuna tad-doża aktar bil-mod se jagħmilha aktar faċli biex tinjetta.
 - il-labra tieghek tista' tkun misduda. Poġġi labra ġdida u ppompja l-Pinna.
 - inti jista' jkollok trab, ikel jew likwidu ġol-Pinna. Armi l-Pinna u ġib Pinna ġdida.

Jekk għandek xi mistoqsijiet jew problemi bil-Lyumjev 100 unità/mL Junior KwikPen tieghek, ikkuntattja l-professjonist tieghek tal-kura tas-saħħa għall-għajnuna jew ikkuntattja r-rappreżentant lokali ta' Lilly

Data ta' Revizjoni tad-Dokument:

Fuljett ta' taghrif: Informazzjoni għall-utent

Lyumjev 100 unità/ml Tempo Pen soluzzjoni għall-injezzjoni f'pinna mimlija għal-lest insulina lispro

Kull Tempo Pen tforni minn unità 1 sa 60 unità b'zidiet ta' unità 1 f'injezzjoni waħda.

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-medicina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.
- Din il-medicina għet mogħtija lilek biss. M'għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista' tagħmlilhom il-ħsara, anke jekk għandhom l-istess sinjali ta' mard bħal tiegħek.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek. Dan jinkludi xi effetti sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F'dan il-fuljett

1. X'inhum Lyumjev Tempo Pen u għalxiex jintuża
2. X'għandek tkun taf qabel ma tuża Lyumjev Tempo Pen
3. Kif għandek tuża Lyumjev Tempo Pen
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif taħżen Lyumjev Tempo Pen
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1. X'inhum Lyumjev Tempo Pen u għalxiex jintuża

Lyumjev 100 unità/ml Tempo Pen soluzzjoni għall-injezzjoni f'pinna mimlija għal-lest fih is-sustanza attiva insulin lispro. Lyumjev jintuża għat-trattament tad-dijabete mellitus fl-adulti, fl-adolesxenti u fit-tfal mill-età ta' sena u 'l fuq. Huwa insulina ta' mal-ikel li taħdem aktar malajr minn medicini oħra li fihom insulin lispro. Lyumjev fih sustanzi li jagħgħlu l-assorbiment ta' insulin lispro għal għol-ġisem.

Id-dijabete hija kondizzjoni li fiha l-ġisem tiegħek ma jagħmilx biżżejjed insulina jew ma jużax l-insulina b'mod effettiv, li jwassal għal effetti bħal livelli għoljin ta' zokkor fid-demm. Lyumjev huwa medicina ta' insulina li jintuża fit-trattament tad-dijabete u b'hekk jikkontrolla z-zokkor fid-demm. Trattament effettiv tad-dijabete, b'kontroll tajjeb taz-zokkor fid-demm, jevita kumplikazzjonijiet fuq tul ta' żmien mid-dijabete tiegħek.

It-trattament b'Lyumjev jgħin biex jikkontrolla z-zokkor fid-demm fuq żmien twil u jevita kumplikazzjonijiet mid-dijabete tiegħek. Lyumjev jkollu l-effett massimu tiegħu minn 1 sa 3 sigħat wara l-injezzjoni u l-effett idum sa 5 sigħat. Inti għandek tuża Lyumjev fil-bidu tal-ikla, jew sa 20 minuta wara li tkun bdejt tiekol.

It-tabib tiegħek jista' jgħidlek biex tuża Lyumjev kif ukoll insulina li taħdem fit-tul jew b'mod intermedju. Tbidilx l-insulina tiegħek sakemm ma jgħidlekx it-tabib tiegħek.

Il-Lyumjev 100 unità/ml Tempo Pen hija pinna mimlija għal-lest li tintrema wara li tintuża u li fiha 3 ml (300 unità, 100 unità/ml) ta' insulina lispro. Tempo Pen waħda fiha dozi multipli ta' insulina. It-Tempo Pen tisselezzjona unità waħda kull darba. **In-numru ta' unitajiet jidher fit-tieqa tad-doża, dejjem għandek tiċċekja qabel ma tagħmel l-injezzjoni.** Inti tista' tagħti minn unità waħda sa 60 unità f'injezzjoni waħda. **Jekk id-doża tiegħek hija iżjed minn 60 unità, inti jkollok bżonn tagħti lilek innifsek iżjed minn injezzjoni waħda.**

2. X'ghandek tkun taf qabel ma tuża Lyumjev Tempo Pen

TUŻAX Lyumjev Tempo Pen

- jekk taħseb li z-zokkor fid-demm tiegħek nieżel (**ipoglicemija**). Iktar 'il quddiem, dan il-fuljett se jgħidlek kif titratta zokkor baxx fid-demm (ara sezzjoni 3 taht “Jekk tuża Lyumjev aktar milli suppost”).
- jekk inti **allergiku/a** għal insulin lispro jew għal xi sustanza oħra ta' din il-medicina (imnizzla fis-sezzjoni 6).

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek qabel tuża Lyumjev.

Jekk inti ma tistax tara tajjeb inti se jkollok bżonn l-għajnuna ta' xi hadd li jkun imharreg biex jagħti injezzjonijiet.

- **Zokkor baxx fid-demm (ipoglicemija).**

Zokkor baxx fid-demm jista' jkun serju u ipoglicemija li ma tiġix trattata tista' anke twassal għall-mewt.

Lyumjev jibda jnaqqas iz-zokkor fid-demm aktar malajr minn xi wħud mill-insulini ta' mal-ikel. Jekk issehh ipoglicemija, din tista' tiġrilek qabel wara injezzjoni ta' Lyumjev. Jekk ikollok ipoglicemija ta' spiss jew ikollok diffikultà biex tagħrafha, jekk jogħgbok iddiskuti dan mat-tabib jew mal-infermier tiegħek. Jekk il-livelli taz-zokkor fid-demm tiegħek huma kkontrollati tajjeb bit-terapija tal-insulina tiegħek ta' bħalissa jew wara żmien twil ta' dijabete, jista' jkun li inti ma tħossx is-sintomi ta' twissija meta z-zokkor fid-demm tiegħek ikun qed jitbaxxa wisq. Sinjali ta' twissija huma elenkati aktar tard f'dan il-fuljett. Għas-sintomi jekk jogħgbok ara “Probemi komuni tad-dijabete”.

Inti għandek taħseb sewwa dwar meta għandek tiekol, kemm tagħmel eżerċizzju u kemm tagħmlu ta' spiss. Għandek ukoll tosserva mill-qrib il-livelli taz-zokkor fid-demm tiegħek billi tittestja z-zokkor fid-demm tiegħek iktar ta' spiss.

Meta tagħmel bidliet fit-tipi ta' insulina li inti tuża dan jista' jikkawża z-zokkor fid-demm tiegħek jogħla jew jinżel wisq.

Jista' jkun meħtieġ li żżid il-frekwenza tal-ittestjar taz-zokkor fid-demm jekk inti qiegħed/a f'riskju ta' zokkor baxx fid-demm. It-tabib tiegħek jista' jkun jeħtieġ jibdillek id-dożi tal-medicini l-oħra tiegħek tad-dijabete.

- **Zokkor għoli fid-demm (iperglicemija).**

It-twaqqif tal-insulina jew li ma tiħux biżżejjed insulina jista' jwassal għal zokkor għoli fid-demm (iperglicemija) u ketoacidożi tad-dijabete, kondizzjonijiet serji li possibilmint jistgħu jwasslu anke għall-mewt. Għas-sintomi jekk jogħgbok ara “Problemi komuni tad-dijabete”.

- Jekk it-trattament tal-insulina tiegħek jkun qed jingħata flimkien ma' wiehed mill-klassi ta' medicini tad-dijabete msejha thiazolidinediones jew glitazones, bħal ma huwa pioglitazone, għid lit-tabib tiegħek mill-aktar fis jekk ikollok sinjali ta' insufficjenza tal-qalb bħal qtugħ ta' nifs mhux tas-soltu jew żieda malajr fil-piż jew nefha lokalizzata ikkawżata minn żamma ta' fluwidu (edima).
- Jekk għandek reazzjoni allergika serja għall-insulina jew għal kwalunkwe sustanza ta' Lyumjev, ieqaf uża din il-medicina u kkuntattja s-servizzi ta' emerġenza medika minnufih.
- Dejjem għandek tiċċekkja l-pakkett u t-tikketta għall-isem u t-tip ta' insulina meta inti għibha mill-ispiżerija. Aċċerta ruhek li għib il-Lyumjev li t-tabib qellek biex tuża.
- Żomm il-kartuna, jew żomm nota tan-numru tal-lott ta' fuq il-kartuna. Jekk ikollok effett sekondarju inti mbagħad tkun tista' tipprovi dak in-numru meta inti tirrapporta l-effett sekondarju, ara “rappurtar ta' effetti sekondarji”.
- Dejjem uża labra għdida għal kull injezzjoni biex tevita infezzjonijiet jew labar misduda. Jekk labra tistadd ibdilha ma' labra għdida.

- **Bidliet fil-ġilda fis-sit tal-injezzjoni.**

Is-sit tal-injezzjoni għandu jinbidel kull darba biex jiġu evitati bidliet fil-ġilda bħal boċċi taħt il-ġilda. L-insulina tista' ma taħdimx tajjeb ħafna jekk tinjetta f'żona bil-boċċi (ara "Kif għandek tuża Lyumjev Tempo Pen"). Ikkuntattja lit-tabib tiegħek jekk bħalissa qed tinjetta f'żona bil-boċċi qabel ma tibda tinjetta f'parti differenti. It-tabib tiegħek jista' jgħidlek biex tiċċekkja aktar mill-qrib iz-zokkor fid-demm tiegħek, u biex taġġusta d-doża tal-insulina jew tal-medikazzjonijiet antidijabetiċi l-oħra tiegħek.

It-Tempo Pen fiha kalamita. Jekk għandek ippjantat apparat mediku, bħal *pacemaker* tal-qalb, din tista' ma taħdimx sew jekk it-Tempo Pen tinżamm viċin wisq. Il-kamp manjetiku jestendi għal madwar 1.5 cm.

Tfal u adolexxenti

Din il-medicina mhix irrakkomandata għall-użu fit-tfal taħt l-età ta' sena.

Medicini oħra u Lyumjev

Għid lit-tabib, lill-infermier jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qed tieħu, haadt dan l-aħħar jew tista' tieħu xi medicini oħra. Xi medicini jaffettwaw iz-zokkor fid-demm tiegħek – dan jista' jfisser li d-doża tal-insulina tiegħek għandha tinbidel.

Il-livelli taz-zokkor fid-demm tiegħek jistgħu jinżlu (ipoglicemija) jekk inti tieħu:

- medicini oħra għad-dijabete (mill-ħalq u li jiġu injettati)
- antibijotiċi sulphonamide (għall-infezzjonijiet)
- acetylsalicylic acid (għall-uġiġħ u deni ħafif u biex jiġi evitat tgħaqid tad-demm)
- xi antidepressanti (inibituri ta' monoamine oxidase jew inibituri selettivi tal-assorbiment mill-ġdid tas-serotonin)
- xi inibituri tal-enzima li tikkonverti angiotensin (ACE, angiotensin converting enzyme) (per eżempju captopril, enalapril) (għal xi problemi tal-qalb jew pressjoni għolja)
- imblokkaturi tar-riċetturi ta' angiotensin II (għall-pressjoni għolja jew problemi tal-qalb)
- analogi ta' somatostatin (bħal octreotide, li jintużaw biex jitrattaw kondizzjoni rari li tinvolvi ormon żejjed ta' tkabbir)

Il-livelli taz-zokkor fid-demm tiegħek jistgħu jogħlew (iperglicemija) jekk inti tieħu:

- danazol (għall-endometrijozi)
- il-pillola kontraċettiva (pilloli għall-kontroll tat-tqala)
- terapija ta' sostituzzjoni tal-ormoni tat-tirojde (għal problemi tat-tirojde)
- ormon tat-tkabbir tal-bniedem (għal defiċjenza tal-ormon tat-tkabbir)
- diuretiki (għal pressjoni għolja jew jekk qed jingemgħa l-ilma fil-ġisem tiegħek)
- sustanzi simpatomimetiki (għal reazzjonijiet allergiċi serji jew jintużaw f'xi medicini għall-irjiġħat)
- kortikosteroidi (biex jitrattaw l-ażma jew kondizzjonijiet awtoimmuni)

Imblokkaturi tar-riċetturi beta (jintużaw għall-pressjoni għolja, aritmija jew angina) jagħmluha aktar diffiċli biex wiehed jagħraf is-sintomi ta' twissija ta' zokkor baxx fid-demm.

Lyumjev mal-alkohol

Il-livelli taz-zokkor tiegħek jistgħu jew jogħlew jew jinżlu jekk inti tixrob l-alkohol. Għalhekk l-ammont ta' insulina meħtieġa jista' jinbidel. Għalhekk inti għandek timmonitorja l-livell ta' zokkor fid-demm tiegħek aktar ta' spiss mis-soltu.

Tqala u treddigh

Jekk inti tqila jew qed tredda, taħseb li tista' tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir tat-tabib, tal-infermier jew tal-ispiżjar tiegħek qabel tieħu din il-medicina. L-ammont ta' insulina li inti tkun teħtieġ is-soltu jonqos matul l-ewwel 3 xhur tat-tqala u jiżdied għas-6 xhur li jkun għad fadal.

Wara li inti jkollok it-tarbija l-bżonnijiet tiegħek tal-insulina x'aktarx jirritornaw għal dak li kont teħtieġ qabel it-tqala.

M'hemm l-ebda restrizzjonijiet fuq it-trattament b'Lyumjev matul it-treddigh. Jekk inti qed tredda', jista' jkollok bżonn tbiddel it-teħid tal-insulina jew id-dieta.

Sewqan u thaddim ta' magni

Il-ħila biex tikkonċentra u tirreagixxi tista' tonqos jekk inti jkollok ipoglicemija. Jekk jogħġbok żomm quddiem għajnejk din il-problema possibbli fis-sitwazzjonijiet kollha fejn inti tista' tpoġġi lilek innifsek jew oħrajn f'riskju (eż. issuq karożza jew thaddem magni). Inti għandek tikkuntattja lit-tabib tiegħek dwar is-sewqan jekk inti għandek:

- episodji frekwenti ta' ipoglicemija
- sinjali ta' twissija mnaqqsa jew assenti meta jkollok ipoglicemija

Lyumjev Tempo pen fih sodium

Din il-medicina fiha anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f'kull doża, li tista' tgħid hija essenzjalment 'mingħajr sodium'.

3. Kif għandek tuża Lyumjev Tempo Pen

Dejjem għandek tuża din il-medicina kif deskritt f'dan il-fuljett jew skont il-parir eżatt tat-tabib, tal-ispiżjar jew tal-infermier tiegħek. Iċċekkja magħhom jekk ikollok xi dubju.

Huma se jkunu qalulek kemm eżatt għandek tuża Lyumjev, meta għandek tużah, u kemm-il darba għandek tużah. Se jgħidulek ukoll kemm ta' spiss għandek tmur għall-vista l-klinika tad-dijabete.

Biex tevita t-trasmissjoni possibbli ta' mard, kull pinna għandha tintuża minnek biss, anke jekk il-labra tinbidel.

Inti għandek dejjem iżżomm insulina żejda u apparat ieħor tal-injezzjoni f'każ li tiġi bżonnhom.

Jekk inti għami jew għandek problemi bil-vista inti se jkollok bżonn għajnuna mingħand haddieħor biex itik l-injezzjonijiet.

It-tabib tiegħek jista' jgħidlek tuża Lyumjev kif ukoll insulina li taħdem aktar fit-tul jew b'mod intermedju. Injetthom b'mod separat. Lyumjev m'għandux jithallat ma' xi insulina oħra.

It-Tempo Pen hija magħmula biex taħdem mat-Tempo Smart Button. It-Tempo Smart Button huwa attribut addizzjonali li jista' jintuża mat-Tempo Pen li jista' jintuża biex jittrasmetti informazzjoni dwar id-doża lejn applikazzjoni ċellulari. It-Tempo Pen jista' jintuża bi jew mingħajr it-Tempo Smart Button imwahnal. Ara l-istruzzjonijiet ipprovduti mat-Tempo Smart Button u l-applikazzjoni ċellulari għal aktar rinformazzjoni.

Meta għandek tinjetta Lyumjev

Lyumjev huwa insulina ta' mal-ikel. Inti għandek tuża Lyumjev eżatt malli tibda tiekol, jew minuta jew tnejn qabel l-ikla; inti għandek ukoll l-għażla li tinjetta sa 20 minuta wara li tkun bdejt l-ikla.

Kemm għandek tuża insulina

It-tabib se jaħdimlek id-doża abbażi taz-zokkor fid-demm tiegħek u l-piż tal-ġisem u se jispegjalek:

- Kemm għandek bżonn Lyumjev f'kull ikla.
- Kif u meta għandek tiċċekkja l-livell ta' zokkor fid-demm tiegħek.
- Kif għandek tibdel id-doża tal-insulina skont il-livelli taz-zokkor fid-demm tiegħek.
- X'għandek tagħmel jekk tibdel id-dieta tiegħek, jew jekk tibdel kemm tagħmel eżerċizzju, jekk tkun ma tiflaħx jew jekk tkun qed tuża medicini oħra.

- Jekk tibdel it-tip ta' insulina li inti tuża, jista' jkun li inti jkollok tuża aktar jew anqas minn qabel. Dan jista' jkun biss għall-ewwel injezzjoni jew tista' tkun bidla bil-mod il-mod fuq diversi ġimgħat jew xhur.

Tużax Lyumjev

- Jekk ma jidhirx qisu ilma. Lyumjev għandu jkun ċar, bla kulur u ma jkollu l-ebda frak fih. Iċċekkja kull darba li tinjetta lilek innifsek.
- Jekk Lyumjev ma nħażinx kif suppost (ara sezzjoni 5 “Kif taħzen Lyumjev”).
- Jekk il-pinna jkun fiha kwalunkwe ħsara, tużahiex.

Kif tlesti t-Tempo Pen għall-użu (Jekk jogħġbok ara l-istruzzjonijiet dwar l-użu)

- L-ewwel aħsel idejk.
- Aqra l-istruzzjonijiet dwar kif tuża il-pinna tal-insulina mimlija għal-lest. Jekk jogħġbok segwi l-istruzzjonijiet b'attenzjoni. Hawn għandek ftit affarijiet biex ifakkruk.
- Uża labra ġdida. (Il-labar mhux inkluzi).
- Ikkarga t-Tempo Pen kull darba qabel ma tużaha. B'hekk tiċċekkja li l-insulina toħroġ barra u tneħhi l-bzieżaq tal-arja mit-Tempo Pen tiegħek. Jista' jagħti l-każ li xorta jkun għad hemm ftit bzieżaq tal-arja żgħar fil-pinna. Bzieżaq żgħar tal-arja huma normali u mhumiex se jaffettwaw id-doża tiegħek.
- In-numru ta' unitajiet jintwera fit-tieqa tad-doża, dejjem iċċekkjhomm qabel l-injezzjoni tiegħek.

Meta tagħti injezzjoni ta' Lyumjev

- Qabel ma tagħti l-injezzjoni, naddaf il-ġilda tiegħek.
- Injetta taħt il-ġilda (injezzjoni subkutaneja), kif ġejt mgħallem mit-tabib jew mill-infermier tiegħek.
- Wara l-injezzjoni tiegħek, ħalli l-labra fil-ġilda għal 5 sekondi biex tkun żgur li tirċievi d-doża kollha. Aċċerta ruħek li tinjetta mill-inqas 1 mill-aħħar injezzjoni u li inti 'tibdel' il-postijiet li tinjetta fihom (in-naħa ta' fuq tad-driegħ, il-koxxa, il-warrani jew jew iż-żaqq).
- Jekk m'għandekx biżżejjed insulina fil-pinna biex tiegħu d-doża kollha tiegħek, hu nota ta' kemm għad trid tiegħu. Ikkarga pinna ġdida u injetta d-doża li jkun għad jonqos.
- Jekk għandek bżonn tinjetta insulina oħra fl-istess waqt ma' Lyumjev, uża post differenti għall-injezzjoni.
- Tinjettax direttament go vina.

Wara li tinjetta

- Eżatt kif tkun ħadt l-injezzjoni, holl il-labra mit-Tempo Pen billi tuża l-għatu ta' barra tal-labra. Din iżomm l-insulina sterili u żżommha milli tqattar. Hija twaqqaf ukoll l-arja milli terġa' tidhol lura fil-pinna u il-labra milli tistadd. **Issellifx il-labar tiegħek. Issellifx il-pinna tiegħek.** Poġġi l-għatu lura fuq il-pinna tiegħek.
- Jekk m'intix ċert/a kemm injettajt għandek tiċċekkja l-livelli taz-zokkor fid-demmi tiegħek qabel ma tiddeċiedi jekk għandekx bżonn injezzjoni oħra.

Aktar injezzjonijiet

- Kull darba li inti tuża Tempo Pen inti għandek tuża labra ġdida. Qabel kull injezzjoni, neħhi kwalunkwe bzieżaq tal-arja. Inti tista' tara kemm fadal insulina billi żomm it-Tempo Pen bil-labra thares 'il fuq.
- Ladarba t-Tempo Pen tiżvojta, terġax tużaha.

Jekk tuża Lyumjev aktar milli suppost

Jekk inti tinjetta wisq Lyumjev, jew m'intix ċert/a kemm injettajt, jista' jseħh livell baxx ta' zokkor fid-demmi. Iċċekkja z-zokkor fid-demmi tiegħek.

Jekk iz-zokkor fid-demmi tiegħek jkun baxx (ipoglicemija) u inti tista' titratta lilek innifsek, hu pilloli tal-glukożju, zokkor jew xarba biz-zokkor. Imbagħad kul frott, gallettini, jew sandwich, skont kif ikun tak parir it-tabib jew l-infermier tiegħek u strieh f'it. B'hekk hafna drabi jirnexxilek tirkupra miz-

zokkor baxx fid-demmm jew doża eċċessiva ħafifa ta' insulina. Erga' ċekkja z-zokkor fid-demmm tiegħek wara 15-20 min sakemm iz-zokkor fid-demmm jistabilizza.

Jekk inti ma tistax titratta lilek innifsek (ipoglicemija severa) minhabba li tħossok wisq stordut/a, dgħajjef/fa, konfuż/a, għandek diffikultà biex titkellem, tintilef minn sensik jew ittik aċċessjoni inti tista' tkun tehtieg tigi ttrattat/a bil-glukagon. Dan jista' jingħata minn xi hadd li jkun jaf jużah. Hu l-glukożju jew iz-zokkor wara l-glukagon. Jekk il-glukagon ma jaħdimx, inti se jkollok tmur l-isptar jew iċċempel is-servizzi tal-emergenza. Staqsi lit-tabib tiegħek biex jgħidlek dwar il-glukagon.

Għid lil kull min tqatta' ħin miegħu/magħha li inti għandek id-dijabete. Għidilhom x'jista' jiġri jekk iz-zokkor fid-demmm tiegħek jitbaxxa wisq, inkluż ir-riskju li tintilef minn sensik. Avżhom li jekk tintilef minn sensik, huma għandhom idawruk fuq ġenbek biex tevita li tifga, iġibu għajnuma medika minnufih u biex ma jagħuk l-ebda ikel jew xorb minhabba li tista' tifga.

Jekk tinsa tuża Lyumjev

Jekkk tinsa tuża l-insulina tiegħek jew jekk inti tuża anqas milli suppost, jew m'intix ċert/a kemm injettajt, iz-zokkor fid-demmm tiegħek jista' jkun għoli wisq (iperglicemija). Iċċekkja l-livell taz-zokkor fid-demmm tiegħek biex tiddeċiedi hemmx bżonn doża tal-insulina. Komplil bl-iskeda tal-għoti tad-doża tas-soltu waqt l-ikel li jmiss.

Jekk tieqaf tuża Lyumjev

Twaqqafx jew tibdilx l-insulina tiegħek hlief jekk jgħidlek tagħmel dan it-tabib tiegħek. Jekk inti tuża inqas Lyumjev milli suppost, jista' jsehh livell għoli ta' zokkor fid-demmm.

Jekk iz-zokkor għoli fid-demmm (iperglicemija) ma jiġix trattat jista' jkun serju ħafna u jikkawża uġiġħ ta' ras, nawsja, rimettar, uġiġħ fl-addome, deidratazzjoni, telf ta' koxjenza, koma jew anke mewt (ara sezzjoni 4).

Tliet affarijiet sempliċi biex tevita ipoglicemija jew iperglicemija huma:

- Dejjem żomm pinna żejda, f'każ li inti tiflew it-Tempo Pen jew jiġrilha l-ħsara.
- Dejjem żomm xi haġa fuqek biex turi li inti dijabetiku/a.
- Dejjem żomm iz-zokkor fuqek.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' din il-medicina, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

4. Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull medicina oħra, din il-medicina tista' tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f'kulhadd.

Zokkor baxx fid-demmm (ipoglicemija) huwa komuni ħafna bit-trattament tal-insulina (jista' jaffettwa aktar minn persuna 1 minn kull 10). Hija tista' tkun serja ħafna. Jekk il-livell taz-zokkor fid-demmm tiegħek jinżel wisq inti tista' tintilef minn sensik. Ipoglicemija serja tista' tikkawża ħsara fil-moħħ u tista' tkun ta' periklu għall-ħajja. Jekk inti għandek sintomi ta' zokkor baxx fid-demmm, hu azzjoni **immedjatment** biex iżżid il-livell taz-zokkor fid-demmm tiegħek. Ara sezzjoni 3 taht 'Jekk tuża aktar Lyumjev milli suppost'.

Reazzjonijiet allergiċi huma komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 10). Huma jistgħu jkunu severi u jistgħu jinkludu s-sintomi li ġejjin:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| • raxx u ħakk mal-ġisem kollu | • tinżel il-pessjoni |
| • diffikultà biex tiehu n-nifs | • qalb tħabbat tghaġġel |
| • tħarhir | • ħruġ ta' għaraq |

Jekk ikollok reazzjoni allergika serja (inkluż attakk anafilattiku) għall-insulina jew għal kwalunkwe sustanza f'Lyumjev, ieqaf uża din il-medicina u kkuntattja s-servizzi mediċi tal-emergenza minnufih.

Effetti sekondarji ohra jinkludu

Komuni (jistghu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 10)

Reazzjonijiet fil-post tal-injezzjoni. Xi persuni jkollhom ħmura, uġiġ, nefha jew ħakk madwar il-post tal-injezzjoni tal-insulina. Dan is-soltu jgħaddi fi ftit minuti sa ftit ġimgħat mingħajr ma tkun teħtieġ twaqqaf Lyumjev. Jekk inti jkollok reazzjonijiet fil-post tal-injezzjoni, għid lit-tabib tiegħek.

Mhux komuni (jistghu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 100)

Bidliet fil-ġilda fis-sit tal-injezzjoni: Jekk tinjetta insulina wisq ta' spiss fl-istess post, it-tessut xaħmi jista' jew jiċkien (lipoatrofija) jew jihxien (lipoipertrofija). Boċċi taħt il-ġilda jistghu jiġu kkawżati wkoll minn akkumulazzjoni ta' proteina msejja amilojdi (amilojdozi tal-ġilda). L-insulina tista' ma taħdimx tajjeb ħafna jekk tinjetta f'żona bil-boċċi. Ibdel is-sit tal-injezzjoni ma' kull injezzjoni biex tgħin fil-prevenzjoni ta' dawn il-bidliet fil-ġilda.

Effetti sekondarji ohra li jistghu jseħhu

Nefha fid-dirgħajn jew fl-għekiesi minħabba żamma tal-fluwidu (edima), b'mod partikolari fil-bidu tat-terapija bl-insulina jew matul bidla fil-medicini tad-dijabete tiegħek.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek. Dan jinkludi xi effetti sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Tista' wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali mniżżla f' [Appendiċi V](#). Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista' tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta' din il-medicina.

Problemi komuni tad-dijabete

Zokkor baxx fid-demm

Zokkor baxx fid-demm (ipoglicemija) ifisser li m'hemmx biżżejjed zokkor fid-demm. Dan jista' jiġi kkawżat jekk:

- inti tiegħu wisq Lyumjev jew insulina ohra;
- inti taqbez ikliet jew iddum ma tiekol jew tibdel id-dieta tiegħek;
- inti tagħmel eżerċizzju jew tagħmel xogħol iebes eżatt qabel jew wara ikla;
- inti għandek infezzjoni jew mard (speċjalment dijarea jew rimettar);
- hemm bidla fil-bżonn tal-insulina tiegħek per eżempju jekk titlef il-piż; jew
- inti għandek problemi bil-kliewi jew bil-fwied li jmorru għall-aġġar.

Ara s-sezzjoni 'Jekk tuża Lyumjev aktar milli suppost.'

L-ewwel sintomi ta' zokkor baxx fid-demm is-soltu jiġu malajr u jinkludu dan li ġej:

- gheja
- qalb tħabbat b'mod mgħaġġel
- nervi jew roġħda
- tħossok imdardar
- uġiġ ta' ras
- għaraq kiesaħ

Jekk m'intix kunfidenti li tagħraf is-sintomi ta' twissija tiegħek, evita sitwazzjonijiet bħal issuq karozza, li fihom inti jew persuni ohra jitpoġġew f'periklu minħabba ipoglicemija.

Zokkor għoli fid-demm (iperglicemija) u ketoacidożi tad-dijabete

Iperglycemia (wisq zokkor fid-demm) tfisser li li l-livelli tal-glucose fil-ġisem tiegħek huma għoljin wisq. Iperglycemia tista' tiġi minhabba:

- li inti ma tihux l-insulina tiegħek;
- tuża inqas insulina minn kemm jehtieg il-ġisem tiegħek;
- żbilanċ bejn l-ammont ta' karboidrati li tiekol u l-ammont ta' insulina li tiehu; jew
- deni, infezzjoni jew stress emozzjonali.

Is-sintomi bikrija ta' iperglicemija huma:

- tkun bil-ġhatx ħafna
- uġiġħ ta' ras
- thossok bi nġhas
- tagħmel awrina aktar spiss

L-iperglicemija tista' twassal għall-ketoacidożi tad-dijabete. L-ewwel sintomi jiġu bil-mod fuq perjodu ta' ħafna sigħat jew jiem. Sintomi addizzjonali jinkludu li ġejjin:

- nawsja u/jew rimettar
- uġiġħ fl-addome
- polz mġaġġel
- tiehu nifs fil-fond
- ammonti moderati jew kbar ta' ketoni fl-awrina. Il-ketoni jiġu magħmula meta l-ġisem tiegħek jahraq ix-xaħam għall-enerġija minflok il-glucose.

Jekk għandek kwalunkwe minn dawn is-sintomi u zokkor għoli **ġib għajnuna medika minnufih**. Ara s-sezzjoni 'Jekk tinsa'tuża Lyumjev'.

Mard

Jekk inti ma tiflaħx, speċjalment jekk qed thossok imdardar jew qed tirremetti, l-ammont ta' insulina li inti għandek bżonn jista' jinbidel. **Anke meta inti ma tkunx qed tiekol b'mod normali, inti xorta jkollok bżonn l-insulina.** Ittestja l-awrina jew id-demm, segwi 'r-regoli ta' meta tkun ma tiflaħx', u għid lit-tabib tiegħek.

5. Kif tahzen Lyumjev Tempo Pen

Żomm din il-medicina fejn ma' tintlaħaqx u ma tidhirx mit-tfal.

Tużax din il-medicina wara d-data ta' meta tiskadi li tidher fuq it-tikketta u l-kartuna. Id-data ta' meta tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta' dak ix-xaħar.

Qabel l-ewwel użu

Aħżen fi frigġ ($2^{\circ}\text{C} - 8^{\circ}\text{C}$).

Tagħmlux fil-friza.

Żomm fil-kartuna ta' barra sabiex tilqa' mid-dawl.

Wara l-ewwel użu

Tahżinx f'temperatura 'l fuq minn 30°C .

Tagħmlux fil-friza.

Tagħmlux fil-frigġ.

It-Tempo Pen m'għandhiex tinħażen bil-labra mwahħla. Żomm l-għatu fuq il-pinna sabiex tilqa' mid-dawl.

Armiha wara 28 jum **anke jekk ikun għad fadal fiha xi soluzzjoni.**

Tarmix medicini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispizjar tiegħek dwar kif għandek tarmi medicini li m'għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni ohra

X'fih Lyumjev 100 unità/ml Tempo Pen soluzzjoni għal injezzjoni

- Is-sustanza attiva hi insulina lispro. Kull ml ta' soluzzjoni fih 100 unità ta' insulina lispro. Tempo Pen waħda fiha 300 unità ta' insulina lispro f' soluzzjoni ta' 3 ml.
- Is-sustanzi l-oħra huma metacresol, glycerol, magnesium chloride hexahydrate, sodium citrate dihydrate, treprostinal sodium, zinc oxide, ilma għall-injezzjonijiet. Sodium hydroxide jew hydrochloric acid setgħu intużaw biex jaġġustaw il-pH (ara t-tmiem ta' sezzjoni 2 taħt 'Lyumjev Tempo Pen fih sodium').
- It-Tempo Pen fiha kalamita (ara sezzjoni 2, "Twissijiet u prekawzjonijiet").

Kif jidher Lyumjev Tempo Pen u l-kontenut tal-pakkett

Lyumjev Tempo Pen soluzzjoni għal injezzjoni, hija soluzzjoni ċara, bla kulur, u akweja f'pinna mimlija għal-lest. Kull pinna mimlija għal-lest fiha 300 unità (3 millilitri).

Daqsijiet tal-pakkett ta' 5 jew pakkett multiplu ta' 2 x 5 pinen mimlija għal-lest.

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkun fis-suq.

Il-Lyumjev Tempo Pen hija griża bil-kannella (taupe). Il-buttuna tad-doża hija blu bi ħnieq imqabbża mal-ġenb kollu. It-tikketta hija blu, ħadra u bajda.

Kull Lyumjev Tempo Pen tagħti minn unità 1 sa 60 unità f'zidiet ta' unità 1 f'injezzjoni waħda.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq

Eli Lilly Nederland B.V.
Papendorpseweg 83
3528 BJ Utrecht
L-Olanda.

Manifattur

Lilly France
Rue du Colonel Lilly
67640 Fegersheim
Franza.

Għal kull tagħrif dwar dan il-prodott mediċinali, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq:

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.
Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Lietuva
Tel: +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България
Тел.: + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.
Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.
Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.
Tel.: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S
Tlf.: +45 45 26 6000

Malta

Charles de Giorgio Ltd.
Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH
Tel: + 49-(0) 6172 273 2222

Eesti

Eli Lilly Nederland B.V.
Tel: +372 6817 280

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΑΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
Τηλ: +30 210 629 4600

España

Dista S.A.
Tel: + 34-91 663 50 00

France

Lilly France
Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.
Tel: +385 1 2350 999

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited
Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Ísland

Icepharma hf.
Sími: + 354 540 8000

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.
Tel: + 39- 055 42571

Κύπρος

Phadisco Ltd
Τηλ: +357 22 715000

Latvija

Eli Lilly (Suisse) S.A Pārstāvniecība Latvijā
Tel: +371 67364000

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.
Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Norge

Eli Lilly Norge A.S.
Tlf: + 47 22 88 18 00

Österreich

Eli Lilly Ges. m.b.H.
Tel: + 43-(0) 1 711 780

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 440 33 00

Portugal

Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda
Tel: + 351-21-4126600

România

Eli Lilly România S.R.L.
Tel: + 40 21 4023000

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.
Tel: +386 (0) 1 580 00 10

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia s.r.o.
Tel: + 421 220 663 111

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab
Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Sverige

Eli Lilly Sweden AB
Tel: + 46-(0) 8 7378800

Dan il-fuljett kien rivedut l-ahhar f'**Sorsi ohra ta' informazzjoni**

Informazzjoni dettaljata dwar din il-medicina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Medicini: <https://www.ema.europa.eu>.

Instruzzjonijiet dwar l-Użu

Lyumjev 100 unità/mL Tempo Pen soluzzjoni għall-injezzjoni f'pinna mimlija għal-lest insulin lispro



JEKK JOGHĠBOK AQRA DAWN L-ISTRUZZJONIJIET QABEL L-UŻU

Aqra l-istruzzjonijiet dwar l-użu qabel tibda tuża Lyumjev u kull darba li inti gġib Lyumjev Tempo Pen għidha. Jista' jkun hemm informazzjoni għidha. Din l-informazzjoni ma tihux post li inti titkellem mal-professjonist tiegħek fil-qasam tal-kura tas-saħħa dwar il-kundizzjoni medika tiegħek jew it-trattament tiegħek.

Lyumjev 100 unità/mL Tempo Pen ("Pinna") hija pinna mimlija għal-lest li tintrema wara li tintuża li fiha 3 mL (300 unità, 100 unità/mL) ta' soluzzjoni ta' insulin lispro għall-injezzjoni.


- Il-professjonist fil-qasam tal-kura tas-saħħa tiegħek se jgħidlek kemm-il unità għandek tagħti bħala d-doża tiegħek u kif għandek tinjetta d-doża tal-insulina ordnata lilek.
- Inti tista' tagħti lilek innifsek aktar minn doża waħda mill-Pinna.
- Kull dawra tal-buttuna tagħti unità 1 ta' insulina. Inti tista' tagħti minn unità 1 sa 60 unità f'injezzjoni waħda.
- Jekk id-doża tiegħek hija aktar minn 60 unità, inti se jkollok bżonn tagħti lilek innifsek aktar minn injezzjoni waħda. Dejjem għandek tiċċekkja n-numru fit-tieqa tad-doża biex taċċerta ruħek li inti tkun dawwart id-doża t-tajba.
- Il-planger jiċċaqlaq ftit biss ma' kull injezzjoni u jista' jkun li inti ma tinnutax li jiċċaqlaq. Il-planger jilhaq it-tarf tal-iskartoċċ biss meta inti tkun użajt it-300 unità kollha li fiha l-Pinna.

It-Tempo Pen hija magħmula biex taħdem mat-Tempo Smart Button. It-Tempo Smart Button huwa prodott li wiehed jista' jagħzel biex iwahhal fuq il-buttuna tad-doża tat-Tempo Pen u jgħin biex jittrasmetti informazzjoni dwar id-doża ta' Lyumjev mit-Tempo Pen għal applikazzjoni ċellulari kompatibbli. It-Tempo Pen jinjetta insulina bi jew mingħajr it-Tempo Smart Button imwahhal. It-Tempo Smart Button tiegħek trid tkun imwahhla mat-Tempo Pen biex tirrekordja jew tittrasmetti dejta dwar id-doża. Aghfas it-Tempo Smart Button bi dritt għal fuq il-buttuna tad-doża sakemm tisma' hoss ta' tifqigha jew thoss li t-Tempo Smart Button dahlet f'postha. Sabiex tittrasmetti dejta lejn l-applikazzjoni ċellulari, segwi l-istruzzjonijiet ipprovduti mat-Tempo Smart Button u l-istruzzjonijiet mal-applikazzjoni ċellulari.

Issellifx il-Lyumjev Tempo Pen lil persuni ohra, anke jekk tkun inbidlet il-labra. Terġax tuża labar użati jew issellef il-labar tiegħek lil persuni ohra. Inti tista' tagħtihom infezzjoni serja jew inti tista' tiegħu infezzjoni serja mingħandhom.


Persuni li huma għomja jew għandhom problemi bil-vista m'għandhomx jużaw il-Pinna mingħajr l-għajnuna ta' persuna mharrġa fl-użu tal-Pinna.

Partijiet ta' Lyumjev Tempo Pen



Partijiet tal-Labra tal-Pinna (Il-Labar Mhumiex Inkluzi)

Buttuna tad-Doża



Kif taghraf il-Lyumjev Tempo Pen tieghek

- Kulur tal-pinna: Griż bil-Kannella (Taupe)
- Buttuna tad-doża: Blu, bi ħnieq imqabbża mal-ġenb kollu
- Tikketta: Blu, ħadra u bajda

Affarijiet mehtieġa biex taghti l-injezzjoni tieghek




- Lyumjev Tempo Pen
- Labra kumpatibbli mat-Tempo Pen (huma rrakkomandati l-Labar għall-pinen BD [Becton, Dickinson and Company])
- Imselha jew garża

Labar, imselha jew garża mhumiex inkluzi.

Kif tipprepara l-Pinna tieghek

- Aħsel idejk bis-sapun u l-ilma.
- Iċċekkja l-Pinna biex taċċerta ruhek li inti tkun qed tiegħu t-tip ta' insulina it-tajba. Dan huwa importanti b'mod speċjali jekk inti tuża aktar minn tip wieħed ta' insulina.
- **Tużax** il-Pinna tiegħek wara d-data ta' meta tiskadi li hemm stampata fuq it-tikketta jew għal aktar minn 28 ġurnata wara li inti tibda tuża l-Pinna għall-ewwel darba.
- Dejjem uża **labra ġdida** għal kull injezzjoni biex tevita infezzjonijiet u labar misdudin.



Pass 1: • Iġbed l-għatu tal-Pinna dritt 'il barra. – Tnehhix it-tikketta tal-Pinna. • Imsaħ is-sigill tal-gomma bl-imselha.	
Pass 2: • Iċċekkja l-likwidu fil-Pinna. • Lyumjev għandu jidher ċar u bla kulur. Tużahx jekk ikun imdardar, ikkulurit, jew ikun fih frak jew ċapep.	


Pass 3: - Aghżel labra ġdida. - Iġbed it-tikketta tal-karti minn mal-protezzjoni ta' barra tal-labra.	
Pass 4: Imbotta l-labra li għadha bl-għatu dritt fuq il-Pinna u dawwar il-labra sakemm tissikka.	
Pass 5: - Aqla' l-protezzjoni ta' barra tal-labra billi tiġbidha. Tarmihix. - Aqla' l-protezzjoni ta' ġewwa tal-labra billi tiġbidha u armiha.	

Kif tikkarga l-Pinna

Ikkarga qabel kull injezzjoni.

- Tikkarga l-Pinna tiegħek tfisser li tneħhi l-arja mil-labra u mill-iskartoċċ li tista' tingabar matul l-użu normali tal-pinna u jiġi aċċertat li l-Pinna tiegħek tkun qegħda taħdem sew.
- Jekk inti **ma tikkargax** qabel kull injezzjoni, inti tista' tirċievi wisq jew ftit wisq insulina.

Pass 6: Biex tikkarga l-Pinna tiegħek, dawwar il-buttuna tad-doża biex tagħżel 2 unitajiet.	
Pass 7: Żomm il-Pinna tiegħek bil-labra tħares 'il fuq. Tektek bil-mod il-kontenitur tal-iskartoċċ biex tiġbor il-bżieqaq tal-arja lejn in-naħa ta' fuq.	
Pass 8: Kompli żomm il-Pinna bil-labra tħares 'il fuq. Aghfas il-buttuna tad-doża sakemm tista' u jidher "0" fit-tieqa tad-doża. Żomm il-buttuna tad-doża 'l ġewwa u ghodd sal-5 bil-mod. Inti għandek tara l-insulina fit-tarf tal-labra.	



– Jekk inti ma tarax insulina, irrepeti l-passi 6 sa 8 tal-ikkargar, iżda mhux għal aktar minn 4 darbiet. – Jekk tibqa' ma tarax insulina, biddel il-labra u rrepeti l-passi 6 sa 8 tal-ikkargar. Bżiežaq żgħar tal-arja huma normali u mhumiex se jaffettwaw id-doża tiegħek.	
--	---

Kif tagħzel id-doża tiegħek


- Tista' tagħti minn unità waħda sa 60 unità f'injezzjoni waħda.
- Jekk id-doża tiegħek hija iżjed minn 60 unità, inti jkollok bżonn tagħti iżjed minn injezzjoni waħda.
 - Jekk għandek bżonn l-ghajnuna sabiex tiddeċiedi kif għandek taqsam id-doża tiegħek, staqsi lill-professionist tiegħek tal-kura tas-saħħa.
 - Għandek tuża labra ġdida għal kull injezzjoni u rrepeti l-passi tal-ikkargar.

Pass 9:

- Dawwar il-buttuna tad-doża biex tagħzel in-numru ta' unitajiet li inti tehtieg tinjetta. L-indikatur tad-doża għandu jiġi bi dritt id-doża tiegħek.
 - Il-Pinna ddawwar unità waħda kull darba.
 - Il-buttuna tad-doża tagħmel klikk meta ddawwarha.
 - **Iddawwarx** id-doża tiegħek billi tgħodd in-numru ta' klikks. Tista' ddawwar id-doża l-ħażina. Dan jista' jwassal biex inti tieħu wisq insulina jew ma tihux biżżejjed insulina.
 - Id-doża tista' tiġi kkoreġuta billi ddawwar il-buttuna fi kwalunkwe direzzjoni sakemm id-doża korretta tiġi bi dritt l-indikatur tad-doża.
 - In-numri **biż-żewġ** huma stampati fuq il-wiċċ li jdur. L-eżempju fuq il-lemin juri 12-il unità.
 - In-numri **bil-fard**, wara n-numru 1, qed jintwerew bħala linji shaħ bejn in-numri. L-eżempju fuq in-naħa tal-lemin qed juri 25 unità.
- **Dejjem iċċekkja in-numru fit-tieqa tad-doża biex taċċerta ruhek li inti dawwart id-doża t-tajba.**



Eżempju: 12-il unità murija fit-tieqa tad-doża



Eżempju: 25 unità murija fit-tieqa tad-doża

- Il-Pinna ma thallikx iddawwar aktar min-numru ta' unitajiet li jkun għad-fadal fil-Pinna.
- Jekk għandek bżonn tinjetta aktar min-numru ta' unitajiet li għad fadal fil-Pinna, inti tista' jew:
 - tinjetta l-ammont li jkun għad fadal fil-Pinna mbagħad tuża Pinna ġdida biex tagħti l-bqija tad-doża tiegħek,

jew


- iġġib Pinna ġdida u tinjetta d-doża kollha.
- Huwa normali li tara ammont żgħir ta' insulina li tibqa' fil-Pinna u li inti ma tkunx tista' tinjetta.

Kif tagħti l-injezzjoni tiegħek

- Injetta l-insulina tiegħek kif uriek il-professjonist tiegħek tal-kura tas-saħħa.
- Ibdel il-post tal-injezzjoni tiegħek għal kull injezzjoni.
- **Tippruvax** tibdel id-doża tiegħek waqt li tkun qed tinjetta.

Pass 10:

- Aghżel il-post tal-injezzjoni tiegħek.
Lyumjev jiġi injettat taħt il-ġilda fiż-żona tal-istonku, fil-warrani, fin-naħa ta' fuq tar-rigiel jew fin-naħa ta' fuq tad-driegħ.
- Imsaħ il-ġilda tiegħek b'imselha, u halli l-ġilda tiegħek tinxef qabel tinjetta d-doża.





Pass 11:

- Dahħal il-labra fil-ġilda tiegħek.
- Aghfas il-buttuna tad-doża kollha kemm hi 'l gewwa.
- Kompli zomm il-buttuna tad-doża magħfusa 'l gewwa u **bil-mod għodd sal-5** qabel ma tohroġ il-labra.





Tippruvax tinjetta l-insulina tiegħek billi ddawwar il-buttuna tad-doża. **M'intix** se tirċievi l-insulina billi ddawwar il-buttuna tad-doża.




Pass 12: • Iġbed il-labra 'l barra minn ġol-ġilda tiegħek. – Qatra insulina fit-tarf tal-labra hija normali. Hija mhijiex se taffettwalek id-doża. • Iċċekkja n-numru fit-tieqa tad-doża. – Jekk tara “0” fit-tieqa tad-doża, inti tkun irċivejt l-ammont kollu li tkun dawwart. – Jekk ma tarax “0” fit-tieqa tad-doża, inti ma tkunx irċivejt id-doża kollha tiegħek. Terġax iddawwar. Dahhal il-labra fil-ġilda u spiċċa l-injezzjoni. – Jekk xorta taħseb li inti ma rċivejtx l-ammont kollu li inti dawwart għall-injezzjoni tiegħek, terġax tibda mill-bidu jew tirrepeti dik l-injezzjoni. Immonitorja l-glukożju fid-demm kif spjegat mill-professionist tiegħek tal-kura tas-saħħa. – Jekk is-soltu inti jkollok bżonn tagħti 2 injezzjonijiet għad-doża shiħa tiegħek, kun ċert/a li tagħti t-tieni injezzjoni. Il-planger jiċċaqlaq ffit biss ma' kull injezzjoni u jista' jkun li inti ma tinnutax li jiċċaqlaq. Jekk tara d-demm wara li inti tkun ġbidt il-labra 'l barra minn ġol-ġilda tiegħek, aghfas il-post tal-injezzjoni b'mod ħafif b'biċċa garża jew imselha. Togħorokx iż-żona.	
---	--

Wara l-injezzjoni tiegħek

Pass 13: • B'attenzjoni poġġi lura l-protezzjoni ta' barra tal-labra.	
Pass 14: • Holl il-labra mġhottija u armiha kif deskritt hawn taht (ara s-sezzjoni “Kif tarmi l-Pinen u l-labar”). • Tahżinx il-Pinna bil-labra mwahhla magħha biex tevita li tqattar, li l-labra tistadd, u li tidhol l-arja fil-Pinna.	

Pass 15:

- Poġġi lura l-ġhatu tal-Pinna billi tpoġġi l-klipp tal-pinna bi dritt l-idikatur tad-doża u timbotta dritt 'il ġewwa.

**Kif tarmi l-Pinen u l-labar**

- Poġġi l-labar użati f'kontenitur għal oġġetti li jaqtgħu jew bil-ponta jew f'kontenitur ta' plastik iebes b'ġhatu sikur. **Tarmix** il-labar direttament fl-iskart domestiku tiegħek.
- **Tirriċiklax** il-kontenitur għal oġġetti li jaqtgħu jew bil-ponta meta jimtela.
- Staqsi lill-professjonist tiegħek tal-kura tas-saħħa dwar l-għażliet biex tarmi kif suppost il-Pinna u l-kontenitur għal oġġetti li jaqtgħu jew bil-ponta.
- L-istruzzjonijiet dwar l-immaniġġjar tal-labar mhumiex maħsuba li jiehdu post ir-regoli lokali, tal-professjonisti tal-kura tas-saħħa jew istituzzjonali.

Kif tagħraf u ssolvi xi problemi fil-Pinna

- Jekk ma tkunx tista' tneħhi l-ġhatu tal-Pinna, dawwar bil-mod l-ġhatu 'l quddiem u lura, imbagħad iġbdu dritt 'il barra.
- Jekk il-buttuna tad-doża hija iebsa biex tagħfasha:
 - li tagħfas il-buttuna tad-doża aktar bil-mod se jagħmilha aktar faċli biex tinjetta.
 - il-labra tiegħek tista' tkun misduda. Poġġi labra ġdida u kkarga l-Pinna.
 - inti jista' jkollok trab, ikel jew likwidu ġol-Pinna. Armi l-Pinna u ġib Pinna ġdida. Jista' jkollok bżonn riċetta mill-professjonist fil-kura tas-saħħa tiegħek.

Jekk għandek xi mistoqsijiet jew problemi bil-Lyumjev 100 unità/mL Tempo Pen tiegħek, ikkuntattja l-professjonist tiegħek tal-kura tas-saħħa għall-għajjnuna jew ikkuntattja r-rappreżentant lokali ta' Lilly

Data ta' Revizjoni tad-Dokument:

Fuljett ta' taghrif: Informazzjoni għall-utent

Lyumjev 200 unità/ml KwikPen soluzzjoni għall-injezzjoni f'pinna mimlija għal-lest insulin lispro

Kull KwikPen taghti minn unità 1 sa 60 unità f'passi ta' unità 1 f'injezzjoni wahda

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-mediċina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok b'żonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib, lill-infermier jew lill-ispizjar tiegħek.
- Din il-mediċina għet mogħtija lilek biss. M'għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista' tagħmlilhom il-ħsara, anke jekk għandhom l-istess sinjali ta' mard bħal tiegħek.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib, lill-infermier jew lill-ispizjar tiegħek. Dan jinkludi xi effetti sekondarji possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F'dan il-fuljett

1. X'inhu Lyumjev 200 unità/ml KwikPen u għalxiex jintuża
2. X'għandek tkun taf qabel ma tuża Lyumjev 200 unità/ml KwikPen
3. Kif għandek tuża Lyumjev 200 unità/ml KwikPen
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif taħžen Lyumjev 200 unità/ml KwikPen
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1. X'inhu Lyumjev 200 unità/ml KwikPen u għalxiex jintuża

Lyumjev 200 unità/ml KwikPen soluzzjoni għall-injezzjoni f'pinna mimlija għal-lest fih is-sustanza attiva insulin lispro. Lyumjev jintuża għat-trattament tad-dijabete fl-adulti. Huwa insulina ta' mal-ikel li taħdem aktar malajr minn mediċini oħra li fihom insulin lispro. Lyumjev fih sustanzi li jagħglu l-assorbiment ta' insulin lispro għal għol-gisem.

Id-dijabete hija kondizzjoni li fiha l-gisem tiegħek ma jagħmilx biżżejjed insulina jew ma jużax l-insulina b'mod effettiv, li jwassal għal effetti bħal livelli għoljin ta' zokkor fid-dem. Lyumjev huwa mediċina ta' insulina li jintuża fit-trattament tad-dijabete u b'hekk jikkontrolla z-zokkor fid-dem. Trattament effettiv tad-dijabete, b'kontroll tajjeb taz-zokkor fid-dem, jevita kumplikazzjonijiet fuq tul ta' żmien mid-dijabete tiegħek.

It-trattament b'Lyumjev jgħin biex jikkontrolla z-zokkor fid-dem fuq żmien twil u jevita kumplikazzjonijiet mid-dijabete tiegħek. Lyumjev jkollu l-effett massimu tiegħu minn 1 sa 3 sigħat wara l-injezzjoni u l-effett idum sa 5 sigħat. Inti għandek tuża Lyumjev fil-bidu tal-ikla, jew sa 20 minuta wara li tkun bdejt tiekol.

It-tabib tiegħek jista' jgħidlek biex tuża Lyumjev kif ukoll insulina li taħdem fit-tul jew b'mod intermedju. Tbiddilx l-insulina tiegħek sakemm ma jgħidlekx it-tabib tiegħek.

Lyumjev 200 unità/ml KwikPen hija pinna mimlija għal-lest li tintrema wara li tintuża li fiha 3 ml (600 unità, 200 unità/ml) ta' insulin lispro. KwikPen wahda fiha ħafna doži ta' insulina. Il-KwikPen iżżid unità wahda kull darba. **In-numru ta' unitajiet jidher fit-tieqa tad-doża, dejjem iċċekkja dan qabel l-injezzjoni tiegħek.** Inti tista' tagħti minn unità 1 sa 60 unità f'injezzjoni wahda. **Jekk id-doża tiegħek hija aktar minn 60 unità, inti se jkollok b'żonn tagħti lilek innifsek aktar minn injezzjoni wahda.**

2. X'ghandek tkun taf qabel ma tuża Lyumjev 200 unità/ml KwikPen

TUŻAX Lyumjev 200 unità/ml KwikPen

- jekk taħseb li z-zokkor fid-demm tiegħek nieżel (**ipoglicemija**). Iktar 'il quddiem, dan il-fuljett se jgħidlek kif titratta zokkor baxx fid-demm (ara sezzjoni 3 taht “Jekk tuża Lyumjev aktar milli suppost”).
- jekk inti **allergiku/a** għal insulin lispro jew għal xi sustanza oħra ta' din il-medicina (imnizzla fis-sezzjoni 6).

Twissijiet u prekawzjonijiet

- **Is-soluzzjoni għall-injezzjoni ta' Lyumjev 200 unità/ml fil-pinna mimlija għal-lest tiegħek (il-KwikPen) għandha tiġi injettata BISS ma' din il-pinna mimlija għal-lest. Titraserixxix l-insulin lispro mill-Lyumjev 200 unità/ml KwikPen għal go siringa.** Il-marki fuq is-siringa tal-insulina mhumieq se jkejlu d-doża t-tajba tiegħek. Tista' twassal għal doża eċċessiva severa, li tikkawża zokkor baxx fid-demm li jista' jpoġġilek haġtek f'riskju. Titraserixxix insulin mill-Lyumjev 200 unità/ml KwikPen għal kwalunkwe apparat ieħor li jagħti l-insulina bħal pompi tal-infużjoni tal-insulina.

Kellem lit-tabib, lill-ispizjar jew lill-infermier tiegħek qabel tuża Lyumjev.

Jekk inti ma tistax tara tajjeb inti se jkollok bżonn l-għajnuna ta' xi hadd li jkun imħarreg biex jagħti injezzjonijiet.

- **Zokkor baxx fid-demm (ipoglicemija).**

Zokkor baxx fid-demm jista' jkun serju u ipoglicemija li ma tiġix trattata tista' anke twassal għall-mewt.

Lyumjev jibda jnaqqas iz-zokkor fid-demm aktar malajr minn xi wħud mill-insulini ta' mal-ikel. Jekk issehh ipoglicemija, din tista' tiġrilek qabel wara injezzjoni ta' Lyumjev. Jekk ikollok ipoglicemija ta' spiss jew ikollok diffikultà biex tagħrafha, jekk jogħġbok iddiskuti dan mat-tabib jew mal-infermier tiegħek. Jekk il-livelli taz-zokkor fid-demm tiegħek huma kkontrollati tajjeb bit-terapija tal-insulina tiegħek ta' bħalissa jew wara żmien twil ta' dijabete, jista' jkun li inti ma tħossx is-sintomi ta' twissija meta z-zokkor fid-demm tiegħek ikun qed jitbaxxa wisq. Sinjali ta' twissija huma elenkati aktar tard f'dan il-fuljett. Għas-sintomi jekk jogħġbok ara “Probemi komuni tad-dijabete”.

Inti għandek taħseb sewwa dwar meta għandek tiekol, kemm tagħmel eżerċizzju u kemm tagħmlu ta' spiss. Għandek ukoll tosserva mill-qrib il-livelli taz-zokkor fid-demm tiegħek billi tittestja z-zokkor fid-demm tiegħek iktar ta' spiss.

Meta tagħmel bidliet fit-tipi ta' insulin li inti tuża dan jista' jikkawża z-zokkor fid-demm tiegħek jogħla jew jinżel wisq.

Jista' jkun meħtieġ li żżid il-frekwenza tal-ittestjar taz-zokkor fid-demm jekk inti qiegħed/a f'riskju ta' zokkor baxx fid-demm. It-tabib tiegħek jista' jkun jeħtieġ jibdil id-doži tal-medicini l-oħra tiegħek tad-dijabete.

- **Zokkor għoli fid-demm (iperglicemija).**

It-twaqqif tal-insulina jew li ma tiħux biżżejjed insulin jista' jwassal għal zokkor għoli fid-demm (iperglicemija) u ketoacidoži tad-dijabete, kondizzjonijiet serji li possibilmint jistgħu jwasslu anke għall-mewt. Għas-sintomi jekk jogħġbok ara “Problemi komuni tad-dijabete”.

- Jekk it-trattament tal-insulina tiegħek jkun qed jingħata flimkien ma' wieħed mill-klassi ta' medicini tad-dijabete msejja thiazolidinediones jew glitazones, bħal ma huwa pioglitazone, għid lit-tabib tiegħek mill-aktar fis jekk ikollok sinjali ta' insufficjenza tal-qalb bħal qtugħ ta' nifs mhux tas-soltu jew żieda malajr fil-piż jew nefha lokalizzata ikkawżata minn żamma ta' fluwidu (edima).
- Jekk għandek reazzjoni allergika serja għall-insulina jew għal kwalunkwe sustanza ta' Lyumjev, ieqaf uża din il-medicina u kkuntattja s-servizz ta' emergenza medika minnufih.
- Dejjem għandek tiċċekkja l-pakkett u t-tikketta għall-isem u t-tip ta' insulin meta inti għibha mill-ispizjerija. Aċċerta ruhek li għib il-Lyumjev li t-tabib qellek biex tuża.

- Żomm il-kartuna, jew żomm nota tan-numru tal-lott ta' fuq il-kartuna. Jekk ikollok effett sekondarju inti mbagħad tkun tista' tipprovi dak in-numru meta inti tirrapporta l-effett sekondarju, ara "rappurtar ta' effetti sekondarji".
- Dejjem uża labra ġdida għal kull injezzjoni biex tevita infezzjonijiet jew labar misduda. Jekk labra tistadd ibdilha ma' labra ġdida.

- **Bidliet fil-ġilda fis-sit tal-injezzjoni.**

Is-sit tal-injezzjoni għandu jinbidel kull darba biex jiġi evitati bidliet fil-ġilda bħal boċċi taħt il-ġilda. L-insulina tista' ma taħdimx tajjeb ħafna jekk tinjetta f'żona bil-boċċi (ara "Kif għandek tuża Lyumjev 200 units/ml KwikPen"). Ikkuntattja lit-tabib tiegħek jekk bħalissa qed tinjetta f'żona bil-boċċi qabel ma tibda tinjetta f'parti differenti. It-tabib tiegħek jista' jgħidlek biex tiċċekkja aktar mill-qrib iz-zokkor fid-demm tiegħek, u biex taġġusta d-doża tal-insulina jew tal-medikazzjonijiet antidiabetiċi l-oħra tiegħek.

Tfal u adolexxenti

Din il-medicina m'għandhiex tintuża fi tfal jew adolexxenti, minhabba li mhemmx esperjenza b'din il-medicina fit-tfal u l-adolexxenti ta' taħt it-18-il sena.

Medicini oħra u Lyumjev

Għid lit-tabib, lill-infermier jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista' tieħu xi medicini oħra. Xi medicini jaffettwaw iz-zokkor fid-demm tiegħek – dan jista' jfisser li d-doża tal-insulina tiegħek għandha tinbidel.

Il-livelli taz-zokkor fid-demm tiegħek jistgħu jinżlu (ipoglicemija) jekk inti tieħu:

- medicini oħra għad-dijabete (mill-ħalq u li jiġu injettati)
- antibijotiċi sulphonamide (għall-infezzjonijiet)
- acetylsalicylic acid (għall-uġiġħ u deni ħafif u biex jiġi evitat tgħaqid tad-demm)
- xi antidepressanti (inibituri ta' monoamine oxidase jew inibituri selettivi tal-assorbiment mill-ġdid tas-serotonin)
- xi inibituri tal-enzima li tikkonverti angiotensin (ACE, angiotensin converting enzyme) (per eżempju captopril, enalapril) (għal xi problemi tal-qalb jew pressjoni għolja)
- imblokkaturi tar-riċetturi ta' angiotensin II (għall-pressjoni għolja jew problemi tal-qalb)
- analogi ta' somatostatin (bħal octreotide, li jintużaw biex jitrattaw kondizzjoni rari li tinvolvi ormon żejjed ta' tkabbir)

Il-livelli taz-zokkor fid-demm tiegħek jistgħu jogħlew (iperglicemija) jekk inti tieħu:

- danazol (għall-endometrijozi)
- il-pillola kontraċettiva (pilloli għall-kontroll tat-tqala)
- terapija ta' sostituzzjoni tal-ormoni tat-tirojde (għal problemi tat-tirojde)
- ormon tat-tkabbir tal-bniedem (għal defiċjenza tal-ormon tat-tkabbir)
- diuretici (għal pressjoni għolja jew jekk qed jingemgħa l-ilma fil-ġisem tiegħek)
- sustanzi simpatomimetici (għal reazzjonijiet allergici serji jew jintużaw f'xi medicini għall-irjihat)
- kortikosteroidi (biex jitrattaw l-ażma jew kondizzjonijiet awtoimmuni)

Imblokkaturi tar-riċetturi beta (jintużaw għall-pressjoni għolja, aritmija jew angina) jagħmluha aktar diffiċli biex wiehed jagħraf is-sintomi ta' twissija ta' zokkor baxx fid-demm.

Lyumjev mal-alkoħol

Il-livelli taz-zokkor tiegħek jistgħu jew jogħlew jew jinżlu jekk inti tixrob l-alkoħol. Għalhekk l-ammont ta' insulina meħtieġa jista' jinbidel. Għalhekk inti għandek timmonitorja l-livell ta' zokkor fid-demm tiegħek aktar ta' spiss mis-soltu.

Tqala u treddigh

Jekk inti tqila jew qed tredda', taħseb li tista' tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir tat- tabib, tal-infermier jew tal-ispizjar tiegħek qabel tieħu din il-mediċina. L-ammont ta' insulina li inti tkun teħtieġ is-soltu jonqos matul l-ewwel 3 xhur tat-tqala u jiżdied għas-6 xhur li jkun għad fadal. Wara li inti jkollok it-tarbija l-bżonnijiet tiegħek tal-insulina x'aktarx jirritornaw għal dak li kont teħtieġ qabel it-tqala.

M'hemm l-ebda restrizzjonijiet fuq it-trattament b'Lyumjev matul it-treddigh. Jekk inti qed tredda', jista' jkollok bżonn tbiddel it-teħid tal-insulina jew id-dieta.

Sewqan u thaddim ta' magni

Il-hila biex tikkonċentra u tirreagixxi tista' tonqos jekk inti jkollok ipoglicemija. Jekk jogħġbok żomm quddiem għajnejk din il-problema possibbli fis-sitwazzjonijiet kollha fejn inti tista' tpoġġi lilek innifsek jew oħrajn f'riskju (eż. issuq karozza jew thaddem magni). Inti għandek tikkuntattja lit-tabib tiegħek dwar is-sewqan jekk inti għandek:

- episodji frekwenti ta' ipoglicemija
- sinjali ta' twissija mnaqqsa jew assenti meta jkollok ipoglicemija

Lyumjev 200 unità/ml KwikPen fih sodium

Din il-mediċina fiha anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f'kull doża, li tista' tghid hija essenzjalment 'mingħajr sodium'.

3. Kif għandek tuża Lyumjev 200 unità/ml KwikPen

Dejjem għandek tuża din il-mediċina kif deskritt f'dan il-fuljett jew skont il-parir eżatt tat-tabib, tal-ispizjar jew tal-infermier tiegħek. Iċċekkja magħhom jekk ikollok xi dubju.

Huma se jkun qalulek kemm eżatt għandek tuża Lyumjev, meta għandek tużah, u kemm-il darba għandek tużah. Se jgħidulek ukoll kemm ta' spiss għandek tmur għall-vista l-klinika tad-dijabete.

Biex tevita t-trasmissjoni possibbli ta' mard, kull pinna għandha tintuża minnek biss, anke jekk il-labra tinbidel.

Tużax Lyumjev 200 unità/ml KwikPen soluzzjoni għall-injezzjoni go pompa tal-infużjoni tal-insulina.

Inti għandek dejjem iżżomm insulina żejda u apparat ieħor tal-injezzjoni f'każ li tiġi bżonnhom.

Jekk inti għami jew għandek problemi bil-vista inti se jkollok bżonn għajnuna mingħand haddieħor biex itik l-injezzjonijiet.

It-tabib tiegħek jista' jgħidlek tuża Lyumjev kif ukoll insulina li taħdem aktar fit-tul jew b'mod intermedju. Injetthom b'mod separat. Lyumjev m'għandux jithallat ma' xi insulina oħra.

Meta għandek tinjetta Lyumjev

Lyumjev huwa insulina ta' mal-ikel. Inti għandek tuża Lyumjev eżatt malli jew tibda tiekol, jew minuta jew tnejn qabel l-ikla; inti għandek ukoll l-għażla li tinjetta sa 20 minuta wara li tkun bdejt l-ikla.

Kemm għandek tuża insulina

It-tabib se jaħdimlek id-doża abbażi taz-zokkor fid-demm tiegħek u l-piż tal-gisem u se jispjegalek:

- Kemm għandek bżonn Lyumjev f'kull ikla.
- Kif u meta għandek tiċċekkja l-livell ta' zokkor fid-demm tiegħek.
- Kif għandek tibdel id-doża tal-insulina skont il-livelli taz-zokkor fid-demm tiegħek.
- X'għandek tagħmel jekk tibdel id-dieta tiegħek, jew jekk tibdel kemm tagħmel eżerċizzju, jekk tkun ma tiflaħx jew jekk tkun qed tuża mediċini oħra.
- Jekk tibdel it-tip ta' insulina li inti tuża, jista' jkun li inti jkollok tuża aktar jew anqas minn

qabel. Dan jista' jkun biss għall-ewwel injezzjoni jew tista' tkun bidla bil-mod il-mod fuq diversi ġimgħat jew xhur.

Tużax Lyumjev

- Jekk ma jidhirx qisu ilma. Lyumjev għandu jkun ċar, bla kulur u ma jkollu l-ebda frak fih. Iċċekkja kull darba li tinjetta lilek innifsek.
- Jekk Lyumjev ma nħażinx kif suppost (ara sezzjoni 5 “Kif taħžen Lyumjev”).
- Jekk il-pinna jkun fiha kwalunkwe ħsara, tużahix.

Kif tlesti l- Lyumjev 200 unità/ml KwikPen għall-użu (Jekk jogħġbok ara l-istruzzjonijiet dwar l-użu)

- L-ewwel aħsel idejk.
- Aqra l-istruzzjonijiet dwar kif tuża il-pinna tal-insulina mimlija għal-lest. Jekk jogħġbok segwi l-istruzzjonijiet b'attenzjoni. Hawn għandek ftit affarijiet biex ifakkruk.
- Uża labra ġdida. (Il-labar mhux inklużi).
- Ippompja l- Lyumjev 200 unità/ml KwikPen kull darba qabel ma tużaha. B'hekk tiċċekkja li l-insulina toħroġ barra u tneħhi l-bżieqa tal-arja mill- Lyumjev 200 unità/ml KwikPen tiegħek. Jista' jagħti l-każ li xorta jkun għad hemm ftit bżieqa żgħira tal-arja fil-pinna. Bżieqa żgħira tal-arja huma normali u mhumiex se jaffettwaw id-doża tiegħek.
- In-numru ta' unitajiet jintwera fit-tieqa tad-doża, dejjem iċċekkjhom qabel l-injezzjoni tiegħek.

Meta tagħti injezzjoni ta' Lyumjev

- Qabel ma tagħti l-injezzjoni, naddaf il-ġilda tiegħek.
- Injetta taht il-ġilda, kif ġejt mgħallem mit-tabib jew mill-infermier tiegħek.
- Wara l-injezzjoni tiegħek, ħalli l-labra fil-ġilda għal 5 sekondi biex tkun żgur li rċievejt id-doża kollha. Aċċerta ruħek li tinjetta mill-inqas 1 mill-aħħar injezzjoni u li inti 'tibdel' il-postijiet li tinjetta fihom (in-naħa ta' fuq tad-driegħ, il-koxxa, il-warrani jew jew iż-żaqq).
- Jekk m'għandekx biżżejjed insulina fil-pinna biex tiehu d-doża kollha tiegħek, hu nota ta' kemm għad trid tiehu. Ippompja pinna ġdida u injetta d-doża li jkun għad jonqos.
- Jekk għandek bżonn tinjetta insulina oħra fl-istess waqt ma' Lyumjev, uża post differenti għall-injezzjoni.
- Tinjettax direttament go vina.

Wara li tinjetta

- Eżatt kif tkun ħadt l-injezzjoni, holl il-labra mill-Lyumjev 200 unità/ml Kwikpen billi tuża l-għatu ta' barra tal-labra. Din iżomm l-insulina sterili u żżommha milli tqattar. Hija twaqqaf ukoll l-arja milli terġa' tidhol lura fil-pinna u il-labra milli tistadd. **Issellifx il-labar tiegħek. Issellifx il-pinna tiegħek.** Poġġi l-għatu lura fuq il-pinna tiegħek.
- Jekk m'intix ċert/a kemm injettajt għandek tiċċekkja l-livelli taz-zokkor fid-demm tiegħek qabel ma tiddeċiedi jekk għandekx bżonn injezzjoni oħra.

Aktar injezzjonijiet

- Kull darba li inti tuża Lyumjev 200 unità/ml KwikPen inti għandek tuża labra ġdida. Qabel kull injezzjoni, kwalunkwe bżieqa tal-arja. Inti tista' tara kemm fadal insulina billi żomm il-Lyumjev 200 unità/ml KwikPen bil-labra thares 'il fuq.
- Ladarba l-Lyumjev 200 unità/ml KwikPen tiżvojta, terġax tużaha.

Jekk tuża Lyumjev aktar milli suppost

Jekk inti tinjetta wisq Lyumjev, jew m'intix ċert/a kemm injettajt, jista' jsehh livell baxx ta' zokkor fid-demm. Iċċekkja z-zokkor fid-demm tiegħek.

Jekk iz-zokkor fid-demm tiegħek jkun baxx (ipoglicemija) u inti tista' titratta lilek innifsek, hu pilloli tal-glukożju, zokkor jew xarba biz-zokkor. Imbagħad kul frott, gallettini, jew sandwich, skont kif ikun tak parir it-tabib jew l-infermier tiegħek u striegħ f'it. B'hekk hafna drabi jirnexxilek tirkupra miz-zokkor baxx fid-demm jew doża eċċessiva hafifa ta' insulina. Erga' ċċekkja z-zokkor fid-demm tiegħek wara 15-20 min sakemm iz-zokkor fid-demm jistabilizza.

Jekk inti ma tistax titratta lilek innifsek (ipoglicemija severa) minhabba li tħossok wisq stordut/a, dgħajjef/fa, konfuż/a, għandek diffikultà biex titkellem, tintilef minn sensik jew ittik aċċessjoni inti tista' tkun tehtiegħ tigi ttrattat/a bil-glukagon. Dan jista' jingħata minn xi hadd li jkun jaf jużah. Hu l-glukożju jew iz-zokkor wara l-glukagon. Jekk il-glukagon ma jaħdimx, inti se jkollok tmur l-isptar jew iċċempel is-servizzi tal-emergenza. Staqsi lit-tabib tiegħek biex jgħidlek dwar il-glukagon.

Għid lil kull min tqatta' ħin miegħu/magħha li inti għandek id-dijabete. Għidilhom x'jista' jigi jekk iz-zokkor fid-demm tiegħek jibaxxa wisq, inkluż ir-riskju li tintilef minn sensik. Avżhom li jekk tintilef minn sensik, huma għandhom idawruk fuq ġenbek biex tevita li tifga, igibu għajnuma medika minnufih u biex ma jagħuk l-ebda ikel jew xorb minhabba li tista' tifga.

Jekk tinsa tuża Lyumjev

Jekkk tinsa tuża l-insulina tiegħek jew jekk inti tuża anqas milli suppost, jew m'intix ċert/a kemm injettajt, iz-zokkor fid-demm tiegħek jista' jkun għoli wisq (iperglicemija). Iċċekkja l-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek biex tiddeċiedi hemmx bżonn doża tal-insulina. Kompli bl-iskeda tal-għoti tad-doża tas-soltu waqt l-ikla li jmiss.

Jekk tieqaf tuża Lyumjev

Twaqqafx jew tiddilx l-insulina tiegħek ħlief jekk jgħidlek tagħmel dan it-tabib tiegħek. Jekk inti tuża inqas Lyumjev milli suppost, jista' jseħh livell għoli ta' zokkor fid-demm.

Jekk iz-zokkor għoli fid-demm (iperglicemija) ma jiġix trattat jista' jkun serju ħafna u jikkawża uġiħ ta' ras, nawsja, rimettar, uġiħ fl-addome, deidratazzjoni, telf ta' koxjenza, koma jew anke mewt (ara sezzjoni 4).

Tliet affarijiet sempliċi biex tevita ipoglicemija jew iperglicemija huma:

- Dejjem żomm pinna żejda, f'każ li inti titlef il-Lyumjev 200 unità/ml KwikPen jew jiġrilha l-ħsara.
- Dejjem żomm xi haġa fuqek biex turi li inti dijabetiku/a.
- Dejjem żomm iz-zokkor fuqek.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' din il-medicina, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

4. Effetti sekondarji possibbli

Bhal kull medicina oħra, din il-medicina tista' tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f'kulhadd.

Zokkor baxx fid-demm (ipoglicemija) huwa komuni ħafna bit-trattament tal-insulina (jista' jaffettwa aktar minn persuna 1 minn kull 10). Hija tista' tkun serja ħafna. Jekk il-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek jinżel wisq inti tista' tintilef minn sensik. Ipoglicemija serja tista' tikkawża ħsara fil-moħħ u tista' tkun ta' periklu għall-ħajja. Jekk inti għandek sintomi ta' zokkor baxx fid-demm, hu azzjoni **immedjatment** biex iżżid il-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek. Ara sezzjoni 3 taht 'Jekk tuża aktar Lyumjev milli suppost'.

Reazzjonijiet allergiċi huma komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 10). Huma jistgħu jkunu severi u jistgħu jinkludu s-sintomi li ġejjin:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| • raxx u ħakk mal-ġisem kollu | • tinżel il-persjoni |
| • diffikultà biex tieħu n-nifs | • qalb tħabbat tgħaġġel |
| • tħarhir | • ħruġ ta' għaraq |

Jekk ikollok reazzjoni allergika serja (inkluż attakk anafilattiku) għall-insulina jew għal kwalunkwe sustanza f'Lyumjev, ieqaf uża din il-medicina u kkuntattja s-servizzi mediċi tal-emergenza minnufih.

Effetti sekundarji ohra jinkludu:

Komuni (jistghu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 10)

Reazzjonijiet fil-post tal-injezzjoni. Xi persuni jkollhom ħmura, uġiġħ, nefħa jew ħakk madwar il-post tal-injezzjoni tal-insulina. Dan is-soltu jgħaddi fi ftit minuti sa ftit ġimgħat mingħajr ma tkun teħtieġ twaqqaf Lyumjev. Jekk inti jkollok reazzjonijiet fil-post tal-injezzjoni, għid lit-tabib tiegħek.

Mhux komuni (jistghu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 100)

Bidliet fil-ġilda fis-sit tal-injezzjoni: Jekk tinjetta insulina wisq ta' spiss fl-istess post, it-tessut xahmi jista' jew jiċkien (lipoatrofija) jew jiħxien (lipoipertrofija). Boċċi taħt il-ġilda jistghu jiġu kkawżati wkoll minn akkumulazzjoni ta' proteina msejja amilojdi (amilojdozi tal-ġilda). L-insulina tista' ma taħdimx tajjeb ħafna jekk tinjetta f'żona bil-boċċi. Ibdel is-sit tal-injezzjoni ma' kull injezzjoni biex tgħin fil-prevenzjoni ta' dawn il-bidliet fil-ġilda.

Effetti sekundarji ohra li jistghu jseħhu

Nefħa fid-dirgħajn jew fl-għekiesi minħabba żamma tal-fluwidu (edima), b'mod partikolari fil-bidu tat-terapija bl-insulina jew matul bidla fil-medicini tad-dijabete tiegħek.

Rappurtar tal-effetti sekundarji

Jekk ikollok xi effett sekundarju, kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekundarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Tista' wkoll tirrapporta effetti sekundarji direttament permezz [tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali](#) mniżżla f'[Appendiċi V](#). Billi tirrapporta l-effetti sekundarji tista' tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta' din il-medicina.

Problemi komuni tad-dijabete

Zokkor baxx fid-demm

Zokkor baxx fid-demm (ipoglicemija) ifisser li m'hemmx biżżejjed zokkor fid-demm. Dan jista' jiġi kkawżat jekk:

- inti tiehu wisq Lyumjev jew insulina ohra;
- inti taqbez ikliet jew iddum ma tiekol jew tibdel id-dieta tiegħek;
- inti tagħmel eżerċizzju jew tagħmel xogħol iebes eżatt qabel jew wara ikla;
- inti għandek infezzjoni jew mard (speċjalment dijarea jew rimettar);
- hemm bidla fil-bżonn tal-insulina tiegħek per eżempju jekk titlef il-piż; jew
- inti għandek problemi bil-kliewi jew bil-fwied li jmorru għall-aġġar.

Ara s-sezzjoni 'Jekk tuża Lyumjev aktar milli suppost'.

L-ewwel sintomi ta' zokkor baxx fid-demm is-soltu jiġu malajr u jinkludu dan li ġej:

- għeja
- qalb tħabbat b'mod mgħaġġel
- nervi jew roġħda
- tħossok imdardar
- uġiġħ ta' ras
- għaraq kiesaħ

Jekk m'intix kunfidenti li tagħraf is-sintomi ta' twissija tiegħek, evita sitwazzjonijiet bħal issuq karozza, li fihom inti jew persuni ohra jitpoġġew f'periklu minħabba ipoglicemija.

Zokkor għoli fid-demm (iperglicemija) u ketoacidozi tad-dijabete

Iperglicemija (wisq zokkor fid-demm) tfisser li l-livelli tal-glucose fil-ġisem tiegħek huma għoljin wisq. Iperglicemija tista' tiġi minħabba:

- li inti ma tihux l-insulina tiegħek;
- tuża inqas insulina minn kemm jeħtieġ il-ġisem tiegħek;

- żbilanċ bejn l-ammont ta' karboidrati li tiekol u l-ammont ta' insulina li tiehu; jew
- deni, infezzjoni jew stress emozzjonali.

Is-sintomi bikrija ta' iperglicemija huma:

- tkun bil-ghatx hafna
- uġiġh ta' ras
- thossok bi nġhas
- tagħmel awrina aktar spiss

L-iperglicemija tista' twassal għall-ketoacidożi tad-dijabete. L-ewwel sintomi jiġu bil-mod fuq perjodu ta' hafna sigħat jew jiem. Sintomi addizzjonali jinkludu li ġejjin:

- nawsja u/jew rimettar
- uġiġh fl-addome
- polz mġhaġġel
- tiehu nifs fil-fond
- ammonti moderati jew kbar ta' ketoni fl-awrina. Il-ketoni jiġu magħmula meta l-ġisem tiegħek jahraq ix-xaħam għall-enerġija minflok il-glucose.

Jekk għandek kwalunkwe minn dawn is-sintomi u zokkor għoli **ġib għajnuna medika minnufih**. Ara s-sezzjoni 'Jekk tinsa'tuża Lyumjev'.

Mard

Jekk inti ma tiflaħx, speċjalment jekk qed thossok imdardar jew qed tirremetti, l-ammont ta' insulina li inti għandek bżonn jista' jinbidel. **Anke meta inti ma tkunx qed tiekol b'mod normali, inti xorta jkollok bżonn l-insulina.** Ittestja l-awrina jew id-dem, segwi 'r-regoli ta' meta tkun ma tiflaħx', u għid lit-tabib tiegħek.

5. Kif taħżen Lyumjev 200 unità/ml KwikPen

Żomm din il-medicina fejn ma' tintlaħaqx u ma tidhirx mit-tfal.

Tużax din il-medicina wara d-data ta' meta tiskadi li tidher fuq it-tikketta u l-kartuna. Id-data ta' meta tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta' dak ix-xaħar.

Żomm fil-kartuna ta' barra sabiex tilqa' mid-dawl.

Qabel l-ewwel użu

Aħżen fi frigġ (2 °C – 8 °C).

Tagħmlux fil-friża.

Wara l-ewwel użu

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 30 °C.

Tagħmlux fil-friża.

Tagħmlux fil-frigġ.

Il-Lyumjev 200 unità/ml KwikPen m'għandhiex tinħażen bil-labra mwahħla. Żomm l-għatu tal-pinna fuq il-pinna sabiex tippoteġi mid-dawl.

Armiha wara 28 jum **anke jekk ikun għad fadal fiha xi soluzzjoni.**

Tarmix medicini mal-ilma tad-dranagġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispizjar tiegħek dwar kif għandek tarmi medicini li m'għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni ohra

X'fih Lyumjev 200 unità/ml KwikPen soluzzjoni għall-injezzjoni

- Is-sustanza attiva hija insulin lispro. Kull ml soluzzjoni fiha 200 unità ta' insulin lispro. Lyumjev 200 unità/ml KwikPen waħda fiha 600 unità ta' insulin lispro f' soluzzjoni ta' 3 ml.
- Is-sustanzi l-oħra huma metacresol, glycerol, magnesium chloride hexahydrate, sodium citrate dihydrate, treprostini sodium, zinc oxide, ilma għall-injezzjonijiet. Sodium hydroxide jew hydrochloric acid setgħu intużaw biex jaġġustaw il-pH (ara t-tmiem ta' sezzjoni 2 taħt 'Lyumjev 200 units/ml KwikPen fih sodium').

Kif jidher Lyumjev 200 unità/ml KwikPen u l-kontenut tal-pakkett

Lyumjev 200 unità/ml KwikPen soluzzjoni għall-injezzjoni hija soluzzjoni ċara, bla kulur, akweja f'pinna mimlija għal-lest.

Kull pinna mimlija għal-lest fiha 600 unità (3 millilitri).

Daqsijiet tal-pakkett ta' 2 jew 5 jew pakkett b'ħafna ta' 10 (2 x 5) pinen mimlija għal-lest.

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkun fis-suq.

Il-Lyumjev 200 unità/ml KwikPen hija griża bil-kannella (taupe). Il-buttuna tad-doża hija griża bil-kannella (taupe) bil-ħnieq imqabbża mal-ġenb. It-tikketta hija bajda b'biċċa solida blu u disinn checkerboard. Fuq il-kartuna u t-tikketta l-qawwa tal-insulina hija mmarkata b'kaxxa bi sfond isfar biex tiġbed l-attenzjoni.

It-tikketta safra ta' twissija fuq il-kontenitur tal-iskartoċċ tfakkrek biex "Uża biss f'din il-pinna, inkella tista' sseħħ doża eċċessiva severa."

Kull Lyumjev 200 unità/ml KwikPen tagħti minn unità 1 sa 60 unità f'żidiet ta' unità 1 f'injezzjoni waħda.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq

Eli Lilly Nederland B.V.
Papendorpseweg 83
3528 BJ Utrecht
L-Olanda.

Manifattur

Lilly France
Rue du Colonel Lilly
67640 Fegersheim
Franza.

Għal kull tagħrif dwar din il-medicina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq:

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.
Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Lietuva
Tel: +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България
Тел.: + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.
Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.
Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.
Tel.: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S
Tlf.: +45 45 26 6000

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH
Tel: + 49-(0) 6172 273 2222

Eesti

Eli Lilly Nederland B.V.
Tel: +372 6817 280

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
Τηλ: +30 210 629 4600

España

Dista S.A.
Tel: + 34-91 663 50 00

France

Lilly France
Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.
Tel: +385 1 2350 999

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited
Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Ísland

Icepharma hf.
Sími: + 354 540 8000

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.
Tel: + 39- 055 42571

Κύπρος

Phadisco Ltd
Τηλ: +357 22 715000

Latvija

Eli Lilly (Suisse) S.A Pārštāvniecība Latvijā
Tel: +371 67364000

Malta

Charles de Giorgio Ltd.
Tel: + 356 25600 500

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.
Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Norge

Eli Lilly Norge A.S.
Tlf: + 47 22 88 18 00

Österreich

Eli Lilly Ges. m.b.H.
Tel: + 43-(0) 1 711 780

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 440 33 00

Portugal

Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda
Tel: + 351-21-4126600

România

Eli Lilly România S.R.L.
Tel: + 40 21 4023000

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.
Tel: +386 (0) 1 580 00 10

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia s.r.o.
Tel: + 421 220 663 111

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab
Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Sverige

Eli Lilly Sweden AB
Tel: + 46-(0) 8 7378800

Dan il-fuljett kien rivedut l-ahhar f'

Sorsi ohra ta' informazzjoni

Informazzjoni dettaljata dwar din il-medicina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Medicini: <https://www.ema.europa.eu>.

Instruzzjonijiet dwar l-Użu

Lyumjev 200 unità/mL KwikPen soluzzjoni għall-injezzjoni f'pinna mimlija għal-lest insulin lispro



JEKK JOGĦĠBOK AQRA DAWN L-ISTRUZZJONIJIET QABEL L-UŻU



Aqra l-istruzzjonijiet dwar l-użu qabel tibda tiegħu Lyumjev u kull darba li inti għiib Lyumjev KwikPen għdida. Jista' jkun hemm informazzjoni għdida. Din l-informazzjoni ma tiħux post li inti titkellem mal-professjonist tiegħek fil-qasam tal-kura tas-saħħa dwar il-kundizzjoni medika tiegħek jew it-trattament tiegħek.

Issellifx il-Lyumjev KwikPen lil persuni ohra, anke jekk tkun inbidlet il-labra. Terġax tuża labar użati jew issellef il-labar tiegħek lil persuni ohra. Inti tista' tagħtiom infezzjoni serja jew inti tista' tiegħu infezzjoni serja minghandhom.

Lyumjev 200 unità/mL KwikPen ("Pinna") hija pinna mimlija għal-lest li tintrema wara li tintuża li fiha 3 mL (600 unità, 200 unità/mL) ta' soluzzjoni ta' insulin lispro għall-injezzjoni.


- Il-professjonist fil-qasam tal-kura tas-saħħa tiegħek se jgħidlek kemm-il unità għandek tagħti bħala d-doża tiegħek u kif għandek tinjetta d-doża tal-insulina ordnata lilek.
- Inti tista' tagħti lilek innifsek aktar minn doża waħda mill-Pinna.
- Kull dawra tal-buttuna tagħti unità 1 ta' insulina. Inti tista' tagħti minn unità 1 sa 60 unità f'injezzjoni waħda.
- Jekk id-doża tiegħek hija aktar minn 60 unità, inti se jkollok bżonn tagħti lilek innifsek aktar minn injezzjoni waħda. Dejjem għandek tiċċekkja n-numru fit-tieqa tad-doża biex taċċerta ruħek li inti tkun dawwart id-doża t-tajba.
- Il-planger jiċċaqtaq ftit biss ma' kull injezzjoni u jista' jkun li inti ma tinnutax li jiċċaqtaq. Il-planger jilhaq it-tarf tal-iskartoċċ biss meta inti tkun użajt it-300 unità kollha li fiha l-Pinna.

Din il-Pinna hija mfassal biex tkun tista' tagħtik aktar dozi minn pinen ohra li inti stajt użajt fil-passat. Dawwar id-doża tas-soltu tiegħek kif qallek il-professjonist tal-kura tas-saħħa tiegħek.


Lyumjev KwikPen hija diponibbli f'żewġ qawwiet, 100 unità/mL u 200 unità/mL. Injetta Lyumjev 200 unità/mL biss bil-Pinna tiegħek. Titrasferixxix insulina mill-Pinna tiegħek għal apparat ieħor li jagħti l-insulina. Siringi u pompi tal-insulina mhumieq se jkejlu 200 unità/mL ta' insulina kif suppost. Jista' jkun hemm doża eċċessiva severa li tikkawża zokkor baxx hafna fid-demm li jista' jpoġġilek haġtek f'periklu.

Persuni li huma għomja jew għandhom problemi bil-vista m'għandhomx jużaw il-Pinna minghajr l-għajjnuna ta' persuna mharrġa fl-użu tal-Pinna.

Partijiet ta' Lyumjev KwikPen



Partijiet tal-Labra tal-Pinna (Il-Labar Mhumieħ Inkluzi)



Buttuna tad-Doża

Kif tagħraf il-Lyumjev KwikPen tiegħek





- Kulur tal-pinna: Griż bil-Kannella (Taupe)
- Buttuna tad-doża: Griż bil-Kannella (Taupe), b'sinjali mqabbża mal-ġenb
- Tikketta: Bajda b'biċċa solida blu u disinn checkerboard. Twissija safra fuq il-kontenitur tal-iskartoċċ.

Affarijiet meħtieġa biex tagħti l-injezzjoni tiegħek

- Lyumjev KwikPen
- Labra kumpatibbli mal-KwikPen (huma rrakkomandati l-labar tal-Pinna BD [Becton, Dickinson and Company])
- Imselha jew garża

Kif tipprepara l-Pinna tiegħek


- Aħsel idejk bis-sapun u l-ilma.
- Iċċekkja l-pinna biex taċċerta ruħek li inti tkun qed tieħu t-tip ta' insulina it-tajba. Dan huwa importanti b'mod speċjali jekk inti tuża aktar minn tip wieħed ta' insulina.
- **Tużax** il-Pinna tiegħek wara d-data ta' meta tiskadi li hemm stampata fuq it-tikketta label jew għal aktar minn 28 wara li inti tibda tuża l-Pinna għall-ewwel darba.
- Dejjem uża **labra ġdida** għal kull injezzjoni biex tevita infezzjonijiet u labar misdudin



Pass 1: - Iġbed l-għatu tal-Pinna dritt 'il barra. Tnehhix it-tikketta tal-Pinna. - Imsaħ is-sigill tal-gomma bl-imselha.	 UŻA BISS F'DIN IL-PINNA, INKELLA TISTA' SSEMM DOŻA EĊĊESSIVA SEVERA
Pass 2: - Iċċekkja l-likwidu fil-Pinna. - Lyumjev għandu jidher ċar u bla kulur. Tużahx jekk ikun imdardar, ikkulurit, jew ikun fih frak jew ċapep.	
Pass 3: - Aghżel labra ġdida. - Iġbed it-tikketta tal-karti minn mal-protezzjoni ta' barra tal-labra.	
Pass 4: Imbotta l-labra li għadha bl-għatu dritt fuq il-Pinna u dawwar il-labra sakemm tissikka.	
Pass 5: - Aqla' l-protezzjoni ta' barra tal-labra billi tiġbidha. Tarmihix. - Aqla' l-protezzjoni ta' ġewwa tal-labra billi tiġbidha u armiha.	 Keep Throw Away

Kif tippompja l-pinna

Ippompja qabel kull injezzjoni.

- Tippompja l-Pinna tiegħek ifisser li tneħhi l-arja mil-labra u mill-iskartoċċ li tista' tingabar matul l-użu normali tal-pinna u jiġi aċċertat li l-Pinna tiegħek tkun qegħda taħdem sew.
- Jekk inti **ma tippompjax** qabel kull injezzjoni, inti tista' tirċievi wisq jew ftit wisq insulina.

Pass 6: Biex tippompja l-Pinna tiegħek aghżel 2 unitajiet.	
--	---



Pass 7: • Żomm il-Pinna tiegħek bil-labra thares 'il fuq. Tektek bil-mod il-kontenitur tal-istkartoċċ biex tiġbor il-bżiežaq tal-arja n-naħa ta' fuq.	
Pass 8: • Komplil żomm il-Pinna bil-labra thares 'il fuq. Dawwar il-buttuna tad-doża sakemm tieqaf u jidher “0” fit-tieqa tad-doża. Żomm il-buttuna tad-doża 'l ġewwa u ghodd sal-5 bil-mod. Inti għandek tara l-insulina fit-tarf tal-labra. – Jekk inti ma tarax insulina, irrepeti l-passi 6 sa 8 tal-ippumpjar, iżda mhux għal aktar minn 8 darbiet. – Jekk tibqa' ma tarax insulina, biddel il-labra u rrepeti l-passi 6 sa 8 tal-ippumpjar. Bżiežaq żgħar tal-arja huma normali u mhumiex se jaffettwaw id-doża tiegħek.	 

Kif tagħzel id-doża tiegħek


- Tista' tagħti minn unità waħda sa 60 unità f'injezzjoni waħda.
- Jekk id-doża tiegħek hija iżjed minn 60 unità, inti jkollok bżonn tagħti iżjed minn injezzjoni waħda.
 - Jekk għandek bżonn l-ghajnuna sabiex tiddeċiedi kif għandek taqsam id-doża tiegħek, staqsi lill-professionist tiegħek tal-kura tas-saħħa.
 - Għandek tuża labra ġdida għal kull injezzjoni u tirrepeti l-passi tal-ippumpjar.

Pass 9:

- Dawwar il-buttuna tad-doża biex tagħzel in-numru ta' unitajiet li inti teħtieġ tinjetta. L-indikatur tad-doża għandu jiġi bi dritt id-doża tiegħek.
 - Il-Pinna ddawwar unità waħda kull darba.
 - Il-buttuna tad-doża tagħmel klikk meta ddawwarha.
 - **Iddawwarx** id-doża tiegħek billi tgħodd in-numru ta' klikks. Tista' ddawwar id-doża l-ħażina. Dan jista' jwassal biex inti tieħu wisq insulina jew ma tihux biżżejjed insulina.
 - Id-doża tista' tiġi kkoreġuta billi ddawwar il-buttuna fi kwalunkwe direzzjoni sakemm id-doża korretta tiġi bi dritt l-indikatur tad-doża.
 - In-numri **biż-żewġ** huma stampati fuq il-wiċċ li jdur. L-eżempju fuq il-lemin juri 12-il unità.
 - In-numri **bil-fard**, wara n-numru 1, qed jintwerew bħala linji sħaħ bejn in-numri. L-eżempju fuq in-naħa tal-lemin qed juri 25 unità.
- **Dejjem iċċekkja in-numru fit-tieqa tad-doża biex taċċerta ruħek li inti dawwart id-doża t-tajba.**



Eżempju: 12-il unità murija fit-tieqa tad-doża






Eżempju: 25 unità murija fit-tieqa tad-doża

- Il-Pinna ma thallikx iddawwar aktar min-numru ta' unitajiet li jkun għad-fadal fil-Pinna.
 - Jekk għandek bżonn tinjetta aktar min-numru ta' unitajiet li għad fadal fil-Pinna, inti tista' jew:
 - tinjetta l-ammont li jkun għad fadal fil-Pinna mbagħad tuża Pinna ġdida biex tagħti l-bqija tad-doża tiegħek,
- jew**
- iġġib Pinna ġdida u tinjetta d-doża kollha.
 - Huwa normali li tara ammont żgħir ta' insulina li tibqa' fil-Pinna u li inti ma tkunx tista' tinjetta. **Titttrasferix dan go siringa. Tista' ssehh doża eċċessiva severa.**



Kif tagħti l-injezzjoni tiegħek

- Injetta l-insulina tiegħek kif uriek il-professjonist tiegħek tal-kura tas-saħħa.
- Ibdel il-post tal-injezzjoni tiegħek għal kull injezzjoni.
- **Tippruvax** tibdel id-doża tiegħek waqt li tkun qed tinjetta.

Pass 10: - Aghżel il-post tal-injezzjoni tiegħek. Lyumjev jiġi injettat taħt il-ġilda fiż-żona tal-istonku, fil-warrani, fin-naħa ta' fuq tar-rigél jew fin-naħa ta' fuq tad-driegħ. - Imsaħ il-ġilda tiegħek b'imselha, u halli l-ġilda tiegħek tinxfef qabel tinjetta d-doża.	
Pass 11: - Dahhal il-labra fil-ġilda tiegħek. - Aghfas il-buttuna tad-doża kollha kemm hi 'l ġewwa. - Kompli żomm il-buttuna tad-doża magħfusa 'l ġewwa u bil-mod għodd sal-5 qabel ma toħroġ il-labra.  Tippruvax tinjetta l-insulina tiegħek billi ddawwar il-buttuna tad-doża. M'intix se tirċievi l-insulina billi ddawwar il-buttuna tad-doża.	


Pass 12: - Iġbed il-labra 'l barra minn ġol-ġilda tiegħek. - Qatra insulina fit-tarf tal-labra hija normali. Hija mhijiex se taffettwalek id-doża. - Iċċekkja n-numru fit-tieqa tad-doża. - Jekk tara “0” fit-tieqa tad-doża, inti tkun irċivejt l-ammont kollu li tkun dawwart. - Jekk ma tarax “0” fit-tieqa tad-doża, inti ma tkunx irċivejt id-doża kollha tiegħek. Trerġax iddawwar. Dahhal il-labra fil-ġilda u spiċċa l-injezzjoni. - Jekk xorta taħseb li inti ma rċivejtx l-ammont kollu li inti dawwart għall-injezzjoni tiegħek, terġax tibda mill-bidu u tirrepetix dik l-injezzjoni. Immonitorja l-glukożju fid-demm kif spjegat mill-professionist tiegħek tal-kura tas-saħħa. - Jekk is-soltu inti jkollok bżonn tagħti 2 injezzjonijiet għad-doża shiħa tiegħek, kun ċert/a li tagħti t-tieni injezzjoni. Il-planger jiċċaqlaq ffit biss ma' kull injezzjoni u jista' jkun li inti ma tinnutax li jiċċaqlaq. Jekk tara d-demm wara li inti tkun ġbidt il-labra 'l barra minn ġol-ġilda tiegħek, aghfas il-post tal-injezzjoni b'mod ħafif b'biċċa garża jew imselha. Togħorokx iż-żona.	
---	---

Wara l-injezzjoni tiegħek

Pass 13: B'attenzjoni poġġi lura l-protezzjoni ta' barra tal-labra.	
Pass 14: - Holl il-labra mġhottija u armiha kif deskritt hawn taht (ara s-sezzjoni “Kif tarmi l-Pinen u l-labar”). Tahżinx il-Pinna bil-labra mwahhla magħha biex tevita li tqattar, li l-labra tistadd, u li tidhol l-arja fil-Pinna.	

Pass 15:

- Poġġi lura l-għatu tal-Pinna billi tpoġġi l-klipp tal-pinna bi dritt l-idikatur tad-doża u timbotta dritt 'il ġewwa.

**Kif tarmi l-Pinen u l-labar**

- Poġġi l-labar użati f'kontenitur għal oġġetti li jaqtgħu jew bil-ponta jew f'kontenitur ta' plastik iebes b'għatu sikur. **Tarmix** il-labar direttament fl-iskart domestiku tiegħek.
- **Tirriċiklax** il-kontenitur għal oġġetti li jaqtgħu jew bil-ponta meta jimtela.
- Staqsi lill-professjonist tiegħek tal-kura tas-saħħa dwar l-għażliet biex tarmi kif suppost il-Pinna u l-kontenitur għal oġġetti li jaqtgħu jew bil-ponta.
- L-istruzzjonijiet dwar l-immaniġġjar tal-labar mhumiex maħsuba li jiehdu post ir-regoli lokali, tal-professjonisti tal-kura tas-saħħa jew istituzzjonali.

Kif tagħraf u ssolvi xi problemi fil-Pinna

- Jekk ma tkunx tista' tneħhi l-għatu tal-Pinna, dawwar bil-mod l-għatu 'l quddiem u lura, imbagħad iġbdu dritt 'il barra.
- Jekk il-buttuna tad-doża hija iebisa biex tagħfasha:
 - li tagħfas il-buttuna tad-doża aktar bil-mod se jagħmilha aktar faċli biex tinjetta.
 - il-labra tiegħek tista' tkun misduda. Poġġi labra ġdida u ppompja l-Pinna.
 - inti jista' jkollok trab, ikel jew likwidu ġol-Pinna. Armi l-Pinna u ġib Pinna ġdida.

Jekk għandek xi mistoqsijiet jew problemi Lyumjev 200 unità/mL KwikPen, ikkuntattja l-professjonist tiegħek tal-kura tas-saħħa għall-għajnuna jew ikkuntattja r-rappreżentant lokali ta' Lilly

Data ta' Reviżjoni tad-Dokument: