

ANNESS I

KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT FIL-QOSOR

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Spironolactone Ceva 10 mg pilloli għal klieb
Spironolactone Ceva 40 mg pilloli għal klieb
Spironolactone Ceva 80 mg pilloli għal klieb

2. KOMPOŻIZZJONI KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Sustanza attiva:

Spironolactone Ceva 10 mg fih 10 mg spironolakton
Spironolactone Ceva 40 mg fih 40 mg spironolakton
Spironolactone Ceva 80 mg fih 80 mg spironolakton

Għal-lista shiha tas-sustanzi (mhux attivi), ara s-sezzjoni 6.1.

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola.

Spironolactone Ceva 10 mg: Pillola ovali kannellamxaqqa li tnejn twila 10 mm
Spironolactone Ceva 40 mg: Pillola ovali kannella, mxaqqa fi tnejn twila 17 mm
Spironolactone Ceva 80 mg: Pillola ovali kannella mxaqqa f'ingħa twila 20 mm.

4. TAGHRIF KLINIKU

4.1 Speċi li fuqhom ser jintuża l-prodott

Klieb.

4.2 Indikazzjonijiet għal użu tal-prodott li jispeċifikaw l-ispeċi li fuqhom se jintuża l-prodott

Għal użu f'kombinazzjoni ma' terapija standard, (li jinkludi appoġġ diuretiku, meta mehtieg) għat-trattament ta' falliment tal-qalb kongestiv ikkagunat minn rigurġitazzjoni valvulari fil-klieb.

4.3 Kontra indikazzjonijiet

Tużax fi klieb li jsuf u minn ipoadrenokorticiżmu, iperkalemija jew iponatremija.
Tużax flimkien ma' Mediċini Antinfjammatorji Mhux Sterojdi (NSAIDs) fuq klieb b'insuffiċjenza renali (indeboliment/funzjoni hażin tal-kliwi).
Tużax waqt it-tqala jew treddigh.
Tużax f'animali li jintużaw għal, jew huma intenzjonati biex jintużaw għat-trobbija

4.4 Twissijiet speċjali għal kull speċi li għaliha hu indikat il-prodott

Xejn

4.5 Prekawzjonijiet Speċjali għall-Użu

Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-animali

Il-funzjoni tal-kliwi u l-livelli ta' potassjum fis-sirum għandhom ikunu evalwati qabel jinbeda trattament ikkombinat bi spironolakton u impedituri tal-Enzima li Tikkonverti Angiotensin (ACE).

Incidenza akbar ta' iperkalemija ma kinitx osservata fi provi klinici magħmulin fuq klieb b'din il-kombinazzjoni, mhux b'hal fil-bnedmin. Madankollu, fil-klieb b'indeboliment fil-kliewi monitoraġġ regolari fuq il-funzjoni tal-kliewi u l-livelli ta' potassju fis-serum huwa rakkomandat peress li jista' jkun hemm riskju oghla ta' iperkalemija.

Klieb ittrattati bi Spironolakton u NSAIDS flimkien għandhom jiġu idratati korrettament. Sorveljanza tal-funzjoni renali tagħhom u l-livelli tal-potassjum fil-plażma hija rakkomandata qabel il-bidu u waqt it-trattament b'terapija kkombinata (ara sezzjoni 4.3).

Peress li spironolakton għandu effett anti-androgeniku, mhuwiex rakkomandat li tamministra l-prodott mediċinali veterinarju lill-klieb li jkunu għadhom qed jikbru.

Peress li spironolakton ikollu bijotrasformazzjoni epatika estensiva (fwied), attenzjoni għandha tinghata meta l-prodott mediċinali veterinarju jintuza fi klieb bi problemi tal-fwied.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittiehdu mill-persuna li tamministra l-prodott mediċinali veterinarju lill-annimali

Jista' jikkaguna sensibilità fil-ġilda: persuni li huma magħrufin li huma allergici għal spiro lactone m'għandhomx jmissu dan il-prodott.

Aħsel idejx sew wara l-użu.

F'każ ta' ingestjoni aċċidentali, fittex parir mediku minnufih u uri l-funzjoni tal-pakkett jew it-tikketta lit-tabib.

4.6 Effetti mhux mixtieqa (frekwenza u gravità)

Atrofija prostatika riversibbli ta' spiss tiġi osservata fi klieb irġiel shah.

4.7 Użu fit-tqala, fi żmien il-halib u meta jbidu l-bajd

Tużax meta l-annimali jkunu tqal jew waqt it-tred diegħ. Studji fil-laboratorju fi speċijiet (far, ġurdien, fenek u xadina) urew evidenza ta' żvilupp ta' tossiċità.

4.8 Effetti fuq prodotti mediċinali oħra jew effetti oħra

Furosemide u pimobenden intużaw flimkien bi Spironolactone Ceva fi klieb b'falliment kardijaku mingħajr evidenza klinika ta' reazzjonijiet avversi.

Spironolakton inaqqas l-eliminazzjoni ta' digoxin u b'hekk jgħolli l-koncentrazzjoni tad-digoxin fil-plażma. Peress li l-indiċi terapewtiku għad-digoxin huwa dejjaq hafna, huwa rakkomandat li tissorvelja mill-qrib klieb li qed jinghataw kemm digoxin u kemm spironolakton.

L-amministrazzjoni jew ta' deoxycorticosterone jew ta' NSAIDs ma' spironolakton tista' twassal għal tnaqqis moderat fl-effetti natrijuretici (tnaqqis ta' l-eliminazzjoni tas-sodjum fl-awrina) ta' spironolactone.

Amministrazzjoni konkomitanti ta' spironolakton ma' impedituri-ACE u mediċini li ma jahlux il-potassjum (b'hal imblokkaturi tar-riċetturi ta' angjotensin, imblokkaturi-β, imblokkaturi tal-kanali tal-kalċju, eċc.) jistgħu potenzjalment iwasslu għal iperkalemija (ara sezzjoni 4.5).

Spironolakton jista' jikkaguna kemm induzzjoni kif ukoll impediment ta' l-eżimi ċitokromi P450 u għaldaqstant jista' jaffettwa l-metabolizmu ta' mediċini oħra li jutilizzaw dawn il-mogħdijiet metabolici.

4.9 Doża rakkomandata u l-metodu ta' amministrazzjoni

Jittiehed mill-halq.

Agħti 2 mg/kg ta' piż korporali ta' spironolakton darba kuljum. Il-prodott mediċinali veterinarju għandu jiġi mogħti ma' l-ikel. Il-pillola tista' jew tithallat b'ammont żgħir ta' ikel qabel l-ikla prinċipali jew tingħata direttament għal-halq wara l-ikel. Il-pilloli fihom it-togħma taċ-ċanga sabiex jitjieb il-palat tagħom, u fi studju li sar fuq klieb b'saħħithom intwera li kienu konsumati b'mod volontarju u shih f'75% tal-hin.

PIŻ TAL-ĠISEM	Numru ta' pilloli		
	Spironolactone Ceva 10 mg	Spironolactone Ceva 40 mg	Spironolactone Ceva 80 mg
1 sa 2.5 kg	½		
2.5 sa 5 kg	1		
5 sa 10 kg	2		
10 sa 15 kg	3		
15 sa 20 kg		1	
20 sa 30 kg		1 + ½	
30 sa 40 kg			1
40 sa 50 kg			1 + ¼
50 sa 60 kg			1 + ½

4.10 Doża Eċċessiva (sintomi, proċeduri ta' emerġenza, antidoti), jekk neċessarji

Wara l-ghoti sa 10 darbiet tad-doża rakkomandata (20 mg/kg) lil klieb f'saħħithom, effetti avversi dipendenti fuq id-doża kienu nnotati, ara sezzjoni 4.6.

F'każ ta' iġestjoni aċċidentali massiva minn kelb, ma hemm l-ebda antidotu jew trattament speċifiku. Għaldaqstant huwa rakkomandat li tindur u r-remettar, il-hasil tal-istonku (jiddependi fuq l-istima tar-riskju) u sorveljanza tal-elettroliti. Trattament simptomatiku, eż. terapija bil-fluwidi, għandu jkun ipprovdut.

4.11 Perjodu ta' Tiżmin

Mhux applikabbli.

5. KWALITAJIET FARMAKOLOĠIĊI

Grupp Farmako-terapewtiku: antagonista ta' aldosterone.
Kodiċi ATC veterinarja: QC03DA01.

5.1 Kwalitajiet Farmakodinamiċi

Spironolakton u l-metaboliti attivi tiegħu (li jinkludu 7 α -thiomethyl-Spironolakton u canrenone) jgħidmu bħala antagonisti speċifiċi ta' aldosterone u jeżerċitaw l-effetti tagħhom billi jorbtu kompetitivament mar-riċettur tal-mineralokortikojde li huwa lokalizzat fil-kliewi, il-qalb jew il-važi tad-demm.

Spironolakton huwa mediċina natrijuretika (storikament deskritt bħala diuretiku artab). Fil-kilwa Spironolakton jimpedixxi ż-żamma tas-sodjum indott minn aldosterone li jwassal għall-eliminazzjoni tas-sodjum u sussegwentement ta' l-ilma, u żamma ta' potassjum.

L-effetti renali ta' Spironolakton u l-metaboliti tiegħu jwasslu għal tnaqqis fil-volum ta' barra ċ-ċelloli u konsegwentement fi tnaqqis tat-tagħbija kardijaka ta' qabel u pressjoni fl-atriju tax-xellug. Ir-riżultat huwa tiġib fil-funzjoni tal-qalb.

Fis-sistema kardjovaskulari, Spironolakton jimpedixxi l-effetti detrimentali ta' aldosterone. Għalkemm il-mekkaniżmu ta' azzjoni preċiż s'issa mhuwiex mfisser b'mod ċar, aldosterone jippromwovi l-fibrozi mijokardijali, mudellar mijokardijali u vaskulari mill-ġdid u l-funzjoni hażina ta' l-endotilju. F'mudelli sperimentali fil-klieb, kien muri li terapija fuq tul ta' żmien ma' antagonist ta' aldosterone jimpedixxi l-funzjoni hażina progressiva tal-ventrikolu tax-xellug u jimmodera l-immudellar mill-ġdid tal-ventrikolu tax-xellug fi klieb b'falliment kroniku tal-qalb.

F'studju kliniku li investiga ż-żmien tas-sopravivenza fil-klieb b'insuffiċjenza kongestiva tal-qalb, kien hemm 65% tnaqqis fir-riskju relattiv ta' mortalità ta' 15-il xahar fi klieb ikkurati b' spironolactone ikkombinat ma' terapija standard meta mqabbla ma terapija standard waħidha. (Il mortalità kienet ikklasifikata bħala mewt jew ewtanasje minhabba falliment fil-qalb).

Meta intuża f'kombinazzjoni ma' impedituri-ACE, Spironolakton jista' jikkontrarja l-effetti ta' "harba ta' aldosterone".

Żieda żgħira fil-livelli ta' aldosterone fid-demmi jistgħu jkunu osservati f'annimali fuq trattament. Jista' jkun hemm ipertrofija taż-żona glomeruloża adrenalj relatata mad-doża. Din hija mahsuba li hija minhabba l-attivazzjoni ta' mekkaniżmi ta' feedback mingħajr konsegwenzi kliniċi avversi. Jista' jkun hemm ipertrofija relatata mad-doża taż-żona glomeruloża adrenalj f'rati ta' dozi għoljin.

5.2 Tagħrif Farmakokinetiċi

Il-farmakokinetiċi ta' Spironolakton huma bażzati fuq il-metaboliti tiegħu, peress li l-kompost ġenitur mhuwiex stabbli fl-assaġġ.

Assorbiment

Wara l-ghoti ta' Spironolakton mill-halq lil klieb, kien muri li t-tliet metaboliti kisbu livelli minn 32 sa 49% tad-doża amministrata. L-ikel iżid il-bijodisponibiltà minn 80 % sa 90%. Wara t-tehid mill-halq ta' 2 sa 4 mg/kg, l-assorbiment jidher b'mod lineari fuq il-medda. Wara dozi orali multipli ta' 2 mg spironolakton/ kg, għal 10 ijiem konskuttivi, ma kienet osservata l-ebda akkumulazzjoni. C_{max} medju ta' 382 µg/l u 94 µg/l jinkisbu għal metaboliti primarji, 7α-thiomethyl-Spironolakton u canrenone, wara 2 u 4 sigħat, rispettivament. Kundizzjonijiet ta' stat fiss huma miksuba sa jum 2.

Distribuzzjoni

Il-volumi medji ta' distribuzzjoni (V_{ss}) ta' 7α-thiomethyl-Spironolakton u canrenone huma madwar 153 litri u 177 litri rispettivament.

Il-hin ta' residenza medju tal-metaboliti jvarja minn 9 sa 14-il siegħa u huma preferenzjalment distribwiti lejn il-passaġġ gastrointestinali, kliwi, fwied u glandoli adrenalj.

Metaboliżmu

Spironolakton huwa metabolizzat malajr u kompletament mill-fwied għal metaboliti attivi tiegħu, 7α-thiomethyl-Spironolakton u canrenone, li huma l-metaboliti primarji fil-kelb.

Eliminazzjoni

Spironolakton huwa prinċipalment eliminat permezz tal-metaboliti tiegħu. Ir-rata ta' eliminazzjoni mill-plażma ta' canrenone hija ta' 1.45 ± 0.39 l/h/kg u ta' 7α-thiomethyl-Spironolakton hija ta' 0.87 ± 0.44 l/h/kg. Wara l-ghoti mill-halq ta' Spironolakton radjotikketat lill-kelb, 70 % tad-doża kienet rikoverata mill-ippurgar u 20 % mill-awrina.

6. TAGHRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta' sustanzi

Lactose monohydrate
Cellulose, microcrystalline
Crospovidone
Povidone K30
Artificial beef flavour
Compressible sugar
Magnesium stearate

6.2 Inkompatibilitajiet

Mhux Applikabbli.

6.3 Żmien ta' kemm il-prodott idum tajjeb

Żmien li l-prodott mediċinali veterinarju jista' jinżamm fuq l-ixkaffa ippakkjat għall-bejgħ: 3 snin.
Uża fi żmien xahrejn minn meta jinfetħ l-ewwel darba l-flixkun.

6.4 Taghrif speċjali dwar kif għandu jinħażen

Dan il-prodott mediċinali veterinarju m'għandux bżonn ta' tnebbja kundizzjoni speċjali sabiex jinħażen.
Pilloli parzjalment użati għandhom jinżammu fil-flixkun oriġinali.

6.5 In-natura u l-għamla ta' l-ewwel ippakkjar

Flixkun HDPE abjad, li fih 30 pillola b' għatu tal-kamin abjad tal-polypropylene reżistenti għat-tbagħbis mit-tfal u b' dessikant fih, ippakkjat go kaxxa tal-kartun.

Mhux id-daqsijiet kollha tal-pakkett jistgħu neqgħdin fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi ta' tal-prodotti mediċinali veterinarji mhux użata jew materjal ieħor għar-rimi li huwa derivat minn dawn il-prodotti

Mediċina veterinarja li ma għadx użata jew prodotti oħra li ntuzaw għal din il-mediċina għandhom jintremew skond kif titlob il-liġi tal-pajjiż.

7. L-ENTITÀ LI GĦANDHA L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Ceva Santé Animale
10, av. de La Balastière
33500 Libourne
Franza

8. NUMRU(I) TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU 2/07/074/007-009

9. DATA TA' L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI / TIĠDID TA' L-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 20 ta' Ġunju 2007

Data tal-aħħar tiġdid: 22 ta' Mejju 2012

10 DATA TA' META ĠIET RIVEDUTA DIN IL-KITBA

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediku veterinarju tinstab fuq il-websajt ta' l-Aġenzija Ewropea għall-Medicini (EMA) <http://www.ema.europa.eu/>.

PROJBIZZJONI TA' BEJGH, PROVISTA, U/JEW UŻU

Mhux Applikabbli.

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Spironolactone Ceva 10 mg pilloli għal klieb
Spironolactone Ceva 40 mg pilloli għal klieb
Spironolactone Ceva 80 mg pilloli għal klieb

2. KOMPOŻIZZJONI KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Sustanza attiva:

Spironolactone Ceva 10 mg fih 10 mg spironolakton
Spironolactone Ceva 40 mg fih 40 mg spironolakton
Spironolactone Ceva 80 mg fih 80 mg spironolakton

Għal-lista shiħa tas-sustanzi (mhux attivi), ara s-sezzjoni 6.1.

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola.

Spironolactone Ceva 10 mg: Pillola ovali bajda bi ftit tbajja' kannella, mxaqqa fi tnejn twila 10 mm
Spironolactone Ceva 40 mg: Pillola ovali bajda bi ftit tbajja' kannella, mxaqqa f'erbgħa twila 17 mm bi tliet linji paralleli ta' ksur
Spironolactone Ceva 80 mg: Pillola ovali bajda bi ftit tbajja' kannella, mxaqqa f'erbgħa twila 20 mm.

4. TAGHRIF KLINIKU

4.1 Speċi li fuqhom ser jintuża l-prodott

Klieb.

4.2 Indikazzjonijiet għal użu tal-prodott li jispeċifikaw l-ispeċi li fuqhom se jintuża l-prodott

Għal użu f'kombinazzjoni ma' terapija standard, (li jinkludi appoġġ diuretiku, meta mehtieg) għat-trattament ta' falliment tal-qalb kongestiv ikkaġunat minn rigurġitazzjoni valvulari fil-klieb.

4.3 Kontra indikazzjonijiet

Tużax fi klieb li jsof u minn ipoadrenokorticiżmu, iperkalemija jew iponatremija.
Tużax flimkien ma' Mediċini Antinfjammatorji Mhux Sterojdi (NSAIDs) fuq klieb b'insuffiċjenza renali (indeboliment/funzjoni hażin tal-kliwi).
Tużax waqt it-tqala jew treddigh.
Tużax f'annimali li jintużaw għal, jew huma intenzjonati biex jintużaw għat-trobbija

4.4 Twissarjiet speċjali għal kull speċi li għaliha hu indikat il-prodott

Xejn

4.5 Prekawzjonijiet Speċjali għall-Użu

Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-annimali

Il-funzjoni tal-kliwi u l-livelli ta' potassjum fis-sirum għandhom ikunu evalwati qabel jinbeda trattament ikkombinat bi spironolakton u impedituri tal-Enzima li Tikkonverti Angiotensin (ACE). Incidenza akbar ta' iperkalemija ma kinitx osservata fi provi kliniċi magħmulin fuq klieb b'din il-kombinazzjoni, mhux b'hal fil-bnedmin. Madankollu, fil-klieb b'indeboliment fil-kliwi monitoraġġ regolari fuq il-funzjoni tal-kliwi u l-livelli ta' potassju fis-serum huwa rakkomandat peress li jista' jkun hemm riskju oġġla ta' iperkalemija.

Klieb ittrattati bi Spironolakton u NSAIDS flimkien għandhom jiġu idratati korrettament. Sorveljanza tal-funzjoni renali tagħhom u l-livelli tal-potassjum fil-plażma hija rakkomandata qabel il-bidu u waqt it-trattament b'terapija kkombinata (ara sezzjoni 4.3).

Peress li spironolakton għandu effett anti-androgeniku, mhuwiex rakkomandat li tamministra l-prodott mediċinali veterinarju lill-klieb li jkunu għadhom qed jikbru.

Peress li spironolakton ikollu bijotrasformazzjoni epatika estensiva (fwied) attenzjoni għandha tingħata meta l-prodott mediċinali veterinarju jintuza fi klieb bi problemi tal-fwied.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittiehdu mill-persuna li tamministra l-prodott mediċinali veterinarju lill-annimali

Jista' jikkawna sensibiltà fil-ġilda: persuni li huma magħrufin li huma allergiċi għal spironolakton m'għandhomx jmissu dan il-prodott.

Aħsel idejk sew wara l-użu.

F'każ ta' ingestjoni aċċidentali, fittex parir mediku minnufih u uri l-fuljett tal-pakkett jew it-tikketta lit-tabib.

4.6 Effetti mhux mixtieqa (frekwenza u gravità)

Atrofija prostatika reversibbli ta' spiss tiġi osservata fi klieb irġiel shah.

4.6 Użu fit-tqala, fi żmien il-habib u meta jbidu l-bajd

Tużax meta l-annimali jkunu qal jew waqt it-treddeigh. Studji fil-laboratorju fi speċijiet (far, ġurdien, fenek u xadina) urew evidenza ta' żvilupp ta' tossiċità.

4.8 Effetti fuq prodotti mediċinali ohra jew effetti ohra

Furosemide u pimplenden intużaw flimkien bi Spironolakton Ceva fi klieb b'falliment kardijaku minghajr evidenza klinika ta' reazzjonijiet avversi.

Spironolakton inaqqas l-eliminazzjoni ta' digoxin u b'hekk jgħolli l-koncentrazzjoni tad-digoxin fil-plażma. Peress li l-indiċi terapewtiku għad-digoxin huwa dejjaq hafna, huwa rakkomandat li tissorvelja mill-qrib klieb li qed jingħataw kemm digoxin u kemm spironolakton.

L-amministrazzjoni jew ta' deoxycorticosterone jew ta' NSAIDs ma' spironolakton tista' twassal għal tnaqqis moderat fl-effetti natrijuretici (tnaqqis ta' l-eliminazzjoni tas-sodju fl-awrina) ta' spironolakton.

Amministrazzjoni konkomitanti ta' spironolakton ma' impedituri-ACE u mediċini li ma jahlux il-potassjum (b'hal imblokkaturi tar-riċetturi ta' angiotensin, imblokkaturi-β, imblokkaturi tal-kanali tal-kalċjum, eċc.) jistgħu potenzjalment iwasslu għal iperkalemija (ara sezzjoni 4.5).

Spironolakton jista' jikkaguna kemm induzzjoni kif ukollimpediment ta' l-enzimi citokromi P450 u għaldaqstant jista' jaffettwa l-metabolizmu ta' mediċini oħra li jutilizzaw dawn il-mogħdijet metabolici.

4.9 Doża rakkomandata u l-metodu ta' amministrazzjoni

Jittiehed mill-halq.

Agħti 2 mg/kg ta' piż korporali ta' spironolakton darba kuljum. Il-prodott mediċinali veterinarju għandu jiġi mogħti ma' l-ikel. Il-pillola tista' jew tithallat b'ammont żgħir ta' ikel qabel l-ikla prinċipali jew tingħata direttament għol-halq wara l-ikel.

PIŻ TAL-ĠISEM	Numru ta' pilloli		
	Spironolactone Ceva 10 mg	Spironolactone Ceva 40 mg	Spironolactone Ceva 80 mg
1 sa 2.5 kg	½		
2.5 sa 5 kg	1		
5 sa 10 kg	2		
10 sa 15 kg	3		
15 sa 20 kg		1	
20 sa 30 kg		1 + ½	
30 sa 40 kg			1
40 sa 50 kg			1 + ¼
50 sa 60 kg			1 + ½

4.10 Doża Eċċessiva (sintomi, proċeduri ta' emergenza, antidoti), jekk neċessarji

Wara l-ġħoti sa 10 darbiet tad-doża rakkomandata (20 mg/kg) lil klieb f'saħħithom, effetti avversi dipendenti fuq id-doża kienu rari, ara sezzjoni 4.6.

F'każ ta' ingestjoni aċċidentali massiva minn kelb, ma hemm l-ebda antidotu jew trattament speċifiku. Għaldaqstant huwa rakkomandat li tinduċi r-remettar, il-hasil tal-istonku (jiddependi fuq l-istima tar-riskju) u sorveljanza ta' elettroliti. Trattament simptomatiku, eż. terapija bil-fluwidi, għandu jkun ipprovdut.

4.11 Perjodu ta' Riżmim

Mhux applikabbli.

5. KWALITAJIET FARMAKOLOĠIĊI

Grupp Farmako-terapewtiku: antagonista ta' aldosterone.

Kodiċi ATC veterinarja: QC03DA01.

5.1 Kwalitajiet Farmakodinamiċi

Spironolakton u l-metaboliti attivi tiegħu (li jinkludu 7α-thiomethyl-Spironolakton u canrenone) jahdmu bħala antagonisti speċifiċi ta' aldosterone u jeżerċitaw l-effetti tagħhom billi jorbtu

kompetitivament mar-riċettur tal-mineralokortikoidje li huwa lokalizzat fil-kliewi, il-qalb jew il-vażi tad-demm.

Spironolakton huwa mediċina natrijuretika (storikament deskritt bħala diuretiku artab). Fil-kilwa Spironolakton jimpedixxi ż-żamma tas-sodjum indott minn aldosterone li jwassal għall-eliminazzjoni tas-sodjum u sussegwentement ta' l-ilma, u żamma ta' potassjum.

L-effetti renali ta' Spironolakton u l-metaboliti tiegħu jwasslu għal tnaqqis fil-volum ta' barra ċ-ċelloli u konsegwentement fi tnaqqis tat-tagħbija kardijaka ta' qabel u pressjoni fl-atrju tax-xellug. Ir-risultat huwa titjib fil-funzjoni tal-qalb.

Fis-sistema kardjovaskulari, Spironolakton jimpedixxi l-effetti detrimentali ta' aldosterone. Għalkemm il-mekkaniżmu ta' azzjoni preċiż s'issa mhux m'fisser b'mod ċar, aldosterone jipprova jwovli l-fibrozi mijokardijali, mudellar mijokardijali u vaskulari mill-ġdid u l-funzjoni hażina ta' l-endotijju. F'mudelli sperimentali fil-klieb, kien muri li terapija fuq tul ta' żmien ma' antagonist ta' aldosterone jimpedixxi l-funzjoni hażina progressiva tal-ventrikolu tax-xellug u jimmodera l-imudellar mill-ġdid tal-ventrikolu tax-xellug fi klieb b'falliment kroniku tal-qalb.

Fi studju kliniku li investiga ż-żmien tas-sopravivenza fil-klieb b'insuffiċjenza kongestiva tal-qalb, kien hemm 65% tnaqqis fir-riskju relattiv ta' mortalità ta' 15-il xahar fi klieb ikkurati b'spironolactone ikkombinat ma' terapija standard meta mqabbla ma' terapija standard waħidha. (Il-mortalità kienet ikklassifikata bħala mewt jew ewtanazja minhabba falliment fil-qalb)

Meta intuża f'kombinazzjoni ma' impedituri-ACE, Spironolakton jista' jikkuntrarja l-effetti ta' "harba ta' aldosterone".

Żieda żgħira fil-livelli ta' aldosterone fid-demm jistgħu jkunu osservati f'annimali fuq trattament. Jista' jkun hemm ipertrofija taż-żona glomeruloża adrenali relatata mad-doża. Din hija maħsuba li hija minhabba l-attivazzjoni ta' mekkaniżmi ta' feedback mingħajr konsegwenzi kliniċi avversi. Jista' jkun hemm ipertrofija relatata mad-doża taż-żona glomeruloża adrenali f'rati ta' dozi għoljin.

5.2 Tagħrif Farmakokinetiċi

Il-farmakokinetiċi ta' Spironolakton huma tażżati fuq il-metaboliti tiegħu, peress li l-kompost ġenitur mhux stabbli fl-assaġġ.

Assorbiment

Wara l-ghoti ta' Spironolakton mill-ħalq lil klieb, kien muri li t-tliet metaboliti kisbu livelli minn 32 sa 49% tad-doża amminisrata. L-ikel iżid il-bijodisponibiltà minn 80 % sa 90%. Wara t-tehid mill-ħalq ta' 2 sa 4 mg/kg, l-assorbiment jiżdied b'mod lineari fuq il-medda. Wara dozi orali multipli ta' 2 mg spironolakton/kg, għal 10 ijiem konsekuttivi, ma kienet osservata l-eċċidja akkumulazzjoni. C_{max} medju ta' 382 µg/l u 94 µg/l jinkisbu għal metaboliti primarji, 7α-thiomethyl-Spironolakton u canrenone, wara 2 u 4 sigħat, rispettivament. Kundizzjonijiet ta' stat fiss huma miksuba sa jum 2.

Distribuzzjoni

Il-volumi medji ta' distribuzzjoni (V_{ss}) ta' 7α-thiomethyl-Spironolakton u canrenone huma madwar 153 litri u 177 litri rispettivament.

Il-hin ta' residenza medju tal-metaboliti jvarja minn 9 sa 14-il siegħa u huma preferenzjalment distribwiti lejn il-passaġġ gastrointestinali, kliewi, fwied u glandoli adrenali.

Metabolizmu

Spironolakton huwa metabolizzat malajr u kompletament mill-fwied għal metaboliti attivi tiegħu, 7α-thiomethyl-Spironolakton u canrenone, li huma l-metaboliti primarji fil-kelb.

Eliminazzjoni

Spironolakton huwa prinċipalment eliminat permezz tal-metaboliti tiegħu. Ir-rata ta' eliminazzjoni mill-plażma ta' canrenone hija ta' 1.45 ± 0.39 l/h/kg u ta' 7α-thiomethyl-Spironolakton hija ta'

0.89±0.44 l/h/kg. Wara l-ghoti mill-halq ta' Spironolakton radjotikketat lill-kelb, 70 % tad-doża kienet rikoverata mill-ippurgar u 20 % mill-awrina.

6. TAGHRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta' sustanzi

Essenza taċ-ċanga
Mannitol
Lawrisulfat tas-sodju
Mikrokristallina ċellulosi
Povidone
Sorbitol
Talc
Sterat tal-magnesju

4.7 Inkompatibilitajiet

Mhux Applikabbli.

6.3 Żmien ta' kemm il-prodott idum tajjeb

Żmien li l-prodott mediċinali veterinarju jista' jinżamm fuq il-kaxxa ippakkjat għall-bejgh: 3 snin.
Pilloli użati parzjalment għandhom jintużaw fi żmien 7 ijiem.

6.4. Taghrif speċjali dwar kif għandu jinħażen

Dan il-prodott mediċinali veterinarju m'għandux bżonn ta' l-ebda kundizzjoni speċjali sabiex jinħażen.
Pilloli parzjalment użati għandhom jinżammu fl-imbrixxa oriġinali.

6.5 In-natura u l-ghamla ta' l-ewwel ippakkjar

Strixxi li fihom 10 pilloli tal-Poliamide/aluminju/polyvinyl chloride//aluminju.

Daqsijiet tal-pakketti

Kaxxa tal-kartun bi 3 strixxi ie., 18-il strixxa ta' 10 pilloli

Mhux id-daqsijiet kollha tal-pakkett jistgħu qegħdin fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi tal-prodotti mediċinali veterinarji mhux użata jew materjal ieħor għar-rimi li huwa derivat minn dawn il-prodotti

Mediċina veterinarja li ma gietx użata jew prodotti oħra li ntuzaw għal din il-mediċina għandhom jintremew skond kif titlob il-liġi tal-pajjiż.

7. L-ENTITÀ LI GHANDHA L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Ceva Santé Animale
10, av. de La Ballastière
33500 Libourne
Franza

8. NUMRU(I) TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/07/074/001-006

9. DATA TA' L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI / TIĠDID TA' L-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 20 ta' Ġunju 2007

Data tal-aħħar tiġdid: 22 ta' Mejju 2012

10. DATA TA' META ĠIET RIVEDUTA DIN IL-KITBA

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediku veterinarju tinstab fuq il-websajt ta' l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) <http://www.ema.europa.eu/>.

PROJBIZZJONI TA' BEJGH, PROVISTA, U/JEW UŻU

Mhux Applikabbli.

ANNESS II

- A. L-MANIFATTUR RESPONSABBLI MILL-FRUĠ TAL-LOTT**
- B. KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA JEW L-UŻU**
- Ċ. DIKJARAZZJONI TAL-MRLs**
- D. KUNDIZZJONIJIET U REKWIŻITI OĦRA TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ**

A. IL-MANIFATTUR RESPONSABBLI MILL-HRUĠ TAL-LOTT

Isem u indirizz tal-manifattur responsabbli għall-hruġ tal-lott

Ceva Santé Animale
Z.I. Très le Bois
22600 Loudéac
Franza

Catalent Germany
Schorndorf GmbH
Steinbeistrasse 2
D-73614 Schorndorf
Il-Ġermanja

B. KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA JEW L-UŻU

Sabiex jiġi mogħti biss bi preskrizzjoni veterinarja.

Ċ. DIKJARAZZJONI TAL-MRLs

Mhux applikabbli.

D. KUNDIZZJONIJIET U REKWIŻITI OĦRA TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Ceva Santé Animale jiżgura li s-sistema ta' farmakoviġilanza, kif deskritta f'Parti I tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, neqgħda f'potha u qed tiffunzjona qabel u waqt li l-prodott mediċinali veterinarju jkun fis-seħh.

ANNES III

TIKETTA U L-FULJETT TA' TAGHRIF FIL-PAKETT

A. TIKKETTA

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

Kaxxa tal-kartun ta' flixkun 1 ta' 30 pillola

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Spironolactone Ceva 10 mg pilloli għal klieb
Spironolactone Ceva 40 mg pilloli għal klieb
Spironolactone Ceva 80 mg pilloli għal klieb

Spironolakton.

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

Spironolactone 10 mg
Spironolactone 40 mg
Spironolactone 80 mg

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola

4. DAQS TAL-PAKKETT

30 pillola

5. SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Klieb

6. INDIKAZZJONI (JFET)

7. TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEHTIEĠ

Għal użu orali.
Qabel l-użu qiegħda l-fuljett li jinsab fil-pakkett.

8. ZMIEN TA' TIŻMIM

9. TWISSIJIET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠ

Aqra l-fuljett ta' tagħrif fil-pakkett qabel tuża.

10. DATA TA' SKADENZA

JIS: {xahar/sena}

Uża fi żmien xahrejn wara li jinfetaħ l-ewwel darba l-flixxun.

11. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GHANDU JINHAŻEN

Ahžen pilloli użati parzjalment għol- flixxun originali.

**12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI
JEW MATERJAL IEHOR GħAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ**

Rimi: ara l-fuljett ta' tagħrif.

**13. IL-KLIEM "GħAL TRATTAMENT TA' L-ANIMALI BISS" U KUNDIZZJONIJIET
JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA, JEW L-UŻU, jekk applikabbli**

Għal Trattament ta' l-Animali Biss <għandu jingħad bi preskrizzjoni veterinarja

14. IL-KLIEM "ŻOMM FEJN MA JINTLAHAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL"

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Ceva Santé Animale
10, av. de La Ballastière
33500 Libourne
Franza

16. NUMRU TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/07/074/007

EU/2/07/074/008

EU/2/07/074/009

17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott:

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

Kaxxa tal-kartun – pilloli ta' 10 mg, pilloli ta' 40 mg u pilloli ta' 80 mg

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Spironolactone Ceva 10 mg pilloli għal klieb
Spironolactone Ceva 40 mg pilloli għal klieb
Spironolactone Ceva 80 mg pilloli għal klieb

Spironolakton.

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OHRA

Spironolactone 10 mg
Spironolactone 40 mg
Spironolactone 80 mg

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola

4. DAQS TAL-PAKKETT

30 pillola
180 pillola

5. SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Klieb

6. INDIKAZZJONI (JEF)**7. TWISSIJIET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠ**

Jittiehed mill-halq.
Qabel l-użu aqra l-fuljett li jinsab fil-pakkett.

8. LMIEN TA' TIŻMIM**9. TWISSIJIET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠ**

Aqra l-fuljett ta' tagħrif fil-pakkett qabel tuża

10. DATA TA' SKADENZA

JIS: {xahar/sena}

Pilloli użati parzjalment g]andhom jintużaw fi żmien 7 ijiem.

11. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GHANDU JINHAŻEN

Ahżen pilloli użati parzjalment ġol-istrixxa oriġinali.

12. PREKAWZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MITT UŻATI JEW MATERJAL IEHOR GHAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Rimi: ara l-fuljett ta' taghrif.

13. IL-KLIEM "GHAL TRATTAMENT TA' L-ANIMALI BISS" U KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA JEW L-UŻU, jekk applikabbli

Għal Trattament ta' l-Animali Biss <għandu jingħata biss bi preskrizzjoni veterinarja

14. IL-KLIEM "ŻOMM FEJN MA JINTLAHAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL"

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Ceva Santé Animale
10, av. de La Ballastière
33500 Libourne
Franza

16. NUMRU/I TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/07/074/001 (3 strixxi ta' 10 pilloli)

EU/2/07/074/002 (18-il strixxa ta' 10 pilloli)

EU/2/07/074/003 (3 strixxi ta' 10 pilloli)

EU/2/07/074/004 (18-il strixxa ta' 10 pilloli)

EU/2/07/074/005 (3 strixxi ta' 10 pilloli)

EU/2/07/074/006 (18-il strixxa ta' 10 pilloli)

17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott:

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

Flixkun ta' 30 pillola

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Spironolactone Ceva 10 mg pilloli għal klieb
Spironolactone Ceva 40 mg pilloli għal klieb
Spironolactone Ceva 80 mg pilloli għal klieb

Spironolakton.

2. KWANTITÀ TAS-SUSTANZA ATTIVA / SUSTANZI ATTIVI

Spironolactone 10 mg
Spironolactone 40 mg
Spironolactone 80 mg

3. KONTENUT BHALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA' DOŻI

30 pillola

4. MOD TA' AMMINISTRAZZJONI

5. ŻMIEN TA' TIŻMIM

6. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

7. DATA TA' SKADENZA

JIS {xahar/sena}

8. IL-KLIEM "GHAL TRATTAMENT TAL-ANIMALI BISS"

Għal Trattament tal-Annimali Biss

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-BLISTERS JEW L-ISTRIXXI

Strixxi – Pilloli ta' 10 mg, pilloli ta' 40 mg u pilloli ta' 80 mg

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI VETERINARJU

Spironolactone Ceva 10 mg pilloli għal klieb

Spironolactone Ceva 40 mg pilloli għal klieb

Spironolactone Ceva 80 mg pilloli għal klieb

Spironolakton

2. ISEM TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

CEVA

3. DATA TA' META JISKADI

EXP: {xahar/sena}

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

5. IL-KLIEM "GHAL TRATTAMENT TAL-ANIMALI BISS"

Għal trattament tal-animali biss.

B. FULJETT TA' TAGHRIF IL-PAKKETT

FULJETT TA' TAGHRIF FIL-PAKKETT

Spironolactone Ceva 10 mg pilloli għal klieb
Spironolactone Ceva 40 mg pilloli għal klieb
Spironolactone Ceva 80 mg pilloli għal klieb

1. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ, U L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-MANIFATTURA RESPONSABBLI LI JHALLI L-KONSENJA TMUR FIS-SUQ, JEKK DIFFERENTI

Sid l-Awtorizzazzjoni tal-Kummerċ

Ceva Santé Animale
10, av. de La Ballastière
33500 Libourne Franza
Tel: + 33 (0) 5 57 55 40 40
Faks: + 33 (0) 5 57 55 41 98

Manifatturi li jhalli l-konsenja tmur fis-suq

Ceva Santé Animale
Z.I. Très le Bois
22600 Loudéac
Franza

Catalent Germany
Schorndorf GmbH
Steinbeistrasse 2
D-73614 Schorndorf
Il-Ġermanja

2. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI VETERINARJU

Spironolactone Ceva 10 mg pilloli għal klieb
Spironolactone Ceva 40 mg pilloli għal klieb
Spironolactone Ceva 80 mg pilloli għal klieb

Spironolakton

3. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I) U INGREDJENT(I) OHRA

Spironolactone Ceva 10 mg fih 10 mg spironolakton
Spironolactone Ceva 40 mg fih 40 mg spironolakton
Spironolactone Ceva 80 mg fih 80 mg spironolakton

4. INDIKAZZJONI(JIET)

Il-midli Spironolactone Ceva jintużaw f'kombinazzjoni ma' terapija standard, (li jinkludi appoġġ diuretiku, meta meħtieġ) għat-trattament ta' falliment tal-qalb kongestiv ikkawnat minn rigorizzazzjoni valvulari fil-klieb.

5. KONTRA INDIKAZZJONIJIET

Tużax dan il-prodott fi klieb li jsofru miinn ipoadrenokortiċizmu, iperkalemija jew iponatremija..
Tużax flimkien ma' Mediċini ta' kontra l-infjammazzjoni mhix sterojdi (NSAIDs) fi klieb b'insuffiċjenza renali (indeboliment renali/funzjoni hażina).
Tużax meta l-annimali jkunu tqal jew waqt it-treddiegh.
Tużax f'annimali miżmuma, jew bil-ħsieb tat- tnissil

6. EFFETTI MHUX MIXTIEQA

Atrofija prostatika riversibbli (tnaqqis fid-daqs) ta' spiss tiġi osservata fi klieb irġiel shah.

Jekk tinnota xi effetti serji jew effetti ohra mhux msemija f'dan il-fuljett, jekk jidher għalik informazzjoni lit-tabib veterinarju tiegħek.

7. SPEĊI LI GHALIHOM HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Klieb.

8. DOŻA GHAL KULL SPEĊI, MOD(I) U METODU TA' AMMINISTRAZZJONI

Jittiehed mill-halq.

Agħti 2 mg/kg piż korporali ta' spironolakton darba kuljum

PIŻ KORPORALI	Numru ta' pilloli		
	Spironolactone Ceva 10 mg	Spironolactone Ceva 40 mg	Spironolactone Ceva 80 mg
1 sa 2.5 kg	1/4		
2.5 sa 5 kg	1		
5 sa 10 kg	2		
10 sa 15 kg	3		
15 sa 20 kg		1	
20 sa 30 kg		1 + 1/2	
30 sa 40 kg			1
40 sa 50 kg			1 + 1/4
50 sa 60 kg			1 + 1/2

9. PARIR SABIEX TAMMINISTRA B'MOD KORRETT

Il-prodott mediċinali veterinarju għandu jiġi mogħti ma' l-ikel. Il-pillola tista' jew tithallat b'ammont żgħir ta' ikel qabel l-ikel prinċipali jew tingħata direttament għal-halq wara l-ikel.
Il-pilloli fihom it-togħma taċ-ċanga sabiex jitjieb il-palat tagħom, u fi studju li sar fuq klieb b'saħħithom intwera li kienu konsumati b' mod volontarju u shih f'75% tal-hin.

10. PERJODU TA' TIŻMIM

11. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHALL-HAŻNA

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

Dan il-prodott mediċinali veterinarju m'għandux bżonn ta' l-ebda kundizzjoni speċjali sabiex jinħażen.

Uża fi żmien xahrejn minn meta jinfetħ l-ewwel darba l-flixkun.

Pilloli parzjalment użati għandhom jinżammu fil-flixkun oriġinali.

Tużax wara d-data tal-iskadenza li hi dikjarata fuq il-kartuna wara EXP.

12. TWISSIJIET SPEĊJALI

Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-annimali

Il-funzjoni tal-kliwi u l-livelli ta' potassju fis-serum għandhom ikun u evalwati qabel jinbeda trattament ikkombinat bi spironolakton u impedituri tal-Enzima li Tikkonverti Angiotensin (ACE). Incidenza akbar ta' iperkalemija ma kinitx osservata fi provi kliniċi magħmulin fuq klieb b'din il-kombinazzjoni, mhux b'hal fil-bnedmin. Madankollu, fil-klieb b'indeboliment fil-kliwi monitoraġġ regolari fuq il-funzjoni tal-kliwi u l-livelli ta' potassju fis-serum huwa rakkomandat peress li jista' jkun hemm riskju oghla ta' iperkalemija.

Klieb ittrattati bi Spironolakton u NSAIDS flimkien għandhom jiġu idratati korrettament. Sorveljanza tal-funzjoni renali tagħhom u l-livelli tal-potassju, fil-plażma hija rakkomandata qabel il-bidu u waqt it-trattament b'terapija kombinata (ara Kontra-indikazzjonijiet).

Peress li spironolakton għandu effett anti-androgeniku, mhuwiex rakkomandat li tamministra l-prodott mediċinali veterinarju lill-klieb li jkunu għandhom qed jikbru.

Peress li spironolakton ikollu bijotrasformazzjoni epatika estensiva (fwied), attenzjoni għandha tingħata meta l-prodott mediċinali veterinarju jintuża fi klieb bi problemi tal-fwied.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittiehdu mill-persuna li tamministra l-prodott mediċinali veterinarju lill-annimali

Ilbes l-ingwanti meta tamministra l-prodott.

Jista' jikkawna sensitività fil-ġilda: persuni li huma magħrufin li huma allergiċi għal spironolakton m'għandhomx jmissu dan il-prodott.

Aħsel idejk sew wara l-użu.

F'każ ta' ingestjoni aċċidentali, fittex parir mediku minnufih u uri l-fuljett tal-pakkett jew it-tikketta lit-tabib.

Użu fit-tqala, fi żmien il-ħalib u meta jbidu l-bajd

Tużax meta l-annimali jkunu tqal jew waqt it-treddeigh. Studji fil-laboratorju fi speċijiet (far, ġurdien, fenek u xadina) urew evidenza ta' żvilupp ta' tossiċità.

Interazzjonijiet

Fursemide u pimobenden intużaw flimkien bi Spironolactone Ceva fi klieb b'falliment kardijaku mingħajr evidenza klinika ta' reazzjonijiet avversi.

Spironolakton inaqqas l-eliminazzjoni ta' digoxin u b'hekk jgħolli l-koncentrazzjoni tad-digoxin fil-plażma. Peress li l-indiċi terapewtiku għad-digoxin huwa dejjaq hafna, huwa rakkomandat li tissorvelja mill-qrib klieb li qed jingħataw kemm digoxin u kemm spironolakton.

L-amministrazzjoni jew ta' deoxycorticosterone jew ta' NSAIDs ma' spironolakton tista' twassal għal tnaqqis moderat fl-effetti natrijuretici (tnaqqis ta' l-eliminazzjoni tas-sodju fl-awrina) ta' spironolactone.

Amministrazzjoni konkomitanti ta' spiro lactone ma' impedituri-ACE u mediċini li ma jahlux il-potasju (bħal imblokkaturi tar-riċetturi ta' angiotensin, imblokkaturi- β , imblokkaturi tal-kanali tal-kalċjum eċċ.) jistgħu potenzjalment iwasslu għal iperkalemija. (Ara Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-animali).

Spironolakton jista' jikkaguna kemm induzzjoni u kemm impediment ta' l-enzimi citokromi P450 u għaldaqstant jistgħu jaffettwaw il-metaboliżmu ta' mediċini oħra li jutilizzaw dawn il-mogħdijiet metabolici.

Doża eċċessiva

Wara l-ghoti sa 10 darbiet id-doża rakkomandata (20 mg/kg) lil klieb f'saħħithom, effetti avversi dipendenti fuq id-doża kienu nnotati (ara s-sezzjoni Reazzjonijiet Mhux Mixtieqa).

F'każ ta' ingestjoni aċċidentali massiva mill-kelb, ma hemm l-ebda antidot, jew trattament speċifiku. Għaldaqstant huwa rakkomandat li tinduci r-remettar, il-ħasil ta' l-istonku (jiddependi fuq l-istima tar-riskju) u sorveljanza tal-elettroliti. Trattament simptomatiku, eż. terapija bil-fluwidi, għandu jkun ipprovdut.

13. PREKAWZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR RIMI TA' PRODOTT MHUX UŻATA JEW MATERJAL IEHOR GHAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Staqs li l-veterinarju tiegħek dwar kif l-aħjar li tarmi l-mediċin li ma jkunux aktar meħtieġa minnek. Dawn il-mizuri għandhom jgħinu sabiex tiproteġi l-ambjent.

14. DATA META GĠIE APPROVAT L-AĤĤAR IL-FULJETT INFORMATIV FIL-PAKKETT

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediku veterinarju tinstab fuq il-websajt ta' l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) <http://www.ema.europa.eu/>.

15. TAGHRIF IEHOR

Daqsijiet tal-pakketti:

Flixxun li fih 30 pillola prakkjati go kaxxa tal-kartun.

Jista' jkun li mhux id-daqsijiet kollha jitqegħdu fis-suq.

Kwalitajiet farmakodinamiċi

Spironolakton u l-metaboliti attivi tiegħu (li jinkludu 7 α -thiomethyl-Spironolakton u canrenone) jahdmu bħala antagonisti speċifiċi ta' aldosterone u jeżerċitaw l-effetti tagħhom billi jorbtu kompetitivament mar-riċettur tal-mineralokortikoidje li huwa lokalizzat fil-kliwi, il-qalb jew il-vazi tad-demm.

Spironolakton huwa mediċina natrijuretika (storikament deskritt bħala diuretiku artab). Fil-kilwa spironolakton jimpedixxi $\bar{z}$ -zamma tas-sodju indott minn aldosterone li jwassal għall-eliminazzjoni tas-sodju u sussegwentement ta' l-ilma, u zamma ta' potassju.

L-effetti renali ta' spironolakton u l-metaboliti tiegħu jwasslu għal tnaqqis fil-volum ta' barra ċ-ċelloli u konsegwentement fi tnaqqis tat-tagħbija kardijaka tal- pressjoni fl-atriju tax-xellug. Ir-rizultat huwa titjib fil-funzjoni tal-qalb.

Fis-sistema kardijovaskulari, spironolakton jimpedixxi l-effetti detrimental ta' aldosterone.

Għalkemm il-mekkaniżmu ta' azzjoni preċiż tal-aldosterone s'issa mhux magħruf b'mod ċar, dan jipprova l-fibrozi mijokardijali, mudellar mill-ġdid mijokardijali u vaskulari u l-funzjoni hażina ta' l-endotilju.

F'mudelli sperimentali fil-klieb, kien muri li terapija fuq tul ta' żmien ma' antagonist ta' aldosterone jimpedixxi l-funzjoni hażina progressiva tal-ventrikolu tax-xellug u jimmodera l-immudellar mill-ġdid tal-ventrikolu tax-xellug fi klieb b'falliment tal-qalb kroniku.

F'studju kliniku li investiga ż-żmien tas-sopravivenza fil-klieb b'insuffiċjenza kongestiva tal-qalb, kien hemm 65% tnaqqis fir-riskju relattiv ta' mortalità ta' 15-il xahar fi klieb ikkurati b' spironolactone ikkombinat ma' terapija standard meta mqabbla ma terapija standard waħidha. (Il mortalità kienet ikklassifikata bħala mewt jew ewtanasja minhabba falliment fil-qalb).

Meta intuża f'kombinazzjoni ma' impedituri-ACE, spironolakton jista' jikkontribwixxi l-effetti ta' "harba ta' aldosterone".

Żieda żgħira fil-livelli ta' aldosterone fid-demm jistgħu jkunu osservati f'annimali fuq trattament. Jista' jkun hemm ipertrofija taż-żona glomeruloża adrenal relata ma' doża. Din hija maħsuba li hija minhabba l-attivazzjoni ta' mekkaniżmi ta' rispons, mingħajr konsegwenzi kliniċi kuntrarji.

Jista' jkun hemm ipertrofija marbuta ma' doża fiż-żona glomeruloża adrenal b'rati ta' doži għoljin.

FULJETT TA' TAGHRIF FIL-PAKKETT

Spironolactone Ceva 10 mg pilloli għal klieb
Spironolactone Ceva 40 mg pilloli għal klieb
Spironolactone Ceva 80 mg pilloli għal klieb

1. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ, U L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-MANIFATTURA RESPONSABBLI LI JHALLI L-KONSENJA TMUR FIS-SUQ, JEKK DIFFERENTI

Sid l-Awtorizzazzjoni tal-Kummerċ

Ceva Santé Animale
10, av. de La Ballastière
33500 Libourne Franza
Tel: + 33 (0) 5 57 55 40 40
Faks: + 33 (0) 5 57 55 41 98

Manifatturi li jhalli l-konsenja tmur fis-suq

Ceva Santé Animale
Z.I. Très le Bois
22600 Loudéac
Franza

Catalent Germany
Schorndorf GmbH
Steinbeistrasse 2
D-73614 Schorndorf
Il-Ġermanja

2. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI VETERINARJU

Spironolactone Ceva 10 mg pilloli għal klieb
Spironolactone Ceva 40 mg pilloli għal klieb
Spironolactone Ceva 80 mg pilloli għal klieb

Spironolakton

3. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I) U INGREDJENT(I) OHRA

Spironolactone Ceva 10 mg fih 10 mg spironolakton
Spironolactone Ceva 40 mg fih 40 mg spironolakton
Spironolactone Ceva 80 mg fih 80 mg spironolakton

4. INDIKAZZJONI(JIET)

Il-prodott Spironolactone Ceva jintużaw f'kombinazzjoni ma' terapija standard, (li jinkludi appoġġ diuretiku, meta meħtieġ) għat-trattament ta' falliment tal-qalb kongestiv ikkawnat minn rigorizzazzjoni valvulari fil-klieb.

5. KONTRA INDIKAZZJONIJIET

Tużax dan il-prodott fi klieb li jsofru minn ipoadrenokortiċiżmu, iperkalemija jew iponatremija..

Tużax flimkien ma' Mediċini ta' kontra l-infjammazzjoni mhix steroidi (NSAIDs) fi klieb b'insuffiċjenza renali (indeboliment renali/funzjoni hażina).
 Tużax meta l-annimali jkunu tqal jew waqt it-treddiegh.
 Tużax f'annimali miżmuma, jew bil-ħsieb tat-tnissil

6. EFFETTI MHUX MIXTIEQA

Atrofija prostatika riversibbli (tnaqqis fid-daqs) ta' spiss tiġi osservata fi klieb irġiel shaħ.

Jekk tinnota xi effetti serji jew effetti ohra mhux msemmija f'dan il-fuljett, jekk jogħġbok info. ma lit-tabib veterinarju tiegħek.

7. SPEĊI LI GHALIHM HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Klieb.

8. DOŻA GHAL KULL SPEĊI, MOD(I) U METODU TA' AMMINISTRAZZJONI

Jittiehed mill-ħalq.

Agħti 2 mg/kg piż korporali ta' spironolakton darba kuljum.

PIŻ KORPORALI	Numru ta' pilloli		
	Spironolactone Ceva 10 mg	Spironolactone Ceva 40 mg	Spironolactone Ceva 80 mg
1 sa 2.5 kg	½		
2.5 sa 5 kg	1		
5 sa 10 kg	2		
10 sa 15 kg	3		
15 sa 20 kg		1	
20 sa 30 kg		1 + ½	
30 sa 40 kg			1
40 sa 50 kg			1 + ¼
50 sa 60 kg			1 + ½

9. PARIR SABIEX TAMMINISTRA B'MOD KORRETT

Il-proċott mediċinali veterinarju għandu jiġi mogħti ma' l-ikel. Il-pillola tista' jew tithallat b'ammont żgħir ta' ikel qabel l-ikla prinċipali jew tingħata direttament għal-ħalq wara l-ikel.

10. PERJODU TA' TIŻMIM

11. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHALL-HAŻNA

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

Dan il-prodott mediċinali veterinarju m'għandux bżonn ta' l-ebda kundizzjoni speċjali sabiex jinħażen.

Pilloli parzjalment użati għandhom jinżammu fl-istrixxa oriġinali u għandhom jintużaw fi żmien 7 ijiem.

Tużax wara d-data tal-iskadenza li hi dikjarata fuq il-kartuna jew fuq it-tikketta tal-blister wara EXP.

12. TWISSIJIET SPEĊJALI

Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-animali

Il-funzjoni tal-kliwi u l-livelli ta' potassju fis-serum għandhom ikunu evalwati qabel jinbeda trattament ikkombinat bi spironolakton u impedituri tal-Enzima li Tikkonverti Angiotensin (ACE). Incidenza akbar ta' iperkalemija ma kinitx osservata fi provi kliniċi magħmula fuq klieb b'din il-kombinazzjoni, mhux b'hal fil-bnedmin. Madankollu, fil-klieb b'indeboliment fil-kliwi monitoraġġ regolari fuq il-funzjoni tal-kliwi u l-livelli ta' potassju fis-serum huwa rakkomandat peress li jista' jkun hemm riskju oġġla ta' iperkalemija.

Klieb ittrattati bi Spironolakton u NSAIDS flimkien għandhom jiġu idratati korrettament. Sorveljanza tal-funzjoni renali tagħhom u l-livelli tal-potassjum fil-plażma hi rakkomandata qabel il-bidu u waqt it-trattament b'terapija kombinata (ara Kontra indikazzjonijiet).

Peress li spironolakton għandu effett anti-androgeniku, mhuwiex rakkomandat li tamministra l-prodott mediċinali veterinarju lill-klieb li jkunu għadhom qed jikoru.

Peress li spironolakton ikollu bijotrasformazzjoni epatika estensiva (fwied), attenzjoni għandha tingħata meta l-prodott mediċinali veterinarju jintuża fi klieb bi problemi tal-fwied.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittiehdu mill-persuna li tamministra l-prodott mediċinali veterinarju lill-animali

Ilbes l-ingwanti meta tamministra l-prodott.

Jista' jikkaguna sensittività fil-ġilda persuni li huma magħrufin li huma allergiċi għal spironolakton m'għandhomx jmissu dan il-prodott.

Aħsel idejk sew wara l-użu.

F'każ ta' ingestjoni aċċidentali, fittex parir mediku minnufih u uri l-fuljett tal-pakkett jew it-tikketta lit-tabib.

Użu fit-tqala, fi żmien il-halib u meta jbidu l-bajd

Tużax meta l-animali jkunu tqal jew waqt it-treddiegh. Studji fil-laboratorju fi speċijiet (far, ġurdien, fenek u xadina) urew evidenza ta' żvilupp ta' tossiċità.

Interazzjonijiet

Furosemide u pimobenden intużaw flimkien bi Spironolactone Ceva fi klieb b'falliment kardijaku mingħajr evidenza klinika ta' reazzjonijiet avversi.

Spironolakton inaqqas l-eliminazzjoni ta' digoxin u b'hekk jgħolli l-koncentrazzjoni tad-digoxin fil-plażma. Peress li l-indiċi terapewtiku għad-digoxin huwa dejjaq ħafna, huwa rakkomandat li tissorvelja mill-qrib klieb li qed jingħataw kemm digoxin u kemm spironolakton.

L-amministrazzjoni jew ta' deoxycorticosterone jew ta' NSAIDs ma' spironolakton tista' twassal għal tnaqqis moderat fl-effetti natrijuretici (tnaqqis ta' l-eliminazzjoni tas-sodju fl-awrina) ta' spironolactone.

Amministrazzjoni konkomitanti ta' spiro lactone ma' impedituri-ACE u medicini li ma jahlux il-potassjum (bhal imblokkaturi tar-ricetturi ta' angjotensin, imblokkaturi- β , imblokkaturi tal-kanali tal-kalcjum, eċċ.) jistgħu potenzjalment iwasslu għal iperkalemija. (Ara Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-annimali).

Spironolakton jista' jikkaguna kemm induzzjoni u kemm impediment ta' l-enzimi ċitokromi P450 u għaldaqstant jistgħu jaffettwaw il-metaboliżmu ta' medicini ohra li jutilizzaw dawn il-mogħdijiet metabolici.

Doża eċċessiva

Wara l-ghoti sa 10 darbiet id-doża rakkomandata (20 mg/kg) lil klieb f'saħħithom, effetti avversi dipendenti fuq id-doża kienu nnotati (ara s-sezzjoni Reazzjonijiet Mhux Mixtieqa). F'każ ta' ingestjoni aċċidentali massiva mill-kelb, ma hemm l-ebda antidotu jew trattament speċifiku. Għaldaqstant huwa rakkomandat li tinduċi r-remettar, il-ħasil ta' l-istonku (jiddependi fuq l-istima tar-riskju) u sorveljanza tal-elettroliti. Trattament simptomatiku, eż. terapija bil-flavidi, għandu jkun ipprovdut.

13. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR RIMI TA' PRODOTT MHUX UŻATA JEW MATERJAL IEHOR GHAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Staqsijiet lil veterinarju tiegħek dwar kif l-aħjar li tarmi l-medicini li ma jkunux aktar meħtieġa minnek. Dawn il-miżuri għandhom jgħinu sabiex tipproteġi l-ambjent.

14. DATA META ĠIE APPROVAT L-AHHAR IL-FOLJETT INFORMATTIV FIL-PAKKETT

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediku veterinarju tinstab fuq il-websajt ta' l-Aġenzija Ewropea għall-Medicini (EMA) <http://www.ema.europa.eu/>.

15. TAGHRIF IEHOR

Daqsijiet tal-pakketti:

Kaxxa tal-kartun li fiha 3 strixxi jew 18-il strixxa ta' 10 pilloli

Jista' jkun li mhux id-daqsijiet kollha jitqegħdu fis-suq.

Kwalitajiet farmakodinamici

Spironolakton u l-metaboliti attivi tiegħu (li jinkludu 7 α -thiomethyl-Spironolakton u canrenone) jahdmu bħala antagonisti speċifiċi ta' aldosterone u jeżerċitaw l-effetti tagħhom billi jorbtu kompetitivament tar-ricettur tal-mineralokortikoidje li huwa lokalizzat fil-kliewi, il-qalb jew il-vażi tad-demm.

Spironolakton huwa medicina natrijuretika (storikament deskritt bħala diuretika artab). Fil-kilwa spironolakton jimpedixxi α -zamma tas-sodju indott minn aldosterone li jwassal għall-eliminazzjoni tas-sodju u sussegwentement ta' l-ilma, u α -zamma ta' potassjum.

L-effetti renali ta' spironolakton u l-metaboliti tiegħu jwasslu għal tnaqqis fil-volum ta' barra ċ-ċelloli u konsegwentement fi tnaqqis tat-tagħbija kardijaka tal-pressjoni fl-atriju tax-xellug. Ir-riżultat huwa tneġġib fil-funzjoni tal-qalb.

Fis-sistema kardijovaskulari, spironolakton jimpedixxi l-effetti detrimentali ta' aldosterone. Għalkemm il-mekkaniżmu ta' azzjoni preċiż tal-aldosterone s'issa mhuwiex magħruf b'mod ċar, dan

jippromwovi l-fibrozi mijokardijali, mudellar mill-ġdid mijokardijali u vaskulari u l-funzjoni hażina ta' l-endotilju.

F'mudelli sperimentali fil-klieb, kien muri li terapija fuq tul ta' żmien ma' antagonist ta' aldosterone jimpedixxi l-funzjoni hażina progressiva tal-ventrikolu tax-xellug u jimmodera l-immudellar mill-ġdid tal-ventrikolu tax-xellug fi klieb b'falliment tal-qalb kroniku.

F'studju kliniku li investiga ż-żmien tas-sopravivenza fil-klieb b'insuffiċjenza kongestiva tal-qalb, kien hemm 65% tnaqqis fir-riskju relattiv ta' mortalità ta' 15-il xahar fi klieb ikkurati b'spironolactone ikkombinat ma' terapija standard meta mqabbla ma terapija standard waħidha. (Il-mortalità kienet ikklassifikata bħala mewt jew ewtanasje minhabba falliment fil-qalb).

Meta intuża f'kombinazzjoni ma' impedituri-ACE, spironolacton jista' jikkontrabatti l-⁺effetti ta' "harba ta' aldosterone".

Żieda żgħira fil-livelli ta' aldosterone fid-demm jistgħu jkunu osservati f'annimali fuq trattament. Jista' jkun hemm ipertrofija taż-żona glomeruloża adrenali relatata mad-doża. Din hija ma'isuba li hija minhabba l-attivazzjoni ta' mekkaniżmi ta' rispons, mingħajr konsegwenzi kliniċi kuntrarji.

Jista' jkun hemm ipertrofija marbuta mad-doża fiż-żona glomerulosa adrenali b'rati ta' doži għoljin.