

ANNES I

SOMMARJU TAL-KARATTERISTIČI TAL-PRODOTT

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

TREVICTA 175 mg suspensjoni li terġi l-mediċina bil-mod għall-injezzjoni
TREVICTA 263 mg suspensjoni li terġi l-mediċina bil-mod għall-injezzjoni
TREVICTA 350 mg suspensjoni li terġi l-mediċina bil-mod għall-injezzjoni
TREVICTA 525 mg suspensjoni li terġi l-mediċina bil-mod għall-injezzjoni

2. GHAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

175 mg suspensjoni li terġi l-mediċina bil-mod għall-injezzjoni

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 273 mg paliperidone palmitate f'0.88 mL ekwivalenti għal 175 mg paliperidone.

263 mg suspensjoni li terġi l-mediċina bil-mod għall-injezzjoni

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 410 mg paliperidone palmitate f'1.32 mL ekwivalenti għal 263 mg paliperidone.

350 mg suspensjoni li terġi l-mediċina bil-mod għall-injezzjoni

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 546 mg paliperidone palmitate f'1.75 mL ekwivalenti għal 350 mg paliperidone.

525 mg suspensjoni li terġi l-mediċina bil-mod għall-injezzjoni

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 819 mg paliperidone palmitate f'2.63 mL ekwivalenti għal 525 mg paliperidone.

Għal-lista sħiħa ta' eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Suspensjoni li terġi l-mediċina bil-mod għall-injezzjoni.
Is-suspensjoni hija bajda jew ofwajt. Is-suspensjoni għandha pH newtrali (madwar 7.0).

4. TAGHRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

TREVICTA, injezzjoni ta' kull 3 xhur, huwa indikat għat-trattament ta' manteniment tal-iskizofrenija f'pazjenti adulti li jkunu stabbli b'mod kliniku fuq paliperidone palmitate ta' kull xahar li jista' jiġi injettat (ara sezzjoni 5.1).

4.2 Pożoloġija u metodu ta' kif għandu jingħata

Pożoloġija

Pazjenti li jkunu qed jiġu ttrattati b'mod sodisfaċenti b'paliperidone palmitate ta' kull xahar li jista' jiġi injettat (preferibbilment għal erba' xhur jew aktar) u li ma jkunux jeħtieġu aġġustamenti fid-doża jistgħu jinqalbu fuq injezzjoni ta' paliperidone palmitate li tingħata kull 3 xhur.

TREVICTA għandu jinbeda minflok id-doża skedata li jkun imiss ta' paliperidone palmitate ta' kull xahar li jista' jiġi injettat (± 7 ijiem). Id-doża ta' TREVICTA għandha tiġi bbażata fuq id-doża

preċedenti ta' paliperidone palmitate ta' kull xahar li jista' jiġi injettat billi tintuża doża li hija 3.5 drabi oghla muriġa fit-tabella li jmiss:

Doži ta' TREVICTA għal pazjenti ttrattati b'mod sodisfaċenti b'paliperidone palmitate ta' kull xahar li jista' jiġi injettat

Jekk l-aħhar doża ta' paliperidone palmitate ta' kull xahar li jista' jiġi injettat hija	Ibda' TREVICTA bid-doża li ġejja
50 mg	175 mg
75 mg	263 mg
100 mg	350 mg
150 mg	525 mg

Ma hemm l-ebda doża ta' TREVICTA ekwivalenti għad-doża ta' 25 mg ta' paliperidone palmitate ta' kull xahar li jista' jiġi injettat u din ma ġietx studjata.

Wara d-doża tal-bidu ta' TREVICTA, TREVICTA għandu jingħata permezz ta' injezzjoni fil-muskolu darba kull 3 xhur (\pm ġimagħtejn, ara wkoll is-sezzjoni Doża maqbuża).

Jekk ikun meħtieġ, aġġustament fid-doża ta' TREVICTA jista' jsir kull 3 xhur b'żidiet fuq firxa minn 175 mg sa 525 mg abbażi tat-tollerabilità individwali tal-pazjent u/jew l-effikaċja. Minhabba l-karatteristika ta' TREVICTA li jaħdem fit-tul, ir-rispons tal-pazjent għal doża aġġustata jista' ma jkunx evidenti għal diversi xhur (ara sezzjoni 5.2). Jekk il-pazjenti jibqgħu jkollu s-sintomi, huma għandhom jiġu mmanigġjati skont il-prattika klinika.

Bidla minn prodotti mediċinali antipsikotiċi oħra

Il-pazjenti m'għandhomx jinqalbu direttament minn antipsikotiċi oħra minhabba li paliperidone palmitate li jiġi injettat kull 3 xhur għandu jinbada biss wara li l-pazjent jiġi stabilizzat fuq paliperidone palmitate li jiġi injettat kull xahar.

Bidla minn TREVICTA għal prodotti mediċinali antipsikotiċi oħra

Jekk TREVICTA jitwaqqaf, għandhom jitqiesu l-karatteristiċi tiegħu li jerġi l-mediċina bil-mod.

Bidla minn TREVICTA għal paliperidone palmitate ta' kull xahar li jista' jiġi injettat

Biex tibdel minn TREVICTA għal paliperidone palmitate ta' kull xahar li jista' jiġi injettat, paliperidone palmitate ta' kull xahar li jista' jiġi injettat għandu jingħata fiż-żmien li fiha kellha tingħata d-doża ta' TREVICTA li jkun imiss billi tintuża doża li hija 3.5 drabi inqas muriġa fit-tabella li jmiss. Mhuwiex meħtieġ l-ġhoti ta' doża tal-bidu skont kif imfisser fl-informazzjoni dwar kif għandu jiġi ordnat paliperidone palmitate ta' kull xahar li jista' jiġi injettat. Id-doża ta' paliperidone palmitate ta' kull xahar li jista' jiġi injettat għandha mbagħad titkompla tingħata f'intervalli ta' xahar kif imfisser fl-informazzjoni tiegħu dwar kif għandu jiġi ordnat.

Doži ta' paliperidone palmitate ta' kull xahar li jista' jiġi injettat għal pazjenti li qed jibdlu minn TREVICTA

Jekk l-aħhar doża ta' TREVICTA hija	Ibda paliperidone palmitate ta' kull xahar li jista' jiġi injettat 3 xhur wara bid-doża li ġejja
175 mg	50 mg
263 mg	75 mg
350 mg	100 mg
525 mg	150 mg

Bidla minn TREVICTA għal pilloli paliperidone li jerġu l-mediċina bil-mod li jittiehdu mill-ħalq kuljum

Biex tibdel minn TREVICTA għall-pilloli ta' paliperidone li jerġu l-mediċina bil-mod, l-ġhoti ta' doża kuljum tal-pilloli paliperidone li jerġu l-mediċina bil-mod għandu jinbada 3 xhur wara l-aħhar doża ta' TREVICTA u t-trattament għandu jitkompla bil-pilloli paliperidone li jerġu l-mediċina bil-mod kif imfisser fit-tabella taħt. It-tabella li jmiss tipprovdi l-iskedi ta' konverżjoni tad-doża rakkomandati

biex jippermettu l-pazjenti li qabel kienu stabilizzati fuq dozi differenti ta' TREVICTA jiksbu esponiment simili għal paliperidone bil-pilloli ta' paliperidone li jerhu l-mediċina bil-mod.

Dozi tal-pilloli ta' paliperidone li jerhu l-mediċina bil-mod għall-pazjenti li qed jibdlu minn TREVICTA*

L-ahħar doża ta' TREVICTA (Ġimgha 0)	Numru tal-ġimgha wara l-ahħar doża ta' TREVICTA		
	Ġimgha 12 sa Ġimgha 18, inklużivi	Ġimgha 19 sa Ġimgha 24, inklużivi	Minn Ġimgha 25 'il quddiem
	Doża ta' kuljum tal-pilloli paliperidone li jerhu l-mediċina bil-mod		
175 mg	3 mg	3 mg	3 mg
263 mg	3 mg	3 mg	6 mg
350 mg	3 mg	6 mg	9 mg
525 mg	6 mg	9 mg	12 mg

* Id-dozi kollha tal-pilloli paliperidone li jerhu l-mediċina bil-mod u jittiehdu kuljum għandhom jiġu individwalizzati għall-pazjent speċifiku, filwaqt li jitqiesu affarijiet li jvarjaw bħal raġunijiet għall-bidla, rispons għat-trattament preċedenti b'paliperidone, severità tas-sintomi psikotiċi, u/jew it-tendenza għal effetti sekondarji.

Doża maqbuża

Intervall għall-ghoti tad-doża

TREVICTA għandu jiġi injettat darba kull 3 xhur. Biex tevita doża maqbuża ta' TREVICTA il-pazjenti jistgħu jingħataw l-injezzjoni sa ġimagħtejn qabel jew wara l-punt ta' żmien ta' 3 xhur.

Dozi maqbuża

Jekk id-doża skedata tinqabeż u ż-żmien mill-ahħar injezzjoni jkun	Azzjoni
> 3½ xhur sa 4 xhur	L-injezzjoni għandha tingħata kemm jista' jkun malajr imbagħad titkompla l-iskeda ta' injezzjoni kull 3 xhur.
4 xhur sa 9 xhur	Uża l-iskeda rakkomandata ta' bidu mill-ġdid murija fit-tabella t'hawn taht.
> 9 xhur	Erga' ibda t-trattament mill-ġdid b'paliperidone palmitate ta' kull xahar li jista' jiġi injettat kif deskritt fl-informazzjoni dwar kif għandu jiġi ordnat dak il-prodott. TREVICTA jista' mbagħad jitkompla wara li l-pazjent ikun ġie trattat b'paliperidone palmitate ta' kull xahar li jista' jiġi injettat preferibbilment għal erba xhur jew aktar.

Skeda rakkomandata għal bidu mill-ġdid wara li jinqabzu minn 4 xhur sa 9 xhur ta' TREVICTA

Jekk l-ahħar doża ta' TREVICTA kienet	Aġhti żewġ dozi ta' paliperidone palmitate ta' kull xahar li jista' jiġi injettat, ġimgha bogħod minn xulxin (ġol-muskolu deltojd)		Imbagħad aġhti TREVICTA (ġol-muskolu deltojd ^a jew gluteali)
	Jum 1	Jum 8	Xahar wara jum 8
175 mg	50 mg	50 mg	175 mg
263 mg	75 mg	75 mg	263 mg
350 mg	100 mg	100 mg	350 mg
525 mg	100 mg	100 mg	525 mg

^a Ara wkoll *Informazzjoni għall-professjonisti fil-qasam mediku jew fil-qasam tal-kura tas-sahha* għall-għażla tal-labra abbażi tal-piż tal-ġisem.

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani

L-effikaċja u s-sigurtà fl-anzjani ta' > 65 sena għadhom ma ġewx determinati.

B'mod ġenerali, l-għoti tad-dożi ta' TREVICTA rakkomandat għal pazjenti anzjani b'funzjoni normali tal-kliwi huwa l-istess bħal dak ta' pazjenti adulti iżgħar b'funzjoni normali tal-kliwi. Minhabba li pazjenti anzjani jista' jkollhom funzjoni tal-kliwi mnaqqsa, ara *Indeboliment tal-kliwi* hawn taht għal rakkomandazzjonijiet dwar għoti tad-dożi f'pazjenti b'indeboliment tal-kliwi.

Indeboliment tal-kliwi

TREVICTA ma ġiex studjat f'pazjenti b'indeboliment tal-kliwi (ara sezzjoni 5.2). Għall-pazjenti b'indeboliment hafif tal-kliwi (tneħħija tal-kreatinina ≥ 50 sa < 80 mL/min), id-doża għandha tiġi aġġustata u l-pazjent għandu jiġi stabilizzat bl-użu ta' paliperidone palmitate ta' kull xahar li jista' jiġi injettat, imbagħad jinqaleb fuq TREVICTA.

TREVICTA mhux irrakkomandat f'pazjenti b'indeboliment moderat jew sever tal-kliwi (tneħħija tal-kreatinina < 50 mL/min).

Indeboliment tal-fwied

TREVICTA ma ġiex studjat f'pazjenti b'indeboliment tal-fwied. Abbażi ta' esperjenza b'paliperidone li jittiehed mill-halq, ma huwa meħtieġ l-ebda aġġustament fid-doża f'pazjenti b'indeboliment hafif jew moderat tal-fwied. Minhabba li paliperidone ma ġiex studjat f'pazjenti b'indeboliment sever tal-fwied, hija rakkomandata l-kawtela f'pazjenti bħal dawn (ara sezzjoni 5.2).

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta' TREVICTA fit-tfal u l-adolesxenti tal-età ta' < 18-il sena ma ġewx stabbiliti. M'hemm l-ebda data disponibbli.

Metodu ta' kif għandu jingħata

TREVICTA huwa maħsub għal użu ġol-muskolu biss. Huwa m'għandux jingħata minn xi rotta oħra. Kull injezzjoni għandha tingħata biss minn professjonist fil-qasam tal-kura tas-saħħa li jagħti d-doża sħiħa f'injezzjoni waħda. Huwa għandu jiġi injettat bil-mod, fil-fond ġol-muskolu deltojd jew gluteali. Bidla minn gluteali għal deltojd (u vice versa) għandha titqies għal injezzjonijiet futuri f'każ ta' skumdità fis-sit tal-injezzjoni (ara sezzjoni 4.8).

TREVICTA għandu jingħata biss permezz tal-labar magħmula minn materjal irqiq li huma pprovduti fil-pakkett ta' TREVICTA. Labar mill-pakkett ta' paliperidone palmitate ta' kull xahar li jista' jiġi injettat jew labar oħra disponibbli b'mod kummerċjali m'għandhomx jintużaw meta wieħed jagħti TREVICTA (ara *Informazzjoni li qegħda għall-professjonisti fil-qasam mediku jew fil-qasam tal-kura tas-saħħa*).

Il-kontenut tas-siringa mimlija għal-lest għandu jiġi mifli għal frak u telf ta' kulur qabel ma jingħata. **Huwa importanti li s-siringa tithawwad bis-saħħa b'polz merħi bit-tarf ihares 'il fuq għal mill-inqas 15-il sekonda biex tiġi aċċertata suspensjoni omogenja. TREVICTA għandu jingħata fi żmien 5 minuti minn meta jithawwad.** Jekk jgħaddu aktar minn 5 minuti qabel l-injezzjoni, erga' hawwad bis-saħħa għal mill-inqas 15-il sekonda biex iġġib il-prodott mediċinali f'suspensjoni mill-ġdid. (Ara *Informazzjoni li qegħda għall-professjonisti fil-qasam mediku jew fil-qasam tal-kura tas-saħħa*).

Għoti ġol-muskolu deltojd

Il-labra speċifikata għall-għoti ta' TREVICTA ġol-muskolu deltojd hija determinata mill-piż tal-pazjent.

- Għal dawk ≥ 90 kg, għandha tintuża l-labra magħmula minn materjal irqiq ta' pulzier u nofs, 22 gejġ (0.72 mm x 38.1 mm).

- Għal dawk < 90 kg, għandha tintuża l-labra magħmula minn materjal irqiq ta' pulzier, 22 gejġ (0.72 mm x 25.4 mm).

Huwa għandu jinghata fiċ-ċentru tal-muskolu deltojd. Injezzjonijiet fil-muskolu deltojd għandhom jiġu alternati bejn iż-żewġ muskoli deltojd.

Għoti fil-muskolu gluteali

Il-labra li għandha tintuża għall-għoti ta' TREVICTA ġol-muskolu gluteali hija l-labra magħmula minn materjal irqiq ta' pulzier u nofs, 22 gejġ (0.72 mm x 38.1 mm) irrISPETTAVEMENT mill-piż tal-ġisem. Huwa għandu jinghata fil-kwadrant tan-naħa ta' fuq ta' barra tal-muskolu gluteali. Injezzjonijiet gluteali għandhom jiġu alternati bejn iż-żewġ muskoli gluteali.

Għoti mhux komplut

Biex tevita l-għoti mhux komplut ta' TREVICTA, is-siringa mimlija għal-lest għandha tithawwad bis-saħħa għal mill-anqas 15-il sekonda fiż-żmien il-5 minuti ta' qabel l-injezzjoni biex tiġi aċċertata suspensjoni omogenja (ara *Informazzjoni li qegħda għall-professjonisti fil-qasam mediku jew fil-qasam tal-kura tas-saħħa*).

Madankollu f'każ ta' doża li ma ġietx injettata kollha, id-doża li jifdal fis-siringa m'għandhiex tiġi injettata mill-ġdid u m'għandhiex tinghata doża oħra minhabba li huwa diffiċli tikkalkula l-proporzjon tad-doża li tkun inghata fil-verità. Il-pazjent għandu jiġi mmonitorjat mill-qrib u mmaniġġjat kif inkun xieraq b'mod kliniku sal-injezzjoni skedata li jmiss ta' TREVICTA ta' kull 3 xhur.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Ipersensittività għas-sustanza attiva, għal risperidone għal kwalunkwe eċċipjent elenkat fis-sezzjoni 6.1.

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Użu f'pazjenti li jinsabu fi stat ta' aġitazzjoni akuta jew fi stat psikotiku sever

TREVICTA m'għandux jintuża sabiex jikkontrolla stati ta' aġitazzjoni akuta jew stati psikotiċi severi meta jkun meħtieġ kontroll immedjat tas-sintomi.

Intervall QT

Għandha tintuża l-kawtela meta paliperidone jiġi ordnat b'riċetta lill-pazjenti b'mard kardjovaskulari magħruf jew bi QT mtawwal fl-istorja tal-familja, u fl-użu flimkien ma' prodotti mediċinali oħrajn maħsuba li jtaqlu l-intervall QT.

Sindrom newrolettiku malinn

Is-Sindrom Newrolettiku Malinn (NMS), ikkaratterizzat minn ipertermija, riġidità fil-muskoli, nuqqas ta' stabbiltà awtonomika, koxjenza mibdula, u livelli għoljin ta' creatine phosphokinase fis-serum ġie rrapportat li jseħh b'paliperidone. Sinjali kliniċi oħrajn jistgħu jinkludu mijoglubinurja (rabdomijolizi) u insuffiċjenza akuta tal-kliewi. Jekk pazjent jiżviluppa sinjali jew sintomi li jindikaw NMS, paliperidone għandu jitwaqqaf. Għandha titqies il-karatteristika ta' TREVICTA li jaħdem fit-tul.

Diskajneżja tardiva/sintomi ekstrapiramidali

Prodotti mediċinali b'karatteristiċi antagonistiċi għar-riċettur ta' dopamine ġew assoċjati mal-induzzjoni ta' diskajneżja tardiva kkaratterizzata minn ċaqliq ritmiku involontarju, l-iktar tal-ilsien u/jew tal-wiċċ. Jekk jidhru s-sinjali u s-sintomi ta' diskajneżja tardiva, għandu jitqies it-twaqqif tal-antipsikotiċi kollha, inkluż ta' paliperidone. Għandha titqies il-karatteristika ta' TREVICTA li jaħdem fit-tul.

Hija meħtieġa l-kawtela f' pazjenti li jkunu qed jirċievu, psikostimulanti (eż., methylphenidate) flimkien ma' paliperidone, minħabba li jistgħu jfiġġu sintomi ekstrapiramidali meta jiġi aġġustat prodott mediċinali minnhom jew it-tnejn li huma. Huwa rrakkomandat li t-twaqqif tat-trattament bl-istimulant isir bil-mod (ara sezzjoni 4.5).

Lewkopenija, newtrogenija, u agranuloċitozi

Każijiet ta' lewkopenija, newtrogenija, u agranuloċitozi ġew irrappurtati b' paliperidone. Pazjenti bi storja ta' għadd baxx ta' ċelluli bojod fid-dem (WBC - *white blood cell*) sinifikanti b' mod kliniku jew lewkopenija/newtrogenija kkaġunata minn mediċina għandhom jiġu mmonitorjati waqt l-ewwel ftit xhur tat-terapija u għandu jiġi kkunsidrat it-twaqqif ta' TREVICTA mal-ewwel sinjal ta' tnaqqis fil-WBC sinifikanti b' mod kliniku fin-nuqqas ta' fatturi oħra li jistgħu jikkawżaw dan. Pazjenti b' newtrogenija sinifikanti b' mod kliniku għandhom jiġu mmonitorjati b' attenzjoni għal deni jew sintomi oħra jew sinjali ta' infezzjoni u għandhom jiġu ttrattati minnufih jekk iseħħu sintomi jew sinjali bħal dawn. Pazjenti b' newtrogenija qawwija (għadd assolut ta' newtrofili < 1 X 10⁹/L) għandhom iwaqqfu TREVICTA u għandu jkollhom il-WBC segwiti sakemm jirkupraw. Għandha titqies il-karatteristika ta' TREVICTA li jaħdem fit-tul.

Reazzjonijiet ta' sensitività eċċessiva

Reazzjonijiet ta' sensitività eċċessiva jistgħu jseħħu anke f' pazjenti li qabel ikunu ttolleraw risperidone li jittiehed mill-ħalq jew paliperidone li jittiehed mill-ħalq (ara sezzjoni 4.8).

Iperglicemija u dijabete mellitus

Iperglicemija, dijabete mellitus, u dijabete mellitus li tkun diġà preżenti u ssir aġġar, inkluż koma tad-dijabete u ketoacidozi, kienu rrappurtati b' paliperidone. Huwa rrakkomandat monitoraġġ kliniku xieraq skont il-linji gwida li qed jiġu użati għall-antipsikotiċi. Il-pazjenti ttrattati bi TREVICTA għandhom jiġu mmonitorjati għal sintomi ta' iperglicemija (bħal polidipsja, poliurja, polifaġġa, u dgħufija) u pazjenti b' dijabete mellitus għandhom jiġu mmonitorjati b' mod regolari għal kontroll tal-glukows li jmur għall-aġġar.

Żieda fil-piż

Ġiet irrappurtata żieda sinifikanti fil-piż bl-użu ta' TREVICTA. Il-piż għandu jiġi mmonitorjat b' mod regolari.

Użu f' pazjenti b' tumuri jiddependu mill-prolaktin

L-istudji tat-tkabbir tat-tessuti jissuġġerixxu li t-tkabbir taċ-ċelloli fit-tumuri tas-sider tal-bniedem jista' jkun stimulat mill-prolaktin. Għalkemm s'issa għadha ma ntweriet l-ebda assoċjazzjoni ċara mal-ghoti ta' antipsikotiċi fl-istudji kliniċi u epidemjoloġiċi, hija rrakkomandata l-kawtela f' pazjenti bi storja medika rilevanti. Paliperidone għandu jintuża b' kawtela f' pazjenti li diġà jkollhom tumor li jista' jkun jiddependi mill-prolactin.

Ipotensjoni ortostatika

F' xi pazjenti, paliperidone jista' jinduċi ipotensjoni ortostatika minħabba l-azzjoni tiegħu li jimblokka r-riċetturi adrenerġiċi alfa. Fil-provi kliniċi ta' TREVICTA, 0.3% tal-individwi rrappurtaw reazzjoni avversa marbuta ma' ipotensjoni ortostatika. TREVICTA għandu jintuża b' kawtela f' pazjenti magħrufa li għandhom mard kardjovaskulari (eż., insuffiċjenza tal-qalb, infart mijokardjaku jew iskemija, anormalitajiet fit-trasmissjoni), mard ċerebrovaskulari, jew kundizzjonijiet li jippreddisponu l-pazjent għal ipotensjoni (eż., deidratazzjoni u ipovolimja).

Aċċessjonijiet

TREVICTA għandu jintuża b'kawtela f'pazjenti bi storja ta' aċċessjonijiet jew kundizzjonijiet oħra li jistgħu jnaqqsu l-limitu li fih isseħħ aċċessjoni.

Indeboliment tal-kliewi

Il-konċentrazzjonijiet ta' paliperidone fil-plażma jizdiedu f'pazjenti b'indeboliment tal-kliewi. Għal pazjenti b'indeboliment hafif tal-kliewi (tneħħija tal-kreatinina ≥ 50 mL/min sa < 80 mL/min), id-doża għandha tiġi aġġustata u l-pazjent għandu jiġi stabilizzat bl-użu ta' paliperidone palmitate ta' kull xahar li jista' jiġi injettat, imbagħad jgħaddi għal TREVICTA. TREVICTA mhuwiex irrakkomandat f'pazjenti b'indeboliment moderat jew qawwi tal-kliewi (tneħħija tal-kreatinina < 50 mL/min). (Ara t-taqsimiet 4.2 u 5.2).

Indeboliment tal-fwied

M'hemm l-ebda dejta disponibbli f'pazjenti b'indeboliment sever tal-fwied (klassi C ta' Child-Pugh). Hija rrakkomandata l-kawtela jekk paliperidone jintuża f'dawn il-pazjenti.

Pazjenti anzjani bid-dimenzja

TREVICTA ma ġiex studjat f'pazjenti anzjani bid-dimenzja. TREVICTA mhuwiex irrakkomandat għat-trattament ta' pazjenti anzjani bid-dimenzja minhabba ż-żieda fir-riskju ta' mortalità totali u reazzjonijiet ċerebrovaskulari avversi.

L-esperjenza minn risperidone kkwotata hawn taht hija meqjusa valida wkoll għal paliperidone.

Mortalità totali

F'meta-analiżi ta' 17-il prova klinika kkontrollata, pazjenti anzjani bid-dimenzja ttrattati b'antipsikotiċi atipiċi oħrajn, inkluż risperidone, aripiprazole, olanzapine, u quetiapine kellhom zieda fir-riskju ta' mortalità meta mqabbla ma' dawk li ħadu placebo. Fost dawk ittrattati b'risperidone, il-mortalità kienet 4% meta mqabbla ma' 3.1% għall-placebo.

Reazzjonijiet ċerebrovaskulari avversi

Dehret zieda ta' madwar 3 darbiet fir-riskju ta' reazzjonijiet ċerebrovaskulari avversi fi provi kliniċi fejn il-pazjenti ntgħażlu b'mod arbitrarju, ikkontrollati bi placebo fil-popolazzjoni bid-dimenzja b'xi antipsikotiċi atipiċi, inkluż risperidone, aripiprazole, u olanzapine. Il-mekkaniżmu għaż-żieda f'dan ir-riskju mhuwiex magħruf.

Marda ta' Parkinson u dimenzja b'korpi Lewy

It-tobba għandhom iqisu r-riskji u l-benefiċċji meta jordnaw TREVICTA lill-pazjenti bil-marda ta' Parkinson jew b'Dimenzja b'Korpi Lewy (DLB - *Dementia with Lewy Bodies*) billi ż-żewġ gruppi jista' jkollhom riskju oġġa tas-Sindrom Newrolettiku Malinn, kif ukoll zieda fis-sensittività għall-antipsikotiċi. Il-manifestazzjoni ta' din iż-żieda fis-sensittività tista' tinkludi konfużjoni, tnaqqis kbir fil-livell ta' koxxjenza, instabilità fil-qagħda li twassal għal waqgħat frekwenti, flimkien ma' sintomi ekstrapiramidali.

Prijapiżmu

Prodotti mediċinali antipsikotiċi (inkluż paliperidone) li għandhom effetti ta' mblukkar alfa adrenergiku ġew irrappurtati li jikkawżaw prijapiżmu. Il-pazjenti għandhom jiġu infurmati biex ifittxu kura medika urgenti f'każ li l-prijapiżmu ma jitlaqx fi żmien 4 sigħat.

Regolazzjoni tat-temperatura tal-ġisem

Tfixkil fil-hila tal-ġisem li jnaqqas it-temperatura tal-qalba tal-ġisem ġie attribwit lill-prodotti mediċinali antipsikotiċi. Hija rrakkomandata attenzjoni xierqa meta TREVICTA jiġi ordnat lill-

pazjenti li jkun ser ikollhom kundizzjonijiet li jistgħu jikkontribwixxu għal zieda fit-temperatura tal-qalba tal-ġisem, eż. eżerċizzju qawwi, esponiment għal shana estrema, it-tehid fl-istess hin ma' prodotti mediċinali b'attività antikolinerġika jew ikunu soġġetti għal deidratazzjoni.

Tromboemboliżmu fil-vini

Każijiet ta' tromboemboliżmu fil-vini (VTE - *venous thromboembolism*) kienu rrapportati bi prodotti mediċinali antipsikotiċi. Minhabba li pazjenti ttrattati b'antipsikotiċi ta' spiss ikollhom fatturi ta' riskju akkwistati għal VTE, il-fatturi kollha ta' riskju għal VTE għandhom jiġu identifikati qabel u waqt il-kura bi TREVICTA u għandhom jittieħdu miżuri ta' prevenzjoni.

Effett antiemetiku

Ġie osservat effett antiemetiku fi studji qabel dawk kliniċi b'paliperidone. Dan l-effett, jekk isehh fil-bnedmin, jista' jostor is-sinjali u s-sintomi ta' doża eċċessiva b'ċerti prodotti mediċinali jew ta' kundizzjonijiet bħal sadda intestinali, is-sindrom ta' Reye u tumur fil-moħħ.

Għoti

Għandu jkun hemm attenzjoni biex jiġi evitat li TREVICTA jingħata go vina.

Sindrom Intraoperattiv tal-Habba li Titharrek

Is-sindrom intraoperattiv tal-habba li titharrek (IFIS - *Intraoperative Floppy Iris Syndrome*) ġie osservat waqt operazzjonijiet tal-kataretti f'pazjenti ttrattati b'mediċini b'effett antagonist għar-riċettur adrenergiku alfa 1a, bħal ma huwa TREVICTA (ara sezzjoni 4.8).

IFIS jista' jżid ir-riskju ta' kumplikazzjonijiet fl-għajn waqt u wara l-operazzjoni. L-użu attwali jew fil-passat ta' mediċini b'effett antagonista għar-riċettur adrenergiku alfa 1a għandu jkun mgħarraf bih il-kirurgu oftalmiku minn qabel l-operazzjoni. Il-benefiċċju possibbli li titwaqqaf it-terapija li timblokka alfa 1 qabel l-operazzjoni tal-kataretti ma ġiex stabbilit u għandu jitqies kontra r-riskju li titwaqqaf it-terapija antipsikotika.

Eċċipjenti

Dan il-prodott mediċinali fih inqas minn 1 mmol ta' sodium (23 mg) f'kull doża, jiġifieri, huwa essenzjalment mingħajr sodium.

4.5 Interazzjoni ma' prodotti mediċinali ohra u forom ohra ta' interazzjoni

Hija rakkomkandata l-kawtela meta TREVICTA jiġi ordnat ma' prodotti mediċinali magħrufa li jtaflu l-intervall QT, eż. antiarritmiċi tal-klassi IA, (eż., quinidine, disopyramide) u antiarritmiċi tal-klassi III (eż., amiodarone, sotalol), xi antistaminiċi, xi antibijotiċi (eż., fluoroquinolones), xi antipsikotiċi oħrajn, u xi mediċini kontra l-malarja (eż., mefloquine). Din il-lista hija indikattiva biss u mhijiex komprensiva.

Il-potenzjal ta' TREVICTA li jaffettwa mediċini oħra

Paliperidone mhuwiex mistenni li jikkawża interazzjonijiet farmakokinetiċi importanti b'mod kliniku ma' prodotti mediċinali li huma metabolizzati bl-isozimi taċ-ċitokrom P450.

Meta wiehed iqis l-effetti primarji fuq is-sistema ċentrali nervuża (CNS - *central nervous system*) ta' paliperidone (ara sezzjoni 4.8), TREVICTA għandu jintuża b'kawtela meta jittieħed flimkien ma' prodotti mediċinali oħra li għandhom azzjoni ċentrali eż. anksjolitiċi, il-biċċa l-kbira tal-antipsikotiċi, ipnotiċi, opjojdi, eċċ. jew l-alkoħol.

Paliperidone jista' jantagonizza l-effett ta' levodopa u agonisti oħra tad-dopamina. Jekk it-teħid ta' dawn it-tnejn flimkien jitqies meħtieġ, speċjalment fl-aħħar fażi tal-marda ta' Parkinson, għandha tiġi ordnata l-iktar doża baxxa effettiva ta' kull trattament.

Minħabba l-potenzjal li għandu li jikkaguna ipotensjoni ortostatika (ara sezzjoni 4.4), jista' jiġi osservat effett kumulattiv meta TREVICTA jingħata ma' prodotti mediċinali oħra li għandhom dan il-potenzjal eż. antipsikotiċi oħrajn, triċikliċi.

Hija rrakkomandata l-kawtela jekk paliperidone jingħata flimkien ma' prodotti mediċinali oħra magħrufa li jnaqqsu l-limitu li fih isseħħ aċċessjoni (i.e., phenothiazines jew butyrophenones, triċikliċi jew SSRIs, tramadol, mefloquine eċċ).

L-għoti mill-ħalq ta' pilloli ta' paliperidone li jerħu l-mediċina fit-tul fl-istat fiss (12-il mg darba kuljum) flimkien mal-pilloli ta' divalproex sodium li jerħu l-mediċina fit-tul (500 mg sa 2 000 mg darba kuljum) ma affettwax il-farmakokinetika ta' valproate fl-istat fiss.

Ma sar l-ebda studju dwar interazzjoni bejn TREVICTA u lithium, madankollu, mhuwiex probabbli li sseħħ interazzjoni farmakokinetika.

Il-potenzjal li mediċini oħrajn jaffettwaw TREVICTA

Studji *in vitro* jindikaw li CYP2D6 u CYP3A4 jistgħu jkunu involuti b'mod minimu fil-metaboliżmu ta' paliperidone, iżda ma hemm l-ebda indikazzjonijiet *in vitro* jew *in vivo* li dawn l-isozimi għandhom sehem sinifikanti fil-metaboliżmu ta' paliperidone. L-għoti ta' paliperidone orali flimkien ma' paroxetine, inibitur qawwi ta' CYP2D6, ma wera l-ebda effett sinifikanti b'mod kliniku fuq il-farmakokinetika ta' paliperidone.

L-għoti darba kuljum mill-ħalq ta' paliperidone li jintreħa bil-mod ma' 200 mg ta' carbamazepine darbtejn kuljum ikkawża tnaqqis ta' madwar 37% fil-medja tas- C_{max} u l-AUC ta' paliperidone fl-istat fiss. Dan it-tnaqqis huwa kkawżat, fil-parti l-kbira, minn żieda ta' 35% fit-tneħħija ta' paliperidone mill-kliewi aktarx minħabba l-induzzjoni ta' P-gp tal-kliewi b' carbamazepine. Tnaqqis żgħir fl-ammont tas-sustanza attiva li titneħħa mhux mibdula mal-awrina jissuġġerixxi li f'tit kien hemm effett fuq il-metaboliżmu ta' CYP jew il-bijodisponibiltà ta' paliperidone waqt l-għoti tiegħu ma' carbamazepine. Jista' jseħħ tnaqqis ikbar fil-konċentrazzjonijiet ta' paliperidone fil-plażma b' dozi ikbar ta' carbamazepine. Malli jinbeda carbamazepine, id-doża ta' TREVICTA għandha tiġi evalwata mill-ġdid u jekk hemm bżonn għandha tizzied. Bil-maqlub, meta carbamazepine jitwaqqaf, id-doża ta' TREVICTA għandha tiġi evalwata mill-ġdid u jekk hemm bżonn għandha titnaqqas. Għandha titqies il-karatterisitka ta' TREVICTA li jaħdem fit-tul.

L-għoti ta' doża waħda mill-ħalq ta' pillola ta' 12-il mg ta' paliperidone li terħi l-mediċina bil-mod flimkien mal-pilloli ta' divalproex sodium li jerħu l-mediċina bil-mod (żewġ pilloli ta' 500 mg darba kuljum) wassal għal żieda ta' madwar 50% fis- C_{max} u l-AUC ta' paliperidone, aktarx minħabba żieda fl-assorbiment orali. Minħabba li ma gie osservat l-ebda effett fuq it-tneħħija sistemika, mhijiex mistennija interazzjoni sinifikanti b'mod kliniku bejn il-pilloli ta' divalproex sodium li jerħu l-mediċina bil-mod u l-injezzjoni fil-muskolu ta' TREVICTA. Din l-interazzjoni ma gietx studjata bi TREVICTA

L-użu ta' TREVICTA flimkien ma' risperidone jew paliperidone li jittieħed mill-ħalq

Minħabba li paliperidone huwa l-metabolit priċipali attiv ta' risperidone, għandha tintuża l-kawtela meta TREVICTA jingħata flimkien ma' risperidone jew ma' paliperidone li jittieħed mill-ħalq għal perjodi twal ta' żmien. Dejta ta' sigurtà li tinvolvi l-użu ta' TREVICTA flimkien ma' antipsikotiċi oħra hija limitata.

L-użu konkomitanti ta' TREVICTA ma' psikostimulanti

L-użu ta' psikostimulanti (eż., methylphenidate) flimkien ma' paliperidone jista' jwassal għal sintomi ekstrapiramidali meta jkun hemm bidla fi trattament wiehed jew fit-tnejn li huma (ara sezzjoni 4.4).

4.6 Fertilità, tqala u treddigh

Tqala

M'hemmx tagħrif biżżejjed dwar l-użu ta' paliperidone waqt it-tqala. Paliperidone palmitate injettat fil-muskolu u paliperidone mogħti mill-ħalq ma kinux teratoġeniċi fi studji fuq l-annimali, iżda deħru forom oħra ta' tossiċità fir-riproduzzjoni (ara sezzjoni 5.3). Trabi tat-twelid esposti għal paliperidone matul it-tielet trimestru tat-tqala huma f'riskju ta' reazzjonijiet avversi inkluż sintomi ekstrapiramidali u/jew sintomi ta' waqfien ta' medicina li tivvizzja li jistgħu jvarjaw fis-severità u f'kemm idumu wara t-twelid. Kien hemm rapporti ta' aġitazzjoni, ipertonja, ipotonja, roġħda, hedla, diffikultà respiratorja, jew disturb fit-teħid tal-ħalib. Konsegwentament, trabi tat-twelid għandhom jiġu mmonitorjati b'attenzjoni. TREVICTA m'għandux jintuża matul it-tqala ħlief jekk ikun meħtieġ b'mod ċar.

Minħabba li paliperidone ġie nnutat fil-plażma sa 18-il xahar wara doża waħda ta' TREVICTA, għandha titqies il-karattersitika li TREVICTA jaħdem fit-tul minħabba li esponiment tal-omm għal TREVICTA qabel u waqt it-tqala jista' jwassal għal reazzjonijiet avversi fit-tarbija tat-twelid.

Treddigh

Paliperidone jiġi eliminat fil-ħalib tas-sider tant li aktarx ikun hemm effetti fuq it-trabija li qed titredda' jekk jingħataw dozi terapewtiċi lil nisa li qed ireddgħu. Minħabba li paliperidone ġie nnutat fil-plażma sa 18-il xahar wara għoti ta' doża waħda ta' TREVICTA, għandha titqies il-karattersitika li TREVICTA jaħdem fit-tul minħabba li trabi li qed jitreddgħu jistgħu jkunu f'riskju anke minn TREVICTA li ngħata ħafna qabel it-treddigh. TREVICTA m'għandux jintuża waqt it-treddigh.

Fertilità

Ma ġewx osservati effetti rilevanti fl-istudji mhux kliniċi.

4.7 Effetti fuq il-hila biex issuq u thaddem magni

Paliperidone jista' jkollu influwenza żgħira jew influwenza moderata fuq il-kapaċità ta' sewqan u thaddim ta' magni minħabba l-effetti possibbli fuq is-sistema nervuża u l-vista, bħal sedazzjoni, ngħas, sinkope, vista mċajpra (ara sezzjoni 4.8). Għalhekk il-pazjenti għandhom jingħataw parir biex ma jsuqux u ma jhaddmux magni sakemm tkun magħrufa s-suxxettibilità individwali tagħhom għal TREVICTA.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta' sigurtà

L-aktar reazzjonijiet avversi osservati b'mod frekwenti rrapportati f' $\geq 5\%$ tal-pazjenti f'żewġ provi kliniċi kkontrollati ta' TREVICTA fejn la l-individwi u lanqas l-investigaturi ma kienu jafu liema medicina qed tintuża kienu žieda fil-piż, infezzjoni fin-naħa ta' fuq tal-apparat tan-nifs, ansjetà, uġiġħ ta' ras, insomnja, u reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni.

Lista ta' reazzjonijiet avversi miġbura f'tabella

Dawn li li ġejjin huma kollha reazzjonijiet avversi li ġew irrapportati b'paliperidone skont il-kategorija ta' frekwenza stmata minn provi kliniċi b'paliperidone palmitate. Intużaw dawn it-termini u l-frekwenzi: *komuni ħafna* ($\geq 1/10$); *komuni* ($\geq 1/100$ sa $< 1/10$); *mhux komuni* ($\geq 1/1000$ sa $< 1/100$);

rari ($\geq 1/10\ 000$ sa $< 1/1\ 000$); rari ħafna ($< 1/10\ 000$); u mhux magħruf (ma tistax tittiehed stima mid-data disponibbli).

Klassi tas-sistemi u tal-organi	Reazzjonijiet avversi				
	Frekwenza				
	Komuni Hafna	Komuni	Mhux komuni	Rari	Mhux magħruf ^a
Infezzjonijiet u infestazzjonijiet		infezzjoni fil-parti ta' fuq tal-apparat tan-nifs, infezzjoni fl-apparat tal-awrina, influwenza	pulmonite, bronkite, infezzjoni fl-apparat tan-nifs, sinusite, ċistite, infezzjoni fil-widna, tonsillite, onikkomikozi, ċellulite, axxess taht il-ġilda	infezzjoni fl-ghajn, akarodermatite	
Disturbi tad-demem u tas-sistema limfatika			tnaqqis fl-ghadd taċ-ċelluli tad-demem bojod, anemija	newtropenija, tromboċitopenija, żieda fl-ghadd tal-eosinofili	agranuloċitozi
Disturbi fis-sistema immuni			sensittività eċċessiva		reazzjoni anafilattika
Disturbi fis-sistema endokrinarja		iperprolaktinimja ^b		tnixxija mhux xierqa tal-ormon antidijuretiku, glukows preżenti fl-awrina	
Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni		iperglicemija, żieda fil-piż, tnaqqis fil-piż, tnaqqis fl-aptit	dijabete mellitus ^d , iperinsulinemija, żieda fl-aptit, anoreksja, żieda fit-trigliceridi fid-demem, żieda fil-kolesterol fid-demem	ketoaciidozi tad-dijabete, ipoglicemija, polidipsja	intossikazzjoni mill-ilma
Disturbi psikjatriċi	insomnja ^e	aġitazzjoni, depressjoni, ansjeta	disturb fl-irqad, manija, tnaqqis fil-libido, nervożità, ħmar il-lejl	katatonja, stat ta' konfużjoni, somnambulizmu, tnaqqis kbir fl-espressjoni tal-emozzjonijiet, ma jinkisibx orgażmu	disturb fil-kwantità ta' ikel li wiehed jiekol, marbut mal-irqad
Disturbi fis-sistema nervuża		parkinsoniżmu ^c , akatisja ^c , sedazzjoni/ hedla tan-ngha, distonja ^c , sturdament, diskajneżja ^c , roġħda, uġiġħ ta' ras	diskajneżja tardiva, sinkope, attivita psikomotorja eċċessiva, sturdament skont il-qagħda, disturb fl-attenzjoni, disartrija, disgewżja, ipoestesija, parestesija	sindrom newrolettiku malinn, iskemija fil-moħħ, mingħajr rispons għall-istimuli, telf mis-sensi, livelli depressi ta' koxjenza, konvulżjoni ^e , disturb fil-bilanċ, koordinazzjoni mhux normali, ras tirtogħod	koma tad-diajbete
Disturbi fl-ghajnejn			vista mċajpra, konguntivite, ghajn xotta	glawkoma, disturb fiċ-ċaqliq tal-ghajnejn, qlib tal-ghajnejn, fotofobja, żieda fid-dmugh, iperimja fl-ghajn	sindrom tal-habba li tiċċaqlaq (intraoperattiv)
Disturbi fil-widnejn u fis-sistema labirintika			vertigo, żanzin fil-widnejn, uġiġħ fil-widna		

Disturbi fil-qalb		takikardija	imblokk atriyoventrikulari, disturb ta' konduzzjoni tal-impulsi elettrici tal-qalb, intervall QT tal-elettrokardjogramma mtawwal, sindrom ta' takikardija ortostatika tal-qagħda, bradikardija, elettrokardjogramma mhux normali, palpazzjonijiet	fibrillazzjoni tal-atriju, aritmija tas-sinus	
Disturbi vaskulari		ipertensjoni	ipotensjoni, ipotensjoni ortostatika	emboliżmu fil-pulmuni, trombozi fil-vini, fwawar	iskemija
Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali		soghla, kongestjoni fl-immieher	qtuġh ta' nifs, uġiġh fil-faringi u l-laringi, tinfaġar mill-immieher	sindrom ta' apnea waqt l-irqad, kongestjoni fil-pulmuni, kongestjoni fil-passaġġ tan-nifs, hsejjes mill-pulmun man-nifs, tharhir	tehid tan-nifs mghaġġel, pulmonite minhabba ġbid tal-kontenut tal-istonku man-nifs, disfonja
Disturbi gastrointestinali		uġiġh fl-addome, rimettar, nawsjia, stitikezza, dijarea, dispepsja, uġiġh fis-snien	skumdità fl-addome, gastroenterite, disfaġja, ħalq xott, gass	pankreatite, imblokk fil-musrana, ilsien minfuh, inkontinenza tal-ippurgar, fikaloma, kejlite	ileus
Disturbi fil-fwied u fil-marrara		zieda fit-transaminases	zieda fil-gamma-glutamyltransferrase, zieda fl-enzimi tal-fwied		suffejra
Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta' taħt il-ġilda			urtikarja, prurite, raxx, alopeċja, ġilda xotta, eritema, akne	reazzjoni fil-ġilda mill-medicina, iperkeratozi, dermatite tas-sabborea, brija	sindrome ta' Stevens-Johnson/nekrolizi tossika tal-epidermide, anġioedima, telf ta' kulur fil-ġilda
Disturbi muskuloskelettriċi u tat-tessuti konnettivi		uġiġh muskuloskelettriku, uġiġh fid-dahar, artralġja	zieda fil-creatine phosphokinase fid-dem, spażmi fil-muskoli, ebusija fil-ġogi, dghufija fil-muskoli	rabdomijolisi, nefha fil-ġogi	qagħda mhux normali
Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja			inkontinenza tal-awrina, pollakijurja, disurja	żamma tal-awrina	
Kondizzjonijiet ta' waqt it-tqala, il-ħlas u wara l-ħlas					sidrom ta' twaqqif ta' medicina li tivvizzja fi trabi tat-twelid (ara sezzjoni 4.6)
Disturbi fis-sistema riproduttiva u fis-sider		amenorrea	impotenza, disturb fl-eġakulazzjoni, disturb fil-menstrwazzjoni ^e , ġinekomastja, galaktorea, funzjoni sesswali ħażina, uġiġh fis-sider	prijapiżmu, skumdità fis-sider, kongestjoni fis-sider, tkabbir fis-sider, tnixxija mill-vagina	

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta' mnejn jinghata		deni, astenja, gheja kbira, reazzjoni fil-post tal-injezzjoni	edima fil-wiċċ, edima ^e , żieda fit-temperatura tal-ġisem, mixi mhux normali, uġiġh fis-sider, skumdità fis-sider, telqa tal-ġisem minghajr sinjali ta' mard, ebusija	ipotermja, tkexkix ta' bard, ghatx, sindrom ta' twaqqif ta' medicina li tivvizzja, axxess fil-post tal-injezzjoni, ċellulite fil-post tal-injezzjoni, ċesta fil-post tal-injezzjoni, ematoma fis-sit tal-injezzjoni	tnaqqis fit-temperatura tal-ġisem, nekrozi fil-post tal-injezzjoni, ulċera fil-post tal-injezzjoni
Korriment, avvalenament u komplikazzjonijiet ta' xi proċedura			waqgħa		

- ^a Il-frekwenza tar-reazzjonijiet avversi hija kkwalifikata bħala "mhux magħrufa" minhabba li dawn ma kinux osservati fil-provi kliniċi b'paliperidone palmitate. Dawn jew ittiehdu minn rapporti spontanji wara t-tqegħid fis-suq u l-frekwenza tagħhom ma' tistax tiġi determinata, jew ittiehdu minn risperidone (kwalunkwe formulazzjoni) jew minn dejta minn provi kliniċi u/jew rapporti minn wara t-tqegħid fis-suq ta' paliperidone li ngħata orali.
- ^b Irreferi għal 'Iperprolaktinimja' taħt.
- ^c Irreferi għal 'Sintomi ekstrapiramidali' taħt.
- ^d Fi provi kkontrollati bi placebo, dijabete mellitus kienet irrappurtata f'0.32% tal-individwi trattati b'paliperidone palmitate kull xahar li jista' jiġi injettat meta mqabbla ma' rata ta' 0.39% fil-grupp tal-placebo. L-inċidenza globali mill-provi kliniċi kollha kienet ta' 0.65% fl-individwi kollha trattati b'paliperidone palmitate ta' kull xahar li jista' jiġi injettat.
- ^e **Insomnja tinkludi:** insomnja fil-bidu tal-irqad, insomnja f'nofs l-irqad; **Konvulzjoni tinkludi:** konvulzjoni grand mal; **Edima tinkludi:** edima mifruxa, edima periferali, edima bl-iffossar; **Disturb fil-menstrwazzjoni tinkludi:** menstrwazzjoni tittardja, menstrwazzjoni irregolari, oligomenorrea.

Effetti mhux mixtieqa nnutati bil-formulazzjonijiet ta' risperidone

Paliperidone huwa l-metabolit attiv ta' risperidone, għalhekk, il-profilu tar-reazzjonijiet avversi ta' dawn is-sustanzi (inkluż kemm il-formolazzjonijiet li jittiehdu mill-ħalq u li jiġu injettati) huma rilevanti għal xulxin.

Deskrizzjoni ta' reazzjonijiet avversi magħżula

Reazzjoni anafilattika

B'mod rari, ġew irrappurtati każijiet ta' reazzjoni anafilattika wara injezzjoni b'paliperidone palmitate ta' kull xahar li jista' jiġi injettat waqt esperjenza ta' wara t-tqegħid fis-suq f'pazjenti li qabel kienu ttolleraw risperidone li jittiehed mill-ħalq jew paliperidone li jittiehed mill-ħalq (ara sezzjoni 4.4).

Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni

Fi provi kliniċi ta' TREVICTA, 5.3% tal-individwi rrappurtaw reazzjoni avversa marbuta mal-post tal-injezzjoni. L-ebda waħda minn dawn il-każijiet ma kienu serji jew wasslu għat-twaqqif tal-injezzjoni. Abbażi tal-istimi tal-investigaturi, ebusija, ħmura u nefha ma kinux preżenti jew kienu ħfief f' $\geq 95\%$ tal-valutazzjonijiet. Uġiġh fis-sit tal-injezzjoni stmat mill-individwi abbażi ta' skala analoga viżwali kien ftit u naqas fl-intensità maż-żmien.

Sintomi ekstrapiramidali (EPS - extrapyramidal symptoms)

Fil-provi kliniċi ta' TREVICTA, akatisja, diskineżja, distonja, parkinsoniżmu u roġħda kienu rrappurtati fi 3.9%, 0.8%, 0.9%, 3.6%, u 1.4% tal-individwi, rispettivament.

Sintomi ekstrapiramidali (EPS) kienu jinkludu gabra ta' analiżi t-termini li ġejjin: parkinsonism (jinkludi disturb ekstrapiramidali, sintomi ekstrapiramidali, fenomenu ta' fażijiet ta' immobiltà jinbidlu f'fażijiet ta' mobiltà, marda ta' Parkinson, kriżi parkinsonjana, ħruġ eċċessiv ta' bżieq, ebusija muskoluskeletrika, parkinsoniżmu, tleġhib, riġidità b'movimenti qishom ta' rota tal-ingranaġġ, bradikinesja, ipokinesja, wiċċ qisu b'maska, ebusija fil-muskoli, akinesija, riġidità fl-għonq, riġidità fil-muskoli, mixja parkinsonjana, rifless glabellari mhux normali, roġħda ta' parkinson ta' waqt il-mistrieħ), akatisja (tinkludi akatisja, nuqqas ta' kwiet, iperkinesja, u sindrom ta' riġel b'nuqqas ta')

kwiet), diskajneżja (diskajneżja, korea, disturb fiċ-ċaqliq, ġbid tal-muskoli għall-għarrieda, koreoatatozi, atetozi, u mijoklonus), distonja (tinkludi distonja, spażmu tal-għonq tal-utru, emprostotonus, križi ta' qlib tal-għajnejn, distonja oromandibulari, risus sardonius, tetanja, ipertonja, tortikollis, ġbid involontarju tal-muskoli, kontrattura tal-muskoli, blefarospażmu, qlib tal-għajnejn o, paraliżi tal-ilsien, spażmu fil-wiċċ, spażmu fil-laringi, mijotonja, opistotonus, spażmu orofaringali, plewrototonus, spażmu fil-ilsien u trismus), u roghda.

Żieda fil-piż

Fl-istudju fit-tul ta' waqfien tal-medicina fejn il-pazjenti ntgħażlu b' mod arbitrarju, żidiet mhux normali ta' $\geq 7\%$ fil-piż tal-ġisem mill-linja bażi sal-iskop finali fejn la l-investigaturi u lanqas l-individwi ma kienu jafu liema sustanza qed tintuża, ġew irrappurtati għal 10% tal-individwi fil-grupp ta' TREVICTA u 1% tal-grupp tal-plaċebo. Kontra ta' dan, tnaqqis mhux normali fil-piż tal-ġisem ($\geq 7\%$) mill-linja bażi sal-iskop finali fejn la l-investigaturi u lanqas l-individwi ma kienu jafu liema sustanza qed tintuża kienu irrappurtati għal 1% tal-individwi fil-grupp ta' TREVICTA u 8% tal-individwi fil-grupp tal-plaċebo. Il-bidliet medji fil-piż tal-ġisem mill-linja bażi sal-iskop finali fejn la l-investigaturi u lanqas l-individwi ma kienu jafu liema sustanza qed tintuża kienu +0.94 kg u -1.28 kg għall-gruppi ta' TREVICTA u tal-plaċebo, rispettivament.

Iperprolaktinimja

Matul il-fażi fejn la l-investigaturi u lanqas l-individwi li ntgħażlu b' mod każwali ma kienu jafu liema sustanza qed tintuża tal-istudju fit-tul ta' twaqqif tal-medicina, ġew innutati żidiet fil-livelli tal-prolaktin aktar mill-firxa ta' riferenza (> 13.13 ng/mL fl-irġiel u > 26.72 ng/mL fin-nisa) fi proporzjon ikbar fl-irġiel u fin-nisa fil-grupp ta' TREVICTA milli fil-grupp tal-plaċebo (9% vs. 3% u 5% vs. 1%, rispettivament). Fil-grupp ta' TREVICTA, il-medja tal-bidla mill-linja bażi sal-iskop finali fejn la l-investigaturi u lanqas l-individwi ma kienu jafu liema sustanza qed tintuża kienet +2.90 ng/mL għall-irġiel (vs. -10.26 ng/mL fil-grupp ta' plaċebo) u +7.48 ng/mL għan-nisa (vs. -32.93 ng/mL fil-grupp tal-plaċebo). Mara waħda (2.4%) fil-grupp ta' TREVICTA kellha reazzjoni avversa ta' amenorrea, filwaqt li ma ġew innutati l-ebda reazzjonijiet avversi possibbilment marbuta mal-prolaktin fost nisa fil-grupp tal-plaċebo. Ma kien hemm l-ebda reazzjonijiet avversi possibbilment marbuta mal-prolaktin fost irġiel fiż-żewġ gruppi.

Effetti tal-klassi

Titwil tal-intervall QT, aritmiji tal-ventrikulu (fibrillazzjoni tal-ventrikulu, takikardija tal-ventrikulu), mewt zoptu mingħajr spjegazzjoni, waqfien kardijaku, u Torsade de pointes jistgħu jseħħu bl-antipsikotiċi.

Każijiet ta' tromboemboliżmu fil-vini, inkluż każijiet ta' emboliżmu fil-pulmuni u każijiet ta' trombozi fil-vini fil-fond, ġew irrappurtati bi prodotti mediċinali antipsikotiċi (frekwenza mhux magħrufa).

Rappurtar ta' reazzjonijiet avversi ssuspettati

Huwa importanti li jiġu irrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professionisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrapportaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali elenkata f' Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

Sintomi

B' mod ġenerali, is-sinjali u s-sintomi li wieħed jistenna huma dawk li jiġu minn esaġerazzjoni tal-effetti farmakoloġiċi magħrufa ta' paliperidone, i.e., hedla u sedazzjoni, takikardja u ipotensjoni, titwil tal-intervall QT, u sintomi ekstrapiramidali. Torsade de pointes u fibrillazzjoni tal-ventrikulu ġew irrappurtati f' pazjent li ngħata doża eċċessiva ta' paliperidone orali. Fil-każ ta' doża eċċessiva akuta għandha tiġi kkunsidrata l-possibbiltà tal-involvement ta' iktar minn prodott mediċinali wieħed.

Immaniġġjar

Meta wiehed jistma t-trattament meħtieġ u l-irkupru, għandha titqies il-karatteristika li l-prodott mediċinali jerhi l-mediċina bil-mod u l-*half-life* twila ta' eliminazzjoni ta' paliperidone. M'hemmx antidot speċifiku għal paliperidone. Għandhom jintużaw miżuri generali ta' sostenn. Il-passaġġ tanifs għandu jinfetħ u jinżamm miftuħ biex tiġi aċċertata ossiġenazzjoni u ventilazzjoni adegwata.

Il-monitoraġġ kardjovaskulari għandu jibda mill-ewwel u għandu jinkludi monitoraġġ elettrokardjografiku kontinwu għall-possibbiltà ta' aritmiji. L-ipotensjoni u l-kollaps ċirkolatorju għandhom jiġu ttrattati b'miżuri xierqa bħal fluwidu fil-vina u/jew sustanzi simpatomimetici. Fil-każ ta' sintomi ekstrapiramidali qawwija, għandhom jingħataw sustanzi antikolinergici. Superviżjoni u monitoraġġ mill-qrib għandhom jitkoplew sakemm il-pazjent jirkupra.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Psikolettiċi, antipsikotiċi oħra. Kodiċi ATC: N05AX13

TREVICTA fih taħlita raċemika ta' paliperidone (+) u (-).

Mekkanizmu ta' azzjoni

Paliperidone huwa sustanza li timblokka b'mod selettiv l-effetti monoamini, li l-karatteristiċi farmakoloġiċi tiegħu huma differenti minn dawk ta' newrolettiċi tradizzjonali. Paliperidone jintrabat b'mod qawwi mar-riċetturi serotonergici 5-HT₂ u dopaminergici D₂. Paliperidone jimblokka wkoll riċetturi adrenergici alfa₁ u kemxejn inqas riċetturi istaminergici H₁ u adrenergici alfa₂. L-attività farmakoloġika tal-enantjomeri (+) u (-) ta' paliperidone hija simili mill-aspetti kwalitattivi kif ukoll kwantitattivi.

Paliperidone ma jintrabatx ma' riċetturi kolinerġiċi. Minkejja li paliperidone huwa antagonist qawwi ta' D₂, li hu maħsub li jtaffi s-sintomi tal-iskizofrenja, huwa jikkawża inqas katalessi u jnaqqas il-funzjonijiet motorji inqas minn newtrolettiċi tradizzjonali. Billi jiddomina l-antagonizmu b'mod ċentrali tas-serotonin jista' jnaqqas it-tendenza ta' paliperidone li jikkawża effetti ekstrapiramidali.

Effikaċja klinika

L-effikaċja ta' TREVICTA fil-manteniment tat-trattament tal-iskizofrenja f'individwi li ġew ittrattati b'mod sodisfaċenti għal mill-inqas erba' xhur b'paliperidone palmitate ta' kull xahar li jista' jiġi injettat u bl-aħħar żewġ dozi jkun b'doża tal-istess qawwa ġiet ivvalutata fi studju wiehed fit-tul ta' waqfien mill-mediċina, ikkontrollat bi placebo fejn la l-individwi li ntgħażlu b'mod arbitrarju u lanqas l-investigaturi ma kienu jafu liema mediċina kienet qed tintuża u studju wiehed ta' non-inferjorità fit-tul, ikkontrollat b'mod attiv, fejn la l-investigaturi u lanqas l-individwi ma kienu jafu liema mediċina qed tintuża. Għaż-żewġ studji, ir-risultat primarju kien ibbażat fuq rikaduta.

Fl-istudju fit-tul ta' waqfien tal-mediċina fejn l-individwi ntgħażlu b'mod arbitrarju, 506 individwi adulti li ssodisfaw il-kriterji DSM-IV għall-iskizofrenja ġew irregistrati go fazi ta' bidla fejn kemm l-investigaturi kif ukoll l-individwi kienu jafu li qed jiġu ttrattati b'dozi flessibbli ta' paliperidone palmitate ta' kull xahar li jista' jiġi injettat mogħti fil-muskolu deltojd jew gluteali (50-150 mg) għal 17-il ġimgħa (aġġustamenti fid-doża seħħew fil-ġimgħat 5 u 9). Total ta' 379 individwu mbaġħad irċivew doża waħda ta' TREVICTA jew fil-muskolu deltojd jew gluteali fil-fazi ta' stabilizzazzjoni fejn kemm l-investigaturi kif ukoll l-individwi kienu jafu x'sustanza qed tintuża (id-doża kienet multipla ta' 3.5 tal-aħħar doża ta' paliperidone palmitate ta' kull xahar). L-individwi li kienu meqjusa bħala stabbli b'mod kliniku fi tmiem il-fazi ta' 12-il ġimgħa ta' stabilizzazzjoni imbaġħad intgħażlu b'mod arbitrarju 1:1 biex jew jingħataw TREVICTA jew placebo fil-fazi ta' tul varjabbli fejn la l-

investigaturi u l-anqas l-individwi ma kienu jafu liema sustanza qed tintuża (id-doża ta' TREVICTA kienet l-istess bhall-ahhar doża li ngħatat matul il-perjodu ta' stabilizzazzjoni; din id-doża baqgħet fissa matul il-fażi fejn la l-investigaturi u l-anqas l-individwi ma kienu jafu liema sustanza qed tintuża). F'dan il-perjodu, 305 individwi b'sintomi stabbli ntgħażlu b'mod arbitrarju biex jew ikomplu tarattament bi TREVICTA (n = 160) jew bi placebo (n = 145) sakemm irkadew, waqfu kmieni, jew l-istudju gie fit-tmiem. Dak li jvarja għall-effikaċja primarja kien iż-żmien għall-ewwel rikaduta. L-istudju ntemm abbażi ta' analiżi interim ipplanata minn qabel li saret meta 283 individwu kienu ntgħażlu b'mod arbitrarju u kienu ġew osservati 42 każ ta' rikaduta.

Abbażi tal-analiżi finali (N = 305), 42 individwu (29.0%) fil-grupp tal-placebo u 14-il individwu (8.8%) fil-grupp ta' TREVICTA kellhom każ ta' rikaduta waqt il-fażi tal-istudju fejn la l-investigaturi u lanqas l-individwi ma kienu jafu liema sustanza qed tintuża. Il-proporzjon ta' periklu (*hazard ratio*) kien ta' 3.81 (95% CI: 2.08, 6.99) li jindika tnaqqis ta' 74% fir-riskju ta' rikaduta bi TREVICTA meta mqabbel mal-placebo. Il-plot Kaplan Meier taż-żmien għar-rikaduta skont il-grupp ta' kura qed tintwera f'Figura 1. Kien hemm differenza sinifikanti ($p < 0.0001$) fiż-żmien għar-rikaduta bejn iż-żewġ gruppi ta' kura li kienet favur TREVICTA. Iż-żmien għar-rikaduta tal-grupp ta' placebo (medjan ta' 395 jum) kien iqsar b'mod sinifikanti minn dak għall-grupp ta' TREVICTA (il-medjan ma setax jiġi stmat minhabba l-perċentwal baxx ta' individwi li kellhom rikaduta [8.8%]).




Figura 1: Plot Kaplan-Meier taż-żmien għar-rikaduta – Analizi finali

Fl-istudju ta' non-inferjorità, 1,429 individwi morda b'mod akut (medja tal-punteġġ totali PANSS fil-linja bażi: 85.7) li ssodisfaw il-kriterji DSM-IV għall-iskizofrenja ġew irregistrati fil-fażi fejn kemm l-investigaturi kif ukoll l-individwi kienu jafu li qed jiġu ttrattati b'paliperidone palmitate ta' kull xahar li jista' jiġi injettat għal 17-il ġimgħa. Id-doża setgħet tiġi agġustata (i.e., 50 mg, 75 mg, 100 mg, jew 150 mg) fl-injezzjonijiet tal-ġimgħat 5 u 9 u s-sit tal-injezzjoni setgħet tkun tad-deltoid jew gluteali. Għal individwi li ssodisfaw kriterji għal għażla arbitrarja fil-ġimgħat 14 u 17, 1,016 intgħażlu b'mod arbitrarju fi proporzjon ta' 1:1 biex jew ikomplu fuq injezzjonijiet kull xahar ta' paliperidone palmitate ta' kull xahar li jista' jiġi injettat jew jaqilbu għal TREVICTA b'multipli ta' 3.5 tad-doża tal-ġimgħa 9 u 13 ta' paliperidone palmitate ta' kull xahar li jista' jiġi injettat għal 48 ġimgħa. L-individwi rċievew TREVICTA darba kull 3 xhur u rċievew medicina placebo li tiġi injettata fix-xhur l-oħra biex jinżamm il-fatt li hadd ma jkun jaf liema medicina qed tintuża. L-iskop finali primarju ta' effikaċja tal-istudju kien il-perċentwal ta' individwi li ma kinux irkadew sal-ahhar tal-fażi ta' 48 ġimgħa fejn la l-investigaturi u lanqas l-individwi ma kienu jafu liema sustanza qed tintuża abbażi tal-istima ta' Kaplan-Meier ta' 48 ġimgħa (TREVICTA: 91.2%, paliperidone palmitate ta' kull xahar li jista' jiġi injettat: 90.0%). Iż-żmien medjan għar-rikaduta fi kwalunkwe grupp ma setax jiġi stmat minhabba l-

percentwal baxx ta' individwi b'rikaduta. Id-differenza bejn (95% CI) il-gruppi ta' trattament kienet 1.2% (-2.7%, 5.1%), li tissodisfa l-kriterju tan-nuqqas ta' inferjorità abbaži ta' margini ta' -10%. B'hekk, il-grupp ta' trattament bi TREVICTA ma kienx inferjuri għal paliperidone palmitate ta' kull xahar li jista' jiġi injettat. Titjib f'kif wiehed jiffunzjona, kif imkejjel permezz tal-iskala ta' Eżekuzzjoni Personali u Soċjali (PSP - *Personal and Social Performance*), li kien osservat matul il-faži ta' stabilizzazzjoni fejn kemm l-investigaturi kif ukoll l-individwi kienu jafu liema sustanza qed tintuża nżammu matul il-faži fejn la l-investigaturi u l-anqas l-individwi ma kienu jafu liema sustanza qed tintuża fiż-żewġ gruppi ta' trattament.




Figura 2: Plot Kaplan-Meier taż-żmien għar-rikaduta li tqabbel TREVICTA u paliperidone palmitate ta' kull xahar li jista' jiġi injettat

Ir-riżultati ta' effikaċja kienu konsistenti fis-sottogruppi tal-popolazzjonijiet kollha (sess tal-persuna, età, u razza) fiż-żewġ studji.

Popolazzjoni pedjatrika

L-Aġenzija Ewropea għall-Medicini neħhiet l-obbligu li jiġu sottomessi r-riżultati tal-istudji bi TREVICTA fis-subsettijiet kollha tal-popolazzjoni pedjatrika bi skizofrenija. Ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu pedjatriku.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment u distribuzzjoni

Minħabba s-solubilità baxxa ħafna tiegħu fl-ilma, il-formulazzjoni ta' kull 3 xhur ta' paliperidone palmitate tinħall bil-mod wara li tiġi injettata fil-muskolu qabel tiġi idrolizzata għal paliperidone u assorbita fiċ-ċirkolazzjoni sistemika. Ir-rilaxx tas-sustanza attiva jibda sa minn jum 1 u jdum anke sa 18-il xahar.

Id-dejta pprezentata f'dan il-paragrafu hija bbażata fuq analiżi farmakokinetika tal-popolazzjoni. Wara doża waħda ta' TREVICTA għol-muskolu, il-koncentrazzjonijiet ta' paliperidone fil-plażma joghlew bil-mod biex jilhqgħu l-ogħla konċentrazzjonijiet fil-plażma f' T_{max} medjan ta' 30-33 jum. Wara injezzjoni ta' TREVICTA għol-muskolu bid-doži ta' 175-525 mg fil-muskolu deltojd, kienet osservata, bħala medja, C_{max} minn 11-12% oghla meta mqabbla ma' injezzjoni fil-muskolu gluteali. Il-profil ta' rilaxx u l-iskeda ta' għoti tad-doża ta' TREVICTA jwasslu għal konċentrazzjonijiet terapewtiċi miżmuma. L-esponiment totali għal paliperidone wara għoti ta' TREVICTA kien fi proporzjon mad-doża fuq il-medda ta' doża minn 175-525 mg, u bejn wiehed u ieħor fi proporzjon mad-doża għas- C_{max} . Il-medja tal-proporzjon bejn l-ogħla u l-inqas konċentrazzjoni fl-istat fiss għal doża ta' TREVICTA kien 1.6 wara għoti gluteali u 1.7 wara għoti fil-muskolu deltojd.

L-irbit ta' paliperidone raċemiku mal-proteini tal-plażma huwa 74%.

Wara għoti ta' TREVICTA, l-enantijomeri (+) u (-) ta' paliperidone jikkonvertu wieħed fl-ieħor, u jilhq u AUC bi proporzjon ta' (+) u (-) ta' madwar 1.7-1.8.

Bijotrasformazzjoni u eliminazzjoni

Fi studju b'¹⁴C-paliperidone li jittiehed mill-ħalq li jerhi l-medicina b'mod immedjat, ġimġha wara l-għoti ta' doża waħda mill-ħalq ta' 1 mg ¹⁴C-paliperidone li jerhi l-medicina b'mod immedjat, 59% tad-doża tneħhiet mhux mibdula fl-awrina, li jindika li paliperidone ma jiġix metabolizzat b'mod estensiv fil-fwied. Bejn wiehed u ieħor 80% tar-radjuattività mogħtija ngabret lura mill-awrina u 11% fl-ippurġar. Ġew identifikati erba' mogħdijiet metabolici *in vivo*, li l-ebda waħda minnhom ma kienet responsabbli għal iktar minn 10 % tad-doża: dealkilazzjoni, idroksilazzjoni, deidroġenazzjoni, u xizzjoni tal-benzisoxazole. Għalkemm studji *in vitro* issuġġerew li CYP2D6 u CYP3A4 għandhom sehem fil-metaboliżmu ta' paliperidone, m'hemmx evidenza *in vivo* li dawn l-isozimi għandhom sehem sinifikanti fil-metaboliżmu ta' paliperidone. Analizi farmakokinetika tal-popolazzjoni ma wrew l-ebda differenza fit-tneħħija apparenti ta' paliperidone wara l-għoti ta' paliperidone mill-ħalq bejn metabolizzaturi estensivi u metabolizzaturi dgħajfa ta' sustrati ta' CYP2D6. Studji *in vitro* fil-mikrożomi tal-fwied tal-bniedem urew li paliperidone ma jinibixxix b'mod sostanzjali l-metaboliżmu ta' medicini metabolizzati bl-isozimi tač-ċitokroma P450, inklużi CYP1A2, CYP2C8/9/10, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4, u CYP3A5.

Studji *in vitro* urew li paliperidone huwa sustrat ta' P-gp u inibitur dgħajjed ta' P-gp f'koncentrazzjonijiet għoljin. M'hemmx dejta *in vivo* disponibbli u r-rilevanza klinika mhijiex magħrufa.

Abbaži ta' analizi farmakokinetika tal-popolazzjoni, il-medjan tal-*half-life* apparenti ta' paliperidone wara għoti ta' TREVICTA fuq medda ta' doża ta' 175-525 mg kien iwarja minn 84-95 jum wara injezzjonijiet fil-muskolu deltoid u minn 118-139 jum wara injezzjonijiet gluteali.

Injezzjoni ta' paliperidone palmitate ta' kull 3 xhur li taħdem fit-tul versus formulazzjonijiet oħra ta' paliperidone

TREVICTA huwa mfassal biex jagħti paliperidone fuq perjodu ta' 3 xhur, filqwaqt li l-injezzjoni ta' paliperidone palmitate ta' kull xahar tingħata kull xahar. TREVICTA, meta jingħata b'doži li huma 3.5 darbiet oghla mid-doża korrispondenti tal-injezzjoni ta' paliperidone palmitate ta' kull xahar (ara sezzjoni 4.2), twassal għal esponimenti ta' paliperidone simili għal dawk li nkisbu bid-doži korrispondenti ta' injezzjoni ta' paliperidone palmitate ta' kull xahar mogħtija darba fix-xahar u doži korrispondenti ta' pilloli paliperidone li jittiehdu mill-ħalq li jerħu l-medicina fit-tul mogħtija darba kuljum. Il-firxa ta' esponiment għal TREVICTA hija inkluża fil-firxa ta' esponiment għal qawwiet tad-doži tal-pilloli paliperidone li jerħu l-medicina fit-tul.

Indeboliment tal-fwied

Paliperidone mhuwiex immetabolizzat b'mod estensiv fil-fwied. Għalkemm TREVICTA ma ġiex studjat f'pazjenti b'indeboliment epatiku, m'hemmx bżonn ta' aġġustament tad-doži f'pazjenti b'indeboliment tal-fwied minn ħafif sa moderat. Fi studju b'paliperidone li jittiehed mill-ħalq f'individwi b'indeboliment tal-fwied moderat (Child-Pugh Klass B), il-koncentrazzjonijiet ta' paliperidone ħieles fil-plażma kienu simili għal dawk ta' individwi f'saħħithom. Paliperidone ma ġiex studjat f'pazjenti b'indeboliment tal-fwied sever.

Indeboliment tal-kliewi

TREVICTA ma ġiex studjat b'mod sistematiku f'pazjenti b'indeboliment tal-kliewi. Id-dispożizzjoni ta' doża waħda mill-ħalq ta' pillola ta' 3 mg paliperidone li terħi l-medicina fit-tul ġiet studjata f'individwi bi gradi differenti ta' funzjoni tal-kliewi. L-eliminazzjoni ta' paliperidone naqset aktar ma naqset l-istima tat-tneħħija tal-kreatinina. It-tneħħija totali ta' paliperidone naqset b'medja ta' 32% f'individwi b'indeboliment ħafif (CrCl = 50 sa < 80 mL/min), 64% f'indeboliment moderat

(CrCl = 30 sa < 50 mL/min), u 71% f'indeboliment sever (CrCl = 10 sa < 30 mL/min) fil-funzjoni tal-kliwi, li jaqbel ma' zieda medja fl-esponiment (AUC_{inf}) ta' 1.5, 2.6, u 4.8 darbiet, rispettivament, meta mqabbel ma' individwi f'saħħithom.

Anzjani

Analizi farmakokinetiċi tal-popolazzjoni ma wrew l-ebda xhieda ta' differenzi farmakokinetiċi marbuta mal-età.

Indiċi tal-massa tal-gisem (BMI - *body mass index*)/piż tal-gisem

Ġie osservat C_{max} aktar baxx f'individwi b'piż żejjed u ħxuna żejda. Fl-istat fiss apparenti bi TREVICTA, il-konċentrazzjonijiet l-aktar baxxi kienu jixxiebhu fost individwi normali, b'piż żejjed u bi ħxuna żejda.

Razza

Analizi farmakokinetiċi tal-popolazzjoni ma wrew l-ebda xhieda ta' differenzi farmakokinetiċi marbuta mar-razza.

Sess tal-persuna

Analizi farmakokinetiċi tal-popolazzjoni ma wrew l-ebda xhieda ta' differenzi farmakokinetiċi marbuta mas-sess tal-persuna.

Tipjip

Abbażi ta' studji *in vitro* li użaw enzimi tal-fwied tal-bniedem, paliperidone mhuwiex sustrat għal CYP1A2; għalhekk, it-tipjip mhux suppost li jkollu effett fuq il-farmakokinetika ta' paliperidone. L-effet tat-tipjip fuq il-farmakokinetika ta' paliperidone ma ġiex studjat bi TREVICTA. Analizi tal-farmakokinetika tal-popolazzjoni bbażata fuq dejta dwar pilloli mill-halq ta' paliperidone li jerħu l-emdiċina bil-mod uriet esponiment kemmxejn inqas għal paliperidone f'min ipejjeq meta mqabbla ma' min ma jpejjeq. Id-differenza aktarx li ma jkollhiex rilevanza klinika.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Studji dwar tossiċità minn dozi ripetuti ta' paliperidone palmitate injettat fil-muskolu (il-formulazzjoni ta' kull xahar) u paliperidone mogħti mill-halq fil-far u l-kelb urew fil-biċċa l-kbira effetti farmakoloġiċi, bħal sedazzjoni u effetti medjati mill-prolactin fuq il-glandoli mammarji u l-ġenitali. Fl-annimali li ġew ikkurati b'paliperidone palmitate dehret reazzjoni ta' infjammazzjoni fil-post fejn ingħatat l-injezzjoni fil-muskolu. Gara li kultant iffirma axxess.

Fi studji dwar ir-riproduzzjoni fil-far b'risperidone orali, li jinbidel b'mod estensiv f'paliperidone fil-firien u l-bnedmin, deheru effetti avversi fuq il-piż tat-twelid u s-sopravvivenza tal-frieh. Ma ġewx osservati tossiċitajiet fl-embriju jew formazzjonijiet hżiena wara l-ghoti ta' paliperidone palmitate fil-muskolu lill-firien tqal sal-oghla doża (160 mg/kg/kuljum) li tikkorrispondi għal 2.2 drabi l-livell ta' esponiment fil-bnedmin bid-doża massima rakkomandata ta' 525 mg. Meta ngħataw antagonisti oħra tad-dopamina lil annimali tqal, dawn kellhom effetti negattivi fuq it-tagħlim u l-iżvilupp motorju tal-frieh.

Paliperidone palmitate u paliperidone ma kinux tossiċi għall-ġeni. Fi studji dwar jekk risperidone mogħti mill-halq jikkawżax kanċer fil-firien u l-ġrieden, deheru zidiet fl-adenomi fil-glandoli pitwitarji (fil-ġurdien), adenomi endokrinariji fil-frixa (fil-far) u adenomi fil-glandoli mammarji (fiż-żewġ speċi). Il-possibbiltà li paliperidone palmitate injettat fil-muskoli jikkawża kanċer ġiet evalwata fil-firien. Kien hemm zieda sinifikanti b'mod statistiku fl-adenokarċinomi fil-glandoli mammarji tal-firien nisa b'10, 30 u 60 mg/kg/xahar. Il-firien irġiel urew zieda sinifikanti b'mod statistiku f'adenomi u karċinomi tal-glandoli mammarji bi 30 u 60 mg/kg/xahar li huwa 0.6 u 1.2 darbiet il-livell ta'

esponiment tad-doża massima ta' 525 mg rakkomandata fil-bnedmin. Dawn it-tumuri jistgħu jkunu marbuta ma' antagoniżmu fit-tul għad-dopamina D2 u iperprolaktinemia. Mhijiex magħrufa r-rilevanza ta' dawn is-sejbiet ta' tumuri f'animal gerriema f'dak li huwa riskju għall-bnedmin.

6. TAGHRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta' eċċipjenti

Polysorbate 20
Polyethylene glycol 4 000
Citric acid monohydrate
Sodium dihydrogen phosphate monohydrate
Sodium hydroxide (għal aġġustament tal-pH)
Ilma għall-injezzjonijiet

6.2 Inkompatibiltajiet

Dan il-prodott mediċinali m'għandux jithallat ma' prodotti mediċinali oħrajn.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Dan il-prodott mediċinali m'għandux bżonn ħażna speċjali.

6.5 In-natura u tal-kontenitur u ta' dak li hemm ġo fih

175 mg

Suspensjoni ta' 0.88 mL f'siringa mimlija għal-lest (cyclic-olefin-copolymer) b'waqfien għall-plaġer, protezzjoni fuq wara li twaqqaf, u għatu fit-tarf (lastku bromobutyl) b'labra ta' sigurtà magħmula minn materjal irqiq ta' 22G u pulzier u nofs (0.72 mm x 38.1 mm) u labra ta' sigurtà magħmula minn materjal irqiq ta' 22G u pulzier (0.72 mm x 25.4 mm).

263 mg

Suspensjoni ta' 1.32 mL f'siringa mimlija għal-lest (cyclic-olefin-copolymer) b'waqfien għall-plaġer, protezzjoni fuq wara li twaqqaf, u għatu fit-tarf (lastku bromobutyl) b'labra ta' sigurtà magħmula minn materjal irqiq ta' 22G u pulzier u nofs (0.72 mm x 38.1 mm) u labra ta' sigurtà magħmula minn materjal irqiq ta' 22G u pulzier (0.72 mm x 25.4 mm).

350 mg

Suspensjoni ta' 1.75 mL f'siringa mimlija għal-lest (cyclic-olefin-copolymer) b'waqfien għall-plaġer, protezzjoni fuq wara li twaqqaf, u għatu fit-tarf (lastku bromobutyl) b'labra ta' sigurtà magħmula minn materjal irqiq ta' 22G u pulzier u nofs (0.72 mm x 38.1 mm) u labra ta' sigurtà magħmula minn materjal irqiq ta' 22G u pulzier (0.72 mm x 25.4 mm).

525 mg

Suspensjoni ta' 2.63 mL f'siringa mimlija għal-lest (cyclic-olefin-copolymer) b'waqfien għall-plaġer, protezzjoni fuq wara li twaqqaf, u għatu fit-tarf (lastku bromobutyl) b'labra ta' sigurtà magħmula minn materjal irqiq ta' 22G u pulzier u nofs (0.72 mm x 38.1 mm) u labra ta' sigurtà magħmula minn materjal irqiq ta' 22G u pulzier (0.72 mm x 25.4 mm).

Daqsijiet tal-pakkett:

Il-pakkett fih siringa 1 mimlija għal-lest u 2 labriet

6.6 Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi u għal ġestjoni ieħor

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa' wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

L-istruzzjonijiet shah dwar l-użu u l-immaniġġjar ta' TREVICTA huma pprovduti fil-fuljett ta' tagħrif (*Ara Informazzjoni intenzjonata għal professjonisti fil-qasam mediku jew fil-qasam tal-kura tas-saħħa*).

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Janssen-Cilag International NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Il-Belġju

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/1/14/971/007
EU/1/14/971/008
EU/1/14/971/009
EU/1/14/971/010

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 05 ta' Diċembru 2014
Data tal-aħħar tiġdid:

10. DATA TA' REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini <http://www.ema.europa.eu>.

ANNEX II

- A. MANIFATTUR RESPONSABBLI GHALL-HRUĠ TAL-LOTT**
- B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD IL-PROVVISTA U L-UŻU**
- C. KONDIZZJONIJIET U REKWIŻITI OHRA TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**
- D. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FIR-RIGWARD TAL-UŻU SIGUR U EFFIKAĊI TAL-PRODOTT MEDIĊINALI**

A. MANIFATTUR RESPONSABBLI GHALL-HRUĠ TAL-LOTT

Isem u indirizz tal-manifattur responsabbli għall-hruġ tal-lott

Janssen Pharmaceutica NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Il-Belġju

B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD IL-PROVVISTA U L-UŻU

Prodott mediċinali li jingħata b'riċetta ta' tabib.

C. KONDIZZJONIJIET U REKWIŻITI OHRA TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

- **Rapporti perjodiċi aġġornati dwar is-sigurtà (PSURs)**

Ir-rekwiżiti biex jiġu pprezentati PSURs għal dan il-prodott mediċinali huma mniżżla fil-lista tad-dati ta' referenza tal-Unjoni (lista EURD) prevista skont l-Artikolu 107c(7) tad-Direttiva 2001/83/KE u kwalunkwe aġġornament sussegwenti ppubblikat fuq il-portal elettroniku Ewropew tal-mediċini.

D. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FIR-RIGWARD TAL-UŻU SIGUR U EFFIKAĊI TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

- **Pjan tal-ġestjoni tar-riskju (RMP)**

Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq (MAH) għandu jwettaq l-attivitajiet u l-interventi meħtieġa ta' farmakoviġilanza dettaljati fl-RMP maqbul ipprezentat fil-Modulu 1.8.2 tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u kwalunkwe aġġornament sussegwenti maqbul tal-RMP.

RMP aġġornat għandu jiġi pprezentat:

- Meta l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini titlob din l-informazzjoni;
- Kull meta s-sistema tal-ġestjoni tar-riskju tiġi modifikata speċjalment minhabba li tasal informazzjoni ġdida li tista' twassal għal bidla sinifikanti fil-profil bejn il-benefiċċju u r-riskju jew minhabba li jintlaħaq għan importanti (farmakoviġilanza jew minimizzazzjoni tar-riskji).

ANNES III

TIKKETTAR U FULJETT TA' TAGHRIF

A. TIKKETTAR

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ L-IMBALLAĠĠ ESTERN

KARTUNA TAL-KARTUN

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

TREVICTA 175 mg suspensjoni li terġi l-mediċina bil-mod għall-injezzjoni
paliperidone

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull siringa mimlija għal-lest fiha paliperidone palmitate ekwivalenti għal 175 mg paliperidone.

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: polysorbate 20, polyethylene glycol 4 000, citric acid monohydrate, sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium hydroxide, ilma għall-injezzjonijiet

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Suspensjoni li terġi l-mediċina bil-mod għall-injezzjoni

Siringa 1 mimlija għal-lest ta' 0.88 mL

2 labriet

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

Użu għal ġol-muskoli



Agħti kull 3 xhur



Hawwad is-siringa bis-saħħa għal mill-inqas 15-il sekonda

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

10. PREKAWZZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Janssen-Cilag International NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Il-Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/1/14/971/007

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

trevicta 175 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGHAR EWLENIN
SIRINGA MIMLIJA GHAL-LEST

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GHANDU JINGHATA

TREVICTA 175 mg injezzjoni
paliperidone
IM

2. METODU TA' KIF GHANDU JINGHATA



Hawwad bis-saħħa

3. DATA TA' SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

175 mg

6. OHRAJN

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ L-IMBALLAĠĠ ESTERN

KARTUNA TAL-KARTUN

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

TREVICTA 263 mg suspensjoni li terġi l-mediċina bil-mod għall-injezzjoni
paliperidone

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull siringa mimlija għal-lest fiha paliperidone palmitate ekwivalenti għal 263 mg paliperidone.

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: polysorbate 20, polyethylene glycol 4 000, citric acid monohydrate, sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium hydroxide, ilma għall-injezzjonijiet

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Suspensjoni li terġi l-mediċina bil-mod għall-injezzjoni

Siringa 1 mimlija għal-lest ta' 1.32 mL

2 labriet

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

Użu għal ġol-muskoli



Agħti kull 3 xhur



Ħawwad is-siringa bis-saħħa għal mill-inqas 15-il sekonda

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

10. PREKAWZZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Janssen-Cilag International NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Il-Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/1/14/971/008

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

trevicta 263 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

**TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGHAR EWLENIN
SIRINGA MIMLIJA GHAL-LEST**

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GHANDU JINGHATA

TREVICTA 263 mg injezzjoni
paliperidone
IM

2. METODU TA' KIF GHANDU JINGHATA



Hawwad bis-saħħa

3. DATA TA' SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

263 mg

6. OHRAJN

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ L-IMBALLAĠĠ ESTERN

KARTUNA TAL-KARTUN

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

TREVICTA 350 mg suspensjoni li terġi l-mediċina bil-mod għall-injezzjoni paliperidone

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull siringa mimlija għal-lest fiha paliperidone palmitate ekwivalenti għal 350 mg paliperidone.

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: polysorbate 20, polyethylene glycol 4 000, citric acid monohydrate, sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium hydroxide, ilma għall-injezzjonijiet

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Suspensjoni li terġi l-mediċina bil-mod għall-injezzjoni

Siringa 1 mimlija għal-lest ta' 1.75 mL

2 labriet

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

Użu għal ġol-muskoli



Agħti kull 3 xhur



Ħawwad is-siringa bis-saħħa għal mill-inqas 15-il sekonda

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

10. PREKAWZZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Janssen-Cilag International NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Il-Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/1/14/971/009

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

trevicta 350 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

**TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGHAR EWLENIN
SIRINGA MIMLIJA GHAL-LEST**

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GHANDU JINGHATA

TREVICTA 350 mg injezzjoni
paliperidone
IM

2. METODU TA' KIF GHANDU JINGHATA



Hawwad bis-saħħa

3. DATA TA' SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

350 mg

6. OHRAJN

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ L-IMBALLAĠĠ ESTERN

KARTUNA TAL-KARTUN

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

TREVICTA 525 mg suspensjoni li terġi l-mediċina bil-mod għall-injezzjoni paliperidone

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull siringa mimlija għal-lest fiha paliperidone palmitate ekwivalenti għal 525 mg paliperidone.

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: polysorbate 20, polyethylene glycol 4 000, citric acid monohydrate, sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium hydroxide, ilma għall-injezzjonijiet

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Suspensjoni li terġi l-mediċina bil-mod għall-injezzjoni

Siringa 1 mimlija għal-lest ta' 2.63 mL

2 labriet

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

Użu għal ġol-muskoli



Agħti kull 3 xhur



Hawwad is-siringa bis-saħħa għal mill-inqas 15-il sekonda

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

10. PREKAWZZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Janssen-Cilag International NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Il-Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/1/14/971/010

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

trevicta 525 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

**TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGHAR EWLENIN
SIRINGA MIMLIJA GHAL-LEST**

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GHANDU JINGHATA

TREVICTA 525 mg injezzjoni
paliperidone
IM

2. METODU TA' KIF GHANDU JINGHATA



Hawwad bis-saħħa

3. DATA TA' SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

525 mg

6. OHRAJN

B. FULJETT TA' TAGHRIF

Fuljett ta' taghrif: Informazzjoni għall-utent

TREVICTA 175 mg suspensjoni li terhi l-mediċina bil-mod għall-injezzjoni
TREVICTA 263 mg suspensjoni li terhi l-mediċina bil-mod għall-injezzjoni
TREVICTA 350 mg suspensjoni li terhi l-mediċina bil-mod għall-injezzjoni
TREVICTA 525 mg suspensjoni li terhi l-mediċina bil-mod għall-injezzjoni
paliperidone

Aqra l-fuljett ta' taghrif kollu bir-reqqa qabel tibda tuża din il-mediċina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib, lill-ispizjar jew lill-infermier tiegħek.
- Jekk ikollok xi effetti sekondarji kellem lit-tabib, lill-ispizjar jew lill-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi effetti sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F'dan il-fuljett

1. X'inhu TREVICTA u għalxiex jintuża
2. X'għandek tkun taf qabel ma tuża TREVICTA
3. Kif għandek tuża TREVICTA
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif taħžen TREVICTA
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1. X'inhu TREVICTA u għalxiex jintuża

TREVICTA fih is-sustanza attiva paliperidone li tappartjenti għall-klassi ta' mediċini antipsikotiċi u jintuża bħala trattament ta' manteniment għas-sintomi tal-iskizofrenija f'pazjenti adulti.

Jekk inti rrispondejt tajjeb għal trattament b'injezzjoni ta' paliperidone palmitate li tingħata darba fix-xahar, it-tabib tiegħek jista' jibda trattament bi TREVICTA.

L-iskizofrenija hija marda b'sintomi "pożittivi" u "negattivi". Pożittivi jfissru sintomi żejda li normalment ma jkunux preżenti. Pereżempju, persuna bi skizofrenija tista' tisma vuċijiet jew tara affarijiet li ma jkunux hemm (imsejha alluċinazzjonijiet), temmen affarijiet li m'humiex veri (imsejha delużjonijiet), jew ikollha suspetti mhux tas-soltu f'persuni oħrajn. Negattivi jfissru nuqqas ta' mgħiba jew sentimenti li s-soltu jkunu preżenti. Pereżempju, persuna bi skizofrenija tista' tidher magħluqa fiha nfisha u tista' ma jkollha l-ebda rispons emozzjonali jew ikollha diffikultajiet biex titkellem b'mod ċar u loġiku. Persuni li jkollhom din il-marda jistgħu wkoll iħossuhom depressi, anzjużi, hatja, jew b'tensjoni fuqhom.

TREVICTA jista' jgħin biex itaffi s-sintomi tal-marda tiegħek u jnaqqas iċ-ċans li s-sintomi tiegħek jiġu lura.

2. X'għandek tkun taf qabel ma tuża TREVICTA

Tużax TREVICTA

- jekk inti allergiku għal paliperidone jew għal xi ingredjenti oħra ta' din il-mediċina (mniżzla fis-sezzjoni 6).
- jekk inti allergiku għal xi mediċina antipsikotika oħra inkluża s-sustanza risperidone.

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib, lill-ispizjar jew lill-infermier tiegħek qabel tuża TREVICTA.

Din il-mediċina ma gietx studjata f'pazjenti anzjani bid-dimenzja. Madankollu, il-pazjenti anzjani bid-dimenzja, li jkunu ttrattati b'tipi oħra ta' mediċina simili, jista' jkollhom zieda fir-riskju ta' puplesija jew mewt (ara sezzjoni 4).

Il-mediċini kollha jkollhom effetti sekondarji u xi wħud mill-effetti sekondarji ta' din il-mediċina jistgħu jaggravaw is-sintomi ta' kundizzjonijiet mediċi oħrajn. Għal din ir-raġuni, huwa importanti li tiddiskuti mat-tabib tiegħek kwalunkwe waħda minn dawn il-kundizzjonijiet li ġejjin li jistgħu jaggravaw waqt it-tratament b'din il-mediċina:

- jekk għandek il-marda ta' Parkinson
- jekk qatt ġejt iddijanostikat b'kundizzjoni li s-sintomi tagħha jinkludu temperatura għolja u ebusija fil-muskoli (magħrufa wkoll bħala Sindrom Newrolettiku Malinn)
- jekk qatt kellek movimenti ta' għbid għall-għarrieda jew skossi li inti ma tistax tikkontrolla f'wiċċek, f'islienek jew f'parti oħra tal-ġisem tiegħek (Diskajnezja Tardiva)
- jekk inti taf li fil-passat kellek livelli baxxi ta' ċelluli bojod tad-demm (li setgħu kienu jew ma kinux ikkawżati minn mediċini oħra)
- jekk inti dijabatiku jew suxxettibbli għad-dijabete
- jekk kellek kanċer tas-sider jew tumur fil-glandola pitwitarja f'moħħok
- jekk għandek xi mard tal-qalb jew tieħu trattament għal mard tal-qalb li jagħmlek suxxettibbli għal pressjoni tad-demm baxxa
- jekk ikollok pressjoni baxxa meta inti tqum bilwieqfa jew tqum bilqegħda f'daqqa
- jekk għandek storja ta' aċċessjonijiet
- jekk għandek problemi fil-kliwi
- jekk għandek problemi fil-fwied
- jekk ikollok erezzjoni fit-tul u/jew bl-uġiġħ
- jekk għandek problemi sabiex tikkontrolla t-temperatura tal-ġisem jew shana żejda
- jekk inti għandek livell għoli mhux normali tal-ormon prolactin fid-demm tiegħek jew jekk hemm possibbiltà li inti għandek tumur li jiddependi mill-prolactin
- jekk inti jew xi hadd iehor fil-familja għandkom storja ta' tagħqid tad-demm, peress li l-antipsikotiċi ġew assoċjati mal-formazzjoni ta' tagħqid tad-demm

Jekk għandek kwalunkwe waħda minn dawn il-kundizzjonijiet, jekk jogħġbok kellem lit-tabib tiegħek għaliex huwa/hija jistgħu jkunu jridu jaġġustawlek id-doża tiegħek jew jissorveljawk għal xi żmien.

Minhabba li f'pazjenti li kienu qed jieħdu din il-mediċina dehru b'mod rari ħafna numri baxxi b'mod perikoluż ta' ċertu tip ta' ċellula bajda tad-demm meħtieġa biex tiġġieled infezzjonijiet fid-demm tiegħek, it-tabib tiegħek jista' jiċċekkja l-għadd ta' ċelluli bojod fid-demm tiegħek.

Anke jekk inti qabel tkun ittollerajt paliperidone li jittiehed mill-ħalq jew risperidone, b'mod rari jseħħu reazzjonijiet allergiċi wara li wieħed jirċievi injezzjonijiet ta' TREVICTA. Fittex għajnuma medika minnufih jekk inti jkollok raxx, nefħa fil-gerżuma, ħakk jew problemi biex tieħu n-nifs minhabba li dawn jistgħu jkunu sinjali ta' reazzjoni allergiċa serja.

Din il-mediċina tista' ġġieghlek iżżid fil-piż. Żieda sinifikanti fil-piż tista' tkun ta' ħsara għal saħħek. It-tabib tiegħek għandu jkejjel il-piż tiegħek b'mod regolari.

Minhabba li f'pazjenti li kienu qed jieħdu din il-mediċina dehret id-dijabete mellitus jew taħrix ta' dijabete mellitus li kienet hemm diġà, it-tabib tiegħek għandu jiċċekkja għal sinjali ta' zokkor għoli fid-demm. F'pazjenti li diġà għandhom id-dijabete mellitus iz-zokkor fid-demm għandu jitkejjel b'mod regolari.

Minhabba li din il-mediċina tista' tnaqqaslek l-impuls li tirremetti, hemm possibbiltà li tista' tostori reazzjoni normali tal-ġisem għall-ingestjoni ta' sustanzi tossiċi jew kundizzjonijiet mediċi oħrajn.

Waqt operazzjoni fl-għajn għal-lenti li tittappan (katarretta), il-pupilla (iċ-ċirku iswed f'nofs għajnejk) tista' ma tikbirx fid-daqs kif meħtieġ. Ukoll, il-ħabba (il-parti kkulurita tal-għajn) tista' titharrek waqt l-intervent kirurġiku u dan jista' jwassal għal ħsara fl-għajn. Jekk qed tippjana li jkollok operazzjoni f'għajnejk, kun żgur li tgħarraf lit-tabib tiegħek li qed tieħu din il-mediċina.

Tfal u adoloxxenti

Tużax din il-mediċina fi tfal u adoloxxenti taht l-età ta' 18-il sena. Mhux magħruf jekk hijiex mingħajr periklu u effettiva f' dawn il-pazjenti.

Mediċini oħra u TREVICTA

Għid lit-tabib tiegħek jekk qed tieħu, dan l-aħħar hadt jew stajt hadt xi mediċini oħra.

Jekk inti tieħu din il-mediċina ma' carbamazepine (mediċina kontra l-epilessija u li tistabbilizza l-burdata) tista' tkun meħtieġa bidla fid-doża tiegħek ta' din il-mediċina.

Minhabba li din il-mediċina taħdem primarjament fil-moħħ, l-użu ta' mediċini oħrajn li jaħdmu fil-moħħ jista' jikkawża esaġerazzjoni tal-effetti sekondarji bħal ngħas jew effetti oħrajn fuq il-moħħ bħal mediċini oħra psikjatriċi, opjojdi, antiistamini u mediċini tal-irqad.

Minhabba li din il-mediċina tista' tbaxxi l-persjoni tad-demm, għandu jkun hemm attenzjoni meta din il-mediċina tintuża ma' mediċini oħrajn li jbaxxu l-persjoni tad-demm.

Din il-mediċina tista' tnaqqas l-effett ta' mediċini kontra l-marda ta' Parkinson u s-sindrom ta' nuqqas ta' kwiet fir-riglejn (eż., levodopa).

Din il-mediċina tista' tikkawża anormalità fl-elettrokardjogramma (ECG) li turi hin twil għal impuls elettriku sabiex jivvjaġġa matul ċerta parti tal-qalb (magħrufa bħala "titwil tal-QT"). Mediċini oħrajn li għandhom dan l-effett jinkludu xi mediċini li jintużaw biex jittrattaw ir-ritmu tal-qalb jew biex jittrattaw infezzjoni, u antipsikotiċi oħrajn.

Jekk inti għandek storja ta' aċċessjonijiet, din il-mediċina tista' żżidlek il-possibbiltà li jkollok minnhom. Mediċini oħrajn li għandhom dan l-effett jinkludu xi mediċini li jintużaw biex jittrattaw id-depressjoni jew biex jittrattaw infezzjoni, u antipsikotiċi oħrajn.

TREVICTA għandu jintuża b'kawtela ma' mediċini li jżidu l-attività tas-sistema nervuża ċentrali (psikostimulanti bħal methylphenidate).

TREVICTA mal-alkoħol

L-alkoħol għandu jiġi evitat.

Tqala u treddigh

Jekk inti tqila jew qed tredda', taħseb li tista' tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir tat-tabib jew tal-ispizjar tiegħek qabel tieħu din il-mediċina. M'għandekx tuża din il-mediċina waqt it-tqala sakemm ma ddiskutejtx dan mat-tabib tiegħek. Is-sintomi li ġejjin jistgħu jseħħu fi trabi tat-twelid, ta' ommijiet li użaw paliperidone fl-aħħar trimestru (l-aħħar tliet xhur tat-tqala tagħhom): roġhda, ebusija u/jew dgħufija tal-muskoli, hedla tan-ngħas, aġitazzjoni, problemi bit-tehid tan-nifs, u diffikultà biex jerdghu. Jekk it-tarbija tiegħek tiżviluppa xi wiehed minn dawn is-sintomi fittex għajnuna medika għat-tarbija tiegħek.

Din il-mediċina tista' tgħaddi mill-omm għat-tarbija minn ġol-ħalib tas-sider u tista' tagħmel hsara lit-tarbija. Għaldaqstant, m'għandekx tredda' meta tuża din il-mediċina.

Sewqan u thaddim ta' magni

Jistgħu jseħħu sturdament, gheja kbira u problemi fil-vista waqt it-trattament b'din il-mediċina (ara sezzjoni 4). Dan għandu jkun ikkunsidrat f'każijiet fejn tkun meħtieġa viġilanza sħiħa, eż., meta ssuq karozza jew thaddem magni.

TREVICTA fih sodium

Din il-mediċina fiha inqas minn 1 mmol ta' sodium (23 mg) f'kull doża, li tista' tgħid huwa essenzjalment 'hieles mis-sodium'.

3. Kif ghandek tuża TREVICTA

Din il-medicina tinghata mit-tabib tieghek jew minn professjonista ieħor fil-qasam tal-kura tas-saħħa. It-tabib tieghek jgħidlek meta jkollok bżonn l-injezzjoni li jmiss. Huwa importanti li ma taqbiżx id-doża skedata tieghek. Jekk ma tistax tmur għall-appuntament tieghek għand it-tabib, kun żgur li ċċempillu minnufih sabiex jagħmillek appuntament ieħor mill-aktar fis possibbli.

Inti se tirċievi injezzjoni ta' TREVICTA fil-parti ta' fuq tad-driegħ jew fil-warrani darba kull 3 xhur.

Skont is-sintomi tieghek, it-tabib jista' jżidlek jew inaqqaslek l-ammont ta' medicina li tirċievi fl-injezzjoni skedata li jmissek.

Pazjenti bi problemi fil-kliewi

Jekk ghandek problemi żgħar fil-kliewi t-tabib se jiddetermina d-doża xierqa ta' TREVICTA abbażi tad-doża ta' paliperidone palmitate ta' kull xahar li jista' jiġi injettat li inti kont qed tirċievi. Jekk inti ghandek problemi moderati jew severi fil-kliewi din il-medicina m'għandiex tintuża.

Anzjani

It-tabib tieghek se jiddetermina d-doża tieghek ta' din il-medicina jekk il-funzjoni tal-kliewi tieghek tkun imnaqqa.

Jekk tinghata aktar TREVICTA milli tehtieg

Din il-medicina tinghatalek taħt superviżjoni medika; għaldaqstant, huwa improbabbli li tinghata ż-żejjed.

Pazjenti li jkunu ngħataw paliperidone żejjed jista' jkollhom dawn is-sintomi li ġejjin: ngħas jew sedazzjoni, rata mgħagġla tal-qalb, pressjoni baxxa tad-demem, elettrokardjogramma anormali (intraċċar elettriku tal-qalb), jew ċaqliq bil-mod jew anormali fil-wiċċ, fil-gisem, fid-dirgħajn jew fir-riglejn.

Jekk tieqaf tuża TREVICTA

Jekk tieqaf tirċievi l-injezzjonijiet tieghek, is-sintomi tal-iskizofrenja tieghek jistgħu imorro għall-agħar. Inti m'għandekx tieqaf tuża din il-medicina sakemm ma jgħidlikx tagħmel dan it-tabib tieghek.

Jekk ghandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' din il-medicina, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tieghek.

4. Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull medicina oħra, din il-medicina jista' jkollha effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux fuq kulhadd.

Għid lit-tabib immedjament jekk inti:

- ikollok tagħqid tad-demem fil-vini, speċjalment fir-riglejn (sintomi jinkludu nefha, uġiġh u ħmura fir-riglejn), li jistgħu jgħaddu mill-kanali tad-demem għal għol-pulmun fejn jikkawżaw uġiġh fis-sider jew diffikultà biex tieħu n-nifs. Jekk tinnota kwalunkwe minn dawn is-sintomi fittex minnufih l-għajnuna medika.
- għandek dimenzja u jkollok bidla f'daqqa fl-istat mentali tieghek, jew dgħufija f'daqqa jew tneħħim f'wiċċek, f'dirgħajk jew fir-riglejk, speċjalment fuq naħa waħda, jew diskors li ma jinftehemx, anke għal perjodu qasir ta' żmien. Dawn jistgħu jkunu sinjali ta' puplesija.
- ikollok deni, ebusija fil-muskoli, għaraq jew livell aktar baxx ta' koxjenza (disturb imsejjaħ 'Sindrom Newrolettiku Malinn'). Jista' jkun hemm bżonn trattament mediku immedjat.
- raġel u qed ikollok erezzjoni fit-tul jew bl-uġiġh. Dan jissejjaħ prijapiżmu. Jista' jkun hemm bżonn trattament mediku immedjat.
- ikollok movimenti tal-ilsien, ħalq jew wiċċ involontari u ritmiċi. Jista' jkun hemm bżonn twaqif ta' paliperidone.

- ikollok allergija severa kkaratterizzata minn deni, nefha fil-halq, fil-wiċċ, fix-xufftejn jew fl-ilsien, qtugħ ta' nifs, ħakk, raxx fil-ġilda u xi kultant tnaqqis fil-pressjoni tad-demmm (li huma ekwivalenti għal 'reazzjoni anafilattika'). Anke jekk qabel inti ttollerajt risperidone li jittiehed mill-halq jew paliperidone li jittiehed mill-halq, b'mod rari jseħhu reazzjonijiet allergiċi wara li wiehed jirċievi injezzjonijiet ta' paliperidone.
- qed tippjana li jkollok operazzjoni f'għajnejk, kun żgur li tgħarraf lit-tabib tal-għajnejn tiegħek li qed tiehu din il-medicina. Waqt operazzjoni fl-għajn għal-lenti li tittappan (katarretta), il-ħabba (il-parti kkulurita tal-għajn) tista' titharrek waqt l-intervent kirurġiku (magħruf bhala "sindrom tal-ħabba li titharrek" u dan jista' jwassal għal ħsara fl-għajn.
- inti konxju li għandek numru baxx b'mod perikoluż ta' ċertu tip ta' ċelluli tad-demmm bojod meħtieġa biex jiġġieldu infezzjoni fid-demmm tiegħek.

L-effetti sekondarji li ġejjin jistgħu jseħhu:

Effetti sekondarji komuni hafna: jistgħu jaffettwaw aktar minn persuna waħda minn kull 10

- diffikultà biex torqod jew biex tibqa' rieqed.

Effetti sekondarji komuni: jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 10

- sintomi ta' riħ, infezzjoni fl-apparat tal-awrina, thossok qisek għandek l-influwenza
- TREVICTA jista' jżid il-livelli ta' ormon imsejjah "prolactin" li jinstab b'test tad-demmm (li jista' jikkawża jew ma jikkawżax sintomi). Meta jseħhu sintomi ta' prolactin għoli, dawn jistgħu jinkludu: (fl-irġiel) nefha fis-sider, diffikultà biex tinkiseb jew tinżamm erezzjoni, jew funzjoni sesswali ħazina oħra; (fin-nisa) skumdità fis-sider, hrug ta' ħalib mis-sider, menstrwazzjoni maqbuża, jew problemi oħra biċ-ċiklu tiegħek.
- livell għoli ta' zokkor fid-demmm, zieda fil-piż, tnaqqis fil-piż, tnaqqis fl-aptit
- irritabbiltà, depressjoni, ansjetà
- thossok bla kwiet
- parkinsoniżmu: Din il-kondizzjoni tista' tinkludi ċaqliq bil-mod jew indebolit, sensazzjoni ta' ebusija jew ġbid fil-muskoli (li jgegħluk tiċċaqlaq bl-iskossi), u xi kultant anke sensazzjoni li ċ-ċaqliq "jingazza" imbagħad jerga' jibda' mill-ġdid. Sinjali oħra ta' Parkinsoniżmu huma mixi bil-mod u bit-tkaxkir, roġħda f'parti tal-ġisem meta ma tkunx qed tiċċaqlaq, zieda fil-bzieq u/jew fit-tleġħib, u telf ta' espressjoni tal-wiċċ.
- nuqqas ta' kwiet, thossok bi ngħas, jew inqas attent
- distonja: Din hija kundizzjoni li tinvolvi ġbid involuntarju bil-mod jew sostnut tal-muskoli. Filwaqt li tista' taffettwa kwalunkwe parti tal-ġisem (u tista' twassal għal qagħda mhux normali), distonja hafna drabi tinvolvi l-muskoli tal-wiċċ, inkluż ċaqliq mhux normali tal-għajnejn, tal-halq, tal-ilsien jew tax-xedaq.
- sturdament
- diskajneżja: Din hija kundizzjoni li tinvolvi ċaqliq involuntarju tal-muskoli, u tista' tinkludi ċaqliq ripetittiv, bl-iskossi, bi tkagħwiġ, jew għall-għarrieda
- roġħda
- uġiġħ ta' ras
- rata mgħagġla ta' taħbit tal-qalb
- pressjoni tad-demmm għolja
- sogħla, imnieher imblukkat
- uġiġħ fl-addome, rimettar, nawsjia, stitikezza, dijarea, indigestjoni, uġiġħ tas-snien
- zieda fil-livelli tat-transaminases tal-fwied fid-demmm tiegħek
- uġiġħ fl-għadam jew fil-muskoli, uġiġħ fid-dahar, uġiġħ fil-ġogi
- telf tal-menstrwazzjoni
- deni, dgħufija, gheja kbira
- reazzjoni fis-sit tal-injezzjonni, li tinkludi ħakk, uġiġħ jew nefha.

Effetti sekundarji mhux komuni: jistghu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 100

- pulmonite, infezzjoni fis-sider (bronkite), infezzjoni tal-passaġġi tan-nifs, infezzjoni fis-sinus, infezzjoni fil-bużżieqa tal-awrina, infezzjoni fil-widnejn, tonsillite, infezzjoni bil-fungu fid-dwiefer, infezzjoni fil-ġilda, axxess taht il-ġilda
- tnaqqis fl-ġhadd ta' ċelluli bojod tad-demmm, tnaqqis fit-tip ta' ċelluli bojod tad-demmm li jgħinu biex jiproteġuk kontra infezzjoni, anemija
- reazzjoni allergika
- dijabete jew dijabete li tmur għall-agħar, żieda fl-insulina (ormon li jikkontrolla l-livelli ta' zokkor fid-demmm) fid-demmm tiegħek
- żieda fl-aptit
- telf ta' aptit li jwassal għal dgħufija fizika minhabba nuqqas ta' ikel sustanzjuż u piż baxx tal-ġisem
- livelli għolja ta' trigliċeridi fid-demmm (xaħam), żieda fil-kolesterol fid-demmm tiegħek
- disturb fl-irqad, burdata ta' ferħ kbir (manija), tnaqqis fl-aptit sesswali, nervi, hmar il-lejl
- diskajnezja tardiva (ċaqliq għall-għarrieda jew bl-iskossi li inti ma tistax tikkontrolla f'wiċċek, f'ilsienek, jew f'partijiet oħra ta' ġismek). Għid lit-tabib tiegħek minnufih jekk thoss ċaqliq ritmiku u involontarju tal-ilsien, tal-ħalq u tal-wiċċ. Jista' jkun li din il-medicina jkollha titwaqqaf.
- ħass ħażin, thoss bżonn bla sabar li ċċaqlaq partijiet minn ġismek, sturdament meta tqum bilwieqfa, disturb fl-attenzjoni, problemi bit-taħdit, telf jew sens mhux normali tat-togħma, sensazzjoni mnaqqsa għall-uġiġh u l-ħass fil-ġilda, sensazzjoni ta' tneimm, tingiż jew titrix fil-ġilda
- vista mċajpra, infezzjoni fl-għajn jew fil-membrana li tgħatti quddiem tal-għajn (*pink eye*), għajn xotta
- sensazzjoni li kollox qed idur bik (vertigo), żarżir fil-widnejn, uġiġh fil-widnejn
- interruzzjoni fit-trasmissjoni ta' impulsi bejn il-partijiet ta' fuq u t'isfel tal-qalb, trasmissjoni ta' impulsi elettrici mhux normali fil-qalb, titwil tal-intervall QT mill-qalb tiegħek, taħbit tal-qalb li jiżdied hekk kif tqum bilwieqfa, rata baxxa ta' taħbit tal-qalb, intraċċar elettriku mhux normali tal-qalb (elettrokardjogramma jew ECG), thoss tferfir jew taħbit qawwi f'sidrek (palpitazzjonijiet)
- pressjoni baxxa, pressjoni baxxa hekk kif tqum bilwieqfa (konsegwenza ta' dan, xi persuni li jkunu qed jieħdu din il-medicina jistghu jhossuhom qisu se jagħtihom ħass ħażin, storduti, jew jistghu jintilfu minn sensihom meta jqumu bilwieqfa jew iqumu bilqieda f'daqqa waħda)
- qtugħ ta' nifs, grizmejn juġġhu, tinfaġar mill-immieher
- skumdità fl-addome, infezzjoni fl-istonku jew fil-musrana, diffikultà biex tibra', ħalq xott, titfa' ammont eċċessiv ta' gass
- żieda fil-livell ta' GGT (enzima tal-fwied msejha gamma-glutamyltransferase) fid-demmm tiegħek, żieda fl-enzimi tal-fwied fid-demmm tiegħek
- ħorriqja, ħakk, raxx, jaqa' ix-xagħar, ekzema, ġilda xotta, ħmura fil-ġilda, akne
- żieda fil-livell ta' CPK (creatine phosphokinase) fid-demmm tiegħek, enzima li xi drabi tintreħa minn diżintegrazzjoni tal-muskoli
- spażmi fil-muskoli, ebusija fil-ġogi, dgħufija fil-muskoli
- inkontinenza (nuqqas ta' kontroll) tal-awrina, tagħmel l-awrina b' mod frekwenti, uġiġh meta tagħmel l-awrina
- impotenza, disturb fl-eġakulazzjoni, menstrwazzjoni maqbuża jew problemi oħra biċ-ċiklu tiegħek (nisa), żvilupp ta' sider fl-irġiel, funzjoni sesswali ħażina, uġiġh fis-sider, tnixxija ta' ħalib mis-sider
- nefha fil-wiċċ, fil-ħalq, fl-għajnejn, jew fix-xofftejn, nefha fil-ġisem, fid-dirgħajn jew fir-riglejn
- żieda fit-temperatura tal-ġisem
- bidla fil-mod kif timxi
- uġiġh fis-sider, skumdità fis-sider, thossok ma tiflaħx
- ġilda tibbies
- waqgħa.

Effetti sekundarji rari: jistghu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 1 000

- infezzjoni fl-għajn
- infjammazzjoni fil-gilda kkawżata minn dud irqiq parassitiku (mite), qorriegħa jew gilda bil-qxur u l-ħakk
- zieda fl-eosinofili (tip ta' ċellula tad-demmm bajda) fid-demmm tiegħek
- tnaqqis fil-plejtlits (ċelluli tad-demmm li jgħinu biex id-demmm ma jibqax ħiereg)
- tnixxija mhux f'lokha ta' ormon li jikkontrolla l-volum tal-awrina
- zokkor fl-awrina
- kumplikazzjonijiet ta' theddida għall-ħajja minn dijabete mhux ikkontrollata
- livell baxx ta' zokkor fid-demmm
- xorb eċċessiv ta' ilma
- konfużjoni
- ras tirtogħod
- ma tiċċaqlaqx jew ma tirrispondix waqt li tkun imqajjem/ma (katatonja)
- timxi waqt li tkun rieqed/a
- nuqqas ta' emozzjoni
- ma jkunx jista' jinkiseb orgażmu
- sindrome newrolettiku malinn (konfużjoni, koxxjenza mnaqqsa jew telf mis-sensi, deni għoli, u ebusija severa fil-muskoli), problemi fil-važi tad-demmm fil-moħħ, inkluż telf f'daqqa ta' provvista tad-demmm lejn il-moħħ (puplesija jew "puplesija żgħira"), ma tirrispondix għall-istimuli, telf mis-sensi, livell baxx ta' koxxjenza, konvulżjoni (aċċessjonijiet), disturb fil-bilanċ koordinazzjoni anormali
- glawkoma (zieda fil-pressjoni għewwa l-boċċa tal-għajn)
- problemi biċ-ċaqliq ta' għajnejk, tidwir tal-għajnejn, sensitività żejda tal-għajnejn għad-dawl, zieda fid-dmugh, ħmura fl-għajnejn
- fibrillazzjoni tal-atriju (ritmu mhux normali tal-qalb), qalb tħabbat b'mod irregolari
- ikollok tagħqid tad-demmm fil-vini speċjalment fir-riġlejn (sintomi jinkludu nefħa, ugiġħ u ħmura fis-sieq). Jekk tinnota kwalunkwe minn dawn is-sintomi, fittex minnufih l-għajjnuna medika
- tagħqid tad-demmm fil-pulmuni li jikkawża ugiġħ fis-sider u diffikultà biex tieħu n-nifs. Jekk inti tinnota xi wieħed minn dawn is-sintomi fittex parir mediku immedjatament.
- fwawar
- probemi biex tieħu n-nifs waqt l-irqad (apnea tal-irqad)
- kongestjoni fil-pulmuni, kongestjoni fil-passaġġi tat-teħid tan-nifs, tisfir
- ħsejjes ta' tifqigħ fil-pulmun
- infjammazzjoni tal-frixa, ilsien minfuħ, inkontinenza tal-ippurgar, ippurgar iebes ħafna
- sadda fl-imsaren
- qsim fix-xuftejn
- raxx fil-gilda marbut mal-medicina, gilda teħxien, brija
- nefħa fil-gogi
- ma tkunx tista' tagħmel l-awrina
- skumdità fis-sider, tkabbir tal-glandoli għewwa sidrek, tkabbir tas-sider
- tnixxija mill-vagina
- priapiżmu (erezzjoni tal-pene li tieħu fit-tul li tista' tkun teħtiegħ trattament b'operazzjoni)
- temperatura tal-gisem baxxa ħafna, tkexxix ta' bard, thossok bil-għatx
- sintomi ta' waqfien ta' medicina li tivvizzja
- akkumulazzjoni ta' materja kkawżata minn infezzjoni fil-post tal-injezzjoni, infezzjoni fil-fond fil-gilda, ċesta fil-post tal-injezzjoni, tbengil fil-post tal-injezzjoni.

Mhux magħrufa: ma tistax tittiehed stima tal-frekwenza mid-data disponibbli

- numbru baxx b'mod perikoluż ta' ċertu tip ta' ċellula bajda tad-demmm meħtiegħa biex tiġġieled infezzjoni fid-demmm tiegħek
- reazzjoni allergika severa kkaratterizzata minn deni, nefħa fil-ħalq, fil-wiċċ, fix-xoffa jew fl-ilsien, qtugħ ta' nifs, ħakk, raxx fil-gilda u xi drabi tnaqqis fil-pressjoni tad-demmm
- xorb eċċessiv perikoluż ħafna ta' ilma

- disturb fil-kwantità ta' ikel li wieħed jiekol, marbut mal-irqad
- koma minhabba dijabete mhux ikkontrollata
- tehid tan-nifs mgħagġel u qasir, pulmonite kkawżata minn ġbid tal-ikel man-nifs, disturb fil-vuċi
- tnaqqis fl-ossigenu f'partijiet ta' ġismek (minhabba tnaqqis fil-provvista tad-demmi)
- nuqqas ta' moviment fil-musrana li jikkawża mblukkar
- il-ġilda u l-abjad tal-ġhajnejn jisfaru (suffejra)
- raxx sever jew ta' periklu għall-ħajja bi nfafet u taqxir tal-ġilda li jista' jibda fil-ħalq, fl-imnieher, fl-ġhajnejn u fil-ġenitali jew madwarhom u jinfirex f'partijiet oħra tal-ġisem (sindrome ta' Stevens-Johnson/nekroliżi tossika tal-epidermide)
- reazzjoni allergika serja b'nefha li tista' tinvolvi l-gerżuma u twassal għal diffikultà biex tieħu n-nifs
- telf ta' kulur tal-ġilda
- qagħda mhux normali
- trabi tat-twelid imwielda minn nisa li jkunu ħadu TREVICTA waqt it-tqala jista' jkollhom effetti sekondarji tal-medicina u jew sintomi ta' waqfien ta' medicina li tivvizzja, bħal irritabbiltà, ġbid involuntarju bil-mod jew sostnut tal-muskoli, roġħda, ħedla tan-nġhas, problemi bit-tehid tan-nifs jew biex jinsqew
- tnaqqis fit-temperatura tal-ġisem
- ċelluli tal-ġilda mejtin fil-post tal-injezzjoni, ulċera fil-post tal-injezzjoni.

Rapportar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effetti sekondarji, kellem lit-tabib, lill-ispizjar jew lill-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi effetti sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Tista' wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali mniżżla f' **Appendiċi V**. Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista' tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta' din il-medicina.

5. Kif taħzen TREVICTA

Żomm din il-medicina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-medicina wara d-data ta' meta tiskadi li tidher fuq il-kartuna. Id-data ta' meta tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta' dak ix-xahar.

Dan il-prodott medicinali m'għandu bżonn l-ebda ħażna speċjali.

Tarmix medicini mal-ilma tad-dranagġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispizjar tiegħek dwar kif għandek tarmi medicini li m'għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X'fih TREVICTA

Is-sustanza attiva hija paliperidone.

Kull siringa mimlija għal-lest ta' TREVICTA 175 mg fiha 273 mg paliperidone palmitate f'0.88 mL.

Kull siringa mimlija għal-lest ta' TREVICTA 263 mg fiha 410 mg paliperidone palmitate f'1.32 mL.

Kull siringa mimlija għal-lest ta' TREVICTA 350 mg fiha 546 mg paliperidone palmitate f'1.75 mL.

Kull siringa mimlija għal-lest ta' TREVICTA 525 mg fiha 819 mg paliperidone palmitate f'2.63 mL.

L-ingredjenti l-oħra huma:

Polysorbate 20

Polyethylene glycol 4 000

Citric acid monohydrate

Sodium dihydrogen phosphate monohydrate

Sodium hydroxide (għal aġġustament tal-pH)
Ilma għall-injezzjonijiet

Kif jidher TREVICTA u l-kontenut tal-pakkett

TREVICTA hija suspensjoni minn bajda sa ofwajt li terhi l-mediċina bil-mod għall-injezzjoni f'siringa mimlija għal-lest li t-tabib jew l-infermier tiegħek se jhawwad bis-saħħa biex jerga' jagħmliha suspensjoni qabel tingħata bhala injezzjoni.

Kull pakkett fih siringa 1 mimlija għal-lest u 2 labriet.

Jista jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq

Janssen-Cilag International NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Il-Belġju

Manifattur

Janssen Pharmaceutica NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Il-Belġju

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq.

België/Belgique/Belgien

Janssen-Cilag NV
Tel/Tél: +32 14 64 94 11

Lietuva

UAB "JOHNSON & JOHNSON"
Tel: +370 5 278 68 88

България

"Джонсън & Джонсън България" ЕООД
Тел.: +359 2 489 94 00

Luxembourg/Luxemburg

Janssen-Cilag NV
Tél/Tel: +32 14 64 94 11

Česká republika

Janssen-Cilag s.r.o.
Tel: +420 227 012 227

Magyarország

Janssen-Cilag Kft.
Tel.: +36 1 884 2858

Danmark

Janssen-Cilag A/S
Tlf: +45 4594 8282

Malta

AM MANGION LTD.
Tel: +356 2397 6000

Deutschland

Janssen-Cilag GmbH
Tel: +49 2137 955 955

Nederland

Janssen-Cilag B.V.
Tel: +31 76 711 1111

Eesti

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal
Tel.: +372 617 7410

Norge

Janssen-Cilag AS
Tlf: +47 24 12 65 00

Ελλάδα

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε
Τηλ: +30 210 80 90 000

Österreich

Janssen-Cilag Pharma GmbH
Tel: +43 1 610 300

España

Janssen-Cilag, S.A.
Tel: +34 91 722 81 00

France

Janssen-Cilag
Tel: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

Hrvatska

Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
Tel: +385 1 6610 700

Ireland

Janssen Sciences Ireland UC
Tel: 1 800 709 122
medinfo@its.jnj.com

Ísland

Janssen-Cilag AB
C/o Vistor hf
Sími: +354 535 7000

Italia

Janssen-Cilag SpA
Tel: 800.688.777 / +39 02 2510 1

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ
Τηλ: +357 22 207 700

Latvija

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā
Tel: +371 678 93561

Polska

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 237 60 00

Portugal

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda.
Tel: +351 214 368 600

România

Johnson & Johnson România SRL
Tel: +40 21 207 1800

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o.
Tel: +386 1 401 18 00

Slovenská republika

Johnson & Johnson, s.r.o.
Tel: +421 232 408 400

Suomi/Finland

Janssen-Cilag Oy
Puh/Tel: +358 207 531 300

Sverige

Janssen-Cilag AB
Tfn: +46 8 626 50 00

United Kingdom (Northern Ireland)

Janssen Sciences Ireland UC
Tel: +44 1 494 567 444
medinfo@its.jnj.com

Dan il-fuljett kien rivedut l-ahhar f'

Informazzjoni dettaljata dwar din il-medicina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Medicini: <http://www.ema.europa.eu>.

Informazzjoni li qeghda ghal professjonisti fil-qasam mediku jew fil-qasam tal-kura tas-sahha

L-informazzjoni li ġejja qeghda biss ghal professjonisti fil-qasam mediku jew professjonisti fil-qasam tal-kura tas-sahha u ghandha tinqara mill-professjonist mediku jew fil-qasam tal-kura tas-sahha flimkien mal-informazzjoni shiha dwar kif ghandu jigi preskritt (Sommarju tal-Karatterisitiċi tal-Prodott).



Agħti kull 3 xhur



Ħawwad is-siringa bis-sahha għal mill-inqas 15-il sekonda

Biex jinghata b'injezzjoni ġol-muskoli biss. Tagħtix mill-ebda rotta oħra.

Importanti

Aqra l-istruzzjonijiet kollha qabel l-użu. TREVICTA jehtieg li tinghata attenzjoni lil dawn il-passi tal-Istruzzjonijiet dwar l-Użu li tgħin biex jigi accertat għoti b'suċċess.

TREVICTA għandu jinghata minn professjonist fil-qasam tal-kura tas-sahha bhala injezzjoni waħda.

TAQSAMX id-doża f'hafna injezzjonijiet.

TREVICTA qiegħed biex jintuza biss fil-muskoli. Injetta bil-mod, fil-fond ġol-muskolu filwaqt li toqgħod attent li tevita li tagħti l-injezzjoni ġo arterja jew vina.

Għoti tad-doża

TREVICTA għandu jinghata **darba kull 3 xhur**.

Preparazzjoni

Qaxxar it-tikketta ta' identifikazzjoni minn mas-siringa u poġġiha fir-rekords tal-pazjent.

TREVICTA jehtieg li **tithawwad għal iktar fit-tul u iktar bis-sahha** minn paliperidone palmitate ta' kull xahar li jista' jigi injettat. Ħawwad is-siringa bis-sahha, bit-tarf tas-siringa iħares 'il fuq, għal **mill-inqas 15-il sekonda fil-5 minuti ta' qabel l-għoti** (ara Pass 2).


L-Għażla tal-Labar ta' Sigurtà Magħmula minn Materjal Irqiq

Labar ta' Sigurtà Magħmula minn Materjal Irqiq (TW - *thin wall*) huma ddisinjati biex jintużaw ma' TREVICTA. Huwa importanti li **tuza biss il-labar provduti fil-pakkett ta' TREVICTA**.

Kontenut tal-Pakkett tad-Doża

Prefilled Syringe

Thin Wall Safety Needles




1

Agħżel labra

L-għażla tal-labra hija determinata mill-post tal-injezzjoni u l-piż tal-pazjent.

Jekk se tagħti injezzjoni fid-**Deltoid**




Jekk il-pazjent jiżen:
Inqas minn 90 kg
l-aċċessorju r-roża

22G × 1"

90 kg jew aktar
l-aċċessorju l-isfar

22G × 1½"

Jekk se tagħti injezzjoni **Gluteali**




Irrispettivament mill-piż tal-pazjent:
l-aċċessorju l-isfar

22G × 1½"



Immedjatement armi l-labra li ma ntużatx fil-kontenitur approvat għal oġġetti li jaqtgħu jew bil-ponta. Iżżomhiex biex tużaha aktar 'il quddiem.



HAWWAD BIS-SAHHA għal mill-inqas 15-il sekonda

Bit-tarf tas-siringa jhares 'il fuq,
HAWWAD BIS-SAHHA b'polz
merhi għal mill-inqas 15-il sekonda
 biex tkun ċert li għandek suspensjoni omogena.

NOTA: Din il-medicina tehtieg li tithawwad għal iktar fit-tul u b'aktar saħħa minn paliperidone palmitate ta' kull xahar li jista' jiġi injettat.



Għaddi għall-pass li jmiss immedjatament wara li thawwadha.
Jekk jghaddu aktar minn 5 minuti
qabel l-injezzjoni, hawwad bis-
sahħa, bit-tarf tas-siringa jerga'
jhares 'il fuq, għal mill-anqas
 15-il sekonda biex tissospendi l-
 medicina mill-gdid.


Iċċekkja s-suspensjoni



Wara li thawwad is-siringa għal mill-anqas 15-il sekonda, iċċekkja d-dehra tas-suspensjoni mit-tieqa li tara minnha.


Is-suspensjoni għandha tidher kollha l-istess u ta' lewn abjad qisha ħalib. Huwa normali wkoll li tara b'żewġ qiegħ tal-arja.

Iftaħ il-pakkett tal-labra u nehhi t-tapp



L-ewwel, iftaħ il-pakkett tal-labra billi tqaxxar il-kisja san-nofs. Poġġih fuq wiċċ nadif. Imbagħad, filwaqt li żżomm is-siringa wieqfa, dawwar u iġbed it-tapp tas-siringa biex tneħħih.

Aqbad il-pakkett tas-siringa




Itwi l-kisja tal-labra u t-tilar tal-plastik lura. Imbagħad, b'mod sod aqbad l-għatu tal-labra minn għol-pakkett, kif muri.

Wahhal il-labra



Żomm is-siringa tipponta 'l fuq. Wahhal il-labra ta' sigurtà mas-siringa billi ddawwarha bil-mod biex tevita qsim jew hsara lill-baži tal-labra. Dejjem iċċekkja għal sinjali ta' hsara jew tnixxija qabel l-ġhoti.


Nehhi l-ġhatu tal-labra



Iġbed l-ġhatu minn mal-labra b' movement dritt.

Iddawwarx l-ġhatu, minhabba li dan jista' jholl il-labra minn mas-siringa.

Nehhi l-bżieżaq tal-arja




Żomm is-siringa wieqfa u tektek fuqha bil-mod biex iġġieghel il-bżieżaq tal-arja jitilgħu 'il fuq. Bil-mod u b'attenzjoni imbotta l-virga tal-plaġer 'l fuq biex tnehhi l-arja.

3

Injetta

Injetta d-doża




Bil-mod injetta l-kontenut kollu tas-siringa ġol-muskolu, fil-fond fil-muskolu magħżul tad-deltoid jew gluteali.

Tagħtix mill-ebda rotti ohra.

4

Wara l-injezzjoni

Nehhi l-periklu tal-labra



Wara li titlesta l-injezzjoni, uża s-saba' l-kbir jew wiċċ ċatt biex tneħhi l-periklu tal-labra billi tagħlaqha permezz tal-mekkaniżmu ta' sigurtà. Il-labra ma tibqax perikoluża meta jistema l-hoss ta' "klikk".

Armi kif suppost



Armi s-siringa u l-labra mhux użata fil-kontenitur approvat għal oġġetti li jaqtgħu jew bil-ponta.



Il-labar ta' sigurtà magħmula minn materjal irqiq huma ddisinjati speċifikament biex jintużaw ma' TREVICTA. Labar mhux użati għandhom jintremew u m'għandhomx jinżammu biex jintużaw aktar 'il quddiem.