

ANNESS I

SOMMARJU TAL- KARATTERISTIČI TAL-PRODOTT

1. ISEM IL-PRODOTT MEDICINALI

Vizarsin 25 mg pilloli miksija b'rita
Vizarsin 50 mg pilloli miksija b'rita
Vizarsin 100 mg pilloli miksija b'rita

2. GHAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola miksija b'rita fiha sildenafil citrate ekwivalenti għal 25 mg, 50 mg jew 100 mg sildenafil.

Eċċipjent b'effett magħruf:

Vizarsin 25 mg pilloli miksija b'rita

Kull pillola miksija b'rita fiha 1.9 mg lactose (bħala monohydrate).

Vizarsin 50 mg pilloli miksija b'rita

Kull pillola miksija b'rita fiha 3.8 mg lactose (bħala monohydrate).

Vizarsin 100 mg pilloli miksija b'rita

Kull pillola miksija b'rita fiha 7.6 mg lactose (bħala monohydrate).

Għal-lista shiħa ta' eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola miksija b'rita.

Vizarsin 25 mg pilloli miksija b'rita: Pilloli bojod, oblong, immarkati "25" fuq naħa waħda.

Vizarsin 50 mg pilloli miksija b'rita: Pilloli bojod, oblong, immarkati "50" fuq naħa waħda.

Vizarsin 100 mg pilloli miksija b'rita: Pilloli bojod, oblong, immarkati "100" fuq naħa waħda.

4. TAGHRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Vizarsin hu indikat f'irġiel adulti bi problema ta' l-erezzjoni tal-pene. Dan jirreferi għal diffikultà biex wiehed jilhaq jew iżomm erezzjoni għal tul ta' żmien biżżejjed biex l-att sesswali iseħħ b'mod sodisfaċenti.

Biex Vizarsin ikun effettiv, ikun hemm bżonn ta' stimolazzjoni sesswali.

4.2 Pożoloġija u metodu ta' kif għandu jingħata

Pożoloġija

Użu fl-adulti:

Id-doża rrakkomandata hija 50 mg meħuda kif meħtieġ madwar siegħa qabel l-attività sesswali. Bażata fuq effiċjenza u tollerabilità, id-doża tista tizzied għal 100 mg jew titnaqqas għal 25 mg. Id-doża massima rrakkomandata hija 100 mg. Il-frekwenza tad-dożagg massimu rrakkomandat huwa ta' darba kuljum. Jekk Vizarsin jittiehed mal-ikel, jista' jkun li l-effett tagħha jdum aktar ma jinħass milli kieku jittiehed fuq stonku vojta (ara sezzjoni 5.2).

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani

Aġġustamenti fid-doża mhumiex meħtieġa għal pazjenti anzjani (ta' ≥ 65 sena).

Indeboliment tal-kliwi

Ir-rakkomandazzjonijiet ta' dożaggi mfissra f' "Użu fl-adulti" japplikaw għal pazjenti b'indeboliment hafif għal moderat tal-kliwi (tneħħija ta' kreatinina = 30-80 ml/min).

Peress li t-tneħħija ta' sildenafil titnaqqas f'pazjenti b'indeboliment sever tal-kliwi (tneħħija ta' kreatinina <30 ml/min) doża ta' 25 mg għandha tiġi kkunsidrata. Skont l-effikaċja u t-tollerabilità, id-doża tista' tiżdied fi stadji għal 50 mg sa 100 mg skont il-ħtieġa.

Indeboliment tal-fwied

Peress li t-tneħħija ta' sildenafil titnaqqas f'pazjenti b'indeboliment tal-fwied (eż. ċirrosi) doża ta' 25 mg għandha tiġi kkunsidrata. Skont l-effikaċja u tollerabilità, id-doża tista' tiżdied f'inkrementi għal 50 mg sa 100 mg skont il-ħtieġa.

Popolazzjoni pedjatrika

Vizarsin mhux indikat għal individwi taħt l-eż ta' 18 sena.

Użu f'pazjenti li jkunu qed jieħdu prodotti mediċinali oħra:

Bl-eċċessjoni ta' ritonavir li mhux rakkomandat li sildenafil jingħata miegħu (ara sezzjoni 4.4) doża tal-bidu ta' 25 mg għandha tiġi kkunsidrata f'pazjenti li fl-istess hin ikunu fuq trattament ta' inibituri ta' CYP3A4 (ara sezzjoni 4.5).

Biex jitnaqqas ir-riskju ta' żvilupp ta' pressjoni baxxa posturali f'pazjenti li jkunu qed jirċievu kura b'alpha-blockers, il-pazjenti għandhom jiġu stabilizzati fuq kura b'alfa blockers qabel ma jinbeda trattament b'sildenafil. Barra minn hekk, għandu jiġi kkunsidrat li tinbeda kura b'sildenafil b'doża ta' 25 mg (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.5).

Metodu ta' kif għandu jingħata

Għal użu orali.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieħed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1.

B'mod konsistenti mal-effetti magħrufa tiegħu fuq il-passaġġ ta' nitric oxide/cyclic guanosine monophosphate (cGMP) (ara sezzjoni 5.1), sildenafil intwera li jsaħħaħ l-effetti ipotensivi ta' nitrati, u l-amministrazzjoni kongunta b'donaturi ta' nitric oxide (bħal amyl nitrite) jew nitrati f'xi għamla oħra għalhekk kontraindikata.

It-teħid flimkien ta' inibituri ta' PDE5, inkluż sildenafil, ma' stimulatori ta' guanylate cyclase, bħal riociguat, huwa kontraindikat għax hemm il-possibbiltà li dan iwassal għal ipotensjoni sintomatika (ara sezzjoni 4.5).

Sustanzi għal kura ta' problemi tal-erezzjoni, li jinkludu sildenafil, m'għandhomx jintużaw f'irġiel li għalihom l-attività sesswali mhix irrakkomandata (eż. pazjenti bi problemi severi kardjovaskulari bħal angina mhux stabbli jew insuffiċjenza kardijaka gravi).

Vizarsin huwa kontraindikat f'dawk il-pazjenti li tilfu l-vista minn għajn waħda minhabba newropatija anterjuri iskimika, mhux arterika tal-għajn (NAION), kemm jekk dan l-episodju għar wara espożizzjoni għal inibitur ta' PDE5 kif ukoll jekk le (ara sezzjoni 4.4).

Is-sigurtà ta' sildenafil ma ġietx studjata f'dawn is-sottogruppi ta' pazjenti li ġejjin, u għalhekk l-użu tiegħu huwa kontraindikat: indeboliment sever tal-fwied, pressjoni baxxa (pressjoni tad-dem $<90/50$ mmHg), passat reċenti ta' puplesija jew attakk tal-qalb u mard magħruf ereditarju ta' degenerazzjoni

tar-retina bħal retinitis pigmentosa (minoranza ta' dawn il-pazjenti għandhom mard genetiku ta' phosphodiesterases retinali).

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Għandha titqies l-istorja medika tal-pazjent u jsir eżami fiżiku, biex issir dijanjożi tal-problema tal-erezzjoni u jiġu determinati raġunijiet oħra li jista' jkun hemm, qabel ma tinbeda kura farmakoloġika.

Fatturi ta' riskju kardjovaskulari

Qabel ma tinbeda xi kura għal problema tal-erezzjoni, t-tabib għandu jikkunsidra l-istat kardjuvaskulari tal-pazjent, minhabba li hemm grad ta' riskju għal qalb assoċjat ma' attività sesswali. Sildenafil għandu effetti vażodilatatorji, li jirriżultaw fi tnaqqis hafif u temporanju tal-pressjoni tad-demm (ara sezzjoni 5.1). Qabel ma tinghata riċetta għal sildenafil, it-tobba għandhom jikkonsidraw bir-reqqa jekk pazjenti b'kundizzjonijiet fl-isfond hux ser jiġu affettwat hażin minn dawn l-effetti ta' vażodilatazzjoni, speċjalment waqt l-attività sesswali. Pazjenti li jistgħu jintlaqtu hażin bl-użu ta' sustanzi vażodilatatorji jinkludu dawk li jsofru minn sadd tal-ħrug ventikulari tax-xellug (eż. stenożi tal-aorta, *hypertrophic obstructive cardiomyopathy*), jew dawk bis-sindromu rari ta' atrofija ta' sistemi diversi li jidher li jkollu effetti qawwija fuq il-kontroll awtonomu tal-pressjoni tad-demm.

Sildenafil iħarrax l-effett ipotensiv ta' nitrati (ara sezzjoni 4.3).

Wara li tqiegħedet fuq is-suq, ġew irrappurtati każi kardjuvaskulari serji marbuta mal-użu fl-istess waqt ta' sildenafil, fosthom infart mijokardijaku, angina instabbli, mewt zoptu b'attakk tal-qalb, aritmja ventikulari, emorraġija ċerebrovaskulari, attakk iskemiku transitorju, pressjoni għolja u pressjoni baxxa. Il-biċċa l-kbira ta' dawn il-pazjenti, iżda mhux kollha, kellhom fatturi ta' riskju kardjuvaskulari minn qabel. Ħafna każi ġew irrappurtati li għaw matul jew f'it wara attività sesswali u f'it ġew irrappurtati li għaw wara l-użu ta' sildenafil mingħajr attività sesswali. Mhux possibbli jiġi determinat jekk dawn il-każi humiex relatati direttament ma' dawn il-fatturi jew ma' fatturi oħra.

Prijapiżmu

Sustanzi għal kura ta' problema tal-erezzjoni fosthom sildenafil, għandhom jintużaw b'kawtela f'pazjenti b'deformazzjoni anatomika tal-pene (bħal angulazzjoni, fibrosi fil-korpus kavernożum jew il-marda ta' *Peyronie*), jew f'pazjenti li għandhom kundizzjonijiet li jagħmluhom predisposti għal prijapiżmu (bħal anemija tas-*sickle cell*, majeloma multipla jew lewkimja).

Erezzjonijiet fit-tul u prijapiżmu ġew irrappurtati b'sildenafil f'esperjenza ta' wara t-tqegħid fis-suq. Fil-każ ta' erezzjoni li tippersisti għal iktar minn 4 sigħat, il-pazjent għandu jfittex għajnnu medika immedjatament. Jekk il-prijapiżmu ma jiġix ikkurat immedjatament, tista' tirriżulta ħsara fit-tessut tal-pene u telf permanenti fil-potenza.

L-użu fl-istess ħin ma' inibituri oħrajn ta' PDE5 jew kuri oħrajn għal disfunzjoni erettile

Is-sigurtà u effiċjenza tal-użu ta' sildenafil ma' inibituri oħrajn ta' PDE5, jew ma' kuri oħrajn għal pressjoni għolja tal-arterja pulmonari (PAH) li jkun fihom sildenafil, jew trattamenti oħra għal problemi tal-erezzjoni ma ġewx studjati. Għalhekk l-użu ta' dan it-taħlit, mhux rakkomandat.

Effetti fuq il-vista

Każijiet ta' difetti fil-vista relatati mal-amministrazzjoni ta' sildenafil u inibituri ta' PDE5 oħrajn ġew irrappurtati b'mod spontanju (ara sezzjoni 4.8). Każijiet ta' newropatija anterjuri iskimika, mhux arteritika ta' l-għajn, kundizzjoni rari, relatati mal-amministrazzjoni ta' sildenafil u inibituri ta' PDE5 oħrajn ġew irrappurtati b'mod spontanju fi studju ta' osservazzjoni (ara sezzjoni 4.8). Il-pazjenti għandhom jkunu avżati li fl-eventwalità li f'daqqa waħda jiżviluppaw kwalunkwe difett fil-vista, dawn għandhom iwaqqfu l-Vizarsin u jkellmu tabib immedjatament (ara sezzjoni 4.3).

L-użu fl-istess hin ma' ritonavir

Il-ko-amministrazzjoni ta' sildenafil ma' ritonavir mhix irrakkomandata (ara sezzjoni 4.5).

L-użu fl-istess hin ma' alpha-blockers

Sildenafil għandu jintuża b'kawtela fost dawk li qed jużaw alpha-blockers peress li l-ghoti fl-istess hin tista' twassal għal pressjoni sintomatika baxxa f'xi pazjenti (ara sezzjoni 4.5). Huwa probabbli li dan isehh fi żmien 4 sigħat wara li tittieħed id-doża ta' sildenafil. Biex jitnaqqas ir-riskju ta' pressjoni baxxa posturali, pazjenti għandhom ikunu emodinamikament stabbli fuq trattament ta' alpha-blockers qabel ma jinbeda t-trattament b'sildenafil. Għandu jiġi kkunsidrat li tinbeda kura b'sildenafil b'doża ta' 25 mg (ara sezzjoni 4.2). Barra minn hekk, it-tobba għandhom jgħarrfu lill-pazjenti tagħhom fuq il-passi li jridu jiehdu f'każ li jkollhom sintomi ta' pressjoni baxxa posturali.

L-effett fuq il-ħruġ tad-demm

Studji bi plejtlets umani jindikaw li sildenafil isahha l-effett kontra l-aggregazzjoni ta' sodium nitroprusside *in vitro*. M'hemmx informazzjoni dwar is-sigurtà tal-amministrazzjoni ta' sildenafil f'pazjenti b'mard ta' emorraġġi (tnixxija tad-demm) jew ulċera attiva fl-istonku. Għalhekk sildenafil għandu jingħata biss lil dawn il-pazjenti wara eżami bir-reqqa tal-beneficċji u r-riskji.

Nisa

Vizarsin mhux indikat biex jintuża min-nisa.

Eċċipjenti

Vizarsin fiħ lactose. Pazjenti li għandhom problemi ereditarji rari ta' intolleranza għall-galactose, nuqqas totali ta' lactase jew malassorbiment tal-glucosegalactose m'għandhomx jiehdu din il-medicina.

Din il-medicina fiha anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f'kull pillola, jiġifieri essenzjalment "ħieles mis-sodium".

4.5 Interazzjoni ma' prodotti mediċinali ohra u forom ohra ta' interazzjoni

Effetti ta' prodotti mediċinali ohra fuq sildenafil

Studji in vitro:

Il-metaboliżmu ta' sildenafil isehh l-aktar permezz tal-iżoformi ta' ċitokromju P450 (CYP) 3A4 (rotta ewlenija) u 2C9 (rotta minuri). Għalhekk, l-inibituri ta' dawn l-iżoenzimi jistgħu jnaqqsu t-tneħħija ta' sildenafil u l-indutturi ta' dawn l-iżoenzimi jistgħu jżidu t-tneħħija ta' sildenafil.

Studji in vivo:

Analizi farmakokinetika ta' tagħrif minn provi kliniċi fuq grupp ta' pazjenti tindika tnaqqis fit-tneħħija ta' sildenafil meta ngħata flimkien ma' inibituri ta' CYP3A4 (bħal ketoconazole, erythromycin, cimetidine). Għalkemm ma gietx osservata żieda fl-inċidenza ta' reazzjonijiet avversi f'dawn il-pazjenti, doża tal-bidu ta' 25 mg għandha tiġi kunsidrata meta sildenafil jiġi amministrat fl-istess hin ma' inibituri ta' CYP3A4.

L-ghoti wkoll tal-inibitur ta' HIV protease ritonavir, fi stat stabbli (500 mg darbtejn kuljum) ma' sildenafil (100 mg doża waħda) irriżulta f'żieda ta' 300% (4 darbjet) fis- C_{max} ta' sildenafil u żieda ta' 1000% (11-il darba) fl-AUC tal-plażma ta' sildenafil. F'24 siegħa, il-livelli ta' plazma ta' sildenafil kienu għadhom bejn wieħed u ieħor 200 ng/ml, imqabblin ma' bejn wieħed u ieħor 5 ng/ml meta sildenafil ingħata waħdu. Dan huwa konsistenti ma' l-effetti sinifikanti ta' ritonavir fuq varjeta wiesgħa ta' sustrati ta' P450. Sildenafil ma kellux effett fuq il-farmakokinetiċi ta' ritonavir. Bażata fuq dawn ir-riżultati farmakokinetiċi il-ko-amministrazzjoni ta' sildenafil ma' ritonavir mhix

rakkomandata (ara sezzjoni 4.4) u f'kull eventwalità l-oghla doża ta' sildenafil taht l-ebda ċirkustanza ma għandha tkun iżjed minn 25 mg tul 48 siegħa.

L-ghoti wkoll tal-inibitur ta' HIV protease saquinavir, inibitur ta' CYP3A4, fi stat stabbli (1200 mg tlett darbiet kuljum) ma' sildenafil (100 mg doża waħda) irrizulta f'żieda ta' 140% fis- C_{max} ta' sildenafil u żieda ta' 210% fl-AUC ta' sildenafil. Sildenafil ma kellux effett fuq il-farmakokinteki ta' saquinavir (ara sezzjoni 4.2). Inibituri ta' CYP3A4 aktar b'saħħithom bħal ketoconazole u itraconazole jkun mistennija li jkollhom effetti akbar.

Meta doża waħda ta' 100 mg sildenafil ġiet amministrata ma' erythromycin, inibitur moderat ta' CYP3A4, fi stat stabbli (500 mg darbtejn kuljum għal 5 jiem), kien hemm żieda ta' 182% fl-espożizzjoni sistemika (AUC) ta' sildenafil. F'voluntiera rġiel normali b'saħħithom, ma kienx hemm evidenza ta' xi effett ta' azithromycin (500 mg kuljum għal 3 jiem) fuq ir-rata tal-eliminazzjoni fissa tal-AUC, C_{max} u t_{max} , jew il-half life ta' wara ta' sildenafil jew il-metabolu principali tiegħu fiċ-ċirkolazzjoni. Cimetidine (800 mg), inibitur ta' ċitokromju P450 u inibitur ta' CYP3A4 mhux speċifiku, wassal għal żieda ta' 56% fil-konċentrazzjonijiet tal-plażma ta' sildenafil meta ngħata flimkien ma' sildenafil (50 mg) fuq voluntiera b'saħħithom.

Il-meraq tal-grejpfrut huwa inibitur dghajjef tal-metaboliżmu ta' CYP3A4 li jsehh fil-wiċċ ta' ġewwa tal-musrana u jista' jwassal għal żidiet żgħar fil-livelli tal-plażma ta' sildenafil.

Doži waħdanin ta' antaċidu (magnesium hydroxide/aluminium hydroxide) ma effettwatx il-bijodisponibilità ta' sildenafil.

Għalkemm ma sarux studji speċifiċi ta' interazzjoni għal prodotti mediċinali kollha, analiżi farmakokinetiċi tal-popolazzjoni ma wrew l-ebda effett ta' medikazzjoni konkomitanti fuq il-farmakokinetiċi ta' sildenafil meta miġbura fi gruppi bħala inibituri ta' CYP2C9 (bħal tolbutamide, warfarin, phenytoin), inibituri ta' CYP2D6 (bħal *selective serotonin reuptake inhibitors*, *tricyclic antidepressants*), thiazide u diuretiki relatati, diuretiki *loop* u li jirristringu t-tnixxija ta' potassju, inibituri tal-eżima li tikkonverti l-angiotensin, imblokkaturi tal-kanal tal-kalċju, antagonisti beta-adrenoreceptor jew sensitizzaturi tal-metaboliżmu CYP450 (bħal rifampicin, barbiturate). Fi studju ta' voluntiera rġiel b'saħħithom, amministrazzjoni ta' antagonist tal-endothelin, bosetan, (induttur ta' CYP3A4 [moderat], CYP2C9 u possibilmint ta' CYP2C19) fi stat fiss (125 mg darbtejn kuljum) flimkien ma' sildenafil fi stat fiss (80 mg tlett darbiet kuljum) irrizulta fi tnaqqis ta' 62.6% u 55.4% fl-AUC u C_{max} ta' sildenafil rispettivament. Għalhekk, huwa mistenni li amministrazzjoni konkomitanti ta' induttori b'saħħithom ta' CYP3A4, bħal rifampicin, tista' twassal għal tnaqqis fil-konċentrazzjonijiet ta' sildenafil fil-plażma.

Nicorandil huwa ibridu ta' attivatur tal-kanali tal-potassju u nitrate. Minhabba il-komponent ta' nitrate, hemm potenzjal ta' interazzjoni serja ma' sildenafil.

Effetti ta' sildenafil fuq prodotti mediċinali oħra

Studji in vitro:

Sildenafil huwa inibitur dghajjef ta' ċitokromju P450 izoformi 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 u 3A4 ($IC_{50} > 150 \mu M$). Bl-oghla konċentrazzjonijiet ta' plazma ta' sildenafil ta' bejn wieħed u ieħor $1 \mu M$ wara doži rakkomandati, mhux probabli li sildenafil ibiddel it-tneħħija tas-sustrati ta' dawn l-izoenzimi.

M'hemmx informazzjoni dwar l-interazzjoni bejn sildenafil u inibituri ta' phosphodiesterase mhux speċifiċi bħal theophylline jew dipyridamole.

Studji in vivo:

B'mod konsistenti mal-effetti magħrufa ta' sildenafil fuq il-passaġġ nitric oxide/cGMP (ara sezzjoni 5.1), intwera li sildenafil iħarrax l-effetti ta' nitrates li jnaqqsu l-pressjoni u għaldaqstant il-koamministrazzjoni ta' sildenafil u donaturi ta' nitric oxide jew nitrates hija kontraindikata (ara sezzjoni 4.3).

Riociguat: Studji qabel l-użu kliniku wrew żieda fl-effett li titbaxxa l-pressjoni sistemika tad-demmm meta inibituri ta' PDE5 intużaw flimkien ma' riociguat. Fi studji kliniċi, ġie muri li riociguat jżid l-effetti ipotensivi tal-inibituri ta' PDE5. Fil-popolazzjoni taħt studju ma kien hemm ebda evidenza li dan it-teħid flimkien kellu xi effett kliniku favorevoli. It-teħid fl-istess ħin ta' riociguat ma' inibituri ta' PDE5, inkluż sildenafil, huwa kontraindikata (ara sezzjoni 4.3).

L-ġħoti fl-istess ħin ta' sildenafil lil pazjenti li qed jiedu terapija b'alpha-blocker tista' tirriżulta fi pressjoni baxxa sintomatika fi ftit individwi suxxettibbli. Dan jista' jsehh l-aktar sa 4 sigħat wara li tittiehed id-doża ta' sildenafil (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.4). Fi tliet studji speċifiċi għal interazzjoni bejn żewġ prodotti mediċinali, alpha-blocker doxazocin (4 mg u 8 mg) u sildenafil (25 mg, 50 mg u 100 mg) ġew amministrati fl-istess ħin lil pazjenti bi tkabbir benin tal-prostata (BPH), stabilizzati fuq kura b' doxazocin. F'dawn il-popolazzjonijiet tal-istudji, kien osservat tnaqqis addizzjonali medju tal-pressjoni meta kienu mimdudni ta' 7/7 mmHg, 9/5 mmHg u 8/4 mmHg rispettivament u meta bil-wieqfa tnaqqis addizzjonali medju ta' 6/6 mmHg, 11/4 mmHg u 4/5 mmHg. Meta sildenafil u doxazocin ngħataw fl-istess ħin lil pazjenti stabilizzati fuq kura ta' doxazocin kien hemm rapporti mhux spissi ta' pazjenti li kellhom pressjoni baxxa posturali sintomatika. Fost dawn ir-rapporti kien hemm stordament qawwi u stordament ħafif imma mhux sinkope.

Ma kienx hemm interazzjonijiet sinifikanti meta sildenafil (50 mg) kien mogħti wkoll ma' tolbutamide (250 mg) jew warfarin (40 mg), li t-tnejn huma metabolizzati b'CYP2C9.

Sildenafil (50 mg) ma ħarrax iż-żieda fil-ħin ta' fsada kkaġunata mill-aċidu acetyl salicylic (150 mg).

Sildenafil (50 mg) ma saħħaħx l-effetti ipotensivi tal-alkoħol f'voluntiera b'saħħithom b'medja tal-oġġla livelli ta' alkoħol fid-demmm ta' 80 mg/dl.

Ġabra tal-klassijiet li ġejjin ta' mediċini li jaġixxu kontra l-pressjoni għolja; diuretiċi, beta-blokers, inibituri ta' ACE, antagonisti ta' angiotensin II, prodotti mediċinali kontra l-pressjoni għolja (vażodilataturi u li jaħdmu fuq is-sistema ċentrali), adrenergic neurone blockers, imblokkaturi tal-kanal tal-kalċju u imblokkaturi alpha-adrenoceptor, ma wrew ebda differenza fil-profil ta' effetti f'pazjenti li ħadu sildenafil mqabblin ma' kura bil-placebo. Fi studju speċifiku ta' interazzjoni, fejn sildenafil (100 mg) kien mogħti flimkien ma' amlodipine f'pazjenti bi pressjoni għolja, kien hemm aktar tnaqqis fil-pressjoni sistolika f'pożizzjoni minduda tad-demmm ta' 8 mmHg. It-tnaqqis korrispondenti fil-pressjoni diastolika tad-demmm f'pożizzjoni minduda kienet 7 mmHg. Dan it-tnaqqis ulterjuri fil-pressjoni tad-demmm kien jixbah lil dak li sehh meta sildenafil ġie amministrat waħdu lil voluntiera b'saħħithom (ara sezzjoni 5.1).

Sildenafil (100 mg) ma affettwax il-farmakokinetiċi fi stat stabbli tal-inibituri ta' HIV protease, saquinavir u ritonavir, it-tnejn li huma sustrati CYP3A4.

F'voluntiera rġiel b'saħħithom, sildenafil fi stat fiss (80 mg t.i.d.) irriżulta f'żieda ta' 49.8% fl-AUC ta' bosentan u żieda ta' 42% fis- C_{max} ta' bosentan (125 mg b.i.d.).

Iż-żieda ta' doża waħda ta' sildenafil ma' sacubitril/valsartan fi stat fiss f'pazjenti bi pressjoni għolja kienet assoċjata ma' tnaqqis sinifikament akbar fil-pressjoni tad-demmm meta mqabbel mal-ġħoti ta' sacubitril/valsartan waħdu. Għalhekk, għandha tiġi eżerċitata l-kawtela meta sildenafil jinbeda f'pazjenti ttrattati b'sacubitril/valsartan.

4.6 Fertilità, tqala u treddigh

Vizarsin mhux indikat għal użu fin-nisa.

M'hemm l-ebda studji adegwati u kkontrollati tajjeb fuq nisa tqal u li jkunu qed ireddegħu.

Ma nstabux effetti avversi fi studji riproduttivi f'firien u fniek wara amministrazzjoni orali ta' sildenafil.

Ma kien hemm l-ebda effett fuq il-motilità jew il-morfologija tal-isperma wara dozi orali singoli ta' 100 mg ta' sildenafil f'voluntiera b'saħħithom (ara sezzjoni 5.1).

4.7 Effetti fuq il-hila biex issuq u thaddem magni

Ma sarux studji dwar l-effett ta' sildenafil fuq il-hila biex issuq jew thaddem magni.

Peress li kien hemm sturdamenti u vista mibdula fil-provi klinici b'sildenafil, il-pazjenti għandhom ikunu konxji ta' kif jirreagixxu għal Vizarsin, qabel ma jsuqu jew ihaddmu xi magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Is-sigurtà ta' Vizarsin hija bbażata fuq 9570 pazjenti f'74 studju klinikubi placebo bħala kontroll u double-blind. L-aktar reazzjonijiet avversi li ġew irrappurtati minn fost il-pazjenti li użaw sildenafil fl-istudji klinici kienu uġiġh ta' ras, fwawar, dispepsja, sadd fl-imnifsejn, sturdament, dardir, fwawar shan, disturb viziv, ċjanopsija u vista mċajpra.

Reazzjonijiet avversi minn sorvelljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq ġiet miġbura fuq medda ta' >10 snin. Peress li mhux ir-reazzjonijiet avversi kollha huma rapportati lid-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u inklużi fid-database tas-sigurtà, il-frekwenzi ta' dawn ir-reazzjonijiet ma jistgħux jiġu stabbiliti b'mod affidabbli.

Lista tabulata ta' reazzjonijiet avversi

Fit-tabella ta' hawn taħt, ir-reazzjonijiet avversi ta' importanza medika, li sehhew fl-istudji klinici b'incidenza iktar minn bil-placebo, huma mnizzla skont il-klassi tal-organi u l-frekwenzi (komuni ħafna ($\geq 1/10$), komuni ($\geq 1/100$ sa $< 1/10$), mhux komuni ($\geq 1/1,000$ sa $< 1/100$), rari ($\geq 1/10,000$ sa $< 1/1,000$)).

F'kull gabra ta' frekwenzi, l-effetti mhux mixtieqa l-aktar serji huma mnizzla qabel dawk anqas serji.

Tabella 1: Reazzjonijiet avversi ta' importanza medika b'incidenza ta' rapporti akbar minn placebo fi studji klinici kkontrollati, u reazzjonijiet avversi ta' importanza medika rrappurtati minn sorveljanza ta' wara t-tqegħid tal-prodott fis-suq

Sistema tal-Klassifika tal-Organ	Komuni ħafna ($\geq 1/10$)	Komuni ($\geq 1/100$ u $< 1/10$)	Mhux komuni ($\geq 1/1000$ u $< 1/100$)	Rari ($\geq 1/10000$ u $< 1/1000$)
Infezzjonijiet u infestazzjonijiet			Rinite	
Disturbi fis-sistema immuni			Sensittività eċċessiva	
Disturbi fis-sistema nervuża	Uġiġh ta' ras	Sturdament	Nġhas tqil, Ipostesja	Aċċident ċerebrovaskulari, Attakk iskemiku temporanju, Attakk ta' puplesija,* Attakki ripetuti ta' puplesija,* Sinkope
Disturbi fl-ġhajnejn		Kuluri li jidhru viżwalment differenti** Disturbi fil-vista, Vista	Disturbi fid-dmugħ *** Uġiġh fl-ġhajnejn, Fotofobija, Fotopsja, Iperemija okulari, tara d-dawl	Newropatija anterjuri iskimika, mhux tal-arterja tal-ġhajn (NAION), * Sadda fis-sistema vaskulari ġewwa r-retina,* Emorraġija retinali, Retinopatija arterjosklerotika, Disturb

		mċajpra	qawwi, Kongunktivite	retinali, Glawkoma, Difett fil-kamp viżiv, Diplopja, Preċiżjoni viżiva mnaqqsa, Mijopija, Astenopja, Frak f'wiċċ il-likwidu vitruż, Disturb fil-habba tal-ghajn, Mijadrijażi, Vista ta' awreola, Xantopsja, Eritropsja, Kloropsja, Edema tal-ghajn, Nefha tal-ghajn, Disturbi fl-ghajnejn, Iperemija tal-kongunktiva, Irritazzjoni tal-ghajnejn, Sensazzjoni mhux normali fl-ghajnejn, Edema fil-kappell tal-ghajn, Ghajn xotta, Telf fil-kulur sklerali, Disturbi fid-dmugħ
Disturbi fil-widnejn u fis-sistema labirintika			Vertigo, Żanzin fil-widnejn	Truxija
Disturbi fil-qalb			Takikardija, Palpitazzjonijiet	Mewta kardijaka għall-gharrieda, * Infart mijokardijaku, Arritmija ventrikulari, * Fibrillazzjoni atrijali, Angina instabbli
Disturbi vaskulari		Fwawar, Fwawar tal-menopawsa	Pressjoni għolja, pressjoni baxxa	
Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali		Kongestjoni nażali	Epistassi, Kongestjoni tas-sinus	Għafis fuq il-gerżuma, Edema nażali, Imnieher xott
Disturbi gastro-intestinali		Dardir, Dispepsja	Mard tar-rifluss gastroesofageali, Rimettar, Uġiġħ ta' żaqq fil-parti ta' fuq, Halq xott	Ipoaestesija orali
Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta' taħt il-ġilda			Raxx	Sindromu ta' Stevens-Johnson (SJS), * Nekrolisi tossika tal-ġilda (TEN) *
Disturbi muskolu-skelettriċi u tat-tessuti konnettivi			Mijaġġja, Uġiġħ fl-estrematajiet	
Disturbi fil-kliwi u fis-sistema urinarja			Ematurja	
Disturbi fis-sistema riproduttiva u fis-sider				Emorraġija fil-pene, Prijapiżmu, * Ematospermja, Erezzjoni fit-tul
Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta' mnejn jingħata			Uġiġħ fis-sider, Gheja, Thoss is-shana	Irritabilità
Investigazzjonijiet			Żieda fir-rata li biha tħabbat il-qalb	

* Irrapportati matul sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq biss

** Kuluri li jidhru viżwalment differenti: Kloropsja, Kromatopsja, Sijanopsja, Eritropsja u Xantopsja

***Żieda fl-ammont ta' dmugh: Għajn tinħass xotta, disturbi fid-dmugh u Żieda fl-ammont ta' dmugh

Rappurtar ta' reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrapportati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrapportaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali imniżżla f' [Appendiċi V](#).

4.9 Doża eċċessiva

Sintomi

Fi studju b' doża waħda sa 800 mg fuq voluntieri, ir-reazzjonijiet avversi kienu bħal dawġ li dehru f' doži iżgħar, imma r-rata ta' inċidenza tagħhom u s-severità kienu oġġla. Doži sa 200 mg ma rriżultawx f' żieda fl-effikaċja, imma l-inċidenza ta' reazzjonijiet avversi (uġiġħ ta' ras, ħmura, sturdament, dispepsja, kongestjoni nażali, vista mibdula) kienet oġġla.

Immanigjar

F' każi ta' doża eċċessiva, miżuri normali ta' appoġġ għandhom jingħataw kif meħtieġ. Dijaliżi tal-kliwii mhux mistennija li tħaffef it-tneħħija għax sildenafil huwa marbut b' mod qawwi ma' proteini tal-plażma u mhux eliminat fl-urina.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Uroloġiċi, mediċini użati għal impotenza. Kodiċi ATC: G04BE03.

Mekkaniżmu ta' azzjoni

Sildenafil huwa terapija orali għal problema ta' impotenza. F' ċirkostanzi naturali, i.e. bi stimulu sesswali, hu jegħleb il-problema ta' impotenza billi jżid l-influss ta' demm fil-pene.

Il-mekkaniżmu fiżjoloġiku responsabbli biex il-pene jibbies jinvolvi it-tnixxija ta' nitric oxide (NO) fil-corpus cavernosum waqt stimolazzjoni sesswali. Nitric oxide mbaġħad jattiva l-enzima guanylate cyclase, li tirriżulta f' livelli miżjuda ta' cyclic guanosine monophosphate (cGMP), li tipproduċi rilassament fil-muskoli mellies tal-corpus cavernosum u tikkawża d-dhul tad-demm.

Sildenafil huwa impeditur potenti u slettiv ta' *cGMP specific phosphodiesterase type 5* (PDE5) fil-corpus cavernosum, fejn PDE5 huwa responsabbli għad-degradazzjoni ta' cGMP. Sildenafil għandu sit periferali ta' azzjoni fuq erezzjonijiet. Sildenafil m'għandu l-ebda effett rilassanti dirett fuq il-corpus cavernosum tal-bniedem iżolat iżda bil-qawwa jsaħħa l-effett rilassanti ta' NO fuq dan it-tessut. Meta l-passaġġ NO/cGMP jiġi attivat, bħal ma jiġr bi stimolazzjoni sesswali, inibizzjoni ta' PDE5 minn sildenafil tirriżulta f' hveli aktar għoljin ta' cGMP fil-corpus cavernosum. Għalhekk stimolazzjoni sesswali hija neċessarja biex l-effetti terapewtiċi ta' sildenafil ikunu ta' ġid.

Effetti farmakodinamiċi

Studji *in vitro* wrew li sildenafil huwa selettiv għal PDE5, li huwa involut fil-proċess ta' twebbis. L-effett tiegħu huwa iżjed potenti fuq PDE5 minn phosphodiesterases magħrufa oħra. Hemm selettività ta' 10-darbiet għal PDE6 li huwa involut fil-passaġġ ta' *phototransduction* fir-retina. Bl-oġġla doži rakkomandati, hemm selettività ta' 80-darba fuq PDE1, u aktar minn 700-darba fuq PDE2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 u 11. B' mod partikulari, sildenafil għandu selettività ta' aktar minn 4,000-darba għal PDE5 fuq PDE3, is-*cAMP specific phosphodiesterase isoform* involut fil-kontroll tal-kontrattilità.

Effikaċja klinika u sigurtà

Żewg studji kliniċi kienu speċifikament maħsuba biex jeżaminaw il-perijodu ta' hin wara d-dożagg li matulu sildenafil jista' jipproduċi twebbis bi twegiba għal stimolazzjoni sesswali. Fi studju tal-pene bil-plestismografu (RigiScan) f'pazjenti sajmin, il-hin medjan biex jibdew l-erezzjonijiet għal dawkw li kisbu 60% rigidità (suffiċjenti għal rapport sesswali) kien 25 minuta (medda bejn 12-37 minuta) b'sildenafil. Fi studju RigiScan separat, sildenafil kien għadu kapaċi jipproduċi erezzjoni bi twegiba għal stimolazzjoni sesswali 4-5 sigħat wara d-doża.

Sildenafil jikkaguna tnaqqis hafif u temporanju fil-pressure tad-demmi li, fil-maggoranza tal-każi ma jissarfux f'effetti kliniċi. L-oghla tnaqqis medju fil-pressure sistolika f'pożizzjoni mimduda wara 100 mg ta' doża orali ta' sildenafil kienet ta' 8.4 mmHg. Il-bidla korrispondenti fil-pressure dijastolika f'pożizzjoni mimduda kienet 5.5 mmHg. Dan it-tnaqqis fil-pressure tad-demmi huwa konsistenti mal-effetti ta' vazodilatazzjoni ta' sildenafil, probabilmint minhabba żieda fil-livelli ta' cGMP fil-muskoli mellies vaskulari. Doži wahdanin sa 100 mg ta' sildenafil li ttiehdu mill-ħalq minn voluntiera b'saħħithom ma għamlu l-ebda effett klinikalment rilevanti fuq l-ECG.

Fi studju tal-effetti emodinamiċi ta' doża wahda orali ta' 100 mg sildenafil f'14-il pazjenti b'mard sever tal-arterji tal-qalb (CAD) (> 70% stenożi f' ta' mill-anqas arterja wahda tal-qalb), il-pressure sistolika u dijastolika medja tad-demmi waqt is-serħan naqset b'7% u 6% rispettivament meta mqabbla mal-linja bażi. Il-pressure medja tad-demmi sistolika tal-pulmun naqset b'9%. Sildenafil ma wera ebda effett fuq l-effiċjenza tal-qalb, u ma fixkilx iċ-ċirkolazzjoni tad-demmi fl-arterji stenożati tal-qalb.

Prova ta' stress waqt l-eżerċizzju, double-blind, ikkontrollata bi placebo, evalwat 144 pazjent b'disfunzjoni erettili u angina stabbli kronika li regolarment irċiew prodotti mediċinali kontra l-angina (ħlief nitrates). Ir-riżultati wrew li ma kien hemm l-ebda differenza klinikament rilevanti bejn sildenafil u placebo fil-hin ta' limitazzjoni għal angina.

Kien hemm differenzi ħfief u għaddiena fid-diskriminazzjoni tal-kulur (blu/aħdar) f'xi pazjenti li użaw il-Farnsworth-Munsell 100 Hue Test, siegħa wara li ħadu doża ta' 100 mg, u ebda effett ma deher sagħtejn wara d-doża. Il-mekkanizmu maħsub għal din il-bidla fid-diskriminazzjoni tal-kulur jinvolvi l-inibizzjoni ta' PDE6, li huwa involut fil-*phototransduction cascade* tar-retina. Sildenafil m'għandux effett fuq kemm tkun akuta l-vista jew fuq is-sensittività tal-kuntrast. Fi studju żgħir bil-placebo bħala kontroll ta' pazjenti b'degenerazzjoni makulari bikrija dokumentata relatata mal-età (n=9), sildenafil (doża wahda, 100 mg) ma wera ebda tibdil sinifikanti f'testijiet fuq il-vista li saru (kemm tkun akuta l-vista, *Amsler grid*, diskriminazzjoni ta' kulur ta' dwal tat-traffiku simulati, *Humphrey perimeter* u *photostress*).

Ma kienx hemm effett fuq il-morfologija jew il-motilità tal-isperma wara li voluntiera b'saħħithom ħadu doża wahda ta' 100 mg mill-ħalq.

Aktar tagħrif dwar provi kliniċi

Fi provi kliniċi sildenafil gie mogħti lil aktar minn 8000 pazjent bejn l-etajiet ta' 19-87 sena. Il-gruppi ta' pazjenti li għejjin kienu rappreżentati: anzjani (19.9%), pazjenti bi pressure għolja (30.9%), dijabete mellitus (20.3%), mard iskemiku tal-qalb (5.8%), iperlipidemja (19.8%), korrimenti fl-ispina dorsali (0.6%), dipressjoni (5.2%), b'resezzjoni transuretrali tal-prostata (3.7%), u prostatektomija radikali (3.3%). Il-gruppi li għejjin ma kinux rappreżentati sew jew għew esklużi fil-provi kliniċi: pazjenti b'interventi kirurġiċi fil-pelvi, pazjenti wara r-radjuoterapija, pazjenti b'indeboliment fil-kliwi jew fil-fwied u pazjenti b'ċertu kundizzjonijiet kardjovaskulari (ara sezzjoni 4.3).

Fi studji b'doża fissa, il-proporzjon ta' pazjenti li rrapportaw li l-kura tejbet l-erezzjonijiet tagħhom kienu 62% (25 mg), 74% (50 mg), u 82% (100 mg) mqabbla ma' 25% tal-placebo. Fi provi kliniċi b'kontrolli, ir-rata ta' diskontinwazzjoni minhabba sildenafil kienet baxxa u simili ma' tal-placebo.

Fil-provi kollha, il-proporzjon ta' pazjenti li rrapportaw titjib bil-sildenafil kienu kif għejjin: problema ta' erezzjoni tal-pene psikogenika (84%), problemi tal-erezzjoni mħallta (77%), problema ta' erezzjoni organika (68%), anzjani (67%), diabetiċi (59%), mard iskemiku tal-qalb (69%), pressure

gholja (68%), TURP (61%), prostatektomija radikali (43%), korriment fl-ispina dorsali (83%), dipressjoni (75%). Sildenafil żamm l'effikaċja u s-sigurtà tiegħu fi studji fuq tul ta' żmien twil.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Sildenafil jiġi assorbit malajr. L-ogħla konċentrazzjonijiet fil-plażma osservati intlaħqu fi żmien bejn 30 sa 120 minuta (medjan 60 minuta) ta' doża orali fi stat sajjem. Il-medja assoluta ta' bijodisponibilità orali hija ta' 41% (medda 25-63%). Wara doża orali ta' sildenafil l-AUC u C_{max} jizdiedu fi proporzjon mad-doża fuq il-medda rakkomandata tad-doża (25-100 mg).

Meta sildenafil jittiehed mal-ikel, ir-rata ta' assorbiment titnaqqas b'dewmien medju fit- t_{max} ta' 60 minuta u tnaqqis medju fis- C_{max} ta' 29%.

Distribuzzjoni

Il-medja tal-volum ta' distribuzzjoni fi stat fiss (V_d) għal sildenafil huwa ta' 105 l, li jindika distribuzzjoni fit-tessut. Wara doża orali waħda ta' 100 mg, l-ogħla konċentrazzjoni medja totali ta' sildenafil fil-plażma kienet madwar 440 ng/ml (CV 40%). Minhabba li sildenafil (u l-metabolit fiċ-ċirkolazzjoni ewlenieni tiegħu N-desmethyl) huwa 96% marbut ma' proteini tal-plażma, dan irriżulta fl-ogħla konċentrazzjoni ta' plażma ħielsa għal sildenafil b'18 ng/ml (38nM). Ir-rabta mal-proteini hija indipendenti mill-konċentrazzjonijiet totali tal-pillola.

F'voluntiera b'saħħithom li ħadu sildenafil (100 mg doża waħda), anqas minn 0.0002% (medja 188 ng) tad-doża amministrata kienet preżenti fl-isperma 90 minuta wara d-doża.

Bijotrasformazzjoni

Sildenafil huwa mnaddaf prinċipalment mill-iżoenzimi mikrożomali CYP3A4 (rotta ewlenija) u CYP2C9 (rotta minuri) tal-fwied. Il-metabolit ċirkulatorju ewlieni jirriżulta minn *N-demethylation* ta' sildenafil. Dan il-metabolit għandu profil selettiv ta' phosphodiesterase simili għal sildenafil u potenza *in vitro* għal PDE5 ta' madwar 50% ta' dik tal-medicina mhux mibdula. Konċentrazzjonijiet fil-plażma ta' dan il-metabolit huma ta' madwar 40% ta' dawk li deher għal sildenafil. Il-metabolit N-desmethyl jiġi metabolizzat iżjed, b'half-life terminali ta' madwar 4 h.

Eliminazzjoni

It-tneħħija totali ta' sildenafil mill-ġisem hi ta' 41 l/h b'half-life fil-fażi terminali ta' 3-5 h. Wara li jittiehed jew mill-ħalq jew minn ġol-vina, sildenafil jiġi eliminat b'ħala metaboliti prinċipalment mal-ippurgar (madwar 80% tad-doża orali) u f'proporzjon inqas fl-urina (madwar 13% tad-doża orali).

Farmakokinetiċi fi gruppi speċjali ta' pazjenti

Anzjani:

Voluntiera anzjani b'saħħithom (65 sena jew iżjed) kellhom tneħħija mnaqqsa ta' sildenafil, li irriżulta f'madwar 90% konċentrazzjonijiet ogħla fil-plażma ta' sildenafil u l-metabolit attiv N-desmethyl meta mqabbel ma' dawk li nstabu f'voluntiera żgħażaġh b'saħħithom (18-45 sena). Minhabba differenzi relatati mal-età fir-rabta ma' proteini tal-plażma, ż-żieda korrispondenti fil-konċentrazzjoni ta' sildenafil ħieles fil-plażma kienet ta' madwar 40%.

Indeboliment tal-kliwi:

F'voluntiera b'indeboliment ħafif għal moderat tal-kliwi (tneħħija ta' kreatinina = 30-80ml/min), il-farmakokinetiċi ta' sildenafil ma tiddlux wara doża orali waħda ta' 50 mg. Il-medja tal-AUC u C_{max} tal-metabolit N-desmethyl żdiedu b'sa 126% u b'sa 73% rispettivament, meta mqabbla ma' voluntiera tal-istess età li ma kellhomx ħsara fil-kliwi. Madankollu, minhabba varjazzjonijiet kbar bejn l-individwi, dawn id-differenzi ma kienux statistikament sinifikanti. F'voluntiera b'indeboliment sever tal-kliwi (tneħħija ta' kreatinina < 30ml/min), it-tneħħija ta' sildenafil naqset, u wasslet għal żidiet medji ta' l-AUC u C_{max} ta' 100% u 88% rispettivament meta mqabbla ma' voluntiera tal-istess età li ma kellhomx ħsara fil-kliwi. Barra minn dan, il-valuri tal-AUC u C_{max} tal-metabolit N-desmethyl żdiedu b'mod sinifikanti b' 200% u 79% rispettivament.

Insuffiċjenza tal-fwied:

Fvoluntiera b'ċirrozi ħafifa għal moderata tal-fwied (Child-Pugh A u B) it-tneħħija ta' sildenafil tnaqqas, u rriżulta f'żidiet fl-AUC (84%) u C_{max} (47%) mqabbel ma' voluntiera tal-istess età li ma kellhomx ħsara fil-fwied. Il-farmakokinetiċi ta' sildenafil f'pazjenti bi ħsara severa tal-fwied ma ġewx studjati.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta' sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, riskju ta' kanċer, effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva u l-iżvilupp, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

6. TAGHRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta' eċċipjenti

Il-qalba tal-pillola:

Microcrystalline cellulose (E460)
Calcium hydrogen phosphate
Croscarmellose sodium
Hypromellose (E464)
Magnesium stearate (E470b)

Il-kisi tar-rita:

Lactose monohydrate
Hypromellose (E464)
Titanium dioxide (E171)
Triacetin (E1518)

6.2 Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

5 snin

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Dan il-prodott mediċinali m'għandux bżonn l-ebda kundizzjoni speċjali għall-ħażna.

6.5 In-natura u tal-kontenitur u ta' dak li hemm ġo fih

Folja (fojl tal-PVC/fojl tal-Alu): pillola 1 miksija b'rita, f'kaxxa.

Folja (folja perforata ta' doża unika, fojl tal-PVC/fojl tal-Alu): 4 x 1, 8 x 1 jew 12 x 1 pillola miksija b'rita, f'kaxxa.

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkun fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi u għal immaniġġar iehor

L-ebda htigijiet speċjali.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Is-Slovenja

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Vizarsin 25 mg pilloli miksija b'rita

1 fiha pillola miksija: EU/1/09/551/001

4 x 1 pillola miksija: EU/1/09/551/002

8 x 1 pillola miksija: EU/1/09/551/003

12 x 1 pillola miksija: EU/1/09/551/004

Vizarsin 50 mg pilloli miksija b'rita

1 fiha pillola miksija: EU/1/09/551/005

4 x 1 pillola miksija: EU/1/09/551/006

8 x 1 pillola miksija: EU/1/09/551/007

12 x 1 pillola miksija: EU/1/09/551/008

Vizarsin 100 mg pilloli miksija b'rita

1 fiha pillola miksija: EU/1/09/551/009

4 x 1 pillola miksija: EU/1/09/551/010

8 x 1 pillola miksija: EU/1/09/551/011

12 x 1 pillola miksija: EU/1/09/551/012

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 21 ta' Settembru 2009

Data tal-aħħar tiġdid: 16 ta' Mejju 2014

10. DATA TA' REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini <http://www.ema.europa.eu/>.

1. ISEM IL-PRODOTT MEDICINALI

Vizarsin 25 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq
Vizarsin 50 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq
Vizarsin 100 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

2. GHAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola li tinħall fil-ħalq fiha 25 mg, 50 mg jew 100 mg sildenafil.

Eċċipjenti b'effett magħruf:

Vizarsin 25 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

Kull pillola li tinħall fil-ħalq fiha 0.375 mg aspartame (E951) u 0.00875 mg sorbitol (E420).

Vizarsin 50 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

Kull pillola li tinħall fil-ħalq fiha 0.75 mg aspartame (E951) u 0.0145 mg sucrose.

Vizarsin 100 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

Kull pillola li tinħall fil-ħalq fiha 1.5 mg aspartame (E951) u 0.029 mg sucrose.

Għal-lista kompluta ta' eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola li tinħall fil-ħalq.

Vizarsin 25 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq: Pilloli bojod għal kważi bojod, daqsxejn imbuzzati fuq żewġ naħat bil-possibilità ta' dbabar aktar skuri.

Vizarsin 50 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq: Pilloli bojod għal kważi bojod, daqsxejn imbuzzati fuq żewġ naħat bil-possibilità ta' dbabar aktar skuri.

Vizarsin 100 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq: Pilloli bojod għal kważi bojod, daqsxejn imbuzzati fuq żewġ naħat bil-possibilità ta' dbabar aktar skuri.

4. TAGHRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Vizarsin hu indikat f'irġiel adulti bi problema ta' l-erezzjoni tal-pene. Dan jirreferi għall-diffikultà biex wieħed jilħaq jew iżomm erezzjoni għal tul ta' żmien biżżejjed biex l-att sesswali isehh b'mod sodisfaċenti.

Biex Vizarsin ikun effettiv, ikun hemm bżonn ta' stimolazzjoni sesswali.

4.2 Pożoloġija u metodu ta' kif għandu jingħata

Pożoloġija

Użu fl-adulti:

Id-doża rrakkomandata hija 50 mg meħuda kif meħtieġ madwar siegħa qabel l-attività sesswali. Bażata fuq effiċjenza u tollerabilità, id-doża tista tiżdied għal 100 mg jew titnaqqas għal 25 mg. Id-doża massima rrakkomandata hija 100 mg. Il-frekwenza tad-dożagg massimu rrakkomandat huwa ta' darba kuljum. Jekk Vizarsin jittiehed mal-ikel, jista' jkun li l-effett tagħha jdum aktar ma jinħass milli kieku jittiehed fuq stonku vojta (ara sezzjoni 5.2).

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani

Aġġustamenti fid-doża mhumiex meħtieġa għal pazjenti anzjani (ta' ≥ 65 sena).

Indeboliment tal-kliwi

Ir-rakkomandazzjonijiet ta' dożaggi mfissra f' "Użu fl-adulti" japplikaw għal pazjenti b'indeboliment hafif għal moderat tal-kliwi (tneħħija ta' kreatinina = 30-80 ml/min).

Peress li t-tneħħija ta' sildenafil titnaqqas f'pazjenti b'indeboliment sever tal-kliwi (tneħħija ta' kreatinina <30 ml/min) doża ta' 25 mg għandha tiġi kkunsidrata. Skont l-effikaċja u t-tollerabilità, id-doża tista' tiżdied fi stadji għal 50 mg sa 100 mg skont il-ħtieġa.

Indeboliment tal-fwied

Peress li t-tneħħija ta' sildenafil titnaqqas f'pazjenti b'indeboliment tal-fwied (eż. ċirrosi) doża ta' 25 mg għandha tiġi kkunsidrata. Skont l-effikaċja u tollerabilità, id-doża tista' tiżdied f'inkrementi għal 50 mg sa 100 mg skont il-ħtieġa.

Popolazzjoni pedjatrika

Vizarsin mhux indikat għal individwi taħt l-età ta' 18 sena.

Użu f'pazjenti li jkunu qed jieħdu prodotti mediċinali oħra:

Bl-eċċessjoni ta' ritonavir li mhux rakkomandat li sildenafil jingħata miegħu (ara sezzjoni 4.4) doża tal-bidu ta' 25 mg għandha tiġi kkunsidrata f'pazjenti li fl-istess hin ikunu fuq trattament ta' inibituri ta' CYP3A4 (ara sezzjoni 4.5).

Biex jitnaqqas ir-riskju ta' żvilupp ta' pressjoni baxxa posturali f'pazjenti li jkunu qed jirċievu kura b'alpha-blockers, il-pazjenti għandhom jiġu stabilizzati fuq kura b'alfa blockers qabel ma jinbeda trattament b'sildenafil. Barra minn hekk, għandu jiġi kkunsidrat li tinbeda kura b'sildenafil b'doża ta' 25 mg (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.5).

Metodu ta' kif għandu jingħata

Għal użu orali

Il-pillola li tinħall fil-halq għandha titqiegħed fuq l-ilsien, fejn ser tinfiirex malajr gor-riq, biex tkun tista' tinbela' malajr. Tista' tittiehed kemm b'likwidu jew mingħajru. It-tneħħija tal-pillola shiħa li tinħall fil-halq huwa diffiċli. Peress li l-pillola li tinħall fil-halq hija fragli, għandha tittiehed minnufih, kif tinfetaħ il-folja.

Il-pillola li tinħall fil-halq tista' tintuża bħala alternattiva għal pilloli miksijin b'rita ta' Vizarsin għal pazjenti li għandhom diffikultà biex jibilgħu pilloli miksijin b'rita.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieħed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1.

B'mod konsistenti mal-effetti magħrufa tiegħu fuq il-passaġġ ta' nitric oxide/cyclic guanosine monophosphate (cGMP) (ara sezzjoni 5.1), sildenafil intwera li jsaħħaħ l-effetti ipotensivi ta' nitrati, u l-amministrazzjoni kongunta b'donaturi ta' nitric oxide (bħal amyl nitrite) jew nitrati f'xi għamla oħra għalhekk kontraindikata.

It-teħid flimkien ta' inibituri ta' PDE5, inkluż sildenafil, ma' stimulatori ta' guanylate cyclase, bħal riociguat, huwa kontraindikata għax hemm il-possibbiltà li dan iwassal għal ipotensjoni sintomatika (ara sezzjoni 4.5).

Sustanzi għal kura ta' problemi tal-erezzjoni, li jinkludu sildenafil, m'għandhomx jintużaw f'irġiel li għalihom l-attività sesswali mhix irrakkomandata (eż. pazjenti bi problemi severi kardjovaskulari bħal angina mhux stabbli jew insuffiċjenza kardijaka gravi).

Vizarsin huwa kontraindikata f'dawk il-pazjenti li tilfu l-vista minn għajn waħda minhabba newropatija anterjuri iskimika, mhux arterika tal-għajn (NAION), kemm jekk dan l-episodju għara wara espożizzjoni għal inibitur ta' PDE5 kif ukoll jekk le (ara sezzjoni 4.4).

Is-sigurtà ta' sildenafil ma gietx studjata f'dawn is-sottogruppi ta' pazjenti li ġejjin, u għalhekk l-użu tiegħu huwa kontraindikata: indeboliment sever tal-fwied, pressjoni baxxa (pressjoni tad-demem <90/50 mmHg), passat reċenti ta' puplesija jew attakk tal-qalb u mard magħruf ereditarju ta' degenerazzjoni tar-retina bħal *retinitis pigmentosa* (minoranza ta' dawn il-pazjenti għandhom mard genetiku ta' phosphodiesterases retinali).

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Għandha titqies l-istorja medika tal-pazjent u jsir eżami fiżiku, biex issir dijanjożi tal-impotenza u jiġu determinati raġunijiet oħra li jista' jkun hemm, qabel ma tinbeda kura farmakoloġika.

Fatturi ta' riskju kardjovaskulari

Qabel ma tinbeda xi kura għal problema tal-impotenza, it-tabib għandu jikkunsidra l-istat kardjuvaskulari tal-pazjent tiegħu, minhabba li hemm grad ta' riskju għal qalb assoċjat ma' attività sesswali. Sildenafil għandu effetti vażodilatatorji, li jirriżultaw fi tnaqqis ħafif u temporanju tal-pressjoni tad-demem (ara sezzjoni 5.1). Qabel ma tingħata riċetta għal sildenafil, it-tobba għandhom jikkonsidraw bir-reqqa jekk pazjenti b'kundizzjonijiet fl-isfond hux ser jiġu affettwati ħazin minn dawn l-effetti vażodilatatorji, speċjalment waqt l-attività sesswali. Pazjenti li jistgħu jintlaqtu ħazin bl-użu ta' sustanzi vażodilatatorji jinkludu dawk li jsofru minn sadd tal-iżbokk ventikulari tax-xellug (eż. stenożi tal-aorta, kardjomijopatija ipertrofika osstruttiva), jew dawk bis-sindromu rari ta' atrofija ta' sistemi diversi li jidher li jkollu effetti qawwija fuq il-kontroll awtonomu tal-pressjoni tad-demem.

Sildenafil iħarrax l-effett ipotensiv ta' nitrati (ara sezzjoni 4.3).

Wara li tqiegħedet fuq is-suq, ġew irrappurtati każi kardjuvaskulari serji marbuta mal-użu fl-istess waqt ta' sildenafil, fosthom infart mijokardjaku, angina instabbli, mewt zoptu b'attakk tal-qalb, aritmja ventikulari, emorragija ċerebrovaskulari, attakk iskemiku transitorju, pressjoni għolja u pressjoni baxxa. Il-biċċa l-kbira ta' dawn il-pazjenti, iżda mhux kollha, kellhom fatturi ta' riskju kardjuvaskulari minn qabel. Ħafna każi ġew irrappurtati li għaw matul jew f'it wara attività sesswali u f'it ġew irrappurtati li għaw wara l-użu ta' sildenafil mingħajr attività sesswali. Mhux possibbli jiġi determinat jekk dawn il-każi humiex relatati direttament ma' dawn il-fatturi jew ma' fatturi oħra.

Prijapiżmu

Sustanzi għal kura ta' impotenza, fosthom sildenafil, għandhom jintużaw b'kawtela f'pazjenti b'deformazzjoni anatomika tal-pene (bħal angulazzjoni, fibrosi fil-korpus kavernożum jew il-marda ta' *Peyronie*), jew f'pazjenti li għandhom kundizzjonijiet li jagħmluhom predisposti għal prijapiżmu (bħal anemija b'ċelluli f'mingel, majeloma multipla jew lewkimja).

Erezzjonijiet fit-tul u prijapiżmu ġew irrappurtati b'sildenafil f'esperjenza ta' wara t-tqegħid fis-suq. Fil-każ ta' erezzjoni li tippersisti għal iktar minn 4 sigħat, il-pazjent għandu jfittex għajjnuna medika immedjatament. Jekk il-prijapiżmu ma jiġix ikkurat immedjatament, tista' tirriżulta ħsara fit-tessut tal-pene u telf permanenti fil-potenza.

L-użu fl-istess ħin ma' inibituri oħrajn ta' PDE5 jew kuri oħrajn għal disfunzjoni erettile

Is-sigurtà u effiċjenza tal-użu ta' sildenafil ma' inibituri oħrajn ta' PDE5, jew ma' kuri oħrajn għal pressjoni għolja tal-arterja pulmonari (PAH) li jkun fihom sildenafil, jew trattamenti oħra għal problemi tal-erezzjoni ma għewx studjati. Għalhekk l-użu ta' dan it-taħlit, mhux rakkomandat.

Effetti fuq il-vista

Każijiet ta' difetti fil-vista relatati mal-amministrazzjoni ta' sildenafil u inibituri ta' PDE5 oħrajn għew irrapporati b'mod spontanju (ara sezzjoni 4.8). Każijiet ta' newropatija anterjuri iskimika, mhux arteritika ta' l-għajn, kundizzjoni rari, relatati mal-amministrazzjoni ta' sildenafil u inibituri ta' PDE5 oħrajn għew irrapporati b'mod spontanju fi studju ta' osservazzjoni (ara sezzjoni 4.8). Il-pazjenti għandhom jkunu avżati li fl-eventwalità li f'daqqa waħda jiżviluppaw kwalunkwe difett fil-vista, dawn għandhom iwaqqfu l-Vizarsin u jkellmu tabib immedjatament (ara sezzjoni 4.3).

L-użu fl-istess hin ma' ritonavir

Il-ko-amministrazzjoni ta' sildenafil ma' ritonavir mhix irrakkomandata (ara sezzjoni 4.5).

L-użu fl-istess hin ma' alpha-blockers

Sildenafil għandu jintuża b'kawtela fost dawk li qed jużaw alpha-blockers peress li l-għoti fl-istess hin tista' twassal għal pressjoni sintomatika baxxa f'xi pazjenti (ara sezzjoni 4.5). Huwa probabbli li dan isehh fi żmien 4 sigħat wara li tittiehed id-doża ta' sildenafil. Biex jitnaqqas ir-riskju ta' pressjoni posturali baxxa, il-pazjenti għandhom ikunu emodinamikament stabbli fuq trattament ta' alpha-blockers qabel ma jinbeda t-trattament b'sildenafil. Għandu jiġi kkunsidrat li tinbeda kura b'sildenafil b'doża ta' 25 mg (ara sezzjoni 4.2). Barra minn hekk, tobbja għandhom jgħarrfu lill-pazjenti tagħhom fuq il-passi li jridu jiehdu f'każ li jkollhom sintomi ta' pressjoni posturali baxxa.

L-effett fuq il-hrug tad-demm

Studji bi plejtlets umani jindikaw li sildenafil isahha l-effett kontra l-aggregazzjoni ta' sodium nitroprusside *in vitro*. M'hemmx informazzjoni dwar is-sigurtà tal-amministrazzjoni ta' sildenafil f'pazjenti b'mard ta' emorragiji (tnixxija tad-demm) jew ulċera attiva fl-istonku. Għalhekk sildenafil għandu jingħata biss lil dawn il-pazjenti wara eżami bir-reqqa tal-benefiċċji u r-riskji.

Nisa

Vizarsin mhux indikat għal użu fin-nisa.

Eċċipjenti

Vizarsin 25 mg, 50 mg u 100 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq fih aspartame (E951). Aspartame hu sors ta' phenylalanine. Jista' jkun ta' ħsara għal pazjent b'fenilketonurja (PKU). Din il-medicina għandha tintuża b'kawtela f'pazjenti b'fenilketonurja.

Vizarsin 25 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq fih sorbitol (E420). Għandu jittiehed kont ta' l-effett addittiv ta' prodotti li fihom sorbitol (jew fructose) mogħtija fl-istess hin kif ukoll teħid ta' sorbitol (jew fructose) mad-dieta. Il-kontenut ta' sorbitol fi prodotti mediċinali għall-użu orali jista' jaffettwa l-bijodisponibilità ta' prodotti mediċinali oħra għall-użu orali mogħtija fl-istess hin.

Vizarsin 50 mg u 100 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq fih sucrose. Pazjenti li għandhom problemi ereditarji rari ta' intolleranza għall-fructose, malassorbiment tal-glucose-galactose jew nuqqas ta' sucrase-isomaltase, m'għandhomx jieħdu din il-medicina.

4.5 Interazzjoni ma' prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta' interazzjoni

Effetti ta' prodotti mediċinali oħra fuq sildenafil

Studji in vitro:

Il-metabolizmu ta' sildenafil isehh l-aktar permezz tal-iżoformi ta' ċitokromju P450 (CYP) 3A4 (rotta

ewlenija) u 2C9 (rotta minuri). Għalhekk, l-inibituri ta' dawn l-izoenzimi jistghu jnaqqsu t-tneħħija ta' sildenafil u l-indutturi ta' dawn l-izoenzimi jistghu jżidu t-tneħħija ta' sildenafil.

Studji in vivo:

Analizi farmakokinetika ta' tagħrif minn provi kliniċi fuq grupp ta' pazjenti tindika tnaqqis fit-tneħħija ta' sildenafil meta ngħata flimkien ma' inibituri ta' CYP3A4 (bħal ketoconazole, erythromycin, cimetidine). Għalkemm ma gietx osservata żieda fl-inċidenza ta' reazzjonijiet avversi f'dawn il-pazjenti, doża tal-bidu ta' 25 mg għandha tiġi kunsidrata meta sildenafil jiġi amministrat fl-istess hin ma' inibituri ta' CYP3A4.

L-ghoti wkoll tal-inibitur ta' HIV protease ritonavir, fi stat stabbli (500 mg darbtejn kuljum) ma' sildenafil (100 mg doża waħda) irriżulta f'żieda ta' 300 % (4 darbjet) fis- C_{max} ta' sildenafil u żieda ta' 1,000 % (11-il darba) fl-AUC tal-plażma ta' sildenafil. F'24 siegħa, il-livelli ta' sildenafil fil-plażma kienu għadhom bejn wiehded u iehor 200 ng/ml, imqabbli ma' bejn wiehded u iehor 5 ng/ml meta sildenafil ingħata waħdu. Dan huwa konsistenti mal-effetti sinifikanti ta' ritonavir fuq varjetà wiesgħa ta' sustrati ta' P450. Sildenafil ma kellux effett fuq il-farmakokinetiċi ta' ritonavir. Skont dawn ir-riżultati farmakokinetiċi il-koamministrazzjoni ta' sildenafil ma' ritonavir mhix rakkomandata (ara sezzjoni 4.4) u f'kull eventwalità l-ogħla doża ta' sildenafil taħt l-ebda ċirkustanza ma għandha tkun iżjed minn 25 mg tul 48 siegħa.

L-ghoti wkoll tal-inibitur ta' HIV protease saquinavir, inibitur ta' CYP3A4, fi stat stabbli (1200 mg tlett darbjet kuljum) ma' sildenafil (100 mg doża waħda) irriżulta f'żieda ta' 140 % fis- C_{max} ta' sildenafil u żieda ta' 210 % fl-AUC ta' sildenafil. Sildenafil ma kellux effett fuq il-farmakokinteki ta' saquinavir (ara sezzjoni 4.2). Inibituri ta' CYP3A4 aktar b'saħħithom bħal ketoconazole u itraconazole jkunu mistennija li jkollhom effetti akbar.

Meta doża waħda ta' 100 mg sildenafil ġiet amministrata ma' erythromycin, inibitur ta' CYP3A4 moderat, fi stat stabbli (500 mg darbtejn kuljum għal 5 ijiem), kien hemm żieda ta' 182 % fl-espożizzjoni sistemika (AUC) ta' sildenafil. F'voluntiera rġiel normali b'saħħithom, ma kienx hemm evidenza ta' xi effett ta' azithromycin (500 mg kuljum għal 3 ijiem) fuq ir-rata tal-eliminazzjoni fissa tal-AUC, C_{max} u t_{max} , jew il-half life ta' wara ta' sildenafil jew il-metabolit principali tiegħu fiċ-ċirkolazzjoni. Cimetidine (800 mg), inibitur ta' ċitokromju P450 u inibitur ta' CYP3A4 mhux speċifiku, wassal għal żieda ta' 56 % fil-konċentrazzjonijiet ta' sildenafil fil-plażma meta ngħata flimkien ma' sildenafil (50 mg) fuq voluntiera b'saħħithom.

Il-meraq tal-grejpfrut huwa inibitur dġajjed tal-metaboliżmu ta' CYP3A4 li jsehh fil-wieċ ta' ġewwa tal-musrana u jista' jwassal għal żidiet żgħir fil-livelli ta' sildenafil fil-plażma.

Doži waħdanin ta' antaċidu (magnesium hydroxide/aluminium hydroxide) ma effettwatx il-bijodisponibilità ta' sildenafil.

Għalkemm ma sarux studji speċifiċi ta' interazzjoni għal prodotti mediċinali kollha, analiżi farmakokinetiċi tal-popolazzjoni ma wrew l-ebda effett ta' medikazzjoni konkomitanti fuq il-farmakokinetiċi ta' sildenafil meta migbura fi gruppi bħala inibituri ta' CYP2C9 (bħal tolbutamide, warfarin, phenytoin), inibituri ta' CYP2D6 (bħal *selective serotonin reuptake inhibitors*, antidiressanti triċikliċi), thiazide u diuretici relatati, diuretici *loop* u li jirristringu t-tnixxija ta' potassju, inibituri tal-eżima li tikkonverti l-angiotensin, imblokkaturi tal-kanal tal-kalċju, antagonisti beta-adrenoreceptor jew sensitizzaturi tal-metaboliżmu CYP450 (bħal rifampicin, barbiturate). Fi studju ta' voluntiera rġiel b'saħħithom, amministrazzjoni ta' antagonist tal-endothelin, bosentan, (induttur ta' CYP3A4 [moderat], CYP2C9 u possibilmint ta' CYP2C19) fi stat fiss (125 mg darbtejn kuljum) flimkien ma' sildenafil fi stat fiss (80 mg tlett darbjet kuljum) irriżulta fi tnaqqis ta' 62.6% u 55.4% fl-AUC u C_{max} ta' sildenafil rispettivament. Għalhekk, huwa mistenni li amministrazzjoni konkomitanti ta' indutturi b'saħħithom ta' CYP3A4, bħal rifampicin, tista' twassal għal tnaqqis fil-konċentrazzjonijiet ta' sildenafil fil-plażma.

Nicorandil huwa ibridu ta' attivatur tal-kanali tal-potassju u nitrate. Minhabba l-komponent ta' nitrate, hemm potenzjal ta' interazzjoni serja ma' sildenafil.

Effetti ta' sildenafil fuq prodotti mediċinali oħra

Studji in vitro:

Sildenafil huwa inibitur dgħajef ta' ċitokromju P450 ižoformi 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 u 3A4 ($IC_{50} > 150 \mu M$). Bl-ogħla konċentrazzjonijiet ta' plazma ta' sildenafil ta' bejn wieħed u ieħor $1 \mu M$ wara dożi rakkomandati, mhux probabli li sildenafil jibdel it-tneħħija tas-sustrati ta' dawn l-iżoenzimi.

M'hemmx informazzjoni dwar l-interazzjoni bejn sildenafil u inibituri ta' phosphodiesterase mhux speċifiċi bħal theophylline jew dipyridamole.

Studji in vivo:

B'mod konsistenti mal-effetti magħrufa ta' sildenafil fuq il-passaġġ nitric oxide/cGMP (ara sezzjoni 5.1), intwera li sildenafil iħarrax l-effetti ta' nitrates li jnaqqsu l-pressjoni u għaldaqstant il-koamministrazzjoni ta' sildenafil u donaturi ta' nitric oxide jew nitrates hija kontraindikata (ara sezzjoni 4.3).

Riociguat

Studji qabel l-użu kliniku wrew żieda fl-effett li titbaxxa l-pressjoni sistemika tad-demmi meta inibituri ta' PDE5 intużaw flimkien ma' riociguat. Fi studji kliniċi, ġie muri li riociguat jżid l-effetti ipotensivi tal-inibituri ta' PDE5. Fil-popolazzjoni taħt studju ma kien hemm ebda evidenza li dan it-teħid flimkien kellu xi effett kliniku favorevoli. It-teħid fl-istess hin ta' riociguat ma' inibituri ta' PDE5, inkluż sildenafil, huwa kontraindikata (ara sezzjoni 4.3).

L-ġħoti fl-istess hin ta' sildenafil lil pazjenti li qed jiedu terapija b'alpha-blockers tista' tirrizulta fi pressjoni baxxa sintomatika fi ftit individwi suxxettibbli. Dan jista' jsehh l-aktar sa 4 sigħat wara li tittiehed id-doża ta' sildenafil (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.4). Fi tliet studji speċifiċi għal interazzjoni bejn żewġ prodotti mediċinali, l-alpha-blocker doxazocin (4 mg u 8 mg) u sildenafil (25 mg, 50 mg u 100 mg) ġew amministrati fl-istess hin lil pazjenti bi tkabbir benin tal-prostata (BPH), stabilizzati fuq kura ta' doxazocin. F'dawn il-popolazzjonijiet tal-istudji, kien osservat tnaqqis addizzjonali medju tal-pressjoni meta kienu mimdudin ta' 7/7 mmHg, 9/5 mmHg u 8/4 mmHg rispettivament u tnaqqis addizzjonali medju ta' 6/6 mmHg, 11/4 mmHg u 4/5 mmHg. Meta sildenafil u doxazocin ngħataw fl-istess hin lil pazjenti stabilizzati fuq kura ta' doxazocin kien hemm rapporti mhux spissi ta' pazjenti li kellhom pressjoni baxxa posturali sintomatika. Fost dawn ir-rapporti kien hemm stordament qawwi u stordament ħafif imma mhux sinkope.

Ma kienx hemm interazzjonijiet sinifikanti meta sildenafil (50 mg) kien mogħti wkoll ma' tolbutamide (250 mg) jew warfarin (40 mg), li t-tnejn huma metabolizzati b'CYP2C9.

Sildenafil (50 mg) ma ħarrax iż-żieda fil-hin ta' fsada kkaġunat mill-acetyl salicylic acid (150 mg).

Sildenafil (50 mg) ma saħħaħx l-effetti ipotensivi tal-alkoħol f'voluntiera b'saħħithom b'medja tal-ogħla livelli ta' alkoħol fid-demmi ta' 80 mg/dl.

Ġbir tal-klassijiet li ġejjin ta' mediċini li jaġixxu kontra l-pressjoni għolja; dijuretiċi, beta-blokers, inibituri ta' ACE, antagonisti ta' angiotensin II, prodotti mediċinali kontra l-pressjoni għolja (vażodilataturi u li jaħdmu fuq is-sistema ċentrali), adrenergic neurone blockers, imblokkaturi tal-kanal tal-kalċju u imblokkaturi alpha-adrenoceptor, ma wrew ebda differenza fil-profil ta' effetti f'pazjenti li ħadu sildenafil mqabblin ma' kura bil-placebo. Fi studju speċifiku ta' interazzjoni, fejn sildenafil (100 mg) kien mogħti flimkien ma' amlodipine f'pazjenti bi pressjoni għolja, kien hemm aktar tnaqqis fil-pressjoni sistolika tad-demmi ta' 8 mmHg f'pożizzjoni minduda. It-tnaqqis korrispondenti fil-pressjoni diastolika tad-demmi f'pożizzjoni minduda kienet 7 mmHg. Dan it-tnaqqis ulterjuri fil-pressjoni tad-demmi kien jixbah lil dak li sehh meta sildenafil ġie amministrat waħdu lil voluntiera b'saħħithom (ara sezzjoni 5.1).

Sildenafil (100 mg) ma affettwax il-farmakokinetiċi fi stat stabbli tal-inibituri ta' HIV protease, saquinavir u ritonavir, it-tnejn li huma sustrati CYP3A4.

F'voluntiera rġiel b'saħħithom, sildenafil fi stat fiss (80 mg t.i.d.) irriżulta f'żieda ta' 49.8% fl-AUC ta' bosentan u żieda ta' 42% fis- C_{max} ta' bosentan (125 mg b.i.d.).

Iż-żieda ta' doża waħda ta' sildenafil ma' sacubitril/valsartan fi stat fiss f'pazjenti bi pressjoni għolja kienet assoċjata ma' tnaqqis sinifikament akbar fil-pressjoni tad-demm meta mqabbel mal-ġhoti ta' sacubitril/valsartan waħdu. Għalhekk, għandha tiġi eżerċitata l-kawtela meta sildenafil jinbeda f'pazjenti ttrattati b'sacubitril/valsartan.

4.6 Fertilità, tqala u treddigh

Vizarsin mhux indikat għal użu fin-nisa.

Ma nstabu M'hemm l-ebda studji adegwati u kkontrollati tajjeb fuq nisa tqal u li jkunu qed iredgħu.

Ma nstabux effetti avversi fi studji riproduttivi f'firien u fniek wara amministrazzjoni orali ta' sildenafil.

Ma kien hemm l-ebda effett fuq il-motilità jew il-morfologija tal-isperma wara doži orali singoli ta' 100 mg ta' sildenafil f'voluntiera b'saħħithom (ara sezzjoni 5.1).

4.7 Effetti fuq il-hila biex issuq u thaddem magni

Ma sarux studji dwar l-effett ta' sildenafil fuq il-hila biex issuq jew thaddem magni.

Peress li kien hemm sturdamenti u vista mibdula fil-provi kliniċi b'sildenafil, il-pazjenti għandhom ikunu konxji ta' kif jirreaggixxu għal Vizarsin, qabel ma jsuqu jew ihaddmu xi magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Is-sigurtà ta' Vizarsin hija bbażata fuq 9570 pazjenti f'74 studju klinikubi placebo bħala kontroll u double-blind. L-aktar reazzjonijiet avversi li ġew irrappurtati minn fost il-pazjenti li użaw sildenafil fl-istudji klinici kienu uġiġħ ta' ras, fwawar, dispepsja, sadd fl-innifsejn, sturdament, dardir, fwawar sħan, disturb viziv, ċjanopsija u vista mċajpra.

Reazzjonijiet avversi minn sorvelljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq ġiet miġbura fuq medda ta' >10 snin. Peress li mhux ir-reazzjonijiet avversi kollha huma rapportati lid-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u inkluzi fid-database tas-sigurtà, il-frekwenzi ta' dawn ir-reazzjonijiet ma jistgħux jiġu stabbiliti b'mod affidabbli.

Lista tabulata ta' reazzjonijiet avversi

Fit-tabella ta' hawn taħt, ir-reazzjonijiet avversi ta' importanza medika, li sehhew fl-istudji klinici b'incidenza iktar milli bil-placebo, huma mnizzla skont il-klassi tal-organi u l-frekwenzi (komuni ħafna ($\geq 1/10$), komuni ($\geq 1/100$ sa $< 1/10$), mhux komuni ($\geq 1/1,000$ sa $< 1/100$), rari ($\geq 1/10,000$ sa $< 1/1,000$)).

F'kull ġabra ta' frekwenzi, l-effetti mhux mixtieqa l-aktar serji huma mnizzla qabel dawk anqas serji.

Tabella 1: Reazzjonijiet avversi ta' importanza medika b'incidenza ta' rapporti akbar minn placebo fi studji klinici kkontrollati, u reazzjonijiet avversi ta' importanza medika rrappurtati minn sorveljanza ta' wara t-tqegħid tal-prodott fis-suq

Sistema tal-Klassifika tal-	Komuni ħafna	Komuni ($\geq 1/100$ u	Mhux komuni ($\geq 1/1000$ u	Rari ($\geq 1/10000$ u $< 1/1000$)
-----------------------------	--------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

Organi	(≥ 1/10)	<1/10)	<1/100)	
Infezzjonijiet u infestazzjonijiet			Rinite	
Disturbi fis-sistema immuni			Sensittività eċċessiva	
Disturbi fis-sistema nervuża	Ugħigh ta' ras	Sturdament	Ngħas tqil, Ipostesja	Aċċident ċerebrovaskulari, Attakk iskemiku temporanju, Attakk ta' puplesija,* Attakki ripetuti ta' puplesija,* Sinkope
Disturbi fl-ġhajnejn		Kuluri li jidhru viżwalment differenti** Disturbi fil-vista, Vista mċajpra	Disturbi fid-dmugh *** Ugħigh fl-ġhajnejn, Fotofobija, Fotopsja, Iperemija okulari, tara d-dawl qawwi, Kongunktivite	Newropatija anterjuri iskimika, mhux tal-arterja tal-ġhajn (NAION), * Sadda fis-sistema vaskulari ġewwa r-retina,* Emorraġija retinali, Retinopatija arterjosklerotika, Disturb retinali, Glawkoma, Difett fil-kamp viżiv, Diplopja, Preċiżjoni viżiva mnaqqsa, Mijopija, Astenopja, Frak f'wiċċ il-likwidu vitruż, Disturb fil-habba tal-ġhajn, Mijadrija, Vista ta' awreola, Xantopsja, Eritropsja, Kloropsja, Edema tal-ġhajn, Nefha tal-ġhajn, Disturbi fl-ġhajnejn, Iperemija tal-kongunktiva, Irritazzjoni tal-ġhajnejn, Sensazzjoni mhux normali fl-ġhajnejn, Edema fil-kappell tal-ġhajn, Ġhajn xotta, Telf fil-kulur sklerali, Disturbi fid-dmugh
Disturbi fil-widnejn u fis-sistema labirintika			Vertigo, Ŗanżin fil-widnejn	Truxija
Disturbi fil-qalb			Takikardija, Palpitazzjonijiet	Mewta kardijaka għall-gharrieda,* Infart mijokardijaku, Arritmija ventrikulari,* Fibrillazzjoni atrijali, Angina instabbli
Disturbi vaskulari		Fwawar, Fwawar tal-menopawsa	Pressjoni għolja, pressjoni baxxa	
Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali		Kongestjoni nażali	Epistassi, Kongestjoni tas-sinus	Għafis fuq il-gerżuma, Edema nażali, Imnieher xott
Disturbi gastro-intestinali		Dardir, Dispepsja	Mard tar-rifluss gastroesofaġeali, Rimettar, Ugħigh ta' żaqq fil-parti ta' fuq, Halq xott	Ipoaestesija orali
Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta' taħt il-			Raxx	Sindromu ta' Stevens-Johnson (SJS), * Nekrolisi

gilda				tossika tal-gilda (TEN) *
Disturbi muskolu-skelettriċi u tat-tessuti konnettivi			Mijaġġa, Uġiġh fl-estremiġi	
Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja			Ematurja	
Disturbi fis-sistema riproduttiva u fis-sider				Emorraġġa fil-pene, Prijapiżmu, * Ematospermja, Erezżjoni fit-tul
Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta' mnejn jingħata			Uġiġh fis-sider, Għeja, Thoss is-shana	Irritabilità
Investigazzjonijiet			Żieda fir-rata li biha tħabbat il-qalb	

* Irrapportati matul sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq biss

** Kuluri li jidhru vizwalment differenti: Kloropsja, Kromatopsja, Sijanopsja, Eritropsja u Xantopsja

*** Żieda fl-ammont ta' dmugħ: Għajn tinħass xotta, disturbi fid-dmugħ u Żieda fl-ammont ta' dmugħ

Rappurtar ta' reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrapportati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrapportaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali imnizzla f' [Appendiċi V](#).

4.9 Doża eċċessiva

Sintomi

Fi studju fuq voluntieri b'doża waħda sa 800 mg, ir-reazzjonijiet avversi kienu bħal dawkl li dehru f'doži iżgħar, imma r-rata ta' inċidenza tagħhom u s-severità kienu oġġla. Doži sa 200 mg ma rriżultawx f'żieda fl-effikaċġa, imma l-inċidenza ta' reazzjonijiet avversi (uġiġh ta' ras, ħmura, sturdament, dispepsja, kongestjoni nażali, vista mibdula) kienet oġġla.

Immaniġġar

F'każi ta' doża eċċessiva, miżuri normali ta' appoġġ għandhom jingħataw kif meħtieġ. Dijaliżi tal-kliewi mhux mistennija li tħaffet it-tneħħiġa għax sildenafil huwa marbut b'mod qawwi ma' proteini tal-plażma u mhux eliminat fl-urina.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Uroloġiċi, mediċini użati għal impotenza. Kodiċi ATC: G04BE03.

Mekkaniżmu ta' azzjoni

Sildenafil huwa terapija orali għal problema ta' impotenza. F'ċirkostanzi naturali, i.e. bi stimulu sesswali, hu jegħleb il-problema ta' impotenza billi jżid l-influss ta' demm fil-pene.

Il-mekkaniżmu fiżjoloġiku responsabbli biex il-pene jitwebbes jinvolveja t-tnixxija ta' nitric oxide (NO) fil-corpus cavernosum waqt stimolazzjoni sesswali. Nitric oxide mbaġħad jattiva l-enzima guanylate cyclase, li tirriżulta f'livelli miżjuda ta' cyclic guanosine monophosphate (cGMP), li tipproduċi rilassament fil-muskoli mellies tal-corpus cavernosum u tikkawża d-dħul tad-demm.

Sildenafil huwa impeditur potenti u silettiv ta' cGMP specific phosphodiesterase type 5 (PDE5)

fil-corporis cavernosum, fejn PDE5 huwa responsabbli għad-degradazzjoni ta' cGMP. Sildenafil għandu sit periferali ta' azzjoni fuq erezzjonijiet. Sildenafil m'għandu l-ebda effett rilassanti dirett fuq il-corporis cavernosum tal-bniedem iżolat iżda bil-qawwa jsahha l-effett rilassanti ta' NO fuq dan it-tessut. Meta l-passaġġ NO/cGMP jiġi attivat, bħal ma jiġri bi stimulazzjoni sesswali, inibizzjoni ta' PDE5 minn sildenafil tirrizulta f'livelli aktar għoljin ta' cGMP fil-corporis cavernosum. Għalhekk stimulazzjoni sesswali hija neċessarja biex l-effetti terapewtiċi ta' sildenafil ikunu ta' għid.

Effetti farmakodinamiċi

Studji *in vitro* wrew li sildenafil huwa selettiv għal PDE5, li huwa involut fil-proċess ta' twebbis. L-effett tiegħu huwa iżjed potenti fuq PDE5 minn phosphodiesterases magħrufa oħra. Hemm selettività ta' 10 darbiet għal PDE6 li huwa involut fil-passaġġ ta' *phototransduction* fir-retina. Bl-ogħla dożi rakkomandati, hemm selettività ta' 80 darba fuq PDE1, u aktar minn 700 darba fuq PDE2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 u 11. B'mod partikulari, sildenafil għandu selettività ta' aktar minn 4,000 darba għal PDE5 fuq PDE3, is-cAMP –specific phosphodiesterase isoform involut fil-kontroll tal-kontrattilità.

Effikaċja klinika u sigurtà

Żewġ studji kliniċi kienu speċifikament maħsuba biex jeżaminaw il-perijodu ta' hin wara d-dożagg li matulu sildenafil jista' jipproduċi twebbis bi twegiba għal stimulazzjoni sesswali. Fi studju tal-pene bil-plestismografu (RigiScan) f'pazjenti sajmin, il-hin medjan biex jibdeu l-erezzjonijiet għal daww li kisbu 60 % rigidità (suffiċjenti għal rapport sesswali) kien 25 minuta (medda bejn 12-37 minuta) b'sildenafil. Fi studju RigiScan separat, sildenafil kien għadu kapaċi jipproduċi erezzjoni bi twegiba għal stimulazzjoni sesswali 4-5 sigħat wara d-doża.

Sildenafil jikkaguna tnaqqis hafif u temporanju fil-pressjoni tad-demmi li, fil-maggoranza tal-każi ma jissarfux f'effetti kliniċi. L-ogħla tnaqqis medju fil-pressjoni sistolika f'pożizzjoni minduda wara 100 mg ta' doża orali ta' sildenafil kienet ta' 8.4 mmHg. Il-bidla korrispondenti fil-pressjoni diastolika f'pożizzjoni minduda kienet 5.5 mmHg. Dan it-tnaqqis fil-pressjoni tad-demmi huwa konsistenti mal-effetti ta' vażodilatazzjoni ta' sildenafil, probabilmint minhabba zieda fil-livelli ta' cGMP fil-muskoli vaskulari melliesi. Doži waħdanin sa 100 mg ta' sildenafil li ttiehdu mill-ħalq minn voluntiera b'sahhithom ma għamlu l-ebda effett klinikament rilevanti fuq l-ECG.

Fi studju tal-effetti emodinamiċi ta' doża orali waħda ta' 100 mg sildenafil f'14-il pazjenti b'mard sever tal-arterji tal-qalb (CAD) (> 70 % stenożi f' ta' mill-anqas arterja waħda tal-qalb), il-pressjoni sistolika u diastolika medja tad-demmi waqt is-serħan naqset b'7 % u 6 % rispettivament meta mqabbla mal-linja bażi. Il-pressjoni medja tad-demmi sistolika tal-pulmun naqset b'9 %. Sildenafil ma wera ebda effett fuq il-produzzjoni tal-qalb, u ma fixkilx iċ-ċirkolazzjoni tad-demmi fl-arterji stenożati tal-qalb.

Prova ta' stress waqt l-eżerċizzju, double-blind, ikkontrollata bi placebo, evalwat 144 pazjent b'disfunzjoni erettili u angina stabbli kronika li regolarment irċievew mediċini kontra l-angina (ħlief nitrates). Ir-riżultati wrew li ma kien hemm l-ebda differenza klinikament rilevanti bejn sildenafil u placebo fil-hin ta' limitazzjoni għal angina.

Kien hemm differenzi ħfief u għaddiena fid-diskriminazzjoni tal-kulur (blu/aħdar) f'xi pazjenti li użaw il-Farnsworth-Munsell 100-Hue Test, siegħa wara li ħadu doża ta' 100 mg, u ebda effett ma deher sagħtejn wara d-doża. Il-mekkanizmu maħsub għal din il-bidla fid-diskriminazzjoni tal-kulur jinvolvi l-inibizzjoni ta' PDE6, li huwa involut fil-*phototransduction cascade* tar-retina. Sildenafil m'għandux effett fuq kemm tkun akuta l-vista jew fuq is-sensittività tal-kuntrast. Fi studju żgħir bil-placebo bħala kontroll ta' pazjenti b'degenerazzjoni makulari bikrija dokumentata relatata mal-eż (n=9), sildenafil (doża waħda, 100 mg) ma wera ebda tibdil sinifikanti f'testijiet fuq il-vista li saru (kemm tkun akuta l-vista, *Amsler grid*, diskriminazzjoni ta' kulur ta' dwal tat-traffiku simulati, *Humphrey perimeter* u *photostress*).

Ma kienx hemm effett fuq il-morfologija jew il-motilità tal-isperma wara li voluntiera b'sahhithom

ħadu doħa waħda ta' 100 mg mill-ħalq.

Aktar tagħrif dwar provi kliniċi

Fi provi kliniċi sildenafil ġie mogħti lil aktar minn 8000 pazjent bejn l-etajiet ta' 19-87 sena. Il-gruppi ta' pazjenti li ġejjin kienu rappreżentati: anzjani (19.9 %), pazjenti bi pressjoni għolja (30.9 %), dijabete mellitus (20.3 %), mard iskemiku tal-qalb (5.8 %), iperlipidemja (19.8 %), korrimenti fl-ispina dorsali (0.6 %), dipressjoni (5.2 %), b'resezzjoni transuretrali tal-prostata (3.7 %), u prostatektomija radikali (3.3 %). Il-gruppi li ġejjin ma kinux rappreżentati sew jew ġew esklużi fil-provi kliniċi: pazjenti b'interventi kirurġiċi fil-pelvi, pazjenti wara r-radjuoterapija, pazjenti b'indeboliment fil-kliwi jew fil-fwied u pazjenti b'ċertu kundizzjonijiet kardjovaskulari (ara sezzjoni 4.3).

Fi studji b'doħa fissa, il-proporzjon ta' pazjenti li rrappurtaw li l-kura tejbet l-erezzjonijiet tagħhom kienu 62 % (25 mg), 74 % (50 mg), u 82 % (100 mg) mqabbla ma' 25 % tal-plaċebo. Fi provi kliniċi b'kontrolli, ir-rata ta' diskontinwazzjoni minħabba sildenafil kienet baxxa u simili ma' tal-plaċebo.

Fil-provi kollha, il-proporzjon ta' pazjenti li rrapurtaw titjib bil-sildenafil kienu kif ġejjin: problema ta' erezzjoni tal-pene psikogenetika (84 %), problemi tal-erezzjoni mħallta (77 %), problema ta' erezzjoni organika (68 %), anzjani (67 %), dijabetiċi (59 %), mard iskemiku tal-qalb (69 %), pressjoni għolja (68 %), TURP (61 %), prostatektomija radikali (43 %), korriment fl-ispina dorsali (83 %), dipressjoni (75 %). Sildenafil żamm l-effikaċja u s-sigurtà tiegħu fi studji fuq tul ta' żmien twil.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Sildenafil jiġi assorbit malajr. L-ogħla konċentrazzjonijiet fil-plażma osservati intlaħqu fi żmien bejn 30 sa 120 minuta (medjan 60 minuta) ta' doħa orali fi stat sajjem. Il-medja assoluta ta' bijodisponibilità orali hija ta' 41 % (medda 25-63 %). Wara doħa orali ta' sildenafil l-AUC u C_{max} jizdiedu fi proporzjon mad-doħa fuq il-medda rakkomandata tad-doħa (25-100-mg). Meta sildenafil jittiehed mal-ikel, ir-rata ta' assorbiment titnaqqas b'dewmien medju fit- t_{max} ta' 60 minuta u tnaqqis medju fis- C_{max} ta' 29 %.

Distribuzzjoni

Il-medja tal-volum ta' distribuzzjoni fi stat fiss (V_d) għal sildenafil huwa ta' 105 l, li jindika distribuzzjoni fit-tessut. Wara doħa orali waħda ta' 100 mg, l-ogħla konċentrazzjoni medja totali ta' sildenafil fil-plażma kienet madwar 440 ng/ml (CV 40 %). Minħabba li sildenafil (u l-metabolit fiċ-ċirkolazzjoni ewlenieni tiegħu N-desmethyl) huwa 96 % marbut ma' proteini tal-plażma, dan irriżulta fl-ogħla konċentrazzjoni ta' plażma ħielsa għal sildenafil b'18 ng/ml (38 nM). Ir-rabta mal-proteini hija indipendenti mill-konċentrazzjonijiet totali tal-pillola.

F'voluntiera b'saħħithom li ħadu sildenafil (100 mg doħa waħda), anqas minn 0.0002 % (medja 188 ng) tad-doħa amministrata kienet preżenti fl-isperma 90 minuta wara d-doħa.

Bijotrasformazzjoni

Sildenafil huwa mnaddaf prinċipalment mill-izoenzimi mikrożomali CYP3A4 (rotta ewlenija) u CYP2C9 (rotta minuri) tal-fwied. Il-metabolit ċirkulatorju ewleni jirriżulta minn *N-demethylation* ta' sildenafil. Dan il-metabolit għandu profil selettiv ta' phosphodiesterase simili għal sildenafil u potenza *in vitro* għal PDE5 ta' madwar 50 % ta' dik tal-medicina mhux mibdula. Konċentrazzjonijiet fil-plażma ta' dan il-metabolit huma ta' madwar 40 % ta' dawk li deher għal sildenafil. Il-metabolit N-desmethyl jiġi metabolizzat iżjed, b'half-life terminali ta' madwar 4 h.

Eliminazzjoni

It-tneħħija totali ta' sildenafil mill-ġisem hi ta' 41 l/h b'half-life fil-fażi terminali ta' 3-5 h. Wara li jittiehed jew mill-ħalq jew minn ġol-vina, sildenafil jiġi eliminat bħala metaboliti prinċipalment mal-ippurgar (madwar 80 % tad-doħa orali) u f'proporzjon inqas fl-urina (madwar 13 % tad-doħa orali).

Farmakokinetiċi fi gruppi speċjali ta' pazjenti

Anzjani:

Voluntiera anzjani b'saħħithom (65 sena jew iżjed) kellhom tneħħija mnaqqsa ta' sildenafil, li irrizulta f'madwar 90 % konċentrazzjonijiet oghla ta' sildenafil fil-plażma u l-metabolit attiv N-desmethyl meta mqabbel ma' dawh li nstabu f'voluntiera żgħażaġh b'saħħithom (18-45 sena). Minhabba differenzi relatati mal-età fir-rabta ma' proteini tal-plażma, iż-żieda korrispondenti fil-konċentrazzjoni ta' sildenafil hieles fil-plażma kienet ta' madwar 40 %.

Indeboliment tal-kliwi:

F'voluntiera b'indeboliment ħafif għal moderat tal-kliwi (tneħħija ta' kreatinina = 30-80 ml/min), il-farmakokinetiċi ta' sildenafil ma tiddlux wara doża orali waħda ta' 50 mg. Il-medja tal-AUC u C_{max} tal-metabolit N-desmethyl żdiedu b'sa 126 % u b'sa 73 % rispettivament, meta mqabbla ma' voluntiera tal-istess età li ma kellhomx ħsara fil-kliwi. Madankollu, minhabba varjazzjonijiet kbar bejn l-individwi, dawn id-differenzi ma kinux statistikament sinifikanti. F'voluntiera b'indeboliment sever tal-kliwi (tneħħija ta' kreatinina < 30 ml/min), it-tneħħija ta' sildenafil naqset, u wasslet għal żidiet medji tal-AUC u C_{max} ta' 100 % u 88 % rispettivament meta mqabbla ma' voluntiera tal-istess età li ma kellhomx ħsara fil-kliwi. Barra minn dan, il-valuri tal-AUC u C_{max} tal-metabolit N-desmethyl żdiedu b'mod sinifikanti b' 200 % u 79 % rispettivament.

Insuffiċjenza tal-fwied:

F'voluntiera b'ċirrozi ħafifa għal moderata tal-fwied (Child-Pugh A u B) it-tneħħija ta' sildenafil tnaqqas, u rrizulta f'żidiet fl-AUC (84 %) u C_{max} (47 %) mqabbel ma' voluntiera tal-istess età li ma kellhomx ħsara fil-fwied. Il-farmakokinetiċi ta' sildenafil f'pazjenti bi ħsara severa tal-fwied ma ġewx studjati.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Informazzjoni mhix klinika, magħmula fuq studji konvenzjonali ta' sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dozi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, riskju ta' kanċer, effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva, ma turi l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

6. TAGHRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta' eċċipjenti

Vizarsin 25 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

Hydroxypropylcellulose (E463)

Mannitol (E421)

Aspartame (E951)

Neohesperidin-dihydrochalcone (E959)

Spearmint oil

Peppermint oil (li fih sorbitol (E420))

Crospovidone

Calcium silicate

Magnesium stearate (E470b)

Vizarsin 50 mg, 100 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

Hydroxypropylcellulose (E463)

Mannitol (E421)

Aspartame (E951)

Neohesperidin-dihydrochalcone (E959)

Togħma ta' nagħniegħ

Togħma ta' peppermint (li fih sucrose)

Crospovidone

Calcium silicate

Magnesium stearate (E470b)

6.2 Inkompatabiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Vizarsin 25 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq
Sentejn

Vizarsin 50 mg, 100 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq
3 snin

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 30°C.
Ahżen fil-pakkett oriġinali, sabiex tilqa' mill-umdità.

6.5 In-natura u tal-kontenitur u ta' dak li hemm go fih

Vizarsin 25 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq
Folja (folja li tqaxxarha miftuħa, Polyamide Orjentat/Aluminju/PVC//PET/Aluminju): pillola 1 li tinħall fil-ħalq, f'kaxxa.
Folja (folja perforata ta' doża unika li titqaxxar biex tinfetaħ, Polyamide Orjentat/Aluminju/PVC//PET/Aluminju): 2 x 1, 4 x 1, 8 x 1 jew 12 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq f'kaxxa.

Vizarsin 50 mg, 100 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq
Folja (folja li tqaxxarha miftuħa, Polyamide Orjentat/Aluminju/PVC//PET/Aluminju): pillola 1 li tinħall fil-ħalq, f'kaxxa.
Folja (folja perforata ta' doża unika li titqaxxar biex tinfetaħ, Polyamide Orjentat/Aluminju/PVC//PET/Aluminju): 2 x 1, 4 x 1, 8 x 1, 12 x 1 jew 24 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq f'kaxxa.

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi u għal immaniġġar ieħor

L-ebda htigijiet speċjali.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Is-Slovenja

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Vizarsin 25 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq
Pillola 1 li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/013
2 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/014
4 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/015
8 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/016
12 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/017

Vizarsin 50 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

Pillola 1 li tinħall fil-ħalq EU/1/09/551/018
2 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/019
4 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/020
8 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/021
12 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/022
24 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/028

Vizarsin 100 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

Pillola 1 li tinħall fil-ħalq EU/1/09/551/023
2 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/024
4 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/025
8 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/026
12 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/027
24 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/029

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 21 ta' Settembru 2009

Data tal-aħħar tiġdid: 16 ta' Mejju 2014

10. DATA TA' REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini <http://www.ema.europa.eu/>.

ANNESS II

- A. MANIFATTUR(I) RESPONSABBLI GHALL-HRUĠ TAL-LOTT**
- B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD IL-PROVVISTA U L-UŻU**
- C. KONDIZZJONIJIET U REKWIŻITI OHRA TAL-AWTORIZZAZZJONI GTAL-AWTORIZ FIS-SUQ**
- D. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FIR-RIGWARD TAL-UŻU SIGUR U EFFETTIV TAL-PRODOTT MEDIĊINALI**

A. MANIFATTUR(I) RESPONSABBLI GHALL-HRUĠ TAL-LOTT

Isem u indirizz tal-manifattur(i) responsabbli għall-hruġ tal-lott

KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Is-Slovenja

TAD Pharma GmbH
Heinz-Lohmann-Straße 5
27472 Cuxhaven
Il-Ġermanja

Fuq il-fuljett ta' tagħrif tal-prodott mediċinali għandu jkun hemm l-isem u l-indirizz tal-manifattur responsabbli għall-hruġ tal-lott ikkonċernat.

B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD IL-PROVVISTA U L-UŻU

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

C. KONDIZZJONIJIET U REKWIŻITI OHRA TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

- **Rapporti perjodiċi aġġornati dwar is-sigurtà (PSURs)**

Ir-rekwiżiti biex jiġu ppreżentati PSURs għal dan il-prodott mediċinali huma mnizzla fil-lista tad-dati ta' referenza tal-Unjoni (lista EURD) prevista skont l-Artikolu 107c(7) tad-Direttiva 2001/83/KE u kwalunkwe aġġornament sussegwenti ppubblikat fuq il-portal elettroniku Ewropew tal-mediċini.

D. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FIR-RIGWARD TAL-UŻU SIGUR U EFFIKAĊI TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

- **Pjan tal-ġestjoni tar-riskju (RMP)**

Mhux applikabbli.

ANNESS III

TIKKETTAR U FULJETT TA' TAGHRIF

A. TIKKETTAR

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**KAXXA****1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI**

Vizarsin 25 mg pilloli miksija b'rita
sildenafil

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b'rita fiha sildenafil citrate ekwivalenti għal 25 mg sildenafil.

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Fih lactose.
Ara l-fuljett għal aktar tagħrif.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pillola miksija b'rita

1 pillola miksija b'rita
4 x 1 pilloli miksija b'rita
8 x 1 pilloli miksija b'rita
12 x 1 pillola miksija b'rita

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.
Għal użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**8. DATA TA' SKADENZA**

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Is-Slovenia

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

1 fiha pillola miksija: EU/1/09/551/001

4 x 1 pillola miksija: EU/1/09/551/002

8 x 1 pillola miksija: EU/1/09/551/003

12 x 1 pillola miksija: EU/1/09/551/004

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Vizarsin 25 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluz.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC
SN
NN

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI

Vizarsin 25 mg pilloli miksija b'rita
sildenafil

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

KRKA

3. DATA TA' SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OHRAJN

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**KAXXA****1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI**

Vizarsin 50 mg pilloli miksija b'rita
sildenafil

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b'rita fiha sildenafil citrate ekwivalenti għal 50 mg sildenafil.

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Fih lactose.
Ara l-fuljett għal aktar tagħrif.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pillola miksija b'rita

1 pillola miksija b'rita
4 x 1 pilloli miksija b'rita
8 x 1 pilloli miksija b'rita
12 x 1 pillola miksija b'rita

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.
Għal użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**8. DATA TA' SKADENZA**

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Is-Slovenia

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

1 fiha pillola miksija: EU/1/09/551/005

4 x 1 pillola miksija: EU/1/09/551/006

8 x 1 pillola miksija: EU/1/09/551/007

12 x 1 pillola miksija: EU/1/09/551/008

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Vizarsin 50 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluz.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC
SN
NN

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI

Vizarsin 50 mg pilloli miksija b'rita
sildenafil

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

KRKA

3. DATA TA' SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OHRAJN

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**KAXXA****1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI**

Vizarsin 100 mg pilloli miksija b'rita
sildenafil

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b'rita fiha sildenafil citrate ekwivalenti għal 100 mg sildenafil.

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Fih lactose.
Ara l-fuljett għal aktar tagħrif.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pillola miksija b'rita

1 pillola miksija b'rita
4 x 1 pilloli miksija b'rita
8 x 1 pilloli miksija b'rita
12 x 1 pillola miksija b'rita

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.
Għal użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**8. DATA TA' SKADENZA**

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Is-Slovenia

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

1 fiha pillola miksija: EU/1/09/551/009

4 x 1 pillola miksija: EU/1/09/551/010

8 x 1 pillola miksija: EU/1/09/551/011

12 x 1 pillola miksija: EU/1/09/551/012

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Vizarsin 100 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluz.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC
SN
NN

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI

Vizarsin 100 mg pilloli miksija b'rita
sildenafil

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

KRKA

3. DATA TA' SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OHRAJN

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KAXXA għal ippakkjar monolingwali u bilingwali

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vizarsin 25 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq
sildenafil

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola li tinħall fil-ħalq fiha 25 mg sildenafil.

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Fih aspartame (E951) u peppermint oil (sorbitol (E420)).
Ara l-fuljett għal aktar tagħrif.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pillola li tinħall fil-ħalq

Pillola 1 li tinħall fil-ħalq

2 x 1 pilloli li jinħallu fil-ħalq

4 x 1 pilloli li jinħallu fil-ħalq



8 x 1 pilloli li jinħallu fil-ħalq

12 x 1 pillola li jinħallu fil-ħalq




5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.
Għal użu orali. Halliha tinħall fil-ħalq.

għal pillola 1 f'kull folja:



għal 4 pilloli f'kull folja:



1. Żomm il-folja mit-truf u ssepara ċellola ta' folja wahda mill-kumplement tal-folja billi bil-mod iċċarrat tul il-perforazzjonijiet ta' madwarha.
2. Aqla' t-tarf tal-folja u qaxxar il-folja kompletament.

3. Aqleb il-pillola għal fuq idejk.
4. Poġġi l-pillola fuq ilsienek hekk kif titneħħa mill-ippakkjar.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA
--

8. DATA TA' SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 30°C.
Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa' mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN
--

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ
--

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Is-Slovenja

12. NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Pillola 1 li tinhall fil-ħalq: EU/1/09/551/013
2 x 1 pillola li tinhall fil-ħalq: EU/1/09/551/014
4 x 1 pillola li tinhall fil-ħalq: EU/1/09/551/015
8 x 1 pillola li tinhall fil-ħalq: EU/1/09/551/016
12 x 1 pillola li tinhall fil-ħalq: EU/1/09/551/017

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Vizarsin 25 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D
--

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - <i>DATA</i> LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC
SN
NN

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA ghal ippakkjar monolingwali u bilingwali

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI

Vizarsin 25 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq
sildenafil

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

KRKA

3. DATA TA' SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OHRAJN

1. ILWI U ĊARRAT
2. QAXXAR

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KAXXA għal ippakkjar monolingwali u bilingwali

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vizarsin 50 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq
sildenafil

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola li tinħall fil-ħalq fiha fiha 50 mg sildenafil.

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Fih aspartame (E951) u toġhma ta' pepermint (sucrose).
Ara l-fuljett għal aktar tagħrif.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pillola li tinħall fil-ħalq

Pillola 1 li tinħall fil-ħalq

2 x 1 pilloli li jinħallu fil-ħalq

4 x 1 pilloli li jinħallu fil-ħalq

8 x 1 pilloli li jinħallu fil-ħalq



12 x 1 pillola li jinħallu fil-ħalq

24 x 1 pillola li jinħallu fil-ħalq


5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.
Għal użu orali. Halliha tinħall fil-ħalq.

għal pillola 1 f'kull folja:



għal 4 pilloli f'kull folja:



1. Żomm il-folja mit-truf u ssepara ċellola ta' folja wahda mill-kumplement tal-folja billi bil-mod iċċarrat tul il-perforazzjonijiet ta' madwarha.

2. Aqla' t-tarf tal-folja u qaxxar il-folja kompletament.
3. Aqleb il-pillola għal fuq idejk.
4. Poġġi l-pillola fuq ilsienek hekk kif titneħħa mill-ippakkjar.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA
--

8. DATA TA' SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 30°C.
Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa' mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN
--

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ
--

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Is-Slovenja

12. NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Pillola 1 li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/018
 2 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/019
 4 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/020
 8 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/021
 12 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/022
 24 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/028

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Vizarsin 50 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D
--

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluz.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - <i>DATA</i> LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC
SN
NN

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA għal ippakkjar monolingwali u bilingwali

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vizarsin 50 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq
sildenafil

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

KRKA

3. DATA TA' SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OHRAJN

1. ILWI U ĊARRAT
2. QAXXAR

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KAXXA għal ippakkjar monolingwali u bilingwali

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vizarsin 100 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq
sildenafil

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola li tinħall fil-ħalq fiha fiha 100 mg sildenafil.

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Fih aspartame (E951) u toġhma ta' pepermint (sucrose).
Ara l-fuljett għal aktar tagħrif.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT



Pillola li tinħall fil-ħalq

Pillola 1 li tinħall fil-ħalq
2 x 1 pilloli li jinħallu fil-ħalq
4 x 1 pilloli li jinħallu fil-ħalq
8 x 1 pilloli li jinħallu fil-ħalq
12 x 1 pillola li jinħallu fil-ħalq
24 x 1 pillola li jinħallu fil-ħalq


5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.
Għal użu orali. Halliha tinħall fil-ħalq.

għal pillola 1 f'kull folja:



għal 4 pilloli f'kull folja:



1. Żomm il-folja mit-truf u ssepara ċellola ta' folja wahda mill-kumplement tal-folja billi bil-mod iċċarrat tul il-perforazzjonijiet ta' madwarha.

2. Aqla' t-tarf tal-folja u qaxxar il-folja kompletament.
3. Aqleb il-pillola għal fuq idejk.
4. Poġġi l-pillola fuq ilsienek hekk kif titneħħa mill-ippakkjar.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA
--

8. DATA TA' SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 30°C.
Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa' mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN
--

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ
--

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Is-Slovenja

12. NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Pillola 1 li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/023
 2 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/024
 4 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/025
 8 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/026
 12 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/027
 24 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/029

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Vizarsin 100 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D
--

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluz.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - <i>DATA</i> LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC
SN
NN

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA għal ippakkjar monolingwali u bilingwali

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI

Vizarsin 100 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq
sildenafil

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

KRKA

3. DATA TA' SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OHRAJN

1. ILWI U ĊARRAT
2. QAXXAR

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KAXXA għal ippakjar trilingwali

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vizarsin 25 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq
sildenafil

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola li tinħall fil-ħalq fiha 25 mg sildenafil.

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Fih aspartame (E951) u peppermint oil (sorbitol (E420)).
Ara l-fuljett għal aktar tagħrif.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pillola li tinħall fil-ħalq

Pillola 1 li tinħall fil-ħalq

2 x 1 pilloli li jinħallu fil-ħalq

4 x 1 pilloli li jinħallu fil-ħalq



8 x 1 pilloli li jinħallu fil-ħalq

12 x 1 pillola li jinħallu fil-ħalq


5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Għal użu orali.

għal pillola 1 f'kull folja:



għal 4 pilloli f'kull folja:



1. Żomm il-folja mit-truf u ssepara ċellola ta' folja waħda mill-kumplament tal-folja billi bil-mod iċċarrat tul il-perforazzjonijiet ta' madwarha.
2. Aqla' t-tarf tal-folja u qaxxar il-folja kompletament.
3. Taptap il-pillola fuq idejk u qiegħda fuq l-ilsien.

4. Halliha tinhall fil-halq.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

8. DATA TA' SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 30°C.
Aħżen fil-pakkett originali sabiex tilqa' mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Is-Slovenja

12. NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Pillola 1 li tinhall fil-halq: EU/1/09/551/013
2 x 1 pillola li tinhall fil-halq: EU/1/09/551/014
4 x 1 pillola li tinhall fil-halq: EU/1/09/551/015
8 x 1 pillola li tinhall fil-halq: EU/1/09/551/016
12 x 1 pillola li tinhall fil-halq: EU/1/09/551/017

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Vizarsin 25 mg pilloli li jinħallu f'il-ħalq

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - <i>DATA</i> LI TINQARA MILL-BNIEDEM
--

PC
SN
NN

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA ghal ippakjar trilingwali

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI

Vizarsin 25 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq
sildenafil

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

KRKA

3. DATA TA' SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OHRAJN

1. Ċarrat
2. Qaxxar

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KAXXA għal ippakjar trilingwali

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vizarsin 50 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq
sildenafil

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola li tinħall fil-ħalq fiha fiha 50 mg sildenafil.

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Fih aspartame (E951) u toġhma ta' pepermint (sucrose).
Ara l-fuljett għal aktar tagħrif.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pillola li tinħall fil-ħalq

Pillola 1 li tinħall fil-ħalq

2 x 1 pilloli li jinħallu fil-ħalq

4 x 1 pilloli li jinħallu fil-ħalq

8 x 1 pilloli li jinħallu fil-ħalq



12 x 1 pillola li jinħallu fil-ħalq

24 x 1 pillola li jinħallu fil-ħalq




5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Għal użu orali.

għal pillola 1 f'kull folja:



għal 4 pilloli f'kull folja:



1. Żomm il-folja mit-truf u ssepara ċellola ta' folja wahda mill-kumplement tal-folja billi bil-mod iċċarrat tul il-perforazzjonijiet ta' madwarha.
2. Aqla' t-tarf tal-folja u qaxxar il-folja kompletament.

3. Taptap il-pillola fuq idejk u qiegħda fuq l-ilsien.
4. Halliha tinħall fil-ħalq.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA
--

8. DATA TA' SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 30°C.
Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa' mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN
--

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ
--

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Is-Slovenja

12. NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Pillola 1 li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/018
2 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/019
4 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/020
8 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/021
12 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/022
24 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/028

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Vizarsin 50 mg pilloli li jinhallu fil-halq

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D
--

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - <i>DATA</i> LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC
SN
NN

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA ghal ippakjar trilingwali

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI

Vizarsin 50 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq
sildenafil

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

KRKA

3. DATA TA' SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OHRAJN

1. Ċarrat
2. Qaxxar

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KAXXA għal ippakjar trilingwali

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vizarsin 100 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq
sildenafil

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola li tinħall fil-ħalq fiha fiha 100 mg sildenafil.

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Fih aspartame (E951) u toġhma ta' pepermint (sucrose).
Ara l-fuljett għal aktar tagħrif.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pillola li tinħall fil-ħalq

Pillola 1 li tinħall fil-ħalq

2 x 1 pilloli li jinħallu fil-ħalq

4 x 1 pilloli li jinħallu fil-ħalq

8 x 1 pilloli li jinħallu fil-ħalq


12 x 1 pillola li jinħallu fil-ħalq

24 x 1 pillola li jinħallu fil-ħalq




5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Għal użu orali.

għal pillola 1 f'kull folja:



għal 4 pilloli f'kull folja:



1. Żomm il-folja mit-truf u ssepara ċellola ta' folja waħda mill-kumplement tal-folja billi bil-mod iċċarrat tul il-perforazzjonijiet ta' madwarha.
2. Aqla' t-tarf tal-folja u qaxxar il-folja kompletament.

3. Taptap il-pillola fuq idejk u qiegħda fuq l-ilsien.
4. Halliha tinħall fil-ħalq.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA
--

8. DATA TA' SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 30°C.
Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa' mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN
--

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ
--

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Is-Slovenja

12. NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Pillola 1 li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/023
 2 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/024
 4 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/025
 8 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/026
 12 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/027
 24 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/029

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Vizarsin 100 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D
--

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - <i>DATA</i> LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC
SN
NN

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA ghal ippakjar trilingwali

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI

Vizarsin 100 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq
sildenafil

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

KRKA

3. DATA TA' SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OHRAJN

1. Ċarrat
2. Qaxxar

B. FULJETT TA' TAGHRIF

Fuljett ta' taghrif: Informazzjoni għall-utent

Vizarsin 25 mg pilloli miksija b'rita sildenafil

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tiehu din il-medicina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.
- Din il-medicina għet mogħtija lilek biss. M'għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista' tagħmlilhom il-ħsara, anke jekk għandhom l-istess sinjali ta' mard bħal tiegħek.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek. Dan jinkludi xi effetti sekondarju possibbli li mhux elenkat f'dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F'dan il-fuljett

1. X'inhum Vizarsin u għalxiex jintuza
2. X'għandek tkun taf qabel ma tiehu Vizarsin
3. Kif għandek tiehu Vizarsin
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif taħżen Vizarsin
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1. X'inhum Vizarsin u għalxiex jintuza

Vizarsin fih is-sustanza attiva sildenafil li jagħmel ma' grupp ta' mediċinali msejha inibituri ta' phosphodiesterase tip 5 (PDE5). Hu jaġixxi billi jgħin jirrilassa l-važi tad-demm fil-pene tiegħek, u hekk jippermetti d-demm jidhol fil-pene meta tkun eċċitat sesswalment. Vizarsin jgħinek biss biex ikollok it-twebbis jekk tkun stimlat sesswalment.

Vizarsin huwa trattament għal irġiel li għandhom problema biex jibbies il-pene, li kultant hi magħrufa bħala impotenza. Dan jigri meta raġel ma jkunx jista' jikseb, jew iżomm, pene erett u iebes li jkun adattat għal attività sesswali.

2. X'għandek tkun taf qabel ma tiehu Vizarsin

Tihux Vizarsin

- Jekk inti allergiku għal sildenafil jew għal xi sustanza oħra ta' din il-medicina (elenkati fis-sezzjoni 6).
- Jekk inti qed tiehu mediċini li huma msejha nitrati, minhabba li flimkien jistgħu jikkawżaw pressjoni baxxa li tista' tkun ta' ħsara. Għid lit-tabib tiegħek jekk inti qed tiehu xi waħda minn dawn il-mediċini li jingħataw spiss biex itaffu l-angina pectoris (jew "uġiġħ fis-sider). Jekk inti m'intix ċert, staqsi lill-ispizjar jew lit-tabib tiegħek.
- Jekk inti qed tiehu mediċini li huma magħrufin li jġeneraw nitric oxide, bħal amyl nitrite ("poppers"), peress li l-kombinazzjoni wkoll tista' tikkawża pressjoni baxxa li tista' tkun ta' ħsara.
- qed/a tiehu riociguat. Din il-medicina tintuza għat-trattament tal-ipertensjoni arterjali pulmonarja (i.e., pressjoni għolja tad-demm fil-pulmuni) u ipertensjoni pulmonarja tromboembolika kronika (i.e., pressjoni għolja tad-demm fil-pulmuni kkawżata minn ċapep fid-demm). Ġie muri li inibituri ta' PDE5, bħal Vizarsin, iżidu l-effetti ipotensivi ta' din il-medicina. Jekk qed/a tiehu riociguat jew m'intix ċert/a għid lit-tabib tiegħek.
- Jekk għandek problema severa tal-qalb jew tal-fwied.

- Jekk inti dan l-ahhar kellek puplesija jew attack tal-qalb, jew jekk għandek pressjoni baxxa.
- Jekk inti għandek ċertu mard rari ereditarju tal-għajnejn (bħal *retinitis pigmentosa*).
- Jekk qatt kellek problemi fit-telf tal-vista minhabba newropatija anterjuri iskimika, mhux arteritika tal-għajn (NAION).

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib jew l-ispizjar tiegħek qabel tieħu Vizarsin:

- Jekk inti għandek anemija *tas-sickle cell* (abnormalità taċ-ċelloli ħomor tad-demem), lewkemja (kanċer taċ-ċelluli tad-demem), majeloma multipla (kanċer tal-mudullun).
- Jekk għandek deformità tal-pene tiegħek, jew il-marda ta' Peyronie.
- Jekk inti għandek problemi b'qalbek. F'dak il-każ it-tabib tiegħek għandu jiccekja bir-reqqa jekk qalbek tkunx tiflaħ għall-isforz żejjed li jkollok waqt rapport sesswali.
- Jekk fil-preżent inti għandek ulċera fl-istonku, jew problemi ta' tnixxija tad-demem (bħal emofilja).
- Jekk għall-għarrieda jkollok tnaqqis fil-vista jew tiflel il-vista, tieħux iktar Vizarsin u kellem lit-tabib tiegħek mill-ewwel.

Inti m'għandekx tuża Vizarsin ma' xi kura oħra kemm mill-ħalq u kemm lokalizzarta għal problema tat-twebbis tal-pene.

M'għandekx tuża Vizarsin ma' kuri għal pressjoni għolja arterjali pulmonari (PAH) li jkun fihom sildenafil jew kwalunkwe inibituri oħrajn ta' PDE5.

M'għandekx tieħu Vizarsin jekk m'għandekx disfunzjoni erettili.

M'għandekx tieħu Vizarsin jekk inti mara.

Kunsiderazzjonijiet speċjali għal pazjenti bi problem tal-klewi jew tal-fwied

Għandek tgharraf lit-tabib tiegħek jekk għandek problemi tal-klewi jew tal-fwied. It-tabib tiegħek għandu mnejn inaqaslek id-doża tiegħek.

Tfal u adolexxenti

Vizarsin m'għandux jingħata lil individwi taħt l-età ta' 18-il sena.

Mediċini oħra u Vizarsin

Għid lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek jekk qiegħed tieħu, ħadt dan l-aħhar, jew tista' tieħu xi mediċina oħra.

Il-pilloli Vizarsin jistgħu jinterferixxu ma xi mediċini oħra, speċjalment dawk użati biex jittrattaw uġiħ fis-sider. F'każ ta' emergenza medika, inti għandek tghid lit-tabib, l-ispizjar jew l-infermier tiegħek li inti ħadt Vizarsin u meta. Tieħux Vizarsin ma' mediċini oħra sakemm it-tabib tiegħek ma jgħidlekx li inti tista' tagħmel dan.

M'għandekx tieħu Vizarsin jekk qed tieħu mediċini msejja nitrati, peress li l-kombinazzjoni ta' dawn il-prodotti jista' jwassal għal tnaqqis perikoluż fil-pressjoni tad-demem tiegħek. Dejjem għandek tghid lit-tabib jew l-ispizjar tiegħek jekk qed tieħu minn dawn l-mediċini li jintużaw sikwit għal kura ta' angina pectoris (jew "uġiħ fis-sider").

M'għandekx tiehu Vizarsin jekk qed tiehu mediċini magħrufa bħala donaturi ta' nitric oxide bħal amyl nitrite ("poppers") peress li l-kombinazzjoni ta' dawn ukoll tista' twassal għal tnaqqis perikoluż fil-pressjoni.

Għid lit-tabib jew spiżjar tiegħek jekk diġà qed tiehu riociguat.

Jekk inti qed tiehu mediċini magħrufa bħala inibituri ta' protease, bħal daww għall-kura tal-HIV, it-tabib tiegħek jista' jibda jtik l-anqas doża (25 mg) ta' Vizarsin.

Pazjenti fuq kura ta' alpha blockers għal pressjoni għolja jew nefha tal-prostata jistgħu iħossu sturdament qawwi jew sturdament hafif li jista' jkun ikkawżat minn pressjoni baxxa posturali, jiġifieri l-pressjoni titbaxxa meta toqgħod bil-qiegħda jew meta tqum bil-wieqfa malajr. Xi pazjenti hassew dawn is-sintomi meta kienu qed jieħdu Vizarsin ma' alpha-blockers. Dan ġeneralment isehh fi żmien 4 sigħat wara li tkun ħadt Vizarsin. Sabiex titnaqqas il-probabilità li dawn is-sintomi jseħħu, għandek tkun fuq doża regolari ta' kuljum ta' alpha blocker li qed tiehu qabel ma tibda Vizarsin. It-tabib tiegħek jista' jibdix b'doża baxxa ta' 25 mg ta' Vizarsin.

Għid lit-tabib jew spiżjar tiegħek jekk diġà mediċini li fihom sacubitril/valsartan, użati biex jitrattaw l-insuffiċjenza tal-qalb.

Vizarsin ma' ikel, xorb u alkohol

Vizarsin jista' jittiehed mal-ikel jew fuq stonku vojta. Madnakollu, għandek mnejn issib li Vizarsin iddim biex jaħdem aktar wara li kun ħadt ikla tqila.

Ix-xorb alkoħoliku jista' temporanjament ifixkel l-abilità li jkollok erezzjoni. Biex tiehu l-aħjar benefiċċju mill-mediċina tiegħek, huwa rrakkomandat li inti ma tixrob ammont kbir ta' alkoħol qabel ma tiehu Vizarsin.

Tqala u treddigh

Vizarsin mhux indikat għal użu fin-nisa.

Sewqan u thaddim ta' magni

Vizarsin jista' jikkawża sturdament u jaffettwa l-vista. Għandek tkun taf sew kif tirreagixxi għal Vizarsin qabel ma ssuq jew tuża ingeni.

Vizarsin fih lactose u sodium

Jekk it-tabib qallek li għandek intolleranza għal ċerti tipi ta' zokkor, ikkuntattja lit-tabib tiegħek qabel tiehu dan il-prodott mediċinali.

Din il-mediċina fiha anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f'kull pillola, jiġifieri essenzjalment "f'ieles mis-sodium".

3. Kif għandek tiehu Vizarsin

Dejjem għandek tiehu din il-mediċina skont il-parir eżatt tat-tabib jew l-ispiżjar tiegħek. Dejjem għandek taċċerta ruħek mat-tabib jew mal-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

Id-doża tal-bidu rrakkomandata hija 50 mg.

M'għandekx tiehu Vizarsin aktar minn darbtejn kuljum.

Inti għandek tippjana li tiehu Vizarsin madwar siegħa qabel ma tippjana li jkollok x'taqsam sesswalment mal-partner. Ibla' l-pillola shiħa ma' tazza ilma.

Jekk inti jkollok l-impressjoni li l-effett ta' Vizarsin huwa qawwi jew dgħajjed wisq, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Vizarsin jgħinek biss biex ikollok erezzjoni jekk inti tkun stimulat sesswalment. Il-ħin li jieħu Vizarsin biex jahdem ivarja minn persuna għal oħra, iżda normalment jieħu bejn nofs siegħa u siegħa. Inti tista' ssib li Vizarsin iddum iżjed biex jahdem jekk inti tkun ħadt ikla kbira.

Jekk Vizarsin ma jgħinekx biex jkollok erezzjoni, jew jekk l-erezzjoni ma ddumx biżżejjed biex inti jkollok rapport sesswali shiħ, inti għandek tgħid lit-tabib tiegħek.

Jekk tiehu Vizarsin aktar milli suppost

Tista' tesperjenza zieda fl-effetti sekondarji u fis-severità tagħhom. Dozi ta' aktar minn 100 mg ma jżidux l-effikaċja.

M'għandekx tiehu aktar pilloli milli suppost.

Jekk tiehu aktar pilloli milli suppost, ikkuntattja lit-tabib tiegħek.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' din il-medicina, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

4. Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull medicina oħra, din il-medicina tista' tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f'kulhadd. Dawn l-effetti sekondarji rrappurtati ma' l-użu tal-Vizarsin huma ġeneralment ħfief għal moderati u ma jdumux.

Jekk ikollok kwalunkwe minn dawn l-effetti sekondarji li ġejjin, għandek tieqaf tiehu Vizarsin u tfittex għajnuna medika immedjatament:

- Reazzjoni allergika - din isseħħ **b'mod mhux komuni** (tista' taffettwa persuna 1 minn kull 100) Is-sintomi jinkludu tharhir tan-nifs f'daqqa, diffikulta' biex tiehu n-nifs u sturdament, nefha fil-kapell ta' l-għajn, fil-wieċ u fil-griżmejn.
- Uġiġh fis-sider - dan isseħħ **b'mod mhux komuni**
Jekk dan isseħħ matul jew wara l-att sesswali:
 - Oqgħod f'pożizzjoni kważi bilqiegħda u pprova rrilassa.
 - **Tużax nitrates** biex tikkura l-uġiġh fis-sider.
- Erezjonijiet prolongati u kultant bl-uġieħ – dawn isseħħu **b'mod rari** (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 1,000)
Jekk għandek erezzjoni li ddum iktar minn 4 sigħat, għandek tikkuntattja lit-tabib tiegħek immedjatament.
- Tnaqqis jew telf fil-vista f'daqqa – dan isseħħ **b'mod rari**
- Reazzjonijiet serji tal-ġilda – dawn isseħħu **b'mod rari**
Is-sintomi jistgħu jinkludu tqaxxir sever u nefha tal-ġilda, infafet fil-halq, fil-partijiet ġenitali u madwar l-għajnejn, deni.
- Puplesiji jew aċċessjonijiet – dawn isseħħu **b'mod rari**

Effetti sekondarji oħrajn:

Komuni hafna (jistgħu jaffettwaw iktar minn persuna minn kull 10): uġiġh ta' ras.

Komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna minn kull 10): dardir, ħmura fil-wieċ, fwawar tal-menopawsa (sintomi jinkludu sensazzjoni f'daqqa ta' shana fil-parti ta' fuq tal-ġisem), ħmura fil-wieċ, indigestjoni, vista mżewwqa b'xi kulur, vista mċajpra, disturb viżiv, immifsejn miżduda u sturdament.

Mhux komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna minn kull 100): rimettar, raxx, irritazzjoni fl-ghajnejn, ghajnejn homor, ugiġh fl-ghajn, tara leħhiet ta' dawl bħal berqa, luminożità viżiva, sensitività għad-dawl, ghajnejn idemmghu, taħbit qawwi tal-qalb, taħbit tal-qalb mgħaġġel, pressjoni għolja, pressjoni baxxa, ugiġh fil-muskoli, nġhas tqil, tnaqqis fis-sens tal-mess, vertigo, tisfir fil-widnejn, ħalq xott, imnifsejn imblukkati jew mimlijin, infjammazzjoni tar-rita tal-imnieher (sintomi jinkludu tnixxija, għatis u sadda), ugiġh addominali fil-parti ta' fuq, mard tar-rifluss gastro-esofageali (sintomi jinkludu ħruq ta' stonku), preżenza ta' demm fl-awrina, ugiġh fid-dirġajn u r-riġlejn, fsada fl-imnieher, sensazzjoni ta' shana u għeja.

Rari (jistgħu jaffettwaw sa 1 persuna minn kull 1,000): hażż hażin, puplesija, attakk tal-qalb, taħbit irregolari tal-qalb, fluss tad-demmi temporanjament imnaqqas għal partijiet tal-moħħ, sensazzjoni ta' ssikkar tal-gerżuma, telf ta' sensazzjoni fil-ħalq, fsada fuq wara tal-ghajnejn, tara doppju, tnaqqis fil-preċiżjoni viżiva, sensazzjoni mhux normali fl-ghajnejn, nefha tal-ghajn jew tal-kappell tal-ghajn, telf ta' kulur tal-abjad tal-ghajnejn, fsada fil-pene, preżenza ta' demm fis-semen, imnieher xott, nefha fuq ġewwa tal-imnieher, thossok irritabbli u telf f'daqqa tas-smiġh.

Minn esperjenza ta' wara t-tqegħid fis-suq, b'mod rari ġew irrappurtati każijiet ta' aņina instabbli (kundizzjoni tal-qalb) mewt għall-gharrieda. Ta' min wieħed jinnota li l-biċċa l-kbira tal-irġiel, iżda mhux kollha, li kellhom dawn l-effetti sekondarji kellhom problemi tal-qalb qabel ma ħadu din il-medicina. Mhux possibbli li wieħed jistabbilixxi jekk dawn il-każijiet kinux relatati direttament ma' Vizarsin.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellek lit-tabib, lill-ispiżjar jew l-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi effetti sekondarji li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Tista' wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali mnizżla f'[Appendiċi V](#). Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista' tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta' din il-medicina.

5. Kif taħzen Vizarsin

Żomm din il-medicina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-medicina wara d-data ta' meta tiskadi li tidher fuq il-kaxxa u l-folja wara EXP. Id-data ta' meta tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta' dak ix-xahar.

Din il-medicina m'għandhiex bżonn hażna speċjali.

Tarmix medicini mal-ilma tad-dranagġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif għandek tarmi medicini li m'għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X'fih Vizarsin

- Is-sustanza attiva hi sildenafil. Kull pillola miksija b'rita fiha sildenafil citrate ekwivalenti għal 25 mg sildenafil.
- Is-sustanzi l-oħra huma:
 - Qalba tal-pillola: microcrystalline cellulose (E460), calcium hydrogen phosphate, croscarmellose sodium, hypromellose (E464), magnesium stearate (E470b).
 - Kisi tar-rita: lactose monohydrate, hypromellose (E464), titanium dioxide (E171), triacetin (E1518).
 - Ara sezzjoni 4 "Vizarsin fih lactose u sodium".

Kif jidher Vizarsin u l-kontenut tal-pakkett

Vizarsin 25 mg Il-pilloli miksija b'rita ta' Vizarsin 25 mg huma ta' lewn bajdani f'ghamla oblong u mmarkati b'“25” fuq naha wahda.

Visarsin pilloli ta' 25 mg miksija b'rita huma disponibbli f'kaxxi ta' pillola 1 miksija b'rita f'folji u wkoll f'kaxxi ta' 4 x 1, 8 x 1 jew 12 x 1 pillola miksija b'rita f'folji perforati ta' doża unika. Jista' jkun li mhux id-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq u l-Manifattur

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Is-Slovenja

Għal kull tagħrif dwar din il-medicina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq:

België/Belgique/Belgien

KRKA Belgium, SA.

Tél/Tel: + 32 (0) 487 50 73 62

Lietuva

UAB KRKA Lietuva

Tel: + 370 5 236 27 40

България

КРКА България ЕООД

Тел.: + 359 (02) 962 34 50

Luxembourg/Luxemburg

KRKA Belgium, SA.

Tél/Tel: + 32 (0) 487 50 73 62 (BE)

Česká republika

KRKA ČR, s.r.o.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Magyarország

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

Tel.: + 36 (1) 355 8490

Danmark

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Malta

E. J. Busuttil Ltd.

Tel: + 356 21 445 885

Deutschland

TAD Pharma GmbH

Tel: + 49 (0) 4721 606-0

Nederland

KRKA Belgium, SA.

Tel: + 32 (0) 487 50 73 62 (BE)

Eesti

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal

Tel: + 372 (0) 6 671 658

Norge

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Ελλάδα

KRKA ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ

Τηλ: + 30 2100101613

Österreich

KRKA Pharma GmbH, Wien

Tel: + 43 (0)1 66 24 300

España

KERN PHARMA, S.L.

Tel: + 34 93 700 25 25

Polska

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 573 7500

France

KRKA France Eurl

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

Portugal

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

Hrvatska

KRKA - FARMA d.o.o.

Tel: + 385 1 6312 100

România

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 4 021 310 66 05

Ireland

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

Tel: + 353 1 413 3710

Slovenija

KRKA, d.d., Novo mesto

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Ísland

LYFIS ehf.
Sími: + 354 534 3500

Italia

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.
Tel: + 39 02 3300 8841

Κύπρος

KI.PA. (PHARMACAL) LIMITED
Τηλ: + 357 24 651 882

Latvija

KRKA Latvija SIA
Tel: + 371 6 733 86 10

Slovenská republika

KRKA Slovensko, s.r.o.
Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

Suomi/Finland

KRKA Finland Oy
Puh/Tel: + 358 20 754 5330

Sverige

KRKA Sverige AB
Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

United Kingdom (Northern Ireland)

KRKA Pharma Dublin, Ltd.
Tel: + 353 1 413 3710

Dan il-fuljett kien rivedut l-ahhar f'

Informazzjoni dettaljata dwar din il-medicina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Medicini <http://www.ema.europa.eu/>.

Fuljett ta' taghrif: Informazzjoni għall-utent

Vizarsin 50 mg pilloli miksija b'rita sildenafil

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tiehu din il-medicina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.
- Din il-medicina għet mogħtija lilek biss. M'għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista' tagħmlilhom il-ħsara, anke jekk għandhom l-istess sinjali ta' mard bħal tiegħek.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek. Dan jinkludi xi effetti sekondarju possibbli li mhux elenkat f'dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F'dan il-fuljett

1. X'inhum Vizarsin u għalxiex jintuza
2. X'għandek tkun taf qabel ma tiehu Vizarsin
3. Kif għandek tiehu Vizarsin
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif taħżen Vizarsin
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1. X'inhum Vizarsin u għalxiex jintuza

Vizarsin fih is-sustanza attiva sildenafil li jagħmel ma' grupp ta' mediċinali msejha inibituri ta' phosphodiesterase tip 5 (PDE5). Hu jaġixxi billi jgħin jirrilassa l-vażi tad-demm fil-pene tiegħek, u hekk jippermetti d-demm jidhul fil-pene meta tkun eċċitat sesswalment. Vizarsin jgħinek biss biex ikollok it-twebbis jekk tkun stimlat sesswalment.

Vizarsin huwa trattament għal irġiel li għandhom problema biex jibbies il-pene, li kultant hi magħrufa bħala impotenza. Dan jigri meta raġel ma jkunx jista' jikseb, jew iżomm, pene erett u iebes li jkun adattat għal attività sesswali.

2. X'għandek tkun taf qabel ma tiehu Vizarsin

Tihux Vizarsin

- Jekk inti allergiku għal sildenafil jew għal xi sustanza oħra ta' din il-medicina (elenkati fis-sezzjoni 6).
- Jekk inti qed tiehu mediċini li huma msejha nitrati, minhabba li flimkien jistgħu jikkawżaw pressjoni baxxa li tista' tkun ta' ħsara. Għid lit-tabib tiegħek jekk inti qed tiehu xi waħda minn dawn il-mediċini li jingħataw spiss biex itaffu l-angina pectoris (jew "uġiġħ fis-sider). Jekk inti m'intix ċert, staqsi lill-ispizjar jew lit-tabib tiegħek.
- Jekk inti qed tiehu mediċini li huma magħrufin li jġeneraw nitric oxide, bħal amyl nitrite ("poppers"), peress li l-kombinazzjoni wkoll tista' tikkawża pressjoni baxxa li tista' tkun ta' ħsara.
- qed/a tiehu riociguat. Din il-medicina tintuza għat-trattament tal-ipertensjoni arterjali pulmonarja (i.e., pressjoni għolja tad-demm fil-pulmuni) u ipertensjoni pulmonarja tromboembolika kronika (i.e., pressjoni għolja tad-demm fil-pulmuni kkawżata minn ċapep fid-demm). Għe muri li inibituri ta' PDE5, bħal Vizarsin, iżidu l-effetti ipotensivi ta' din il-medicina. Jekk qed/a tiehu riociguat jew m'intix ċert/a għid lit-tabib tiegħek.
- Jekk għandek problema severa tal-qalb jew tal-fwied.

- Jekk inti dan l-ahhar kellek puplesija jew attack tal-qalb, jew jekk għandek pressjoni baxxa.
- Jekk inti għandek ċertu mard rari ereditarju tal-għajnejn (bħal *retinitis pigmentosa*).
- Jekk qatt kellek problemi fit-telf tal-vista minhabba newropatija anterjuri iskimika, mhux arteritika tal-għajn (NAION).

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib jew l-ispiżjar tiegħek qabel tieħu Vizarsin:

- Jekk inti għandek anemija *tas-sickle cell* (abnormalità taċ-ċelloli ħomor tad-demmm), lewkemja (kanċer taċ-ċelluli tad-demmm), majeloma multipla (kanċer tal-mudullun).
- Jekk għandek deformità tal-pene tiegħek, jew il-marda ta' Peyronie.
- Jekk inti għandek problemi b'qalbek. F'dak il-każ it-tabib tiegħek għandu jiccekja bir-reqqa jekk qalbek tkunx tiflaħ għall-isforz żejjed li jkollok waqt rapport sesswali.
- Jekk fil-preżent inti għandek ulċera fl-istonku, jew problemi ta' tnixxija tad-demmm (bħal emofilja).
- Jekk għall-għarrieda jkollok tnaqqis fil-vista jew titlef il-vista, tieħux iktar Vizarsin u kellem lit-tabib tiegħek mill-ewwel.

Inti m'għandekx tuża Vizarsin ma' xi kura oħra kemm mill-ħalq u kemm lokalizzarta għal problema tat-twebbis tal-pene.

M'għandekx tuża Vizarsin ma' kuri għal pressjoni għolja arterjali pulmonari (PAH) li jkun fihom sildenafil jew kwalunkwe inibituri oħrajn ta' PDE5.

M'għandekx tieħu Vizarsin jekk m'għandekx disfunzjoni erettili.

M'għandekx tieħu Vizarsin jekk inti mara.

Kunsiderazzjonijiet speċjali għal pazjenti bi problem tal-klewi jew tal-fwied

Għandek tgharraf lit-tabib tiegħek jekk għandek problemi tal-klewi jew tal-fwied. It-tabib tiegħek għandu mnejn inaqaslek id-doża tiegħek.

Tfal u adolexxenti

Vizarsin m'għandux jingħata lil individwi taħt l-età ta' 18-il sena.

Mediċini oħra u Vizarsin

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qiegħed tieħu, ħadt dan l-aħħar, jew tista' tieħu xi mediċina oħra.

Il-pilloli Vizarsin jistgħu jinterferixxu ma xi mediċini oħra, speċjalment dawk użati biex jittrattaw uġiħ fis-sider. F'każ ta' emergenza medika, inti għandek tghid lill-professionist tal-kura tas-sahha li qed jikkurak, li inti ħadt Vizarsin u meta. Tieħux Vizarsin ma' mediċini oħra sakemm it-tabib tiegħek ma jgħidlekx li inti tista' tagħmel dan.

M'għandekx tieħu Vizarsin jekk qed tieħu mediċini msejha nitrati, peress li l-kombinazzjoni ta' dawn il-prodotti jista' jwassal għal tnaqqis perikoluż fil-pressjoni tad-demmm tiegħek. Dejjem għandek tghid lit-tabib jew l-ispiżjar tiegħek jekk qed tieħu minn dawn l-mediċini li jintużaw sikwit għal kura ta' angina pectoris (jew "uġiħ fis-sider").

M'għandekx tiehu Vizarsin jekk qed tiehu mediċini magħrufa bħala donaturi ta' nitric oxide bħal amyl nitrite ("poppers") peress li l-kombinazzjoni ta' dawn ukoll tista' twassal għal tnaqqis perikoluż fil-pressjoni.

Għid lit-tabib jew spiżjar tiegħek jekk diġà qed tiehu riociguat.

Jekk inti qed tiehu mediċini magħrufa bħala inibituri ta' protease, bħal daww għall-kura tal-HIV, it-tabib tiegħek jista' jibda jtik l-anqas doża (25 mg) ta' Vizarsin.

Pazjenti fuq kura ta' alpha blockers għal pressjoni għolja jew nefha tal-prostata jistgħu iħossu sturdament qawwi jew sturdament hafif li jista' jkun ikkawżat minn pressjoni baxxa posturali, jiġifieri l-pressjoni titbaxxa meta toqgħod bil-qiegħda jew meta tqum bil-wieqfa malajr. Xi pazjenti hassew dawn is-sintomi meta kienu qed jieħdu Vizarsin ma' alpha-blockers. Dan ġeneralment isehh fi żmien 4 sigħat wara li tkun ħadt Vizarsin. Sabiex titnaqqas il-probabilità li dawn is-sintomi jseħħu, għandek tkun fuq doża regolari ta' kuljum ta' alpha blocker li qed tiehu qabel ma tibda Vizarsin. It-tabib tiegħek jista' jibdix b'doża baxxa ta' 25 mg ta' Vizarsin.

Għid lit-tabib jew spiżjar tiegħek jekk diġà mediċini li fihom sacubitril/valsartan, użati biex jitrattaw l-insuffiċjenza tal-qalb.

Vizarsin ma' ikel, xorb u alkohol

Vizarsin jista' jittiehed mal-ikel jew fuq stonku vojta. Madnakollu, għandek mnejn issib li Vizarsin iddim biex jaħdem aktar wara lit kun ħadt ikla tqila.

Ix-xorb alkoħoliku jista' temporanjament ifixkel l-abilità li jkollok erezzjoni. Biex tiehu l-aħjar benefiċċju mill-mediċina tiegħek, huwa rrakkomandat li inti ma tixrobx ammont kbir ta' alkoħol qabel ma tiehu Vizarsin.

Tqala u treddigh

Vizarsin mhux indikat għal użu fin-nisa.

Sewqan u thaddim ta' magni

Vizarsin jista' jikkawża sturdament u jaffettwa l-vista. Għandek tkun taf sew kif tirreagixxi għal Vizarsin qabel ma ssuq jew tuża ingeni.

Vizarsin fih lactose u sodium

Jekk it-tabib qallek li għandek intolleranza għal ċerti tipi ta' zokkor, ikkuntattja lit-tabib tiegħek qabel tiehu dan il-prodott mediċinali.

Din il-mediċina fiha anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f'kull pillola, jiġifieri essenzjalment "ħieles mis-sodium".

3. Kif għandek tiehu Vizarsin

Dejjem għandek tiehu din il-mediċina skont il-parir eżatt tat-tabib jew l-ispiżjar tiegħek. Dejjem għandek taċċerta ruħek mat-tabib jew mal-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

Id-doża tal-bidu rrakkomandata hija 50 mg.

M'għandekx tiehu Vizarsin aktar minn darbtejn kuljum.

Inti għandek tippjana li tiehu Vizarsin madwar siegħa qabel ma tippjana li jkollok x'taqsam sesswalment mal-partner. Ibla' l-pillola shiħa ma' tazza ilma.

Jekk inti jkollok l-impressjoni li l-effett ta' Vizarsin huwa qawwi jew dgħajjef wisq, kellek lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Vizarsin jgħinek biss biex ikollok erezzjoni jekk inti tkun stimulat sesswalment. Il-ħin li jieħu Vizarsin biex jahdem ivarja minn persuna għal oħra, iżda normalment jieħu bejn nofs siegħa u siegħa. Inti tista' ssib li Vizarsin iddum iżjed biex jahdem jekk inti tkun ħadt ikla kbira.

Jekk Vizarsin ma jgħinekx biex jkollok erezzjoni, jew jekk l-erezzjoni ma ddumx biżżejjed biex inti jkollok rapport sesswali shiħ, inti għandek tgħid lit-tabib tiegħek.

Jekk tiehu Vizarsin aktar milli suppost

Tista' tesperjenza zieda fl-effetti sekondarji u fis-severità tagħhom. Dozi ta' aktar minn 100 mg ma jżidux l-effikaċja.

M'għandekx tiehu aktar pilloli milli suppost.

Jekk tiehu aktar pilloli milli suppost, ikkuntattja lit-tabib tiegħek.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' din il-medicina, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

4. Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull medicina oħra, din il-medicina tista' tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f'kulhadd. Dawn l-effetti sekondarji rrappurtati ma' l-użu tal-Vizarsin huma ġeneralment ħfief għal moderati u ma jidmuxe.

Jekk ikollok kwalunkwe minn dawn l-effetti sekondarji li ġejjin, għandek tieqaf tiehu Vizarsin u tftitex għajnuna medika immedjatament:

- Reazzjoni allergika - din isseħħ **b'mod mhux komuni** (tista' taffettwa persuna 1 minn kull 100) Is-sintomi jinkludu tharhir tan-nifs f'daqqa, diffikulta' biex tiehu n-nifs u sturdament, nefha fil-kapell ta' l-għajn, fil-wiċċ u fil-griżmejn.
- Uġiġh fis-sider - dan isseħħ **b'mod mhux komuni**
Jekk dan isseħħ matul jew wara l-att sesswali:
 - Oqgħod f'pożizzjoni kważi bilqiegħda u pprova rrilassa.
 - **Tużax nitrates** biex tikkura l-uġiġh fis-sider.
- Erezjonijiet prolongati u kultant bl-uġieħ – dawn isseħħu **b'mod rari** (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 1,000)
Jekk għandek erezzjoni li ddum iktar minn 4 sigħat, għandek tikkuntattja lit-tabib tiegħek immedjatament.
- Tnaqqis jew telf fil-vista f'daqqa – dan isseħħ **b'mod rari**
- Reazzjonijiet serji tal-ġilda – dawn isseħħu **b'mod rari**
Is-sintomi jistgħu jinkludu tqaxxir sever u nefha tal-ġilda, infafet fil-halq, fil-partijiet ġenitali u madwar l-għajnejn, deni.
- Puplesiji jew aċċessjonijiet – dawn isseħħu **b'mod rari**

Effetti sekondarji oħrajn:

Komuni hafna (jistgħu jaffettwaw iktar minn persuna minn kull 10): uġiġh ta' ras.

Komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna minn kull 10): dardir, ħmura fil-wiċċ, fwawar tal-menopawsa (sintomi jinkludu sensazzjoni f'daqqa ta' shana fil-parti ta' fuq tal-ġisem), ħmura fil-wiċċ, indigestjoni, vista mżewwqa b'xi kulur, vista mċajpra, disturb viżiv, immifsejn miżduda u sturdament.

Mhux komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna minn kull 100): rimettar, raxx, irritazzjoni fl-ghajnejn, ghajnejn homor, uġiġh fl-ghajn, tara leħhiet ta' dawl bħal berqa, luminożità viżiva, sensitività għad-dawl, ghajnejn idemmghu, taħbit qawwi tal-qalb, taħbit tal-qalb mgħaġġel, pressjoni għolja, pressjoni baxxa, uġiġh fil-muskoli, nġhas tqil, tnaqqis fis-sens tal-mess, vertigo, tisfir fil-widnejn, ħalq xott, imnifsejn imblukkati jew mimlijin, infjammazzjoni tar-rita tal-imnieher (sintomi jinkludu tnixxija, għatis u sadda), uġiġh addominali fil-parti ta' fuq, mard tar-rifluss gastro-esofageali (sintomi jinkludu ħruq ta' stonku), preżenza ta' demm fl-awrina, uġiġh fid-dirġajn u r-riġlejn, fsada fl-imnieher, sensazzjoni ta' shana u għeja.

Rari (jistgħu jaffettwaw sa 1 persuna minn kull 1,000): hażs hażin, puplesija, attakk tal-qalb, taħbit irregolari tal-qalb, fluss tad-demmm temporanjament imnaqqas għal partijiet tal-moħħ, sensazzjoni ta' ssikkar tal-gerżuma, telf ta' sensazzjoni fil-ħalq, fsada fuq wara tal-ghajnejn, tara doppju, tnaqqis fil-preċiżjoni viżiva, sensazzjoni mhux normali fl-ghajnejn, nefħa tal-ghajn jew tal-kappell tal-ghajn, telf ta' kulur tal-abjad tal-ghajnejn, fsada fil-pene, preżenza ta' demm fis-semen, imnieher xott, nefħa fuq ġewwa tal-imnieher, thossok irritabbli u telf f'daqqa tas-smiġh.

Minn esperjenza ta' wara t-tqegħid fis-suq, b'mod rari ġew irrappurtati każijiet ta' anġina instabbli (kundizzjoni tal-qalb) mewt għall-gharrieda. Ta' min wieħed jinnota li l-biċċa l-kbira tal-irġiel, iżda mhux kollha, li kellhom dawn l-effetti sekondarji kellhom problemi tal-qalb qabel ma ħadu din il-medicina. Mhux possibbli li wieħed jistabbilixxi jekk dawn il-każijiet kinux relatati direttament ma' Vizarsin.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellek lit-tabib, lill-ispizjar jew l-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Tista' wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali mnizżla f'[Appendiċi V](#). Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista' tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta' din il-medicina.

5. Kif taħzen Vizarsin

Żomm din il-medicina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-medicina wara d-data ta' meta tiskadi li tidher fuq il-kaxxa u l-folja wara EXP. Id-data ta' meta tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta' dak ix-xahar.

Din il-medicina m'għandhiex bżonn hażna speċjali.

Tarmix medicini mal-ilma tad-dranagġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispizjar tiegħek dwar kif għandek tarmi medicini li m'għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X'fih Vizarsin

- Is-sustanza attiva hi sildenafil. Kull pillola miksija b'rita fiha sildenafil citrate ekwivalenti għal 50 mg sildenafil.
- Is-sustanzi l-oħra huma:
Qalba tal-pillola: microcrystalline cellulose (E460), calcium hydrogen phosphate, croscarmellose sodium, hypromellose (E464), magnesium stearate (E470b).
Kisi tar-rita: lactose monohydrate, hypromellose (E464), titanium dioxide (E171), triacetin (E1518).
Ara sezzjoni 4 "Vizarsin fih lactose u sodium".

Kif jidher Vizarsin u l-kontenut tal-pakkett

Il-pilloli miksija b'rita ta' Vizarsin 50 mg huma ta' lewn bajdani f'ghamla oblong u mmarkati b "50" fuq naħa waħda.

Visarsin pilloli ta' 50 mg miksija b'rita huma disponibbli f'kaxxi ta' pillola 1 miksija b'rita f'folji u wkoll f'kaxxi ta' 4 x 1, 8 x 1 jew 12 x 1 pillola miksija b'rita f'folji perforati ta' doża unika. Jista' jkun li mhux id-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq u l-Manifattur

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Is-Slovenja

Għal kull tagħrif dwar din il-medicina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq:

België/Belgique/Belgien

KRKA Belgium, SA.

Tél/Tel: + 32 (0) 487 50 73 62

Lietuva

UAB KRKA Lietuva

Tel: + 370 5 236 27 40

България

КРКА България ЕООД

Тел.: + 359 (02) 962 34 50

Luxembourg/Luxemburg

KRKA Belgium, SA.

Tél/Tel: + 32 (0) 487 50 73 62 (BE)

Česká republika

KRKA ČR, s.r.o.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Magyarország

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

Tel.: + 36 (1) 355 8490

Danmark

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Malta

E. J. Busuttil Ltd.

Tel: + 356 21 445 885

Deutschland

TAD Pharma GmbH

Tel: + 49 (0) 4721 606-0

Nederland

KRKA Belgium, SA.

Tel: + 32 (0) 487 50 73 62 (BE)

Eesti

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal

Tel: + 372 (0) 6 671 658

Norge

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Ελλάδα

KRKA ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ

Τηλ: + 30 2100101613

Österreich

KRKA Pharma GmbH, Wien

Tel: + 43 (0)1 66 24 300

España

KERN PHARMA, S.L.

Tel: + 34 93 700 25 25

Polska

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 573 7500

France

KRKA France Eurl

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

Portugal

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

Hrvatska

KRKA - FARMA d.o.o.

Tel: + 385 1 6312 100

România

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 4 021 310 66 05

Ireland

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

Tel: + 353 1 413 3710

Slovenija

KRKA, d.d., Novo mesto

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Ísland

LYFIS ehf.
Sími: + 354 534 3500

Italia

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.
Tel: + 39 02 3300 8841

Κύπρος

KI.PA. (PHARMACAL) LIMITED
Τηλ: + 357 24 651 882

Latvija

KRKA Latvija SIA
Tel: + 371 6 733 86 10

Slovenská republika

KRKA Slovensko, s.r.o.
Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

Suomi/Finland

KRKA Finland Oy
Puh/Tel: + 358 20 754 5330

Sverige

KRKA Sverige AB
Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

United Kingdom (Northern Ireland)

KRKA Pharma Dublin, Ltd.
Tel: + 353 1 413 3710

Dan il-fuljett kien rivedut l-ahhar f'

Informazzjoni dettaljata dwar din il-medicina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Medicini <http://www.ema.europa.eu/>.

Fuljett ta' taghrif: Informazzjoni għall-utent

Vizarsin 100 mg pilloli miksija b'rita sildenafil

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tiehu din il-medicina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.
- Din il-medicina għet mogħtija lilek biss. M'għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista' tagħmlilhom il-ħsara, anke jekk għandhom l-istess sinjali ta' mard bħal tiegħek.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek. Dan jinkludi xi effetti sekondarju possibbli li mhux elenkat f'dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F'dan il-fuljett

1. X'inhum Vizarsin u għalxiex jintuza
2. X'għandek tkun taf qabel ma tiehu Vizarsin
3. Kif għandek tiehu Vizarsin
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif taħžen Vizarsin
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1. X'inhum Vizarsin u għalxiex jintuza

Vizarsin fih is-sustanza attiva sildenafil li jagħmel ma' grupp ta' mediċinali msejha inibituri ta' phosphodiesterase tip 5 (PDE5). Hu jaġixxi billi jgħin jirrilassa l-važi tad-demem fil-pene tiegħek, u hekk jippermetti d-demem jidhol fil-pene meta tkun eċċitat sesswalment. Vizarsin jgħinek biss biex ikollok it-twebbis jekk tkun stimlat sesswalment.

Vizarsin huwa trattament għal irġiel li għandhom problema biex jibbies il-pene, li kultant hi magħrufa bħala impotenza. Dan jigri meta raġel ma jkunx jista' jikseb, jew iżomm, pene erett u iebes li jkun adattat għal attività sesswali.

2. X'għandek tkun taf qabel ma tiehu Vizarsin

Tihux Vizarsin

- Jekk inti allergiku għal sildenafil jew għal xi sustanza oħra ta' din il-medicina (elenkati fis-sezzjoni 6).
- Jekk inti qed tiehu mediċini li huma msejha nitrati, minhabba li flimkien jistgħu jikkawżaw pressjoni baxxa li tista' tkun ta' ħsara. Għid lit-tabib tiegħek jekk inti qed tiehu xi waħda minn dawn il-mediċini li jingħataw spiss biex itaffu l-angina pectoris (jew "uġiġħ fis-sider). Jekk inti m'intix ċert, staqsi lill-ispizjar jew lit-tabib tiegħek.
- Jekk inti qed tiehu mediċini li huma magħrufin li jġeneraw nitric oxide, bħal amyl nitrite ("poppers"), peress li l-kombinazzjoni wkoll tista' tikkawża pressjoni baxxa li tista' tkun ta' ħsara.
- qed/a tiehu riociguat. Din il-medicina tintuza għat-trattament tal-ipertensjoni arterjali pulmonarja (i.e., pressjoni għolja tad-demem fil-pulmuni) u ipertensjoni pulmonarja tromboembolika kronika (i.e., pressjoni għolja tad-demem fil-pulmuni kkawżata minn ċapep fid-demem). Ġie muri li inibituri ta' PDE5, bħal Vizarsin, iżidu l-effetti ipotensivi ta' din il-medicina. Jekk qed/a tiehu riociguat jew m'intix ċert/a għid lit-tabib tiegħek.
- Jekk għandek problema severa tal-qalb jew tal-fwied.

- Jekk inti dan l-ahhar kellek puplesija jew attack tal-qalb, jew jekk għandek pressjoni baxxa.
- Jekk inti għandek ċertu mard rari ereditarju tal-għajnejn (bħal *retinitis pigmentosa*).
- Jekk qatt kellek problemi fit-telf tal-vista minhabba newropatija anterjuri iskimika, mhux arteritika tal-għajn (NAION).

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib jew l-ispiżjar tiegħek qabel tieħu Vizarsin:

- Jekk inti għandek anemija tas-sickle cell (abnormalità taċ-ċelloli ħomor tad-demmm), lewkemja (kanċer taċ-ċelluli tad-demmm), majeloma multipla (kanċer tal-mudullun).
- Jekk għandek deformità tal-pene tiegħek, jew il-marda ta' Peyronie.
- Jekk inti għandek problemi b'qalbek. F'dak il-każ it-tabib tiegħek għandu jiccekja bir-reqqa jekk qalbek tkunx tiflaħ għall-isforz żejjed li jkollok waqt rapport sesswali.
- Jekk fil-preżent inti għandek ulċera fl-istonku, jew problemi ta' tnixxija tad-demmm (bħal emofilja).
- Jekk għall-għarrieda jkollok tnaqqis fil-vista jew titef il-vista, tiehux iktar Vizarsin u kellem lit-tabib tiegħek mill-ewwel.

Inti m'għandekx tuża Vizarsin ma' xi kura oħra kemm mill-ħalq u kemm lokalizzarta għal problema tat-twebbis tal-pene.

M'għandekx tuża Vizarsin ma' kuri għal pressjoni għolja arterjali pulmonari (PAH) li jkun fihom sildenafil jew kwalunkwe inibituri oħrajn ta' PDE5.

M'għandekx tieħu Vizarsin jekk m'għandekx disfunzjoni erettili.

M'għandekx tieħu Vizarsin jekk inti mara.

Kunsiderazzjonijiet speċjali għal pazjenti bi problem tal-klewi jew tal-fwied

Għandek tgharraf lit-tabib tiegħek jekk għandek problemi tal-klewi jew tal-fwied. It-tabib tiegħek għandu mnejn inaqaslek id-doża tiegħek.

Tfal u adolexxenti

Vizarsin m'għandux jingħata lil individwi taħt l-età ta' 18-il sena.

Mediċini oħra u Vizarsin

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qiegħed tieħu, ħadt dan l-aħhar, jew tista' tieħu xi mediċina oħra.

Il-pilloli Vizarsin jistgħu jinterferixxu ma xi mediċini oħra, speċjalment dawk użati biex jittrattaw uġiħ fis-sider. F'każ ta' emergenza medika, inti għandek tghid lill-professionist tal-kura tas-sahha li qed jikkurak, li inti ħadt Vizarsin u meta. Tiehux Vizarsin ma' mediċini oħra sakemm it-tabib tiegħek ma jgħidlekx li inti tista' tagħmel dan.

M'għandekx tieħu Vizarsin jekk qed tieħu mediċini msejha nitrati, peress li l-kombinazzjoni ta' dawn il-prodotti jista' jwassal għal tnaqqis perikoluż fil-pressjoni tad-demmm tiegħek. Dejjem għandek tghid lit-tabib jew l-ispiżjar tiegħek jekk qed tieħu minn dawn l-mediċini li jintużaw sikwit għal kura ta' angina pectoris (jew "uġiħ fis-sider").

M'għandekx tiehu Vizarsin jekk qed tiehu mediċini magħrufa bħala donaturi ta' nitric oxide bħal amyl nitrite ("poppers") peress li l-kombinazzjoni ta' dawn ukoll tista' twassal għal tnaqqis perikoluż fil-pressjoni.

Għid lit-tabib jew spiżjar tiegħek jekk diġà qed tiehu riociguat.

Jekk inti qed tiehu mediċini magħrufa bħala inibituri ta' protease, bħal daww għall-kura tal-HIV, it-tabib tiegħek jista' jibda jtik l-anqas doża (25 mg) ta' Vizarsin.

Pazjenti fuq kura ta' alpha blockers għal pressjoni għolja jew nefha tal-prostata jistgħu iħossu sturdament qawwi jew sturdament hafif li jista' jkun ikkawżat minn pressjoni baxxa posturali, jiġifieri l-pressjoni titbaxxa meta toqgħod bil-qiegħda jew meta tqum bil-wieqfa malajr. Xi pazjenti hassew dawn is-sintomi meta kienu qed jieħdu Vizarsin ma' alpha-blockers. Dan ġeneralment isehh fi żmien 4 sigħat wara li tkun ħadt Vizarsin. Sabiex titnaqqas il-probabilità li dawn is-sintomi jseħħu, għandek tkun fuq doża regolari ta' kuljum ta' alpha blocker li qed tiehu qabel ma tibda Vizarsin. It-tabib tiegħek jista' jibdix b'doża baxxa ta' 25 mg ta' Vizarsin.

Għid lit-tabib jew spiżjar tiegħek jekk diġà mediċini li fihom sacubitril/valsartan, użati biex jitrattaw l-insuffiċjenza tal-qalb.

Vizarsin ma' ikel, xorb u alkohol

Vizarsin jista' jittiehed mal-ikel jew fuq stonku vojta. Madnakollu, għandek mnejn issib li Vizarsin iddim biex jaħdem aktar wara li kun ħadt ikla tqila.

Ix-xorb alkoħoliku jista' temporanjament ifixkel l-abilità li jkollok erezzjoni. Biex tiehu l-aħjar benefiċċju mill-mediċina tiegħek, huwa rrakkomandat li inti ma tixrob ammont kbir ta' alkoħol qabel ma tiehu Vizarsin.

Tqala u treddigh

Vizarsin mhux indikat għal użu fin-nisa.

Sewqan u thaddim ta' magni

Vizarsin jista' jikkawża sturdament u jaffettwa l-vista. Għandek tkun taf sew kif tirreagixxi għal Vizarsin qabel ma ssuq jew tuża ingeni.

Vizarsin fih lactose u sodium

Jekk it-tabib qallek li għandek intolleranza għal ċerti tipi ta' zokkor, ikkuntattja lit-tabib tiegħek qabel tiehu dan il-prodott mediċinali.

Din il-mediċina fiha anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f'kull pillola, jiġifieri essenzjalment "ħieles mis-sodium".

3. Kif għandek tiehu Vizarsin

Dejjem għandek tiehu din il-mediċina skont il-parir eżatt tat-tabib jew l-ispiżjar tiegħek. Dejjem għandek taċċerta ruħek mat-tabib jew mal-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

Id-doża tal-bidu rrakkomandata hija 50 mg.

M'għandekx tiehu Vizarsin aktar minn darbtejn kuljum.

Inti għandek tippjana li tiehu Vizarsin madwar siegħa qabel ma tippjana li jkollok x'taqsam sesswalment mal-partner. Ibla' l-pillola shiħa ma' tazza ilma.

Jekk inti jkollok l-impressjoni li l-effett ta' Vizarsin huwa qawwi jew dgħajjed wisq, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Vizarsin jgħinek biss biex ikollok erezzjoni jekk inti tkun stimulat sesswalment. Il-ħin li jieħu Vizarsin biex jahdem ivarja minn persuna għal oħra, iżda normalment jieħu bejn nofs siegħa u siegħa. Inti tista' ssib li Vizarsin iddum iżjed biex jahdem jekk inti tkun ħadt ikla kbira.

Jekk Vizarsin ma jgħinekx biex jkollok erezzjoni, jew jekk l-erezzjoni ma ddumx biżżejjed biex inti jkollok rapport sesswali shiħ, inti għandek tgħid lit-tabib tiegħek.

Jekk tiehu Vizarsin aktar milli suppost

Tista' tesperjenza zieda fl-effetti sekondarji u fis-severità tagħhom. Dozi ta' aktar minn 100 mg ma jżidux l-effikaċja.

M'għandekx tiehu aktar pilloli milli suppost.

Jekk tiehu aktar pilloli milli suppost, ikkuntattja lit-tabib tiegħek.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' din il-medicina, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

4. Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull medicina oħra, din il-medicina tista' tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f'kulhadd. Dawn l-effetti sekondarji rrappurtati ma' l-użu tal-Vizarsin huma ġeneralment ħfief għal moderati u ma jdumux.

Jekk ikollok kwalunkwe minn dawn l-effetti sekondarji li ġejjin, għandek tieqaf tiehu Vizarsin u tfittex għajnuna medika immedjatament:

- Reazzjoni allergika - din isseħħ **b'mod mhux komuni** (tista' taffettwa persuna 1 minn kull 100) Is-sintomi jinkludu tharhir tan-nifs f'daqqa, diffikulta' biex tiehu n-nifs u sturdament, nefha fil-kapell ta' l-għajn, fil-wiċċ u fil-griżmejn.
- Uġiġh fis-sider - dan isseħħ **b'mod mhux komuni**
Jekk dan isseħħ matul jew wara l-att sesswali:
 - Oqgħod f'pożizzjoni kważi bilqiegħda u pprova rrilassa.
 - **Tużax nitrates** biex tikkura l-uġiġh fis-sider.
- Erezjonijiet prolongati u kultant bl-uġiġh – dawn isseħħu **b'mod rari** (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 1,000)
Jekk għandek erezzjoni li ddum iktar minn 4 sigħat, għandek tikkuntattja lit-tabib tiegħek immedjatament.
- Tnaqqis jew telf fil-vista f'daqqa – dan isseħħ **b'mod rari**
- Reazzjonijiet serji tal-ġilda – dawn isseħħu **b'mod rari**
Is-sintomi jistgħu jinkludu tqaxxir sever u nefha tal-ġilda, infafet fil-halq, fil-partijiet ġenitali u madwar l-għajnejn, deni.
- Puplesiji jew aċċessjonijiet – dawn isseħħu **b'mod rari**

Effetti sekondarji oħrajn:

Komuni hafna (jistgħu jaffettwaw iktar minn persuna minn kull 10): uġiġh ta' ras.

Komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna minn kull 10): dardir, ħmura fil-wiċċ, fwawar tal-menopawsa (sintomi jinkludu sensazzjoni f'daqqa ta' shana fil-parti ta' fuq tal-ġisem), ħmura fil-wiċċ, indigestjoni, vista mżewwqa b'xi kulur, vista mċajpra, disturb viżiv, immifsejn miżduda u sturdament.

Mhux komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna minn kull 100): rimettar, raxx, irritazzjoni fl-ghajnejn, ghajnejn homor, ugiġh fl-ghajn, tara leħhiet ta' dawl bħal berqa, luminożità viżiva, sensitività għad-dawl, ghajnejn idemmghu, taħbit qawwi tal-qalb, taħbit tal-qalb mghaġġel, pressjoni għolja, pressjoni baxxa, ugiġh fil-muskoli, nġhas tqil, tnaqqis fis-sens tal-mess, vertigo, tisfir fil-widnejn, ħalq xott, imnifsejn imblukkati jew mimlijin, infjammazzjoni tar-rita tal-imnieher (sintomi jinkludu tnixxija, għatis u sadda), ugiġh addominali fil-parti ta' fuq, mard tar-rifluss gastro-esofageali (sintomi jinkludu ħruq ta' stonku), preżenza ta' demm fl-awrina, ugiġh fid-dirġajn u r-riġlejn, fsada fl-imnieher, sensazzjoni ta' shana u għeja.

Rari (jistgħu jaffettwaw sa 1 persuna minn kull 1,000): hażż hażin, puplesija, attakk tal-qalb, taħbit irregolari tal-qalb, fluss tad-demm temporanjament imnaqqas għal partijiet tal-moħħ, sensazzjoni ta' ssikkar tal-gerżuma, telf ta' sensazzjoni fil-ħalq, fsada fuq wara tal-ghajnejn, tara doppju, tnaqqis fil-preċiżjoni viżiva, sensazzjoni mhux normali fl-ghajnejn, nefha tal-ghajn jew tal-kappell tal-ghajn, telf ta' kulur tal-abjad tal-ghajnejn, fsada fil-pene, preżenza ta' demm fis-semen, imnieher xott, nefha fuq ġewwa tal-imnieher, thossok irritabbli u telf f'daqqa tas-smiġh.

Minn esperjenza ta' wara t-tqegħid fis-suq, b'mod rari ġew irrappurtati każijiet ta' aņina instabbli (kundizzjoni tal-qalb) mewt għall-ġharrieda. Ta' min wieħed jinnota li l-biċċa l-kbira tal-irġiel, iżda mhux kollha, li kellhom dawn l-effetti sekondarji kellhom problemi tal-qalb qabel ma ħadu din il-medicina. Mhux possibbli li wieħed jistabbilixxi jekk dawn il-każijiet kinux relatati direttament ma' Vizarsin.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellek lit-tabib, lill-ispiżjar jew l-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Tista' wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali mnizżla f'[Appendiċi V](#). Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista' tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta' din il-medicina.

5. Kif taħzen Vizarsin

Żomm din il-medicina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-medicina wara d-data ta' meta tiskadi li tidher fuq il-kaxxa u l-folja wara EXP. Id-data ta' meta tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta' dak ix-xahar.

Din il-medicina m'għandhiex bżonn hażna speċjali.

Tarmix medicini mal-ilma tad-dranagġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif għandek tarmi medicini li m'għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X'fih Vizarsin

- The active substance is sildenafil. Kull pillola miksiya b'rita fiha sildenafil citrate ekwivalenti għal 100 mg sildenafil.
- Is-sustanzi l-oħra huma:
Qalba tal-pillola: microcrystalline cellulose (E460), calcium hydrogen phosphate, croscarmellose sodium, hypromellose (E464), magnesium stearate (E470b).
Kisi tar-rita: lactose monohydrate, hypromellose (E464), titanium dioxide (E171), triacetin (E1518).
Ara sezzjoni 4 "Vizarsin fih lactose u sodium".

Kif jidher Vizarsin u l-kontenut tal-pakkett

Il-pilloli miksija b'rita ta' Vizarsin 100 mg huma ta' lewn bajdani f'ghamla oblong u mmarkati b "100" fuq naha waħda.

Visarsin pilloli ta' 100 mg miksija b'rita huma disponibbli f'kaxxi ta' pillola 1 miksija b'rita f'folji u wkoll f'kaxxi ta' 4 x 1, 8 x 1 jew 12 x 1 pillola miksija b'rita f'folji perforati ta' doża unika. Jista' jkun li mhux id-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq u l-Manifattur

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Is-Slovenja

Għal kull tagħrif dwar din il-medicina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq:

België/Belgique/Belgien

KRKA Belgium, SA.

Tél/Tel: + 32 (0) 487 50 73 62

Lietuva

UAB KRKA Lietuva

Tel: + 370 5 236 27 40

България

КРКА България ЕООД

Тел.: + 359 (02) 962 34 50

Luxembourg/Luxemburg

KRKA Belgium, SA.

Tél/Tel: + 32 (0) 487 50 73 62 (BE)

Česká republika

KRKA ČR, s.r.o.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Magyarország

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

Tel.: + 36 (1) 355 8490

Danmark

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Malta

E. J. Busuttil Ltd.

Tel: + 356 21 445 885

Deutschland

TAD Pharma GmbH

Tel: + 49 (0) 4721 606-0

Nederland

KRKA Belgium, SA.

Tel: + 32 (0) 487 50 73 62 (BE)

Eesti

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal

Tel: + 372 (0) 6 671 658

Norge

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Ελλάδα

KRKA ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ

Τηλ: + 30 2100101613

Österreich

KRKA Pharma GmbH, Wien

Tel: + 43 (0)1 66 24 300

España

KERN PHARMA, S.L.

Tel: + 34 93 700 25 25

Polska

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 573 7500

France

KRKA France Eurl

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

Portugal

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

Hrvatska

KRKA - FARMA d.o.o.

Tel: + 385 1 6312 100

România

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 4 021 310 66 05

Ireland

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

Tel: + 353 1 413 3710

Slovenija

KRKA, d.d., Novo mesto

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Ísland

LYFIS ehf.
Sími: + 354 534 3500

Italia

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.
Tel: + 39 02 3300 8841

Κύπρος

KI.PA. (PHARMACAL) LIMITED
Τηλ: + 357 24 651 882

Latvija

KRKA Latvija SIA
Tel: + 371 6 733 86 10

Slovenská republika

KRKA Slovensko, s.r.o.
Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

Suomi/Finland

KRKA Finland Oy
Puh/Tel: + 358 20 754 5330

Sverige

KRKA Sverige AB
Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

United Kingdom (Northern Ireland)

KRKA Pharma Dublin, Ltd.
Tel: + 353 1 413 3710

Dan il-fuljett kien rivedut l-ahhar f'

Informazzjoni dettaljata dwar din il-medicina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Medicini <http://www.ema.europa.eu/>.

Fuljett ta' taghrif: Informazzjoni għall-utent

Vizarsin 25 mg pilloli li jinhallu fil-halq sildenafil

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tiehu din il-medicina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.
- Din il-medicina għet mogħtija lilek biss. M'għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista' tagħmlilhom il-ħsara, anke jekk għandhom l-istess sinjali ta' mard bħal tiegħek.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek. Dan jinkludi xi effetti sekondarju possibbli li mhux elenkat f'dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F'dan il-fuljett

1. X'inhu Vizarsin u għalxiex jintuża
2. X'għandek tkun taf qabel ma tiehu Vizarsin
3. Kif għandek tiehu Vizarsin
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif taħżen Vizarsin
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1. X'inhu Vizarsin u għalxiex jintuża

Vizarsin fih is-sustanza attiva sildenafil li jagħmel ma' grupp ta' mediċinali msejha inibituri ta' phosphodiesterase tip 5 (PDE5). Hu jaġixxi billi jgħin jirrilassa l-vażi tad-demm fil-pene tiegħek, u hekk jippermetti d-demm jidhol fil-pene meta tkun eċċitat sesswalment. Vizarsin jgħinek biss biex ikollok it-twebbis jekk tkun stimlat sesswalment.

Vizarsin huwa trattament għal irġiel li għandhom problema biex jibbies il-pene, li kultant hi magħrufa bħala impotenza. Dan jigri meta raġel ma jkunx jista' jikseb, jew iżomm, pene erett u iebes li jkun adattat għal attività sesswali.

2. X'għandek tkun taf qabel ma tiehu Vizarsin

Tihux Vizarsin

- Jekk inti allergiku għal sildenafil jew għal xi sustanza oħra ta' din il-medicina (elenkati fis-sezzjoni 6).
- Jekk inti qed tiehu mediċini li huma msejha nitrati, minhabba li flimkien jistgħu jikkawżaw pressjoni baxxa li tista' tkun ta' ħsara. Għid lit-tabib tiegħek jekk inti qed tiehu xi waħda minn dawn il-mediċini li jingħataw spiss biex itaffu l-aġina ("uġigh fis-sider"). Jekk inti m'intix ċert, staqsi lill-ispizjar jew lit-tabib tiegħek.
- Jekk inti qed tiehu mediċini li huma magħrufin li jġeneraw nitric oxide, bħal amyl nitrite ("poppers"), dawn ukoll jistgħu jikkawżaw pressjoni baxxa li tista' tkun ta' ħsara.
- qed/a tiehu riociguat. Din il-medicina tintuża għat-trattament tal-ipertensjoni arterjali pulmonarja (i.e., pressjoni għolja tad-demm fil-pulmuni) u ipertensjoni pulmonarja tromboembolika kronika (i.e., pressjoni għolja tad-demm fil-pulmuni kkawżata minn ċapep fid-demm). Ġie muri li inibituri ta' PDE5, bħal Vizarsin, iżidu l-effetti ipotensivi ta' din il-medicina. Jekk qed/a tiehu riociguat jew m'intix ċert/a għid lit-tabib tiegħek.
- Jekk għandek problema severa tal-qalb jew tal-fwied.

- Jekk inti dan l-ahhar kellek puplesija jew attack tal-qalb, jew jekk għandek pressjoni baxxa.
- Jekk inti għandek ċertu mard rari ereditarju tal-ġhajnejn (bħal *retinitis pigmentosa*).
- Jekk qatt kellek problemi fit-telf tal-vista minhabba newropatija *anterjuri iskimika*, mhux arteritika tal-ġhajn (NAION).

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib jew l-ispiżjar tiegħek qabel tieħu Vizarsin:

- Jekk inti għandek anemija *tas-sickle cell* (abnormalità taċ-ċelloli ħomor tad-demem), lewkemja (kanċer taċ-ċelluli tad-demem), majeloma multipla (kanċer tal-mudullun) jew.
- Jekk għandek deformità fil-pene tiegħek, jew il-marda ta' Peyronie.
- Jekk inti għandek problemi b'qalbek. F'dak il-każ it-tabib tiegħek għandu jiccekja bir-reqqa jekk qalbek tkunx tiflaħ għall-isforz żejjed li jkollok waqt rapport sesswali.
- Jekk fil-preżent inti għandek ulċera fl-istonku, jew disturbu ta' tnixxija tad-demem (bħal emofilja).
- Jekk għall-ġharrieda jkollok tnaqqis fil-vista jew titef il-vista, tieħux iktar Vizarsin u kellem lit-tabib tiegħek mill-ewwel.

Inti m'għandekx tuża Vizarsin ma' xi kura oħra għall-impotenza.

M'għandekx tuża Vizarsin ma' kuri għal pressjoni għolja arterjali pulmonari (PAH) li jkun fihom sildenafil jew kwalunkwe inibituri oħrajn ta' PDE5.

M'għandekx tieħu Vizarsin jekk m'għandekx disfunzjoni erettili.

M'għandekx tieħu Vizarsin jekk inti mara.

Kunsiderazzjonijiet speċjali għal pazjenti bi problemi tal-kliewi jew tal-fwied

Għandek tgħarraf lit-tabib tiegħek jekk għandek problemi tal-kliewi jew tal-fwied. It-tabib tiegħek għandu mnejn inaqqaslek id-doża tiegħek.

Tfal u adolexxenti

Vizarsin m'għandux jingħata lil individwi taħt l-età ta' 18-il sena.

Mediċini oħra u Vizarsin

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qiegħed tieħu, ħadt dan l-aħħar, jew tista' tieħu xi mediċina oħra.

Vizarsin jista' jinterferixxi ma xi mediċini oħra, speċjalment dawk użati biex jittrattaw uġiħ fis-sider. F'każ ta' emergenza medika, inti għandek tgħid lill-professionist tal-kura tas-sahha li qed jikkurak, li inti ħadt Vizarsin u meta. Tieħux Vizarsin ma' mediċini oħra sakemm it-tabib tiegħek ma jgħidlekx li inti tista' tagħmel dan.

M'għandekx tieħu Vizarsin jekk qed tieħu mediċini msejja nitrati, peress li l-kombinazzjoni ta' dawn il-prodotti jista' jwassal għal tnaqqis perikoluż fil-pressjoni tad-demem tiegħek. Dejjem għandek tgħid lit-tabib jew l-ispiżjar tiegħek jekk qed tieħu minn dawn l-mediċini li jintużaw sikwit għal kura ta' angina pectoris (jew "uġiħ fis-sider").

M'għandekx tieħu Vizarsin jekk qed tieħu mediċini magħrufa bħala donaturi ta' nitric oxide bħal amyl nitrite ("poppers") peress li l-kombinazzjoni ta' dawn ukoll tista' twassal għal tnaqqis perikoluż fil-pressjoni.

Għid lit-tabib jew spizjar tiegħek jekk diġà qed tiegħu riociguat.

Jekk inti qed tiegħu mediċini magħrufa bħala inibituri ta' protease, bħal daww għall-kura tal-HIV, it-tabib tiegħek jista' jibda jtik l-anqas doża (25 mg) ta' Vizarsin.

Pazjenti fuq kura ta' alpha blockers għal pressjoni għolja jew nefha tal-prostata jistgħu iħossu sturdament qawwi jew sturdament hafif li tista' tkun ikkawżata minn pressjoni posturali baxxa, jiġifieri l-pressjoni titbaxxa meta toqgħod bilqiegħda jew meta tqum bilwieqfa malajr. Xi pazjenti ħassew dawn is-sintomi meta kienu qed jieħdu Vizarsin ma' alpha-blockers. Dan ġeneralment iseħħ fi żmien 4 sigħat wara li tkun ħadt Vizarsin. Sabiex titnaqqas il-probabbiltà li dawn is-sintomi jseħħu, għandek tkun fuq doża regolari ta' kuljum ta' alpha blocker li qed tiegħu qabel ma tibda Vizarsin. It-tabib tiegħek jista' jibdik b'doża aktar baxxa (25 mg) ta' Vizarsin.

Għid lit-tabib jew spizjar tiegħek jekk diġà mediċini li fihom sacubitril/valsartan, użati biex jitrattaw l-insuffiċjenza tal-qalb.

Vizarsin ma' ikel, xorb u alkohol

Vizarsin jista' jittiehed mal-ikel jew fuq stonku vojta. Madnakollu, għandek mnejn issib li Vizarsin iddum biex jahdem aktar wara li tkun ħadt ikla tqila. Ħalqek għandu jkun vojta qabel tiegħu din il-pillola.

Ix-xorb alkoħoliku jista' temporanjament ifixkel l-abilità li jkollok erezzjoni. Biex tiegħu l-aħjar benefiċċju mill-mediċina tiegħek, huwa rrakkomandat li inti ma tixrobx ammont kbir ta' alkoħol qabel ma tiegħu Vizarsin.

Tqala u treddigh

Vizarsin mhux indikat għal użu fin-nisa.

Sewqan u thaddim ta' magni

Vizarsin jista' jikkawża sturdament u jaffettwa l-vista. Għandek tkun taf sew kif tirreagixxi għal Vizarsin qabel ma ssuq jew tuża inġenji.

Vizarsin fih aspartame (E951) u sorbitol (E420)

Din il-mediċina fiha 0,375 mg ta' aspartame f'kull pillola li tinhall fil-ħalq. Aspartame hu sors ta' phenylalanine. Jista' jkun ta' ħsara għan-nies li jbatu minn fenilketonurja (phenylketonuria (PKU)), kundizzjoni ġenetika rari fejn fenilketonurja izid għax il-ġisem ma nneħhihx kif suppost.

Din il-mediċina fiha 0,00875 mg sorbitol f'kull pillola li tinhall fil-ħalq. Sorbitol huwa sors ta' fructose. Jekk inti għandek intolleranza ereditarja għal fructose (hereditary fructose intolerance - HFI), disturb ġenetiku rari, inti m'għandekx tingħata din il-mediċina. Pazjenti b'HFI ma jistgħux jkissru l-fructose, li jista' jikkawża effetti sekondarji serji. Għandek tgħid lit-tabib tiegħek qabel ma tingħata din il-mediċina jekk inti għandek HFI.

3. Kif għandek tiegħu Vizarsin

Dejjem għandek tiegħu din il-mediċina skont il-parir eżatt tat-tabib jew l-ispiżjar tiegħek. Dejjem għandek taċċerta ruħek mat-tabib jew mal-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

Id-doża tal-bidu rrakkomandata hija 50 mg.


M'għandekx tiegħu Vizarsin aktar minn darba kuljum.

M'għandekx tiegħu l-pilloli li jinħallu fil-ħalq ta' Vizarsin ma' xi għamliet oħra ta' Vizarsin.


Inti għandek tippjana li tiegħu Vizarsin madwar siegħa qabel ma tippjana li jkollok x'taqsam sesswalment mal-partner.

Vizarsin huwa fragli. Il-pilloli m'għandhomx jiġu mbuttati minn ġol-folja fil-pakkett tal-folji peress li dan jista' jagħmel ħsara lill-pillola. M'għandekx tmiss il-pilloli b'idejn mxarrbin peress li l-pilloli jistgħu jinqassmu. Nehhi pillola minn ġol-pakkett kif ġej:

għal pillola 1 f'kull folja:



għal 4 pilloli f'kull folja:



1. Żomm il-folja mit-truf u ssepara ċellola ta' folja waħda mill-kumplament tal-folja billi bil-mod iċċarrat tul il-perforazzjonijiet ta' madwarha.
2. Aqla' t-tarf tal-folja u qaxxar il-folja kompletament.
3. Aqleb il-pillola għal fuq idejk.
4. Poġġi l-pillola fuq ilsienek hekk kif titneħħa mill-ippakkjar.

Fi ftit sekondi ser tibda tisparixxi fil-ħalq u sussegwentement tista' tinbela' bl-ilma jew mingħajru. Il-ħalq għandu jkun vojt qabel ma tpoġġi pillola fuq l-ilsien.

Jekk inti jkollok l-impressjoni li l-effett ta' Vizarsin huwa qawwi jew dgħajjed wisq, kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

Vizarsin jgħinek biss biex ikollok erezzjoni jekk inti tkun stimulat sesswalment. Il-ħin li jieħu Vizarsin biex jahdem ivarja minn persuna għal oħra, iżda normalment jieħu bejn nofs siegħa u siegħa. Inti tista' ssib li Vizarsin iddum iżjed biex jahdem jekk inti tkun ħadt ikla kbira.

Jekk Vizarsin ma jgħinekx biex jkollok erezzjoni, jew jekk l-erezzjoni ma ddumx biżżejjed biex inti jkollok rapport sesswali shiħ, inti għandek tgħid lit-tabib tiegħek.

Jekk tiehu Vizarsin aktar milli suppost

Tista' tesperjenza zieda fl-effetti sekondarji u fis-severità tagħhom. Dozi ta' aktar minn 100 mg ma jżidux l-effikaċja.

M'għandekx tiehu aktar pilloli milli suppost.

Jekk tiehu aktar pilloli milli suppost, ikkuntattja lit-tabib tiegħek.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' din il-medicina, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

4. Effetti sekondarji possibbli

Bhal kull medicina oħra, din il-medicina tista' tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f'kulhadd. Dawn l-effetti sekondarji rrappurtati ma' l-użu tal-Vizarsin huma ġeneralment ħfief għal moderati u ma jidmuxe.

Jekk ikollok kwalunkwe minn dawn l-effetti sekondarji li ġejjin, ghandek tiegħaf tiegħu Vizarsin u tfittex għajjnuna medika immedjatament:

- Reazzjoni allergika - din isseħħ **b'mod mhux komuni** (tista' taffettwa persuna 1 minn kull 100) Is-sintomi jinkludu tħarhir tan-nifs f'daqqa, diffikulta' biex tiegħu n-nifs u sturdament, nefha fil-kapell ta' l-għajjn, fil-wieċ u fil-grizmejn.
- Uġiġħ fis-sider - dan isseħħ **b'mod mhux komuni**
Jekk dan isseħħ matul jew wara l-att sesswali:
 - Oqgħod f'pożizzjoni kważi bilqiegħda u pprova rrilassa.
 - **Tużax nitrates** biex tikkura l-uġiġħ fis-sider.
- Erezzjonijiet prolongati u kultant bl-uġiġħ – dawn isseħħu **b'mod rari** (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 1,000)
Jekk għandek erezzjoni li ddum iktar minn 4 sigħat, għandek tikkuntattja lit-tabib tiegħek immedjatament.
- Tnaqqis jew telf fil-vista f'daqqa – dan isseħħ **b'mod rari**
- Reazzjonijiet serji tal-ġilda – dawn isseħħu **b'mod rari**
Is-sintomi jistgħu jinkludu tqaxxir sever u nefha tal-ġilda, infafet fil-ħalq, fil-partijiet ġenitali u madwar l-għajnejn, deni.
- Puplesiji jew aċċessjonijiet – dawn isseħħu **b'mod rari**

Effetti sekondarji oħrajn:

Komuni hafna (jistgħu jaffettwaw iktar minn persuna minn kull 10): uġiġħ ta' ras.

Komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna minn kull 10): dardir, ħmura fil-wieċ, fwawar tal-menopawsa (sintomi jinkludu sensazzjoni f'daqqa ta' shana fil-parti ta' fuq tal-ġisem), ħmura fil-wieċ, indiġestjoni, vista mżewwqa b'xi kulur, vista mċajpra, disturb viżiv, imnifsejn miżduda u sturdament.

Mhux komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna minn kull 100): rimettar, raxx, irritazzjoni fl-għajnejn, għajnejn ħomor, uġiġħ fl-għajjn, tara leħhiet ta' dawl bħal berqa, luminożità viżiva, sensittività għadawl, għajnejn idemmghu, taħbit qawwi tal-qalb, taħbit tal-qalb mgħaġġel, pressjoni għolja, pressjoni baxxa, uġiġħ fil-muskoli, nġhas tqil, tnaqqis fis-sens tal-mess, vertigo, tisfir fil-widnejn, ħalq xott, imnifsejn imblukkati jew mimlijin, infjammazzjoni tar-rita tal-imnieher (sintomi jinkludu tnixxija, għatis u sadda), uġiġħ addominali fil-parti ta' fuq, mard tar-rifluss gastro-esofageali (sintomi jinkludu ħruq ta' stonku), preżenza ta' demm fl-awrina, uġiġħ fid-dirgħajn u r-riġlejn, fsada fl-imnieher, sensazzjoni ta' shana u għeja.

Rari (jistgħu jaffettwaw sa 1 persuna minn kull 1,000): hass hażin, puplesija, attakk tal-qalb, taħbit irregolari tal-qalb, fluss tad-demm temporanjament imnaqqas għal partijiet tal-moħħ, sensazzjoni ta' ssikkar tal-gerżuma, telf ta' sensazzjoni fil-ħalq, fsada fuq wara tal-għajnejn, tara doppju, tnaqqis fil-preċiżjoni viżiva, sensazzjoni mhux normali fl-għajnejn, nefha tal-għajjn jew tal-kapell tal-għajjn, telf ta' kulur tal-abjad tal-għajnejn, fsada fil-pene, preżenza ta' demm fis-semen, imnieher xott, nefha fuq ġewwa tal-imnieher, thossok irritabbli u telf f'daqqa tas-smiġħ.

Minn esperjenza ta' wara t-tqegħid fis-suq, b'mod rari ġew irrappurtati każijiet ta' aġina instabbli (kundizzjoni tal-qalb) mewt għall-għarrieda. Ta' min wieħed jinnota li l-biċċa l-kbira tal-irġiel, iżda mhux kollha, li kellihom dawn l-effetti sekondarji kellihom problemi tal-qalb qabel ma ħadu din il-medicina. Mhux possibbli li wieħed jistabbilixxi jekk dawn il-każijiet kinux relatati direttament ma' Vizarsin.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellew lit-tabib, lill-ispizjar jew l-infermier tieghek. Dan jinkludi xi effetti sekondarju li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Tista' wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali mniżżla f' [Appendiċi V](#). Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista' tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta' din il-medicina.

5. Kif taħzen Vizarsin

Żomm din il-medicina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-medicina wara d-data ta' meta tiskadi li tidher fuq il-kaxxa u l-folja wara EXP. Id-data ta' meta tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta' dak ix-xahar.

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 30°C.
Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa' mill-umdità.

Tarmix medicini mal-ilma tad-dranagġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispizjar tieghek dwar kif għandek tarmi medicini li m'għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X'fih Vizarsin

- Is-sustanza attiva hi sildenafil. Kull pillola li tinhall fil-ħalq fiha 25 mg ta' sildenafil.
- Is-sustanzi l-oħra huma: hydroxypropylcellulose (E463), mannitol (E421), aspartame (E951), neohesperidin-dihydrochalcone (E959), spearmint oil, peppermint oil (li fih sorbitol (E420)), crospovidone, calcium silicate u magnesium stearate (E470b).
Ara sezzjoni 4 "Vizarsin fih aspartame (E951) u sorbitol (E420)".

Kif jidher Vizarsin u l-kontenut tal-pakkett

Pilloli bojod għal kważi bojod, tondi, kemxejn imbuzzati, bi dbabar suwed possibbli.

Pilloli li jinhallu fil-ħalq ta' Vizarsin huma disponibbli f'kaxxi ta' pillola 1 li tinhall fil-ħalq f'folji u wkoll f'kaxxi ta' 2 x 1, 4 x 1, 8 x 1 jew 12 x 1 pillola li tinhall fil-ħalq f' folji perforati ta' doża unika. Jista' jkun li mhux id-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Is-Slovenja

Manifatturi

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Is-Slovenja

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Il-Ġermanja

Għal kull tagħrif dwar din il-medicina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq:

België/Belgique/Belgien

KRKA Belgium, SA.

Tél/Tel: + 32 (0) 487 50 73 62

Lietuva

UAB KRKA Lietuva

Tel: + 370 5 236 27 40

България

КРКА България ЕООД

Тел.: + 359 (02) 962 34 50

Luxembourg/Luxemburg

KRKA Belgium, SA.

Tél/Tel: + 32 (0) 487 50 73 62 (BE)

Česká republika

KRKA ČR, s.r.o.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Danmark

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Deutschland

TAD Pharma GmbH

Tel: + 49 (0) 4721 606-0

Eesti

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal

Tel: + 372 (0) 6 671 658

Ελλάδα

KRKA ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ

Τηλ: + 30 2100101613

España

KERN PHARMA, S.L.

Tel: + 34 93 700 25 25

France

KRKA France Eurl

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

Hrvatska

KRKA - FARMA d.o.o.

Tel: + 385 1 6312 100

Ireland

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

Tel: + 353 1 413 3710

Ísland

LYFIS ehf.

Sími: + 354 534 3500

Italia

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.

Tel: + 39 02 3300 8841

Κύπρος

KI.PA. (PHARMACAL) LIMITED

Τηλ: + 357 24 651 882

Latvija

KRKA Latvija SIA

Tel: + 371 6 733 86 10

Magyarország

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

Tel.: + 36 (1) 355 8490

Malta

E. J. Busuttil Ltd.

Tel: + 356 21 445 885

Nederland

KRKA Belgium, SA.

Tel: + 32 (0) 487 50 73 62 (BE)

Norge

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Österreich

KRKA Pharma GmbH, Wien

Tel: + 43 (0)1 66 24 300

Polska

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 573 7500

Portugal

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

România

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 4 021 310 66 05

Slovenija

KRKA, d.d., Novo mesto

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Slovenská republika

KRKA Slovensko, s.r.o.

Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

Suomi/Finland

KRKA Finland Oy

Puh/Tel: + 358 20 754 5330

Sverige

KRKA Sverige AB

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

United Kingdom (Northern Ireland)

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

Tel: + 353 1 413 3710

Dan il-fuljett kien rivedut l-ahhar f'

Informazzjoni dettaljata dwar din il-medicina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Medicini <http://www.ema.europa.eu/>

Fuljett ta' taghrif: Informazzjoni għall-utent

Vizarsin 50 mg pilloli li jinhallu fil-halq sildenafil

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tiehu din il-medicina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.
- Din il-medicina għet mogħtija lilek biss. M'għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista' tagħmlilhom il-ħsara, anke jekk għandhom l-istess sinjali ta' mard bħal tiegħek.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek. Dan jinkludi xi effetti sekondarju possibbli li mhux elenkat f'dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F'dan il-fuljett

1. X'inhu Vizarsin u għalxiex jintuża
2. X'għandek tkun taf qabel ma tiehu Vizarsin
3. Kif għandek tiehu Vizarsin
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif taħżen Vizarsin
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1. X'inhu Vizarsin u għalxiex jintuża

Vizarsin fih is-sustanza attiva sildenafil li jagħmel ma' grupp ta' mediċinali msejha inibituri ta' phosphodiesterase tip 5 (PDE5). Hu jaġixxi billi jgħin jirrilassa l-vażi tad-demm fil-pene tiegħek, u hekk jippermetti d-demm jidhol fil-pene meta tkun eċċitat sesswalment. Vizarsin jgħinek biss biex ikollok it-twebbis jekk tkun stimlat sesswalment.

Vizarsin huwa trattament għal irġiel li għandhom problema biex jibbies il-pene, li kultant hi magħrufa bħala impotenza. Dan jigri meta raġel ma jkunx jista' jikseb, jew iżomm, pene erett u iebes li jkun adattat għal attività sesswali.

2. X'għandek tkun taf qabel ma tiehu Vizarsin

Tihux Vizarsin

- Jekk inti allergiku għal sildenafil jew għal xi sustanza oħra ta' din il-medicina (elenkati fis-sezzjoni 6).
- Jekk inti qed tiehu mediċini li huma msejha nitrati, minhabba li flimkien jistgħu jikkawżaw pressjoni baxxa li tista' tkun ta' ħsara. Għid lit-tabib tiegħek jekk inti qed tiehu xi waħda minn dawn il-mediċini li jingħataw spiss biex itaffu l-aġina ("uġigh fis-sider"). Jekk inti m'intix ċert, staqsi lill-ispizjar jew lit-tabib tiegħek.
- Jekk inti qed tiehu mediċini li huma magħrufin li jġeneraw nitric oxide, bħal amyl nitrite ("poppers"), dawn ukoll jistgħu jikkawżaw pressjoni baxxa li tista' tkun ta' ħsara.
- qed/a tiehu riociguat. Din il-medicina tintuża għat-trattament tal-ipertensjoni arterjali pulmonarja (i.e., pressjoni għolja tad-demm fil-pulmuni) u ipertensjoni pulmonarja tromboembolika kronika (i.e., pressjoni għolja tad-demm fil-pulmuni kkawżata minn ċapep fid-demm). Ġie muri li inibituri ta' PDE5, bħal Vizarsin, iżidu l-effetti ipotensivi ta' din il-medicina. Jekk qed/a tiehu riociguat jew m'intix ċert/a għid lit-tabib tiegħek.
- Jekk għandek problema severa tal-qalb jew tal-fwied.

- Jekk inti dan l-ahhar kellek puplesija jew attack tal-qalb, jew jekk għandek pressjoni baxxa.
- Jekk inti għandek ċertu mard rari ereditarju tal-ghajnejn (bħal *retinitis pigmentosa*).
- Jekk qatt kellek problemi fit-telf tal-vista minhabba newropatija *anterjuri iskimika*, mhux arteritika tal-ghajn (NAION).

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib jew l-ispiżjar tiegħek qabel tieħu Vizarsin:

- Jekk inti għandek anemija *tas-sickle cell* (abnormalità taċ-ċelloli ħomor tad-demem), lewkemja (kanċer taċ-ċelluli tad-demem), majeloma multipla (kanċer tal-mudullun) jew.
- Jekk għandek deformità fil-pene tiegħek, jew il-marda ta' Peyronie.
- Jekk inti għandek problemi b'qalbek. F'dak il-każ it-tabib tiegħek għandu jiccekja bir-reqqa jekk qalbek tkunx tiflaħ għall-isforz żejjed li jkollok waqt rapport sesswali.
- Jekk fil-preżent inti għandek ulċera fl-istonku, jew disturbu ta' tnixxija tad-demem (bħal emofilja).
- Jekk għall-gharrieda jkollok tnaqqis fil-vista jew tiflef il-vista, tieħux iktar Vizarsin u kellem lit-tabib tiegħek mill-ewwel.

Inti m'għandekx tuża Vizarsin ma' xi kura oħra għall-impotenza.

M'għandekx tuża Vizarsin ma' kuri għal pressjoni għolja arterjali pulmonari (PAH) li jkun fihom sildenafil jew kwalunkwe inibituri oħrajn ta' PDE5.

M'għandekx tieħu Vizarsin jekk m'għandekx disfunzjoni erettili.

M'għandekx tieħu Vizarsin jekk inti mara.

Kunsiderazzjonijiet speċjali għal pazjenti bi problemi tal-kliewi jew tal-fwied

Għandek tgħarraf lit-tabib tiegħek jekk għandek problemi tal-kliewi jew tal-fwied. It-tabib tiegħek għandu mnejn inaqqaslek id-doża tiegħek.

Tfal u adolexxenti

Vizarsin m'għandux jingħata lil individwi taħt l-età ta' 18-il sena.

Mediċini oħra u Vizarsin

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qiegħed tieħu, ħadt dan l-aħhar, jew tista' tieħu xi mediċina oħra.

Vizarsin jista' jinterferixxi ma xi mediċini oħra, speċjalment dawk użati biex jittrattaw uġiħ fis-sider. F'każ ta' emergenza medika, inti għandek tgħid lill-professionist tal-kura tas-sahha li qed jikkurak, li inti ħadt Vizarsin u meta. Tieħux Vizarsin ma' mediċini oħra sakemm it-tabib tiegħek ma jgħidlekx li inti tista' tagħmel dan.

M'għandekx tieħu Vizarsin jekk qed tieħu mediċini msejha nitrati, peress li l-kombinazzjoni ta' dawn il-prodotti jista' jwassal għal tnaqqis perikoluż fil-pressjoni tad-demem tiegħek. Dejjem għandek tgħid lit-tabib jew l-ispiżjar tiegħek jekk qed tieħu minn dawn l-mediċini li jintużaw sikwit għal kura ta' angina pectoris (jew "uġiħ fis-sider").

M'għandekx tieħu Vizarsin jekk qed tieħu mediċini magħrufa bħala donaturi ta' nitric oxide bħal amyl nitrite ("poppers") peress li l-kombinazzjoni ta' dawn ukoll tista' twassal għal tnaqqis perikoluż fil-pressjoni.

Għid lit-tabib jew spizjar tiegħek jekk diġà qed tieħu riociguat.

Jekk inti qed tieħu mediċini magħrufa bħala inibituri ta' protease, bħal daww għall-kura tal-HIV, it-tabib tiegħek jista' jibda jtik l-anqas doża (25 mg) ta' Vizarsin.

Pazjenti fuq kura ta' alpha blockers għal pressjoni għolja jew nefha tal-prostata jistgħu iħossu sturdament qawwi jew sturdament hafif li tista' tkun ikkawżata minn pressjoni posturali baxxa, jiġifieri l-pressjoni titbaxxa meta toqgħod bilqiegħda jew meta tqum bilwieqfa malajr. Xi pazjenti ħassew dawn is-sintomi meta kienu qed jieħdu Vizarsin ma' alpha-blockers. Dan generalment iseħħ fi żmien 4 sigħat wara li tkun ħadt Vizarsin. Sabiex titnaqqas il-probabbiltà li dawn is-sintomi jseħħu, għandek tkun fuq doża regolari ta' kuljum ta' alpha blocker li qed tieħu qabel ma tibda Vizarsin. It-tabib tiegħek jista' jibdik b'doża aktar baxxa (25 mg) ta' Vizarsin.

Għid lit-tabib jew spizjar tiegħek jekk diġà mediċini li fihom sacubitril/valsartan, użati biex jitrattaw l-insuffiċjenza tal-qalb.

Vizarsin ma' ikel, xorb u alkohol

Vizarsin jista' jittiehed mal-ikel jew fuq stonku vojta. Madnakollu, għandek mnejn issib li Vizarsin iddum biex jahdem aktar wara li tkun ħadt ikla tqila. Ħalqek għandu jkun vojta qabel tieħu din il-pillola.

Ix-xorb alkoħoliku jista' temporanjament ifixkel l-abilità li jkollok erezzjoni. Biex tieħu l-aħjar benefiċċju mill-mediċina tiegħek, huwa rrakkomandat li inti ma tixrobx ammont kbir ta' alkoħol qabel ma tieħu Vizarsin.

Tqala u treddigh

Vizarsin mhux indikat għal użu fin-nisa.

Sewqan u thaddim ta' magni

Vizarsin jista' jikkawża sturdament u jaffettwa l-vista. Għandek tkun taf sew kif tirreagixxi għal Vizarsin qabel ma ssuq jew tuża inġenji.

Vizarsin fih aspartame (E951) u sucrose

Din il-mediċina fiha 0,75 mg ta' aspartame f'kull pillola li tinħall fil-ħalq. Aspartame hu sors ta' phenylalanine. Jista' jkun ta' ħsara għan-nies li jbatu minn fenilketonurja (phenylketonuria (PKU)), kundizzjoni genetika rari fejn fenilketonurja izid għax il-gisem ma nneħhihx kif suppost. Jekk it-tabib qallek li għandek intolleranza għal ċerti tipi ta' zokkor ikkuntattja lit-tabib tiegħek qabel tieħu dan il-prodott mediċinali.

3. Kif għandek tieħu Vizarsin

Dejjem għandek tieħu din il-mediċina skont il-parir eżatt tat-tabib jew l-ispiżjar tiegħek. Dejjem għandek taċċerta ruħek mat-tabib jew mal-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

Id-doża tal-bidu rrakkomandata hija 50 mg.

M'għandekx tieħu Vizarsin aktar minn darba kuljum.


M'għandekx tieħu l-pilloli li jinħallu fil-ħalq ta' Vizarsin ma' xi għamliet oħra ta' Vizarsin.

Inti għandek tippjana li tieħu Vizarsin madwar siegħa qabel ma tippjana li jkollok x'taqsam sesswalment mal-partner.


Vizarsin huwa fragli. Il-pilloli m'għandhomx jiġu mbuttati minn ġol-folja fil-pakkett tal-folji peress li dan jista' jagħmel ħsara lill-pillola. M'għandekx tmiss il-pilloli b'idejn mxarrbin peress li l-pilloli

jistgħu jinqassmu. Nehhi pillola minn ġol-pakkett kif ġej:

għal pillola 1 f'kull folja:



għal 4 pilloli f'kull folja:



1. Żomm il-folja mit-truf u ssepara ċellola ta' folja waħda mill-kumplament tal-folja billi bil-mod iċċarrat tul il-perforazzjonijiet ta' madwarha.
2. Aqla' t-tarf tal-folja u qaxxar il-folja kompletament.
3. Aqleb il-pillola għal fuq idejk.
4. Poġġi l-pillola fuq ilsienek hekk kif titneħha mill-ippakkjar.

Fi ftit sekondi ser tibda tisparixxi fil-ħalq u sussegwentement tista' tinbela' bl-ilma jew mingħajru. Il-ħalq għandu jkun vojt qabel ma tpoġġi pillola fuq l-ilsien.

Jekk inti jkollok l-impressjoni li l-effett ta' Vizarsin huwa qawwi jew dgħajjed wisq, kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

Vizarsin jgħinek biss biex ikollok erezzjoni jekk inti tkun stimulat sesswalment. Il-ħin li jieħu Vizarsin biex jahdem ivarja minn persuna għal oħra, iżda normalment jieħu bejn nofs siegħa u siegħa. Inti tista' ssib li Vizarsin iddum iżjed biex jahdem jekk inti tkun ħadt ikla kbira.

Jekk Vizarsin ma jgħinekx biex jkollok erezzjoni, jew jekk l-erezzjoni ma ddumx biżżejjed biex inti jkollok rapport sesswali shiħ, inti għandek tgħid lit-tabib tiegħek.

Jekk tiehu Vizarsin aktar milli suppost

Tista' tesperjenza zieda fl-effetti sekondarji u fis-severità tagħhom. Dozi ta' aktar minn 100 mg ma jżidux l-effikaċja.

M'għandekx tiehu aktar pilloli milli suppost.

Jekk tiehu aktar pilloli milli suppost, ikkuntattja lit-tabib tiegħek.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' din il-medicina, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

4. Effetti sekondarji possibbli

Bhal kull medicina oħra, din il-medicina tista' tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f'kulhadd. Dawn l-effetti sekondarji rrappurtati ma' l-użu tal-Vizarsin huma ġeneralment ħfief għal moderati u ma jdumux.

Jekk ikollok kwalunkwe minn dawn l-effetti sekondarji li ġejjin, għandek tieqaf tiehu Vizarsin u tfittex għajnuna medika immedjatament:

- Reazzjoni allergika - din isseħħ **b'mod mhux komuni** (tista' taffettwa persuna 1 minn kull 100)

Is-sintomi jinkludu tharhir tan-nifs f'daqqa, diffikulta' biex tiehu n-nifs u sturdament, nefha fil-kapell ta' l-ghajn, fil-wiċċ u fil-grizmejn.

- Uġigh fis-sider - dan isehh **b'mod mhux komuni**
Jekk dan isehh matul jew wara l-att sesswali:
 - Oqgħod f'pożizzjoni kważi bilqiegħda u pprova rrilassa.
 - **Tużax nitrates** biex tikkura l-uġigh fis-sider.
- Erezzjonijiet prolongati u kultant bl-uġieħ – dawn isehh **b'mod rari** (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 1,000)
Jekk għandek erezzjoni li ddum iktar minn 4 sigħat, għandek tikkuntattja lit-tabib tiegħek immedjatament.
- Tnaqqis jew telf fil-vista f'daqqa – dan isehh **b'mod rari**
- Reazzjonijiet serji tal-ġilda – dawn isehh **b'mod rari**
Is-sintomi jistgħu jinkludu tqaxxir sever u nefha tal-ġilda, infafet fil-ħalq, fil-partijiet ġenitali u madwar l-ghajnejn, deni.
- Puplesiji jew aċċessjonijiet – dawn isehh **b'mod rari**

Effetti sekondarji oħrajn:

Komuni hafna (jistgħu jaffettwaw iktar minn persuna minn kull 10): uġieħ ta' ras.

Komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna minn kull 10): dardir, ħmura fil-wiċċ, fwawar tal-menopawsa (sintomi jinkludu sensazzjoni f'daqqa ta' shana fil-parti ta' fuq tal-ġisem), ħmura fil-wiċċ, indiġestjoni, vista mżewwqa b'xi kulur, vista mċajpra, disturb viżiv, immifsejn miżduda u sturdament.

Mhux komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna minn kull 100): rimettar, raxx, irritazzjoni fl-ghajnejn, ghajnejn homor, uġieħ fl-ghajn, tara leħhiet ta' dawl bħal berqa, luminożità viżiva, sensittività għadawl, ghajnejn idemmghu, taħbit qawwi tal-qalb, taħbit tal-qalb mghaġġel, pressjoni għolja, pressjoni baxxa, uġieħ fil-muskoli, nġhas tqil, tnaqqis fis-sens tal-mess, vertigo, tisfir fil-widnejn, ħalq xott, immifsejn imblukkati jew mimlijin, infjammazzjoni tar-rita tal-imnieher (sintomi jinkludu tnixxija, għatis u sadda), uġieħ addominali fil-parti ta' fuq, mard tar-rifluss gastro-esofaġeali (sintomi jinkludu ħruq ta' stonku), preżenza ta' demm fl-awrina, uġieħ fid-dirghajn u r-riġlejn, fsada fl-imnieher, sensazzjoni ta' shana u għeja.

Rari (jistgħu jaffettwaw sa 1 persuna minn kull 1,000): hażin, puplesija, attakk tal-qalb, taħbit irregolari tal-qalb, fluss tad-demm temporanjament imnaqqas għal partijiet tal-moħħ, sensazzjoni ta' ssikkar tal-gerżuma, telf ta' sensazzjoni fil-ħalq, fsada fuq wara tal-ghajnejn, tara doppju, tnaqqis fil-preċiżjoni viżiva, sensazzjoni mhux normali fl-ghajnejn, nefha tal-ghajn jew tal-kapell tal-ghajn, telf ta' kulur tal-abjad tal-ghajnejn, fsada fil-pene, preżenza ta' demm fis-semen, imnieher xott, nefha fuq ġewwa tal-imnieher, thossok irritabbli u telf f'daqqa tas-smieħ.

Minn esperjenza ta' wara t-tqegħid fis-suq, b'mod rari ġew irrappurtati każijiet ta' angina instabbli (kundizzjoni tal-qalb) mewt għall-gharrieda. Ta' min wieħed jinnota li l-biċċa l-kbira tal-irġiel, iżda mhux kollha, li kellihom dawn l-effetti sekondarji kellihom problemi tal-qalb qabel ma ħadu din il-medicina. Mhux possibbli li wieħed jistabbilixxi jekk dawn il-każijiet kinux relatati direttament ma' Vizarsin.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellek lit-tabib, lill-ispizjar jew l-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju li mhuwiex elenkat f'dan il-fulett. Tista' wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali mnizżla f'[Appendiċi V](#). Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista' tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta' din il-

medicina.

5. Kif taħzen Vizarsin

Żomm din il-medicina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-medicina wara d-data ta' meta tiskadi li tidher fuq il-kaxxa u l-folja wara EXP. Id-data ta' meta tiskadi tirreferi għall-aħħar gurnata ta' dak ix-xahar.

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 30°C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa' mill-umdità.

Tarmix medicini mal-ilma tad-dranagġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispizjar tiegħek dwar kif għandek tarmi medicini li m'għadekx tuża. Dawn il-miżuri jghinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X'fih Vizarsin

- Is-sustanza attiva hi sildenafil. Kull pillola li tinħall fil-ħalq fiha 50 mg ta' sildenafil.
- Is-sustanzi l-oħra huma: hydroxypropylcellulose (E463), mannitol (E421), aspartame (E951), neohesperidin-dihydrochalcone (E959), toġhma ta' nagħniegħ, toġhma ta' pepermint (li fih sucrose), crospovidone, calcium silicate u magnesium stearate (E470b). Ara sezzjoni 4 "Vizarsin fih aspartame (E951) u sucrose".

Kif jidher Vizarsin u l-kontenut tal-pakkett

Pilloli bojod għal kważi bojod, tondi, kemxejn imbuzzati, bi dbabar suwed possibbli.

Pilloli li jinħallu fil-ħalq ta' Vizarsin huma disponibbli f'kaxxi ta' pillola 1 li tinħall fil-ħalq f'folji u wkoll f'kaxxi ta' 2 x 1, 4 x 1, 8 x 1, 12 x 1 jew 24 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq f' folji perforati ta' doża unika.

Jista' jkun li mhux id-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Is-Slovenja

Manifatturi

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Is-Slovenja

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Il-Ġermanja

Għal kull tagħrif dwar din il-medicina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq:

België/Belgique/Belgien

KRKA Belgium, SA.

Tél/Tel: + 32 (0) 487 50 73 62

Lietuva

UAB KRKA Lietuva

Tel: + 370 5 236 27 40

България

КРКА България ЕООД

Тел.: + 359 (02) 962 34 50

Luxembourg/Luxemburg

KRKA Belgium, SA.

Tél/Tel: + 32 (0) 487 50 73 62 (BE)

Česká republika

KRKA ČR, s.r.o.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Magyarország

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

Tel.: + 36 (1) 355 8490

Danmark

KRKA Sverige AB
Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Deutschland

TAD Pharma GmbH
Tel: + 49 (0) 4721 606-0

Eesti

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal
Tel: + 372 (0) 6 671 658

Ελλάδα

KRKA ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
Τηλ: + 30 2100101613

España

KERN PHARMA, S.L.
Tel: + 34 93 700 25 25

France

KRKA France Eurl
Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

Hrvatska

KRKA - FARMA d.o.o.
Tel: + 385 1 6312 100

Ireland

KRKA Pharma Dublin, Ltd.
Tel: + 353 1 413 3710

Ísland

LYFIS ehf.
Sími: + 354 534 3500

Italia

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.
Tel: + 39 02 3300 8841

Κύπρος

KI.PA. (PHARMACAL) LIMITED
Τηλ: + 357 24 651 882

Latvija

KRKA Latvija SIA
Tel: + 371 6 733 86 10

Malta

E. J. Busuttil Ltd.
Tel: + 356 21 445 885

Nederland

KRKA Belgium, SA.
Tel: + 32 (0) 487 50 73 62 (BE)

Norge

KRKA Sverige AB
Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Österreich

KRKA Pharma GmbH, Wien
Tel: + 43 (0)1 66 24 300

Polska

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.
Tel.: + 48 (0)22 573 7500

Portugal

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.
Tel: + 351 (0)21 46 43 650

România

KRKA Romania S.R.L., Bucharest
Tel: + 4 021 310 66 05

Slovenija

KRKA, d.d., Novo mesto
Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Slovenská republika

KRKA Slovensko, s.r.o.
Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

Suomi/Finland

KRKA Finland Oy
Puh/Tel: + 358 20 754 5330

Sverige

KRKA Sverige AB
Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

United Kingdom (Northern Ireland)

KRKA Pharma Dublin, Ltd.
Tel: + 353 1 413 3710

Dan il-fuljett kien rivedut l-ahhar f'

Informazzjoni dettaljata dwar din il-medicina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Medicini <http://www.ema.europa.eu/>.

Fuljett ta' taghrif: Informazzjoni għall-utent

Vizarsin 100 mg pilloli li jinhallu fil-halq sildenafil

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tiehu din il-medicina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.
- Din il-medicina għet mogħtija lilek biss. M'għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista' tagħmlilhom il-ħsara, anke jekk għandhom l-istess sinjali ta' mard bħal tiegħek.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek. Dan jinkludi xi effetti sekondarju possibbli li mhux elenkat f'dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F'dan il-fuljett

1. X'inhu Vizarsin u għalxiex jintuża
2. X'għandek tkun taf qabel ma tiehu Vizarsin
3. Kif għandek tiehu Vizarsin
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif taħżen Vizarsin
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1. X'inhu Vizarsin u għalxiex jintuża

Vizarsin fih is-sustanza attiva sildenafil li jagħmel ma' grupp ta' mediċinali msejha inibituri ta' phosphodiesterase tip 5 (PDE5). Hu jaġixxi billi jgħin jirrilassa l-vażi tad-demm fil-pene tiegħek, u hekk jippermetti d-demm jidhol fil-pene meta tkun eċċitat sesswalment. Vizarsin jgħinek biss biex ikollok it-twebbis jekk tkun stimlat sesswalment.

Vizarsin huwa trattament għal irġiel li għandhom problema biex jibbies il-pene, li kultant hi magħrufa bħala impotenza. Dan jigri meta raġel ma jkunx jista' jikseb, jew iżomm, pene erett u iebes li jkun adattat għal attività sesswali.

2. X'għandek tkun taf qabel ma tiehu Vizarsin

Tihux Vizarsin

- Jekk inti allergiku għal sildenafil jew għal xi sustanza oħra ta' din il-medicina (elenkati fis-sezzjoni 6).
- Jekk inti qed tiehu mediċini li huma msejha nitrati, minhabba li flimkien jistgħu jikkawżaw pressjoni baxxa li tista' tkun ta' ħsara. Għid lit-tabib tiegħek jekk inti qed tiehu xi waħda minn dawn il-mediċini li jingħataw spiss biex itaffu l-aġina ("uġigh fis-sider"). Jekk inti m'intix ċert, staqsi lill-ispizjar jew lit-tabib tiegħek.
- Jekk inti qed tiehu mediċini li huma magħrufin li jġeneraw nitric oxide, bħal amyl nitrite ("poppers"), dawn ukoll jistgħu jikkawżaw pressjoni baxxa li tista' tkun ta' ħsara.
- qed/a tiehu riociguat. Din il-medicina tintuża għat-trattament tal-ipertensjoni arterjali pulmonarja (i.e., pressjoni għolja tad-demm fil-pulmuni) u ipertensjoni pulmonarja tromboembolika kronika (i.e., pressjoni għolja tad-demm fil-pulmuni kkawżata minn ċapep fid-demm). Ġie muri li inibituri ta' PDE5, bħal Vizarsin, iżidu l-effetti ipotensivi ta' din il-medicina. Jekk qed/a tiehu riociguat jew m'intix ċert/a għid lit-tabib tiegħek.
- Jekk għandek problema severa tal-qalb jew tal-fwied.

- Jekk inti dan l-ahhar kellek puplesija jew attack tal-qalb, jew jekk għandek pressjoni baxxa.
- Jekk inti għandek ċertu mard rari ereditarju tal-ġhajnejn (bħal *retinitis pigmentosa*).
- Jekk qatt kellek problemi fit-telf tal-vista minhabba newropatija *anterjuri iskimika*, mhux arteritika tal-ġhajn (NAION).

Twissijiet u prekawżjonijiet

Kellem lit-tabib jew l-ispizjar tiegħek qabel tieħu Vizarsin:

- Jekk inti għandek anemija *tas-sickle cell* (abnormalità taċ-ċelloli ħomor tad-demem), lewkemja (kanċer taċ-ċelluli tad-demem), majeloma multipla (kanċer tal-mudullun) jew.
- Jekk għandek deformità fil-pene tiegħek, jew il-marda ta' Peyronie.
- Jekk inti għandek problemi b'qalbek. F'dak il-każ it-tabib tiegħek għandu jiccekja bir-reqqa jekk qalbek tkunx tiflaħ għall-isforz żejjed li jkollok waqt rapport sesswali.
- Jekk fil-preżent inti għandek ulċera fl-istonku, jew disturbu ta' tnixxija tad-demem (bħal emofilja).
- Jekk għall-ġharrieda jkollok tnaqqis fil-vista jew tiflef il-vista, tieħux iktar Vizarsin u kellem lit-tabib tiegħek mill-ewwel.

Inti m'għandekx tuża Vizarsin ma' xi kura oħra għall-impotenza.

M'għandekx tuża Vizarsin ma' kuri għal pressjoni għolja arterjali pulmonari (PAH) li jkun fihom sildenafil jew kwalunkwe inibituri oħrajn ta' PDE5.

M'għandekx tieħu Vizarsin jekk m'għandekx disfunzjoni erettili.

M'għandekx tieħu Vizarsin jekk inti mara.

Kunsiderazzjonijiet speċjali għal pazjenti bi problemi tal-kliewi jew tal-fwied

Għandek tgħarraf lit-tabib tiegħek jekk għandek problemi tal-kliewi jew tal-fwied. It-tabib tiegħek għandu mnejn inaqqaslek id-doża tiegħek.

Tfal u adolexxenti

Vizarsin m'għandux jingħata lil individwi taħt l-età ta' 18-il sena.

Mediċini oħra u Vizarsin

Għid lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek jekk qiegħed tieħu, ħadt dan l-aħhar, jew tista' tieħu xi mediċina oħra.

Vizarsin jista' jinterferixxi ma xi mediċini oħra, speċjalment dawk użati biex jittrattaw uġiħ fis-sider. F'każ ta' emergenza medika, inti għandek tgħid lill-professionist tal-kura tas-sahha li qed jikkurak, li inti ħadt Vizarsin u meta. Tieħux Vizarsin ma' mediċini oħra sakemm it-tabib tiegħek ma jgħidlekx li inti tista' tagħmel dan.

M'għandekx tieħu Vizarsin jekk qed tieħu mediċini msejja nitrati, peress li l-kombinazzjoni ta' dawn il-prodotti jista' jwassal għal tnaqqis perikoluż fil-pressjoni tad-demem tiegħek. Dejjem għandek tgħid lit-tabib jew l-ispizjar tiegħek jekk qed tieħu minn dawn l-mediċini li jintużaw sikwit għal kura ta' angina pectoris (jew "uġiħ fis-sider").

M'għandekx tieħu Vizarsin jekk qed tieħu mediċini magħrufa bħala donaturi ta' nitric oxide bħal amyl nitrite ("poppers") peress li l-kombinazzjoni ta' dawn ukoll tista' twassal għal tnaqqis perikoluż fil-pressjoni.

Għid lit-tabib jew spizjar tiegħek jekk diġà qed tieħu riociguat.

Jekk inti qed tieħu mediċini magħrufa bħala inibituri ta' protease, bħal daww għall-kura tal-HIV, it-tabib tiegħek jista' jibda jtik l-anqas doża (25 mg) ta' Vizarsin.

Pazjenti fuq kura ta' alpha blockers għal pressjoni għolja jew nefha tal-prostata jistgħu iħossu sturdament qawwi jew sturdament hafif li tista' tkun ikkawżata minn pressjoni posturali baxxa, jiġifieri l-pressjoni titbaxxa meta toqgħod bilqiegħda jew meta tqum bilwieqfa malajr. Xi pazjenti ħassew dawn is-sintomi meta kienu qed jieħdu Vizarsin ma' alpha-blockers. Dan generalment isehh fi żmien 4 sigħat wara li tkun ħadt Vizarsin. Sabiex titnaqqas il-probabilità li dawn is-sintomi jseħħu, għandek tkun fuq doża regolari ta' kuljum ta' alpha blocker li qed tieħu qabel ma tibda Vizarsin. It-tabib tiegħek jista' jibdik b'doża aktar baxxa (25 mg) ta' Vizarsin.

Għid lit-tabib jew spizjar tiegħek jekk diġà mediċini li fihom sacubitril/valsartan, użati biex jitrattaw l-insuffiċjenza tal-qalb.

Vizarsin ma' ikel, xorb u alkohol

Vizarsin jista' jittiehed mal-ikel jew fuq stonku vojta. Madnakollu, għandek mnejn issib li Vizarsin iddum biex jahdem aktar wara li tkun ħadt ikla tqila. Ħalqek għandu jkun vojta qabel tieħu din il-pillola.

Ix-xorb alkoħoliku jista' temporanjament ifixkel l-abilità li jkollok erezzjoni. Biex tieħu l-aħjar benefiċċju mill-mediċina tiegħek, huwa rrakkomandat li inti ma tixrobx ammont kbir ta' alkoħol qabel ma tieħu Vizarsin.

Tqala u treddigh

Vizarsin mhux indikat għal użu fin-nisa.

Sewqan u thaddim ta' magni

Vizarsin jista' jikkawża sturdament u jaffettwa l-vista. Għandek tkun taf sew kif tirreagixxi għal Vizarsin qabel ma ssuq jew tuża inġenji.

Vizarsin fih aspartame (E951) u sucrose

Din il-mediċina fiha 1,5 mg ta' aspartame f'kull pillola li tinħall fil-ħalq. Aspartame hu sors ta' phenylalanine. Jista' jkun ta' ħsara għan-nies li jbatu minn fenilketonurja (phenylketonuria (PKU)), kundizzjoni genetika rari fejn fenilketonurja izid għax il-gisem ma nneħhihx kif suppost. Jekk it-tabib qallek li għandek intolleranza għal ċerti tipi ta' zokkor ikkuntattja lit-tabib tiegħek qabel tieħu dan il-prodott mediċinali.

3. Kif għandek tieħu Vizarsin

Dejjem għandek tieħu din il-mediċina skont il-parir eżatt tat-tabib jew l-ispiżjar tiegħek. Dejjem għandek taċċerta ruħek mat-tabib jew mal-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

Id-doża tal-bidu rrakkomandata hija 50 mg.

M'għandekx tieħu Vizarsin aktar minn darba kuljum.


M'għandekx tieħu l-pilloli li jinħallu fil-ħalq ta' Vizarsin ma' xi għamliet oħra ta' Vizarsin.

Inti għandek tippjana li tieħu Vizarsin madwar siegħa qabel ma tippjana li jkollok x'taqsam sesswalment mal-partner.


Vizarsin huwa fragli. Il-pilloli m'għandhomx jiġu mbuttati minn ġol-folja fil-pakkett tal-folji peress li dan jista' jagħmel ħsara lill-pillola. M'għandekx tmiss il-pilloli b'idejn mxarrbin peress li l-pilloli

jistgħu jinqassmu. Nehhi pillola minn ġol-pakkett kif ġej:

għal pillola 1 f'kull folja:



għal 4 pilloli f'kull folja:



1. Żomm il-folja mit-truf u ssepara ċellola ta' folja waħda mill-kumplament tal-folja billi bil-mod iċċarrat tul il-perforazzjonijiet ta' madwarha.
2. Aqla' t-tarf tal-folja u qaxxar il-folja kompletament.
3. Aqleb il-pillola għal fuq idejk.
4. Poġġi l-pillola fuq ilsienek hekk kif titneħħa mill-ippakkjar.

Fi ftit sekondi ser tibda tisparixxi fil-ħalq u sussegwentement tista' tinbela' bl-ilma jew mingħajru. Il-ħalq għandu jkun vojta qabel ma tpoġġi pillola fuq l-ilsien.

Jekk inti jkollok l-impressjoni li l-effett ta' Vizarsin huwa qawwi jew dgħajjed wisq, kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

Vizarsin jgħinek biss biex ikollok erezzjoni jekk inti tkun stimulat sesswalment. Il-ħin li jieħu Vizarsin biex jahdem ivarja minn persuna għal oħra, iżda normalment jieħu bejn nofs siegħa u siegħa. Inti tista' ssib li Vizarsin iddum iżjed biex jahdem jekk inti tkun ħadt ikla kbira.

Jekk Vizarsin ma jgħinekx biex jkollok erezzjoni, jew jekk l-erezzjoni ma ddumx biżżejjed biex inti jkollok rapport sesswali shiħ, inti għandek tgħid lit-tabib tiegħek.

Jekk tiehu Vizarsin aktar milli suppost

Tista' tesperjenza zieda fl-effetti sekondarji u fis-severità tagħhom. Dozi ta' aktar minn 100 mg ma jżidux l-effikaċja.

M'għandekx tiehu aktar pilloli milli suppost.

Jekk tiehu aktar pilloli milli suppost, ikkuntattja lit-tabib tiegħek.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' din il-medicina, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

4. Effetti sekondarji possibbli

Bhal kull medicina oħra, din il-medicina tista' tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f'kulhadd. Dawn l-effetti sekondarji rrappurtati ma' l-użu tal-Vizarsin huma ġeneralment ħfief għal moderati u ma jdumux.

Jekk ikollok kwalunkwe minn dawn l-effetti sekondarji li ġejjin, għandek tieqaf tiehu Vizarsin u tfittex għajnuna medika immedjatament:

- Reazzjoni allergika - din isseħħ **b'mod mhux komuni** (tista' taffettwa persuna 1 minn kull 100)

Is-sintomi jinkludu tharhir tan-nifs f'daqqa, diffikulta' biex tiehu n-nifs u sturdament, nefha fil-kapell ta' l-ghajn, fil-wiċċ u fil-grizmejn.

- Uġiġ fis-sider - dan isehh **b'mod mhux komuni**
Jekk dan isehh matul jew wara l-att sesswali:
 - Oqgħod f'pożizzjoni kważi bilqiegħda u pprova rrilassa.
 - **Tużax nitrates** biex tikkura l-uġiġ fis-sider.
- Erezzjonijiet prolongati u kultant bl-uġieħ – dawn isehh **b'mod rari** (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 1,000)
Jekk għandek erezzjoni li ddum iktar minn 4 sigħat, għandek tikkuntattja lit-tabib tiegħek immedjatament.
- Tnaqqis jew telf fil-vista f'daqqa – dan isehh **b'mod rari**
- Reazzjonijiet serji tal-ġilda – dawn isehh **b'mod rari**
Is-sintomi jistgħu jinkludu tqaxxir sever u nefha tal-ġilda, infafet fil-ħalq, fil-partijiet ġenitali u madwar l-ghajnejn, deni.
- Puplesiji jew aċċessjonijiet – dawn isehh **b'mod rari**

Effetti sekondarji oħrajn:

Komuni hafna (jistgħu jaffettwaw iktar minn persuna minn kull 10): uġiġ ta' ras.

Komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna minn kull 10): dardir, ħmura fil-wiċċ, fwawar tal-menopawsa (sintomi jinkludu sensazzjoni f'daqqa ta' shana fil-parti ta' fuq tal-ġisem), ħmura fil-wiċċ, indiġestjoni, vista mżewwqa b'xi kulur, vista mċajpra, disturb viżiv, imnifsejn miżduda u sturdament.

Mhux komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna minn kull 100): rimettar, raxx, irritazzjoni fl-ghajnejn, ghajnejn homor, uġiġ fl-ghajn, tara leħhiet ta' dawl bħal berqa, luminożità viżiva, sensitività għadawl, ghajnejn idemmghu, taħbit qawwi tal-qalb, taħbit tal-qalb mghaġġel, pressjoni għolja, pressjoni baxxa, uġiġ fil-muskoli, nġhas tqil, tnaqqis fis-sens tal-mess, vertigo, tisfir fil-widnejn, ħalq xott, imnifsejn imblukkati jew mimlijin, infjammazzjoni tar-rita tal-imnieher (sintomi jinkludu tnixxija, għatis u sadda), uġiġ addominali fil-parti ta' fuq, mard tar-rifluss gastro-esofaġeali (sintomi jinkludu ħruq ta' stonku), preżenza ta' demm fl-awrina, uġiġ fid-dirghajn u r-riġlejn, fsada fl-imnieher, sensazzjoni ta' shana u għeja.

Rari (jistgħu jaffettwaw sa 1 persuna minn kull 1,000): hażin, puplesija, attakk tal-qalb, taħbit irregolari tal-qalb, fluss tad-demm temporanjament imnaqqas għal partijiet tal-moħħ, sensazzjoni ta' ssikkar tal-gerżuma, telf ta' sensazzjoni fil-ħalq, fsada fuq wara tal-ghajnejn, tara doppju, tnaqqis fil-preċiżjoni viżiva, sensazzjoni mhux normali fl-ghajnejn, nefha tal-ghajn jew tal-kapell tal-ghajn, telf ta' kulur tal-abjad tal-ghajnejn, fsada fil-pene, preżenza ta' demm fis-semen, imnieher xott, nefha fuq ġewwa tal-imnieher, thossok irritabbli u telf f'daqqa tas-smiġħ.

Minn esperjenza ta' wara t-tqegħid fis-suq, b'mod rari ġew irrappurtati każijiet ta' aġina instabbli (kundizzjoni tal-qalb) mewt għall-gharrieda. Ta' min wieħed jinnota li l-biċċa l-kbira tal-irġiel, iżda mhux kollha, li kellihom dawn l-effetti sekondarji kellihom problemi tal-qalb qabel ma ħadu din il-medicina. Mhux possibbli li wieħed jistabbilixxi jekk dawn il-każijiet kinux relatati direttament ma' Vizarsin.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellek lit-tabib, lill-ispizjar jew l-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju li mhuwiex elenkat f'dan il-fulett. Tista' wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali mniżżla f'[Appendiċi V](#). Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista' tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta' din il-

medicina.

5. Kif taħzen Vizarsin

Żomm din il-medicina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-medicina wara d-data ta' meta tiskadi li tidher fuq il-kaxxa u l-folja wara EXP. Id-data ta' meta tiskadi tirreferi għall-aħħar gurnata ta' dak ix-xahar.

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 30°C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa' mill-umdità.

Tarmix medicini mal-ilma tad-dranagġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispizjar tiegħek dwar kif għandek tarmi medicini li m'għadekx tuża. Dawn il-miżuri jghinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X'fih Vizarsin

- Is-sustanza attiva hi sildenafil. Kull pillola li tinhall fil-ħalq fiha 100 mg ta' sildenafil.
- Is-sustanzi l-oħra huma: hydroxypropylcellulose (E463), mannitol (E421), aspartame (E951), neohesperidin-dihydrochalcone (E959), toġhma ta' nagħniegħ, toġhma ta' pepermint (li fih sucrose), crospovidone, calcium silicate u magnesium stearate (E470b). Ara sezzjoni 4 "Vizarsin fih aspartame (E951) u sucrose".

Kif jidher Vizarsin u l-kontenut tal-pakkett

Pilloli bojod għal kważi bojod, tondi, kemxejn imbuzzati, bi dbabar suwed possibbli.

Pilloli li jinhallu fil-ħalq ta' Vizarsin huma disponibbli f'kaxxi ta' pillola 1 li tinhall fil-ħalq f'folji u wkoll f'kaxxi ta' 2 x 1, 4 x 1, 8 x 1, 12 x 1 jew 24 x 1 pillola li tinhall fil-ħalq f' folji perforati ta' doża unika.

Jista' jkun li mhux id-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Is-Slovenja

Manifatturi

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Is-Slovenja

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Il-Ġermanja

Għal kull tagħrif dwar din il-medicina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq:

België/Belgique/Belgien

KRKA Belgium, SA.

Tél/Tel: + 32 (0) 487 50 73 62

Lietuva

UAB KRKA Lietuva

Tel: + 370 5 236 27 40

България

КРКА България ЕООД

Тел.: + 359 (02) 962 34 50

Luxembourg/Luxemburg

KRKA Belgium, SA.

Tél/Tel: + 32 (0) 487 50 73 62 (BE)

Česká republika

KRKA ČR, s.r.o.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Magyarország

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

Tel.: + 36 (1) 355 8490

Danmark

KRKA Sverige AB
Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Deutschland

TAD Pharma GmbH
Tel: + 49 (0) 4721 606-0

Eesti

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal
Tel: + 372 (0) 6 671 658

Ελλάδα

KRKA ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
Τηλ: + 30 2100101613

España

KERN PHARMA, S.L.
Tel: + 34 93 700 25 25

France

KRKA France Eurl
Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

Hrvatska

KRKA - FARMA d.o.o.
Tel: + 385 1 6312 100

Ireland

KRKA Pharma Dublin, Ltd.
Tel: + 353 1 413 3710

Ísland

LYFIS ehf.
Sími: + 354 534 3500

Italia

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.
Tel: + 39 02 3300 8841

Κύπρος

KI.PA. (PHARMACAL) LIMITED
Τηλ: + 357 24 651 882

Latvija

KRKA Latvija SIA
Tel: + 371 6 733 86 10

Malta

E. J. Busuttil Ltd.
Tel: + 356 21 445 885

Nederland

KRKA Belgium, SA.
Tel: + 32 (0) 487 50 73 62 (BE)

Norge

KRKA Sverige AB
Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Österreich

KRKA Pharma GmbH, Wien
Tel: + 43 (0)1 66 24 300

Polska

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.
Tel.: + 48 (0)22 573 7500

Portugal

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.
Tel: + 351 (0)21 46 43 650

România

KRKA Romania S.R.L., Bucharest
Tel: + 4 021 310 66 05

Slovenija

KRKA, d.d., Novo mesto
Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Slovenská republika

KRKA Slovensko, s.r.o.
Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

Suomi/Finland

KRKA Finland Oy
Puh/Tel: + 358 20 754 5330

Sverige

KRKA Sverige AB
Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

United Kingdom (Northern Ireland)

KRKA Pharma Dublin, Ltd.
Tel: + 353 1 413 3710

Dan il-fuljett kien rivedut l-ahhar f'

Informazzjoni dettaljata dwar din il-medicina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Medicini <http://www.ema.europa.eu/>.