

Anness III

Emendi għas-sezzjonijiet rilevanti tal-Informazzjoni dwar il-Prodott

Nota:

Din l-informazzjoni dwar il-prodott hi r-riżultat tal-proċedura ta' referenza li tirrelata magħha din id-deċiżjoni tal-Kummissjoni.

L-informazzjoni dwar il-prodott tista' tkun sussegwentement aġġornata mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, flimkien mal-Istat Membru ta' Referenza, kif xieraq, skont il-proċeduri stabbiliti fil-Kapitolu 4 tat-Titolu III tad-Direttiva 2001/83/KE.

Is-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott, it-tikketta u l-fuljett ta' tagħrif validi huma l-verżjonijiet finali miksuba matul il-proċedura tal-grupp ta' koordinazzjoni bl-emendi li ġejjin (inseriment, sostituzzjoni jew tħassir ta' test kif xieraq) biex jirriflettu l-kliem kif ipprovduti hawn taht:

A. Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott

4.2 Pożoloġija u metodu ta' kif għandu jingħata

[...]

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta' Cardioxane fi tfal ta' bejn iż-0 u 18-il sena ma ġewx determinati s'issa. Data disponibbli fil-preżent hija deskritta fis-sezzjonijiet 4.3, 4.4, 4.8, 5.1 u 5.2.

~~Cardioxane huwa kontraindikata fi tfal u adolexxenti li għandhom sa 18-il sena (ara sezzjoni 4.3).~~

[...]

4.3 Kontraindikazzjonijiet

~~Tfal u adolexxenti li għandhom sa 18-il sena (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.8).~~

Cardioxane huwa kontraindikata fi tfal ta' bejn iż-0 u t-18-il sena li huma maħsuba li se jirċievu doża kumulattiva ta' inqas minn 300 mg / m²-ta' doxorubicin jew id-doża kumulattiva ekwivalenti ta' anthracycline oħra (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.8).

Cardioxane huwa kontraindikata ukoll fiċ-ċirkostanzi segwenti:

- [...]

B. Fuljett ta' tagħrif

2. X'għandek tkun taf qabel ma tingħata Cardioxane

M'għandekx tingħata Cardioxane

– Jekk għandek inqas minn 18-il sena **u d-doża ppjanata tiegħek ta' anthracycline hija meqjusa baxxa – kellek lit-tabib tiegħek dwar dan.**

[...]

Tfal u adolexxenti

Il-benefiċċji u r-riskji fit-tul ta' din il-medicina fit-tfal u fl-adolesxenti għadhom mhumieħ ċari. It-tabib tiegħek se jjer jagħtik parir dwar il-benefiċċji u r-riskji ta' din il-medicina.

[...]

IT-TAGHRIF LI JMISS QED JINGHATA BISS GHALL-PROFESSJONISTI TAL-KURA TAS-SANHA

[...]

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta' Cardioxane fi tfal ta' bejn iż-0 u 18-il sena ma ġewx determinati s'issa.

Cardioxane huwa kontraindikata fi tfal u-adolexxenti li għandhom sa ta' bejn iż-0 u t-18-il sena li huma maħsuba li se jirċievu doża kumulattiva ta' inqas minn 300 mg / m² ta' doxorubicin jew id-doża kumulattiva ekwivalenti ta' anthracycline oħra.