

ANNESS I

**LISTA TA' L-ISMIJET, GHAMLA FARMAĊEWTIKA (GHAMLIET FARMAĊEWTIĊI),
QAWWA (QAWWIET) TAL-PRODOTT MEDICINALI, MNEJN JINGHATA , L-
APPLIKANT(S), ID-DETENTUR(I) TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-
SUQ FL-ISTATI MEMBRI**

<u>Stat Membru</u>	<u>Id-Detentur ta' l-Awtorizzazzjoni għat-tqeghid fis-suq</u>	<u>Isem Ivvintat</u> losartan potassium	<u>Qawwa</u>	<u>Ghamla Farmaċewtika</u>	<u>Mnejn jingħata</u>
L-Awstrija	Merck Sharp & Dohme GmbH Donau-City-Straße 6, 1220 Wien L-Awstrija	Cosaar Plus - Filmtabletten	50 mg losartan potassium - 12,5 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
L-Awstrija	Merck Sharp & Dohme GmbH Donau-City-Straße 6, 1220 Wien L-Awstrija	Fortzaar-Filmtabletten	100 mg losartan potassium - 25 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
Il-Belġju	Merck Sharp & Dohme BV - Chaussée de Waterloo 1135 - B-1180 Brussels Il-Belġju	COZAAR PLUS FORTE 100 MG/25 MG	100 mg losartan potassium - 25 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
Il-Belġju	Merck Sharp & Dohme BV - Chaussée de Waterloo 1135 - B-1180 Brussels Il-Belġju	COZAAR PLUS 50 MG/12,5 MG	50 mg losartan potassium - 12,5 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
Il-Belġju	Therabel Pharma S.A. - Rue Egide Van Ophem 108 - B-1180 Brussels, Il-Belġju	LOORTAN PLUS FORTE 100 MG/25 MG	100 mg losartan potassium - 25 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
Il-Belġju	Therabel Pharma S.A. - Rue Egide Van Ophem 108 - B-1180 Brussels, Il-Belġju	LOORTAN PLUS 50 MG/12,5 MG	50 mg losartan potassium - 12,5 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq

Il-Bulgarja	Merck Sharp & Dohme Bulgaria EODD 55 Nikola Vaptzarov blvd. EXPO 2000, east wing, sections B1 & B2, 1st fl. 1407 Sofia Il-Bulgarja	Hyzaar	50 mg losartan potassium - 12,5 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
Ċipru	Merck Sharp & Dohme BV, Postbus 581, 2003 PC, Haarlem, L-Olanda	FORTZAAR	100 mg losartan potassium - 25 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
Ċipru	Merck Sharp & Dohme BV, Postbus 581, 2003 PC, Haarlem, L-Olanda	HYZAAR	50 mg losartan potassium - 12,5 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
Id-Danimarka	Merck Sharp & Dohme BV, Postbus 581, 2003 PC, Haarlem, L-Olanda	Cozaar Comp.	50 mg losartan potassium - 12,5 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
Id-Danimarka	Merck Sharp & Dohme BV, Postbus 581, 2003 PC, Haarlem, L-Olanda	Cozaar Comp. Forte	100 mg losartan potassium - 25 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
Id-Danimarka	Merck Sharp & Dohme BV, Postbus 581, 2003 PC, Haarlem, L-Olanda	Cozaar Comp. 100 mg / 12,5 mg	100 mg losartan potassium - 12,5 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
Id-Danimarka	Merck Sharp & Dohme BV, Postbus 581, 2003 PC, Haarlem, L-Olanda	Fortzaar	100 mg losartan potassium – 25 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'ritas	Jittiehed mill-halq
L-Estonja	Merck Sharp & Dohme OÜ Peterburi tee 46, Tallinn 11415, L-Estonja	HYZAAR	50 mg losartan potassium - 12,5 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq

L-Estonja	Merck Sharp & Dohme OÜ Peterburi tee 46, Tallinn 11415, L-Estonja	FORTZAAR	100 mg losartan potassium - 25 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
Il-Finlandja	Merck Sharp & Dohme B.V. Waarderweg 39 P.O.Box 581 2031 BN Haarlem L-Olanda	Cozaar Comp	50 mg losartan potassium - 12,5 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
Il-Finlandja	Merck Sharp & Dohme B.V. Waarderweg 39 P.O.Box 581 2031 BN Haarlem L-Olanda	Cozaar Comp	100 mg losartan potassium - 12,5 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
Il-Finlandja	Merck Sharp & Dohme B.V. Waarderweg 39 P.O.Box 581 2031 BN Haarlem L-Olanda	Cozaar Comp Forte	100 mg losartan potassium - 25 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
Franza	Merck Sharp Dohme Chibret 3 av. Hoche 75114 Paris Cedex 08 Franza	Fortzaar 100 mg/25 mg film-coated tablets	100 mg losartan potassium - 25 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
Franza	Merck Sharp Dohme Chibret 3 av. Hoche 75114 Paris Cedex 08 Franza	Hyzaar 100 mg/25 mg film-coated tablets	100 mg losartan potassium - 25 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
Franza	Merck Sharp Dohme Chibret 3 av. Hoche 75114 Paris Cedex 08 Franza	Fortzaar 50 mg/12,5 mg film-coated tablets	50 mg losartan potassium - 12,5 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
Franza	Merck Sharp Dohme Chibret 3 av. Hoche 75114 Paris Cedex 08 Franza	Hyzaar 50 mg/12,5 mg film-coated tablets	50 mg losartan potassium - 12,5 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq

Franza	Merck Sharp Dohme Chibret 3 av. Hoche 75114 Paris Cedex 08 Franza	Fortzaar 100 mg/12,5 mg film-coated tablets	100 mg losartan potassium - 12,5 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
Il-Ġermanja	MSD Chibropharm GmbH Postfach 1202 D-85530 Haar, Il-Ġermanja	LORZAAR PLUS 50/12,5 mg Filmdabletten	50 mg losartan potassium - 12,5 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
Il-Ġermanja	MSD Chibropharm GmbH Postfach 1202 D-85530 Haar, Il-Ġermanja	CARDOPAL PLUS 50/12,5 mg Filmdabletten	50 mg losartan potassium - 12,5 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
Il-Ġermanja	VARIPHARM ARZNEIMITTEL GMBH Lindenplatz 1 85540, Haar Il-Ġermanja	LORZAAR VARIPHARM PLUS 50/12,5 mg Filmdabletten	50 mg losartan potassium - 12,5 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
Il-Ġermanja	MSD Chibropharm GmbH Postfach 1202 D-85530 Haar, Il-Ġermanja	FORTZAAR 100/25 mg Filmdabletten	100 mg losartan potassium - 25 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
Il-Ġermanja	VARIPHARM ARZNEIMITTEL GMBH Lindenplatz 1 85540, Haar, Il-Ġermanja	FORTZAAR VARIPHARM 100/25 mg Filmdabletten	100 mg losartan potassium - 25 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
Il-Ġermanja	MSD Chibropharm GmbH Postfach 1202 D-85530 Haar, Il-Ġermanja	LORZAAR PLUS forte 100/12,5 mg Filmdabletten	100 mg losartan potassium - 12,5 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
Il-Greċja	VIANEX A.E. Tatoiou Street, Nea Erythraia 14671, il-Greċja	HYZAAR	50 mg losartan potassium - 12,5 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq

Il-Greċja	VIANEX A.E. Tatoiou Street, Nea Erythraia 14671, Il-Greċja	HYZAAR 100/25	100 mg losartan potassium - 25 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
L-Ungerija	Merck Sharp & Dohme Hungary Ltd 50, Alkotas str. H-1123 Budapest, L-Ungerija	Hyzaar 50/12.5 mg	50 mg losartan potassium - 12,5 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
L-Ungerija	Merck Sharp & Dohme Hungary Ltd 50, Alkotas str. H-1123 Budapest, L-Ungerija	Hyzaar Forte 100/25 mg	100 mg losartan potassium - 25 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
L-Irlanda	Merck Sharp & Dohme Limited Hertford Road Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Ir-Renju Unit	'Cozaar' Comp 50mg/12.5mg film-coated tablets	50 mg losartan potassium - 12,5 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
L-Irlanda	Merck Sharp & Dohme Limited, Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire, EN11 9BU, Ir-Renju Unit	Cozaar' Comp 100mg/25mg film-coated tablets	100 mg losartan potassium - 25 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
L-Italja	Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.A. Via G. Fabbroni 6, 00191 Rome, L- Italja	HIZAAR 50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film	50 mg losartan potassium - 12,5 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
L-Italja	Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.A. Via G. Fabbroni 6, 00191 Rome, L- Italja	HIZAAR 100 mg + 25 mg compresse rivestite con film	100 mg losartan potassium - 25 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
L-Italja	Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.A. Via G Fabbroni 6, 00191 Rome, L- Italja	FORZAAR 100 mg + 25 mg compresse rivestite con film	100 mg losartan potassium - 25 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq

L-Italja	Neopharmed S.p.A. Via G. Fabbroni, 6 00191 Rome, L-Italja	NEO-LOTAN PLUS 50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film	50 mg losartan potassium - 12,5 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
L-Italja	Neopharmed S.p.A. Via G. Fabbroni, 6 00191 Rome, L-Italja	NEO-LOTAN PLUS 100 mg + 25 mg compresse rivestite con film	100 mg losartan potassium - 25 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
L-Italja	Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.- viale Shakespeare 47 , 00144 Rome, L-Italja	LOSAZID 50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film	50 mg losartan potassium - 12,5 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
L-Italja	Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.- viale Shakespeare 47 , 00144 Rome, L-Italja	LOSAZID 100 mg + 25 mg compresse rivestite con film	100 mg losartan potassium - 25 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
Il-Latvija	SIA Merck Sharp & Dohme Latvia, Latvija; Skanstes street 13, LV-1013, Riga, Il-Latvija	HYZAAR 50 mg/12,5 mg;	50 mg losartan potassium - 12,5 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
Il-Latvija	SIA Merck Sharp & Dohme Latvia, Latvija; Skanstes street 13, LV-1013, Riga, Il-Latvija	Fortzaar 100 mg/25 mg	100 mg losartan potassium - 25 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
Il-Litwanja	UAB Merck Sharp & Dohme, Geležinio Vilko 18A, LT- 01112 Vilnius, il-Litwanja	FORTZAAR (Losartan/Hydrochlorothiazide)	100 mg losartan potassium - 25 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
Il-Litwanja	UAB Merck Sharp & Dohme, Geležinio Vilko 18A, LT- 01112 Vilnius, Il-Litwanja	HYZAAR (Losartan/Hydrochlorothiazide)	50 mg losartan potassium - 12,5 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq

Il-Lussemburgu	Merck Sharp & Dohme BV - Chaussée de Waterloo 1135 - B-1180 Brussels, Il-Belġju	COZAAR PLUS FORTE 100 MG/25 MG	100 mg losartan potassium - 25 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
Il-Lussemburgu	Merck Sharp & Dohme BV - Chaussée de Waterloo 1135 - B-1180 Brussels, Il-Belġju	COZAAR PLUS 50 MG/12,5 MG	50 mg losartan potassium - 12,5 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
Il-Lussemburgu	Therabel Pharma S.A. - Rue Egide Van Ophem 108 - B-1180 Brussels, Il-Belġju	LOORTAN PLUS FORTE 100 mg/25 mg	100 mg losartan potassium - 25 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
Il-Lussemburgu	Therabel Pharma S.A. - Rue Egide Van Ophem 108 - B-1180 Brussels, Il-Belġju	LOORTAN PLUS 50 mg/12,5 mg	50 mg losartan potassium - 12,5 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
Malta	Merck Sharp & Dohme Ltd., Hertfordshire Road, Hoddesdon, Hertfordshire, EN11 9BU, Ir-Renju Unit	"Cozaar Comp" 50/12.5 mg pilloli miksija b'rita	50 mg losartan potassium - 12,5 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
Malta	Merck Sharp & Dohme Ltd., Hertfordshire Road, Hoddesdon, Hertfordshire, EN11 9BU, Ir-Renju Unit	"Cozaar Comp" 100/25 mg pilloli miksija b'rita	100 mg losartan potassium - 25 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
Malta	Merck Sharp & Dohme Ltd., Hertfordshire Road, Hoddesdon, Hertfordshire, EN11 9BU, Ir-Renju Unit	"Cozaar Comp" 100/12,5 mg pilloli miksija b'rita	100 mg losartan potassium - 12,5 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
L-Olanda	Merck Sharp & Dohme PO Box 581 2003 PC Haarlem L-Olanda	Cozaar Plus 100/12,5	100 mg losartan potassium - 12,5 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq

L-Olanda	Merck Sharp & Dohme PO Box 581 2003 PC Haarlem L-Olanda	Fortzaar 100/25	100 mg losartan potassium - 25 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
L-Olanda	Merck Sharp & Dohme PO Box 581 2003 PC Haarlem L-Olanda	Hyzaar 50/12,5	50 mg losartan potassium - 12,5 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
Il-Polonja	MSD Polska Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warsaw, Il-Polonja	HYZAAR	50 mg losartan potassium - 12,5 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
Il-Polonja	MSD Polska Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warsaw, Il-Polonja	HYZAAR FORTE	100 mg losartan potassium - 25 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
Il-Portugall	Merck Sharp & Dohme, Lda. Quinta da Fonte - Edifício Vasco da Gama, 19 - Porto Salvo P.O. Box 214 2770-192 Paço d' Arcos, Il-Portugall	COZAAR Plus	50 mg losartan potassium - 12,5 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
Il-Portugall	Merck Sharp & Dohme, Lda. Quinta da Fonte - Edifício Vasco da Gama, 19 - Porto Salvo P.O. Box 214 2770-192 Paço d' Arcos, Il-Portugall	COZAAR Plus	100 mg losartan potassium - 12,5 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
Il-Portugall	Merck Sharp & Dohme, Lda. Quinta da Fonte - Edifício Vasco da Gama, 19 - Porto Salvo P.O. Box 214 2770-192 Paço d' Arcos, Il-Portugall	FORTZAAR	100 mg losartan potassium - 25 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq

Il-Portugall	Heptafarma- Companhia Farmacêutica, Sociedade Unipessoal, Lda Quinta da Fonte - Edifício Vasco da Gama, 19 - Porto Salvo P.O. Box 214 2770-192 Paço d' Arcos, Il-Portugall	SIAARA	100 mg losartan potassium - 25 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
Il-Portugall	LABORATÓRIO MEDINFAR, Produtos Farmacêuticos, SA Rua Manuel Ribeiro de Pavia, 1-1° Venda Nova 2700-547 Amadora, Il-Portugall	LORTAAN Plus	50 mg losartan potassium - 12,5 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
Il-Portugall	LABORATÓRIO MEDINFAR, Produtos Farmacêuticos, SA Rua Manuel Ribeiro de Pavia, 1-1° Venda Nova 2700-547 Amadora, Il-Portugall	LORTAAN Plus	100 mg losartan potassium - 12,5 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
Il-Portugall	Frosst Portuguesa – Produtos Farmacêuticos, Lda. Quinte da Fonte Edifício Vasco da Gama, 19 P.O. BOX 214 Porto Salvo 2780-730 Paço d' Arcos, Il-Portugall	Losartan + Hidroclorotiazida Frosst	100 mg losartan potassium - 12,5 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
Ir-Rumanija	Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Bucharest Business Park Șos. București-Ploiești, Nr. 1A, Clădirea C1, Etaj 3 Sector 1, București, Ir-Rumanija	HYZAAR® 50 mg/12,5 mg, comprimate filmate	50 mg losartan potassium - 12,5 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq

Ir-Rumanija	Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Bucharest Business Park Șos. București-Ploiești, Nr. 1A, Clădirea C1, Etaj 3 Sector 1, București, Ir-Rumanija	FORTZAAR® 100/ comprimat filmate	25 mg ,	100 mg losartan potassium - 25 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
Is-Slovenja	Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o., Smartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, Is-Slovenja	HYZAAR		50 mg losartan potassium - 12,5 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
Is-Slovenja	Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o., Smartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, Is-Slovenja	HYZAAR		100 mg losartan potassium - 12,5 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
Is-Slovenja	Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o., Smartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, Is-Slovenja	FORTZAAR		100 mg losartan potassium - 25 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
Spanja	MERCK SHARP AND DOHME DE ESPAÑA, S.A. C/ Josefa Valcárcel, 38 28027 MADRID, Spanja	Cozaar Plus		50 mg losartan potassium - 12,5 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
Spanja	MERCK SHARP AND DOHME DE ESPAÑA, S.A. C/ Josefa Valcárcel, 38 28027 MADRID, Spanja	Fortzaar		100 mg losartan potassium - 25 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
L-Iżvezja	Merck Sharp & Dohme PO Box 581 2003 PC Haarlem The L-Olanda	Cozaar Comp 50 mg/12,5 mg film drageer tabletter		50 mg losartan potassium - 12,5 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
L-Iżvezja	Merck Sharp & Dohme PO Box 581 2003 PC Haarlem The L-Olanda	Cozaar Comp 100 mg/12,5 mg film drageer tabletter		100 mg losartan potassium - 12,5 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq

L-Izvezja	Merck Sharp & Dohme PO Box 581 2003 PC Haarlem The L-Olanda	Cozaar Comp Forte 100 mg/25 mg filmdragerade tabletter	100 mg losartan potassium - 25 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
Ir-Renju Unit	Merck Sharp & Dohme Limited Hertford Road, Hoddesdon, Herts EN11 9BU, Ir-Renju Unit	COZAAR-COMP 50/12.5MG FILM COATED TABLETS	50 mg losartan potassium - 12,5 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
Ir-Renju Unit	Merck Sharp & Dohme Limited Hertford Road, Hoddesdon, Herts EN11 9BU, Ir-Renju Unit	COZAAR-COMP 100/25MG FILM COATED TABLETS	100 mg losartan potassium - 25 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
Ir-Renju Unit	Merck Sharp & Dohme Limited Hertford Road, Hoddesdon, Herts EN11 9BU, Ir-Renju Unit	COZAAR-Comp 100 mg/12.5 mg Pillola miksija b'ritas	100 mg losartan potassium - 12.5 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
L-Izlanda	Merck Sharp & Dohme PO Box 581 2003 PC Haarlem L-Olanda	COZAAR-COMP 50/12.5MG	50 mg losartan potassium - 12,5 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
L-Izlanda	Merck Sharp & Dohme PO Box 581 2003 PC Haarlem L-Olanda	COZAAR-COMP Forte	100 mg losartan potassium - 25 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
L-Izlanda	Merck Sharp & Dohme PO Box 581 2003 PC Haarlem L-Olanda	COZAAR-COMP 100/12.5MG	100 mg losartan potassium - 12,5 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
In-Norveġja	MSD BV Waarderweg 39 2031 BN Haarlem L-Olanda	Cozaar Comp	50 mg losartan potassium - 12,5 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq

In-Norveġja	MSD BV Waarderweg 39 2031 BN Haarlem L-Olanda	Cozaar Comp	100 mg losartan potassium - 12,5 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq
In-Norveġja	MSD BV Waarderweg 39 2031 BN Haarlem L-Olanda	Cozaar Comp Forte	100 mg losartan potassium - 25 mg hydrochlorothiazide	Pillola miksija b'rita	Jittiehed mill-halq

ANNESS II

**KONKLUŻJONIJIET XJENTIFIČI U RAĠUNIJIET GHAL EMENDA TAS-SOMMARJI
TAL-KARATTERISTIČI TAL-PRODOTT, TIKKETTA U FULJETT TA' TAGHRIF
IPPREŻENTATI MILL-EMEA**

KONKLUŻJONIJIET XJENTIFIČI

SOMMARJU TOTALI TA' L-EVALWAZZJONI XJENTIFIKA TA' COZAAR COMP. U ISMIJIET ASSOČJATI (ARA ANNESS I)

Cozaar Comp. u Cozaar Comp Forte (losartan/hydrochlorothiazide) ġew inklużi fil-lista ta' prodotti għall-armonizzazzjoni tas-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott (SPC) imfassal mis-CMD(h), b'mod konformi ma' l-Artikolu 30(2) tad-Direttiva 2001/83/KE, kif emendata. Minhabba d-deċiżjonijiet nazzjonali diverġenti meħudin minn Stati Membri fir-rigward ta' l-awtorizzazzjoni tal-prodotti msemmijin hawn fuq (u l-ismijiet assoċjati tagħhom), id-Danimarka nnotifikat lis-Segretarjat tas-CHMP/EMA b'referenza uffiċjali skond l-Artikolu 30 tad-Direttiva 2001/83/KE kif emendata sabiex jiġu solvuti diverġenzi fost SPCs awtorizzati fuq livell nazzjonali u b'hekk biex jiġu armonizzati SPCs diverġenti tagħha fl-UE kollha.

Losartan huwa antagonist tar-riċettur angiotensin II (Ang- II) attiv oralment li jahdem fuq is-sottotip ta' riċettur AT1, b'hekk jimblokka l-effett ta' Ang-II fil-kaskata tas-sistema ta' renin angiotensin (RAS). Hydrochlorothiazide (HCTZ) huwa diuretiku thiazide li intuża wkoll bħala mediċina kontra l-pressjoni għolja. L-azzjoni diuretika ta' HCTZ tnaqqas il-volum tal-plażma, b'zieda konsegwenti fl-attività ta' renin fil-plażma, zieda fit-tnixxija ta' aldosterone, zieda fit-telf mill-awrina ta' K⁺ u HCO₃, u tnaqqis ta' K⁺ fil-plażma.

L-oqsma ewlenin ta' nuqqas ta' armonija tas-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott eżistenti kienu sezzjoni 4.1 Indikazzjonijiet Terapewtiċi, sezzjoni 4.3 Kontra-indikazzjonijiet, u sezzjoni 4.4 Twissijiet Speċjali u Prekawżjonijiet għall-Użu.

Indikazzjonijiet Terapewtiċi (SPC sezzjoni 4.1)

- Kura ta' pressjoni għolja essenzjali f'pazjenti li l-pressjoni tad-demm tagħhom mhijiex ikkontrollata adegwament b'monoterapija ta' hydrochlorothiazide jew ta' losartan

L-effikaċja u s-sigurtà huma stabbiliti għall-indikazzjoni "kura ta' pressjoni għolja essenzjali f'pazjenti li l-pressjoni tad-demm tagħhom mhijiex ikkontrollata adegwament b'monoterapija ta' hydrochlorothiazide jew ta' losartan". Għaldaqstant, is-CHMP ikkunsidra li din hija indikazzjoni aċċettabbli.

- Bħala kura ta' l-ewwel għażla f'pazjenti bi pressjoni għolja moderata għal severa u f'pazjenti b'Ipertrofija Ventrikolari Xellugija għolja jew għolja hafna

Is-CHMP ikkonkluda li l-indikazzjoni għat-terapija inizjali għal pressjoni għolja bil-kombinazzjoni ta' doża fissa (FDC) m'għandhiex proporzjon benefiċċju-riskju pożittiv, u għaldaqstant mhijiex aċċettabbli.

It-tagħrif disponibbli ma jurix li terapija ta' l-ewwel għażla bl-FDC hija ta' vantaġġ meta mqabbla ma' approċċ pass pass fi hdan l-indikazzjoni approvata. Ma kien hemm l-ebda differenza rilevanti fin-numru ta' pazjenti bi pressjoni għolja severa li wriet effett ta' tnaqqis ta' BP matul l-ewwel 4 ġimgħat. Aktar minn 50% ta' dawg il-pazjenti li laħqu l-mira BP fuq l-FDC fi żmien 4 ġimgħat ma kellhomx bżonn ta' kombinazzjoni. Dawn il-pazjenti (9.4%) kien ikollhom kura eċċessiva fuq FDC fuq bażi fit-tul. Meta mqabbel ma' 8.2% biss tal-pazjenti li jistgħu jilħqu l-mira BP kemmxjejn aktar malajr meta mqabbla ma' approċċ pass pass, il-proporzjon bejn ir-riskju u l-benefiċċju huwa wieħed negattiv kemm għal pazjenti bi pressjoni għolja severa kif ukoll għal pazjenti bi pressjoni għolja hafifa għal moderata.

Minhabba li d-Detentur ta' l-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq (MAH) ma ssottomettix tagħrif biex juri popolazzjoni ċara li tista' tibbenifika mill-FDC fir-rigward ta' riżultat kardjovaskulari, il-benefiċċju/riskju ta' l-indikazzjoni fl-ewwel għażla jista' jkun iġvaletat u l-indikazzjoni mhijiex awtorizzata mis-CHMP.

- Tnaqqis fir-riskju ta' morbidità u mortalità kardjovaskulari f'pazjenti bi pressjoni għolja b'ipertrofija ventrikulari xellugija.

Waqt il-proċedura ta' referenza, il-MAH ippropona li tiġi emendata l-indikazzjoni li tissostitwixxi "morbidity u mortality kardjovaskulari" b'"attakk ta' puplesija". L-istudju LIFE ġie vvalutat fil-passat u dan wassal għar-reġistrazzjoni ta' l-indikazzjoni iktar estensiva, jiġifieri t-tnaqqis tal-morbidity u tal-mortality kardjovaskulari (kif imkejl in-bl-inċidenza kkumbinata ta' mewt kardjovaskulari (KV), attakk ta' puplesija u MI (attakk tal-qalb)) minflok ta' attakk ta' puplesija biss. Din hija l-indikazzjoni proposta fil-preżent mill-applikant u ġiet irregistrata fi 15-il Stat Membru ta' l-UE. Ir-raġuni għal din l-indikazzjoni iktar wiesgħa hija li l-istudju LIFE ma kienx studju kkontrollat bi placebo, li jistudja l-effett fuq attakk ta' puplesija biss meta mqabbel ma' placebo, iżda kien studju kkontrollat attivament, li qabbel kura kontra l-pressjoni għolja ibbażata fuq losartan ma' kura kontra l-pressjoni għolja ibbażata fuq atenolol permezz ta' l-użu ta' punt ta' tmiem primarju kompost ta' mewt KV, attakk ta' puplesija u MI. Dan il-punt ta' tmiem kompost jista' jittqies rappreżentattiv għal morbidità u mortalità KV, u ġie tradott f'din l-indikazzjoni f'hafna prodotti mediċinali li ġew diskussi fis-CHMP (per eżempju, statins).

Fiz-żmien ta' l-istudju, imblokkar-beta wahdu, jew f'kombinazzjoni ma' diuretiċi wera li jnaqqas ir-rati ta' hafna episodji KV bi 15-45%. Fl-istudju LIFE kien innotat benefiċċju addizzjonali fir-rigward ta' attakk ta' puplesija għall-istrategija bbażata fuq losartan, u l-effetti kienu simili fir-rigward tal-mortality MI u KV. Dan jindika li l-effett ta' benefiċċju muri ta' l-imblokkar-beta fuq il-morbidity u l-mortality KV in ġenerali kien ukoll preżenti għal losartan.

Minn dak iż-żmien 'l hawn, l-effett ta' benefiċċju ta' atenolol fir-rigward tal-morbidity u tal-mortality ġie ddubit. Opinjoni reċenti fil-BMJ turi li l-effett preventiv ta' atenolol fuq l-attakk ta' puplesija huwa iktar baxx milli għal mediċini oħrajn kontra l-pressjoni għolja; RR ta' 1.26 (95%CI: 1.15 sa 1.38). B'konsegwenza ta' dan, it-tnaqqis fir-riskju osservat ta' 25% b'losartan meta mqabbel ma' atenolol iġib l-effett protettiv ta' losartan fuq l-attakk ta' puplesija fl-istess medda ta' mediċini oħrajn kontra l-pressjoni għolja.

Għaldaqstant, l-indikazzjoni proposta kienet ikkunsidrata approvabbli wara vot ta' maġġoranza mill-plenum tas-CHMP u hija appoġġjata bil-formolazzjoni li ġejja: "tnaqqis ta' riskju ta' attakk ta' puplesija f'pazjenti bi pressjoni għolja b'ipertrofija ventrikulari xellugija, iddokumentata b'ECG", il-kunsiderazzjonijiet li ġejjin japplikaw għall-FDC:

Is-CHMP kien imhasseb li ma hemm l-ebda evidenza li tappoġġja kull waħda miż-żewġ sustanzi f'Cozaar Comp (losartan u HCTZ) billi kellu kontribuzzjoni ddokumentata għall-indikazzjoni kklejmjata kif meħtieġa mill-*NfG fuq prodotti ta' kombinazzjoni ta' doża fissa*. Fil-grupp losartan 44% tal-pazjenti rċievu HCTZ, fil-grupp ta' atenolol 38%. Il-MAH ma pprovdix tagħrif li juri li dawklil-pazjenti li jkunu qegħdin jirċievu HCTZ kellhom vantaġġ kliniku fir-rigward ta' punti ta' tmiem kliniċi meta mqabbla ma' dawklil ma jkunux qegħdin jirċievu HCTZ. Il-MAH kien mitlub jipprovdix tagħrif fuq is-sigurtà u l-effikaċja għal dawn is-sottogruppi ta' pazjenti (Losartan, Atenolol, Losartan + HCTZ, Atenolol + HCTZ) sabiex jifhem aħjar il-kontribuzzjoni ta' HCTZ fir-rigward tal-proporzjon ta' benefiċċju riskju totali. Barra minn hekk, indikazzjoni ta' prevenzjoni għal HCTZ wahdu, ibbażata fuq id-dejta LIFE mhijiex ikkunsidrata approvabbli.

Għaldaqstant, is-CHMP ikkunsidra li l-benefiċċju riskju għall-indikazzjoni Tnaqqis fir-riskju ta' morbidità u mortalità kardjovaskulari (jew riskju ta' attakk ta' puplesija) f'pazjenti bi pressjoni għolja b'ipertrofija ventrikulari xellugija hija negattiva u din l-indikazzjoni mhijiex aċċettabbli għall-FDC.

Sezzjoni 4.3 Kontra-indikazzjonijiet

Is-CHMP ikkunsidra li l-kontra-indikazzjonijiet li ġejjin għandhom ikunu inklużi fl-SPC fl-MSs kollha: Indeboliment sever tal-kliwi; Disturbi ta' l-elettroliti bħal ma huma iponatremija, ipokalemija, iperkalcemija; Iperuriċemija; Tqala u treddiġ; defiċjenza ta' lactose LAPP; Indeboliment tal-fwied; Marda ta' Addison. Diment li l-grupp pedjatriku ta' qsim tax-xogħol għadu għaddej, hidma definittiva tista' tkun implimentata biss fir-rigward ta' studji fi tfal u adolexxenti wara li l-proċedura tkun ġiet iffinalizzata.

Sezzjoni 4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu:

Is-CHMP ikkunsidra li t-twissijiet li ġejjin hteġu li jkunu nklużi fl-SPC fl-Istati Membri kollha: Emodijalizi; Pazjenti suwed; Mard valvulari ostruttiv; Kirurgija/anestesija. Diment li l-grupp pedjatriku ta' qsim tax-xogħol għadu għaddej, hidma definittiva tista' tkun implimentata biss fir-rigward ta' studji fi tfal u adolexxenti wara li l-proċedura tkun giet iffinalizzata.

Tqala u Treddigh

Is-CHMP qies li t-test li jikkonċerna t-tqala u t-treddigh fl-SPC (sezzjonijiet 4.3, 4.4 u 4.6) jehtieg li jiġi emendat biex jinkludi l-effett tar-rapport PhVWP fuq Impedituri ACE u fuq antagonisti tar-ricetturi angiotensin II (AIIRAs) u rakkomandazzjonijiet fuq l-użu waqt l-ewwel trimestru tat-tqala (EMA/CHMP/PhVWP/474692/2007). It-Tqala u Treddigh għandhom ikunu kontraindikati u l-formolazzjoni addattata għandha tiġi inkluża fis-sezzjonijiet 4.3, 4.4 u 4.6 ta' l-SPC, u fis-sezzjonijiet rilevanti tal-Fuljett ta' Tagħrif.

RAĠUNIJIET GĦAL EMENDA TAS-SOMMARJI TAL-KARATTERISTIČI TAL-PRODOTT, TIKKETTA U FULJETT TA' TAGĦRIF

Billi

- l-iskop tar-referenza kien l-armonizzazzjoni tas-Sommarji tal-Karatteristiċi tal-Prodott, tikketti u fuljetti ta' tagħrif.

- is-Sommarji tal-Karatteristiċi tal-Prodott, tikketti u fuljetti ta' tagħrif proposti mid-Detenturi ta' l-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq ġew ivvalutati abbażi tad-dokumentazzjoni sottomessa u d-diskussjoni xjentifika fi hdan il-Kumitat,

- is-CHMP ikkonkluda li l-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq tista' tkun armonizzata fuq l-indikazzjonijiet li ġejjin:

- Kura ta' pressjoni għolja f'pazjenti li l-pressjoni tad-demem tagħhom mhijiex ikkontrollata adegwament b'losartan jew b'hydrochlorothiazide.

- is-CHMP ikkonkluda li t-tagħrif mhuwiex ta' appoġġ għall-indikazzjonijiet li ġejjin u għaldaqstant għandu jitnehha mill-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq:

- bhala kura ta' l-ewwel għazla f'pazjenti bi pressjoni għolja moderata sa severa u f'pazjenti b'riskju kardjovaskulari għoli jew għoli hafna.
- tnaqqis fil-morbidità u mortalità kardjovaskulari (jew riskju ta' attakk ta' puplesija) f'pazjenti bi pressjoni għolja b'ipertrofija ventrikolari xellugija.

- It-Tqala u Treddigh għandhom ikunu kontro-indikati u l-formolazzjoni addattata għandha tiġi inkluża f'sezzjonijiet 4.3, 4.4 u 4.6 tal-SPC, u fis-sezzjonijiet rilevanti tal-Fuljett ta' Tagħrif.

Is-CHMP irrakkomanda l-emenda ta' l-Awtorizzazzjonijiet għat-Tqegħid fis-Suq, li s-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott, tikketta u fuljett ta' tagħrif għalihom huma stabbiliti fl-Anness III għal Cozaar Comp. u l-ismijiet assoċjati (ara l-Anness I).

ANNESS III

SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT, TIKKETTA, FULJETT TA' TAGHRIF

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Cozaar Comp u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 50 mg/12.5 mg pilloli miksijin b'rita
Cozaar Comp u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 100 mg/12.5 mg pilloli miksijin b'rita
Cozaar Comp u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 100 mg/25 mg pilloli miksijin b'rita

[Sabiex jiġi implimentat fil-pajjiż]

2. GHAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Cozaar Comp 50 mg/12.5 mg

Kull pillola fiha 50 mg losartan (bħala mluha ta' potassju) u 12.5 mg hydrochlorothiazide (HCTZ) bħala s-sustanzi attivi.

Cozaar Comp 100 mg/12.5 mg

Kull pillola fiha 100 mg losartan (bħala mluha ta' potassju) u 12.5 mg hydrochlorothiazide (HCTZ) bħala s-sustanzi attivi.

Cozaar Comp 100 mg/25 mg

Kull pillola fiha 100 mg losartan (bħala mluha ta' potassju) u 25 mg hydrochlorothiazide (HCTZ) bħala s-sustanzi attivi.

Sustanza mhux attiva:

Cozaar Comp 50 mg/12.5 mg

Kull pillola 63.13 mg lactose monohydrate.

Cozaar Comp 100 mg/12.5 mg

Kull pillola 88.40 mg lactose monohydrate

Cozaar Comp 100 mg/25 mg

Kull pillola 126.26 mg lactose monohydrate

Għal-lista kompleta ta' sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1

[Sabiex jiġi implimentat fil-pajjiż]

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Pilloli miksijin b'rita.

Cozaar Comp 50 mg/12.5 mg

Pilloli miksijin b'rita ta' lewn isfar u f'għamla ovali u mmarkati b'717 fuq naħa waħda u b'xaqq jew mingħajr xaqq fuq in-naħa l-oħra.

Ix-xaqq qiegħed hemm biss biex jiffaċilita il-qsim tal-pillola meta wiehed jiġi biex jibla' u mhux biex wiehed jaqşam f'dozi ugwali.

Cozaar Comp 100 mg/12.5 mg

Pilloli miksijin b'rita ta' lewn abjad u f'għamla ovali u mmarkati b'745 fuq naħa waħda u mingħajr xaqq fuq in-naħa l-oħra.

Cozaar Comp 100 mg/25 mg

Pilloli miksijin b'rita ta' lewn isfar ċar f'għamla ovali u mmarkati b'745 fuq naħa waħda u mingħajr marka fuq in-naħa l-oħra.

[Sabiex jiġi implimentat fil-pajjiż]

4. TAGHRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Cozaar Comp huma indikati għat-trattament ta' pressjoni essenzjali għolja f'pazjenti li l-pressjoni tad-demmi tagħhom mhix ikontrollata sew b'losartan jew b'hydrochlorothiazide waħedhom.

4.2 Pożoloġija u metodu ta' kif għandu jingħata

Cozaar Comp jista' jingħata ma' mediċini oħra ta' kontra l-pressjoni għolja.

Cozaar Comp għandhom jinbelghu ma' tazza ilma.

Cozaar Comp jistgħu jittiehdu ma' l-ikel jew fuq stonku vojta.

Pressjoni għolja

Losartan u hydrochlorothiazide m'għandhomx jintużaw bħala t-terapija inizjali, imma f'pazjenti li l-pressjoni tad-demmi tagħhom mhix ikkontrollata b'mod adegwat b'losartan potassium jew hydrochlorothiazide waħedhom.

Titrazzjoni tad-doża bil-komponenti individwali (losartan u hydrochlorothiazide) huwa rakkomandat.

Meta klinikament xieraq, bidla diretta mill-monoterapija għal kombinazzjoni fissa għandha tiġi kkonsiderata f'pazjenti li l-pressjoni tad-demmi tagħhom mhix kontrollata b'mod adegwat.

Id-doża inizjali u ta' manteniment ta' Cozaar Comp hi ta' pillola waħda ta' Cozaar Comp 50 mg/12.5 mg (50 mg losartan/12.5 mg HCTZ) darba kuljum. Għal pazjenti li ma jirrispondux b'mod adegwat għal Cozaar Comp 50 mg/12.5 mg, id-doża tista' tiżdied għal pillola ta' Cozaar Comp 100 mg/25 mg (100 mg losartan/25 mg HCTZ) darba kuljum. Id-doża massima hi ta' pillola waħda ta' Cozaar Comp 100 mg/25 mg darba kuljum. B'mod ġenerali, l-effett mixtieq kontra l-pressjoni għolja jiehu tliet ġimgħat mill-bidu tat-terapija biex jintlahaq. Cozaar Comp 100/12.5 (100 mg losartan/12.5 mg HCTZ) huwa disponibbli għal dawki il-pazjenti li ġew iddożati għal 100 mg ta' Cozaar li jehtieġu kontroll addizzjonali għal pressjoni tad-demmi tagħhom.

L-użu f'pazjenti b'indeboliment renali u emodijalizi:

L-ebda aġġustament fid-doża mhux meħtieġ għal pazjenti li għandhom indeboliment renali moderat (i.e. tneħħija ta' kreatinina 30-50 ml/min). Il-pilloli losartan u hydrochlorothiazide m'humiex rakkomandati għal pazjenti b'emodijalizi. Il-pilloli losartan/HCTZ m'għandhomx jintużaw f'pazjenti b'indeboliment renali sever (i.e. tneħħija ta' kreatinina <30 ml/min) (ara sezzjoni 4.4).

L-użu f'pazjenti bi żvojtat ta' volumi intravaskulari:

Il-volum u/jew l-iżvojtat ta' sodju għandu jiġi kkoreġut qabel l-ghoti ta' pilloli ta' losartan/HCTZ.

L-użu f'pazjenti b'indeboliment epatiku

Losartan/HCTZ huwa kontra-indikat f'pazjenti li għandhom indeboliment epatiku sever (ara sezzjoni 4.3).

L-użu fl-anzjani

Aġġustament fid-doża ġeneralment mhux meħtieġ fl-anzjani.

L-użu fi tfal u adoloxxenti (< 18-il sena)

M'hemmx esperjenza klinika fi tfal u adoloxxenti. Għalhekk, losartan/hydrochlorothiazide m'għandux jiġi amministrat fi tfal u adoloxxenti.

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

- Sensittività eċċessiva għal losartan, sustanzi derivati minn sulphonamides (bħal hydrochlorothiazide) jew għal xi sustanzi mhux attivi

- Ipokalemja jew iperkalcemija rezistenti għat-terapija
- Iponatremja rifrattorja
- Iperuriċemija/gotta rifrattorja
- It-2ni u t-2et trimestru tat-tqala (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.6)
- Treddigh (ara sezzjoni 4.6)
- Indeboliment renali sever (i.e tnehhija ta' kreatinina < 30 ml/min)
- Anurja.

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Losartan

Anġiodema

Pazjenti bi storja ta' anġiodema (nefha fil-wiċċ, ix-xofftejn, il-grizmejn, u /jew l-ilsien) għandhom jiġu monitorati mill-qrib (ara sezzjoni 4.8).

Pressjoni Baxxa u żvojtjar ta' volumi intravaskulari:

Pressjoni sintomatika baxxa, speċjalment wara l-ewwel doża, tista' issehh f'pazjenti li għandhom volum imnaqas u/jew żvojtjar ta' sodju minhabba terapija diuretika vigoruża, mluha dijetetiċi restritti, dijarea jew remettar. Kundizzjonijiet bħal dawn għandhom jiġu kkoreġuti qabel l-għoti ta' pilloli ta' Cozaar Comp (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.3).

Żbilanċi elettrolitiċi:

Żbilanċi elettrolitiċi huma komuni f'pazjenti b'indeboliment renali, bi jew minghajr dijabete, u għandhom jiġi indirizzati. Għalhekk, il-valuri tal-konċentrazzjonijiet ta' potassju u tat-tnehhija ta' kreatinina fil-plażma għandhom jiġu sorvelljati mill-qrib; speċjalment f'pazjenti b'insuffiċjenza kardijaka u bi tnehhija ta' kreatinina ta' bejn 30-50 ml/min.

L-użu konġunt ta' diuretiki li ma jinkoraġixxux it-tehid ta' potassju, supplimenti ta' potassju u sostituti mluha li fihom il-potassju ma' losartan mhumiekk rakkomandati (ara sezzjoni 4.5)

Indeboliment fil-funzjoni tal-fwied:

Minn tagħrif farmakokinetiku li juri konċentrazzjonijiet sinifikament oghla fil-plażma ta' losartan f'pazjenti b'ċirrosi, Cozaar Comp għandu jintuża b'kawtela f'pazjenti li għandhom storja ta' indeboliment epatiku minn hafif sa moderat. M'hemmx esperjenza terpewtika b'losartan f'pazjenti b'indeboliment epatiku sever. Għalhekk Cozaar Comp huwa kontra-indikat f'pazjenti b'indeboliment epatiku sever (ara sezzjonijiet 4.2, 4.3 u 5.2).

Indeboliment tal-funzjoni tal-kliwi:

Bħala konsegwenza ta' l-impediment tas-sistema renin-angiotensin, bidliet fil-funzjoni renali li jinkludi insuffiċjenza renali ġew irrapportati (b'mod partikolari f'pazjenti li l-funzjoni renali tagħhom tiddependi fuq is-sistema ta' renin angiotensin aldosterone bħal daww li għandhom insuffiċjenza kardijaka severa jew disturbji fil-funzjonament renali li kienu jeżistu minn qabel).

Bħal fil-każ ta' mediċini oħra li jaffettwaw is-sistema renin-angiotensin-aldosterone, zieda ta' l-urea fid-demm u fil-kreatinina fis-serum ġew irrapportati wkoll f'pazjenti bi stenosi bilaterali ta' l-arterja renali jew stenosi ta' l-arterja għal kilwa waħda. Dawn il-bidliet fil-funzjoni renali jistgħu jkunu reversibbli mal-waqfien tat-terapija. Losartan għandu jintuża b'kawtela f'pazjenti li għandhom stenosi bilaterali ta' l-arterja renali jew stenosi ta' l-arterja għal kilwa waħda.

Trapjant tal-kliwi

Għad mhemmx esperjenza f'pazjenti li kellhom trapjant tal-kliwi riċenti.

Iperaldosteroniżmu primarju

Pazjenti b'aldosteroniżmu primarju ġeneralment mhux ser jirrispondu għal mediċini ta' kontra l-pressjoni li jaġixxu b'impediment fuq is-sistema renin-angiotensin. Għalhekk, it-tehid ta' pilloli ta' Cozaar Comp mhuwieg rakkomandat.

Mard tal-qalb koronarju u mard ċerebrovaskulari

Bħal fil-każ ta' mediċini ta' kontra l-pressjoni ohra, tnaqqis fil-pressjoni ta' demm eċċessiva f'pazjenti b'mard kardjovaskulari u ċerebrovaskulari iskaemiku jistgħu jirriżultaw f'infart mijokardjaku jew puplesija.

Insuffiċjenza tal-qalb:

F'pazjenti li għandhom insuffiċjenza tal-qalb, bi jew minghajr indeboliment renali - bħal fil-każ ta' mediċini ohra li jaħdmu fuq is-sistema renin-angiotensin - hemm riskju ta' pressjoni baxxa fl-arterji severa, u indeboliment renali (ta' spiss akuta).

Stenosi tal-valv aortiku u mitrali, kardjomijopatija ipertrofika ostruttiva.

Bħal fil-każ ta' vażodilaturi ohra, kawtela speċjali hija indikata f'pazjenti li jbatu minn stenosi aortika jew mitrali jew kardjomijopatija ipertrofika ostruttiva.

Differenzi etniċi:

Kif kien osservat għal impedituri ta' enzimi li jikkonvertu angiotensin, losartan u l-antagonisti ohra ta' angiotensin jidhru li huma inqas effettivi biex ibaxxu l-pressjoni għolja f'persuni suwed milli f'persuni mhux suwed, possibbilment minhabba l-prevalenza oghla ta' stati baxxi ta' renin fil-popolazzjoni sewda li tbatu bi pressjoni għolja

Tqala

Cozaar Comp m'għandux jinbeda waqt it-tqala. Għajr meta t-tkomplija ta' t-terapija b'losartan/HTCZ hija kkonsidrata essenzjali, pazjenti li qeghdin jippjanaw tqala għandhom jinqelbu fuq terapija alternattiva ta' kontra l-pressjoni għolja li għandha profil tas-sigurtà stabbilit għal użu fi tqala. Meta tqala tiġi dijanjonizzata, it-trattament b'Cozaar Comp għandu jitwaqqaf immedjatament, u jekk jixraq, terapija alternattiva għandha tinbeda (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.6).

Hydrochlorothiazide

Pressjoni baxxa u l-iżbilanċ ta' l-elettroliti/fluwidu

Bħal fil-każijiet kollha ta' terapija għal pressjoni għolja, il-pressjoni sintomatika baxxa tista' ssehh f'xi pazjenti. Il-pazjenti għandhom jiġu osservati għal sinjali kliniċi ta' zbilanċ fil-fluwidu jew elettroliti, e.g., żvojtjar ta' volum, iponatremja, alkalosi ipokloremika, ipomagnesemja jew ipokalemja li jistgħu jsehhu fl-istess waqt ta' dijarea jew rimettar. Determinazzjoni perijodika ta' l-elettroliti fis-serum għandhom isiru f'intervalli xierqa f'xi pazjenti. F'temp shun jista' jkun hemm dilwazzjoni ta' iponatremja dilwita f'pazjenti b'edema

Effetti metabolici u endokrinali

It-terapija b'thiazides tista' timpedixxi t-tolleranza għal glukosju. Għandu mnejn ikun mehtieg aġġustament fid-doża tal-mediċini ta' kontra d-dijabete (ara sezzjoni 4.5). Dijabete melittus mistura tista' tiġi manifestata waqt terapija b'thiazides.

Thiazides għandhom mnejn inaqqsu l-eliminazzjoni awrinarja tal-kalcju u jistgħu jikkaġunaw il-kalcju fis-serum joghla b'mod għaddien. Iperkalcemja notevoli tista' tkun xhieda ta' iperparatajrojdizmu mistur. Thiazides għandhom jiġu mwaqqfa qabel ma jsiru testijiet għal funzjoni tal-paratajrojd.

Żidied fil-livelli ta' kolesterol u trigliceridi jistgħu jkunu assoċjati ma' terapija dijuretika ta' thiazides.

It-terapija b'thiazide tista' tippreċipita l-iperuriċemja u/jew il-gotta f'ċertu pazjenti. Peress li losartan inaqqas l-aċidu uriku, losartan flimkien ma' hydrochlorothiazide jimmodera l-iperuriċemja sensitizzata bid-dijuretiku.

Indeboliment epatiku:

It-thiazides għandhom jintużaw b'kawtela f'pazjenti b'funzjoni epatika indebolita jew mard tal-fwied progressiv, peress li bidliet żgħar fil-bilanċ ta' fluwidi u elettroliti jistgħu jippreċipitaw f'koma

epatika.

Cozaar Comp mhux rakkomandat għal pazjenti li għandhom indeboliment epatiku sever (ara sezzjoni jiet 4.3 u 5.2).

Ohrajn

F'pazjenti li qed jirċievu thiazides, reazzjonijiet ta' sensitività eċċessiva jistgħu jsehhu f'pazjenti bi jew mingħajr storja ta' allergija jew aźma bronkjali. It-tharrix jew l-attivazzjoni ta' lupus eritematosi sistematika ġie rapportat bl-użu ta' thiazides.

Sustanza mhux attiva

Pazjenti bi problemi ereditarji rari ta' intolleranza ta' gallatosju, id-defiċjenza ta' Lapp lactase jew problemi bl-assorbiment ta' glukosju-gallatosju m'għandhomx jiehdu din il-medicina. (Ara sezzjoni 6.1).

4.5 Prodotti mediċinali ohra li ma jaqblux ma' dan il-prodott u affarjiet ohra li jistgħu jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott

Losartan

Rifampicin u fluconazole ġew rapportati li jnaqqsu l-livell tal-metabolit attiv. Il-konsegwenzi kliniċi ta' dawn l-effetti ma ġewx evalwati.

Bħal fil-każ ta' mediċini ohra li jimpedixxu angiotensin II jew l-effetti tiegħu, l-użu fl-istess ħin ta' mediċini ohra li jirstringu t-tnixxija ta' potassju (eż. spironolactone, triamteren, amiloride,) supplimenti tal-potassju jew sostituti ta' l-imluha li fihom il-potassju jistgħu jwasslu għal żieda tal-potassju fis-serum. L-ghoti ta' mediċini bħal dawn mhux rakkomandat.

Bħal mediċini ohra li jaffettwaw l-eliminazzjoni ta' sodju, l-eleiminazzjoni ta' litju jista' jtnaqqas. Għalhekk livelli ta' litju fis-serum għandhom jiġu monitorati bir-reqqa jekk mluha tal-litju jingħataw flimkien ma' riċettaturi antagonisti ta' angiotensin II.

Meta antagonisti ta' angiotensin II jiġu amministrati b'mod simultaneju ma' NSAIDs (i.e. impedituri silettivi ta' COX-2, acetylsalicylic acid f'dożi ta' kontra l-infjammazzjoni) u NSAIDs mhux silettivi, jista' jkun hemm attenwazzjoni ta' l-effett kontra l-pressjoni għolja. F'pazjenti li kellhom disturbi renali batuti li kienu jeżistu minn qabel, l-ghoti flimkien ta' antagonisti ta' angiotensin II jew dijuretiċi u NSAIDs jistgħu jwasslu sabiex il-funzjoni renali tmur għall-agħar, inkluż il-possibilità ta' insuffiċjenza renali, u żieda fil-livell ta' potassju fis-serum. Il-kombinazzjoni għandha tingħata b'kawtela, speċjalment fl-anzjani. Il-pazjenti għandhom ikunu idrati sew u konsiderazzjoni għandha tingħata għal monitoraġġ tal-funzjoni renali wara l-bidu tat-terapija konkomitanti, u perijodikament wara dan.

F'xi pazjenti bil-funzjoni tal-kliewi compromessa li qed jiġu trattati wkoll b'mediċini mhux steroidi ta' kontra l-infjammazzjoni, li jinkludu impedituri cyclooxygenase-2 silettivi, l-amministrazzjoni flimkien ta' antagonisti għar-riċettaturi ta' angiotensin II jista' jirriżulta f'deterjorazzjoni akbar fil-funzjoni renali. Dawn l-effetti huma ġeneralment reversibbli.

Sustanzi ohra li jissensitizzaw l-pressjoni baxxa bħal mediċini kontra d-dipressjoni triċikliċi, antipsikotiċi, baclofene, amifostine. Użu konkomitanti ma' dawn il-mediċini li jnaqqsu l-pressjoni tad-demm, bħala l-effett prinċipali jew l-effett kollaterali jistgħu jżidu r-riskju għal pressjoni baxxa.

Hydrochlorothiazide

Meta jingħata flimkien ma' mediċini ohra, il-mediċini li ġejjin jistgħu jaffettwaw id-dijuretiċi ta' thiazide:

Alkoħol, barbiturati, narkotiċi jew mediċini ta' kontra d-dipressjoni:

Jista' jkun hemm riskju akbar ta' ipotensjoni ortostatika.

Mediċini kontra d-dijabete (mediċini orali u insulina):

It-trattament b'dożi għoljin ta' thiazides jistgħu jinfluwenza t-tolleranza ta' glukosju. Għandu mnejn ikun meħtieġ aġġustament fid-doża tal-mediċina ta' kontra d-dijabete. Metformin għandu jintuża b'kawtela minhabba r-riskju ta' aċidosi lattika sensitizzata bil-possibilità ta' insuffiċjenza renali funzjonali marbuta ma' hydrochlorothiazide.

Mediċini oħra ta' kontra l-pressjoni:

Effett addittiv.

Reżini ta' cholestyramine u colestipol:

L-assorbiment ta' hydrochlorothiazide jiġi impedit fil-preżenza ta' reżini ta' skambju anijoniċi. Dożi waħdanin jew ta' reżini ta' cholestyramine jew ta' colestipol jintrabtu ma' hydrochlorothiazide u jnaqqsu l-assorbiment mill-passaġġ gastro-intestinali b'madwar 85 u 43 fil-mija, rispettivament.

Kortikosteroidi, ACTH

Żvojtjar elettrolitiku intensifikat, partikolarment ipokalemja.

Amini pressors (eż., adrenalina)

Possibilità ta' rispons imnaqqas għal amini pressor imma mhux biżżejjed biex jevita l-użu tagħhom.

Sustanzi li jirrilassaw il-muskoli skelettriċi, mhux depolarizzanti (eż. tubocurarine)

Rispons possiblament oġġla għas-sustanza li tirrilassa l-muskolu.

Litju

Mhux rakkomandat l-użu kongunt ta' mediċini diuretiki li jnaqqsu t-tneħħija renali ta' litju u jgħollu r-riskju ta' tossiċità ta' litju.

Prodotti mediċinali użati fit-trattament ta' gotta (probenecid, sulfipyrazone u allopurinol)

Aġġustament fid-doża ta' prodotti mediċinali urikosuriċi jista' jkun meħtieġ peress li hydrochlorothiazide jista' jgħolli l-livell ta' l-aċidu uriku fis-serum. Żieda fid-doża ta' probenecid jew sulfipyrazone jista' jkun meħtieġ. L-għoti kongunt ta' thiazide jista' jgħolli l-inċidenza ta' reazzjonijiet ta' sensittività eċċessiva għal allopurinol.

Sustanzi antikolinergiċi (eż. atropine, biperiden)

Żieda fil-bijodisponibilità ta' diuretiki tat-tip thiazide bi tnaqqis ta' motilità gastro-intestinali u firrata ta' l-iżvojtjar ta' l-istonku.

Sustanzi ċitotossiċi (eż. cyclophosphamide, methotrexate)

Thiazides jistgħu jnaqqsu l-eliminazzjoni mill-kliewi ta' prodotti mediċinali ċitotossiċi u jharrxu l-effetti majelosuppressivi tagħhom.

Salicylates

F'każ ta' dożi għoljin ta' salicylates, hydrochlorothiazide jista' jharrax l-effetti tossiċi ta' salicylates fuq is-sistema nervuża ċentrali.

Methyldopa

Kien hemm rapporti iżolati ta' anemija emolitika li sehhet meta hydrochlorothiazide u methyldopa ngħataw flimkien.

Cyclosporine

Trattament flimkien ma' cyclosporine jista' jżid ir-riskju għal iperurikemija u kumplikazzjonijiet tat-tip tal-gotta.

Glikoċidi ta' digitalis

Ipokalemija jew ipomagnesemja sensitizzati b'thiazide jistgħu jifavorixxu l-bidu ta' aritmiji kardijaċi indotti b'digitalis

Prodotti mediċinali affettwati b'disturbi tal-potassju fis-serum

Monitoraġġ perijodiku għal potassju fis-serum u ECG huma rakkomandati meta Losartan/hydrochlorothiazide jiġu mogħtija ma' prodotti mediċinali affettwati b'disturbi ta' potassju fis-serum (eż. glikoċidi ta' digitalis u mediċini anti-arritmiċi) u bit-torsades de pointes li ġejjin (takikardja ventrikulari) tal-prodotti mediċinali li jissensitizzaw (li jinkludu xi anti-arritmiċi), l-ipokalemja tkun fattur ta' riskju għal torsades de pointes (takikardja ventrikulari):

- Antiarritmiċi ta' Klassi Ia (eż. quinidine, hydroquinidine, disopyramide).
- Antiarritmiċi ta' Klassi III (eż. amiodarone, sotalol, dofetilide, ibutilide).
- Xi antipsikotiċi (eż. thioridazine, chlorpromazine, levomepromazine, trifluoperazine, cyamemazine, sulpiride, sultopride, amisulpride, tiapride, pimozide, haloperidol, droperidol).
- Ohrajn (eż. bepridil, cisapride, diphemanil, erythromycin IV, halofantrin, mizolastin, pentamidine, terfenadine, vincamine IV).

Mluha tal-kalċju

Id-dijuretiċi ta' thiazide jistgħu jgħollu l-livell ta' kalċju fis-serum minhabba tnaqqis fl-eliminazzjoni. Jekk supplimenti tal-kalċju għandhom jiġu preskritti, il-livelli ta' kalċju fis-serum għandhom jiġu monitorati u d-doża ta' kalċju għandha tiġi aġġustata skond dan.

Interazzjonijiet tal-mediċina/testijiet tal-laboratorju

Minhabba l-effetti tagħhom fuq il-metaboliżmu tal-kalċju, thiazides jistgħu jinterferixxu ma' testijiet għal funzjoni tal-paratirojde (ara sezzjoni 4.4).

Carbamazepine

Riskju ta' iponatremja sintomatika. Monitoraġġ kliniku u bijoloġiku meħtieġ.

Medja ta' Kuntrast bil-Jodju

F'każ ta' deidrazzjoni sensitizzata b'dijuretiku, hemm riskju oġġla ta' insuffiċjenza renali akuta, speċjalment b'dozi għoljin tal-prodott jodiku.

Il-pazjenti għandhom jiġu idrati mill-ġdid qabel l-ġħoti.

Amphotericin B (parenterali), kortikosteroids, ACTH jew purganti stimulant

Hydrochlorothiazide għandu mnejn jintensifika l-iżbilanċ elettrolitiku, b'mod partikolari l-ipokalemija

4.6 Tqala u Tredidigh

Tqala

L-użu ta' Cozaar Comp mhux rakkomandat waqt l-ewwel tliet xhur ta' tqala (ara sezzjoni 4.4). L-użu ta' Cozaar-Comp hu kontra-indikat waqt it-2ni u t-3et tliet xhur ta' tqala (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.4). Evidenza epidemjoloġika dwar ir-riskju ta' teratoġenicità wara espożizzjoni għal impedituri ACE waqt l-ewwel tliet xhur ta' tqala għadha mhix konklusiva; madankollu żieda żgħira fir-riskju ma tistax tiġi eskluża. Filwaqt li m'hemmx dejta epidemjoloġika b'kontrolli fuq ir-riskju b'Impedituri għar-Ricettaturi ta' Angiotensin II (AIIRAs), riskji simili jistgħu jeżistu għal din il-klassi ta' mediċini. Għajr meta tkompli bit-terapija b'ARB hi konsiderata essenzjali, pazjenti li jippjanaw tqala, għandhom jinqalbu fuq trattamenti alternattivi ta' kontra l-pessjoni li għandhom profil ta' sigurtà stabbilit għal użu fi tqala. Meta tqala tiġi dijanjonizzata, it-trattament b'Cozaar Comp għandu jitwaqqaf immedjatament, u jekk jixraq, terapija alternattiva għandha tinbeda. L-espożizzjoni għat-terapija b'Cozaar Comp waqt it-tieni u t-tielet trimestri hi magħrufa li tinduċi tossicità fil-fetu uman (tnaqqis fil-funzjoni tal-kliwi, oligohidramnios, dewmien għal ossifikazzjoni tal-kranju) u tossicità lit-tarbija għadha titwieled (insuffiċjenza renali, pressjoni baxxa, iperkalemja) (ara wkoll 5.3 'Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina').

Jekk l-espozizzjoni għal Cozaar-Comp tkun seħhet mit-tieni xahar ta' tqala, verifiċi bl-ultrasawnd għal funzjoni renali u l-kranju huma rakkomandati.

Trabi li ommhom tkun ħadet Cozaar Comp għandhom jiġu osservati għal pressjoni baxxa (ara wkoll sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

Hydrochlorothiazide għandu jnaqqas kemm il-volum ta' plazma kif ukoll il-fluss uteroplacentali tad-dem. Thiazides jgħaddu mis-sekonda u jinsabu wkoll fid-dem tal-kurdun. Jistgħu jgħolqu disturbi elettrolitiċi fetali u possibilmint reazzjonijiet ohra li ġew osservati f'adulti. Każijiet ta' tromboċitopenija fi trabi għadhom jitwiellu u suffejra fetali jew fi trabi għadhom jitwiellu ġew rapportati wara li ommijiet ġew ittrattati b'thiazides.

Treddigh

Mhux magħruf jekk losartan jiġix eliminat fil-halib ta' l-omm. Madankollu losartan huwa eliminat fil-halib ta' firien qegħdin iredgħu. Thiazides jgħaddu fil-halib tal-bniedem u jistgħu jimpedixxu t-treddigh. Minhabba l-potenzjal għal effetti avversi fuq it-trabi mreda', Cozaar Comp hu kontra-indikat waqt it-treddigh (ara sezzjoni 4.3).

4.7 Effetti fuq il-hila biex issuq u thaddem magni

Ma sarux studji dwar l-effetti fuq il-hila biex issuq jew thaddem magni. Madankollu, meta wiehed issuq vetturi jew ihaddem magni, wiehed għandu jzomm quddiem għajnejh li sturdamenti jew ngħas jistgħu isehħu ta' spiss meta wiehed jiehu terapija kontra l-pressjoni għolja, b'mod partikolari waqt il-bidu tat-tratament jew meta tiżdied id-doża.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Il-każijiet avversi t'hawn isfel huma klassifikati fejn jixraq skond il-klassi ta' l-organi tas-sistema u l-frekwenza skond il-konvenzjoni li ġejja:

Komuni ħafna: $\geq 1/10$
Komuni: $\geq 1/100, < 1/10$
Mhux komuni: $\geq 1/1,000, \leq 1/100$
Rari: $\geq 1/10,000, \leq 1/1,000$
Rari ħafna: $\leq 1/10,000$
Mhux magħruf: $\leq 1/10,000$
(ma jistax jiġi stmat mit-tagħrif disponibbli)

Fi provi kliniċi bil-melh ta' losartan potassium u hydrochlorothiazide, ma ġewx osservati każijiet avversi partikolari għal din il-medicina kkombinata. Il-każijiet avversi kienu ristretti għal daww rapportati qabel b'losartan potassium u/jew hydrochlorothiazide.

Fi provi kliniċi b'kontrolli għal pressjoni essenzjali għolja, l-isturdament kien l-uniku każ avvers rapportat bħala relatat mas-sustanza li seħħ b'incidenza akbar minn placebo f'1% jew aktar ta' pazjenti trattati b'losartan u hydrochlorothiazide.

Barra dawn l-effetti, kien hemm aktar reazzjonijiet avversi relatati rapportati wara l-introduzzjoni tal-prodott fis-suq kid ġej:

Disturbi fil-fwied u fil-marrara

Rari: Epatite

Investigazzjonijiet

Rari: Iperkalemija, livell oġħal ta' ALT

Każijiet avversi addizzjonali li seħħew b'wiehed mill-komponenti individwali u li jista' jikkawża effetti avversi potenzjali b'losartan potassium/hydrochlorothiazide huma li ġejjin:

Losartan

Disturbi tad-demm u tas-sistema limfatika

Mhux komuni: anemija, purpura Henoch-Schönlein, eċċimosi, emolisi

Disturbi fis-sistema immuni

Rari: Reazzjonijiet anafilattiċi, angjodema, urtikarja

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

Mhux komuni: Anoreksja, gotta

Disturbi psikjatriċi

Komuni: Nuqqas ta' rqa

Mhux komuni: Ansjetà, Disturb dwar l-ansjetà, Disturb ta' paniku, konfużjoni, dipressjoni, holm abnormali, disturbi fl-irqad, hedla, memorja mfixxkla

Disturbi fis-sistema nervuża

Komuni: Uġiġħ ta' ras, sturdament

Mhux komuni: Nervozità, paraestesja, newropatija periferika, roġħda, emikranja, sinkope

Disturbi fl-ġhajnejn

Mhux komuni: Vista mċajpra, hruq/tingiż fl-ġhajn, konguntivite, tnaqqis fiċ-ċarezza tal-vista.

Disturbi fil-widnejn u fis-sistema labirintika

Mhux komuni: Vertġini, tinnite

Disturbi fil-qalb

Mhux komuni: Pressjoni baxxa, pressjoni baxxa malli tqum minn pożizzjoni ta' serħan, sternalġja, angina pectoris, grad II - blokk AV, każ ċerebrovaskulari, infart mijokardijaku, palpitazzjoni, aritmiji (fibrillazzjonijiet atrijsali, bradikardja tas-sinus, takikardja ventrikulari, fibrillazzjoni ventrikulari)

Disturbi vaskulari

Mhux komuni: Vaskulite

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali

Komuni: Sogħla, infezzjoni fil-passaġġ ta' fuq, kongestjoni nażali, sinusite, disturb fis-sinus

Mhux komuni: Skumdità faringeali, faringite, laringite, dispnea, bronkite, epistassi, rinite, kongestjoni respiratorja

Disturbi gastro-intestinali

Komuni: Uġiġħ addominali, nawsea, diġarea, dispepsja

Mhux komuni: Stitikezza, uġiġħ fis-sniien, ħalq xott, gass, gastrite, remettar

Disturbi fil-fwied u fil-marrara

Mhux magħruf: Abnormalitajiet fil-funzjoni tal-fwied

Disturbi fil-ġilda u tat-tessut ta' taħt il-ġilda

Mhux komuni: Alopeċja, dermatite, ġilda xotta, eritema, ħmura, fotosensittività, ħakk, raxx, urtikarja, toġhrieq

Disturbi muskolu-skeletriku u tat-tessut konnettiv

Komuni: Bugħawwieġ, uġiġħ fid-dahar, uġiġħ fir-riglejn, uġiġħ fil-muskolu

Mhux komuni: Uġiġħ fid-dirġhajn, tinfih tal-ġogi, uġiġħ fl-irkoppa, uġiġħ muskoloskeletriku, uġiġħ fl-ispallejn, ebusija, artrite, koxalġja, fibromajlaġja, debolezza muskolari.

Disturbi fil-kliwi u fis-sistema urinaria

Mhux komuni: Nokturja, frekwenza awrinarja, infezzjoni fil-passaġġ awrinarju

Disturbi fis-sistema riproduttiva u fis-sider

Mhux komuni: Tnaqqis fl-aptit sesswali, impotenza

Disturbi generali u kondizzjonijiet ta' mnejn jingħata

Komuni: Astenja, gheja, uġiġh fis-sider

Mhux komui: Edema fil-wiċċ, deni

Investigazzjonijiet

Komuni: Iperkalemja, tnaqqis hafif fil-ematokrit u l-emoglobina

Mhux komuni: Żieda hafifa fil-livelli ta' urea u kreatinina fis-serum

Rari hafna: Żieda fl-enzimi epatiċi u bilirubin

Hydrochlorothiazide

Disturbi tad-demm u tas-sistema limfatika

Mhux komuni: Agranuloċitosi, anemija aplastika, anemija emolitika, lewkopenja, purpura, tromboċitopenija

Disturbi fis-sistema immuni

Rari: Reazzjoni anafilattika

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

Mhux komuni: Anoreksja, iperglicemija, iperuriċemija, ipokalemja, iponatremja

Disturbi psikjatriċi

Mhux komuni: Nuqqas ta' rqad

Disturbi fis-sistema nervuża

Komuni: Ċefalalġja

Disturbi fl-ġhajnejn

Mhux komuni: Vista mċajjra għaddiena, ksantopsja

Disturbi vaskulari

Mhux komuni: Anġijite nekrotizzanti (vaskulite, vaskulite kutanea)

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali:

Mhux magħruf: Distress respiratorju (li jinkludi pnemonite u edema pulmonari)

Disturbi gastro-intestinali:

Mhux magħruf: Sijaloadenite, spażmi, irritazzjoni fl-istonku, tqalligħ, remettar, dijarea, stitikezza

Disturbi fil-fwied u fil-marrara:

Mhux magħruf: Ikterus, (suffejra kolestatika intraepatika), pankreatite

Disturbi tal-ġilda u fit-tessuti ta' taħt il-ġilda

Mhux magħruf: Reazzjonijiet ta' sensittività għad-dawl, urtikarja, nekrolisi epidermali tossika

Disturbi muskolu-skeletriku u tat-tessut konnettiv:

Mhux magħruf: Bugħawwieġ

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarka:

Mhux magħruf: Glikosurja, nefrite interstizjali, problemi fil-funzjoni renali, insuffiċjenza renali

Disturbi generali u kondizzjonijiet ta' mnejn jingħata

Mhux komuni: Deni, stordament

4.9 Doża eċċessiva

L-ebda tagħrif speċifiku mhu disponibbli dwar kura għal doża eċċessiva b'Cozaar Comp. Il-kura hija sintomatika u ta' appoġġ. It-terapija b'Cozaar Comp għandha titwaqqaf u l-pazjent għandu jiġi osservat mill-qrib. Miżuri ssuġġeriti jinkludu t-tqanqil ta' emesi jekk it-tehid sar riċentement, u korrezzjoni ta' deidrazzjoni, żbilanċ elettrolitiku, koma epatika u pressjoni baxxa bi proċeduri stabbiliti.

Losartan

Hemm tagħrif ristrett dwar każijiet ta' doża eċċessiva fil-bniedem. L-aktar manifestazzjoni probabbli ta' doża eċċessiva tkun pressjoni baxxa u takikardja; bradikardja tista' ssehh minn stimolazzjoni parasimpatetika (vegus). Jekk ikun hemm pressjoni sintomatika baxxa, trattament ta' appoġġ għandu jiġi mibdi.

La losartan u lanqas il-metabolit attiv ma jistgħu jiġu eliminati f'emodijalizi.

Hydrochlorothiazide

L-aktar sinjali u sintomi komuni osservati huma dawk ikkawżati bi żvojtat elettrolitiku (ipokalemija, ipokloremja, iponatremja) u diżidrazzjoni li tirrużulta minn dijuresi eċċessiva. Jekk digitalis ġie mogħti wkoll, ipokalemja jista' jimmodera l-arritmiji kardijaċi.

Il-grad li bih hydrochlorothiazide jitneħħa f'emodijalizi għadu ma ġiex stabbilit.

5. TAGHRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1 Tagħrif farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: Mediċina kkombinata li fiha antagonist tar-riċettatur ta' angiotensin II (tip AT1) u dijuretiku ta' thiazide, Mediċina ta' kontra l-pressjoni għolja
Kodiċi ATC: C09DA01

Losartan-Hydrochlorothiazide

Il-komponenti ta' Cozaar Comp intwerew li għandhom effett addittiv fit-tnaqqis tal-pressjoni tad-dem, billi jnaqqsu l-pressjoni tad-dem fi grad oġġla minn dawk ta' xi komponent waħdu biss. Dan l-effett hu maħsub li huwa r-riżultat ta' azzjonijiet kumplementari taż-żewġ komponenti. Barraminhekk, bħala riżultat ta' l-effett dijuretiku, hydrochlorothiazide iżid l-attività ta' renin fil-plażma, iżid it-tnixxija ta' aldosterone, inaqqas il-potassju fis-serum, u jżid l-effetti ta' angiotensin II. L-ghoti ta' losartan jimpedixxi l-effetti fiżjoloġiċi rilevanti kollha ta' angiotensin II u permezz ta' l-impediment ta' aldosterone għandu mnejn jimmodera t-telf ta' potassju assoċjat mad-dijuretiku.

Losartan intwera li għandu effett urikosuriku hafif u għaddien. Hydrochlorothiazide intwera li jikkaguna zidied apprezzabbli fl-aċidu uriku; il-kombinazzjoni ta' losartan u hydrochlorothiazide għandu mnejn jimmodera l-iperurikemja sensitizzata bid-dijuretiku.

L-effett kontra l-pressjoni għolja ta' Cozaar Comp huwa sostnut għal perijodu ta' 24 siegħa. Fi studji kliniċi li damu ta' lanqas sena, l-effett kontra l-pressjoni għolja inżamm għal ta' lanqas sena b'terapija kontinwa. Minkejja t-tnaqqis sinifikanti fil-pressjoni tad-dem, l-ghoti ta' Cozaar Comp ma kellux effett sinifikanti fuq ir-rata ta' taħbit tal-qalb. Fi provi kliniċi, wara 12-il sena ta' terapija b'50 mg losartan /12.5 mg hydrochlorothiazide, il-pressjoni diastoka l-aktar baxxa meta bilqiegħda tnaqqset għal medja ta' 13.2 mmHg.

Cozaar Comp huwa effettiv biex inaqqas il-pessjoni tad-demm f'irġiel u nisa, persuni suwed u daww mhux suwed u f'pazjenti iżgħar (<65 years) u akbar (≥65 years) u huwa effettiv f'kull grad tal-pessjoni għolja.

Losartan

Losartan huwa riċettatur antagonista sintetiku u orali ta' angiotensin-II (tip AT₁). Angiotensin II, li jdejjaq b'mod qawwi l-arterji u l-vini, huwa l-ormon prinċipali attiv tas-sistema renin/angiotensin u fattur determinanti tal-patofizjoloġija tal-pessjoni għolja. Angiotensin II jintrabat mar-riċettatur AT₁ li jinstab f'hafna tessuti (eż. Il-muskoli vaskulari lixxi, il-glandoli adrenali, il-kliwi u l-qalb) u jissensitizza diversi azzjonijiet bijoloġiċi importanti li jinkludu t-tidjiq tal-važi tad-demm u r-rilaxx ta' aldosterone. Angiotensin II jissensitizza wkoll il-proliferazzjoni taċ-ċelloli lixxi tal-muskoli. Losartan jimblokka b'mod silettiv ir-riċettatur AT₁. Losartan *in vitro* u *in vivo* u l-metabolit farmakoloġikament attiv tiegħu ta' carboxylic acid, E-3174 jimblokka l-azzjonijiet fizjoloġiċi rilevanti kollha ta' angiotensin II, irrispettivament tas-sors jew il-passaġġ fis-sintesi tiegħu. Losartan m'għandux effett agonista u lanqas ma jimblokka riċettaturi ormonali oħra jew kanali ijonici importanti fil-kontroll kardjovaskulari. Barraminhekk losartan ma jimpeddixxiex ACE (kininase II), l-enzima li tiddegrada bradykinin. Konsegwentement, m'hemmxi effetti potenzjali mhux mixtieqa li jistgħu jsiru b'bradykinin.

Waqt l-ghoti ta' losartan, it-tnehhija tar-rispons negattiv ta' angiotensin II fuq t-tnixxija ta' renin għandha twassal għal żieda fl-attività ta' renin fil-plażma (PRA). Żieda fil-PRA twassal għal żieda f'angiotensin II fil-plażma. Minkejja dawn iż-żidiet, l-attività kontra l-pessjoni għolja u t-trażzin tal-konċentrazzjoni ta' aldosterone fil-plażma huma mantenuti, li jindika impediment effettiv għar-riċettatur ta' angiotensin II. Wara l-waqfien ta' losartan, il-valuri ta' PRA u angiotensin II waqgħu fi żmien tliet ijiem għal valuri ta' riferiment.

Kemm losartan u anke l-metabolit prinċipali attiv tiegħu għandhom affinità akbar għal riċettatur AT₁ milli għar-riċettatur AT₂. Il-metabolit attiv huwa minn 10 darbiet sa 40 darba aktar attiv minn losartan fuq bażi ta' piz għal piz.

Fi studju speċifikament ippjanat biex janalizza l-inċidenza ta' sogħla f'pazjenti trattati b'losartan meta mqabbla ma' pazjenti trattati b'impedituri ACE, l-inċidenza ta' sogħla rapportata minn pazjenti li qed jirċievu losartan jew hydrochlorothiazide kienet simili u kienet sinifikament inqas milli f'pazjenti trattati b'impeditur ACE. Barraminhekk, f'analizi globali ta' 16-il prova klinika double-blind f'4131 pazjent, l-inċidenza ta' sogħla rapportata spontanjament f'pazjenti trattati b'losartan kienet simili (3.1%) għal dik trattata bi placebo (2.6%) jew hydrochlorothiazide (4.1%), filwaqt li l-inċidenza ta' impedituri ACE kienet ta' 8.8%.

F'pazjenti bi pessjoni għolja li m'humiex dijabetiċi u bi protejnurja, l-ghoti ta' losartan potassium inaqqas b'mod sinifikanti l-protejnurja, l-eliminazzjoni parzjali ta' albumina u IgG. Losartan iżomm ir-rata ta' filtrazzjoni glomerulari u jnaqqas il-porzjon ta' filtrazzjoni. Generalment losartan jikkaġuna tnaqqis fl-aċidu uriku fis-serum (generalment <0.4 mg/dl) persistenti f'terapija kronika.

Losartan m'għandux effett fuq riflessi awtoawtonomiċi u l-ebda effett sostnut fuq norepinephrine fil-plażma.

F'pazjenti li għandhom insuffiċjenza ventrikulari tan-naha tax-xellug, dozi ta' 25 mg u 50 mg ta' losartan iproduċa effetti emodinamiċi u newro-ormonali pożittivi iġġaraterizzati b'żieda fl-indiċi kardijaku u tnaqqis fil-pulmonary capillary wedge pressure, reżistenza vaskulari sistematika, pessjoni arterjali sistematika medja u r-rata tal-qalb u tnaqqis fil-livelli ċirkulatorji ta' aldosterone u norepinephrine, rispettivament. Il-każijiet ta' pessjoni baxxa kienu relatati mad-doża f'dawn il-pazjenti b'insuffiċjenza kardijaka

Studji ta' Pressjoni Gholja

Fi studji kliniċi b'kontrolli, l-ghoti darba fil-gimgha ta' Losartan lil pazjenti bi pressjoni essenzjali gholja minn hafifa sa moderata ikkaguna tnaqqis statistikament sinifikanti fil-pressjoni tad-demmm sistolika u diastolika. Il-kejl tal-pressjoni tad-demmm 24 siegħa wara d-doża imqabbel ma' 5-6 sigħat wara d-doża wera tnaqqis fil-pressjoni fuq 24 siegħa; bir-ritmu diurnali naturali jibqa' jinżamm. It-tnaqqis fil-pressjoni tad-demmm fl-aħħar ta' l-intervall dożat kien ta' 70 – 80 % ta' l-effett li deher 5-6 sigħat wara d-doża.

It-twaqqif ta' Losartan f'pazjenti bil-pressjoni gholja ma rriżultatx f'zieda f'daqqa fil-pressjoni tad-demmm (rebound). Minkejja t-tnaqqis notevoli fil-pressjoni tad-demmm, Losartan ma kellux effetti sinifikanti kliniċi fuq ir-rata ta' tahbit tal-qalb.

Losartan huwa effettiv ugwalment kemm fin-nisa u kemm fl-irġiel, u f'pazjenti iżgħar (taħt il-65 sena) u anzjani li għandhom il-pressjoni gholja.

Studju LIFE

L-istudju ta' Intervent b'Losartan għal Tnaqqis fil-Punt ta' Riferiment Aħħari [LIFE] kien studju randomizzat, triple-blind, b'kontrolli attivi li sar fuq 9,193 pazjent bi pressjoni gholja fl-etajiet ta' bejn 55 sa 80 sena u b'ipertrofija fil-ventrikula tax-xellug iddokumentata b'ECG. Il-pazjenti kienu randomizzati għal 50 mg losartan jew 50 mg atenolol darba kuljum. Jekk il-pressjoni tad-demmm bersalljata (< 140/90 mmHg) ma ntlahqitx, l-ewwel ingħatat doża ta' hydrochlorothiazide (12.5 mg) u, jekk meħtieġ id-doża ta' losartan jew atenolol ġiet miżjuda sa 100 mg darba kuljum. Jekk meħtieġ, mediċini ta' kontra l-pressjoni ohra, bl-eċċezzjoni ta' impedituri ACE, antagonisti ta' angiotensin II jew beta-blockers ġew magħduda sabiex tintlaħaq il-pressjoni tad-demmm bersalljata.

Iż-żmien medju ta' follow-up kien ta' 4.8 snin.

Il-punt ta' riferiment aħħari prinċipali kien il-kompost ta' morbidità u mortalità kardjovaskulari mkejla bi tnaqqis fl-inċidenza kkombinata ta' mewt kardjovaskulari, puplesija u infart mijokardjaku. Il-pressjoni tad-demmm kienet sinifikament mnaqqsa għal-livelli simili fiż-żewġ gruppi. It-trattament b' losartan irriżulta fi tnaqqis ta' 13.0% fir-riskju ($p=0.021$, 95 % intervall ta' kunfidenza 0.77-0.98) imqabbel ma' atenolol għal pazjenti li jilhq u l-ewwel punt ta' riferiment kompost prinċipali. Dan kien prinċipalment attribwit għall-inċidenza ta' puplesija. It-trattament b'losartan naqqas ir-riskju ta' puplesija b'25% meta mqabbel ma' atenolol ($p=0.001$ 95% intervall ta' kunfidenza 0.63-0.89). Ir-rati ta' mwiet kardjovaskulari u infarti mijokardjali ma kienux sinifikament differenti bejn il-gruppi ta' trattament.

Hydrochlorothiazide

Hydrochlorothiazide huwa diuretiku ta' thiazide. Il-mekkanizmu ta' l-effett ta' kontra l-pressjoni gholja f'thiazides mhux magħruf sa barra. Thiazides jaffettwaw il-mekkanizmi tubulari renali ta' l-assorbiment mill-ġdid ta' l-elettrolitiċi, li direttament jgħollu l-eliminazzjoni ta' sodju u chloride f'madwar ammonti ekwivalenti. L-azzjoni diuretika ta' hydrochlorothiazide tnaqqas il-volum ta' plazma, tgholli l-attività ta' renin fil-plazma u żżid it-tnixxija ta' aldosterone, b'żidied sussegwenti fit-tnaqqis ta' potassju u bikarbonat fl-awrina, u tnaqqis tal-potassju fis-serum. Ir-rabta ta' renin-aldosterone ssir permezz ta' angjotensin II u għalhekk amministrazzjoni kongunta ta' antagonist riċettatur ta' angjotensin II x'aktarx tirriversja t-telf ta' potassju assoċjat ma' diuretiċi ta' thiazide.

Wara l-użu orali, id-diuresi tibda fi żmien sagħtejn, tilhaq il-qofol tagħha f'madwar 4 sigħat u ddum sejra għal madwar 6 sa 12-il siegħa bl-effett kontra l-pressjoni gholja ddum tippersisti għal 24 siegħa.

5.2 Taghrif Farmakokinetiku

Assorbiment

Losartan

Wara li jinghata mill-halq, losartan jiġi assorbit sew u jghaddi minn proċess ta' first-pass metabolism, bil-formazzjoni ta' metabolit attiv ta' carboxylic acid u metaboliti mhux attivi oħra. Il-bijodisponibilità sistemika tal-pilloli losartan hi ta' madwar 33%. L-ogħla konċentrazzjonijiet medji ta' losartan u l-metabolit attiv tiegħu jintlaħqu f' siegħa u fi 3-4 sigħat, rispettivament. Ma kienx hemm effett klinikament sinifikanti fuq il-profil tal-konċentrazzjoni tal-plażma ta' losartan meta l-pillola tinghata ma' ikla standard.

Distribuzzjoni

Losartan

Kemm losartan u l-metabolit attiv tiegħu huma $\geq 99\%$ marbutin ma' proteini fil-plażma, prinċipalment l-albumina. Il-volum ta' distribuzzjoni ta' losartan hi ta' 34 litru. Studji fuq il-firien indikaw li losartan jaqşam il-barriera tad-demmm-moħħ b'mod fqir, jekk jaqşam.

Hydrochlorothiazide

Hydrochlorothiazide jaqşam is-sekonda imma mhux il-barriera tad-demmm-moħħ u jiġi eliminat fil-halib ta' l-omm.

Bijotrasformazzjoni

Losartan

Madwar 14% ta' doża mogħtija ġol-vina - jew mill-halq - ta' losartan tinbidel fil-metabolit attiv tiegħu. Wara l-ghoti mill-halq u ġol-vina ta' losartan potassium ittikkettat b' ^{14}C , ir-radjoattività prinċipali fiċ-ċirkolazzjoni hija attribwita għal losartan u l-metabolit attiv tiegħu. Tibdil minimu ta' losartan fil-metabolit attiv tiegħu deher f'madwar perċentwal wiehed ta' individwi studjati.

Barra mill-metabolit attiv ifformat, metaboliti mhux attivi huma fformati wkoll, li jinkludu żewġ metaboliti ifformati mill-idrosilazzjoni tan-naħa tal-katina butyl u metabolit iehor zġħir, tip ta' N-2 tetrazole glucuronide.

Eliminazzjoni

Losartan

It-tneħħija ta' losartan mill-plażma u tal-metabolit attiv tiegħu hija ta' madwar 600 ml/min u 50 ml/min, rispettivament. It-tneħħija mill-kliwi ta' losartan u l-metabolit attiv tiegħu hi ta' madwar 74 ml/min u 26 ml/min, rispettivament. Meta losartan jiġi amministrat mill-halq, madwar 4% tad-doża tiġi eliminata mingħajr ma titbidel fl-urina, u madwar 6% tad-doża tiġi eliminata fl-urina bħala l-metabolit attiv. Il-farmakokinetiċi ta' losartan u l-metabolit attiv tiegħu huma linejari b'dozi sa 200 mg losartan potassium meħuda mill-halq.

Wara l-ghoti mill-halq, il-konċentrazzjonijiet fil-plażma ta' losartan u l-metabolit attiv tiegħu jonqsu b'mod poliesponenzjali b'half-life terminali ta' madwar sagħtejn u 6-9 sigħat, rispettivament. F'doża ta' 100 mg li tittiehed darba biss, la losartan u lanqas il-metabolit attiv tiegħu ma jakkumulaw b'mod sinifikanti fil-plażma.

Kemm l-eliminazzjoni mill-marrara u dik urinarja jikkontribwixxu għall-eliminazzjoni ta' losartan u l-metabolit tiegħu. Wara doża meħuda mill-halq ta' losartan ittikkettat b' ^{14}C fil-bniedem, madwar 35% ta' radjoattività giet irkuprata fl-urina u 58% fl-ippurgar.

Hydrochlorothiazide

Hydrochlorothiazide mhux metabolizzat imma jiġi eliminat malajr minn ġol-kliwi. Wara li l-livelli ta' plazma jkunu ġew segwiti għal ta' lanqas 24 siegħa, il-half-life fil-plażma instabet li tvarja bejn 5.6

u 14.8 sigħat. Ta' lanqas 61 fil-mija tad-doża orali hija eliminata minghajr ma tinbidel fi żmien 24 siegħa.

Karatteristiċi fil-Pazjenti

Losartan-Hydrochlorothiazide

Il-konċentrazzjonijiet ta' losartan fil-plażma u tal-metabolit attiv u l-assorbiment ta' hydrochlorothiazide f'pazjenti anzjani bil-pressjoni għolja m'humiex sinifikament differenti minn dawk ta' żgħażaġh li għandhom pressjoni għolja.

Losartan

Wara l-ġhoti mill-ħalq f'pazjenti b'ċirrosi alkoholika fil-fwied minn hafifa sa moderata, il-konċentrazzjonijiet fil-plażma ta' losartan u l-metabolit attiv tiegħu kienu 5 darbiet u 1.7 darbiet oġhla minn dawk li deħru f'voluntieri rġiel żgħażaġh.

La Losartan u lanqas il-metabolit attiv ma jistgħu jiġu eliminati f'emodijalizi.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-medicina

Minn tagħrif ta' qabel l-użu kliniku ma ġie rivelat ebda periklu speċjali għal bniedem skond studji konvenzjonali ta' farmakoloġija, effetti tossiku fuq il-ġeni u riskju ta' kanċer. Il-potenzjal tossiku ta' losartan/hydrochlorothiazide ġie evalwat fi studji ta' tossiċità kronika għal perijodu sa sitt xhur fil-firien u l-klieb wara l-ġhoti mill-ħalq, u l-bidliet osservati f'dawn l-istudji bil-kombinazzjoni kineu prodotti prinċipalment mill-komponent ta' losartan. L-ġhoti tal-kombinazzjoni losartan/hydrochlorothiazide gābet tnaqqis fil-parametri taċ-ċelluli l-homor tad-dem (eritrociti, emaglobina, ematokrit), zieda fil-urea-N fis-serum, piż imnaqqas tal-qalb (minghajr spjegazzjoni histoloġika), u bidliet gastro-intestinali (feriti mukużi tar-rita, ulċeri, tghawwir, emorragiji). Ma kien hemm ebda evidenza ta' teratoġenicità fil-firien jew f'niek ittrattati bil-kombinazzjoni ta' losartan/hydrochlorothiazide. Tossiċità fetali fil-firien, kif evidenzjat b'zieda kemmxejn oġhla fil-kustilji supernumerari fil-ġenerazzjoni F₁ kienu osservati meta nisa kienu trattati qabel u waqt it-tqala. Kif kien osservat fi studji b'losartan waħdu, effetti avversi fetali u fi trabi għadhom jitwiġdu, li jinkludu tossiċità renali u mewt fetali, sehħew meta meta firien tqal kienu trattati bil-kombinazzjoni ta' losartan/hydrochlorothiazide fl-aħħar tat-tqala u/jew t-treddigh.

6. TAGHRIF FARMACEWTIKU

6.1 Lista ta' sustanzi mhux attivi

Cozaar Comp 50 mg/12.5 mg, Cozaar Comp 100 mg/12.5 mg and Cozaar Comp 100 mg/25 mg:

Kull pillola fiha s-sustanzi li ġejjin:

microcrystalline cellulose (E460)

lactose monohydrate

pregelatinized maize starch

magnesium stearate (E572)

hydroxypropyl cellulose (E463)

hypromellose (E464)

Cozaar Comp 50 mg/12.5 mg fihom 4.24 mg (0.108 mEq) ta' potassju.

Cozaar Comp 100 mg/12.5 mg mg fihom 8.48 mg (0.216 mEq) ta' potassju.

u Cozaar Comp 100 mg/25 mg fihom 8.48 mg (0.216 mEq) ta' potassju

Cozaar Comp 50 mg/12.5 mg u Cozaar Comp 100 mg/25 mg fihom ukoll Titanium dioxide (E171), Quinoline yellow aluminum lake (E104), u Carnauba wax (E903)

Cozaar Comp 100 mg/12.5 mg fih ukoll konċentrat ta' kulur abjad (għall-ingredjenti individwali tal-konċentrat: hydroxypropyl cellulose, hypromellose u titanium dioxide) u carnauba wax.

Carnauba wax (E903), Titanium dioxide (E171)

Cozaar Comp 100 mg/25 mg fih ukoll: Titanium dioxide (E171), Quinoline yellow aluminum lake (E104), u Carnauba wax (E903)

6.2 Inkompatibilitajiet

Ma jghoddx f'dan il-każ.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Cozaar Comp 50 mg/12.5 mg, Cozaar Comp 100 mg/25 mg:

3 snin.

Cozaar Comp 100 mg/12.5 mg:

Sentejn

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-hażna

Żomm fil-kontenitur oriġinali. Żomm il-folja fil-kartuna ta' barra u l-flixxun magħluq sewwa

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta' dak li hemm ġo fih

Cozaar Comp 50 mg/12.5 mg - Folji tal-PVC/PE/PVDC b'għotjien b'fojl ta' l-aluminju f'pakketti ta' 4, 7, 10 pilloli, 14-il pillola, 20, 28, 30, 50, 56, 98, jew 280 pillola. Fliexken ta' l-HDPE b'100 pillola.

Cozaar Comp 100 mg/12.5 mg - Folji tal-PVC/PE/PVDC b'għotjien b'fojl ta' l-aluminju f'pakketti ta' 14, 15-il pillola, 28, 30, 50, 56, 84, 98, jew 280 pillola. Fliexken ta' l-HDPE b'100 pillola

Cozaar Comp 100 mg/25 mg - Folji tal-PVC/PE/PVDC b'għotjien b'fojl ta' l-aluminju f'pakketti ta' 7 pilloli, 14-il pillola, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, jew 280 pillola. Fliexken ta' l-HDPE b'100 pillola

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għall-skop kummerċjali.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittiehdu meta jintrema <u għal immaniġġar iehor >

L-ebda htigijiet speċjali.

7. ID-DETENTUR TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Biex jiġi implimentat fil-pajjiż]

8. NUMRU(I) TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Biex jiġi implimentat fil-pajjiż]

9. DATA TA' L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA' L-AWTORIZZAZZJONI

<{DD/MM/YYYY}> <{DD xahar YYYY}>

10. DATA TA' META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

{ XX/SSSS }

TIKKETTA

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

Kartuna ta' barra ghal folja ta' Cozaar Comp 50 mg/12.5 mg pilloli miksijin b'rita

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Cozaar Comp 50 mg/ 12.5 mg mg pilloli miksijin b'rita

Losartan u hydrochlorothiazide

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola fiha 50 mg losartan potassium u 12.5 mg hydrochlorothiazide.

3. LISTA TA' SUSTANZI MHUX ATTIVI

Lactose monohydrate. Ara l-fuljett ghal aktar taghrif.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

4, 7, 10 pilloli, 14-il pillola, 20, 28, 30, 50, 84, 56, 98, jew 280 pillola miksija b'rita.

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Jittiehed mill-halq. Aqra l-fuljett ta' taghrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JINTLAHAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**8. DATA TA' META JISKADI**

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Aħžen fil-pakkett oriġinali. Żomm il-flixxun magħluq sew.

10. PREKAWZZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Sabiex jimtlesta fil-pajjiż stess]

12. NUMRU(I) TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Sabiex jitlesta fil-pajjiż stess]

13. NUMRU TAL-LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

[Għandu jitlesta fil-pajjiż stess]

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

[Għandu jitlesta fil-pajjiż stess]

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

[Għandu jitlesta fil-pajjiż stess]

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI
--

Folji ghal Cozaar Comp 50 mg/12.5 mg pilloli miksijin b'rita

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI

Cozaar Comp 50 mg/12.5 mg

Losartan u hydrochlorothiazide

2. ISEM TAD-DETENTUR TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ
--

[Ara Anness I - Biex jitlesta fil-pajjiz stess]

3. DATA TA' META JISKADI

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

5. OHRAJN

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

Kartuna ta' barra ghal Cozaar Comp 50 mg/12.5 mg pilloli miksijin b'rita Flixkun HDPE

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Cozaar Comp 50 mg/12.5 mg mg pilloli miksijin b'rita

Losartan u hydrochlorothiazide

2. STATEMENT OF ACTIVE SUBSTANCE(S)

Kull pillola fiha 50 mg losartan potassium u 12.5 mg hydrochlorothiazide.

3. LISTA TA' SUSTANZI MHUX ATTIVI

Lactose monohydrate. Ara l-fuljett ghal aktar taghrif.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

100 pillola miksija b'rita.

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Jittiehed mill-halq. Aqra l-fuljett ta' taghrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JINTLAHAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**8. DATA TA' META JISKADI**

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Aħžen fil-pakkett originali. Żomm il-flixkun magħluq sewwa.

10. PREKAWZZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ
--

[Ghandu jimtela fil-pajjiz stess]

12. NUMRU(I) TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ
--

[Ghandu jitlesta fil-pajjiz stess]

13. NUMRU TAL-LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

[Ghandu jitlesta fil-pajjiz stess]

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

[Ghandu jitlesta fil-pajjiz stess]

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

[Ghandu jitlesta fil-pajjiz stess]

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

Tikketta tal-flixkun għal Cozaar Comp 50 mg/12.5 mg pilloli miksijin b'rita. Flixkun HDPE

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Cozaar Comp 50 mg/12.5 mg mg pilloli miksijin b'rita

Losartan u hydrochlorothiazide

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola fiha 50 mg losartan potassium u 12.5 mg hydrochlorothiazide.

3. LISTA TA' SUSTANZI MHUX ATTIVI

Lactose monohydrate. Ara l-fuljett għal aktar tagħrif

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

100 pillola miksija b'rita.

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Jittiehed mill-ħalq. Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JINTLAHAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**8. DATA TA' META JISKADI**

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Aħżen fil-flixkun oriġinali. Żomm il-flixkun magħluq sewwa.

10. PREKAWZZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ
--

[Ghandu jimtela fil-pajjiż stess]

12. NUMRU(I) TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ
--

[Ghandu jitlesta fil-pajjiż stess]

13. NUMRU TAL-LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

[Ghandu jitlesta fil-pajjiż stess]

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

[Ghandu jitlesta fil-pajjiż stess]

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Mhux disponibbli

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

Kartuna ta' barra ghal folja ta' Cozaar Comp 100 mg/12.5 mg pilloli miksijin b'rita

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Cozaar Comp 100 mg/12.5 mg mg pilloli miksijin b'rita

Losartan u hydrochlorothiazide

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola fiha 100 mg losartan potassium u 12.5 mg hydrochlorothiazide.

3. LISTA TA' SUSTANZI MHUX ATTIVI

Lactose monohydrate. Ara l-fuljett ghal aktar taghrif.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

14, 15-il pillola, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, jew 280 pillola miksija b'rita.

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Jittiehed mill-ħalq. Aqra l-fuljett ta' taghrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JINTLAHAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**8. DATA TA' META JISKADI**

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali. Żomm il-folja fil-kartuna ta' barra.

10. PREKAWZZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Ghandu jimtela fil-pajjiż stess]

12. NUMRU(I) TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Ghandu jitlesta fil-pajjiż stess]

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

[Ghandu jitlesta fil-pajjiż stess]

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

[Ghandu jitlesta fil-pajjiż stess]

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

[Ghandu jitlesta fil-pajjiż stess]

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI
--

Folji ghal Cozaar Comp 100 mg/12.5 mg pilloli miksijin b'rita
--

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI

Cozaar Comp 100 mg/12.5 mg

Losartan u hydrochlorothiazide

2. ISEM TAD-DETENTUR TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ
--

[Ara Anness I - Ghandu jitlesta fil-pajjiz stess]

3. DATA TA' META JISKADI

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. OHRAJN

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

Kartuna ta' barra ghal Cozaar Comp 100 mg/12.5 mg pilloli miksija b'rita Flixkun HDPE

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Cozaar Comp 100 mg/12.5 mg mg pilloli miksijin b'rita

Losartan u hydrochlorothiazide

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola fiha 100 mg losartan potassium u 12.5 mg hydrochlorothiazide.

3. LISTA TA' SUSTANZI MHUX ATTIVI

Lactose monohydrate. Ara l-fuljett ghal aktar taghrif.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

100 pillola miksija b'rita.

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Jittiehed mill-ħalq. Aqra l-fuljett ta' taghrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JINTLAHAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**8. DATA TA' META JISKADI**

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Aħžen fil-flixkun oriġinali. Żomm il-flixkun magħluq sew.

10. PREKAWZZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Ghandu jimtela fil-pajjiż stess]

12. NUMRU(I) TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Ghandu jitlesta fil-pajjiż stess]

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

[Ghandu jitlesta fil-pajjiż stess]

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

[Ghandu jitlesta fil-pajjiż stess]

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

[Ghandu jitlesta fil-pajjiż stess]

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

Tikketta tal-flixkun għal Cozaar Comp 100 mg/12.5 mg pilloli miksijin b'rita Flixkun HDPE

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Cozaar Comp 100 mg/12.5 mg mg pilloli miksijin b'rita

Losartan u hydrochlorothiazide

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola fiha 100 mg losartan potassium u 12.5 mg hydrochlorothiazide.

3. LISTA TA' SUSTANZI MHUX ATTIVI

Lactose monohydrate. Ara l-fuljett għal aktar tagħrif.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

100 pillola miksija b'rita.

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Jittiehed mill-ħalq. Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JINTLAHAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**8. DATA TA' META JISKADI**

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Aħžen fil-flixkun oriġinali. Żomm il-flixkun magħluq sew.

10. PREKAWZZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ
--

[Ghandu jimtela fil-pajjiż stess]

12. NUMRU(I) TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ
--

[Ghandu jitlesta fil-pajjiż stess]

13. NUMRU TAL-LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

[Ghandu jitlesta fil-pajjiż stess]

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

[Ghandu jitlesta fil-pajjiż stess]

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Mhux disponibbli

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

Kartuna ta' barra ghal folja ta' Cozaar Comp 100 mg/25 mg pilloli miksijin b'rita

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Cozaar Comp 100 mg/25 mg mg pilloli miksijin b'rita

Losartan u hydrochlorothiazide

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola fiha 100 mg losartan potassium u 25 mg hydrochlorothiazide.

3. LISTA TA' SUSTANZI MHUX ATTIVI

Lactose monohydrate. Ara l-fuljett ghal aktar taghrif

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

7 pilloli, 14-il pillola, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, jew 280 pillola miksija b'rita

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Jittiehed mill-halq. Aqra l-fuljett ta' taghrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JINTLAHAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**8. DATA TA' META JISKADI**

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Aħżen fil-pakkett originali

10. PREKAWZZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ
--

[Ghandu jimtela fil-pajjiż stess]

12. NUMRU(I) TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ
--

<[Ghandu jitlesta fil-pajjiż stess]>

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

[Ghandu jitlesta fil-pajjiż stess]

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

[Ghandu jitlesta fil-pajjiż stess]

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

[Ghandu jitlesta fil-pajjiż stess]

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

Folja għal Cozaar Comp 100 mg/25 mg pilloli miksijin b'rita

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Cozaar Comp 100 mg/25 mg

Losartan u hydrochlorothiazide

2. ISEM TAD-DETENTUR TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Ara Anness I - Biex jitlesta fil-pajjiż stess]

3. DATA TA' META JISKADI

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. OHRAJN

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

Kartuna ta' barra ghal Cozaar Comp 100 mg/25 mg pilloli miksijin b'rita Flixkun HDPE

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Cozaar Comp 100 mg/25 mg mg pilloli miksijin b'rita

Losartan u hydrochlorothiazide

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola fiha 100 mg losartan potassium u 25 mg hydrochlorothiazide.

3. LISTA TA' SUSTANZI MHUX ATTIVI

Lactose monohydrate. Ara l-fuljett ghal aktar taghrif.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

100 pillola miksija b'rita

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Jittiehed mill-ħalq. Aqra l-fuljett ta' taghrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JINTLAHAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

8. DATA TA' META JISKADI

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Aħžen fil-flixkun oriġinali. Żomm il-flixkun magħluq sew.

10. PREKAWZZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Għandu jimtela fil-pajjiż stess]

12. NUMRU(I) TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Għandu jitlesta fil-pajjiż stess]

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

[Għandu jitlesta fil-pajjiż stess]

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

[Għandu jitlesta fil-pajjiż stess]

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

[Għandu jitlesta fil-pajjiż stess]

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

Kartuna ta' barra ghal Flixkun HDPE ta' Cozaar Comp 100 mg/25 mg pilloli miksijin b'rita

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Cozaar Comp 100 mg/25 mg mg pilloli miksijin b'rita

Losartan u hydrochlorothiazide

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola fiha 100 mg losartan potassium u 25 mg hydrochlorothiazide.

3. LISTA TA' SUSTANZI MHUX ATTIVI

Lactose monohydrate. Ara l-fuljett ghal aktar taghrif.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

100 pillola miksija b'rita

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Jittiehed mill-halq. Agra l-fuljett ta' taghrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JINTLAHAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**8. DATA TA' META JISKADI**

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Aħžen fil-pakkett originali. Żomm il-flixkun magħluq sewwa.

10. PREKAWZZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ
--

[Ghandu jimtela fil-pajjiż stess]

12. NUMRU(I) TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ
--

[Ghandu jitlesta fil-pajjiż stess]

13. NUMRU TAL-LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

[Ghandu jitlesta fil-pajjiż stess]

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

[Ghandu jitlesta fil-pajjiż stess]

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Mhux disponibbli

FULJETT TA' TAGHRIF

FULJETT TA' TAGHRIF: INFORMAZZJONI GHAL MIN QED JAGHMEL UŻU MINNU

Cozaar Comp pilloli miksijin b'rita losartan potassium u hydrochlorothiazide

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tiehu din il-mediċina

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.
- Din il-mediċina għet mogħtija lilek. M'għandekx tgħaddiha lil persuni ohra. Tista' tagħmlilhom il-ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sintomi bħal tiegħek.
- Jekk xi wieħed mill-effetti sekondarji jiggrava jew jekk tinnotta xi effetti sekondarji li m'humiex imsemmijin f'dan il-fuljett, jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

F'dan il-fuljett:

1. X'inhu Cozaar Comp u għalxiex jintuża
2. Qabel ma tiehu Cozaar Comp
3. Kif għandek tiehu Cozaar Comp
4. Effetti sekondarji li jista' jkollu
5. Kif taħżen Cozaar Comp
6. Aktar tagħrif

1. X'INHU COZAAR COMP U GHALXIEX JINTUŻA

Cozaar Comp hu kombinazzjoni ta' antagonist għar-riċettatur ta' angiotensin II (losartan) u fijuretiku (hydrochlorothiazide).

Cozaar Comp hu indikat għat-trattament ta' pressjoni essenzjali għolja (pressjoni tad-demm għolja)

2. QABEL MA TIEHU COZAAR COMP

Tiehu Cozaar Comp

- jekk inti allergiku/a (tbat minn sensitività eċċessiva) għal losartan, hydrochlorothiazide jew xi sustanza ohra ta' Cozaar Comp.
- jekk inti allergiku (għandek sensitività eċċessiva) għal grupp ta' mediċini msejha 'mediċini derivati minn sulfonamides' (eż. thiazides oħrajn, xi mediċini antibatterici bħal co-trimoxazole, staqsi lit-tabib tiegħek jekk m'intix żgur)
- jekk inti, jew jekk taħseb li inti jew qed tippjana li tinqabad tqila (ara wkoll "Tqala u Treddigh");
- jekk qed tredda' (ara wkoll sezzjoni 2 Tqala u Treddigh)
- jekk għandek il-funzjoni tal-fwied indebolita severament
- jekk għandek il-funzjoni tal-kliewi indebolita severament jew jekk il-fwied m'humiex jipproduċu awrina
- jekk għandek livelli baxxi ta' potassju, livell baxx ta' sodju jew livell għoli ta' kalċju li ma jistax jiġi kkoreġut bit-trattament.
- jekk qed tbat minn gotta.

Ogħhod attent hafna b'Cozaar Comp

- jekk għandek storja ta' nefha tal-wiċċ, ix-xofftejn, il-grizmejn, u/jew l-ilsien
- jekk qed tiehu d-dijuretiċi (pilloli ta' l-ilma)

- jekk qiegħed fuq dieta fejn tirristringi l-imluha
- jekk qiegħed jew kont qed tirremetti jew kellek dijarea severa
- jekk għandek insuffiċjenza tal-qalb
- jekk l-arterji li jwasslu d-demm lil kliewi tiegħek huma doġoq (stenosi ta' l-arterji tal-kliewi) jew jekk għandek kilwa wahda biss qed taħdem, jew riċentement kellek trapjant tal-kliewi.
- jekk għandek tidjiq ta' l-arterji (arteroxlerosi), angina pectoris (uġiġ fis-sider dovut għal funzjoni batuta tal-qalb)
- jekk għandek 'stenosi aortika jew mitrali' (tidjiq tal-valvi tal-qalb) jew 'kardjomajopatiya ipertrofika' (marda li tikkawża tihxin fil-muskolu tal-qalb)
- jekk int diabetiku
- jekk kellek il-gotta
- jekk għandek jew kellek kondizzjoni allergika, aźma jew kundizzjoni li tikkawża uġiġ fil-ġogi, raxxijiet fuq il-ġilda u deni (eritematodus lupus sistemiku).
- Jekk għandek livelli għoljin ta' kalċju jew livelli baxxi ta' potassju jew jekk qiegħed fuq dieta baxx ta' potassju.
- jekk hemm bżonn li tingħata loppju (anke għand id-dentist) jew qabel intervent kirurġiku, jew jekk għandek tiehu xi testijiet biex tiċċekkja l-funzjoni tal-paratajrojd, għandek tgħid lit-tabib jew l-personel mediku li qed tiehu l-pilloli Losartan u Hydrochlorothiazide.
- Jekk tbat minn iperaldosteroniżmu primarju (sindromu assoċjat ma tnixxija oġġla ta' l-ormon aldosterone li johroġ mill-glandola adrenali, ikkawżata minn abnormalità fi hdan il-glandola).

Meta tiehu mediċini oħra

Jekk jogħġbok għid lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek jekk qiegħed tiehu jew haġt dan l-aħħar xi mediċini oħra, anki daww mingħajr riċetta.

Sustanzi dijuretiċi bħal hydrochlorothiazide li jinsab f'Cozaar Comp jista jaffettwa jew jiġi affettwat b'mediċini oħra. Tahlitiet li fihom il-litju m'għandhomx jittieħdu ma' Cozaar Comp mingħajr superviżjoni mill-qrib mit-tabib tiegħek. Mizuri prekawżjonarji speċjali (eż. testijiet tad-demm) jistgħu jkunu xierqa jekk qed tiehu supplimenti tal-potassju, sostituti tal-melħ li fihom il-potassju jew mediċini li ma jhallux t-nixxija ta' potassju, dijuretiċi oħra ("pilloli ta' l-ilma") xi purganti, mediċini għat-trattament tal-gotta, mediċini li jikkontrollaw ir-ritmu tal-qalb, jew għad-dijabete (mediċini orali jew insulina). Huwa importanti wkoll li t-tabib tiegħek għandu jkun jaf jekk intiex tiehu mediċini biex tbaxxi l-pressjoni, sterojdi, mediċini biex tittratta l-kanċer, mediċini kontra l-uġiġ, mediċini għat-trattament ta' infezzjonijiet tal-moffa, jew mediċini għal artrite, rezini użata għal kolesterol għoli, bħal coleostyramine, mediċini li jirralassaw il-muskoli, pilloli ta' l-irqad, mediċini opjojdi bħal morfina, 'amini pressor' bħal adrenalina jew mediċini oħra mill-istess grupp; (aġenti orali għal dijabete jew insulina).

Jekk jogħġbok informa lit-tabib tiegħek meta hu ppjanat biex ser tapplika midja ta' kuntrast bil-jodju għal Cozaar Comp.

Meta tiehu Cozaar Comp ma' l-ikel u x-xorb

Huwa rakkomandat li ma tixrobx alkohol waqt li qed tiehu dawn il-pilloli: alkohol u l-pilloli Cozaar Comp jistgħu iħarxu l-effetti ta' xulxin.

Melħ djetetiku fi kwantità eċċessiva jista' jikkontraġoni l-effett tal-pilloli Cozaar Comp Cozaar Comp jista jittieħed ma' l-ikel jew fuq stonku vojta.

Tqala u Tredidġ

M'għandekx tiehu Cozaar Comp fl-ewwel 12-il ġimgħa ta' tqala, u m'għandekx teħodhom għall-ebda raġuni wara t-13-il ġimgħa peress li l-użu tagħhom jista' jkun ta' ħsara għat-tarbija.

Jekk tinqabad tqila waqt li qed tiehu Cozaar Comp, għid lit-tabib tiegħek minnufih. Bidla għal trattament alternattiv xieraq għandha ssir minn qabel fi tqala ppjanata.

M'ghandekx tiehu Cozaar Comp jekk qed tredda'.
Staqsì lit-tabib jew lill-ispizjar għal pariri qabel ma tiehu xi mediċina.

L-użu fi tfal u adoloxxenti

M'hemmx esperjenza dwar l-użu ta' Cozaar Comp fi tfal. Għalhekk, Cozaar Comp m'għandux jingħata lit-tfal.

L-użu fl-anzjani

Cozaar Comp jaħdem ugwalment tajjeb u huwa tollerant sew mill-biċċa l-kbira ta' pazjenti adulti akbar u dawk iżgħar minnhom.

Sewqan u thaddim ta' magni

Meta tibda it-trattament b'din il-mediċina, m'ghandekx tagħmel xogħol li jehtieg attenzjoni speċjali (pereżempju, sewqan ta' vettura jew thaddim ta' ingeni perikolużi) sakemm tkun taf li tista' tittolera l-mediċina tiegħek.

Tagħrif importanti dwar xi whud mis-sustanzi ta' Cozaar Comp

Cozaar Comp fih il-lattosju. Jekk it-tabib tiegħek qallek li inti intolleranti għal-lattosju jew ma tistax tidgħerixxi xi tipi ta' zokkor (għandek intolleranza għal xi tipi ta' zokkor) kellem lit-tabib tiegħek qabel ma tiehu din il-mediċina.

3. KIF GHANDEK TIEHU COZAAR COMP

Dejjem għandek tiehu Cozaar Comp skond il-parir tat-tabib. It-tabib tiegħek ser jiddeċiedi d-doża xierqa ta' Cozaar Comp skond il-kundizzjoni tiegħek u jekk intiex tiehu xi mediċini oħra. Huwa importanti li tkompli tiehu Cozaar Comp sakemm jibqa' jippreskrivih it-tabib tiegħek, peress li din il-mediċina tibqa' tikkontrolla l-pressjoni tiegħek.

Pressjoni tad-demm għolja

Id-doża li ġeneralment tingħata ta' Cozaar Comp għal biċċa l-kbira tal-pazjenti hi ta' hi ta' pillola waħda ta' 50 mg/12.5 mg kuljum sabiex tikkontrolla l-pressjoni tad-demm tiegħek fuq perijodu ta' 24 siegħa. Din tista' tiġi miżjuda għal 2 pilloli darba kuljum għal Losartan/Hydrochlorothiazide 50 mg/12.5 mg Pilloli Miksijin b'Rita jew mibdula għal pillola waħda kuljum ta' Losartan/Hydrochlorothiazide 100 mg/25mg Pilloli Miksijin b'Rita (qawwa akbar) kuljum. Id-doża massima ta' kuljum hi ta' 2 pilloli kuljum ta' Losartan / hydrochlorothiazide 50 mg/12.5 mg Pilloli Miksijin b'Rita jew pillola 1 kuljum ta' losartan / hydrochlorothiazide 100 mg/25 mg Pillola Miksija b'Rita

Jekk tiehu Cozaar Comp aktar milli suppost

F'każ ta' doża eċċessiva, ikkuntattja lit-tabib tiegħek minnufih jew mur l-isptar minnufih sabiex attenzjoni medika tkun tista' tingħatalek minnufih. Doża eċċessiva tista' tikkaguna l-pressjoni tad-demm tiegħek biex taqa', palpitazzjonijiet, taħbit tal-qalb kajman, bidla fl-elettroliti tad-demm, u diżidrazzjoni.

Jekk tinsa tiehu Cozaar Comp

M'ghandekx tiehu doża doppja biex tpatti għal kull doża li nsejt tiehu. Aqbez id-doża li tkun insejt tiehu u hu d-doża li jmisek tiehu fil-jum ta' wara.

4. EFFETTI SEKONDARJI LI JISTA' JKOLLU

Bhal kull medicina ohra, i-pilloli ta' Cozaar Comp jista' jkollhom effetti sekondarji, ghalkemm ma jidhrux fuq kulhadd.

Jekk thoss xi wiehed mill-effetti li gejjin, waqqaf il-pilloli losartan u ghid lit-tabib tieghek minnufih jew mur id-dipartiment ta' l-emergenza ta' l-eqreb sptar tieghek:

Reazzjoni allergika severa (raxx, hazz, nefha fil-wicè, ix-xofftejn, il-halq jew il-grizmejn li jistghu jikkawżaw diffikultàbiex tibra' jew tiehu n-nifs).

Dan hu effett kollaterali rari imma serju, li jaffettwa aktar minn persuna 1 f'kull 10,000 pazjent imma inqas minn persuna 1 f'kull 100 pazjent. Ghandu mnejn ikollok b'zonn attenzjoni medika urgenti jew tinzamm l-isptar.

L-effetti sekondarji ta' medicini huma kklassifikati kif gej:

Komuni (li jistghu jaffettwaw anqas minn persuna wahda f'kull 10 imma aktar minn persuna wahda f'100):

- Soghla, infezzjoni fil-passagg ta' fuq, imnieher imblukkat, sinusite, disturbi fis-sinus
- Dijarea, ughigh addominali, nawsea, indigestjoni
- Ughigh fil-muskoli jew bughawwieg, ughigh fir-riglejn, ughigh fid-dahar,
- Nuqqas ta' rقاد, ughigh ta' ras, stordament,
- Debolezza, gheja, ughigh fis-sider
- Livell ta' potassju oghla (li jista' jikkawza ritmu abnormali tal-qalb), livelli ta' emoglobina mnaqqsa.

Mhux komuni (li jistghu jaffettwaw anqas minn persuna wahda f'100 persuna imma aktar minn persuna wahda f'1,000)

- Anemija, dbabar homor jew kannella fuq il-gilda (minn daqqiet fuq is-saqajn, ir-riglejn, id-dirghajn u l-warrani, b'ugigh fil-gogi, nefha fl-idejn u s-saqajn u ughigh fl-istonku) feriti, tnaqqis fl-ghadd ta' cellulati tad-demmm bojod, problemi biex id-demmm jghaqqad u feriti,
- Nuqqas t'aptit, zieda fil-livelli ta' acidu uriku jew gotta franka, zieda fil-livelli ta' zokkor, livelli elettrolitici abnormali fid-demmm,
- Ansjetà, nervozità disturb ta' paniku (attakki ta' paniku rikorrenti), konfużjoni, dipressjoni, holm abnormali, disturbi fl-irquad, hedla, memorja mfixxkla,
- Sensazzjoni ta' labar u tingiz jew simili, ughigh fl-estremitàjiet, roghda, emikranja, hass hazin,
- Vizjoni mcajpra, hruq jew tingiz fl-ghajnejn, konguntivite, il-vista tmur għall-agħar, tibda tara l-affarijiet fl-isfar,
- Čempil, ibużjar, ghajjat, jew ikklikkjar fil-widnejn
- Pressjoni tad-demmm baxxa li tista' tkun assoċjata ma' bidla fil-pożizzjoni (thossok qisek ras fl-arja meta tqum bil-wieqfa meta tqum bilwieqfa, angina (ugigh fis-sider), qalb thabbat b'mod abnormali, acċident ċerebrovaskulari (TIA, "puplesija zghira"), attakk tal-qalb, palpitazzjonijiet,
- Infjammazzjoni tal-važi tad-demmm, li ġeneralment hi assoċjata ma' raxx tal-gilda jew feriti,
- Ughigh fil-grizmejn, nifs maqtugh, bronkite, pnemonja, ilma fil-pulmun (li johloq diffikultà biex tiehu n-nifs), l-imnieher jinfaraġ, kongestjoni,
- Stitikezza, gass, l-istonku mqalla', spażmi fl-istonku, remettar, halq xott, infjammazzjoni tal-glandolu tal-rieq, ughigh fis-sniien,
- Suffejra (tisfir ta' l-ghajnejn u l-gilda), infjammazzjoni tal-frixa,
- Horriqija, hazz, infjammazzjoni fil-gilda, raxx, hmura tal-hilda, sensitività għad-dawl, gilda xotta, fwawar, toghrieq, telf ta' xagħar,
- Ughigh fid-dirghajn, l-ispallejn, il-ġenb, l-irkopptejn u gogi, nefha fil-gogi, ebusija, debolezza tal-muskoli,
- Pipi ta' spiss anke bil-lejl, funzjoni tal-kliwi abnormali li tinkludi infjammazzjoni tal-kliwi, infezzjoni awrinarja, zokkor fl-awrina,
- Tnaqqis fil-ġibda sesswali, impotenza,
- Nefha fil-wicè, deni.

Rari (li jseħħu f'aktar minn 1 f'kull 10,000 pazjent u inqas minn 1 f'kull 1,000)

- Epatite (infjammazzjoni tal-fwied) testijiet abnormali tal-funzjoni tal-fwied

Jekk xi wiehed mill-effetti sekondarji jiggrava jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li mhumiex imsemmijin f'dan il-fuljett, jekk jogħġbok, għid lit-tabib tiegħek.

5. KIF TAHŻEN COZAAR COMP

Żommu fejn ma jintahaqx u ma jidhirx mit-tfal.

Tużax Cozaar Comp wara d-data ta' skadenza li tidher fuq kartuna wara JIS. Id-data ta' skadenza tirreferi għall-aħħar ġurnata ta' dak ix-xahar.

Ahżen fil-kontenitur oriġinali.

Żomm il-flixxun magħluq sewwa. Żomm il-folja fil-kartuna oriġinali. Tiftakx il-folja sakemm tkun lest biex tibda tiehu l-medicina.

Il-medicini m'għandhomx jintremew ma' l-ilma tad-dranagġ jew ma' l-iskart domestiku. Staqsi lill-ispizjar dwar kif għandek tarmi medicini li m'għandekx bżonn. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni ta' l-ambjent.

6. AKTAR TAGHRIF

X'fih Cozaar Comp fih

Is-sustanzi attivi huma losartan potassium u hydrochlorothiazide

Cozaar Comp 50 mg/12.5 mg fiha 50 mg ta' losartan potassium u 12.5 mg ta' hydrochlorothiazide bħala s-sustanzi attivi.

Cozaar Comp 100 mg/25 mg fiha 100 mg ta' losartan potassium u 25 mg ta' hydrochlorothiazide bħala s-sustanzi attivi.

Cozaar Comp 100 mg/25 mg fiha 100 mg ta' losartan potassium u 25 mg ta' hydrochlorothiazide bħala s-sustanzi attivi.

Cozaar Comp 50 mg/12.5 mg, Cozaar Comp 100 mg/12.5 mg u Cozaar Comp 100 mg/25 mg fihom is-sustanzi l-oħra li ġejjin:

microcrystalline cellulose (E460), lactose monohydrate, pregelatinized maize starch, magnesium stearate (E572), hydroxypropyl cellulose (E463), hypromellose (E464)

Cozaar Comp 50 mg/12.5 mg fih 4.24 mg (0.108mEq) ta' potassju, Cozaar Comp 100 mg/12.5 mg u Cozaar Comp 100 mg/25 mg fihom 8.48 mg (0.216 mEq) potassju.

Cozaar Comp 50 mg/12.5 mg u Cozaar Comp 100 mg/25 mg fihom ukoll titanium dioxide (E171), quinoline yellow aluminum lake (E104) u carnauba wax (E903).

Cozaar Comp 100 mg/12.5 mg fih ukoll: konċentrat tal-kulur abjad [jew l-ingredjenti individwali tal-konċentrat: hydroxypropyl cellulose (E463), hypromellose (E464) u titanium dioxide (E171)] u carnauba wax (E903).

Id-dehra ta' Cozaar Comp u l-kontenut tal-pakkett

Cozaar Comp 50 mg/12.5 mg jiġi bħala pilloli miksijin b'rita bix-xaqq jew mingħajr xaqq.

Cozaar Comp 100 mg/12.5 mg jiġi bħala pilloli miksijin b'rita mingħajr xaqq

Cozaar Comp 50 mg/12.5 mg jiġi bħala pilloli miksijin b'rita mingħajr xaqq

Cozaar Comp jiġi fid-daqsijiet ta' pakketti li ġejjin:

Cozaar Comp 50 mg/12.5 mg - Folji tal-PVC/PE/PVDC b'għotjien b'fojl ta' l-aluminju f'pakketti ta' 4, 7, 10 pilloli, 14-il pillola, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 98, jew 280 pillola. Fliexken tal-HDPE ta' 100 pillola.

Cozaar Comp 100 mg/12.5 mg - Folji tal-PVC/PE/PVDC b'għotjien b'fojl ta' l-aluminju f'pakketti ta' 14, 15-il pillola, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, jew 280 pillola. Fliexken tal-HDPE ta' 100 pillola.

Cozaar Comp 100 mg/25 mg - Folji tal-PVC/PE/PVDC b'għotjien b'fojl ta' l-aluminju f'pakketti ta' 7 pilloli, 14-il pillola, 28, 30, 50, 56, 98, jew 280 pillola. Fliexken tal-HDPE ta' 100 pillola

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkun għall-skop kummerċjali.

Id-Detentur ta' l-Awtorizzazzjoni għat-tqeghid fis-Suq u Manifattur

<Għandu jitlesta fil-pajjiż stess >

Dan il-prodott mediċinali huwa awtorizzat fl-Istati Membri u fiż-ŻEE taht l-ismijiet li ġejjin:

L-Awstrija	Cosaar Plus - Filmdabletten
L-Awstrija	Fortzaar-Filmdabletten
Il-Belġju	COZAAR PLUS FORTE 100 MG/25 MG
Il-Belġju	COZAAR PLUS 50 MG/12,5 MG
Il-Belġju	LOORTAN PLUS FORTE 100 MG/25 MG
Il-Belġju	LOORTAN PLUS 50 MG/12,5 MG
Il-Bulgarija	Hyzaar
Ċipru	FORTZAAR
Ċipru	HYZAAR
Id-Danimarka	Cozaar Comp.
Id-Danimarka	Cozaar Comp. Forte
Id-Danimarka	Cozaar Comp. 100 mg / 12,5 mg
Id-Danimarka	Fortzaar
L-Estonja	HYZAAR
L-Estonja	FORTZAAR
Il-Finlandja	Cozaar Comp
Il-Finlandja	Cozaar Comp Forte
Franza	Fortzaar
	100 mg/25 mg film-coated tablets
Franza	Hyzaar
	100 mg/25 mg film-coated tablets
Franza	Fortzaar
	50 mg/12,5 mg film-coated tablets
Franza	Hyzaar
	50 mg/12,5 mg film-coated tablets
Franza	Fortzaar
	100 mg/12,5 mg film-coated tablets
Il-Ġermanja	LORZAAR PLUS 50/12,5 mg Filmdabletten

Il-Ġermanja	CARDOPAL PLUS 50/12,5 mg Filmdabletten
Il-Ġermanja	LORZAAR VARIPHARM PLUS 50/12,5 mg Filmdabletten
Il-Ġermanja	FORTZAAR 100/25 mg Filmdabletten
Il-Ġermanja	FORTZAAR VARIPHARM 100/25 mg Filmdabletten
Il-Ġermanja	LORZAAR PLUS forte 100/12,5 mg Filmdabletten
Il-Greċja	HYZAAR
Il-Greċja	HYZAAR 100/25
L-Ungerija	Hyzaar 50/12.5 mg
L-Ungerija	Hyzaar Forte 100/25 mg
L-Irlanda	'Cozaar' Comp 50mg/12.5mg film-coated tablets
L-Irlanda	Cozaar' Comp 100mg/25mg film-coated tablets
L-Italja	HIZAAR 50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film
L-Italja	HIZAAR 100 mg + 25 mg compresse rivestite con film
L-Italja	FORZAAR 100 mg + 25 mg compresse rivestite con film
L-Italja	NEO-LOTAN PLUS 50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film
L-Italja	NEO-LOTAN PLUS 100 mg + 25 mg compresse rivestite con film
L-Italja	LOSAZID 50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film
L-Italja	LOSAZID 100 mg + 25 mg compresse rivestite con film
Il-Latvija	HYZAAR 50 mg/12,5 mg;
Il-Latvija	Fortzaar 100 mg/25 mg
Il-Litwanja	FORTZAAR (Losartan/Hydrochlorothiazide)
Il-Litwanja	HYZAAR (Losartan/Hydrochlorothiazide)
Il-Lussemburgu	COZAAR PLUS FORTE 100 MG/25 MG
Il-Lussemburgu	COZAAR PLUS 50 MG/12,5 MG
Il-Lussemburgu	LOORTAN PLUS FORTE 100 mg/25 mg
Il-Lussemburgu	LOORTAN PLUS 50 mg/12,5 mg
Malta	"Cozaar Comp" 50/12.5 mg pilloli miksija b'rita
Malta	"Cozaar Comp" 100/25 mg pilloli miksija b'rita
Malta	"Cozaar Comp" 100/12,5 mg pilloli miksija b'rita
L-Olanda	Cozaar Plus 100/12,5
L-Olanda	Fortzaar 100/25
L-Olanda	Hyzaar 50/12,5
Il-Polonja	HYZAAR
Il-Polonja	HYZAAR FORTE
Il-Portugall	COZAAR Plus
Il-Portugall	FORTZAAR
Il-Portugall	SIAARA
Il-Portugall	LORTAAN Plus
Il-Portugall	Losartan + Hidroclorotiazida Frosst
Ir-Rumanija	HYZAAR® 50 mg/12,5 mg, comprimate filmate
Ir-Rumanija	FORTZAAR® 100/ 25 mg, , comprimate filmate

Is-Slovenja	HYZAAR
Is-Slovenja	FORTZAAR
Spanja	Cozaar Plus
Spanja	Fortzaar
L-Iżvezja	Cozaar Comp 50 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter
L-Iżvezja	Cozaar Comp 100 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter
L-Iżvezja	Cozaar Comp Forte 100 mg/25 mg filmdragerade tabletter
Ir-Renju Unit	COZAAR-COMP 50/12.5MG FILM COATED TABLETS
Ir-Renju Unit	COZAAR-COMP 100/25MG FILM COATED TABLETS
Ir-Renju Unit	COZAAR-Comp 100 mg/12.5 mg Film-coated tablets
L-Iżlanda	COZAAR-COMP 50/12.5MG
L-Iżlanda	COZAAR-COMP Forte
L-Iżlanda	COZAAR-COMP 100/12.5MG
In-Norveġja	Cozaar Comp
In-Norveġja	Cozaar Comp Forte

Dan il-fuljett kien approvat l-ahhar f'