

Anness III

SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT, TIKKETTAR U FULJETT TA' TAGHRIF

Nota:

Din l-informazzjoni tal-prodott hija riżultat tal-proċedura ta' riferiment li magħha hija marbuta din id-deċiżjoni tal-Kummissjoni.

L-informazzjoni tal-prodott sussegwentement tista' tiġi aġġustata mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru, flimkien mal-Istat Membru ta' riferenza, skont kif ikun xieraq, skont il-proċeduri mnizzla f'Kapitolu 4 tat-Titolu III tad-Direttiva 2001/83/KE.

SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

HALDOL u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 1 mg pilloli
HALDOL u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 2 mg pilloli
HALDOL u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 4 mg pilloli
HALDOL u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 5 mg pilloli
HALDOL u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 10 mg pilloli
HALDOL u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 20 mg pilloli
HALDOL u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 2 mg/ml soluzzjoni orali
HALDOL u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 10 mg/ml soluzzjoni orali

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

2. GHAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola.

Soluzzjoni orali.

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

4. TAGHRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Pazjenti adulti li għandhom 18-il sena u aktar

- Trattament ta' skizofrenja u disturb skizoaffettiv.
- Trattament akut ta' delirju meta trattamenti mhux farmakoloġiċi jkunu fallew.
- Trattament ta' episodji manjaċi minn moderati sa severi assoċjati ma' disturb bipolari I.
- Trattament ta' aġitazzjoni psikomotorja akuta assoċjata ma' disturb psikotiku jew episodji manijaċi ta' disturb bipolari I.
- Trattament ta' aggressjoni persistenti u sintomi psikotiċi f'pazjenti b'dimenzja ta' Alzheimer minn moderata sa severa u dimenzja vaskulari meta trattamenti mhux farmakoloġiċi jkunu fallew u meta jkun hemm riskju li l-persuna twegġa' lilha nnifisha jew lill-haddiehor.
- Trattament ta' disturbi ta' tik, inkluż is-sindrom ta' Tourette, f'pazjenti b'indeboliment sever wara li trattamenti edukattivi, psikoloġiċi u trattamenti farmakoloġiċi oħra jkunu fallew.
- Trattament ta' korea minn hafifa sa moderata tal-marda ta' Huntington, meta prodotti mediċinali oħra ma jkunux effettivi jew ittollerati.

Pazjenti pedjatriċi

Trattament ta':

- Skizofrenja f'adolesxenti minn 13 sa 17-il sena meta trattamenti farmakoloġiċi oħra jkunu fallew jew ma jkunux ittollerati.
- Aggressjoni persistenti severa fi tfal u adolesxenti li għandhom minn 6 snin sa 17-il sena b'awtizmu jew disturbi pervażivi tal-iżvilupp, meta trattamenti oħra jkunu fallew jew ma jkunux ittollerati.

- Disturbi ta' tik, inkluz is-sindrom ta' Tourette, fi tfal u adolexxenti li għandhom minn 10 snin sa 17-il sena b'indeboliment sever wara li trattamenti edukattivi, psikoloġiċi u trattamenti farmakoloġiċi oħra jkunu fallew.

4.2 Pożoloġija u metodu ta' kif għandu jinghata

Pożoloġija

Adulti

Fil-bidu hija rrakkomandata doża baxxa, li sussegwentement tista' tiġi aġġustata skont ir-rispons tal-pazjent. Il-pazjenti għandhom jinżammu dejjem fuq l-aktar doża minima effettiva (ara sezzjoni 5.2).

Pilloli:

Ir-rakkomandazzjonijiet għad-doża tal-pilloli HALDOL huma ppreżentati f'Tabella 1.

Soluzzjoni orali:

Ir-rakkomandazzjonijiet għad-doża tas-soluzzjoni orali ta' HALDOL huma ppreżentati f'Tabella 1.

Tabella 1: Rakkomandazzjonijiet għad-doża ta' Haloperidol għall-adulti li għandhom 18-il sena u aktar

Trattament ta' skizofrenja u disturb skizoaffettiv • 2 sa 10 mg/kuljum mill-ħalq, bħala doża waħda jew maqsuma f'2 doži. Il-pazjenti bl-ewwel episodju ta' skizofrenja ġeneralment jirrispondu għal 2 sa 4 mg/kuljum, filwaqt li pazjenti b'episodji multipli ta' skizofrenja jistgħu jkunu jeħtieġu doži sa 10 mg/kuljum. • Aġġustamenti fid-doża jistgħu jsiru minn kuljum sa darba kull 7 ijiem. • Doži ta' aktar minn 10 mg/jum ma wrewx effikaċja superjuri għal doži aktar baxxi fil-biċċa l-kbira tal-pazjenti u jistgħu jikkawżaw żieda fl-inċidenza ta' sintomi ekstrapiramidali. Il-benefiċċju u r-riskju individwali għandu jiġi stmat meta wiehed iqis doži ta' aktar minn 10 mg/kuljum. • Id-doża massima hija ta' 20 mg/kuljum minhabba li t-tħassib dwar is-sigurtà huwa akbar mill-benefiċċji kliniċi ta' trattament b'doži oghla.
Trattament akut ta' delirju meta jkunu f'lellw trattamenti mhux farmakoloġiċi • milligramma 1 sa 10 mg/kuljum mill-ħalq, bħala doża waħda jew maqsuma f'2 jew 3 doži. • It-trattament għandu jinbada bl-inqas doża possibbli, u d-doża għandha tiġi aġġustata b'żidiet f'intervalli ta' saġhtejn sa 4 sigħat jekk l-aġitazzjoni tkompli, sa massimu ta' 10 mg/kuljum.
Trattament ta' episodji manijaċi minn moderati sa severi assoċjati ma' disturb bipolari I • 2 sa 10 mg/kuljum mill-ħalq, bħala doża waħda jew maqsuma f'2 doži. • Aġġustamenti fid-doża jistgħu jsiru minn kuljum sa darba kull tlett ijiem. • Doži aktar minn 10 mg/kuljum ma wrewx effikaċja superjuri għal doži aktar baxxi fil-biċċa l-kbira tal-pazjenti u jistgħu jikkawżaw żieda fl-inċidenza ta' sintomi ekstrapiramidali. Il-benefiċċju u r-riskju individwali għandu jiġi stmat meta wiehed iqis doži ta' aktar minn 10 mg/kuljum. • Id-doża massima hija 15-il mg/kuljum minhabba li t-tħassib dwar is-sigurtà huwa akbar mill-benefiċċji kliniċi ta' trattament b'doži oghla. • It-tkomplija tal-użu ta' HALDOL għandha tiġi vvalutata minn kmieni fit-trattament (ara sezzjoni 4.4).
Trattament ta' aġitazzjoni psikomotorja akuta assoċjata ma' disturb psikotiku jew episodji manijaċi ta' disturb bipolari I • 5 sa 10 mg mill-ħalq, ripetuti jekk meħtieġ wara 12-il siegħa sa massimu ta' 20 mg/kuljum. • It-tkomplija tal-użu ta' HALDOL għandha tiġi vvalutata minn kmieni fit-trattament (ara sezzjoni 4.4). • Meta ssir bidla minn injezzjoni ta' haloperidol ġol-muskolu, HALDOL mill-ħlaq għandu jinbada bir-rata ta' konverżjoni tad-doża ta' 1:1 segwit minn aġġustament fid-doża skont ir-rispons kliniku.
Trattament ta' aggressjoni persistenti u sintomi psikotiċi f'pazjenti b'dimenzja ta' Alzheimer minn moderata sa severa u dimenzja vaskulari meta trattamenti mhux farmakoloġiċi jkunu f'lellw u meta jkun hemm riskju li l-persuna twegġa' lilha nnifisha jew lill-haddiehor • 0.5 sa 5 mg/kuljum mill-ħalq, bħala doża waħda jew maqsuma f'2 doži. • Aġġustamenti fid-doża jistgħu jsiru minn kuljum sa darba kull 3 ijiem. • Il-ħtieġa li t-trattament jitkompla għandha tiġi stmata mill-ġdid wara mhux aktar minn 6 ġimgħat.
Trattament ta' disturbi ta' tik, inkluż is-sindrom ta' Tourette, f'pazjenti b'indeboliment sever wara li trattamenti edukattivi, psikoloġiċi u trattamenti farmakoloġiċi ohra jkunu f'lellw • 0.5 sa 5 mg/kuljum mill-ħalq, bħala doża waħda jew maqsuma f'2 doži. • Aġġustamenti fid-doża jistgħu jsiru minn kuljum sa darba kull 7 ijiem. • Il-ħtieġa li t-trattament jitkompla għandha tiġi stmata mill-ġdid kull 6 xhur sa 12-il xahar.

Trattament ta' korea minn hafifa sa moderata tal-marda ta' Huntington, meta prodotti mediċinali ohra ma jkunux effettivi jew ittollerati

- 2 sa 10 mg/kuljum mill-halq, bħala doża waħda jew maqsuma f'2 doži.
- Aġġustamenti fid-dożaġġ jistgħu jsiru minn kuljum sa kull 3 ijiem.

Is-soluzzjoni orali ta' HALDOL għandha tintuża għal doži waħdiet ta' anqas minn 1 mg li ma jistgħux jinkisbu bil-pilloli HALDOL.

soluzzjoni orali ta' 2 mg/ml:

Is-soluzzjoni orali ta' HALDOL 2 mg/ml f'kontenitur b'qattara qegħda biex tintuża għal doži waħdiet sa 2 mg haloperidol (ekwivalenti għal 20 qatra).

Is-soluzzjoni orali ta' HALDOL 2 mg/ml fi flixkun b'siringa tal-halq qegħda biex tintuża għal doži waħdiet ta' 0.5 mg haloperidol u aktar (ekwivalenti għal 0.25 ml u aktar).

In-numru ta' qatriet jew il-kwantità (ml) meħtieġa biex tinkiseb doża waħda speċifikata bl-użu tas-soluzzjoni orali ta' HALDOL 2 mg/ml hija ppreżentata f'Tabella 2.

Tabella 2: Tabella ta' konverżjoni għas-soluzzjoni orali ta' HALDOL 2 mg/ml

mg haloperidol	Numru ta' qtar ta' HALDOL (kontenitur b'qattara)	ml HALDOL (flixkun b'siringa tal-halq)
0.1 mg	qatra waħda	-
0.2 mg	2 qatriet	-
0.3 mg	3 qatriet	-
0.4 mg	4 qatriet	-
0.5 mg	5 qatriet	0.25 ml
1 mg	10 qatriet	0.5 ml
2 mg	20 qatra	1 ml
5 mg	-	2.5 ml
10 mg	-	5 ml
15 mg	-	7.5 ml
20 mg	-	10 ml

L-ebda preżentazzjoni tas-soluzzjoni orali ta' HALDOL 2 mg/ml ma tippermetti l-kejl tal-firxa kollha tad-doži waħdiet rrakkomandati. Dan għandu jitqies meta wiehed ikun qed jiddeċiedi liema pakkett se jordna b'riċetta.

soluzzjoni orali ta' 10 mg/ml:

Is-soluzzjoni orali ta' HALDOL 10 mg/ml f'kontenitur b'qattara qegħda biex jintuża għal doži waħdiet sa 10 mg haloperidol (20 qatra).

Is-soluzzjoni orali ta' HALDOL 10 mg/ml fi flixkun b'siringa tal-halq qegħda biex tintuża għal doži waħdiet ta' 5 mg haloperidol u aktar (ekwivalenti għal 0.5 ml u aktar).

In-numru ta' qtar jew il-kwantità (ml) meħtieġa biex tinkiseb doża waħda speċifikata bl-użu tas-soluzzjoni orali ta' HALDOL 10 mg/ml hija ppreżentata fit-Tabella 3.

Tabella 3: Tabella ta' konverżjoni ghas-soluzzjoni orali ta' HALDOL 10 mg/ml

mg haloperidol	Numru ta' qtar ta' HALDOL (kontenitur b'qattara)	ml HALDOL (flickun b'siringa tal-halq)
0.5 mg	qatra waħda	-
1 mg	2 qatriet	-
2 mg	4 qatriet	-
3 mg	6 qatriet	-
4 mg	8 qatriet	-
5 mg	10 qatriet	0.5 ml
10 mg	20 qatra	1 ml
15 mg	-	1.5 ml
20 mg	-	2 ml

L-ebda preżentazzjoni tas-soluzzjoni orali ta' HALDOL 10 mg/ml ma tippermetti l-kejl tal-firxa kollha tad-dożi waħdiet rrakkomandati. Dan għandu jittqies meta wiehed ikun qed jiddeċiedi liema pakkett se jordna b'riċetta.

Waqfien tat-trattament

Huwa rrakkomandat li l-waqfien ta' haloperidol isir bil-mod il-mod (ara sezzjoni 4.4).

Doża maqbuża

Jekk il-pazjenti jinsew jiehdu doża, huwa rrakkomandat li huma jiehdu d-doża li jkun imiss bħas soltu, u ma jhdux doża doppja.

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani

Id-dożi inizjali ta' haloperidol li għejjin huma rrakkomandati f'pazjenti anzjani:

- Trattament ta' aggressjoni persistenti u sintomi psikotiċi f'pazjenti b'dimenzja ta' Alzheimer minn moderata sa severa u dimenzja vaskulari meta trattamenti mhux farmakoloġiċi jkunu fallw u meta jkun hemm riskju li l-persuna twegġa' lilha nnifisha jew lill-haddiehor – 0.5 mg/kuljum.
- L-indikazzjonijiet l-oħra kollha – nofs l-inqas doża tal-adulti.

Id-doża ta' haloperidol tista' tiġi aġġustata skont ir-rispons tal-pazjent. F'pazjenti anzjani huwa rrakkomandat li d-doża tiżdied b'attenzjoni ftit ftit.

Id-doża massima f'pazjenti anzjani hija 5 mg/kuljum.

Doži aktar minn 5 mg/kuljum għandhom jittqiesu biss f'pazjenti li jkunu ttolleraw doži oġġla u wara stima mill-ġdid tal-profil tal-benefiċċju u r-riskju individwali tal-pazjent.

Indeboliment tal-kliwi

L-influenza ta' indeboliment tal-kliwi fuq il-farmakokinetika ta' haloperidol ma gietx ivvalutata. Ma huwa rrakkomandat l-ebda aġġustament fid-doża, iżda hija rrakkomandata l-kawtela meta jsir trattament ta' pazjenti b'indeboliment tal-kliwi. Madankollu, pazjenti b'indeboliment sever tal-kliwi jistgħu jkunu jehtieġu doża tal-bidu aktar baxxa, b'aġġustamenti sussegwenti li jsiru b'żidiet iżgħar u intervalli itwal minn dawk f'pazjenti mingħajr indeboliment tal-kliwi (ara sezzjoni 5.2).

Indeboliment tal-fwied

L-influwenza ta' indeboliment tal-fwied fuq il-farmakokinetika ta' haloperidol ma ġietx ivvalutata. Minhabba li haloperidol huwa mmetabolizzat b'mod estensiv fil-fwied, huwa rrakkomandat li d-doża tal-bidu titnaqqas bin-nofs, u d-doża tiġi aġġustata b'żidiet iżgħar u intervalli itwal minn dik f'pazjenti minghajr indeboliment tal-fwied (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.2).

Popolazzjoni pedjatrika

Pilloli:

Ir-rakkomandazzjonijiet dwar id-doża tal-pilloli HALDOL huma pprezentati f'Tabella 4.

Soluzzjoni orali:

Ir-rakkomandazzjonijiet dwar id-doża tas-soluzzjoni orali HALDOL huma pprezentati f'Tabella 4.

Tabella 4: Rakkomandazzjonijiet dwar id-doża ta' Haloperidol għall-popolazzjoni pedjatrika

Trattament ta' skizofrenja fl-adolesxenti li għandhom minn 13 sa 17-il sena meta trattamenti farmakoloġiċi ohra jkunu fallaw jew ma jkunux ittollerati • Id-doża rrakkomandata hija 0.5 sa 3 mg/kuljum, mogħti mill-ħalq maqsum f'aktar minn doża waħda (2 sa 3 darbiet kuljum). • Huwa rrakkomandat li jiġi stmat il-benefiċċju u r-riskju individwali meta jitqiesu doża ta' aktar minn 3 mg/kuljum. • Id-doża massima rrakkomandat huwa 5 mg/kuljum. • It-tul ta' żmien tat-trattament għandu jiġi vvalutat b'mod individwali.
Trattament ta' aggressjoni persistenti, severa fit-tfal u adolesxenti li għandhom minn 6 snin sa 17-il sena b'awtiżmu jew disturbi pervażivi tal-iżvilupp, meta trattamenti ohra jkunu fallaw jew ma jkunux ittollerati • Id-doża rrakkomandata hija 0.5 sa 3 mg/kuljum fi tfal li għandhom minn 6 snin sa 11-il sena u 0.5 sa 5 mg/kuljum f'adolesxenti li għandhom minn 12 sa 17-il sena, mogħtija mill-ħalq maqsuma f'aktar minn doża waħda (2 sa 3 darbiet kuljum). • Il-ħtieġa li t-trattament jitkompla għandha tiġi stmata mill-ġdid wara 6 ġimgħat.
Trattament ta' disturbi ta' tik, inkluż is-sindrom ta' Tourette, fi tfal u adolesxenti li għandhom minn 10 snin sa 17-il sena b'indeboliment sever wara li trattamenti edukattivi, psikoloġiċi u trattamenti farmakoloġiċi ohra jkunu fallaw • Id-doża rrakkomandata huma 0.5 sa 3 mg/kuljum fi tfal u adolesxenti li għandhom minn 10 snin sa 17-il sena, mogħtija mill-ħalq maqsuma f'aktar minn doża waħda (2 sa 3 darbiet kuljum). • Il-ħtieġa li t-trattament jitkompla għandha tiġi stmata mill-ġdid kull 6 xhur sa 12-il xahar.

Pilloli:

Is-sigurtà u l-effikaċja tal-pilloli HALDOL fit-tfal li għandhom anqas mill-etajiet iddefiniti fl-indikazzjonijiet ma ġewx determinati s'issa. M'hemmx dejta disponibbli għal tfal li għandhom anqas minn 3 snin.

Soluzzjoni orali:

Is-sigurtà u l-effikaċja tas-soluzzjoni orali ta' HALDOL fit-tfal li għandhom anqas mill-etajiet iddefiniti fl-indikazzjonijiet ma ġewx ddeterminati s'issa. M'hemmx dejta disponibbli għal tfal li għandhom anqas minn 3 snin.

Metodu ta' kif ghandu jinghata

Pilloli:

Il-pilloli HALDOL qeghdin biex jintużaw mill-halq.

Soluzzjoni orali:

Is-soluzzjoni orali ta' HALDOL qeghda biex tintuża mill-halq. Hija tista' tithallat mal-ilma biex tiffacilita l-ghoti tad-doża, izda m'ghandha tihallat ma' ebda likwidu iehor. Is-soluzzjoni ddilwita ghandha tittiehed immedjatament.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

- Sensitività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wiehed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1.
- Stat ta' koma.
- Depressjoni tas-sistema nervuża ċentrali (CNS, *central nervous system*).
- Marda tal-Parkinson.
- Dimenzja bil-korpi Lewy.
- Paralizi sopranukleari progressiva.
- Titwil magħruf tal-intervall QTc jew sindrom kongenitali ta' QT twil.
- Infart mijokardijaku riċenti akut.
- Insuffiċjenza tal-qalb mhix ikkumpensata.
- Storja medika ta' aritmija tal-ventrikulu jew torsades de pointes.
- Ipokalimja mhux ikkoreġuta.
- Trattament konkomitanti bi prodotti mediċinali li jtaqlu l-intervall QT (ara sezzjoni 4.5).

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Żieda fil-mortalità f'pazjenti anzjani bid-dimenzja

Każijiet rari ta' mewt zoptu ġew irrappurtati f'pazjenti psikjatriċi li jkunu qed jirċievu antipsikotiċi, inkluż haloperidol (ara sezzjoni 4.8).

Pazjenti anzjani bi psikożi marbuta mad-dimenzja li jiġu ttrattati b'antipsikotiċi jkunu f'riskju akbar ta' mewt. Analizi ta' sbatax-il studju kkontrollati bil-plaċebo (tul ta' żmien modali ta' 10 ġimgħat), l-aktar f'pazjenti li kienu qed jiehdu antipsikotiċi atipici, żvelat riskju ta' mewt bejn 1.6 u 1.7 darbi aktar fil-pazjenti ttrattati mir-riskju ta' mewt fil-pazjenti ttrattati bi plaċebo. Fuq perjodu ta' studju tipiku ikkontrollat ta' 10 ġimgħat, ir-rata ta' mewt f'pazjenti ttrattati b'antipsikotiċi kienet madwar 4.5%, meta mqabbla ma' rata ta' madwar 2.6% fil-grupp tal-plaċebo. Għalkemm il-kawżi tal-imwiet varjaw, il-biċċa l-kbira tal-imwiet deheru li fin-natura tagħhom kienu kardjovaskulari (eż., insuffiċjenza tal-qalb, mewt zoptu) jew infettivi (eż., pulmonite). Studji ta' osservazzjoni jissuggerixxu li t-trattament ta' pazjenti anzjani b'haloperidol huwa assoċjat ukoll ma' żieda fil-mortalità. Din l-assoċjazzjoni tista' tkun aktar qawwija għal haloperidol milli għal prodotti mediċinali antipsikotiċi atipici, tidher l-aktar fl-ewwel 30 jum wara l-bidu tat-trattament, u tippersisti għal mill-inqas 6 xhur. Il-grad sa fejn din l-assoċjazzjoni tista' tkun attribwita għall-prodott mediċinali, pjuttost milli għall-karatteristiċi li jfixxlu tal-pazjent, għadu ma ġiex spjegat.

Effetti kardjovaskulari

Flimkien ma' mewt zoptu, ġew irrappurtati titwil tal-QTc u/jew aritmiji tal-ventrikulu b'haloperidol (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.8). Ir-riskju ta' dawn l-avvenimenti jidher li jiżdied b'dożi għoljin, b'konċentrazzjonijiet għoljin fil-plażma, f'pazjenti predisposti jew b'użu parenterali, b'mod partikolari għoti fil-vini.

Hija rrakkomandata l-kawtela f'pazjenti bi bradikardija, mard kardijaku, storja fil-familja ta' titwil tal-intervall QTc jew storja ta' esponiment qawwi għall-alkohol. Hija rrakkomandata l-kawtela wkoll f'pazjenti bil-possibbiltà ta' konċentrazzjonijiet għoljin fil-plażma (ara sezzjoni 4.4, Metabolizzaturi dghajfa ta' CYP2D6).

Hija rrakkomandata li tittiehed linja bażi tal-ECG qabel it-trattament. Matul it-terapija, il-htieġa għall-monitoraġġ bl-ECG għal titwil tal-intervall QTc u għal aritmiji tal-ventrikulu għandha tiġi stmata fil-pazjenti kollha. Waqt li wiehed ikun fuq it-terapija, huwa rakkomandat li titnaqqas id-doża jekk l-intervall QTc jitwal, iżda haloperidol għandu jitqwaqqaf jekk il-QTc jaqbez il-500 ms.

Disturbi fl-elettroliti bħal ipokalemija u ipomagnesimja jżidu r-riskju għal aritmiji tal-ventrikulu u għandhom jiġu kkoreġuti qabel ma jinbeda trattament b'haloperidol. Għalhekk, huwa rakkomandat li jsir monitoraġġ tal-elettroliti fil-linja bażi u perijodiku.

Gew irrappurati wkoll takikardija u ipotensjoni (inkluż ipotensjoni ortostatika) (ara sezzjoni 4.8). Hija rrakkomandata l-kawtela meta haloperidol jingħata lill-pazjenti li jkollhom ipotensjoni jew ipotensjoni ortostatika.

Avvenimenti ċerebrovaskulari

Fi studji kliniċi, arbitrarji, kkontrollati bi placebo fil-popolazzjoni bid-dimenzja, kien hemm żieda ta' madwar 3 darbiet fir-riskju ta' avvenimenti ċerebrovaskulari avversi b'xi antipsikotiċi atipiċi. Studji ta' osservazzjoni li qabblu r-rata ta' puplesija f'pazjenti anzjani li kienu esposti għal kwalunkwe antipsikotiku mar-rata ta' puplesija f'dawk li ma kinux esposti għal prodotti mediċinali bħal dawn sabu żieda fir-rata ta' puplesija fost il-pazjenti esposti. Din iż-żieda tista' tkun akbar bil-butyrophenones kollha, inkluż haloperidol. Il-mekkaniżmu għal din iż-żieda fir-riskju mhuwiex magħruf. Żieda fir-riskju ma tistax tiġi eskluża għal popolazzjonijiet oħra ta' pazjenti. HALDOL għandu jintuża b'kawtela f'pazjenti b'fatturi ta' riskju għal puplesija.

Sindrom newrolettiku malinn

Haloperidol ġie assoċjat ma' sindrom newrolettiku malinn: rispons idjosinkratiku rari kkaratterizzat minn ipertermja, riġidità mifruxa fil-muskoli, instabbiltà awtonomika, koxjenza mibdula u żieda fil-livelli ta' creatine phosphokinase fis-serum. Ipertermja ta' spiss tkun sinjal bikri ta' dan is-sindrom. It-trattament antipsikotiku għandu jitwaqqaf immedjatament u għandhom jinbdew terapija xierqa ta' sostenn u monitoraġġ b'attenzjoni.

Diskajneżja tardiva

Diskajneżja tardiva tista' tidher f'xi pazjenti fuq terapija fit-tul jew wara twaqqif tal-prodott mediċinali. Is-sindrom huwa kkaratterizzat l-aktar minn movimenti ritmiċi involontarji tal-ilsien, tal-wiċċ, tal-haq jew tax-xedaq. F'xi pazjenti il-manifestazzjonijiet jistgħu jkunu permanenti. Is-sindrom jista' jinheba meta t-trattament jerga' jinbeda, meta d-doża tiżdied jew meta ssir bidla għal antipsikotiku ieħor. Jekk jidhru s-sinjali u s-sintomi ta' diskajneżja tardiva, għandu jitqies it-twaqqif tal-antipsikotiċi kollha inkluż HALDOL.

Sintomi ekstrapiramidali

Jistgħu jsehhu sintomi ekstrapiramidali (eż. roġħda, riġidità, bzieq żejjed, bradikinesja, akatisja, distonja akuta). L-użu ta' haloperidol ġie assoċjat mal-iżvilupp ta' akatisja, kkaratterizzata minn nuqqas ta' kwiet u htieġa li wiehed jiċċaqlaq li skont l-individwu tista' ma tkunx pjaċevoli jew tohloq ansjetà kbira, ta' spiss akkumpanjata minn inabbiltà li wiehed joqgħod bilqegħda jew bilwieqfa bla ma jiċċaqlaq. Dan x'aktarx li jiġri l-aktar fl-ewwel ftit ġimgħat ta' trattament. F'pazjenti li jżviluppaw dawn is-sintomi, żieda fid-doża tista' tkun ta' hsara.

Distonja akuta tista' ssehh matul l-ewwel ftit jiem ta' trattament b'HALDOL, iżda ġie rrapportat ukoll bidu tagħha aktar tard kif ukoll bidu wara żidiet fid-doża. Sintomi distoniċi jistgħu jinkludu, iżda

mhumieħ limitati għal, tortikollis, tkerrieh tal-wiċċ, trismus, ilsien johroġ 'il barra, u movimenti mhux normali tal-ġhajnejn, inkluż ħarsa fissa 'il fuq involontarja u fit-tul. L-irġiel u gruppi ta' etajiet iżgħar jkunu f'riskju akbar li jkollhom reazzjonijiet bħal dawn. Distonja akuta tista' tkun teħtieġ twaqqif tal-prodott mediċinali.

Prodotti mediċinali tat-tip antikolinerġiku kontra l-parkinson jistgħu jiġu ordnati b'riċetta skont il-ħtieġa biex jiġu mmanigġjati s-sintomi ekstrapiramidali, iżda huwa rrakkomandat li huma ma jiġux ordnati b'mod regolari bħala prevenzjoni. Jekk ikun meħtieġ trattament konkomittanti bi prodott mediċinali kontra l-parkinson, huwa jista' jkollu jitkompla wara li HALDOL jitwaqqaf jekk it-tneħħija tiegħu mill-ġisem tkun aktar malajr minn dik ta' haloperidol sabiex jiġi evitat l-iżvilupp jew l-aggravar tas-sintomi ekstrapiramidali. Iż-żieda possibbli fil-pressjoni intraokulari għandha titqies meta prodott mediċinali antikolinerġiċi, inkluż prodott mediċinali kontra l-parkinson, jingħataw flimkien ma' HALDOL.

Aċċessjonijiet/konvulżjonijiet

Ġie rrapportat li jisgħu jiġu kkawżati aċċessjonijiet permezz ta' haloperidol. Hija rrakkomandata l-kawtela f'pazjenti li jsufu minn epilessija u f'kondizzjonijiet li jippredisponu għal aċċessjonijiet (eż. twaqqif tal-alkohol u ħsara fil-moħħ).

Thassib dwar il-fwied u l-marrara

Minhabba li haloperidol jiġi metabolizzat fil-fwied, huma rrakkomandati aġġustament fid-doża u kawtela f'pazjenti b'indeboliment tal-fwied (ara sezzjonijiet 4.2 u 5.2). Ġew irrappurtati każijiet iżolati ta' anormalitajiet fil-funzjoni tal-fwied jew epatite, il-biċċa l-kbira kolestatika (ara sezzjoni 4.8).

Thassib dwar is-sistema endokrinarja

Thyroxin jista' jiffaċilita t-tossiċità ta' haloperidol. Terapija antipsikotika f'pazjenti b'ipertirojdiżmu għandha tintuża biss b'kawtela u għandha dejjem tkun akkumpanjata b'terapija biex jinkiseb stat ewtirojde.

Effetti tal-antipsikotiċi fuq l-ormoni jinkludu iperprolaktinimja, li tista' tikkawża galaktorea, ġinekomastja, u oligomenorrea jew amenorrea (ara sezzjoni 4.8). Studji ta' kulturi ta' ċelluli jissuggerixxu li t-tkabbir taċ-ċelluli f'tumuri tas-sider tal-bniedem jista' jkun stimulat mill-prolaktin. Ghalkemm ma ntweriet l-ebda assoċjazzjoni ċara bejn l-ġħoti ta' antipsikotiċi u tumuri tas-sider tal-bniedem fi studji kliniċi u epidemjoloġiċi, hija rrakomandata l-kawtela f'pazjenti bi storja medika rilevanti. HALDOL għandu jintuża b'kawtela f'pazjenti b'iperprolaktinimja preżenti minn qabel u f'pazjenti li jista' jkun li għandhom tumuri dipendenti mill-prolaktin (ara sezzjoni 5.3).

L-ipogliċemija u s-sindrom ta' sekrezzjoni mhux xierqa ta' ormon antidijuretiku ġew irrappurtati b'haloperidol (ara sezzjoni 4.8).

Tromboemboliżmu fil-vini

Kienu rrapportati każijiet ta' tromboemboliżmu fil-vini (VTE - *venous thromboembolism*) b'antipsikotiċi. Minhabba li pazjenti ttrattati b'antipsikotiċi spiss ikollhom fatturi ta' riskju akkwiziti għal VTE, il-fatturi kollha possibbli ta' riskju għal VTE għandhom jiġu identifikati qabel u waqt it-trattament b'HALDOL u għandhom jittieħdu miżuri ta' prevenzjoni.

Rispons għat-trattament u twaqqif

Fl-iskizofrenja, ir-rispons għal trattament antipsikotiku jista' jdum ma jseħħ.

Jekk l-antipsikotiċi jitwaqqfu, ir-rikorrenza tas-sintomi marbuta mal-kundizzjoni li kkawżathom jistgħu ma jkunux apparenti għal diversi ġimgħat jew xhur.

Kien hemm rapporti rari hafna ta' sintomi akuti ta' twaqqif (inkluż nawsja, rimettar u insomnja) wara twaqqif f'daqqa ta' dozi għoljin ta' antipsikotiċi. Huwa rrakkomandat tnaqqis bil-mod il-mod bħala prekawzjoni.

Pazjenti b'depressjoni

Huwa rrakkomandat li HALDOL ma jintużax wahdu f'pazjenti li fihom id-depressjoni hija predominanti. Huwa jista' jingħata flimkien ma' antidepressanti biex jitratta dawk il-kondizzjonijiet fejn id-depressjoni u l-psikozi jeżistu flimkien (ara sezzjoni 4.5).

Bidla minn manija għal depressjoni

Fit-trattament tal-episodji manjaċi tad-disturb bipolari hemm riskju li l-pazjenti jaqilbu minn manija għal depressjoni. Il-monitoraġġ ta' pazjenti għall-bidla għal episodju depressiv bir-riskji li dan iġib miegħu, bħal komportament ta' suwiċidju, huwa importanti sabiex wiehed jintervjeni meta jseħħu bidliet bħal dawn.

Metabolizzaturi dgħajfa ta' CYP2D6

HALDOL għandu jintuża b'kawtela f'pazjenti li huma magħrufa li huma metabolizzaturi dgħajfa taċ-ċitokrom P450 (CYP) 2D6 u li flimkien miegħu jingħataw inibitur ta' CYP3A4.

Popolazzjoni pedjatrika

Dejta ta' sigurtà disponibbli fil-popolazzjoni pedjatrika tindika riskju ta' żvilupp ta' sintomi ekstrapiramidali, inkluż diskajneżja tardiva, u sedazzjoni. Hija disponibbli dejta limitata dwar sigurtà fuq tul ta' żmien.

Eċċipjent

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

4.5 Interazzjoni ma' prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta' interazzjoni

Studji ta' interazzjoni twettqu biss f'adulti.

Effetti kardjovaskulari

HALDOL huwa kontraindikata flimkien ma' prodotti mediċinali magħrufa li jtaqlu l-intervall QTc (ara sezzjoni 4.3). Eżempji jinkludu:

- Antiarritmiċi tal-klassi IA (eż. disopyramide, quinidine).
- Antiarritmiċi tal-klassi III (eż. amiodarone, dofetilide, dronedarone, ibutilide, sotalol).
- Ċerti antidepressanti (eż. citalopram, escitalopram).
- Ċerti antibijotiċi (eż. azithromycin, clarithromycin, erythromycin, levofloxacin, moxifloxacin, telithromycin).
- Antipsikotiċi oħra (eż. derivati ta' phenothiazine, sertindole, pimozide, ziprasidone)
- Ċerti antifungali (eż. pentamidine).
- Ċerti mediċini kontra l-malarja (eż. halofantrine).
- Ċerti prodotti mediċinali gastrointestinali (eż. dolasetron).
- Ċerti prodotti mediċinali li jintużaw għall-kanċer (eż. toremifene, vandetanib).
- Ċerti prodotti mediċinali oħra (eż. bepridil, methadone).

Din il-lista mhijiex eżawrjenti.

Hija rrakkomandata l-kawtela meta HALDOL jintuża flimkien ma' prodotti mediċinali magħrufa li jikkawżaw żbilanċ fl-elettroliti (ara sezzjoni 4.4).

Prodotti mediċinali li jistgħu jżidu l-konċentrazzjonijiet ta' haloperidol fil-plażma

Haloperidol jiġi mmetabolizzat permezz ta' diversi rotot (ara sezzjoni 5.2). Is-sensiela ta' reazzjonijiet maġġuri huma glukuronidazzjoni u tnaqqis tal-ketone. Is-sistema tal-enzima taċ-ċitokrom P450 hija involuta wkoll, b'mod partikolari CYP3A4 u, fi grad inqas, CYP2D6. Inibizzjoni ta' dawn ir-rotot ta' metabolizmu permezz ta' prodott mediċinali ieħor jew tnaqqis fl-attività tal-enzima CYP2D6 jistgħu jwasslu għal żieda fil-konċentrazzjonijiet ta' haloperidol. L-effett ta' inibizzjoni ta' CYP3A4 u ta' tnaqqis fl-attività tal-enzima CYP2D6 jista' jkun addittiv (ara sezzjoni 5.2). Abbażi ta' informazzjoni limitata u xi drabi konfligġenti, iż-żieda possibbli fil-konċentrazzjonijiet ta' haloperidol fil-plażma meta jingħata inibitur ta' CYP3A4 u/jew CYP2D6 flimkien miegħu tista' tvarja minn 20 sa 40%, għalkemm f'xi każijiet, kienu rrappurtati żidiet sa 100%. Eżempji ta' prodotti mediċinali li jistgħu jżidu l-konċentrazzjonijiet ta' haloperidol fil-plażma (abbażi ta' esperjenza klinika jew tal-mekkanizmu ta' interazzjoni bejn il-mediċini) jinkludu:

- Inibituri ta' CYP3A4 – alprazolam, fluvoxamine, indinavir, itraconazole, ketoconazole, nefazodone, posaconazole, saquinavir, verapamil, voriconazole.
- Inibituri ta' CYP2D6 – bupropion, chlorpromazine, duloxetine, paroxetine, promethazine, sertraline, venlafaxine.
- Inibituri kombinati ta' CYP3A4 u CYP2D6: fluoxetine, ritonavir.
- Mekkanizmu mhux ċert – buspirone.

Din il-lista mhijiex eżawrjenti.

Żieda fil-konċentrazzjonijiet ta' haloperidol fil-plażma tista' twassal għal żieda fir-riskji ta' avvenimenti avversi, inkluż titwil tal-intervall QTc (ara sezzjoni 4.4). Żidiet fil-QTc kienu osservati meta haloperidol ingħata flimkien ma' kombinazzjoni tal-inibituri metabolici ketoconazole (400 mg/kuljum) u paroxetine (20 mg/kuljum).

Huwa rrakkomandat li l-pazjenti li jiehdu haloperidol flimkien ma' prodotti mediċinali bħal dawn jiġu mmonitorjati għal sinjali jew sintomi ta' żieda jew tul aktar fl-effetti farmakoloġiċi ta' haloperidol, u d-doża ta' HALDOL titnaqqas skont kif ikun ikkunsidrat bħala meħtieġ.

Prodotti mediċinali li jistgħu jnaqqsu l-konċentrazzjonijiet ta' haloperidol fil-plażma

L-ġhoti ta' haloperidol flimkien ma' indutturi qawwija tal-enzimi ta' CYP3A4 jistgħu jnaqqsu l-konċentrazzjonijiet ta' haloperidol fil-plażma bil-mod il-mod tant li l-effikaċja tista' tonqos. Eżempji jinkludu:

- Carbamazepine, phenobarbital, phenytoin, rifampicin, St John's Wort (*Hypericum, perforatum*).

Din il-lista mhijiex eżawrjenti.

L-induzzjoni tal-enzima tista' tiġi osservata wara ftit jiem ta' trattament. L-induzzjoni massima tal-enzima ġeneralment tidher f'madwar ġimagħtejn u mbagħad tista' ddum għall-istess perjodu ta' żmien wara t-twaqqif tat-terapija bil-prodott mediċinali. Matul it-trattament flimkien ma' indutturi ta' CYP3A4, huwa rrakkomandat li l-pazjenti jiġu mmonitorjati u d-doża ta' HALDOL tiżdied skont kif ikun ikkunsidrat bħala meħtieġ. Wara t-twaqqif tal-induttur ta' CYP3A4, il-konċentrazzjoni ta' haloperidol tista' tiżdied bil-mod il-mod u għalhekk jista' jkun meħtieġ li tnaqqas id-doża ta' HALDOL.

Sodium valproate huwa magħruf li jinibixxi glukuronidazzjoni, iżda ma jaffetwax il-konċentrazzjonijiet ta' haloperidol fil-plażma.

L-effett ta' haloperidol fuq prodotti mediċinali ohra

Haloperidol jista' jżid id-depressjoni tas-CNS ikkaġunata mill-alkohol jew prodotti mediċinali li jiddepressaw is-CNS, inkluż ipnotiċi, sedattivi jew analgeziċi qawwija. Kien irrappurtat ukoll effett akbar fuq is-CNS, meta jingħata flimkien ma' methyldopa.

Haloperidol jista' jantagonizza l-azzjoni tal-adrenalina u prodotti mediċinali simpatomimetici ohra (eż. stimulant bħal amfetamini) u jdawwar bil-maqlub l-effetti ta' tnaqqis tal-pressjoni tad-demm ta' prodotti mediċinali li jimblukaw is-sistema adrenergika bħal guanethidine.

Haloperidol jista' jantagonizza l-effett ta' levodopa u agonisti ohra ta' dopamine.

Haloperidol huwa inibitur ta' CYP2D6. Haloperidol jinibixxi l-metabolizmu ta' antidepressanti triċikliċi (eż. imipramine, desipramine), b'hekk iżid il-koncentrazzjonijiet ta' dawn il-prodotti mediċinali fil-plażma.

Forom ohra ta' interazzjoni

F'każijiet rari is-sintomi li ġejjin kienu rrappurtati waqt l-użu ta' lithium flimkien ma' haloperidol: enċefalopatija, sintomi ekstrapiramidali, diskajneżja tardiva, sindrom newrolettiku malinn, sindrom akut tal-moħħ u koma. Il-parti l-kbira ta' dawn is-sintomi kienu riversibbli. Għadu mhux iġġerjat jekk dan jirrapprezentax entità klinika distinta.

Madankollu, huwa rrakkomandat li f'pazjenti li jkunu ttrattati b'lithium flimkien ma' HALDOL, it-terapija għandha titwaqqaf immedjatament jekk isehhu sintomi bħal dawn.

Ġie rrappurtat antagonizmu tal-effett tal-antikoagulant phenindione.

4.6 Fertilità, tqala u treddigh

Tqala

Ammont moderat ta' dejta dwar l-użu waqt it-tqala (aktar minn 400 riżultat ta' tqala) juri li m'hemm l-ebda effett ta' formazzjoni difettuża jew effetti tossiċi fil-fetu/tarbija tat-twelid wara l-użu ta' haloperidol. Madankollu kien hemm rapporti iżolati ta' każijiet ta' difetti tat-twelid wara esponiment tal-fetu għal haloperidol, l-aktar flimkien ma' prodotti mediċinali ohra. Studji f'annimali urew effetti tossiku fuq is-sistema riproduttiva (ara sezzjoni 5.3). Bħala prekawzjoni, l-aħjar huwa li tevita l-użu ta' HALDOL matul it-tqala.

Trabi tat-twelid esposti għal antipsikotiċi (inkluż haloperidol) waqt it-tielet trimestru tat-tqala jkunu f'riskju ta' reazzjonijiet avversi inkluż sintomi ekstrapiramidali u/jew ta' twaqqif tal-medicina li jistgħu jvarjaw fil-qawwa u t-tul tagħhom wara t-twelid. Kien hemm rapporti ta' agitazzjoni, ipertonja, ipotonja, roġħda, hedla tan-nġhas, għejja respiratorja, jew disturb fit-tisqija. Konsegwenza ta' dan, huwa rrakkomandat li trabi tat-twelid jiġu mmonitorjati b'attenzjoni.

Treddigh

Haloperidol huwa eliminat fil-halib tas-sider tal-bniedem. Ammonti żgħira ta' haloperidol instabu fil-plażma u fl-awrina ta' trabi tat-twelid li kienu qed jitreddghu minn ommijiet ittrattati b'haloperidol. M'hemmx informazzjoni biżżejjed dwar l-effetti ta' haloperidol fi trabi li qed jitreddghu. Għandha tittiehed deċizjoni jekk il-mara twaqqafx it-treddigh jew twaqqafx it-terapija b'HALDOL wara li jiġi kkunsidrat il-benefiċċju ta' treddigh għat-tarbija u l-benefiċċju ta' terapija għall-mara.

Fertilità

Haloperidol jgħolli l-livelli tal-prolaktin. Iperprolaktinimja tista' tissoppressa l-GnRH tal-ipotalamu, li jwassal għal tnaqqis fis-sekrezzjoni tal-gonadotropin mill-glandola pitwitarja. Dan jista' jinibixxi l-funzjoni riproduttiva billi jdgħajjed il-formazzjoni tal-isterojdi gonadali kemm f'pazjenti nisa kif ukoll irġiel (ara sezzjoni 4.4).

4.7 Effetti fuq il-hila biex issuq u thaddem magni

HALDOL għandu effett moderat fuq il-hila biex issuq u thaddem magni. Jista' jsehh xi grad ta' sedazzjoni jew indeboliment ta' attenzjoni, b'mod partikolari b'dozi oghla u fil-bidu tat-trattament u jista' jittqawwa permezz tal-alkohol. Huwa rrakkomandat li l-pazjenti jingħatalhom parir biex ma jsuqux u ma jhaddmux magni matul it-trattament, sakemm issir magħrufa s-suxxettibbiltà tagħhom.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Is-sigurtà ta' haloperidol giet ivvalutata f'284 pazjent ittrattati b'haloperidol li pparteċipaw fi 3 studji kliniċi kkontrollati bil-placebo u f'1,295 pazjent ittrattati b'haloperidol li pparteċipaw f'16-il studju kliniku kkontrollati b'kumparatur attiv fejn la l-investigaturi u lanqas l-individwi ma kienu jafu liema sustanza qed tintuża.

Abbazi ta' dejta kollettiva dwar sigurtà minn dawn l-istudji kliniċi, l-aktar reazzjonijiet avversi rrappurtati b'mod komuni kienu: disturb ekstrapiramidali (34%), insomnja (19%), aġitazzjoni (15%), iperkinjeżja (13%), uġiġh ta' ras (12%), disturb psikotiku (9%), depressjoni (8%), zieda fil-piż (8%), roġhda (8%), ipertonja (7%), ipotensjoni ortostatika (7%), distonja (6%) u hedla tan-nġhas (5%).

Barra dan, is-sigurtà ta' haloperidol decanoate giet ivvalutata f'410 pazjenti li pparteċipaw fi 3 studji ta' tqabbil bejn mediċini (1 li qabbel haloperidol decanoate versus fluphenazine u 2 li qabblu l-formulazzjoni ta' decanoate mal-formolazzjoni ta' haloperidol mill-ħalq), 9 studji fejn kemm l-investigaturi kif ukoll l-individwi kienu jafu liema sustanza qed tintuża u studju wiehed ta' rispons tad-doża.

Tabella 5 telenka r-reazzjonijiet avversi kif ġej:

- Irrappurtati fi studji kliniċi b'haloperidol.
- Irrappurtati fi studji kliniċi b'haloperidol decanoate u jikkonċernaw il-parti attiva.
- Minn esperjenza ta' wara t-tqegħid fis-suq b'haloperidol u haloperidol decanoate.

Il-frekwenzi tar-reazzjonijiet avversi huma bbażati fuq (jew stmati minn) provi kliniċi jew studji epidemjoloġiċi b'haloperidol, u kklassifikati bl-użu tal-konvenzjoni li ġejja:

Komuni ħafna: $\geq 1/10$
Komuni: $\geq 1/100$ sa $< 1/10$
Mhux komuni: $\geq 1/1,000$ sa $< 1/100$
Rari: $\geq 1/10,000$ sa $< 1/1,000$
Rari ħafna: $< 1/10,000$
Mhux magħrufa: ma tistax tittiehed stima mid-dejta disponibbli.

Ir-reazzjonijiet avversi huma ppreżentati skont il-klassi tas-Sistemi u tal-Organi u skont is-serjetà tagħhom b'dawk l-aktar serji mnizzla l-ewwel.

Tabella 5: Reazzjonijiet avversi

Klassi tas-Sistemi u tal-Organj	Reazzjoni Avversa				
	Frekwenza				
	Komuni Hafna	Komuni	Mhux Komuni	Rari	Mhux maghruf
Disturbi tad-demmi u tas-sistema limfatika			Lewkopenija		Panċitopenija Agranuloċitozi Tromboċitopenija Newtropenija
Disturbi fis-sistema immuni			Sensittività eċċessiva		Reazzjoni anafilattika
Disturbi fis-sistema endokrinarja				Iperprolaktinimja	Sekrezzjoni mhux xierqa tal-ormon antidijuretiku
Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni					Ipoglicemija
Disturbi psikjatriċi	Aġitazzjoni Insomnja	Disturb psikotiku Depressjoni	Stat ta' konfużjoni Telf ta' libido Tnaqqis fil-libido Nuqqas ta' kwiet		
Disturbi fis-sistema nervuża	Disturb ekstrapiramidali Iperkajnejza Ugħigh ta' ras	Diskajnejza tardiva Akatisja Bradikajnejza Diskajnejza Distonja Ipokineżja Ipertonja Sturdament Hedla tanngħas Rogħda	Konvulżjoni Parkinsoniżmu Sedazzjoni Gbid involontarju tal-muskoli	Sindrom newrolettiku malinn Funzjoni motorja ħażina Nistagmus	Akajnejza Rigidità bħal ta' rota tal-ingranaġġ Espressjoni tal-wiċċ bħal maskra
Disturbi fl-ghajnejn		Ħarsa fissa ġeneralment 'il fuq involontarja u fit-tul Disturb fil-vista	Vista mċajpra		
Disturbi fil-qalb			Takikardja		Fibrillazzjoni tal-ventrikulu Torsade de pointes Takikardija tal-ventrikulu Ekstrasistoli
Disturbi vaskulari		Ipotensjoni Ipotensjoni ortostatika			
Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali			Dispnea	Bronkospazmu	Edima fil-laringi Spazmu fil-laringi

Klassi tas-Sistemi u tal-Organj	Reazzjoni Avversa				
	Frekwenza				
	Komuni Hafna	Komuni	Mhux Komuni	Rari	Mhux maghruf
Disturbi gastrointestinali		Rimettar Nawsja Stitikezza Halq xott Ipersekrezzjon i tal-bżieq			
Disturbi fil-fwied u fil-marrara		Riżultat mhux normali għal- test tal- funzjoni tal- fwied	Epatite Suffejra		Indeboliment akut tal-fwied Kolestasi
Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta' taht il-ġilda		Raxx	Reazzjoni ta' sensittività eċċesiva għad- dawl Urtikarja Prurite Iperidroži		Angjoedima Dermatite bil-qxur Vaskulite lewkoklastika
Disturbi muskoluskelettri ċi u tat-tessuti konnettivi			Tortikollis Rigidità fil- muskoli Spazmi fil- muskoli Ebusija muskoluskelettri ka	Trismus Ġbid f'daqqa tal- muskoli	Rabdomijolisis
Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja		Żamma tal- awrina			
Kondizzjonijiet ta' waqt it-tqala, il-hlas u wara l-hlas					Sindrom ta' twaqqif ta' sustanza li tivvizzja fit-trabi tat-twelid (ara sezzjoni 4.6)
Disturbi fis-sistema riproduttiva u fis-sider		Impotenza	Amenorrea Galactorrea Dismenorrea Ugħigh fis-sider Skumdità fis- sider	Menorragija Disturb fil- menstrwazzjoni Funzjoni sesswali ħażina	Prijapiżmu Ginekomastja
Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta' mnejn jingħata			Ipertermja Edima Disturb fil-mixi		Mewt zoptu Edima fil-wiċċ Ipotermja
Investigazzjonijiet		Żieda fil-piż Tnaqqis fil-piż		Intervall QT imtawwal fuq l- elettrokardjogramma	

Titwil tal-intervall QT fuq l-elettrokardjogramma, arritmiji tal-ventrikulu (fibrillazzjoni tal-ventrikulu, takikardija tal-ventrikulu), torsade de pointes u mewt zoptu kienu rrapportati b'haloperidol.

Effetti tal-klassi tal-antipsikotiċi

Kien irrappurtat waqfien kardijaku b'antipsikotiċi.

Kienu rrappurtati każijiet ta' tromboemboliżmu fil-vini, inkluż każijiet ta' emboliżmu fil-pulmuni u każijiet ta' trombozi fil-vini fil-fond, b'antipsikotiċi. Il-frekwenza mhix magħrufa.

Rappurtar ta' reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali imnizzla f' [Appendiċi V](#).

4.9 Doża eċċessiva

Sintomi u sinjali

Il-manifestazzjonijiet ta' doża eċċessiva ta' haloperidol huma esagerazzjoni tal-effetti farmakoloġiċi u r-reazzjonijiet avversi magħrufa. L-aktar sintomi prominenti huma reazzjonijiet ekstrapiramidali, ipotensjoni u sedazzjoni severi. Reazzjoni ekstrapiramidali tidher bħala ebusija fil-muskoli u roġha mifruxa jew lokalizzata. Ipertensjoni minflok ipotensjoni hija possibbli wkoll.

F'każijiet estremi, il-pazjent ikun jidher fi stat ta' koma b'depressjoni respiratorja u ipotensjoni li tista' tkun severa biżżejjed biex tipproduċi stat bħal f'xokk. Għandu jitqies ir-riskju ta' aritmiji tal-ventrikulu, possibbilment assoċjati ma titwil tal-intervall QTc.

Trattament

Ma hemm l-ebda antidot speċifiku. It-trattament huwa wieħed ta' sostenn. L-effikaċja tal-faħam tal-kannol attivat ma gietx stabbilita. Id-dijalisi mhijiex irrakkomandata fit-trattament ta' doża eċċessiva minhabba li hija tneħhi biss ammonti żgħar ħafna ta' haloperidol (ara sezzjoni 5.2).

Għal pazjenti fi stat ta' koma, għandu jiġi stabbilit passagġ miftuħ tal-arja permezz ta' apparat mill-ħalq għall-faringi jew tubu ġewwa t-trakea. Depressjoni respiratorja tista' tkun tehtieg respirazzjoni artifiċjali.

Huwa rrakkomandat li jiġu mmonitorjati l-ECG u s-sinjali vitali, u li l-monitoraġġ jtkompla sakemm l-ECG tkun normali. Huwa rrakkomandat trattament ta' aritmiji severi b'miżuri xierqa kontra l-aritmiji.

Pressjoni baxxa u kollass ċirkulatorju jistgħu jiġu kontrobattuti bl-użu ta' fluwidi minn ġol-vini, plażma jew albumina kkonċentrata u sustanzi vasopressuri, bħal dopamine jew noradrenaline. L-adrenalina m'għandhiex tintuża minhabba li hija tista' tikkawża ipotensjoni severa fil-preżenza ta' haloperidol.

F'każijiet ta' reazzjonijiet ekstrapiramidali severi, huwa rrakkomandat l-ġhoti parenterali ta' prodott mediċinali kontra l-parkinson.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: psikolettici; antipsikotiċi; derivati ta' butyrophenone, kodiċi ATC: N05AD01.

Mekkaniżmu ta' azzjoni

Haloperidol huwa antipsikotiku li jagħmel parti mill-grupp ta' butyrophenones. Huwa antagonist ċentrali potenti tar-riċettur tat-tip 2 tad-dopamina, u bid-dożi rrakkomandati, għandu attività adrenergika α -1 baxxa u m'għandu l-ebda attività antiistamnergika jew antikolnergika.

Effetti farmakodinamici

Haloperidol jissopressa delużjonijiet u alluċinazzjonijiet bħala kosegwenza diretta ta' imblokk tal-ghoti ta' sinjali dopaminergici fis-sensiela ta' reazzjonijiet mesolimbici. L-effett ta' imblokk ċentrali tad-dopamina għandu attività fuq il-ganglia bażali (*nigrostriatal bundles*). Haloperidol jikkawża sedazzjoni psikomotorja effiċjenti, li jispjega l-effett favorevoli fuq il-manija u sindromi ohra ta' aġitazzjoni.

L-attività fuq il-ganglia bażali probabbilment hija l-kawża tal-effetti motorji ekstrapiramidali mhux mixtieqa (distonja, akatisja u parkinsoniżmu).

L-effetti antidopaminergici ta' haloperidol fuq il-*lactotropes* fil-glandola pitwitarja anterjuri jispjegaw l-iperprolaktinimja minhabba inibizzjoni ta' sekrezzjoni tal-prolaktin minn inibizzjoni tonika medjata minn dopamine.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Il-bijodisponibilità medja ta' haloperidol wara l-ghoti tal-pillola jew tas-soluzzjoni orali hija bejn 60 u 70%. L-ogħla livelli ta' haloperidol fil-plażma ġeneralment jinkisbu fi żmien sagħtejn sa 6 sigħat wara għoti ta' doża mill-halq. Kienet osservata varjabilità kbira fil-koncentrazzjonijiet tal-plażma bejn l-individwi. L-istat fiss jintlaħaq fi żmien ġimgha mill-bidu tat-trattament.

Distribuzzjoni

Il-medja tal-irbit ta' haloperidol mal-proteini tal-plażma fl-adulti hija madwar 88 sa 92%. Hemm varjabilità kbira bejn l-individwi għall-irbit mal-proteini tal-plażma. Haloperidol jiġi ddistribwit malajr f'diversi tessuti u organi, kif indikat permezz tal-volum kbir ta' distribuzzjoni (valuri medji 8 sa 21 l/kg wara għoti ta' doži gol-vini). Haloperidol jgħaddi faċilment mid-demm għall-moħħ. Huwa jgħaddi wkoll mill-plaċenta u jitneħħa fil-halib tas-sider.

Bijotrasformazzjoni

Haloperidol huwa metabolizzat b'mod estensiv fil-fwied. Is-sensiela prinċipali ta' reazzjonijiet metabolici ta' haloperidol fil-bnedmin tinkludi glukuronidazzjoni, tnaqqis tal-*ketone*, *N-dealkylation* ossidattiva u formazzjoni ta' metaboliti tal-*pyridinium*. Il-metaboliti ta' haloperidol mhumix meqjusa li jagħtu kontribut sinifikanti għall-attività tiegħu; madankollu, is-sensiela ta' reazzjonijiet ta' tnaqqis tirrapreżenta madwar 23% tal-bijotrasformazzjoni, u konverżjoni tal-metabolit imnaqqas ta' haloperidol lura għal haloperidol ma tistax tiġi eskluża kompletament. L-enzimi CYP3A4 u CYP2D6 taċ-ċitokrom P450 huma involuti fil-metaboliżmu ta' haloperidol. Inibizzjoni jew induzzjoni ta' CYP3A4, jew inibizzjoni ta' CYP2D6, jistgħu jaffettwaw il-metaboliżmu ta' haloperidol. Tnaqqis fl-attività tal-enzima CYP2D6 jista' jwassal għal zieda fil-koncentrazzjonijiet ta' haloperidol.

Eliminazzjoni

Il-*half-life* terminali ta' eliminazzjoni ta' haloperidol hija madwar 24 siegħa (firxa ta' medji ta' 15-il siegħa sa 37 siegħa) wara għoti mill-halq. It-tneħħija apparenti ta' haloperidol wara għoti ekstrasvaskulari tvarja minn 0.9 sa 1.5 l/siegħa/kg u jitnaqqas f'metabolizzaturi dgħajfa ta' CYP2D6. Attività mnaqqsa tal-enzima CYP2D6 tista' twassal għal zieda fil-koncentrazzjonijiet ta' haloperidol.

Il-varjabilità bejn l-individwi (koeffiċjent ta' varjazzjoni, %) fit-tnehhija ta' haloperidol kienet stmata li hija 44% fl-analiżi farmakokinetika ta' popolazzjoni f'pazjenti bl-iskizofrenja. Wara għoti ta' haloperidol mill-vini, 21% tad-doża kienet eliminata fl-ippurġar u 33% fl-awrina. Anqas minn 3% tad-doża titneħħa mhux mibdula fl-awrina.

Linearità/nuqqas ta' linearità

Teżisti relazzjoni lineari bejn id-doża ta' haloperidol u l-konċentrazzjonijiet fil-plażma fl-adulti.

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani

Il-konċentrazzjonijiet ta' haloperidol fil-plażma f'pazjenti anzjani kienu oġġla minn ta' adulti iżgħar li ngħataw l-istess doża. Riżultati minn studji kliniċi żgħar jissuġġerixxu tnehhija ta' haloperidol inqas u half-life ta' eliminazzjoni itwal f'pazjenti anzjani. Ir-riżultati qegħdin fil-varjabilità osservata tal-farmakokinetika ta' haloperidol. Huwa rrakkomandat aġġustament fid-doża ta' pazjenti anzjani (ara sezzjoni 4.2).

Indeboliment tal-kliewi

L-influwenza ta' indeboliment tal-kliewi fuq il-farmakokinetika ta' haloperidol ma gietx ivvalutata. Madwar terz tad-doża ta' haloperidol jitneħħa fl-awrina, l-aktar bħala metaboliti. Anqas minn 3% mill-haloperidol li jingħata jiġi eliminat mhux mibdul fl-awrina. Il-metaboliti ta' haloperidol mhumieq meqjusa li jagħtu kontribut sinifikanti għall-attività tiegħu; għalkemm għall-metabolit imnaqqas ta' haloperidol konverżjoni lura għal haloperidol ma tistax tiġi eskluża kompletament. Anke jekk indeboliment tal-funzjoni tal-kliewi mhijiex mistennija li taffettwa l-eliminazzjoni ta' haloperidol sa punt rilevanti b'mod kliniku, hija rrakomandata l-kawtela f'pazjenti b'indeboliment tal-kliewi, u speċjalment dawk b'indeboliment sever tal-kliewi, minhabba l-half-life twila ta' haloperidol u l-metabolit imnaqqas tiegħu, u l-possibbiltà ta' akkumulazzjoni (ara sezzjoni 4.2).

Minhabba l-volum ta' distibuzzjoni kbir ta' haloperidol u l-irbit kbir tiegħu mal-proteini, ammonti żgħar hafna biss jitneħħew permezz tad-dijalisi.

Indeboliment tal-fwied

L-influwenza ta' indeboliment tal-fwied fuq il-farmakokinetika ta' haloperidol ma gietx ivvalutata. Madankollu, indeboliment tal-fwied jista' jkollu effetti sinifikanti fuq il-farmakokinetika ta' haloperidol minhabba li huwa jiġi mmetabolizzat b'mod estensiv fil-fwied. Għalhekk huwa rrakkomandat aġġustament fid-doża u hija rrakkomandata l-kawtela f'pazjenti b'indeboliment tal-fwied (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.4).

Popolazzjoni pedjatrika

Dejta limitata dwar konċentrazzjoni fil-plażma giet stabbilita fi studji pedjatriċi inkluż 78 pazjent b'disturbi varji (skizofrenja, disturbi psikotiċi, sindrom ta' Tourette, awtiżmu) li rċievu doži ta' haloperidol mill-halq sa massimu ta' 30 mg/kuljum. Dawn l-istudji inkludew l-aktar tfal u adolexxenti b'età bejn sentejn u 17-il sena. Konċentrazzjonijiet fil-plażma mkejla f'punti ta' żmien differenti wara tulijiet ta' żmien differenti ta' trattament, kienu jew ma jistgħux jitkejlu jew kienu fuq firxa sa massimu ta' 44.3 ng/ml. Bhal fl-adulti, kienet osservata varjabilità kbira fil-konċentrazzjonijiet fil-plażma bejn l-individwi. Kien hemm tendenza għal half-lives iqsar fit-tfal meta mqabbla mal-adulti.

F'żewġ studji fi tfal li kienu qed jirċievu trattament b'haloperidol għal tiks u sindrom ta' Tourette, rispons pożittiv kien assoċjat ma' konċentrazzjonijiet ta' nanogramma 1 sa 4 ng/ml fil-plażma.

Relazzjonijiet farmakokinetiċi/farmakodinamiċi

Konċentrazzjonijiet terapewtiċi

Abbażi ta' dejta ppublikata minn hafna studji kliniċi, rispons terapewtiku jinkiseb fil-biċċa l-kbira tal-pazjenti bi skizofrenja akuta jew kronika b'konċentrazzjonijiet fil-plażma ta' 1 sa 10 ng/ml. Sottosett ta' pazjenti jistgħu jkunu jeħtieġu konċentrazzjonijiet akbar konsegwenza ta' varjabilità kbira bejn individwu u ieħor fil-farmakokinetika ta' haloperidol.

F'pazjenti bl-ewwel episodju ta' skizofrenja, rispons terapewtiku jista' jinkiseb b'konċentrazzjonijiet baxxi ta' 0.6 sa 3.2 ng/ml, kif stmat abbażi ta' kejl tal-okkupanza tar-riċettur D₂ u jekk wieħed jassumi li livell ta' okkupanza tar-riċettur D₂ ta' 60 sa 80% huwa l-aktar xieraq biex jinkiseb rispons terapewtiku u jiġu limitati s-sintomi ekstrapiramidali. Bħala medja, konċentrazzjonijiet f'din il-firxa jinkisbu b'dożi ta' 1 mg sa 4 mg kuljum.

Minhabba l-varjabilità kbira li hemm bejn individwu u ieħor fil-farmakokinetika ta' haloperidol u fir-relazzjoni bejn il-konċentrazzjoni u l-effett, huwa rrakkomandat li d-doża individwali ta' haloperidol tiġi aġġustata abbażi tar-rispons tal-pazjent, fejn għandha titqies dejta li tissuggerixxi dewmien ta' 5 ijiem biex jintlaħaq nofs ir-rispons terapewtiku massimu. Il-kejl tal-konċentrazzjonijiet ta' haloperidol fid-demm jista' jitqies f'kazijiet individwali.

Effetti kardjovaskulari

Ir-riskju ta' tul fl-intervall QTc jiżdied mad-doża ta' haloperidol u mal-konċentrazzjonijiet ta' haloperidol fil-plażma.

Sintomi ekstrapiramidali

Sintomi ekstrapiramidali jistgħu jseħħu fil-firxa terapewtika, għalkemm il-frekwenza generalment hija akbar b'doži li jipproduċu konċentrazzjonijiet oġhla minn dawk terapewtiċi.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku bbażat fuq studji konvenzjonali ta' effett tossiku minn doži ripetuti u effett tossiku fuq il-ġeni, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin. Fl-annimali gerriema, l-ghoti ta' haloperidol werja tnaqqis fil-fertilità, teratoġeniċità limitata kif ukoll effetti tossiċi għall-embriju.

Fi studju dwar karċinoġeniċità ta' haloperidol, deħru żidiet dipendenti mid-doża f'adenomi tal-glandola pitwitarja u karċinomi tal-glandola mammarja fil-ġrieden nisa. Dawn it-tumuri jistgħu jiġu kkawżati minn antagoniżmu fit-tul ta' dopamine D₂ u iperprolaktinimja. Ir-rilevanza ta' dawn is-sejbiet dwar tumuri fil-firien f'termini ta' riskju għall-bniedem mhijiex magħrufa.

Haloperidol intwera li jimblokka l-kanal kardjaku hERG *in vitro* f'diversi studji ppubblikati. F'numru ta' studji *in vivo*, l-ghoti ta' haloperidol mill-vini f'xi annimali bħala mudelli kkawża titwil sinifikanti fl-intervall QTc b'doži ta' madwar 0.3 mg/kg, li jipproduċu livelli tas-C_{max} fil-plażma li kienu mill-inqas 7 sa 14-il darba aktar mill-konċentrazzjonijiet terapewtiċi ta' 1 sa 10 ng/ml fil-plażma li kienu effettivi fil-biċċa l-kbira tal-pazjenti fi studji kliniċi. Dawn id-doži fil-vini, li tawlu l-intervall QTc, ma kkawżawx aritmiji. F'xi studji fl-annimali, doži oġhla ta' haloperidol mill-vini ta' 1 mg/kg jew aktar ikkawżaw titwil fl-intervall QTc u/jew aritmiji tal-ventrikulu f'livelli tas-C_{max} fil-plażma li kienu mill-inqas 38 sa 137 darba oġhla mill-konċentrazzjonijiet terapewtiċi fil-plażma li kienu effettivi fil-maġġoranza tal-pazjenti fi studji kliniċi.

6. TAGHRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta' eċċipjenti

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

6.2 Inkompatibbilitajiet

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta' dak li hemm ġo fih

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittiehdu meta jintrema

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa' wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7. ID-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

{Isem u indirizz}

<{tel}>

<{fax}>

<{e-mail}>

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: {JJ xahar SSSS}

Data tal-aħħar tiġdid: {JJ xahar SSSS}

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

10. DATA TA' REVIŻJONI TAT-TEST

{XX/SSSS}

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

HALDOL u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 5 mg/ml soluzzjoni għall-injezzjoni

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

2. GHAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-injezzjoni.

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

4. TAGHRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Is-soluzzjoni għall-injezzjoni ta' HALDOL hija indikata f'pazjenti adulti għal:

- Kontroll malajr ta' aġitazzjoni psikomotorja severa akuta assoċjata ma' disturb psikotiku jew episodji manijaci ta' disturb bipolari I meta terapija orali ma tkunx xierqa.
- Trattament akut ta' delirju meta trattamenti mhux farmakoloġiċi jkun fuq il-lejw.
- Trattament ta' korea minn hafifa sa moderata tal-marda ta' Huntington, meta prodotti mediċinali oħra ma jkunux effettivi jew ittollerati, u terapija orali ma tkunx xierqa.
- Profilassi ta' nawsjia u rimettar wara operazzjoni f'pazjenti b'riskju minn moderat sa qawwi mogħtija waħedha jew flimkien ma' sustanzi oħra, meta prodotti mediċinali oħra ma jkunux effettivi jew ittollerati.
- Trattament ta' nawsjia u rimettar wara operazzjoni mogħtija flimkien ma' sustanzi oħra meta prodotti mediċinali oħra ma jkunux effettivi jew ittollerati.

4.2 Pożoloġija u metodu ta' kif għandu jingħata

Pożoloġija

Adulti

Fil-bidu hija rakkomandata doża baxxa, li sussegwentement tista' tiġi aġġustata skont ir-rispons tal-pazjent. Il-pazjenti għandhom jinżammu dejjem fuq l-aktar doża minima effettiva (ara sezzjoni 5.2).

Ir-rakkomandazzjonijiet għad-doża tas-soluzzjoni għall-injezzjoni ta' HALDOL huma ppreżentati f'Tabella 1.

Tabella 1: Rakkomandazzjonijiet għad-doża ta' Haloperidol għall-adulti li għandhom 18-il sena u aktar

Kontroll malajr ta' aġitazzjoni psikomotorja severa akuta assoċjata ma' disturb psikotiku jew episodji manijaċi ta' disturb bipolari I meta terapija orali ma tkunx xierqa • 5 mg minn ġol-muskolu. • Jista' jiġi ripetut kull siegħa sakemm jinkiseb kontroll suffiċjenti tas-sintomi. • Fil-biċċa l-kbira tal-pazjenti, doži sa 15-il mg/kuljum huma suffiċjenti. Id-doża massima hija 20 mg/kuljum. • It-tkomplija tal-użu ta' HALDOL għandha tiġi vvalutata minn kmieni fit-trattament (ara sezzjoni 4.4). It-trattament bis-soluzzjoni għall-injezzjoni ta' HALDOL għandu jitwaqqaf hekk kif ikun indikat b'mod kliniku u, jekk ikun meħtieġ aktar trattament, haloperidol mill-ħalq għandu jinbada bir-rata ta' konverżjoni tad-doża ta' 1:1 segwita minn aġġustament fid-doża skont ir-rispons kliniku.
Trattament akut ta' delirju meta trattamenti mhux farmakoloġiċi jkun fuq il-lejw • 1 mg sa 10 mg minn ġol-muskolu. • It-trattament għandu jinbada bl-inqas doża possibbli, u li jekk l-aġitazzjoni tkompli d-doża għandha tiġi aġġustata b'żidiet f'intervalli ta' kull sagħtejn sa 4 sigħat, sa massimu ta' 10 mg/kuljum.
Trattament ta' korea minn hafifa sa moderata tal-marda ta' Huntington, meta prodotti mediċinali oħra ma jkunux effettivi jew ittollerati, u terapija orali ma tkunx xierqa • Minn 2 sa 5 mg minn ġol-muskolu. • Jista' jiġi ripetut kull siegħa sakemm jinkiseb kontroll suffiċjenti tas-sintomi jew sa massimu ta' 10 mg/kuljum.
Profilassi ta' nawwja u rimettar wara operazzjoni f'pazjenti b'riskju minn moderat sa qawwi mogħti wahdu jew flimkien ma' sustanzi oħra, meta prodotti mediċinali oħra ma jkunux effettivi jew ittollerati. • 1 mg sa 2 mg minn ġol-muskolu, mal-ghoti tal-anestesija jew 30 minuta qabel it-tmiem tal-anestesija.
Trattament ta' nawwja u rimettar wara operazzjoni mogħti flimkien ma' sustanzi oħra meta prodotti mediċinali oħra ma jkunux effettivi jew ittollerati • 1 mg sa 2 mg minn ġol-muskolu.

Waqfien tat-trattament

Huwa rrakkomandat li l-waqfien ta' haloperidol isir bil-mod il-mod (ara sezzjoni 4.4).

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani

Id-doża inizjali rrakkomadata ta' haloperidol f'pazjenti anzjani hija nofs l-inqas doża tal-adulti.

Jistgħu jingħataw aktar doži li jiġu aġġustati skont ir-rispons tal-pazjent. F'pazjenti anzjani hija rrakkomadata żieda b'attenzjoni u bil-mod il-mod fid-doża.

Id-doża massima hija ta' 5 mg/kuljum.

Doži aktar minn 5 mg/kuljum għandhom jitqiesu biss f'pazjenti li jkun tolleraw doži oġġa u wara stima mill-ġdid tal-profil tal-benefiċċju u r-riskju individwali tal-pazjent.

Indeboliment tal-kliewi

L-influwenza ta' indeboliment tal-kliewi fuq il-farmakokinetika ta' haloperidol ma gietx ivvalutata. Ma huwa rrakkomandat l-ebda aġġustament fid-doża, iżda hija rrakkomandata l-kawtela meta jsir trattament ta' pazjenti b'indeboliment tal-kliewi. Madankollu, pazjenti b'indeboliment sever tal-kliewi jistgħu jkunu jehtieġu doża tal-bidu aktar baxxa, b'għoti ta' aktar doži li jiġu aġġustati skont ir-rispons tal-pazjent (ara sezzjoni 5.2).

Indeboliment tal-fwied

L-influwenza ta' indeboliment tal-fwied fuq il-farmakokinetika ta' haloperidol ma gietx ivvalutata. Minhabba li haloperidol huwa mmetabolizzat b'mod estensiv fil-fwied, huwa rrakkomandat li d-doża tal-bidu titnaqqas bin-nofs. Jistgħu jingħataw aktar doži u jiġu aġġustati skont ir-rispons tal-pazjent (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.2).

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja tas-soluzzjoni għall-injezzjoni ta' HALDOL fit-tfal u l-adolesxenti ta' taht it-18-il sena ma għewx determinati s'issa. Dejta mhux disponibbli.

Metodu ta' kif għandu jingħata

Is-soluzzjoni għall-injezzjoni ta' HALDOL hija rrakkomandata biss għal użu għal ġol-muskoli (ara sezzjoni 4.4). Għal istruzzjonijiet dwar l-immaniġġjar tas-soluzzjoni għall-injezzjoni ta' HALDOL, ara sezzjoni 6.6.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

- Sensitività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieħed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1.
- Stat ta' koma.
- Depressjoni tas-sistema nervuża ċentrali (CNS, *central nervous system*).
- Marda tal-Parkinson.
- Dimenzja bil-korpi Lewy.
- Paralizi sopranukleari progressiva.
- Titwil magħruf tal-intervall QTc jew sindrom kongenitali ta' QT twil.
- Infart mijokardjaku riċenti akut.
- Insuffiċjenza tal-qalb mhix ikkompensata.
- Storja medika ta' aritmija tal-ventrikulu jew torsades de pointes.
- Ipokalimja mhux ikkoreġuta.
- Trattament konkomitanti bi prodotti mediċinali li jtawlu l-intervall QT (ara sezzjoni 4.5).

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Żieda fil-mortalità f'pazjenti anzjani bid-dimenzja

Każijiet rari ta' mewt zoptu għew irrappurtati f'pazjenti psikjatriċi li jkunu qed jirċievu antipsikotiċi, inkluż haloperidol (ara sezzjoni 4.8).

Pazjenti anzjani bi psikożi marbuta mad-dimenzja li jiġu ttrattati b'antipsikotiċi jkunu f'riskju akbar ta' mewt. Analizi ta' sbatax-il studju kkontrollati bil-placebo (tul ta' żmien modali ta' 10 ġimgħat), l-aktar f'pazjenti li kienu qed jieħdu antipsikotiċi atipiċi, żvelat riskju ta' mewt bejn 1.6 u 1.7 darbi aktar fil-pazjenti ttrattati mir-riskju ta' mewt fil-pazjenti ttrattati bi placebo. Fuq perjodu ta' studju tipiku ikkontrollat ta' 10 ġimgħat, ir-rata ta' mewt f'pazjenti ttrattati b'antipsikotiċi kienet madwar 4.5%, meta mqabbla ma' rata ta' madwar 2.6% fil-grupp tal-placebo. Għalkemm il-kawżi tal-imwiet varjaw, il-biċċa l-kbira tal-imwiet dehru li fin-natura tagħhom kienu kardjovaskulari (eż., insuffiċjenza tal-qalb, mewt zoptu) jew infettivi (eż., pulmonite). Studji ta' osservazzjoni jissuġġerixxu li t-trattament

ta' pazjenti anzjani b'haloperidol huwa assoċjat ukoll ma' żieda fil-mortalità. Din l-assoċjazzjoni tista' tkun aktar qawwija għal haloperidol milli għal prodotti mediċinali antipsikotiċi atipici, tidher l-aktar fl-ewwel 30 jum wara l-bidu tat-trattament, u tippersisti għal mill-inqas 6 xhur. Il-grad sa fejn din l-assoċjazzjoni tista' tkun attribwita għall-prodott mediċinali, pjuttost milli għall-karatteristiċi li jfixxlu tal-pazjent, għadu ma giex spjegat.

Is-soluzzjoni għall-injezzjoni ta' HALDOL mhijiex indikata għat-trattament ta' disturbi fil-komportament marbuta mad-dimenzja.

Effetti kardjovaskulari

Flimkien ma' mewt zoptu, ġew irrappurtati titwil tal-QTc u/jew aritmiji tal-ventrikulu b'haloperidol (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.8). Ir-riskju ta' dawn l-avvenimenti jidher li jżied b'dożi għoljin, b'konċentrazzjonijiet għoljin fil-plażma, f'pazjenti predisposti jew b'użu parenterali, b'mod partikolari għoti fil-vini.

Is-soluzzjoni għall-injezzjoni ta' HALDOL hija rrakkomandata biss għal għoti għal ġol-muskoli. Madankollu, jekk jingħata mill-vini, għandu jsir monitoraġġ kontinwu bl-ECG għal titwil tal-intervall QTc u għal aritmiji tal-ventrikulu.

Hija rrakkomandata l-kawtela f'pazjenti bi bradikardija, mard kardijaku, storja fil-familja ta' titwil tal-intervall QTc jew storja ta' esponiment qawwi għall-alkohol. Hija rrakkomandata l-kawtela wkoll f'pazjenti bil-possibbiltà ta' konċentrazzjonijiet għoljin fil-plażma (ara sezzjoni 4.4, Metabolizzaturi dgħajfa ta' CYP2D6)

Hija rrakkomandata li tittiehed linja bażi tal-ECG qabel l-għoti ta' doża ġol-muskoli. Matul it-terapija, il-htieġa għall-monitoraġġ bl-ECG għal titwil tal-intervall QTc u għal aritmiji tal-ventrikulu għandha tiġi stmata fil-pazjenti kollha, iżda huwa rrakkomandat monitoraġġ kontinwu bl-ECG għal dożi ripetuti ġol-muskoli. Monitoraġġ bl-ECG huwa rrakkomandat sa 6 sigħat wara l-għoti ta' soluzzjoni għall-injezzjoni ta' HALDOL lill-pazjenti għall-profilassi jew it-trattament ta' nawsja u rimettar wara operazzjoni.

Waqt li wiehed ikun fuq it-terapija, huwa rrakkomandat li titnaqqas id-doża jekk l-intervall QTc jitwal, iżda haloperidol għandu jitqwaqqaf jekk il-QTc jaqbeż il-500 ms.

Disturbi fl-elettroliti bħal ipokalimja u ipomagnesimja jżidu r-riskju għal aritmiji tal-ventrikulu u għandhom jiġu kkorreġuti qabel ma jinbeda trattament b'haloperidol. Għalhekk, huwa rrakkomandat li jsir monitoraġġ tal-elettroliti fil-linja bażi u perijodiku.

Ġew irrappurati wkoll takikardija u ipotensjoni (inkluz ipotensjoni ortostatika) (ara sezzjoni 4.8). Hija rrakkomandata l-kawtela meta haloperidol jingħata lill-pazjenti li jkollhom ipotensjoni jew ipotensjoni ortostatika.

Avvenimenti ċerebrovaskulari

Fi studji kliniċi, arbitrarji kkontrollati bi placebo fil-popolazzjoni bid-dimenzja, kien hemm żieda ta' madwar 3 darbiet fir-riskju ta' avvenimenti ċerebrovaskulari avversi b'xi antipsikotiċi atipici. Studji ta' osservazzjoni li qabblu r-rata ta' puplesija f'pazjenti anzjani li kienu esposti għal kwalunkwe antipsikotiku mar-rata ta' puplesija f'dawk li ma kinux esposti għal prodotti mediċinali bħal dawn sabu żieda fir-rata ta' puplesija fost il-pazjenti esposti. Din iż-żieda tista' tkun akbar bil-butyrophenones kollha, inkluz haloperidol. Il-mekkaniżmu għal din iż-żieda fir-riskju mhuwiex magħruf. Żieda fir-riskju ma tistax tiġi eskluża għal popolazzjonijiet oħra ta' pazjenti. HALDOL għandu jintuża b'kawtela f'pazjenti b'fatturi ta' riskju għal puplesija.

Sindrom newrolettiku malinn

Haloperidol ġie assoċjat ma' sindrom newrolettiku malinn: rispons idjosinkratiku rari kkaratterizzat minn ipertermja, riġidità mifruxa fil-muskoli, instabbiltà awtonomika, koxjenza mibdula u żieda fil-livelli ta' creatine phosphokinase fis-serum. Ipertermja ta' spiss tkun sinjal bikri ta' dan is-sindrom. It-trattament antipsikotiku għandu jitwaqqaf immedjatament u għandhom jinbdew terapija xierqa ta' sostenn u monitoraġġ b'attenzjoni.

Diskajneżja tardiva

Diskajneżja tardiva tista' tidher f'xi pazjenti fuq terapija fit-tul jew wara twaqqif tal-prodott mediċinali. Is-sindrom huwa kkaratterizzat l-aktar minn movimenti ritmiċi involontarji tal-ilsien, tal-wiċċ, tal-halq jew tax-xedaq. F'xi pazjenti il-manifestazzjonijiet jistgħu jkunu permanenti. Is-sindrom jista' jinheba meta t-trattament jerga' jinbada, meta d-doża tiżdied jew meta ssir bidla għal antipsikotiku ieħor. Jekk jidhru s-sinjali u s-sintomi ta' diskajneżja tardiva, għandu jitqies it-twaqqif tal-antipsikotiċi kollha inkluż HALDOL.

Sintomi ekstrapiramidali

Jistgħu jseħhu sintomi ekstrapiramidali (eż. roġha, riġidità, bżieq żejjed, bradikinesja, akatisja, distonja akuta). L-użu ta' haloperidol ġie assoċjat mal-iżvilupp ta' akatisja, kkaratterizzata minn nuqqas ta' kwiet u hteġa li wiehed jiċċaqlaq li skont l-individwu tista' ma tkunx pjaċevoli jew tohloq ansjetà kbira, ta' spiss akkumpanjata minn inabbiltà li wiehed joqghod bilqegħda jew bilwieqfa bla ma jiċċaqlaq. Dan x'aktarx li jiġri l-aktar fl-ewwel ftit ġimgħat ta' trattament. F'pazjenti li jiżviluppaw dawn is-sintomi, żieda fid-doża tista' tkun ta' ħsara.

Distonja akuta tista' sseħħ matul l-ewwel ftit jiem ta' trattament b'HALDOL, iżda ġie rrapportat ukoll bidu taġġha aktar tard kif ukoll bidu wara żidiet fid-doża. Sintomi distoniċi jistgħu jinkludu, iżda mhumiex limitati għal, tortikollis, tkerrieh tal-wiċċ, trismus, ilsien johroġ 'il barra, u movimenti mhux normali tal-ġhajnejn, inkluż ħarsa fissa 'il fuq involontarja u fit-tul. L-irġiel u gruppi ta' etajiet iżgħar jkunu f'riskju akbar li jkollhom reazzjonijiet bħal dawn. Distonja akuta tista' tkun teħtieġ twaqqif tal-prodott mediċinali.

Prodotti mediċinali tat-tip antikolinerġiku kontra l-parkinson jistgħu jiġu ordnati b'riċetta skont il-hteġa biex jiġu mmanigġjati s-sintomi ekstrapiramidali, iżda huwa rrakkomandat li huma ma jiġux ordnati b'mod regolari bħala prevenzjoni. Jekk ikun meħtieġ trattament konkonnittanti bi prodott mediċinali kontra l-parkinson, huwa jista' jkollu jitkompla wara li HALDOL jitwaqqaf jekk it-tneħħija tiegħu mill-ġisem tkun aktar malajr minn dik ta' haloperidol sabiex jiġi evitat l-iżvilupp jew l-aggravar tas-sintomi ekstrapiramidali. Iż-żieda possibbli fil-pressjoni intraokulari għandha titqies meta prodott mediċinali antikolinerġiċi, inkluż prodott mediċinali kontra l-parkinson, jingħataw flimkien ma' HALDOL.

Aċċessjonijiet/konvulzjonijiet

Ġie rrapportat li jisgħu jiġu kkawżati aċċessjonijiet permezz ta' haloperidol. Hija rrakkomandata l-kawtela f'pazjenti li jsofru minn epilessija u f'kondizzjonijiet li jippreddisponu għal aċċessjonijiet (eż. twaqqif tal-alkohol u ħsara fil-moħħ).

Thassib dwar il-fwied u l-marrara

Minhabba li haloperidol jiġi metabolizzat fil-fwied, hija rrakkomandata nofs id-doża tal-bidu u l-kawtela f'pazjenti b'indeboliment tal-fwied (ara sezzjonijiet 4.2 u 5.2). Ġew irrappurtati każijiet iżolati ta' anormalitajiet fil-funzjoni tal-fwied jew epatite, il-biċċa l-kbira kolestatika (ara sezzjoni 4.8).

Thassib dwar is-sistema endokrinarja

Thyroxin jista' jiffacilita t-tossicità ta' haloperidol. Terapija antipsikotika f'pazjenti b'ipertirojdiżmu għandha tintuża biss b'kawtela u għandha dejjem tkun akkumpanjata b'terapija biex jinkiseb stat ewtirojde.

Effetti tal-antipsikotiċi fuq l-ormoni jinkludu iperprolaktinimja, li tista' tikkawża galattorrea, ginekomastja, u oligomenorrea jew amenorrea (ara sezzjoni 4.8). Studji ta' kulturi ta' ċelluli jissuggerixxu li t-tkabbir ta' ċelluli f'tumuri tas-sider tal-bniedem jista' jkun stimulat mill-prolaktin. Għalkemm ma ntweriet l-ebda assoċjazzjoni ċara bejn l-għoti ta' antipsikotiċi u tumuri tas-sider tal-bniedem fi studji kliniċi u epidemjoloġiċi, hija rrakomandata l-kawtela f'pazjenti bi storja medika rilevanti. HALDOL għandu jintuża b'kawtela f'pazjenti b'iperprolaktinimja preżenti minn qabel u f'pazjenti li jista' jkun li għandhom tumuri dipendenti mill-prolaktin (ara sezzjoni 5.3).

L-ipogliċemija u s-sindrom ta' sekrezzjoni mhux xierqa ta' ormon antidijuretiku ġew irrappurtati b'haloperidol (ara sezzjoni 4.8).

Tromboemboliżmu fil-vini

Kienu rrapportati każijiet ta' tromboemboliżmu fil-vini (VTE - *venous thromboembolism*) b'antipsikotiċi. Minhabba li pazjenti ttrattati b'antipsikotiċi spiss ikollhom fatturi ta' riskju akkwiziżi għal VTE, il-fatturi kollha possibbli ta' riskju għal VTE għandhom jiġu identifikati qabel u waqt it-trattament b'HALDOL u għandhom jittiehdu miżuri ta' prevenzjoni.

Rispons għat-trattament u twaqqif

Fl-iskizofrenja, ir-rispons għal trattament antipsikotiku jista' jdum ma jsehh.

Jekk l-antipsikotiċi jitwaqqfu, ir-rikorrenza tas-sintomi marbuta mal-kundizzjoni li kkawzathom jistgħu ma jkunux apparenti għal diversi ġimgħat jew xhur.

Kien hemm rapporti rari ħafna ta' sintomi akuti ta' twaqqif (inkluż nawsja, rimettar u insomnja) wara twaqqif f'daqqa ta' dożi għoljin ta' antipsikotiċi. Huwa rrakkomandat tnaqqis bil-mod il-mod bħala prekawzjoni.

Pazjenti b'depressjoni

Huwa rrakkomandat li HALDOL ma jintużax waħdu f'pazjenti li fihom id-depressjoni hija predominanti. Huwa jista' jingħata flimkien ma' antidepressanti biex jitratta dawk il-kundizzjonijiet fejn id-depressjoni u l-psikozi jeżistu flimkien (ara sezzjoni 4.5).

Bidla minn manija għal depressjoni

Fit-trattament tal-episodji manjaċi tad-disturb bipolarari hemm riskju li l-pazjenti jaqilbu minn manija għal depressjoni. Il-monitoraġġ ta' pazjenti għall-bidla għal episodju depressiv bir-riskji li dan iġib miegħu, bħal komportament ta' suwiċidju, huwa importanti sabiex wieħed jintervjeni meta jsehhu bidliet bħal dawn.

Metabolizzaturi dgħajfa ta' CYP2D6

HALDOL għandu jintuża b'kawtela f'pazjenti li huma magħrufa li huma metabolizzaturi dgħajfa ta' ċitokrom P450 (CYP) 2D6 u li flimkien miegħu jingħataw inibitur ta' CYP3A4.

4.5 Interazzjoni ma' prodotti mediċinali ohra u forom ohra ta' interazzjoni

Studji ta' interazzjoni twettqu biss f'adulti.

Effetti kardjovaskulari

HALDOL huwa kontra-indikat flimkien ma' prodotti mediċinali magħrufa li jgħawlu l-intervall QTc (ara sezzjoni 4.3). Eżempji jinkludu:

- Antiarritmiċi tal-klassi IA (eż. disopyramide, quinidine).
- Antiarritmiċi tal-klassi III (eż. amiodarone, dofetilide, dronedarone, ibutilide, sotalol).
- Ċerti antidepressanti (eż. citalopram, escitalopram).
- Ċerti antibijotiċi (eż. azithromycin, clarithromycin, erythromycin, levofloxacin, moxifloxacin, telithromycin).
- Antipsikotiċi oħra (eż. derivati ta' phenothiazine, sertindole, pimozide, ziprasidone)
- Ċerti antifungali (eż. pentamidine).
- Ċerti mediċini kontra l-malarja (eż. halofantrine).
- Ċerti prodotti mediċinali gastrointestinali (eż. dolasetron).
- Ċerti prodotti mediċinali li jintużaw għall-kanċer (eż. toremifene, vandetanib).
- Ċerti prodotti mediċinali oħra (eż. bepridil, methadone).

Din il-lista mhijiex eżawrjenti.

Hija rrakkomandata l-kawtela meta HALDOL jintuża flimkien ma' prodotti mediċinali magħrufa li jikkawżaw żbilanċ fl-elettroliti (ara sezzjoni 4.4).

Prodotti mediċinali li jistgħu jżidu l-konċentrazzjonijiet ta' haloperidol fil-plażma

Haloperidol jiġi mmetabolizzat permezz ta' diversi rotot (ara sezzjoni 5.2). Is-sensjela ta' reazzjonijiet maġġuri huma glukuronidazzjoni u tnaqqis tal-ketone. Is-sistema tal-enzima taċ-ċitokrom P450 hija involuta wkoll, b'mod partikolari CYP3A4 u, fi grad inqas, CYP2D6. Inibizzjoni ta' dawn ir-rotot ta' metabolizmu permezz ta' prodott mediċinali ieħor jew tnaqqis fl-attività tal-enzima CYP2D6 jistgħu jwasslu għal żieda fil-konċentrazzjonijiet ta' haloperidol. L-effett ta' inibizzjoni ta' CYP3A4 u ta' tnaqqis fl-attività tal-enzima CYP2D6 jista' jkun addittiv (ara sezzjoni 5.2). Abbażi ta' informazzjoni limitata u xi drabi konfliġġenti, iż-żieda possibbli fil-konċentrazzjonijiet ta' haloperidol fil-plażma meta jingħata inibitur ta' CYP3A4 u/jew CYP2D6 flimkien miegħu tista' tvarja minn 20 sa 40%, għalkemm f'xi każijiet, kienu rrapportati żidiet sa 100%. Eżempji ta' prodotti mediċinali li jistgħu jżidu l-konċentrazzjonijiet ta' haloperidol fil-plażma (abbażi ta' esperjenza klinika jew tal-mekkanizmu ta' interazzjoni bejn il-mediċini) jinkludu:

- Inibituri ta' CYP3A4 – alprazolam, fluvoxamine, indinavir, itraconazole, ketoconazole, nefazodone, posaconazole, saquinavir, verapamil, voriconazole.
- Inibituri ta' CYP2D6 – bupropion, chlorpromazine, duloxetine, paroxetine, promethazine, sertraline, venlafaxine.
- Inibituri kombinati ta' CYP3A4 u CYP2D6: fluoxetine, ritonavir.
- Mekkanizmu mhux ċert – buspirone.

Din il-lista mhijiex eżawrjenti.

Żieda fil-konċentrazzjonijiet ta' haloperidol fil-plażma tista' twassal għal żieda fir-riskji ta' avvenimenti avversi, inkluż titwil tal-intervall QTc (ara sezzjoni 4.4). Żidiet fil-QTc kienu osservati meta haloperidol ingħata flimkien ma' kombinazzjoni tal-inibituri metabolici ketoconazole (400 mg/kuljum) u paroxetine (20 mg/kuljum).

Huwa rrakkomandat li l-pazjenti li jiehdu haloperidol flimkien ma' prodotti mediċinali bħal dawn jiġu mmonitorjati għal sinjali jew sintomi ta' żieda jew tul aktar fl-effetti farmakoloġiċi ta' haloperidol, u d-doża ta' HALDOL titnaqqas skont kif ikun ikkunsidrat bħala meħtieġ.

Prodotti medicinali li jistghu jnaqqsu l-konċentrazzjonijiet ta' haloperidol fil-plażma

L-ghoti ta' haloperidol flimkien ma' indutturi qawwija tal-enzimi ta' CYP3A4 jistghu jnaqqsu l-konċentrazzjonijiet ta' haloperidol fil-plażma bil-mod il-mod tant li l-effikaċja tista' tonqos. Eżempji jinkludu:

- Carbamazepine, phenobarbital, phenytoin, rifampicin, St John's Wort (*Hypericum, perforatum*).

Din il-lista mhijiex eżawrjenti.

L-induzzjoni tal-enzima tista' tiġi osservata wara ftit jiem ta' trattament. L-induzzjoni massima tal-enzima ġeneralment tidher f'madwar ġimagħtejn u mbagħad tista' ddum għall-istess perjodu ta' żmien wara t-twaqqif tat-terapija bil-prodott medicinali. Matul it-trattament flimkien ma' indutturi ta' CYP3A4, huwa rrakkomandat li l-pazjenti jiġu mmonitorjati u d-doża ta' HALDOL tiżdied skont kif ikun ikkunsidrat bħala meħtieġ. Wara t-twaqqif tal-induttur ta' CYP3A4, il-konċentrazzjoni ta' haloperidol tista' tiżdied bil-mod il-mod u għalhekk jista' jkun meħtieġ li tnaqqas id-doża ta' HALDOL.

Sodium valproate huwa magħruf li jinibixxi glukuronidazzjoni, iżda ma jaffetwax il-konċentrazzjonijiet ta' haloperidol fil-plażma.

L-effett ta' haloperidol fuq prodotti medicinali ohra

Haloperidol jista' jżid id-depressjoni tas-CNS ikkaġunata mill-alkoħol jew prodotti medicinali li jiddepressaw is-CNS, inkluż ipnotiċi, sedattivi jew analġeżiċi qawwija. Kien irrappurtat ukoll effett akbar fuq is-CNS, meta jingħata flimkien ma' methyldopa.

Haloperidol jista' jantagonizza l-azzjoni tal-adrenalina u prodotti medicinali simpatomimetici ohra (eż. stimulant bħal amfetamini) u jdawwar bil-maqlub l-effetti ta' tnaqqis tal-pressjoni tad-demm ta' prodotti medicinali li jimblukaw is-sistema adrenergika bħal guanethidine.

Haloperidol jista' jantagonizza l-effett ta' levodopa u agonisti ohra ta' dopamine.

Haloperidol huwa inibitur ta' CYP2D6. Haloperidol jinibixxi l-metabolizmu ta' antidepressanti triċikliċi (eż. imipramine, desipramine), b'hekk iżid il-konċentrazzjonijiet ta' dawn il-prodotti medicinali fil-plażma.

Forum ohra ta' interazzjoni

F'każijiet rari is-sintomi li ġejjin kienu rrappurtati waqt l-użu ta' lithium flimkien ma' haloperidol: enċefalopatija, sintomi ekstrapiramidali, diskajneżja tardiva, sindrom newrolettiku malinn, sindrom akut tal-moħħ u koma. Il-parti l-kbira ta' dawn is-sintomi kienu rivesibbli. Għadu mhuwiex ċar jekk dan jirrappreżentax entità klinika distinta.

Madankollu, huwa rrakkomandat li f'pazjenti li jkunu ttrattati b'lithium flimkien ma' HALDOL, it-terapija għandha titwaqqaf immedjatament jekk isehhu sintomi bħal dawn.

Ġie rrappurtat antagonizmu tal-effett tal-antikoagulant phenindione.

4.6 Fertilità, tqala u treddigh

Tqala

Ammont moderat ta' dejta dwar l-użu waqt it-tqala (aktar minn 400 riżultat ta' tqala) juri li m'hemm l-ebda effett ta' formazzjoni difettuża jew effetti tossiċi fil-fetu/tarbija tat-twelid wara l-użu ta' haloperidol. Madankollu kien hemm rapporti iżolati ta' każijiet ta' difetti tat-twelid wara esponiment

tal-fetu għal haloperidol, l-aktar flimkien ma' prodotti mediċinali oħra. Studji f'animali urew effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva (ara sezzjoni 5.3). Bħala prekawzjoni, l-aħjar huwa li tevita l-użu ta' HALDOL matul it-tqala.

Trabi tat-twelid esposti għal antipsikotiċi (inkluż haloperidol) waqt it-tielet trimestru tat-tqala jkunu f'riskju ta' reazzjonijiet avversi inkluż sintomi ekstrapiramidali u/jew ta' twaqqif tal-mediċina li jistgħu jvarjaw fil-qawwa u t-tul tagħhom wara t-twelid. Kien hemm rapporti ta' aġitazzjoni, ipertonja, ipotonja, roġħda, hedla tan-ngħas, għejja respiratorja, jew disturb fit-tisqija. Konsegwenza ta' dan, huwa rrakkomandat li trabi tat-twelid jiġu mmonitorjati b'attenzjoni.

Treddigh

Haloperidol huwa eliminat fil-halib tas-sider tal-bniedem. Ammonti żgħir ta' haloperidol instabu fil-plażma u fl-awrina ta' trabi tat-twelid li kienu qed jitreddghu minn ommijiet ittrattati b'haloperidol. M'hemmx informazzjoni biżżejjed dwar l-effetti ta' haloperidol fi trabi li qed jitreddghu. Għandha tittieded deċiżjoni jekk il-mara twaqqafx it-treddigh jew twaqqafx it-terapija b'HALDOL wara li jiġi kkunsidrat il-benefiċċju ta' treddigh għat-tarbija u l-benefiċċju ta' terapija għall-mara.

Fertilità

Haloperidol jgħolli l-livelli tal-prolaktin. Iperprolaktinimja tista' tissoppressa l-GnRH tal-ipotalamu, li jwassal għal tnaqqis fis-sekrezzjoni tal-gonadotropin mill-glandola pitwitarja. Dan jista' jinibixxi l-funzjoni riproduttiva billi jdgħajef il-formazzjoni tal-isterojdi gonadali kemm f'pazjenti nisa kif ukoll irġiel (ara sezzjoni 4.4).

4.7 Effetti fuq il-hila biex issuq u thaddem magni

HALDOL għandu effett moderat fuq il-hila biex issuq u thaddem magni. Jista' jsehh xi grad ta' sedazzjoni jew indeboliment ta' attenzjoni, b'mod partikolari b'dożi ogħla u fil-bidu tat-trattament u jista' jittqawwa permezz tal-alkohol. Huwa rrakkomandat li l-pazjenti jingħatalhom parir biex ma jsuqux u ma jhaddmux magni matul it-trattament, sakemm issir magħrufa s-suxxettibbiltà tagħhom.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Is-sigurtà ta' haloperidol giet ivvalutata f'284 pazjent ittrattati b'haloperidol li pparteċipaw fi 3 studji kliniċi kkontrollati bil-placebo u f'1,295 pazjent ittrattati b'haloperidol li pparteċipaw f'16-il studju kliniku kkontrollati b'kumparatur attiv fejn la l-investigaturi u lanqas l-individwi ma kienu jafu liema sustanza qed tintuża.

Abbazi ta' dejta kollettiva dwar sigurtà minn dawn l-istudji kliniċi, l-aktar reazzjonijiet avversi rrappurtati b'mod komuni kienu: disturb ekstrapiramidali (34%), insomnja (19%), aġitazzjoni (15%), iperkinezja (13%), uġigh ta' ras (12%), disturb psikotiku (9%), depressjoni (8%), żieda fil-piż (8%), roġħda (8%), ipertonja (7%), ipotensjoni ortostatika (7%), distonja (6%) u hedla tan-ngħas (5%).

Barra dan, is-sigurtà ta' haloperidol decanoate giet ivvalutata f'410 pazjenti li pparteċipaw fi 3 studji ta' tqabbil bejn mediċini (1 li qabbel haloperidol decanoate versus fluphenazine u 2 li qabblu l-formulazzjoni ta' decanoate mal-formolazzjoni ta' haloperidol mill-halq), 9 studji fejn kemm l-investigaturi kif ukoll l-individwi kienu jafu liema sustanza qed tintuża u studju wiehed ta' rispons tad-doża.

Tabella 2 telenka r-reazzjonijiet avversi kif ġej:

- Irrappurtati fi studji kliniċi b'haloperidol.
- Irrappurtati fi studji kliniċi b'haloperidol decanoate u jikkonċernaw il-parti attiva.
- Minn esperjenza ta' wara t-tqegħid fis-suq b'haloperidol u haloperidol decanoate.

Il-frekwenzi tar-reazzjonijiet avversi huma bbażati fuq (jew stmati minn) provi kliniċi jew studji epidemjoloġiċi b'haloperidol, u kklassifikati bl-użu tal-konvenzjoni li ġejja:

Komuni ħafna: $\geq 1/10$
 Komuni: $\geq 1/100$ sa $< 1/10$
 Mhux komuni: $\geq 1/1,000$ sa $< 1/100$
 Rari: $\geq 1/10,000$ sa $< 1/1,000$
 Rari ħafna: $< 1/10,000$
 Mhux magħrufa: ma tistax tittiehed stima mid-dejta disponibbli.

Ir-reazzjonijiet avversi huma ppreżentati skont il-klassi tas-Sistemi u tal-Organi u skont is-serjeta' tagħhom b'dawk l-aktar serji mnizzla l-ewwel.

Tabella 2: Reazzjonijiet avversi

Klassi tas-Sistemi u tal-Organi	Reazzjoni Avversa				
	Frekwenza				
	Komuni Ħafna	Komuni	Mhux Komuni	Rari	Mhux magħruf
Disturbi tad-demem u tas-sistema limfatika			Lewkopenija		Panċitopenija Agranuloċitozi Tromboċitopenija Newtopenija
Disturbi fis-sistema immuni			Sensittività eċċessiva		Reazzjoni anafilattika
Disturbi fis-sistema endokrinarja				Iperprolaktinimja	Sekrezzjoni mhux xierqa tal-ormon antidijuretiku
Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni					Ipoglicemija
Disturbi psikjatriċi	Aġitazzjoni Insomnja	Disturb psikotiku Depressjoni	Stat ta' konfużjoni Telf ta' libido Tnaqqis fil-libido Nuqqas ta' kwiet		
Disturbi fis-sistema nervuża	Disturb ekstrapiramidal i Iperkajnejza Ugħigh ta' ras	Diskajnejza tardiva Akatisja Bradikajnejza Diskajnejza Distonja Ipokineżja Ipertonja Sturdament Hedla tan-nghas Rogħda	Konvulżjoni Parkinsoniżmu Sedazzjoni Ġbid involontarju tal-muskoli	Sindrom newrolettiku malinn Funzjoni motorja ħażina Nistagmus	Akajnejza Riġidità bħal ta' rota tal-ingranagġ Espressjoni tal-wiċċ bħal maskra

Klassi tas-Sistemi u tal-Organ	Reazzjoni Avversa				
	Frekwenza				
	Komuni Hafna	Komuni	Mhux Komuni	Rari	Mhux maghruf
Disturbi fl-ghajnejn		Ħarsa fissa ġeneralment 'il fuq involontarja u fit-tul Disturb fil- vista	Vista mċajpra		
Disturbi fil-qalb			Takikardja		Fibrillazzjoni tal- ventrikulu Torsade de pointes Takikardija tal- ventrikulu Ekstrasistoli
Disturbi vaskulari		Ipotensjoni Ipotensjoni ortostatika			
Disturbi respiratorji, toraċi u medjastinali			Dispnea	Bronkospazmu	Edima fil-laringi Spazmu fil-laringi
Disturbi gastrointestinali		Rimettar Nawsja Stitikezza Ħalq xott Ipersekrezzjon i tal-bżieq			
Disturbi fil-fwied u fil-marrara		Riżultat mhux normali għal- test tal- funzjoni tal- fwied	Epatite Suffejra		Indeboliment akut tal-fwied Kolestasi
Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta' taht il-ġilda		Raxx	Reazzjoni ta' sensittività eċċesiva għad- dawl Urtikarja Prurite Iperidroži		Anġjoedima Dermatite bil-qxur Vaskulite Iewkoklastika
Disturbi muskoluskelettri ċi u tat-tessuti konnettivi			Tortikollis Rigidità fil- muskoli Spazmi fil- muskoli Ebusija muskoluskelettri ka	Trismus Ġbid f' daqqa tal- muskoli	Rabdomijolisis
Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja		Żamma tal- awrina			
Kondizzjonijiet ta' waqt it-tqala, il-ħlas u wara l-ħlas					Sindrom ta' twaqqif ta' sustanza li tivvizzja fit-trabi tat-twelid (ara sezzjoni 4.6)

Klassi tas-Sistemi u tal-Organ	Reazzjoni Avversa				
	Frekwenza				
	Komuni Hafna	Komuni	Mhux Komuni	Rari	Mhux maghruf
Disturbi fis-sistema riproduttiva u fis-sider		Impotenza	Amenorrea Galactorrea Dismenorrea Ugħigh fis-sider Skumdità fis-sider	Menorraġija Disturb fil-menstruazzjoni Funzjoni sesswali ħażina	Prijapizmu Ginekomastja
Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta' mnejn jingħata			Ipertermja Edima Disturb fil-mixi		Mewt zoptu Edima fil-wieċ Ipotermja
Investigazzjoni jiet		Żieda fil-piż Tnaqqis fil-piż		Intervall QT imtaqqas fuq l-elettrokardjogramma	

Titwil tal-intervall QT fuq l-elettrokardjogramma, aritmiji tal-ventrikulu (fibrillazzjoni tal-ventrikulu, takikardija tal-ventrikulu), torsade de pointes u mewt zoptu kienu rrapportati b'haloperidol.

Effetti tal-klassi tal-antipsikotiċi

Kien irrappurtat waqfien kardijaku b'antipsikotiċi.

Kienu rrapportati każijiet ta' tromboemboliżmu fil-vini, inkluz każijiet ta' emboliżmu fil-pulmuni u każijiet ta' trombozi fil-vini fil-fond, b'antipsikotiċi. Il-frekwenza mhix magħrufa.

Rappurtar ta' reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrapportati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrapportaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz **tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali imniżżla f' [Appendiċi V](#)**.

4.9 Doża eċċessiva

Sintomi u sinjali

Il-manifestazzjonijiet ta' doża eċċessiva ta' haloperidol huma esagerazzjoni tal-effetti farmakoloġiċi u r-reazzjonijiet avversi magħrufa. L-aktar sintomi prominenti huma reazzjonijiet ekstrapiramidali, ipotensjoni u sedazzjoni severi. Reazzjoni ekstrapiramidali tidher bħala ebusija fil-muskoli u roġħda mifruxa jew lokalizzata. Iperpensjoni minflok ipotensjoni hija possibbli wkoll.

F'każijiet estremi, il-pazjent ikun jidher fi stat ta' koma b'depressjoni respiratorja u ipotensjoni li tista' tkun severa biżżejjed biex tipproduċi stat bħal f'xokk. Għandu jitqies ir-riskju ta' aritmiji tal-ventrikulu, possibbilment assoċjati ma titwil tal-intervall QTc.

Trattament

Ma hemm l-ebda antidot speċifiku. It-trattament huwa wiehed ta' sostenn. Id-dijalisi mhijiex irrakkomandata fit-trattament ta' doża eċċessiva minħabba li hija tneħhi biss ammonti żgħir ħafna ta' haloperidol (ara sezzjoni 5.2).

Għal pazjenti fi stat ta' koma, għandu jiġi stabbilit passaggġ miftuħ tal-arja permezz ta' apparat mill-halq għall-faringi jew tubu ġewwa t-trakea. Depressjoni respiratorja tista' tkun tehtieg respirazzjoni artifiċjali.

Huwa rrakkomandat li jiġu mmonitorjati l-ECG u s-sinjali vitali, u li l-monitoraġġ jitkompla sakemm l-ECG tkun normali. Huwa rrakkomandat trattament ta' aritmiji severi b'mizuri xierqa kontra l-aritmiji.

Pressjoni baxxa u kollass ċirkulatorju jistgħu jiġu kontrobattuti bl-użu ta' fluwidi minn ġol-vini, plażma jew albumina kkonċentrata u sustanzi vasopressuri, bħal dopamine jew noradrenaline. L-adrenalina m'għandhiex tintuża minhabba li hija tista' tikkawża ipotensjoni severa fil-preżenza ta' haloperidol.

F'każijiet ta' reazzjonijiet ekstrapiramidali severi, huwa rrakkomandat l-ghoti parenterali ta' prodott mediċinali kontra l-parkinson.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: psikolettici; antipsikotici; derivati ta' butyrophenone, kodiċi ATC: N05AD01.

Mekkaniżmu ta' azzjoni

Haloperidol huwa antipsikotiku li jagħmel parti mill-grupp ta' butyrophenones. Huwa antagonist ċentrali potenti tar-riċettur tat-tip 2 tad-dopamina, u bid-dożi rrakkomandati, għandu attività adrenergika α -1 baxxa u m'għandu l-ebda attività antiistamnergika jew antikolnergika.

Effetti farmakodinamiċi

Haloperidol jissoppressa delużjonijiet u alluċinazzjonijiet bħala kosegwenza diretta ta' imblokk tal-ghoti ta' sinjali dopaminergici fis-sensiela ta' reazzjonijiet mesolimbici. L-effett ta' imblokk ċentrali tad-dopamina għandu attività fuq il-ganglia bażali (*nigrostriatal bundles*). Haloperidol jikkawża sedazzjoni psikomotorja effiċjenti, li jispjega l-effett favorevoli fuq il-manija u sindromi oħra ta' aġitazzjoni.

L-attività fuq il-ganglia bażali probabbilment hija l-kawża tal-effetti motorji ekstrapiramidali mhux mixtieqa (distonja, akatisja u parkinsoniżmu).

L-effetti antidopaminergici ta' haloperidol fuq il-*lactotropes* fil-glandola pitwitarja anterjuri jispjegaw l-iperprolaktinimja minhabba inibizzjoni ta' sekrezzjoni tal-prolaktin minn inibizzjoni tonika medjata minn dopamine. B'mod addizzjonali, l-effett antidopaminergiku fuq iż-żona li tipprovoka l-kimoriċettur tal-parti postrema jispjega l-attività kontra n-nawjsja u r-rimettar.

5.2 Taghrif farmakokinetiku

Absorption

Wara għoti ġol-muskoli, haloperidol jiġi assorbit kompletament. L-oghla konċentrazzjonijiet ta' haloperidol fil-plażma jinkisbu fi żmien 20 sa 40 minuta.

Distribuzzjoni

Il-medja tal-irbit ta' haloperidol mal-proteini tal-plażma fl-adulti hija madwar 88 sa 92%. Hemm varjabilità kbira bejn l-individwi għall-irbit mal-proteini tal-plażma. Haloperidol jiġi ddistribwit malajr f'diversi tessuti u organi, kif indikat permezz tal-volum kbir ta' distibuzzjoni (valuri medji 8 sa 21 l/kg wara għoti ta' doži ġol-vini). Haloperidol jgħaddi faċilment mid-demm għall-moħħ. Huwa jgħaddi wkoll mill-plaċenta u jitneħħa fil-halib tas-sider.

Bijotrasformazzjoni

Haloperidol huwa metabolizzat b'mod estensiv fil-fwied. Is-sensiela prinċipali ta' reazzjonijiet metabolici ta' haloperidol fil-bnedmin tinkludi glukuronidazzjoni, tnaqqis tal-*ketone*, *N-dealkylation* ossidattiva u formazzjoni ta' metaboliti tal-*pyridinium*. Il-metaboliti ta' haloperidol mhumix meqjusa li jagħtu kontribut sinifikanti għall-attività tiegħu; madankollu, is-sensiela ta' reazzjonijiet ta' tnaqqis tirrapreżenta madwar 23% tal-bijotrasformazzjoni, u konverżjoni tal-metabolit imnaqqas ta' haloperidol lura għal haloperidol ma tistax tiġi eskluża kompletament. L-enzimi CYP3A4 u CYP2D6 taċ-ċitokrom P450 huma involuti fil-metaboliżmu ta' haloperidol. Inibizzjoni jew induzzjoni ta' CYP3A4, jew inibizzjoni ta' CYP2D6, jistgħu jaffettwaw il-metaboliżmu ta' haloperidol. Tnaqqis fl-attività tal-enzima CYP2D6 jista' jwassal għal żieda fil-konċentrazzjonijiet ta' haloperidol.

Eliminazzjoni

Il-*half-life* terminali ta' eliminazzjoni ta' haloperidol hija madwar 21 siegħa (firxa minn 13-il siegħa sa 36 siegħa) wara għoti ġol-muskoli. It-tneħħija apparenti ta' haloperidol wara għoti ekstravaskulari tvarja minn 0.9 sa 1.5 l/siegħa/kg u jitnaqqas f'metabolizzaturi dgħajfa ta' CYP2D6. Attività mnaqqsa tal-enzima CYP2D6 tista' twassal għal żieda fil-konċentrazzjonijiet ta' haloperidol. Il-varjabilità bejn l-individwi (koeffiċjent ta' varjazzjoni, %) fit-tneħħija ta' haloperidol kienet stmata li hija 44% fl-analiżi farmakokinetika ta' popolazzjoni f'pazjenti bl-iskizofrenja. Wara għoti ta' haloperidol mill-vini, 21% tad-doża kienet eliminata fl-ippurgar u 33% fl-awrina. Anqas minn 3% tad-doża titneħħa mhux mibdula fl-awrina.

Linearità/nuqqas ta' linearità

Teżisti relazzjoni lineari bejn id-doża ta' haloperidol u l-konċentrazzjonijiet fil-plażma fl-adulti.

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani

Il-konċentrazzjonijiet ta' haloperidol fil-plażma f'pazjenti anzjani kienu oghla minn ta' adulti iżgħar li ngħataw l-istess doża. Riżultati minn studji klinici żgħar jissuggerixxu tneħħija ta' haloperidol inqas u *half-life* ta' eliminazzjoni itwal f'pazjenti anzjani. Ir-riżultati qegħdin fil-varjabilità osservata tal-farmakokinetika ta' haloperidol. Huwa rrakkomandat aġġustament fid-doża ta' pazjenti anzjani (ara sezzjoni 4.2).

Indeboliment tal-kliwi

L-influwenza ta' indeboliment tal-kliwi fuq il-farmakokinetika ta' haloperidol ma gietx ivvalutata. Madwar terz tad-doża ta' haloperidol jitneħħa fl-awrina, l-aktar bħala metaboliti. Anqas minn 3% mill-haloperidol li jingħata jiġi eliminat mhux mibdul fl-awrina. Il-metaboliti ta' haloperidol mhumix meqjusa li jagħtu kontribut sinifikanti għall-attività tiegħu; għalkemm għall-metabolit imnaqqas ta' haloperidol konverżjoni lura għal haloperidol ma tistax tiġi eskluża kompletament. Anke jekk indeboliment tal-funzjoni tal-kliwi mhijiex mistennija li taffettwa l-eliminazzjoni ta' haloperidol sa punt rilevanti b'mod kliniku, hija rrakkomadata l-kawtela f'pazjenti b'indeboliment tal-kliwi, u speċjalment dawk b'indeboliment sever tal-kliwi, minhabba l-*half-life* twila ta' haloperidol u l-metabolit imnaqqas tiegħu, u l-possibbiltà ta' akkumulazzjoni (ara sezzjoni 4.2).

Minhabba l-volum ta' distibuzzjoni kbir ta' haloperidol u l-irbit kbir tiegħu mal-proteini, ammonti żgħir hafna biss jitnehhew permezz tad-dijalisi.

Indeboliment tal-fwied

L-influwenza ta' indeboliment tal-fwied fuq il-farmakokinetika ta' haloperidol ma gietx ivvalutata. Madankollu, indeboliment tal-fwied jista' jkollu effetti sinifikanti fuq il-farmakokinetika ta' haloperidol minhabba li huwa jiġi mmetabolizzat b'mod estensiv fil-fwied. Għalhekk hija rrakkomandata nofs id-doża tal-bidu u l-kawtela f'pazjenti b'indeboliment tal-fwied (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.4).

Relazzjonijiet farmakokinetiċi/farmakodinamiċi

Konċentrazzjonijiet terapewtiċi

Abbażi ta' dejta ppublikata minn hafna studji kliniċi, rispons terapewtiku jinkiseb fil-biċċa l-kbira tal-pazjenti bi skizofrenja akuta jew kronika b'konċentrazzjonijiet fil-plażma ta' 1 sa 10 ng/ml. Sottosett ta' pazjenti jistgħu jkunu jehtieġu konċentrazzjonijiet akbar konsegwenza ta' varjabilità kbira bejn individwu u ieħor fil-farmakokinetika ta' haloperidol.

F'pazjenti bl-ewwel episodju ta' skizofrenja, rispons terapewtiku jista' jinkiseb b'konċentrazzjonijiet baxxi ta' 0.6 sa 3.2 ng/ml, kif stmat abbażi ta' kejl tal-okkupanza tar-riċettur D₂ u jekk wiehed jassumi li livell ta' okkupanza tar-riċettur D₂ ta' 60 sa 80% huwa l-aktar xieraq biex jinkiseb rispons terapewtiku u jiġi limitati s-sintomi ekstrapiramidali. Bħala medja, konċentrazzjonijiet f'din il-firxa jinkisbu b'dożi ta' milligramma 1 sa 4 mg kuljum.

Minhabba l-varjabilità kbira li hemm bejn individwu u ieħor fil-farmakokinetika ta' haloperidol u fir-relazzjoni bejn il-konċentrazzjoni u l-effett, huwa rrakkomandat li d-doża individwali ta' haloperidol tiġi aġġustata abbażi tar-rispons tal-pazjent, fejn għandha titqies dejta li tissuggerixxi dewmien ta' 5 ijiem biex jintlaħaq nofs ir-rispons terapewtiku massimu. Il-kejl tal-konċentrazzjonijiet ta' haloperidol fid-demm jista' jitqies f'kazijiet individwali.

Effetti kardjovaskulari

Ir-riskju ta' tul fl-intervall QTc jiżdied mad-doża ta' haloperidol u mal-konċentrazzjonijiet ta' haloperidol fil-plażma.

Sintomi ekstrapiramidali

Sintomi ekstrapiramidali jistgħu jseħhu fil-firxa terapewtika, għalkemm il-frekwenza generalment hija akbar b'doži li jipproduċu konċentrazzjonijiet oġhla minn dawk terapewtiċi.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku bbażat fuq studji konvenzjonali ta' effett tossiku minn doži ripetuti u effett tossiku fuq il-ġeni, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin. Fl-annimali gerriema, l-ġhoti ta' haloperidol weraw tnaqqis fil-fertilità, teratoġeniċità limitata kif ukoll effetti tossiċi għall-embriju.

Fi studju dwar karċinogeniċità ta' haloperidol, deheru żidiet dipendenti mid-doża f'adenomi tal-glandola pitwitarja u karċinomi tal-glandola mammarja fil-ġrieden nisa. Dawn it-tumuri jistgħu jiġu kkawżati minn antagoniżmu fit-tul ta' dopamine D₂ u iperprolaktinimja. Ir-rilevanza ta' dawn is-sejbiet dwar tumuri fil-firien f'termini ta' riskju għall-bniedem mhijiex magħrufa.

Haloperidol intwera li jimblokka l-kanal kardjaku hERG *in vitro* f'diversi studji ppublikati. F'numru ta' studji *in vivo*, l-ġhoti ta' haloperidol mill-vini f'xi annimali bħala mudelli kkawżaw titwil sinifikanti

fl-intervall QTc b' dozi ta' madwar 0.3 mg/kg, li jipproduċu livelli tas- C_{max} fil-plażma li kienu mill-inqas 7 sa 14-il darba aktar mill-konċentrazzjonijiet terapewtiċi ta' 1 sa 10 ng/ml fil-plażma li kienu effettivi fil-biċċa l-kbira tal-pazjenti fi studji kliniċi. Dawn id-dozi fil-vini, li tawlu l-intervall QTc, ma kkawżaw arritmiji. F'xi studji fl-animali, dozi oghla ta' haloperidol mill-vini ta' 1 mg/kg jew aktar ikkawżaw titwil fil-intervall QTc u/jew arritmiji tal-ventrikulu f'livelli tas- C_{max} fil-plażma li kienu mill-inqas 38 sa 137 darba oghla mill-konċentrazzjonijiet terapewtiċi fil-plażma li kienu effettivi fil-maġġoranza tal-pazjenti fi studji kliniċi.

6. TAGHRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta' eċċipjenti

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

6.2 Inkompatibbiltajiet

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-hażna



[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta' dak li hemm ġo fih

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittiehdu meta jintrema u għal immaniġġar iehor

- Qabel tuża l-ampulla, dawwarha f'it bejn iż-żewġ paliet tal-idejn biex issaħħan il-prodott.
- Zomm l-ampulla bejn is-saba' l-kbir u l-werrej, filwaqt li thalli t-tarf tal-ampulla liberu.
- Bl-id l-oħra, zomm it-tarf tal-ampulla billi tpoġġi s-saba' l-werrej mal-ġhonq tal-ampulla, u s-saba' l-kbir fuq it-tikka kkulurita parallela maċ-ċrieki ta' identifikazzjoni.
- Filwaqt li żżomm is-saba l-kbir fuq it-tikka, kisser f'daqqa t-tarf tal-ampulla waqt li żżomm b'mod sod il-parti l-oħra tal-ampulla f'idejk.



Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa' wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-ligijiet lokali.

7. ID-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

{ Isem u indirizz }

<{tel}>

<{fax}>

<{e-mail}>

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: {JJ xahar SSSS}

Data tal-ahhar tiġdid: {JJ xahar SSSS}

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

10. DATA TA' REVIŻJONI TAT-TEST

{XX/SSSS}

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

TIKKETTAR

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KARTUNA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

HALDOL u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 1 mg pilloli

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

haloperidol

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pillola

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Użu orali

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

10. PREKAWZZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

{Isem u indirizz}

<{tel}>

<{fax}>

<{e-mail}>

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

13. NUMRU TAL-LOTT

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluz

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI FOLJA
--

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

HALDOL u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 1 mg pilloli

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

haloperidol

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ
--

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

{Isem}

3. DATA TA' SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

5. OHRAJN

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KARTUNA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

HALDOL u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 2 mg pilloli

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

haloperidol

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pillola

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Użu orali

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

10. PREKAWZZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

{Isem u indirizz}

<{tel}>

<{fax}>

<{e-mail}>

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

13. NUMRU TAL-LOTT

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluz

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI FOLJA
--

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

HALDOL u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 2 mg pilloli

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

haloperidol

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ
--

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

{Isem}

3. DATA TA' SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

5. OHRAJN

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KARTUNA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

HALDOL u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 4 mg pilloli

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

haloperidol

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pillola

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Użu orali

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlahaqx mit-tfal

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

10. PREKAWZZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

{Isem u indirizz}

<{tel}>

<{fax}>

<{e-mail}>

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

13. NUMRU TAL-LOTT

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluz

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI FOLJA
--

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

HALDOL u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 4 mg pilloli

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

haloperidol

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ
--

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

{Isem}

3. DATA TA' SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

5. OHRAJN

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KARTUNA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

HALDOL u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 5 mg pilloli

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

haloperidol

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pillola

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Użu orali

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

10. PREKAWZZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

{Isem u indirizz}

<{tel}>

<{fax}>

<{e-mail}>

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

13. NUMRU TAL-LOTT

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluz

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI FOLJA
--

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

HALDOL u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 5 mg pilloli

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

haloperidol

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ
--

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

{Isem}

3. DATA TA' SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

5. OHRAJN

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**KARTUNA****1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI**

HALDOL u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 10 mg pilloli

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

haloperidol

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pillola

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Użu orali

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**8. DATA TA' SKADENZA**

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

10. PREKAWZZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

{Isem u indirizz}

<{tel}>

<{fax}>

<{e-mail}>

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

13. NUMRU TAL-LOTT

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluz

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI FOLJA
--

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

HALDOL u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 10 mg pilloli

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

haloperidol

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ
--

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

{Isem}

3. DATA TA' SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

5. OHRAJN

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KARTUNA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

HALDOL u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 20 mg pilloli

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

haloperidol

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pillola

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Użu orali

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlahaqx mit-tfal

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

10. PREKAWZZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

{Isem u indirizz}

<{tel}>

<{fax}>

<{e-mail}>

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

13. NUMRU TAL-LOTT

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluz

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI FOLJA
--

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

HALDOL u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 20 mg pilloli

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

haloperidol

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ
--

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

{Isem}

3. DATA TA' SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

5. OHRAJN

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KARTUNA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

HALDOL u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 2 mg/ml soluzzjoni orali

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

haloperidol

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni orali

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Użu orali

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlahaqx mit-tfal

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

10. PREKAWZZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

{Isem u indirizz}

<{tel}>

<{fax}>

<{e-mail}>

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

13. NUMRU TAL-LOTT

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluz

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:
SN:
NN:

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT TIKKETTA TAL-FLIXKUN
--

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

HALDOL u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 2 mg/ml soluzzjoni orali

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

haloperidol

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA
--

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT
--

Soluzzjoni orali

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA
--

Użu orali

Aqra l-fuljett ta' taghrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlahaqx mit-tfal

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA
--

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

10. PREKAWZZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

{Isem u indirizz}

<{tel}>

<{fax}>

<{e-mail}>

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

13. NUMRU TAL-LOTT

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**KARTUNA****1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI**

HALDOL u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 10 mg/ml soluzzjoni orali

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

haloperidol

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni orali

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Użu orali

Aqra l-fuljett ta' taghrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlahaqx mit-tfal

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**8. DATA TA' SKADENZA**

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

10. PREKAWZZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

{Isem u indirizz}

<{tel}>

<{fax}>

<{e-mail}>

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

13. NUMRU TAL-LOTT

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluz

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT TIKKETTA TAL-FLIXKUN
--

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

HALDOL u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 10 mg/ml soluzzjoni orali

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

haloperidol

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA
--

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT
--

Soluzzjoni orali

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA
--

Użu orali

Aqra l-fuljett ta' taghrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlahaqx mit-tfal

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA
--

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

10. PREKAWZZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

{Isem u indirizz}

<{tel}>

<{fax}>

<{e-mail}>

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

13. NUMRU TAL-LOTT

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**KARTUNA****1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI**

HALDOL u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 5 mg/ml soluzzjoni għall-injezzjoni

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

haloperidol

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Użu għal ġol-muskoli biss

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**8. DATA TA' SKADENZA**

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

10. PREKAWZZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

{Isem u indirizz}

<{tel}>

<{fax}>

<{e-mail}>

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

13. NUMRU TAL-LOTT

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluz

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGHAR EWLENIN AMPULLA
--

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

HALDOL u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 5 mg/ml soluzzjoni għall-injezzjoni

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

haloperidol

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ
--

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

{Isem}

3. DATA TA' SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

5. OHRAJN

FULJETT TA' TAGHRIF

Fuljett ta' taghrif: Informazzjoni għall-pazjent

HALDOL u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 1 mg pilloli
HALDOL u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 2 mg pilloli
HALDOL u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 4 mg pilloli
HALDOL u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 5 mg pilloli
HALDOL u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 10 mg pilloli
HALDOL u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 20 mg pilloli

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

haloperidol

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tiehu din il-mediċina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.
- Din il-mediċina għet mogħtija lilek. M'għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista' tagħmlilhom il-ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sinjali ta' mard bħal tiegħek.
- Jekk ikollok xi effetti sekondarju kellew lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek. Dan jinkludi xi effetti sekondarju possibbli li mhuwix elenkat f'dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F'dan il-fuljett:

1. X'inhum Haldol u għalxiex jintuża
2. X'għandek tkun taf qabel ma tiehu Haldol
3. Kif għandek tiehu Haldol
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif taħzen Haldol
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1. X'inhum Haldol u għalxiex jintuża

L-isem tal-mediċina tiegħek huwa Haldol.

Haldol fih is-sustanza attiva haloperidol. Din tagħmel parti minn grupp ta' mediċini msejha 'antipsikotiċi'.

Haldol jintuża fl-adulti, fl-adolesxenti u fit-tfal għal mard li jaffettwa l-mod kif inti taħseb, thossok jew iggib ruhek. Dawn jinkludu problemi ta' saħħa mentali (bħal skizofrenja u disturb bipolari) u problemi ta' mġieba.

Dan il-mard jista' jgħieghlek:

- Thossok konfuż/a (delirju)
- Tara, tisma, thoss jew ixxomm affarijiet li mhumix hemm (allucinazzjonijiet)
- Temmen affarijiet li mhumix minnhom (delużjonijiet)
- Thossik suspettuż/a b'mod mhux tas-soltu (paranojja)
- Thossok eċitat/a, aġitat/a, entużjast/a, impulsiv/a hafna jew attiv/a b'mod mhux normali
- Thossok aggressiv/a, ostili jew vjolenti hafna.

Fl-adolesxenti u fit-tfal, Haldol jintuża biex jitratta skizofrenja f'pazjenti li għandhom minn 13 sa 17-il sena, u biex jitratta problemi ta' mġieba f'pazjenti li għandhom minn 6 snin sa 17-il sena.

Haldol jintuża wkoll:

- Fl-adolesxenti u tfal li għandhom minn 10 snin sa 17-il sena u fl-adulti għal movmenti jew ħsejjes li ma tistax tikkontrolla (tiks), per eżempju fis-sindrom ta' Tourette sever
- Fl-adulti biex jgħin jikkontrolla movimenti fil-marda ta' Huntington.

Haldol xi drabi jintuża meta mediċini jew trattamenti oħra ma jkunux haċmu jew ikunu kkawżaw effetti sekondarji mhux aċċettabbli.

2. X'ghandek tkun taf qabel ma tiehu Haldol

Tihux Haldol jekk:

- Inti allergiku/a għal haloperidol jew għal xi sustanza oħra ta' din il-mediċina (elenkati fis-sezzjoni 6)
- Inti tkun anqas konxju tal-affarijiet madwarek jew ir-reazzjonijiet tiegħek isiru bil-mod b'mod mhux tas-soltu
- Inti għandek il-marda tal- Parkinson
- Inti għandek tip ta' dimenzja msejja 'dimenzja bil-korp Lewy'
- Inti għandek paralizi sopranukleari progressiva (PSP - *progressive supranuclear palsy*)
- Inti għandek kondizzjoni tal-qalb imsejja 'intervall QT imtawwal', jew kwalunkwe problema oħra bir-ritmu tal-qalb tiegħek li tidher bħala ntraċċar mhux normali fuq ECG (elettrokardjogramma)
- Inti għandek insuffiċjenza tal-qalb jew dan l-aħħar tak attakk tal-qalb
- Inti għandek livell baxx ta' potassium fid-demm tiegħek, li ma ġiex ittrattat
- Inti tiehu kwalunkwe waħda mill-mediċini elenkati taħt 'Mediċini oħra u Haldol - Tihux Haldol jekk inti qed tiehu ċerti mediċini għal'.

Tihux din il-mediċina jekk xi waħda minn dawn t'hawn fuq tapplika għalik. Jekk għandek xi dubju, kellek lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek qabel tiehu Haldol.

Twissijiet u prekawzjonijiet

Effetti sekondarji serji

Haldol jista' jikkawża problemi bil-qalb, problemi bil-kontroll ta' movimenti tal-ġisem jew tad-dirġajn u r-riġlejn u effetti sekondarji serji msejja 'sindrom newrolettiku malinn'. Huwa jista' jikkawża wkoll reazzjonijiet allergiċi severi u tagħqid tad-demm. Inti għandek tkun konxju tal-effetti sekondarji serji waqt li tkun qed tiehu Haldol minhabba li inti tista' tkun tehtiegħ trattament mediku urġenti. Ara 'Oqghod attent/a għal effetti sekondarji serji' f'sezzjoni 4.

Persuni anzjani u persuni bid-dimenzja

Żieda żgħira fl-imwiet u fil-puplesija ġiet irrappurtata għal persuni anzjani b'dimenzja li jkunu qed jieħdu mediċini antipsikotiċi. Kellek lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek qabel tiehu Haldol jekk inti anzjan/a, b'mod partikolari jekk għandek id-dimenzja.

Kellek lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek jekk inti għandek:

- Tahbit tal-qalb bil-mod, mard tal-qalb, jew xi hadd fil-familja tiegħek li miet zoptu minhabba problemi tal-qalb
- Pressjoni baxxa, jew thossok stordut/a meta tqum bilqegħda jew bilwieqfa
- Livell baxx ta' potassium jew magnesium (jew 'elettrolit' ieħor) fid-demm tiegħek. It-tabib tiegħek se jiddeċiedi kif jitratta dan
- Qatt kellek hrug ta' demm fil-mohħ, jew it-tabib tiegħek qallek li inti għandek aktar probabbiltà minn persuni oħra li tgħaddik puplesija
- Epilessija jew qatt kellek aċċessjonijiet (konvulzjonijiet)
- Problemi bil-kliewi, bil-fwied jew bil-glandola tat-tirojde
- Livell għoli tal-ormon 'prolaktin' fid-demm tiegħek, jew kanċer li jista' jiġi kkawżat minn livelli għoljin tal-prolaktin (bħal kanċer tas-sider)
- Storja ta' tagħqid tad-demm, jew xi hadd ieħor fil-familja għandu storja ta' tagħqid tad-demm
- Depressjoni, jew inti għandek disturb bipolari u tibda thossok depress/a.

Inti tista' tkun tehtieg tigi mmonitorjat/a aktar mill-qrib, u l-ammont ta' Haldol li tiehu jista' jkollu bzonn jinbidel.

Jekk inti m'intix cert/a jekk xi wahda minn dawn tapplikax ghalik, kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tieghek qabel tiehu Haldol.

Eżamijiet mediċi

It-tabib tieghek jista' jkun irid jiehu elettrokardjogramma (ECG, *electrocardiogram*) qabel jew waqt it-trattament tieghek b'Haldol. L-ECG tkejjel l-attività elettrika tal-qalb tieghek.

Testijiet tad-demm

It-tabib tieghek jista' jkun irid jiċċekkja l-livelli tal-potassium jew tal-magnesium (jew 'elettrolit' ieħor) fid-demm tieghek qabel jew matul it-trattament tieghek b'Haldol.

Tfal taht is-6 snin

Haldol m'għandux jintuża fi tfal taht is-6 snin. Dan minhabba li huwa għadu ma giex studjat b'mod xieraq f'dan il-grupp ta' età.

Mediċini oħra u Haldol

Għid lit-tabib jew lill-ispizjar tieghek jekk qieghed tiehu, hadt dan l-aħħar jew tista' tiehu xi mediċina oħra.

Tihux Haldol jekk inti tkun qed tiehu ċerti mediċini għal:

- Problemi bit-tahbit tal-qalb tieghek (bħal amiodarone, dofetilide, disopyramide, dronedarone, ibutilide, quinidine u sotalol)
- Depressjoni (bħal citalopram u escitalopram)
- Psikozi (bħal fluphenazine, levomepromazine, perphenazine, pimozide, prochlorperazine, promazine, sertindole, thiorizadine, trifluoperazine, triflupromazine u ziprasidone)
- Infezzjonijiet bil-batterji (bħal azithromycin, clarithromycin, erythromycin, levofloxacin, moxifloxacin u telithromycin)
- Infezzjonijiet bil-fungu (bħal pentamidine)
- Malarja (bħal halofantrine)
- Nawsja u rimettar (bħal dolasetron)
- Kanċer (bħal toremifene u vandetanib).

Għid lit-tabib tieghek ukoll jekk inti qed tiehu bepridil (għal uġiġh fis-sider jew biex tbaxxi l-pressjoni) jew methadone (mediċina kontra l-uġiġh jew bħala trattament għall-vizzju tad-droga). Dawn il-mediċini jistgħu jagħmlu problemi tal-qalb aktar possibbli, għalhekk kellem lit-tabib tieghek jekk inti qed tiehu kwalunkwe wahda minn dawn u tihux Haldol (ara 'Tihux Haldol jekk').

Jista' jkun mehtieg monitoraġġ speċjali jekk inti tkun qed tiehu lithium u Haldol fl-istess

hin. Għid lit-tabib tieghek minnufih u ieqaf hu ż-żewġ mediċini jekk:

- Ikollok deni li ma tistax tispjega minn fejn gie jew movimenti li ma tistax tikkontrolla
 - Tkun konfuż/a, diżorjentat/a, ikollok uġiġh ta' ras, problemi bil-bilanċ u thossok bi nġhas.
- Dawn huma sintomi ta' kundizzjoni serja.

Ċerti mediċini jistgħu jaffettwaw il-mod kif jahdem Haldol jew jistgħu jġieghlu problemi tal-qalb isiru aktar possibbli

Għid lit-tabib tieghek jekk inti qed tiehu:

- Alprazolam jew buspirone (għall-ansjetà)
- Duloxetine, fluoxetine, fluvoxamine, nefazodone, paroxetine, sertraline, St John's Wort (*Hypericum, perforatum*) jew venlafaxine (għad-depressjoni)
- Bupropion (għad-depressjoni jew biex jgħinek tieqaf tpejjep)
- Carbamazepine, phenobarbital jew phenytoin (għall-epilessija)
- Rifampicin (għal infezzjonijiet bil-batterji)
- Itraconazole, posaconazole jew voriconazole (għal infezzjonijiet bil-fungu)

- Pilloli ta' ketoconazole (għat-trattament tas-sindrom ta' Cushing)
- Indinavir, ritonavir jew saquinavir (għall-virus tal-immunodeficienza umana jew HIV)
- Chlorpromazine jew promethazine (għad-dardir u r-rimettar)
- Verapamil (għall-pressjoni jew għal problemi tal-qalb).

Għid lit-tabib tiegħek ukoll jekk inti qed tiehu mediċini oħra biex tbaxxi l-pressjoni, bħal pilloli tal-pipi (dijuretici).

It-tabib tiegħek jista' jibdel id-doża ta' Haldol tiegħek jekk inti tkun qed tiehu xi waħda minn dawn il-mediċini.

Haldol jista' jaffettwa l-mod kif it-tipi ta' mediċini li ġejjin jahdmu

Għid lit-tabib tiegħek jekk inti qed tiehu mediċini:

- Biex jikkalmawk jew jgħinuk torqod (kalmanti)
- Għall-uġigh (pilloli qawwija tal-uġigh)
- Għad-depressjoni ('mediċini triċikliki kontra d-depressjoni')
- Biex ibaxxu l-pressjoni (bħal guanethidine u methyldopa)
- Għal reazzjonijiet allergiċi severi (adrenalina)
- Għad-disturb ta' nuqqas ta' attenzjoni u attività eċċessiva (ADHD, *attention deficit hyperactivity disorder*) jew narkolepsija (magħrufa bħala 'stimulanti')
- Għall-marda tal-Parkinson (bħal levodopa)
- Biex iraqqu d-demm (phenindione).

Kellem lit-tabib tiegħek qabel tiehu Haldol jekk inti qed tiehu xi waħda minn dawn il-mediċini.

Haldol u l-alkohol

Ix-xorb tal-alkohol waqt li inti tkun qed tiehu Haldol jista' jgħiegħlek thossok bi nġhas u inqas attent. Dan ifisser li inti għandek toqghod attent/a kemm tixrob alkohol. Kellem lit-tabib tiegħek dwar ix-xorb tal-alkohol waqt li tkun qed tiehu Haldol, u għid lit-tabib tiegħek kemm tixrob.

Tqala, treddigh u fertilità

Tqala – jekk inti tqila, taħseb li tista' tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir tat-tabib tiegħek. It-tabib tiegħek jista' jagħtik parir ma tihux Haldol waqt li tkun tqila.

Il-problemi li ġejjin jistgħu jsehhu fi trabi tat-twelid ta' ommijiet li jiehdu Haldol fl-aħħar 3 xhur tat-tqala tagħhom (l-aħħar trimestru):

- Rogħda fil-muskoli, muskoli ibsin jew dgħajfa
- Ikunu bi nġhas jew aġitati
- Problemi biex jieħdu n-nifs jew biex jinsqew.

Il-frekwenza eżatta ta' dawn il-problemi mhijiex magħrufa. Jekk inti hadt Haldol waqt it-tqala u t-tarbija tiegħek tiżviluppa xi wiehed minn dawn l-effetti sekondarji, ikkuntattja lit-tabib tiegħek.

Treddigh – kellem lit-tabib tiegħek jekk inti qed tredda' jew qed tippjana li tredda'. Dan minhabba li ammonti żgħir tal-mediċina jistgħu jgħaddu għal ġol-halib tas-sider tal-omm u jgħaddu lit-tarbija. It-tabib tiegħek se jiddiskuti r-riskji u l-benefiċċji tat-treddigh waqt li inti tkun qed tiehu Haldol.

Fertilità – Haldol jista' jżid il-livelli tiegħek ta' ormon imsejjah 'prolaktin', li jista' jaffettwa l-fertilità fl-irġiel u n-nisa. Kellem lit-tabib tiegħek jekk għandek xi mistoqsijiet dwar dan.

Sewqan u thaddim ta' magni

Haldol jista' jaffettwa l-hila li inti ssuq u tuża għodod jew thaddem magni. Effetti sekondarji bħal, thossok bi nġhas, jistgħu jaffettwaw l-attenzjoni tiegħek, b'mod partikolari fil-bidu li tibda tieħdu jew wara doża għolja. Issuqx, tużax għodod u thaddimx magni mingħajr mal-ewwel tiddiskuti dan mat-tabib tiegħek.

Haldol fih

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

3. Kif ghandek tiehu Haldol

Dejjem ghandek tiehu din il-medicina skont il-parir ezatt tat-tabib jew tal-ispizjar tieghek. Dejjem ghandek taččerta ruhek mat-tabib jew mal-ispizjar tieghek jekk ikollok xi dubju.

Kemm ghandek tiehu

It-tabib tieghek se jghidlek kemm-il pillola ghandek tiehu u ghal kemm zmien. It-tabib tieghek se jghidlek ukoll jekk tihux Haldol darba jew darbtejn kuljum. Jista' jghaddi ftit taż-zmien qabel ma inti tibda thoss l-effett kollu tal-medicina. It-tabib tieghek is-soltu jaghtik doża baxxa biex tibda, imbagħad jagğusta d-doża biex tkun tajba ghalik. Huwa importanti hafna li inti tiehu l-ammont it-tajjeb.

Id-doża tieghek ta' haloperidol se tkun tiddependi fuq:

- L-età tieghek
- X'kundizzjoni qed tiġi ttrattat/a għaliha
- Jekk inti għandekx problemi fil-kliwi jew fil-fwied
- Medicini ohra li inti qed tiehu.

Adulti

- Id-doża tieghek is-soltu tkun bejn 0.5 mg u 10 mg kuljum.
- It-tabib tieghek jista' jagğustaha biex isib id-doża li tkun l-aktar tgħodd għalik.
- L-oghla doża li għandhom jiehdu l-adulti tiddependi fuq il-kundizzjoni li inti tkun qed tiġi ttrattat għaliha u tvarja bejn 5 mg u 20 mg kuljum.

Persuni anzjani

- Persuni anzjani s-soltu jibdwu b'0.5 mg kuljum jew nofs id-doża l-aktar baxxa fl-adulti.
- In-numru ta' pilloli li tiehu imbagħad jiġi agğustat sakemm it-tabib isib id-doża li tkun l-aktar tgħodd għalik.
- L-oghla doża li għandhom jiehdu persuni anzjani hija 5 mg kuljum hlief jekk it-tabib tieghek jiddeċiedi li hija meħtieġa doża oghla.

Tfal u adolexxenti minn 6 snin sa 17-il sena

- Id-doża tieghek is-soltu tkun bejn 0.5 mg u 3 mg kuljum.
- L-adolexxenti sa 17-il sena li jkunu qed jiġu ttrattati għal skizofrenja jew problemi ta' mġieba jistgħu jiehdu doża oghla, sa 5 mg kuljum.

Kif ghandek tiehu Haldol

- Haldol qiegħed biex jintuża mill-halq.
- Ibla' l-pilloli ma' ftit ilma.

Jekk tiehu aktar Haldol milli suppost

Jekk tiehu aktar Haldol milli qalulek jew jekk xi haddiehor ha xi Haldol, kellem tabib jew mur fl-eqreb dipartiment tal-emergenza ta' spatar minnufih.

Jekk tinsa tiehu Haldol

- Jekk tinsa tiehu doża, hu d-doża li jmissek bhas-soltu. Imbagħad ibqa' hu l-medicina tieghek kif ikun qallek it-tabib tieghek.
- Tihux doża doppja.

Jekk tieqaf tiehu Haldol

Sakemm it-tabib tieghek ma jghidlekx mod iehor, inti ghandek tieqaf tiehu Haldol bil-mod il-mod. It-twaqqif f'daqqa tat-trattament jista' jikkawża effetti bhal:

- Nawsja u rimettar
- Diffikultà biex torqod.

Dejjem segwi l-istruzzjonijiet tat-tabib tieghek b'attenzjoni.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' din il-medicina, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

4. Effetti sekondarji possibbli

Bhal kull medicina ohra, din il-medicina tista' tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f'kulhadd.

Oqghod attent/a għal effetti sekondarji serji

Għid lit-tabib tiegħek mill-ewwel jekk inti tinnota jew tissuspetta xi waħda minn dawn li ġejjin. Inti tista' tkun tehtiegħ trattament mediku urġenti.

Problemi bil-qalb:

- Ritmu mhux normali ta' taħbit tal-qalb – dan iwaqqaf il-qalb milli taħdem b'mod normali u jista' jikkawża telf mis-sensi
- Taħbit tal-qalb mgħagħel b'mod mhux normali
- Taħbitiet żejda tal-qalb.

Problemi fil-qalb mhumix komuni f'persuni li jkunu qed jiehdu Haldol (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 100). Mewt zoptu seħhet f'pazjenti li kienu qed jiehdu din il-medicina iżda l-frekwenza eżatta ta' dawn l-imwiet mhijiex magħrufa. Waqfien kardijaku (il-qalb tieqaf thabbat) seħh ukoll f'persuni li kienu qed jiehdu medicini antipsikotiċi.

Problema serja msejha 'sindrom newrolettiku malinn'. Dan jikkawża deni għoli, ebusija severa fil-muskoli, konfużjoni u telf mis-sensi. Huwa rari f'persuni li jkunu qed jiehdu Haldol (jista' jaffettwa sa persuna 1 minn kull 1,000).

Problemi biex jiġu kkontrollati movimenti tal-ġisem jew tad-dirghajn u r-riglejn (disturb ekstrapiramidali), bhal:

- Movimenti tal-halq, tal-ilsien, tax-xedaq u xi drabi tad-dirghajn u r-riglejn (diskajneżja tardiva)
- Thossok bla kwiet jew issibha diffiċli toqghod bla ma tiċċaqlaq, zieda fil-movimenti tal-ġisem
- Movimenti tal-ġisem bil-mod jew imnaqqsa, movimenti bl-iskossi jew bit-tkghawwiġ
- Rogħda jew ebusija fil-muskoli, tkaxkir mal-mixi
- Ma tkunx tista' tiċċaqlaq
- Nuqqas ta' espressjoni normali tal-wiċċ li xi drabi jidher qisu maskra.

Dawn huma komuni hafna f'persuni li jiehdu Haldol (jistgħu jaffettwaw aktar minn persuna 1 minn kull 10). Jekk ikollok xi wiehed minn dawn l-effetti, jista' jkun li inti tingħata medicina addizzjonali.

Reazzjoni allergika severa li tista' tinkludi:

- Wiċċ, xofftejn, halq, ilsien jew gerżuma minfuħin
- Tbatija biex tibla' jew biex tiehu n-nifs
- Raxx bil-hakk (horriqija).

Reazzjoni allergika mhijiex komuni f'persuni li jiehdu Haldol (tista' taffettwa sa persuna waħda minn kull 100).

Tagħqid tad-demm fil-vini, is-soltu fir-riglejn (trombozi fil-vini fil-fond jew DVT, *deep vein thrombosis*). Dan ġie rrapportat f'persuni li jiehdu medicini antipsikotiċi. Is-sinjali ta' DVT fir-rigel jinkludu nefha, uġiġh u hmura fir-rigel, iżda t-tagħqid tad-demm jista' jimxi għall-pulmun fejn jikkawża uġiġh fis-sider u diffikultà fit-tehid tan-nifs. Tagħqid tad-demm jista' jkun serju hafna, għalhekk għid lit-tabib tiegħek minnufih jekk tinnota xi waħda minn dawn il-problemi.

Għid lit-tabib tiegħek minnufih jekk inti tinnota xi waħda minn dawn l-effetti sekondarji serji t'hawn fuq.

Effetti sekundarji ohra

Ghid lit-tabib tieghek jekk inti tinnota jew tissuspetta xi wiehed mill-effetti sekundarji li ġejjin.

Komuni hafna (jistgħu jaffettwaw aktar minn persuna 1 minn kull 10):

- Thossok aġitat/a
- Diffikultà biex torqod
- Uġiġh ta' ras.

Komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 10):

- Problemi serji ta' saħħa mentali, bħal temmen affarijiet li mhumieix veri (delużjonijiet) jew tara, thoss, tisma' jew ixxomm affarijiet li mhumieix hemm (alluċinazzjonijiet)
- Depressjoni
- Tensjoni mhux normali fil-muskoli
- Thossok stordut/a, inkluz meta tqum bilqegħda jew bilwieqfa
- Thossok bi nġhas
- Moviment 'il fuq tal-ġhajnejn jew movimenti jġhaġġlu tal-ġhajnejn li inti ma tkunx tista' tikkontrolla
- Problemi bil-vista, bħal vista mċajpra
- Pressjoni baxxa
- Dardir, rimettar
- Stitikezza
- Halq xott jew žieda fir-rieq
- Raxx fil-ġilda
- Ma tkunx tista' tagħmel l-awrina jew tbattal il-bużżieqa tal-awrina kompletament
- Diffikultà biex tikseb u żżomm erezzjoni (impotenza)
- Žieda fil-piż jew telf ta' piż
- Bidliet li jidhru b'testijiet tad-demm tal-fwied.

Mhux komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 100):

- Effetti fuq iċ-ċelluli tad-demm – numru baxx tat-tipi kollha ta' ċelluli tad-demm, inkluz tnaqqis sever fiċ-ċelluli tad-demm bojod u numru baxx ta' 'plejtlits' (ċelluli li jgħinu d-demm jagħqad)
- Thossok konfuż
- Telf ta' ġibda għas-sess jew tnaqqis fil-ġibda għas-sess
- Aċċessjonijiet
- Muskoli u ġogi ibsin
- Spażmi, ġbid jew kontrazzjonijiet fil-muskoli li inti ma tistax tikkontrolla, inkluz spażmu fl-ghonq li jġieghel ir-ras tingibed lejn naħa waħda
- Problemi biex timxi
- Ikollok qtugħ ta' nifs
- Fwied iffjammat, jew problema fil-fwied li tikkawża sfurija fil-ġilda jew fl-abjad tal-ġhajnejn (suffejra)
- Žieda fis-sensittività tal-ġilda għax-xemx
- Hakk
- Hruġ eċċessiv ta' għaraq
- Bidliet fiċ-ċiklu tal-menstrwazzjoni (*period*), bħal ma jkunx hemm *periods*, jew *periods* li jieħdu fit-tul, bi tnixxija qawwiya u bl-uġiġh
- Produzzjoni mhux mistennija ta' ħalib tas-sider
- Uġiġh jew skumdità fis-sider
- Temperatura għolja tal-ġisem
- Nefha kkawżata minn akkumulazzjoni ta' fluwidu fil-ġisem.

Rari (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 1,000):

- Livell għoli tal-ormon 'prolaktin' fid-demm

- Passaġġi tan-nifs fil-pulmuni jidjiequ u jikkawżaw diffikultà bit-tehid tan-nifs
- Diffikultà biex tiftah jew ma tkunx tista' tiftah halqek
- Problemi biex taghmel is-sess.

L-effetti sekondarji li ġejjin kienu rrappurtati wkoll, iżda l-frekwenza eżatta tagħhom mhijiex magħrufa:

- Livell għoli tal-‘ormon antidijuretika’ fid-demm (sindrom ta’ sekrezzjoni mhux xierqa tal-ormon antidijuretika)
- Livell baxx ta’ zokkor fid-demm
- Nefha madwar il-laringi jew spażmu li ma jdumx fil-kordi vokali, li jista’ jikkawża diffikultà biex titkellem jew tieħu n-nifs
- Insuffiċjenza tal-fwied f’daqqa waħda
- Tnaqqis fit-tnixxija tal-bila fil-passaġġ tal-bila
- Ġilda bil-qxur jew li titqaxxar
- Kanali żgħar tad-demm iffjammati, li jwasslu għal raxx fil-ġilda b’hotob żgħar homor jew vjola
- Diżintegrazzjoni tat-tessut tal-muskolu (rabdomijolisi)
- Erezzjoni tal-pene persistenti u bl-uġiġħ
- Tkabbir tas-sider fl-irġiel
- Temperatura baxxa tal-ġisem.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek. Dan jinkludi xi effetti sekondarji li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imnizżla f’[Appendiċi V](#). Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il-medicina.

5. Kif taħzen Haldol

Żomm din il-medicina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-medicina wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq il-folja jew il-kartuna. Id-data ta’ meta tiskadi tirreferi għal l-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

Tarmix medicini mal-ilma tad-dranagġ <jew mal-iskart domestiku>. Staqsi lill-ispizjar tiegħek dwar kif għandek tarmi medicini li m’għadekx tuża. Dawn il-mizuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni ohra

X’fih Haldol

Is-sustanza attiva hi haloperidol.

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

Kif jidher Haldol u l-kontenut tal-pakkett

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq u l-Manifattur

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

{Isem u indirizz}

<{tel}>

<{fax}>

<{e-mail}>

Dan il-prodott mediċinali huwa awtorizzat fl-istati membri tal-EEA b'dawn l-ismijiet:

Austria, Belgium, Cyprus, France, Iceland, Italy, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Portugal, Romania, Sweden:	Haldol
Denmark, Finland:	Serenase
Germany:	Haldol-Janssen
Greece:	Aloperidin

Dan il-fuljett kien rivedut l-ahhar f' {xahar SSSS}.

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

<Sorsi ohra ta' informazzjoni>

<Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku ta' {isem tal-Istat Membru/Aġenzija}>

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

Fuljett ta' taghrif: Informazzjoni għall-pazjent

HALDOL u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 2 mg/ml soluzzjoni orali **HALDOL u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 10 mg/ml soluzzjoni orali**

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

haloperidol

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tiehu din il-medicina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

- Zomm dan il-fuljett. Jista' jkollok b'zonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.
- Din il-medicina għet mogħtija lilek. M'għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista' tagħmlilhom il-ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sinjali ta' mard bħal tiegħek.
- Jekk ikollok xi effetti sekondarju kellew lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek. Dan jinkludi xi effetti sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F'dan il-fuljett:

1. X'inhum Haldol u għalxiex jintuza
2. X'għandek tkun taf qabel ma tiehu Haldol
3. Kif għandek tiehu Haldol
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif taħzen Haldol
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1. X'inhum Haldol u għalxiex jintuza

L-isem tal-medicina tiegħek huwa Haldol.

Haldol fih is-sustanza attiva haloperidol. Din tagħmel parti minn grupp ta' medicini msejja 'antipsikotiċi'.

Haldol jintuza fl-adulti, fl-adolesxenti u fit-tfal għal mard li jaffettwa l-mod kif inti taħseb, thossok jew iġġib ruhek. Dawn jinkludu problemi ta' saħħa mentali (bħal skizofrenja u disturb bipolari) u problemi ta' mgieba.

Dan il-mard jista' jgħieghlek:

- Thossok konfuż/a (delirju)
- Tara, tisma, thoss jew ixxomm affarijiet li mhumix hemm (allucinazzjonijiet)
- Temmen affarijiet li mhumix minnhom (delużjonijiet)
- Thossik suspettuż/a b'mod mhux tas-soltu (paranojja)
- Thossok eċitat/a, agit/a, entużjast/a, impulsiv/a ħafna jew attiv/a b'mod mhux normali
- Thossok aggressiv/a, ostili jew vjolenti ħafna.

Fl-adolesxenti u fit-tfal, Haldol jintuza biex jitratta skizofrenja f'pazjenti li għandhom minn 13 sa 17-il sena, u biex jitratta problemi ta' mgieba f'pazjenti li għandhom minn 6 snin sa 17-il sena.

Haldol jintuza wkoll:

- Fl-adolesxenti u tfal li għandhom minn 10 snin sa 17-il sena u fl-adulti għal movmenti jew hsejjes li ma tistax tikkontrolla (tiks), per eżempju fis-sindrom ta' Tourette sever
- Fl-adulti biex jgħin jikkontrolla movimenti fil-marda tal-Huntington.

Haldol xi drabi jintuza meta medicini jew trattamenti oħra ma jkunux ħadmu jew ikunu kkawżaw effetti sekondarji mhux aċċettabbli.

2. X'ghandek tkun taf qabel ma tiehu Haldol

Tihux Haldol jekk:

- Inti allergiku/a ghal haloperidol) jew ghal xi sustanza ohra ta' din il-medicina (elenkati fis-sezzjoni 6)
- Inti tkun anqas konxju tal-affarijiet madwarek jew ir-reazzjonijiet tieghek isiru bil-mod b'mod mhux tas-soltu
- Inti ghandek il-marda ta' Parkinson
- Inti ghandek tip ta' dimenzja msejha 'dimenzja bil-korp Lewy'
- Inti ghandek paralizi sopranukleari progressiva (PSP - *progressive supranuclear palsy*)
- Inti ghandek kondizzjoni tal-qalb imsejha 'intervall QT imtawwal', jew kwalunkwe problema ohra bir-ritmu tal-qalb tieghek li tidher bhala ntračcar mhux normali fuq ECG (elettrokardjogramma)
- Inti ghandek insufficjenza tal-qalb jew dan l-ahhar tak attack tal-qalb
- Inti ghandek livell baxx ta' potassium fid-demm tieghek, li ma giex trattat
- Inti tiehu kwalunkwe wahda mill-medicini elenkati taht 'Medicini ohra u Haldol - Tihux Haldol jekk inti qed tiehu ċerti medicini ghal'.

Tihux din il-medicina jekk xi wahda minn dawn t'hawn fuq tapplika ghalik. Jekk ghandek xi dubju, kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tieghek qabel tiehu Haldol.

Twissijiet u prekawzjonijiet

Effetti sekondarji serji

Haldol jista' jikkawza problemi bil-qalb, problemi bil-kontroll ta' movimenti tal-gisem jew tad-dirghajn u r-iglejn u effett sekondarju serju msejjah 'sindrom newrolettiku malinn'. Huwa jista' jikkawza wkoll reazzjonijiet allergici severi u taghqid tad-demm. Inti ghandek tkun konxju tal-effetti sekondarji serji waqt li tkun qed tiehu Haldol minhabba li inti tista' tkun tehtieg trattament mediku urgenti. Ara 'Oqghod attent/a ghal effetti sekondarji serji' f'sezzjoni 4.

Persuni anzjani u persuni bid-dimenzja

Zieda zghira fl-imwiet u fil-puplesija giet irrappurtata ghal persuni anzjani b'dimenzja li jkunu qed jiehd medisini antipsikotici. Kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tieghek qabel tiehu Haldol jekk inti anzjan/a, b'mod partikolari jekk ghandek id-dimenzja.

Kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tieghek jekk inti ghandek:

- Tahbit tal-qalb bil-mod, mard tal-qalb, jew xi hadd fil-familja tieghek li miet zoptu minhabba problemi tal-qalb
- Pressjoni baxxa, jew thossok stordut/a meta tqum bilqeghda jew bilwieqfa
- Livell baxx ta' potassium jew magnesium (jew 'elettrolit' iehor) fid-demm tieghek. It-tabib tieghek se jiddeciedi kif jitratta dan
- Qatt kellek hrug ta' demm fil-mohh, jew it-tabib tieghek qallek li inti ghandek aktar probabbilta minn persuni ohra li tghaddik puplesija
- Epilessija jew qatt kellek accessjonijiet (konvulzjonijiet)
- Problemi bil-kliewi, bil-fwied jew bil-glandola tat-tirojde
- Livell gholi tal-ormon 'prolaktin' fid-demm tieghek, jew kanċer li jista' jigi kkawzat minn livelli gholjin tal-prolaktin (bhal kanċer tas-sider)
- Storja ta' taghqid tad-demm, jew xi hadd iehor fil-familja ghandu storja ta' taghqid tad-demm
- Depressjoni, jew inti ghandek disturb bipolar u tibda thossok depress/a.

Inti tista' tkun tehtieg tigi mmonitorjat/a aktar mill-qrib, u l-ammont ta' Haldol li tiehu jista' jkollu bzonn jinbidel.

Jekk inti m'intix ċert/a jekk xi wahda minn dawn tapplikax ghalik, kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tieghek qabel tiehu Haldol.

Eżamijiet mediċi

It-tabib tiegħek jista' jkun irid jiehu elettrokardjogramma (ECG, *electrocardiogram*) qabel jew waqt it-trattament tiegħek b'Haldol. L-ECG tkejjel l-attività elettrika tal-qalb tiegħek.

Testijiet tad-demm

It-tabib tiegħek jista' jkun irid jiċċekkja l-livelli tal-potassium jew tal-magnesium (jew 'elettrolit' ieħor) fid-demm tiegħek qabel jew matul it-trattament tiegħek b'Haldol.

Tfal taht is-6 snin

Haldol m'għandux jintuża fi tfal taht is-6 snin. Dan minhabba li huwa għadu ma ġiex studjat b'mod xieraq f'dan il-grupp ta' età.

Mediċini ohra u Haldol

Għid lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek jekk qiegħed tiehu, hadt dan l-aħhar jew tista' tiehu xi mediċina ohra.

Tihux Haldol jekk inti tkun qed tiehu ċerti mediċini għal:

- Problemi bit-tahbit tal-qalb tiegħek (bħal amiodarone, dofetilide, disopyramide, dronedarone, ibutilide, quinidine u sotalol)
- Depressjoni (bħal citalopram u escitalopram)
- Psikozi (bħal fluphenazine, levomepromazine, perphenazine, pimozide, prochlorperazine, promazine, sertindole, thiorizadine, trifluoperazine, triflupromazine u ziprasidone)
- Infezzjonijiet bil-batterji (bħal azithromycin, clarithromycin, erythromycin, levofloxacin, moxifloxacin u telithromycin)
- Infezzjonijiet bil-fungu (bħal pentamidine)
- Malarja (bħal halofantrine)
- Nawsja u rimettar (bħal dolasetron)
- Kanċer (bħal toremifene u vandetanib).

Għid lit-tabib tiegħek ukoll jekk inti qed tiehu bepridil (għal uġiġ fis-sider jew biex tbaxxi l-pressjoni) jew methadone (mediċina kontra l-uġiġ jew bħala trattament għall-vizzju tad-droga). Dawn il-mediċini jistgħu jagħmlu problemi tal-qalb aktar possibbli, għalhekk kellem lit-tabib tiegħek jekk inti qed tiehu kwalunkwe wahda minn dawn u tihux Haldol (ara 'Tihux Haldol jekk').

Jista' jkun mehtieg monitoraġġ speċjali jekk inti tkun qed tiehu lithium u Haldol fl-istess hin.

Għid lit-tabib tiegħek minnufih u ieqaf hu ż-żewġ mediċini jekk:

- Ikollok deni li ma tistax tispjega minn fejn ġie jew movimenti li ma tistax tikkontrolla
 - Tkun konfuż/a, diżorjentat/a, ikollok uġiġ ta' ras, problemi bil-bilanċ u thossok bi nġhas.
- Dawn huma sintomi ta' kundizzjoni serja.

Ċerti mediċini jistgħu jaffettwaw il-mod kif jahdem Haldol jew jistgħu jġieghlu problemi tal-qalb isiru aktar possibbli

Għid lit-tabib tiegħek jekk inti qed tiehu:

- Alprazolam jew buspirone (għall-ansjetà)
- Duloxetine, fluoxetine, fluvoxamine, nefazodone, paroxetine, sertraline, St John's Wort (*Hypericum perforatum*) jew venlafaxine (għad-depressjoni)
- Bupropion (għad-depressjoni jew biex jgħinek tieqaf tpejjep)
- Carbamazepine, phenobarbital jew phenytoin (għall-epilessija)
- Rifampicin (għal infezzjonijiet bil-batterji)
- Itraconazole, posaconazole jew voriconazole (għal infezzjonijiet bil-fungu)
- Pilloli ta' ketoconazole (għat-trattament tas-sindrom ta' Cushing)
- Indinavir, ritonavir jew saquinavir (għall-virus tal-immunodeficienza umana jew HIV)
- Chlorpromazine jew promethazine (għad-dardir u r-rimettar)
- Verapamil (għall-pessjoni jew għal problemi tal-qalb).

Ghid lit-tabib tieghek ukoll jekk inti qed tiehu mediċini ohra biex tbaxxi l-pressjoni, bħal pilloli tal-pipi (dijuretici).

It-tabib tieghek jista' jibdel id-doża ta' Haldol tieghek jekk inti tkun qed tiehu xi waħda minn dawn il-mediċini.

Haldol jista' jaffettwa l-mod kif it-tipi ta' mediċini li ġejjin jahdmu

Ghid lit-tabib tieghek jekk inti qed tiehu mediċini:

- Biex jikkalmawk jew jgħinuk torqod (kalmanti)
- Għall-uġigh (pilloli qawwija tal-uġigh)
- Għad-depressjoni ('mediċini triċikliċi kontra d-depressjoni')
- Biex ibaxxu l-pressjoni (bħal guanethidine u methyldopa)
- Għal reazzjonijiet allergiċi severi (adrenalina)
- Għad-disturb ta' nuqqas ta' attenzjoni u attività eċċessiva (ADHD, *attention deficit hyperactivity disorder*) jew narkolepsija (magħrufa bħala 'stimulanti')
- Għall-marda ta' Parkinson (bħal levodopa)
- Biex iraqqu d-demm (phenindione).

Kellem lit-tabib tieghek qabel tiehu Haldol jekk inti qed tiehu xi waħda minn dawn il-mediċini.

Haldol u l-alkohol

Ix-xorb tal-alkohol waqt li inti tkun qed tiehu Haldol jista' jġieghlek thossok bi nġhas u inqas attent. Dan ifisser li inti għandek toqghod attent/a kemm tixrob alkohol. Kellem lit-tabib tieghek dwar ix-xorb tal-alkohol waqt li tkun qed tiehu Haldol, u għid lit-tabib tieghek kemm tixrob.

Tqala, treddigh u fertilità

Tqala – jekk inti tqila, taħseb li tista' tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir tat-tabib tieghek. It-tabib tieghek jista' jagħtik parir ma tihux Haldol waqt li tkun tqila.

Il-problemi li ġejjin jistgħu jseħħu fi trabi tat-twelid ta' ommijiet li jiehdu Haldol fl-aħħar 3 xhur tat-tqala tagħhom (l-aħħar trimestru):

- Rogħda fil-muskoli, muskoli ibsin jew dgħajfa
- Ikunu bi nġhas jew aġitati
- Problemi biex jiehdu n-nifs jew biex jinsqew.

Il-frekwenza eżatta ta' dawn il-problemi mhijiex magħrufa. Jekk inti hadt Haldol waqt it-tqala u t-tarbija tieghek tiżviluppa xi wieħed minn dawn l-effetti sekondarji, ikkuntattja lit-tabib tieghek.

Treddigh – kellem lit-tabib tieghek jekk inti qed tredda' jew qed tippjana li tredda'. Dan minhabba li ammonti żgħir tal-mediċina jistgħu jgħaddu għal ġol-halib tas-sider tal-omm u jgħaddu lit-tarbija. It-tabib tieghek se jiddiskuti r-riskji u l-benefiċċji tat-treddigh waqt li inti tkun qed tiehu Haldol.

Fertilità – Haldol jista' jżid il-livelli tieghek ta' ormon imsejjah 'prolaktin', li jista' jaffettwa l-fertilità fl-irġiel u n-nisa. Kellem lit-tabib tieghek jekk għandek xi mistoqsijiet dwar dan.

Sewqan u thaddim ta' magni

Haldol jista' jaffettwa l-hila li inti ssuq u tuża għodod jew thaddem magni. Effetti sekondarji bħal, thossok bi nġhas, jistgħu jaffettwaw l-attenzjoni tieghek, b'mod partikolari fil-bidu li tibda tiehdu jew wara doża għolja. Issuqx, tużax għodod u thaddimx magni mingħajr mal-ewwel tiddiskuti dan mat-tabib tieghek.

Haldol fih

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

3. Kif ghandek tiehu Haldol

Dejjem ghandek tiehu din il-medicina skont il-parir eżatt tat-tabib jew tal-ispizjar tieghek. Dejjem ghandek taċċerta ruhek mat-tabib jew mal-ispizjar tieghek jekk ikollok xi dubju.

Kemm ghandek tiehu

It-tabib tieghek se jghidlek kemm ghandek tiehu Haldol u ghal kemm żmien. It-tabib tieghek se jghidlek ukoll jekk tihux Haldol darba jew darbtejn kuljum. Jista' jghaddi ftit taż-żmien qabel ma inti tibda thoss l-effett kollu tal-medicina. It-tabib tieghek is-soltu jagħtik doża baxxa biex tibda, imbagħad jagħgusta d-doża biex tkun tajba għalik. Huwa importanti hafna li inti tiehu l-ammont it-tajeb.

Id-doża tieghek ta' haloperidol se tkun tiddependi fuq:

- L-età tieghek
- X'kundizzjoni qed tiġi ttrattat/a għaliha
- Jekk inti għandekx problemi fil-kliwi jew fil-fwied
- Mediċini oħra li inti qed tiehu.

Adulti

- Id-doża tieghek is-soltu tkun bejn 0.5 mg u 10 mg kuljum.
- It-tabib tieghek jista' jagħgustaha biex isib id-doża li tkun l-aħjar għalik.
- L-ogħla doża li għandhom jiehdu l-adulti tiddependi fuq il-kundizzjoni li tkun inti qed tiġi ttrattat għaliha u tvarja bejn 5 mg u 20 mg kuljum.

Persuni anzjani

- Persuni anzjani s-soltu jibdew b'0.5 mg kuljum jew nofs id-doża l-aktar baxxa fl-adulti.
- L-ammont ta' Haldol li tiehu imbagħad jiġi aġġustat sakemm it-tabib isib id-doża li tkun l-aħjar għalik.
- L-ogħla doża li għandhom jiehdu persuni anzjani hija 5 mg kuljum hlief jekk it-tabib tieghek jiddeċiedi li hija meħtieġa doża ogħla.

Tfal u adolexxenti minn 6 snin sa 17-il sena


- Id-doża tieghek is-soltu tkun bejn 0.5 mg u 3 mg kuljum.
- L-adolexxenti sa 17-il sena li jkunu qed jiġu ttrattati għal skizofrenja jew problemi ta' mgieba jistgħu jiehdu doża ogħla, sa 5 mg kuljum.

Kif ghandek tiehu Haldol

- Haldol qiegħed biex jintuza mill-halq.
- Inti tista' thallat is-soluzzjoni orali ta' Haldol fi ftit ilma qabel tohodha, iżda thallathiex ma xi likwidi oħra.

Fuljett ta' tagħrif għas-soluzzjoni orali ta' 2 mg/ml– il-kontenitur b'qattara biss:


- Nehhi l-ghatu mill-flixxun billi tagħfas l-ghatu 'l isfel filwaqt li ddawru lejn ix-xellug.
- Aqleb il-flixxun ta' taht fuq, fuq magħrfa.
- Bil-mod aħfas il-għub tal-flixxun u għodd in-numru ta' qtar li għandek bżonn tiehu.
- Ixrob is-soluzzjoni minnufih.
- Aghlaq il-flixxun.



Fuljett ta' taghrif ghas-soluzzjoni orali ta' 2 mg/ml – il-flixkun bis-siringa tal-halq biss:

Inti tehtieg li tiehu s-soluzzjoni billi tuza s-siringa tal-halq.

- Poġġi l-flixkun fuq wiċċ ċatt.
- Nehhi l-ghatu mill-flixkun billi tagħfas l-ghatu 'l isfel filwaqt li ddawru lejn ix-xellug (figura 1).
- Tarf wiehed tas-siringa tal-halq għandu planger. Poġġi t-tarf l-iehor fis-soluzzjoni ġol-flixkun.
- Filwaqt li żżomm iċ-ċirku ta' taht tas-siringa tal-halq, iġbed iċ-ċirku ta' fuq tal-planger 'il fuq. Aghmel dan, sakemm il-marka li taqbel man-numru ta' millilitri (ml) tibda tidher (figura 2).
- Filwaqt li żżomm iċ-ċirku ta' taht, nehhi s-siringa tal-halq kollha kemm hi mill-flixkun (figura 3).
- Battal il-kontenut tas-siringa tal-halq ġo magħrfa jew ġo tazza. Aghmel dan billi żżerżaq iċ-ċirku ta' fuq 'l isfel filwaqt li tibqa' żżomm iċ-ċirku ta' taht.
- Ixrob is-soluzzjoni minnufih.
- Aghlaq il-flixkun, imbagħad laħlaħ is-siringa tal-halq bi ffit ilma.



Fuljett ta' taghrif ghas-soluzzjoni orali ta' 10 mg/ml – il-kontenitur b'qattara biss:

- Nehhi l-ghatu mill-flixkun billi tagħfas l-ghatu 'l isfel filwaqt li ddawru lejn ix-xellug.
- Aqleb il-flixkun ta' taht fuq, fuq magħrfa.
- Bil-mod aħfas il-ġnub tal-flixkun u għodd in-numru ta' qtar li għandek bżonn tiehu.
- Ixrob is-soluzzjoni minnufih.
- Aghlaq il-flixkun




Fuljett ta' taghrif ghas-soluzzjoni orali ta' 10 mg/ml – il-flixxun bis-siringa tal-halq biss:

Inti tehtieg tiehu s-soluzzjoni billi tuza s-siringa tal-halq. L-ewwel darba li tuzagħha inti trid twahħal is-siringa tal-halq mal-flixxun, kif ġej:

- Nehhi l-ghatu mill-flixxun billi tagħfas 'l isfel l-ghatu li fih il-kamin filwaqt li ddawru lejn ix-xellug (figura 1).
- Iġbed is-siringa tal-halq mill-kontenitur tagħha (figura 2).
- Wahħal is-siringa tal-halq mal-flixxun billi ddawar il-kamin.

Kif tuza s-siringa tal-halq minn hemm 'il quddiem:

- Holl il-kamin tas-siringa tal-halq minn mal-flixxun billi tagħfas l-ghatu li fih il-kamin 'l isfel filwaqt li ddawru lejn ix-xellug (figura 3).
- Iġbed is-soluzzjoni san-numru korrett ta' millilitri (ml).
- Battal il-kontenut ġo magħrfa.
- Ixrob is-soluzzjoni minnufih.
- Erga' wahħal is-siringa tal-halq fuq il-flixxun billi ddawwar il-kamin.



Jekk tiehu aktar Haldol milli suppost

Jekk tiehu aktar Haldol milli qalulek jew jekk xi haddiehor ha xi Haldol, kellem tabib jew mur fl-eqreb dipartiment tal-emergenza ta' sptar minnufih.

Jekk tinsa tiehu Haldol

- Jekk tinsa tiehu doza, hu d-doza li jmissek bhas-soltu. Imbagħad ibqa' hu l-medicina tiegħek kif ikun qallek it-tabib tiegħek.
- Tihux doza doppja.

Jekk tieqaf tiehu Haldol

Sakemm it-tabib tiegħek ma jghidlekx mod ieħor, inti għandek tieqaf tiehu Haldol bil-mod il-mod. It-twaqqif f'daqqa tat-trattament jista' jikkawża effetti bħal:

- Nawsja u rimettar
- Diffikultà biex torqod.

Dejjem segwi l-istruzzjonijiet tat-tabib tiegħek b'attenzjoni.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' din il-medicina, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

4. Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull medicina ohra, din il-medicina tista' tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f'kulhadd.

Ogħhod attent/a għal effetti sekondarji serji

Għid lit-tabib tiegħek mill-ewwel jekk inti tinnota jew tissuspetta xi wahda minn dawn li ġejjin. Inti tista' tkun tehtieg trattament mediku urgenti.

Problemi bil-qalb:

- Ritmu mhux normali ta' taħbit tal-qalb – dan iwaqqaf il-qalb milli taħdem b'mod normali u jista' jikkawża telf mis-sensi
- Taħbit tal-qalb mgħaġġel b'mod mhux normali
- Taħbitiet żejda tal-qalb.

Problemi fil-qalb mhumie x komuni f'persuni li jkunu qed jiehdu Haldol (jistghu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 100). Mewt zoptu sehhet f'pazjenti li kienu qed jiehdu din il-medicina izda l-frekwenza ezatta ta' dawn l-imwiet mhijiex maghrufa. Waqfien kardijaku (il-qalb tieqaf thabbat) seh h ukoll f'persuni li kienu qed jiehdu medicini antipsikoti ci.

Problema serja msejha 'sindrom newrolettiku malinn'. Dan jikkawza deni gholi, ebusija severa fil-muskoli, konfużjoni u telf mis-sensi. Huwa rari f'persuni li jkunu qed jiehdu Haldol (jista' jaffettwa sa persuna 1 minn kull 1,000).

Problemi biex jiġu kkontrollati movimenti tal-ġisem jew tad-dirghajn u r-riglejn (disturb ekstrapiramidali), bhal:

- Movimenti tal-halq, tal-ilsien, tax-xedaq u xi drabi tad-dirghajn u r-riglejn (diskajneżja tardiva)
- Thossok bla kwiet jew issibha diffi ci toqghod bla ma ti ccaqlaq, zieda fil-movimenti tal-ġisem
- Movimenti tal-ġisem bil-mod jew imnaqqsa, movimenti bl-iskossi jew bit-tkghawwiġ
- Roghda jew ebusija fil-muskoli, tkaxkir mal-mixi
- Ma tkunx tista' ti ccaqlaq
- Nuqqas ta' espressjoni normali tal-wi c li xi drabi jidher qisu maskra.

Dawn huma komuni hafna f'persuni li jiehdu Haldol (jistghu jaffettwaw aktar minn persuna 1 minn kull 10). Jekk ikollok xi wiehed minn dawn l-effetti, jista' jkun li inti tinghata medicina addizzjonali.

Reazzjoni allergika severa li tista' tinkludi:

- Wi c, xofftejn, halq, ilsien jew gerżuma minfu hin
- Tbatija biex tibla' jew biex tiehu n-nifs
- Raxx bil-hakk (horriqija).

Reazzjoni allergika mhijiex komuni f'persuni li jiehdu Haldol (tista' taffettwa sa persuna wahda minn kull 100).

Taghqid tad-demmi fil-vini, is-soltu fir-riglejn (trombozi fil-vini fil-fond jew DVT, *deep vein thrombosis*). Dan ġie rrapportat f'persuni li jiehdu medicini antipsikoti ci. Is-sinjali ta' DVT fir-rigel jinkludu nefha, uġiġh u hmura fir-rigel, izda t-taghqid tad-demmi jista' jimxi għall-pulmun fejn jikkawza uġiġh fis-sider u diffikultà fit-tehid tan-nifs. Taghqid tad-demmi jista' jkun serju hafna, għalhekk għid lit-tabib tieghek minnufih jekk tinnota xi wahda minn dawn il-problemi.

Għid lit-tabib tieghek minnufih jekk inti tinnota xi wahda minn dawn l-effetti sekondarji serji t'hawn fuq.

Effetti sekondarji oħra

Għid lit-tabib tieghek jekk inti tinnota jew tissuspetta xi wiehed mill-effetti sekondarji li ġejjin.

Komuni hafna (jistghu jaffettwaw aktar minn persuna 1 minn kull 10):

- Thossok aġitat/a
- Diffikultà biex torqod
- Uġiġh ta' ras.

Komuni (jistghu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 10):

- Problemi serji ta' saħha mentali, bhal temmen affarijiet li mhumie x veri (delużjonijiet) jew tara, thoss, tisma' jew ixxomm affarijiet li mhumie x hemm (alluċinazzjonijiet)
- Depressjoni
- Tensjoni mhux normali fil-muskoli
- Thossok stordut/a, inkluz meta tqum bilqeghda jew bilwieqfa
- Thossok bi nġhas

- Moviment 'il fuq tal-ghajnejn jew movimenti jghaġġlu tal-ghajnejn li inti ma tkunx tista' tikkontrolla
- Problemi bil-vista, bhal vista mċajpra
- Pressjoni baxxa
- Dardir, rimettar
- Stitikezza
- Halq xott jew zieda fir-rieq
- Raxx fil-ġilda
- Ma tkunx tista' tagħmel l-awrina jew tbattal il-bużżieqa tal-awrina kompletament
- Diffikultà biex tikseb u żżomm erezzjoni (impotenza)
- Zieda fil-piż jew telf ta' piż
- Bidliet li jidhru b'testijiet tad-demmm tal-fwied.

Mhux komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 100):

- Effetti fuq iċ-ċelluli tad-demmm – numru baxx tat-tipi kollha ta' ċelluli tad-demmm, inkluż tnaqqis sever fiċ-ċelluli tad-demmm bojod u numru baxx ta' 'plejtlits' (ċelluli li jgħinu d-demmm jagħqad)
- Thossok konfuż
- Telf ta' ġibda għas-sess jew tnaqqis fil-ġibda għas-sess
- Aċċessjonijiet
- Muskoli u ġogi ibsin
- Spażmi, ġbid jew kontrazzjonijiet fil-muskoli li inti ma tistax tikkontrolla, inkluż spażmu fl-ghonq li jġieghel ir-ras tingibed lejn naħa waħda
- Problemi biex timxi
- Ikollok qtugħ ta' nifs
- Fwied iffjammat, jew problema fil-fwied li tikkawża sfurija fil-ġilda jew fl-abjad tal-ghajnejn (suffejra)
- Zieda fis-sensittività tal-ġilda għax-xemx
- Hakk
- Hruġ eċċessiv ta' għaraq
- Bidliet fiċ-ċiklu tal-menstrwazzjoni (*period*), bhal ma jkunx hemm *periods*, jew *periods* li jiehdu fit-tul, bi tnixxija qawwija u bl-uġiġħ
- Produzzjoni mhux mistennija ta' halib tas-sider
- Uġiġħ jew skumdità fis-sider
- Temperatura għolja tal-ġisem
- Nefha kkawżata minn akkumulazzjoni ta' fluwidu fil-ġisem.

Rari (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 1,000):

- Livell għoli tal-ormon 'prolaktin' fid-demmm
- Passaġġi tan-nifs fil-pulmuni jidjieu u jikkawżaw diffikultà bit-tehid tan-nifs
- Diffikultà biex tiftaħ jew ma tkunx tista' tiftaħ halqek
- Problemi biex tagħmel is-sess.

L-effetti sekondarji li ġejjin kienu rrappurtati wkoll, iżda l-frekwenza eżatta tagħhom mhijiex magħrufa:

- Livell għoli tal-'ormon antidijuretik' fid-demmm (sindrom ta' sekrezzjoni mhux xierqa tal-ormon antidijuretik)
- Livell baxx ta' zokkor fid-demmm
- Nefha madwar il-laringi jew spażmu li ma jdumx fil-kordi vokali, li jista' jikkawża diffikultà biex titkellem jew tiehu n-nifs
- Insuffiċjenza tal-fwied f'daqqa waħda
- Tnaqqis fit-tnixxija tal-bila fil-passaġġ tal-bila
- Ġilda bil-qxur jew li titqaxxar
- Kanali żgħar tad-demmm iffjammati, li jwasslu għal raxx fil-ġilda b'hotob żgħar homor jew vjola

- Dizintegrazzjoni tat-tessut tal-muskolu (rabdomijolisi)
- Erezzjoni tal-pene persistenti u bl-uġigh
- Tkabbir tas-sider fl-irġiel
- Temperatura baxxa tal-ġisem.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek. Dan jinkludi xi effetti sekondarju li mhux elenkat f'dan il-fuljett. Tista' wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali imnizżla f' [Appendiċi V](#). Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista' tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta' din il-medicina.

5. Kif taħzen Haldol

Żomm din il-medicina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-medicina wara d-data ta' meta tiskadi li tidher fuq it-tikketta tal-flixkun jew il-kartuna. Id-data ta' meta tiskadi tirreferi għall-aħħar gurnata ta' dak ix-xahar.

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

Tarmix medicini mal-ilma tad-dranagg <jew mal-iskart domestiku>. Staqsi lill-ispizjar tiegħek dwar kif għandek tarmi medicini li m'għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni ohra

X'fih Haldol

Is-sustanza attiva hi haloperidol.

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

Kif jidher Haldol u l-kontenut tal-pakkett

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq u l-Manifattur

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

{Isem u indirizz}

<{tel}>

<{fax}>

<{e-mail}>

Dan il-prodott mediċinali huwa awtorizzat fl-istati membri tal-EEA b'dawn l-ismijiet:

L-Awstrija, Il-Belġju, Ċipru, Franza, L-Islanda, L-Italja, Il-Lussemburgu, Malta, L-Olanda, In-Norveġja, Il-Portugall, Ir-Rumanija, L-Isvezja, Ir-Renju Unit:	Haldol
Id-Danimarka, Il-Finlandja:	Serenase
Il-Ġermanja:	Haldol-Janssen
Il-Greċja:	Aloperidin

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f'{xahar SSSS}.

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

<Sorsi ohra ta' informazzjoni>

<Informazzjoni dettaljata dwar din il-medicina tinsab fuq is-sit elettroniku ta' {isem tal-Istat Membru/Aġenzija}>

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

It-tagħrif li jmiss qed jinghata biss għall-professjonisti fil-qasam mediku:

Fuljett ta' tagħrif għas-soluzzjoni orali ta' 2 mg/ml – il-kontenitur b'qattara biss:

Is-soluzzjoni orali ta' HALDOL 2 mg/ml f'kontenitur b'qattara qegħda biex tintuża għal dozi waħdiet sa 2 mg haloperidol (ekwivalenti għal 20 qatra).

In-numru ta' qatriet meħtieġa biex tinkiseb doża waħda speċifikata bl-użu tas-soluzzjoni orali ta' HALDOL 2 mg/ml hija pprezentata taħt.

Tabella ta' konverżjoni għas-soluzzjoni orali ta' HALDOL 2 mg/ml

mg haloperidol	Numru ta' qtra ta' HALDOL (kontenitur b'qattara)
0.1 mg	qatra 1
0.2 mg	2 qatriet
0.3 mg	3 qatriet
0.4 mg	4 qatriet
0.5 mg	5 qatriet
1 mg	10 qatriet
2 mg	20 qatra

Fuljett ta' tagħrif għas-soluzzjoni orali ta' 2 mg/ml – flixkun bis-siringa tal-ħalq biss:

Is-soluzzjoni orali ta' HALDOL 2 mg/ml fi flixkun b'siringa tal-ħalq qegħda biex tintuża għal dozi waħdiet ta' 0.5 mg haloperidol u aktar (ekwivalenti għal 0.25 ml u aktar).

Il-kwantità (ml) meħtieġa biex tinkiseb doża waħda speċifikata bl-użu tas-soluzzjoni orali ta' HALDOL 2 mg/ml hija pprezentata taħt.

Tabella ta' konverżjoni għas-soluzzjoni orali ta' HALDOL 2 mg/ml

mg haloperidol	ml HALDOL (flixkun bis-siringa tal-ħalq)
0.5 mg	0.25 ml
1 mg	0.5 ml
2 mg	1 ml
5 mg	2.5 ml
10 mg	5 ml
15 mg	7.5 ml
20 mg	10 ml

Fuljett ta' tagħrif għas-soluzzjoni orali ta' 10 mg/ml – il-kontenitur b'qattara biss:

Is-soluzzjoni orali ta' HALDOL 10 mg/ml f'kontenitur b'qattara qiegħed biex jintuża għal dozi waħdiet sa 10 mg haloperidol (20 qatra).

In-numru ta' qtar mehtieġa biex tinkiseb doża wahda speċifikata bl-użu tas-soluzzjoni orali ta' HALDOL 10 mg/ml hija ppreżentata taht.

Tabella ta' konverżjoni għas-soluzzjoni orali ta' HALDOL 10 mg/ml

mg haloperidol	Numru ta' qtar ta' HALDOL (kontenitur b'qattara)
0.5 mg	qatra 1
1 mg	2 qatriet
2 mg	4 qatriet
3 mg	6 qatriet
4 mg	8 qatriet
5 mg	10 qatriet
10 mg	20 qatra

Fuljett ta' tagħrif għas-soluzzjoni orali ta' 10 mg/ml – il-flixxun bis-siringa tal-halq biss:

Is-soluzzjoni orali ta' HALDOL 10 mg/ml fi flixxun fi flixxun b'siringa tal-halq qegħda biex tintuża għal doži wahdiet ta' 5 mg haloperidol u aktar (ekwivalenti għal 0.5 ml u aktar).

Il-kwantità (ml) mehtieġa biex tinkiseb doża wahda speċifikata bl-użu tas-soluzzjoni orali ta' HALDOL 10 mg/ml hija ppreżentata taht.

Tabella ta' konverżjoni għas-soluzzjoni orali ta' HALDOL 10 mg/ml

mg haloperidol	ml HALDOL (flixxun bis-siringa tal-halq)
5 mg	0.5 ml
10 mg	1 ml
15 mg	1.5 ml
20 mg	2 ml

Fuljett ta' taghrif: Informazzjoni għall-pazjent

HALDOL u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 5 mg/ml soluzzjoni għall-injezzjoni

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

haloperidol

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-mediċina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib, lill-ispizjar jew lill-infermier tiegħek.
- Din il-mediċina għet mogħtija lilek. M'għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista' tagħmlilhom il-ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sinjali ta' mard bħal tiegħek.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib, lill-ispizjar jew lill-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi effetti sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F'dan il-fuljett:

1. X'inhu Haldol u għalxiex jintuża
2. X'għandek tkun taf qabel ma tingħata Haldol
3. Kif għandek tuża Haldol
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif taħżen Haldol
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1. X'inhu Haldol u għalxiex jintuża

L-isem tal-mediċina tiegħek huwa Haldol.

Haldol fih is-sustanza attiva haloperidol. Din tagħmel parti minn grupp ta' mediċini msejja 'antipsikotiċi'.

Haldol jintuża fl-adulti għal mard li jaffettwa l-mod kif inti taħseb, thossok jew iġġib ruhek. Dawn jinkludu problemi ta' saħħa mentali (bħal skizofrenja u disturb bipolari) u problemi ta' mġieba.

Dan il-mard jista' jġieghlek:

- Thossok konfuż/a (delirju)
- Tara, tisma, thoss jew ixxomm affarijiet li mhumix hemm (allucinazzjonijiet)
- Temmen affarijiet li mhumix minnhom (delużjonijiet)
- Thossik suspettuz/a b'mod mhux tas-soltu (paranojja)
- Thossok eċitat/a, aġitat/a, entużjast/a, impulsiv/a ħafna jew attiv/a b'mod mhux normali
- Thossok aggressiv/a, ostili jew vjolenti ħafna.

Haldol jintuża wkoll fl-adulti:

- Biex jgħin jikkontrolla movimenti fil-marda ta' Huntington
- Biex jevita jew jitratta nawsja u rimettar (thossok imdardar jew tirremetti) wara operazzjoni.

Haldol jista' jintuża waħdu jew flimkien ma' mediċini oħra, u xi drabi jintuża meta mediċini jew trattamenti oħra ma jkunux ħadmu, ikunu kkawżaw effetti sekondarji mhux aċċettabbli, jew ma jkunux jistghu jittieħdu mill-ħalq.

2. X'ghandek tkun taf qabel ma tinghata Haldol

Tużax Haldol jekk:

- Inti allergiku/a għal haloperidol jew għal xi sustanza oħra ta' din il-medicina (elenkati fis-sezzjoni 6)
- Inti tkun anqas konxju tal-affarijiet madwarek jew ir-reazzjonijiet tiegħek isiru bil-mod b'mod mhux tas-soltu
- Inti għandek il-marda ta' Parkinson
- Inti għandek tip ta' dimenzja msejja 'dimenzja bil-korp Lewy'
- Inti għandek paralizi sopranukleari progressiva (PSP - *progressive supranuclear palsy*)
- Inti għandek kondizzjoni tal-qalb imsejja 'intervall QT imtawwal', jew kwalunkwe problema oħra bir-ritmu tal-qalb tiegħek li tidher bħala ntraċċar mhux normali fuq ECG (elettrokardjogramma)
- Inti għandek insuffiċjenza tal-qalb jew dan l-aħhar tak attakk tal-qalb
- Inti għandek livell baxx ta' potassium fid-demm tiegħek, li ma giex trattat
- Inti tiegħu kwalunkwe waħda mill-medicini elenkati taħt 'Medicini oħra u Haldol - Tużax Haldol jekk inti qed tiegħu ċerti medicini għal'.

Din il-medicina m'għandhiex tintuża jekk xi waħda minn dawn t'hawn fuq tapplika għalik. Jekk għandek xi dubju, kellem lit-tabib, lill-ispizjar jew lill-infermier tiegħek qabel tinghata Haldol.

Twissijiet u prekawzjonijiet

Effetti sekondarji serji

Haldol jista' jikkawża problemi bil-qalb, problemi bil-kontroll ta' movimenti tal-gisem jew tad-dirgħajn u r-riġlejn u effetti sekondarju serju msejjah 'sindrom newrolettiku malinn'. Huwa jista' jikkawża wkoll reazzjonijiet allergiċi severi u tagħqid tad-demm. Inti għandek tkun konxju tal-effetti sekondarji serji waqt li tkun qed tuża Haldol minhabba li inti tista' tkun tehtieg trattament mediku urgenti. Ara 'Oqghod attent/a għal effetti sekondarji serji' f'sezzjoni 4.

Persuni anzjani u persuni bid-dimenzja

Żieda zghira fl-imwiet u fil-puplesija giet irrappurtata għal persuni anzjani b'dimenzja li jkunu qed jieħdu medicini antipsikotiċi. Kellem lit-tabib tiegħek qabel tinghata Haldol jekk inti anzjan/a, b'mod partikolari jekk għandek id-dimenzja.

Kellem lit-tabib tiegħek jekk inti għandek:

- Tahbit tal-qalb bil-mod, mard tal-qalb, jew xi hadd fil-familja tiegħek li miet zoptu minhabba problemi tal-qalb
- Pressjoni baxxa, jew thossok stordut/a meta tqum bilqegħda jew bilwieqfa
- Livell baxx ta' potassium jew magnesium (jew 'elettrolit' ieħor) fid-demm tiegħek. It-tabib tiegħek se jiddeċiedi kif jitratta dan
- Qatt kellek hrug ta' demm fil-moħħ, jew it-tabib tiegħek qallek li inti għandek aktar probabbiltà minn persuni oħra li tgħaddik puplesija
- Epilessija jew qatt kellek aċċessjonijiet (konvulzjonijiet)
- Problemi bil-kliewi, bil-fwied jew bil-glandola tat-tirojde
- Livell għoli tal-ormon 'prolaktin' fid-demm tiegħek, jew kanċer li jista' jiġi kkawżat minn livelli għoljin tal-prolaktin (bħal kanċer tas-sider)
- Storja ta' tagħqid tad-demm, jew xi hadd ieħor fil-familja għandu storja ta' tagħqid tad-demm
- Depressjoni, jew inti għandek disturb bipolar u tibda thossok depress/a.

Inti tista' tkun tehtieg tiġi mmonitorjat/a aktar mill-qrib, u l-ammont ta' Haldol li tinghata jista' jkollu bżonn jinbidel.

Jekk inti m'intix ċert/a jekk xi waħda minn dawn tapplikax għalik, kellem lit-tabib jew lill-infermier tiegħek qabel tinghata Haldol.

Eżamijiet mediċi

It-tabib tiegħek jista' jkun irid jiehu elettrokardjogramma (ECG, *electrocardiogram*) qabel jew waqt it-trattament tiegħek b'Haldol. L-ECG tkejjel l-attività elettrika tal-qalb tiegħek.

Testijiet tad-demem

It-tabib tiegħek jista' jkun irid jiċċekkja l-livelli tal-potassium jew tal-magnesium (jew 'elettrolit' iehor) fid-demem tiegħek qabel jew matul it-trattament tiegħek b'Haldol.

Tfal u adolexxenti

Haldol m'għandux jintuża fi tfal u adolexxenti ta' taht it-18-il sena. Dan minhabba li huwa għadu ma ġiex studjat f'dawn il-gruppi ta' etajiet.

Mediċini ohra u Haldol

Għid lit-tabib, lill-ispizjar jew lill-infermier tiegħek jekk qiegħed tiehu, haadt dan l-ahhar jew tista' tiehu xi mediċina ohra.

Tużax Haldol jekk inti tkun qed tiehu ċerti mediċini għal:

- Problemi bit-tahbit tal-qalb tiegħek (bħal amiodarone, dofetilide, disopyramide, dronedarone, ibutilide, quinidine u sotalol)
- Depressjoni (bħal citalopram u escitalopram)
- Psikożi (bħal fluphenazine, levomepromazine, perphenazine, pimozide, prochlorperazine, promazine, sertindole, thiorizadine, trifluoperazine, triflupromazine u ziprasidone)
- Infezzjonijiet bil-batterji (bħal azithromycin, clarithromycin, erythromycin, levofloxacin, moxifloxacin u telithromycin)
- Infezzjonijiet bil-fungu (bħal pentamidine)
- Malarja (bħal halofantrine)
- Nawsja u rimettar (bħal dolasetron)
- Kanċer (bħal toremifene u vandetanib).

Għid lit-tabib tiegħek ukoll jekk inti qed tiehu bepridil (għal uġigh fis-sider jew biex tbaxxi l-pressjoni) jew methadone (mediċina kontra l-uġigh jew bħala trattament għall-vizzju tad-droga). Dawn il-mediċini jistgħu jagħmlu problemi tal-qalb aktar possibbli, għalhekk kellem lit-tabib tiegħek jekk inti qed tiehu kwalunkwe wahda minn dawn u tużax Haldol (ara 'Tużax Haldol jekk').

Jista' jkun mehtieg monitoraġġ speċjali jekk inti tkun qed tuża lithium u Haldol fl-istess hin.

Għid lit-tabib tiegħek minnufih u ieqaf hu ż-żewġ mediċini jekk:

- Ikollok deni li ma tistax tispjega minn fejn ġie jew movimenti li ma tistax tikkontrolla
 - Tkun konfuż/a, diżorjentat/a, ikollok uġigh ta' ras, problemi bil-bilanċ u thossok bi nġhas.
- Dawn huma sintomi ta' kundizzjoni serja.

Ċerti mediċini jistgħu jaffettwaw il-mod kif jahdem Haldol jew jistgħu jġieghlu problemi tal-qalb isiru aktar possibbli

Għid lit-tabib tiegħek jekk inti qed tiehu:

- Alprazolam jew buspirone (għall-ansjetà)
- Duloxetine, fluoxetine, fluvoxamine, nefazodone, paroxetine, sertraline, St John's Wort (*Hypericum perforatum*) jew venlafaxine (għad-depressjoni)
- Bupropion (għad-depressjoni jew biex jgħinek tieqaf tpejjep)
- Carbamazepine, phenobarbital jew phenytoin (għall-epilessija)
- Rifampicin (għal infezzjonijiet bil-batterji)
- Itraconazole, posaconazole jew voriconazole (għal infezzjonijiet bil-fungu)
- Pilloli ta' ketoconazole (għat-trattament tas-sindrom ta' Cushing)
- Indinavir, ritonavir jew saquinavir (għall-virus tal-immunodeficienza umana jew HIV)
- Chlorpromazine jew promethazine (għad-dardir u r-rimettar)
- Verapamil (għall-pessjoni jew għal problemi tal-qalb).

Għid lit-tabib tiegħek ukoll jekk inti qed tiehu mediċini ohra biex tbaxxi l-pessjoni, bħal pilloli tal-pipi (dijuretiċi).

It-tabib tieghek jista' jibdel id-doża ta' Haldol tieghek jekk inti tkun qed tiehu xi wahda minn dawn il-medicini.

Haldol jista' jaffettwa l-mod kif it-tipi ta' medicini li gejjin jahdmu

Ghid lit-tabib tieghek jekk inti qed tiehu medicini:

- Biex jikkalmawk jew jghinuk torqod (kalmanti)
- Għall-uġigh (pilloli qawwija tal-uġigh)
- Għad-depressjoni ('medicini triċikliċi kontra d-depressjoni')
- Biex ibaxxu l-pressjoni (bħal guanethidine u methyldopa)
- Għal reazzjonijiet allergiċi severi (adrenalina)
- Għad-disturb ta' nuqqas ta' attenzjoni u attività eċċessiva (ADHD, *attention deficit hyperactivity disorder*) jew narkolepsija (magħrufa bħala 'stimulanti')
- Għall-marda ta' Parkinson (bħal levodopa)
- Biex iraqqu d-demm (phenindione).

Kellem lit-tabib jew lill-infermier tieghek qabel tinghata Haldol jekk inti qed tiehu xi wahda minn dawn il-medicini.

Haldol u l-alkohol

Ix-xorb tal-alkohol waqt li inti tkun qed tuża Haldol jista' jġieghlek thossok bi nġhas u inqas attent. Dan ifisser li inti għandek toqghod attent/a kemm tixrob alkohol. Kellem lit-tabib tieghek dwar ix-xorb tal-alkohol waqt li tkun qed tuża Haldol, u għid lit-tabib tieghek kemm tixrob.

Tqala, treddigh u fertilità

Tqala – jekk inti tqila, tahseb li tista' tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir tat-tabib tieghek. It-tabib tieghek jista' jagħtik parir ma tużax Haldol waqt li tkun tqila.

Il-problemi li gejjin jistgħu jseħħu fi trabi tat-twelid ta' ommijiet li jużaw Haldol fl-aħħar 3 xhur tat-tqala tagħhom (l-aħħar trimestru):

- Rogħda fil-muskoli, muskoli ibsin jew dgħajfa
- Ikunu bi nġhas jew aġitati
- Problemi biex jieħdu n-nifs jew biex jinsqew.

Il-frekwenza eżatta ta' dawn il-problemi mhijiex magħrufa. Jekk inti užajt Haldol waqt it-tqala u t-tarbija tieghek tiżviluppa xi wiehed minn dawn l-effetti sekondarji, ikkuntattja lit-tabib tieghek.

Treddigh – kellem lit-tabib tieghek jekk inti qed tredda' jew qed tippjana li tredda'. Dan minhabba li ammonti żgħir tal-medicina jistgħu jgħaddu għal ġol-halib tas-sider tal-omm u jgħaddu lit-tarbija. It-tabib tieghek se jiddiskuti r-riskji u l-benefiċċji tat-treddigh waqt li inti tkun qed tuża Haldol.

Fertilità – Haldol jista' jżid il-livelli tieghek ta' ormon imsejjah 'prolaktin', li jista' jaffettwa l-fertilità fl-irġiel u n-nisa. Kellem lit-tabib tieghek jekk għandek xi mistoqsijiet dwar dan.

Sewqan u thaddim ta' magni

Haldol jista' jaffettwa l-hila li inti ssuq u tuża għodod jew thaddem magni. Effetti sekondarji bħal, thossok bi nġhas, jistgħu jaffettwaw l-attenzjoni tieghek, b'mod partikolari fil-bidu li tibda tuża jew wara doża għolja. Issuqx, tużax għodod u thaddimx magni mingħajr mal-ewwel tiddiskuti dan mat-tabib tieghek.

3. Kif għandek tuża Haldol

Kemm se tinghata medicina

It-tabib tieghek se jiddeciedi kemm għandek bżonn Haldol u għal kemm żmien. Jista' jgħaddi f'it taż-żmien qabel ma inti tibda thoss l-effett kollu tal-medicina. It-tabib tieghek is-soltu jagħtik doża baxxa biex tibda, imbagħad jaġġusta d-doża biex tkun tajba għalik. Id-doża tieghek ta' haloperidol se tkun tiddependi fuq:

- L-età tieghek
- X'kundizzjoni qed tiġi ttrattat/a għaliha
- Jekk inti għandekx problemi fil-kliwi jew fil-fwied
- Medicini oħra li inti qed tiegħu.

Adulti

- Id-doża tal-bidu tieghek is-soltu tkun bejn milligramma 1 u 5 mg.
- Jista' jkun li inti tinghata aktar doži, is-soltu minn siegħa sa 4 sigħat bogħod minn xulxin.
- Inti m'intix se tinghata aktar minn total ta' 20 mg kuljum.

Persuni anzjani

- Persuni anzjani s-soltu jibdw b'0.5 mg kuljum jew nofs id-doża l-aktar baxxa fl-adulti.
- Id-doża mbagħad tiġi aġġustata sakemm it-tabib isib id-doża li tkun l-aktar tghodd għalik.
- Inti m'intix se tinghata aktar minn total ta' 5 mg kuljum hlief jekk it-tabib tieghek jiddeċiedi li hija meħtieġa doża oġhla.

Kif jinghata Haldol

Haldol se jinghata minn tabib jew infermier. Huwa qiegħed għal użu għal ġol-muskoli, u jinghata bħala injezzjoni ġo muskolu.

Jekk taqbez doża jew tiegħu wisq Haldol

Tabib jew infermier se jagħtuk din il-medicina, għalhekk mhuwiex probabbli li inti se taqbez doża jew tinghata ż-żejjed. Jekk inti inkwetat/a, għid lit-tabib jew lill-infermier tieghek.

Jekk tieqaf tuża Haldol

Sakemm it-tabib tieghek ma jiddeċidix mod ieħor, Haldol se jitwaqqaflek bil-mod il-mod. It-twaqqif f'daqqa tat-trattament jista' jikkawża effetti bħal:

- Nawsja u rimettar
- Diffikultà biex torqod.

Dejjem segwi l-istruzzjonijiet tat-tabib tieghek b'attenzjoni.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' din il-medicina, staqsi lit-tabib, lill-ispizjar jew lill-infermier tieghek.

4. Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull medicina oħra, din il-medicina tista' tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f'kulhadd.

Oqgħod attent/a għal effetti sekondarji serji

Għid lit-tabib jew lill-infermier tieghek mill-ewwel jekk inti tinnota jew tissuspetta xi waħda minn dawn li ġejjin. Inti tista' tkun teħtieġ trattament mediku urġenti.

Problemi bil-qalb:

- Ritmu mhux normali ta' taħbit tal-qalb – dan iwaqqaf il-qalb milli taħdem b'mod normali u jista' jikkawża telf mis-sensi
- Taħbit tal-qalb mgħaġġel b'mod mhux normali
- Taħbitiet zejda tal-qalb.

Problemi fil-qalb mhumix komuni f'persuni li jkun qed jużaw Haldol (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 100). Mewt zoptu seħhet f'pazjenti li kienu qed jużaw din il-medicina izda l-frekwenza eżatta ta' dawn l-imwiet mhijiex magħrufa. Waqfien kardijaku (il-qalb tieqaf tħabbat) sehh ukoll f'persuni li kienu qed jiehdu medicini antipsikotiċi.

Problema serja msejha ‘sindrom newrolettiku malinn’. Dan jikkawża deni għoli, ebusija severa fil-muskoli, konfużjoni u telf mis-sensi. Huwa rari f’persuni li jkunu qed jużaw Haldol (jista’ jaffettwa sa persuna 1 minn kull 1,000).

Problemi biex jiġu kkontrollati movimenti tal-ġisem jew tad-dirġajn u r-riġlejn (disturb ekstrapiramidali), bħal:

- Movimenti tal-ħalq, tal-ilsien, tax-xedaq u xi drabi tad-dirġajn u r-riġlejn (diskajneżja tardiva)
- Thossok bla kwiet jew issibha diffiċli toqgħod bla ma tiċċaqlaq, żieda fil-movimenti tal-ġisem
- Movimenti tal-ġisem bil-mod jew imnaqqsa, movimenti bl-iskossi jew bit-tkghawwiġ
- Rogħda jew ebusija fil-muskoli, tkaxkir mal-mixi
- Ma tkunx tista’ tiċċaqlaq
- Nuqqas ta’ espressjoni normali tal-wiċċ li xi drabi jidher qisu maskra.

Dawn huma komuni ħafna f’persuni li jużaw Haldol (jistgħu jaffettwaw aktar minn persuna 1 minn kull 10). Jekk ikollok xi wiehed minn dawn l-effetti, jista’ jkun li inti tingħata medicina addizzjonali.

Reazzjoni allergika severa li tista’ tinkludi:

- Wiċċ, xofftejn, ħalq, ilsien jew gerżuma minfuħin
- Tbatija biex tibla’ jew biex tiehu n-nifs
- Raxx bil-ħakk (ħorriqija).

Reazzjoni allergika mhijiex komuni f’persuni li jużaw Haldol (tista’ taffettwa sa persuna waħda minn kull 100).

Tagħqid tad-demmi fil-vini, is-soltu fir-riġlejn (trombozi fil-vini fil-fond jew DVT, *deep vein thrombosis*). Dan ġie rrapportat f’persuni li jiehdu medicini antipsikotiċi. Is-sinjali ta’ DVT fir-riġel jinkludu nefha, uġiġħ u ħmura fir-riġel, iżda t-tagħqid tad-demmi jista’ jimxi għall-pulmun fejn jikkawża uġiġħ fis-sider u diffikultà fit-tehid tan-nifs. Tagħqid tad-demmi jista’ jkun serju ħafna, għalhekk għid lit-tabib tiegħek minnufih jekk tinnota xi waħda minn dawn il-problemi.

Għid lit-tabib tiegħek minnufih jekk inti tinnota xi waħda minn dawn l-effetti sekondarji serji t’hawn fuq.

Effetti sekondarji oħra

Għid lit-tabib tiegħek jekk inti tinnota jew tissuspetta xi wiehed mill-effetti sekondarji li ġejjin.

Komuni ħafna (jistgħu jaffettwaw aktar minn persuna 1 minn kull 10):

- Thossok aġitat/a
- Diffikultà biex torqod
- Uġiġħ ta’ ras.

Komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 10):

- Problemi serji ta’ saħħa mentali, bħal temmen affarijiet li mhumiex veri (delużjonijiet) jew tara, thoss, tisma’ jew ixxomm affarijiet li mhumiex hemm (alluċinazzjonijiet)
- Depressjoni
- Tensjoni mhux normali fil-muskoli
- Thossok stordut/a, inkluz meta tqum bilqegħda jew bilwieqfa
- Thossok bi ngħas
- Moviment ’il fuq tal-ġhajnejn jew movimenti jgħagglu tal-ġhajnejn li inti ma tkunx tista’ tikkontrolla
- Problemi bil-vista, bħal vista mċajpra
- Pressjoni baxxa
- Dardir, rimettar
- Stitikezza

- Halq xott jew zieda fir-rieq
- Raxx fil-ġilda
- Ma tkunx tista' tagħmel l-awrina jew tbattal il-bużżieqa tal-awrina kompletament
- Diffikultà biex tikseb u żżomm erezzjoni (impotenza)
- Żieda fil-piż jew telf ta' piż
- Bidliet li jidhru b'testijiet tad-demmm tal-fwied.

Mhux komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 100):

- Effetti fuq iċ-ċelluli tad-demmm – numru baxx tat-tipi kollha ta' ċelluli tad-demmm, inkluż tnaqqis sever fiċ-ċelluli tad-demmm bojod u numru baxx ta' 'plejtlits' (ċelluli li jgħinu d-demmm jagħqad)
- Thossok konfuż
- Telf ta' ġibda għas-sess jew tnaqqis fil-ġibda għas-sess
- Aċċessjonijiet
- Muskoli u ġogi ibsin
- Spażmi, ġbid jew kontrazzjonijiet fil-muskoli li inti ma tistax tikkontrolla, inkluż spażmu fl-ghonq li jġieghel ir-ras tingibed lejn naħa waħda
- Problemi biex timxi
- Ikkollok qtugħ ta' nifs
- Fwied iffjammat, jew problema fil-fwied li tikkawża sfurija fil-ġilda jew fl-abjad tal-ghajnejn (suffejra)
- Żieda fis-sensittività tal-ġilda għax-xemx
- Hakk
- Hruġ eċċessiv ta' għaraq
- Bidliet fiċ-ċiklu tal-menstruazzjoni (*period*), bħal ma jkunx hemm *periods*, jew *periods* li jiehdu fit-tul, bi tnixxija qawwiya u bl-uġiġħ
- Produzzjoni mhux mistennija ta' ħalib tas-sider
- Uġiġħ jew skumdità fis-sider
- Temperatura għolja tal-ġisem
- Nefha kkawżata minn akkumulazzjoni ta' fluwidu fil-ġisem.

Rari (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 1,000):

- Livell għoli tal-ormon 'prolaktin' fid-demmm
- Passaġġi tan-nifs fil-pulmuni jidjieu u jikkawżaw diffikultà bit-tehid tan-nifs
- Diffikultà biex tiftah jew ma tkunx tista' tiftah ħalqek
- Problemi biex tagħmel is-sess.

L-effetti sekondarji li ġejjin kienu rrappurtati wkoll, iżda l-frekwenza eżatta tagħhom mhijiex magħrufa:

- Livell għoli tal-'ormon antidijuretiku' fid-demmm (sindrom ta' sekrezzjoni mhux xierqa tal-ormon antidijuretiku)
- Livell baxx ta' zokkor fid-demmm
- Nefha madwar il-laringi jew spażmu li ma jdumx fil-kordi vokali, li jista' jikkawża diffikultà biex titkellem jew tiehu n-nifs
- Insuffiċjenza tal-fwied f'daqqa waħda
- Tnaqqis fit-tnixxija tal-bila fil-passaġġ tal-bila
- Ġilda bil-qxur jew li titqaxxar
- Kanali żgħar tad-demmm iffjammati, li jwasslu għal raxx fil-ġilda b'hotob żgħar ħomor jew vjola
- Dizintegrazzjoni tat-tessut tal-muskolu (rabdomijolisi)
- Erezzjoni tal-pene persistenti u bl-uġiġħ
- Tkabbir tas-sider fl-irġiel
- Temperatura baxxa tal-ġisem.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib, lill-ispizjar jew lill-infermier tieghek. Dan jinkludi xi effetti sekondarju li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Tista' wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali imniżżla f' [Appendiċi V](#). Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista' tghin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta' din il-medicina.

5. Kif taħzen Haldol

Żomm din il-medicina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Haldol m'ghandux jintuza wara d-data ta' meta jiskadi li tidher fuq it-tikketta u l-kartuna. Id-data ta' meta jiskadi tirreferi għall-aħhar ġurnata ta' dak ix-xahar.

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni ohra

X'fih Haldol

Is-sustanza attiva hi haloperidol.

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

Kif jidher Haldol u l-kontenut tal-pakkett

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq u l-Manifattur

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

{Isem u indirizz}

<{tel}>

<{fax}>

<{e-mail}>

Dan il-prodott mediċinali huwa awtorizzat fl-istati membri tal-EEA b'dawn l-ismijiet:

L-Awstrija, Il-Belġju, Ċipru, Franza, L-Islanda, L-Italja, Il-Lussemburgu, L-Olanda, In-Norveġja, L-Isvezja, Ir-Renju Unit:	Haldol
Id-Danimarka, Il-Finlandja:	Serenase
Il-Ġermanja:	Haldol-Janssen
Il-Greċja:	Aloperidin

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħhar f'{xahar SSSS}.

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

<Sorsi ohra ta' informazzjoni>

<Informazzjoni dettaljata dwar din il-medicina tinsab fuq is-sit elettroniku ta' {isem tal-Istat Membru/Aġenzija}>

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]